This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

GERALD L. RATHBONE

Stanford University Libraries



3244
1 Bde coll.

Die
fremdländiſchen Stubenvögel,

ihre

Naturgeſchichte, Pflege und Zucht.

Von

Dr. Karl Ruß.

Erſter Band:

Die körnerfreſſenden Vögel, Hartfutter- oder Samenfreſſer.

Mit 14 chromolithographiſchen Tafeln.

Hannover.
Carl Rümpler.
1879.

Die

körnerfreſſenden fremdländiſchen Stubenvögel,

Hartfutter- oder Samenfreſſer.

Von

Dr. Karl Ruß.

Mit 14 chromolithographiſchen Tafeln.

Hannover.
Carl Rümpler.
1879.

636.6
R958
v.1

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von August Grimpe in Hannover

Vorwort.

Vier Jahre sind verflossen, zwischen dem Erscheinen der ersten Lieferung und der neunten, welche den Schluß dieses Bandes bildet. In wirklich zahllosen Briefen hat man mich nach den Ursachen der nur zu langen Verzögerung gefragt. Den Betheiligten, die auf ein Buch als Belehrungsquelle warteten, war dies ja nicht zu verdenken; Denen, welche die Verhältnisse nicht kannten, dünkte das langsame Fortschreiten unerklärlich; nur die Wenigen, welche die Sachlage völlig zu überschauen vermochten, wußten zu ermessen, daß die Säumniß nicht in meinem Verschulden lag.

Als ich den Plan des Werks gemacht, hatte ich die Anzahl der in den Handel gelangenden fremdländischen Vögel wol überblickt, und als erfahrener Schriftsteller konnte ich überschlagen, daß ich die vorhandenen etwa 200 bis 250 Arten nebst ihren nächsten Verwandten mit voller Bequemlichkeit in dem Raume des Inhalts von 15 bis 16 Lieferungen in Groß-Lexikon-Format bei kompressem Satz schildern könne. Seitdem die erste Lieferung herausgekommen, sind jedoch ganz andere Verhältnisse auf diesem Gebiete eingetreten. Die Liebhaberei hat sich in nie geahnter Weise ausgebreitet, der Vogelhandel hat einen staunenswerthen Aufschwung genommen und die Anzahl der lebend eingeführten überseeischen Vögel ist auf nahezu 700 Arten gestiegen.

Man bezeichnet mich allenthalben als den, welcher durch Lebensschilderungen fremdländischer Stubenvögel in viel gelesenen Unterhaltungsblättern und Zeitungen, durch das „Handbuch für Vogelliebhaber" und die Zeitschrift „Die gefiederte Welt" zum größten Theile diese außerordentliche Verbreitung der Liebhaberei, bzl. die Ausdehnung des Vogelhandels hervorgerufen, meinetwegen auch verschuldet hat. Dies mag immerhin richtig sein — doch gerade ich habe unter diesen Verhältnissen leiden müssen, während sie allen Uebrigen nur Freude und Vortheil brachten.

Bereits bei der Arbeit an der zweiten Lieferung mußte ich einsehen, daß es geradezu unmöglich sei, das Werk im Rahmen des ursprünglichen Plans weiterzuführen. Keineswegs durfte ich eine bloße Aufzählung der Vögel bringen; ich wollte sie schildern nach eigenen Anschauungen und Erfahrungen. Alle neuen Erscheinungen des Vogelmarkts mußte ich nothwendigerweise anschaffen, eingewöhnen und verpflegen, wenn möglich auch züchten — die Zeit aber drängte, der Druck sollte vorwärtsgehen, während die Ergebnisse der Zucht bekanntlich doch nur äußerst mühsam zu erlangen sind.

Da plagten mich und den Herrn Verleger die eifrigen Liebhaber und Züchter wirklich unglaublich. Man wollte das versprochene Buch je eher desto lieber haben, und Bitten, Vorwürfe und Drohungen des Abspringens seitens der Subskribenten regnete es förmlich. Trotzdem verstrich bis zur Vollendung des ersten Bandes Jahr um Jahr!

Das größte Hinderniß des Fortgangs meiner Arbeit lag in der Beschaffung der Vögel. Wer die Verhältnisse kennt, wird wissen, daß alles frisch eingeführte (also erstrecht das im Handel noch nicht vorhandne, erst neu auftauchende) Gefieder fast ohne Ausnahme nur zu leicht zugrunde geht, daß man aber zugleich für alle seltenen Erscheinungen äußerst hohe Preise zahlen muß. Ohne günstigere Verhältnisse abwarten zu können, sah ich mich gezwungen, von jeder Art solcher Vögel ein oder auch wol einige Pärchen zu kaufen; letztres eben in der Voraussetzung, daß Verluste eintreten würden. Eine der größten Schwierigkeiten stellte sich mir schließlich immer in dem nothwendigen Verkauf der ausreichend beobachteten Vögel entgegen, zumal ich bei beschränktem Raume alljährlich mit der Bevölkerung der Vogelstube wechseln mußte. Ich konnte dies fast jedesmal nur mit bedeutender Einbuße erreichen; denn schriftstellerische Thätigkeit und kaufmännisches Geschäft lassen sich schlechterdings nicht vortheilhaft vereinen. Mein kleines Vermögen setzte ich für den Zweck einer gründlichen Kenntniß der fremdländischen Vögel gern ein; ich sagte mir ja, daß es selbst materiell gut angelegt sei, in den Erfahrungen, welche mich dazu befähigten, meine Zeitschrift herauszugeben, das Handbuch und dann dies größere Werk zu schreiben.

In aufrichtiger Dankbarkeit muß ich es anerkennen, daß wohlwollende Freunde und eifrige Liebhaber der Vogelwelt mir bereitwillig zur Förderung meiner Zwecke entgegengekommen. Eine der großartigsten

Sammlungen lebender fremdländischer Vögel besitzt Herr August F. Wiener in London und vermöge seiner weitreichenden geschäftlichen Beziehungen erlangt er gar manche seltne Art, welche Anderen unzugänglich bleibt. Er hat mir nicht allein über alle seine werthvollen Erfahrungen Bericht erstattet, sondern auch meine Sammlung hin und wieder mit absonderlichen Seltenheiten bereichert. In ähnlicher Weise kam mir Herr Direktor Dr. Bodinus entgegen, indem er mir zeitweise kostbare Vögel behufs Züchtung leihweise überließ. Der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha sandte mir ein Verzeichniß der von ihm seit vielen Jahren gehaltenen Vögel, nebst wichtigen Bemerkungen über die Eigenthümlichkeiten mancher Arten, welche sich in keiner andern Sammlung befinden. Die Herren Emil Linden in Radolfzell, Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, Graf Rödern in Breslau, Dr. Franken in Badenbaden, K. Hendschel in Innleitenmühle bei Rosenheim und viele andere begüterte Liebhaber begünstigten mein Streben in der Weise, daß sie mich beauftragten, sehr werthvolle Vögel für sie zu beschaffen und vor der Uebersiedlung in ihre Sammlungen mehr oder minder geraume Zeit hindurch zu beobachten, bzl. zu züchten. Alle Genannten, sowie zahlreiche andere Liebhaber und Züchter ließen mir Mittheilungen ihrer Erfahrungen auf dem Gebiet der Vogelkunde im allgemeinen und der Vogelzucht im besondern zukommen. Reisende und Forscher gaben mir werthvolle Nachrichten inbetreff des Freilebens, so namentlich die Herren Theodor von Heuglin, Dr. Otto Finsch, Herman Soyaux, H. Nehrling in Chikago, Dr. C. Hahn in Wyandotte, Georg Altona in der Kapstadt und auch Dr. A. Reichenow.

Mit vielem Dank muß ich des Entgegenkommens der Großhändler gedenken. Vor allen anderen war es Herr Karl Hagenbeck, der meine Bestrebungen unterstützte, indem er einerseits die seltensten und kostbarsten Vögel stets mir zuerst zukommen ließ und andrerseits für dieselben nur den Einkaufspreis berechnete. In gleicher Weise steht mir Fräulein Christiane Hagenbeck noch bis zum heutigen Tage zurseite und ähnlich auch die Herren Großhändler C. Reiche in Alfeld, Chr. Jamrach in London, K. Lintz und H. Möller in Hamburg, K. Gudera in Wien, K. Baudisch und Gaetano Alpi in Triest, Frau Poisson in Bordeaux und neuerdings auch J. Abrahams in London. Selbst von den Händlern zweiter Hand habe ich manche höchst werthvolle Bereicherung

meiner Vogelstube erlangt, so besonders von den Herren W. Mieth, F. Schmidt, D. Dufour in Berlin, s. Z. auch vom alten Bewig, von E. Genpel in Leipzig und R. Hieronymi in Braunschweig. Wenn ich hier und da noch bei Anderen neu eingeführte Vögel gefunden, so habe ich die Namen der Besitzer stets am btrf. Orte erwähnt. Herr L. van der Snickt in Brüssel erfreut die Liebhaberei neuerdings durch ganz besondere Seltenheiten von Prachtfinken und gewährt derselben dadurch einen beachtenswerthen Vorschub. Gleich den Händlern haben mir im Laufe der Zeit auch viele Liebhaber mancherlei ihnen noch unbekannte Vögel zur Bestimmung zugesandt.

Zu ganz besonderm Dank verpflichtet fühle ich mich aber den Gelehrten, welche mein Unternehmen durch Rath und Hilfe thatsächlich gefördert haben, so vor Allen meinem verehrten Freunde Herrn Dr. Luchs, Badearzt in Warmbrunn. Seine Theilnahme ermöglichte den Aufbau meines populären Werks auf streng wissenschaftlichem Grunde, denn mit seinen gründlichen Kenntnissen stand er mir stets zur Seite, wo es galt, die Abstammung eines Worts zu ergründen, wissenschaftliche Benennungen neu zu geben oder zu verändern oder nach dem Sinn des Worts einen zutreffenden deutschen Namen aufzustellen. Auch die Uebertragung der wissenschaftlichen Beschreibungen ins Lateinische hat er größtentheils ausgeführt oder dieselben doch berichtigt. Die holländischen Namen, welche ich theils den Verzeichnissen der btrf. zoologischen Gärten, theils aus den Listen der Händler entnommen, wurden von den Herren Pastor O. Bourrit in Vendenwres und Dr. P. H. Maas, Advokat in Bergen o. Z. verbessert. Herr Professor Dr. Peters gestattete mir jederzeit Zutritt in die Sammlung des Berliner zoologischen Museum und entweder persönlich oder durch die Herren Kustoden gewährte er mir stets bereitwilligst Hilfe zur Feststellung eines Vogels in allen zweifelhaften Fällen. In früheren Jahren hat namentlich Herr Professor Dr. Cabanis immer auf das bereitwilligste die neuangekommenen mir noch unbekannten Vögel bestimmt. In mancherlei schwierigen Fragen ertheilten mir die Herren Dr. Otto Finsch, Dr. Bodinus, Dr. K. Bolle und Professor Dr. R. Hartmann freundlicherweise Auskunft und Rathschläge. Die Eierbeschreibungen hat Herr Amtmann Nehrkorn auf Riddagshausen größtentheils nach Exemplaren aus meiner Vogelstube, theils aber auch nach solchen aus seiner sehr großartigen Sammlung aufgestellt. Bedeutsame Förderung gewann mein Werk durch

die Forschungen des Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg, welcher eine der interessantesten Vogelsammlungen in Deutschland besitzt, und des Herrn Gymnasiallehrer Fr. Schneider in Wittstock, dessen ebenfalls großartige Sammlung namentlich inbetreff der Verfärbung der Webervögel wichtige Ergebnisse geliefert hat.

Es wäre undankbar, wollte ich nicht auch meines Verlegers, des Herrn Verlagsbuchhändler C. Rümpler, gedenken. Angesichts der überaus kostspieligen Herstellung gehört wahrlich kein geringer Opfermuth dazu, um ein solches Unternehmen den erwähnten Verhältnissen entsprechend zu erweitern und auszuführen. Wenn Herr Rümpler trotzdem mit allem Vertrauen auf einen guten Erfolg neben mir steht, so darf auch ich die Zuversicht nicht verlieren.

Die Beschreibungen aller Vögel, welche ich im Laufe der Zeit besessen, sind in folgender Weise aufgestellt. Mit dem lebenden Exemplar in der Hand, habe ich die Beschreibung seitens eines Reisenden, der die btrf. Art in ihrer Heimat erlegt oder seitens eines Gelehrten, der zahlreiche Exemplare im Museum vor sich gehabt, durchgenommen und Punkt für Punkt verzeichnet, auch meinerseits dann noch die ausgestopften Exemplare im Berliner Museum verglichen. Die unübertrefflichen Beschreibungen der Herren Cabanis, Finsch, Hartlaub, Heuglin und aller übrigen im Text stets gewissenhaft angegebenen Ornithologen habe ich für mein Werk einerseits nur soweit verändert, daß ich eine ganz bestimmte, sorgfältig durchgeführte Reihenfolge der einzelnen Körpertheile innehielt und daß ich sie andrerseits dort berichtigte, wo dem Ornithologen entweder nur in Spiritus aufbewahrte oder infolge des Alters bereits verblichene Exemplare vorgelegen; namentlich die Farbe der Schnäbel und Füße konnte ich in vielen Fällen nach dem Leben richtig angeben.

Als eine ganz neue Gabe hat mein Werk die Beschreibung der Jugendkleider zahlreicher Vögel, welche noch in keinem andern vorhanden sind, aufzuweisen, abgesehen davon, daß es den Nestbau, die ganze Brutentwicklung und alle sonstigen Eigenthümlichkeiten derselben in der Gefangenschaft schildert. Die große Anzahl der Vögel im Jugendkleide, welche das zoologische Museum von Berlin aus meiner Vogelstube erhalten hat, wird es den zukünftigen Gelehrten auf diesem Gebiete darthun, daß die Beschreibungen in meinem Werke beachtenswerthe Schätze für die Wissenschaft Ornithologie hinsichts der Kenntniß

zahlreicher tropischen Vögel gewähren. Um der Sache willen hat es mich angenehm berührt, daß zahlreiche Vereine in Deutschland, in der Schweiz und selbst im fernen Auslande mich zum Ehrenmitgliede ernannt, daß meine gezüchteten Vögel auf zahlreichen Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämirt worden und daß mir sogar in London auf der Vogelausstellung im Krystallpalast (1877) die große goldene Medaille zutheil geworden.

Alle diese Auszeichnungen nehme ich lediglich als Beweise dafür auf, daß einerseits die Vogelliebhaberei fortdauernd auf dem Boden der regsten Entwicklung steht und daß andrerseits meine Thätigkeit erfreulich inmitten derselben wurzelt. Dies gibt mir den Muth, auf der beschrittenen Bahn unbeirrt weiter zu streben.

Noch bitte ich die Leser, die am Schluß dieses Bands gegebenen Nachträge und Ergänzungen, sowie namentlich auch die Berichtigungen nicht übersehen zu wollen. In der verzögerten Herstellung lag es ja eben begründet, daß inbetreff manches Vogels noch wichtige Erfahrungen gewonnen werden konnten, deren Ergebnisse eingeschaltet worden. Zugleich habe ich mich bemüht, die Irrthümer, welche theils in Schreib- oder Druckfehlern beruhten, theils in Angaben, die eine nähere Beobachtung der Vögel widerlegt hat, noch rechtzeitig aufzuklären.

Für den Band, welcher die Papageien schildern wird, stehen mir bereits jetzt reiche Schätze zu Gebote, denn die Züchtung der beliebtesten Arten ist allenthalben schon vielfach gelungen und ich habe es erreicht, fast aus jeder Gattung wenigstens eine Art nach ihrem ganzen Wesen hin, insbesondre aber nach ihrer Fortpflanzung ausreichend kennen zu lernen. Auch die Schilderung der kerbthierfressenden Vögel, welche ich zuletzt folgen lassen werde, kann auf eine verhältnißmäßig große Fülle von Erfahrungen fußen. Ueberaus ergibig aber ist das Gebiet beackert, welches der Halbband umfaßt, der die Pflege und Zucht aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt behandeln soll. Somit hoffe ich, das ganze Werk ohne weitere Unterbrechung beenden zu können.

Berlin-Steglitz, im Sommer 1878.

Dr. **Karl Ruß.**

Inhalt.

Seite

Vorwort V

Inhaltsverzeichniß XI

Verzeichniß der Abbildungen XX

Verzeichniß der hauptsächlichsten Schriften über die fremdländischen Stubenvögel XXII

Einführung 1

I. **Die körnerfressenden Vögel** (Hartfutter- oder Samenfresser) 12

Die Schmuck- oder Prachtfinken [Aeginthidae] 18

Die Astrilde oder klein- und schwachschnäbligen Prachtfinken [Aeginthinae] 29

Die eigentlichen Astrilde 35

Der graue Astrild [Aegintha cinérea] 36

Der gewellte Astrild [Aegintha astrild] 43

(Der schwarzschwänzige Astrild; Aegintha nigricauda) 50

(Der rothbäuchige Astrild; Aegintha rubriventris) 50

Der Zügelastrild [Aegintha rhodopýga]; s. auch Nachtrag S. 668 50

Der rothbärtige Astrild [Aegintha rufibarba] 50

Der orangebäckige Astrild [Aegintha melpóda] 51

Der Sumpfastrild [Aegintha paludícola] 55

(Der grüne Astrild; Aegintha viridis) . 56

Der schwarzköpfige Astrild [Aegintha atricapilla] 56

Der schwarzbäckige Astrild [Aegintha Dufresnei] 57

Der rothschwänzige Astrild [Aeginthae coerulescens] 59

Die Schönfinken oder Amandaven ... 61

Der getigerte Astrild [Aegintha amandava] 64

Der gelbgrüne Astrild [Aegintha formosa] 74

Der goldbrüstige Astrild [Aegintha sanguinolenta] 76

Der kleine rothe Astrild [Aegintha minima] 82

Der Bronze-Astrild [Aegintha Russi] s. Nachtrag S. 668.

Der rothbrüstige oder gepunktete rothe Astrild [Aegintha rufopicta]; s. auch Nachtrag S. 669 88

Der dunkelrothe Astrild [Aegintha rubricata]; s. auch Nachtrag S. 670 . . 89

Dühring's rother Astrild [Aegintha Dühringi] s. Nachtrag S. 671.

Der Larvenastrild [Aegintha larvata]; s. auch Nachtrag S. 672 91

Der schwarzkehlige Astrild [Aegintha nigricollis] 92

Der weinrothe Astrild [Aegintha vinácea]; s. auch Nachtrag S. 673 92

Hartlaub's Astrild [Aegintha Hartlaubi] 92

Reichenow's Astrild [Aegintha Reichenowi] 92

Die Schmetterlingsastrilde 93

Der blaue Astrild [Aegintha phoenicótis] 93

Der granatrothe Astrild [Aegintha granátina]; s. auch Nachtrag S. 674 . . 100

(Der dreifarbige Astrild; Aegintha tricolor) 101

Der Buntastrild [Aegintha melba]; s. auch Nachtrag S. 674 102

Wiener's Astrild [Aegintha Wieneri] s. Nachtrag S. 674.

Der rothrückige Astrild [Aegintha erythronóta] 105

Die Wachtelastrilde oder Wachtelfinken 105

Der Rebhuhnastrild [Aegintha atricollis] 105

Seite

Der Wachtelastrild [Aegintha polyzóna] . . . 107

Die eigentlichen Aeginthinen oder Dornastrilde . . . 107

Der Dornastrild [Aegintha temporalis] . . . 108

Der Sonnenastrild [Aeg. Phaëthon]; s. auch Nachtrag S. 676 . . . 111

Der Zeresastrild [Aegintha modesta] 114

Der Aurora-Astrild [Aegintha phoenicóptera] . . . 117

Der Streifenastrild [Aegintha lineata] . 119

Der Ringelastrild [Aegintha Bichenovi]; s. auch Nachtrag S. 677 . . . 119

Der Gitterastrild [Aegintha annulosa] . 122

Der gemalte Astrild [Aegintha picta]; s. auch Nachtrag S. 677 . . . 122

Der Binsenastrild [Aegintharufícauda] 123

Die Amaduinen oder groß- und starkschnäbligen Prachtfinken [Spermestínae] . . . 125

Die Bandamandine [Spermestes fasciata] . . . 127

Die Rothkopfamandine [Spermestes erythrocéphala]; siehe auch Nachtrag S. 677 . . . 133

Die Reisamandine [Spermestes oryzívora] . . . 136

Der schneeweiße Reisvogel oder die weiße Reisamandine [Spermestes oryzívora, var. alba] . . . 141

Die braune Reisamandine [Spermestes fuscata]; s. auch Nachtrag S. 677 . . . 142

Die Elsteramandinen oder Elstervögel . 143

Die größte Elsteramandine [Spermestes fringillina]; s. auch Nachtrag S. 678 . . . 143

Die kleine Elsteramandine [Spermestes cucullata] . . . 145

Die zweifarbige Elsteramandine [Spermestes bicolor] . . . 148

Die gitterflüglige Elsteramandine [Spermestes poënsis] . . . 149

Die rothrückige Elsteramandine [Spermestes rufodorsualis] . . . 150

Die Zwerg-Elsteramandine [Spermestes nana] . . . 150

Bronzemännchen, Silberfasänchen und Muskatvögel . . . 151

Die gestreifte Bronze-Amandine [Spermestes striata] . . . 152

Die schwarzbürz. Bronze-Amandine [Spermestes melanopygia] . . . 152

Die spitzschwänzige Bronze-Amandine [Spermestes acuticanda] . . . 153

Die japanesischen Mövchen [Spermestes acuticauda, *var.*]: s. auch Nachtrag S. 678 . . . 154

Seite

Die Silberschnabel-Amandine [Spermestes cantans] . . . 155

Die Malabaramandine [Spermestes malabarica] . . . 158

Die Muskatamandine [Spermestes punctularia] . . . 160

Die Nonnenvögel . . . 163

Die weißköpfige Nonnenamandine [Spermestes Maja]; s. auch Nachtrag S. 678 . . . 163

Die schwarzbrüstige Nonnenamandine [Spermestes ferruginosa] . . . 166

Die schwarzköpfige Nonnenamandine [Spermestes sinensis] . . . 167

Die dreifarbige Nonnenamandine [Spermestes malaccensis] . . . 169

Die Schilfamandine [Spermestes castanóthorax] . . . 170

Die weißbrüstige Schilfamandine [Spermestes pectoralis] . . . 171

Die gelbe Schilfamandine [Spermestes flaviprymna] . . . 172

Die australischen Prachtamandinen oder Diamantvögel . . . 172

Die Zebra-Amandine [Spermestes castanótis]; s. auch Nachtrag S. 678 . . 172

Die Diamant-Amandine [Spermestes guttata] . . . 177

Die Feuerschwanz-Amandine [Spermestes nitída]; s. auch Nachtrag S. 678 . 181

Die rothohrige Amandine [Spermestes ocúlea] . . . 182

Die Gürtelamandine [Spermestes cincta] . . . 183

Gould's spitzschwänzige Gürtelamandine [Spermestes Gouldi] . . . 186

Die Masken-Gürtelamandine [Spermestes personata] . . . 186

Die weißbäckige Gürtelamandine [Spermestes leucótis] . . . 187

Frau Gould's Amandine [Spermestes Gouldae] . . . 188

Die wunderschöne Amandine [Spermestes mirabilis] . . . 189

Die Papagei-Amandinen . . . 189

Die lauchgrüne Papagei-Amandine [Spermestes prásina]; s. auch Nachtrag S. 678 . . . 190

Die dreifarbige Papagei-Amandine [Spermestes trichroa] . . . 191

Die eigentliche Papagei-Amandine [Spermestes psittácea]; siehe auch Nachtrag S. 679 . . . 192

Die kurzschwänzige Papagei-Amandine [Spermestes cyanóvirens] . . . 192

Die Samenknacker-Amandinen . . . 192

Die rothbrüstige Samenknacker-Amandine [Spermestes haemátina]; s. auch Nachtrag S. 680 . . . 193

Seite

Die geſchuppte Samenknacker-Amandine [Spermestes Luchsi]; ſiehe auch Nachtrag S. 680 193

Die Widafinken [Viduae] 193

Der ſtahlblaue Widafink [Vidua nitens] 198
Der ſtahlgrüne Widafink [Vidua aenea] 199
Der Paradies-Widafink [Vidua paradisea] 202
Der Dominikaner-Widafink [Vidua principalis] 208
Der Königs-Widafink [Vidua regia] 212
Der Hahnſchweif-Widafink [Vidua caffra] 213
Der Halbmond-Widafink [Vidua ardens] 216
Der gelbſchultrige Widafink [Vidua flaviscapulata] 217
Der gelbrückige Widafink [Vidua macroura] 218
Der breitſchwänzige Widafink [Vidua laticauda] 220
Der weißgezeichnete Widafink [Vidua albonotata] 220
Der kurzſchwänzige Widafink [Vidua axillaris] 221

Die Webervögel [Ploceidae] . . . 223

Die Feuerweber 228

Der Napoleons-Webervogel [Ploceus melanogaster] 231
Der abeſſiniſche gelbe Feuerwebervogel [Ploceus abyssinicus] 235
Der Sammt-Webervogel [Ploceus capensis] 235
Der Orange-Webervogel [Ploceus franciscanus] 237
Der Flammen-Webervogel [Ploceus flammiceps] 241
Der Oryx-Webervogel [Ploceus oryx] 243
Der kleine ſchwarzbäuchige Webervogel [Ploceus nigriventris] 246

Die Schönweber 246

Der Madagaskar-Webervogel [Ploceus madagascariensis] 247
Der Sanſibar-Webervogel [Ploceus eminentissimus] 252
(Der Komoren-Webervogel; Ploceus comorensis) 253
(Der Algonda-Webervogel; Ploceus algondensis) 253
Der Mauritius-Webervogel [Ploceus erythrocéphalus] 253
Der Rodrigez-Webervogel [Ploceus flavicans]; ſ. auch Nachtrag S. 680 . . 254

Die Sperlingsweber 254

Der rothſchnäblige Webervogel [Ploceus sanguinirostris] 255
(Der äthiopiſche rothſchnäblige Webervogel; Ploceus aethiopicus) 256

Seite

(Der roſenrothe rothſchnäblige Webervogel; Ploceus Lathami) 256
Rußʼ rothſchnäbliger Webervogel [Ploceus Russi]; ſiehe Nachtrag S. 681.
Der rothköpfige Webervogel [Ploceus érythrops] 263
Der blutköpfige Webervogel [Ploceus haematocéphalus] 265
Der Baya-Webervogel [Ploceus baya]; ſ. auch Nachtrag S. 683 265
Der Manyar-Webervogel [Ploceus manyar]; ſ. auch Nachtrag S. 683 . . 265
Der Bengalen-Webervogel [Ploceus bengalensis]; ſ. auch Nachtrag S. 683. . 265
Der gelbbrüſtige Baya-Webervogel [Ploceus hypoxanthus]; ſ. auch Nachtrag S. 683 265
Der olivengrüne Baya-Webervogel [Ploceus pensilis] 276

Die eigentlichen Sperlings-Webervögel 276

Der Mahali-Sperlingsweber [Ploceus mahali] 276
Der Augenbrauen-Sperlingsweber [Ploceus superciliosus] 276
Der ſchwarzſchnäblige Sperlingsweber [Ploceus melanorrhynchus] 276
Der bärtige Sperlingsweber [Ploceus pectoralis] 276
Der Kolonie-Webervogel [Ploceus socius] 279

Die Gelb-Webervögel oder Edelweber . 280

Der ſchwarzköpfige oder Textor-Webervogel [P. melanocéphalus] . 281
Der Larven-Webervogel [P. larvatus] 289
Der Rieſen-Webervogel [Ploceus grandis] 292
Der Gürtel-Webervogel [Ploceus cinctus] 292
Der ſchwarzſtirnige Webervogel [P. velatus] 293
(Der äthiopiſche Gelb-Webervogel; Ploceus aethiops) 293
Cabanis' Webervogel [Ploceus Cabanisi]; ſ. auch Nachtrag S. 684 293
Der ſchwarzkehlige Webervogel [Ploceus atrogularis]; ſ. auch Nachtrag S. 684. . 293
Speke's Webervogel [Ploceus Spekei] . . 294
Der Prinzen-Webervogel [P. princeps] . 294
Der Brillen-Webervogel [Ploceus ocularius] 294
Der gelbſcheitelige Webervogel [Ploceus spilonótus] 296
Der ſchwarzhäuptige Webervogel [Ploceus nigriceps] 297
Der goldſtirnige oder olivengrüne Webervogel [Ploceus oliváceus] . . 297
Der goldgelbe Webervogel [P. aureoflavus] 300
(Der Goldwebervogel; Ploceus aureus) . 300
(Der einfarbige Webervogel; P. concolor) 300
Der pomeranzengelbe Webervogel [Ploceus aurantius] 301
Bojer's Webervogel [Ploceus Bojeri] . . 301
Der kaſtanienbraune Webervogel [Ploceus castáneofuscus] 301

Seite

Der rothbraune Webervogel [Ploceus rubiginosus] 303
Der schulterfleckige Webervogel [P. badius]; s. auch Nachtrag S. 684 303
Der schwarze Webervogel [P. nigerrimus] 304
Der dottergelbe Webervogel [Ploceus vitéllinus] 305
Der flügelbindige Webervogel [Ploceus taeniopterus] 308
Der Pirol-Webervogel [P galbulus]; s. auch Nachtrag S. 684 309
Der olivengraue Webervogel [Ploceus erythrophthalmus] 310
Der zitrongelbe Webervogel [Ploceus xanthópterus] 311
Der schwarzohrige Webervogel [P. Guérini] 311
Der Masken-Webervogel [P. lutéolus] 311

Die Büffelweber 315

Der weißschnäblige oder Alekto-Webervogel [Ploceus Alecto] 315
Der Büffel-Weberv. [P. erythrorhynchus] 318
Der Vieh-Webervogel [P. intermedius] 318
Der weißköpfige Büffel-Webervogel [Ploceus Dinemelli] 318

Die Prachtweber 319

Der Hauben-Prachtwebervogel [Ploceus cristatus] 320
Der Schild-Prachtwebervogel [P. scutatus] 320
Der schwarzohrige Prachtwebervogel [Ploceus melanótis] 321
Der glänzende Prachtwebervogel [P. nitens] 322
Der Malimbe-Prachtwebervogel [Ploceus malimbe] 322

Die Schwärzlinge oder Schwarzweber . 322

Arnaud's Schwarzwebervogel [Ploceus Arnaudi] 322
Der grauköpfige Schwarzwebervogel [Ploceus canicapillus] 323
Der gelbstirnige Schwarzwebervogel [Ploceus luteifrons] 323
Der braunrückige Schwarzwebervogel [Ploceus phaenótus] 323
Der zweifarbige Schwarzwebervogel [Ploceus bicolor] 323
Emilien's Schwarzwebervogel [P. Emiliae] 323

Die Finken [Fringillínae] 324

Die Girlitze 326

Der Girlitz von den Kanarischen Inseln oder Kanarienvogel [Fringilla canaria] 326
Der orangestirnige Girlitz [Fringilla pusilla] 352
Der graue weißbürzelige Girlitz [Fringilla musica] 354
Der graue gelbbürzelige Girlitz [Fringilla angolensis] 363
Der graukehlige Girlitz [Fringilla canicollis] 365
Der weißkehlige Girlitz [F. Selbyi] 366

Seite

Der buttergelbe Girlitz oder Hartlaubszeisig [Fringilla butyrácea, *var.* Hartlaubi] 368
Der gelbstirnige Girlitz [Fringilla flaviventris] 375
Der schwefelgelbe Girlitz [Fringilla sulfurata] 377
Der Bartgirlitz [Fringilla barbata] . 378
Der gelbrückige Girlitz [F. flavivertex] . 379
Der grüngelbe Girlitz [Fringilla chloropsis] 379
Der schwarzhalsterige Girlitz [Fringilla capistrata] 379
Der gestrichelte Girlitz [Fringilla striolata] 379
Der kurzschnäblige Girlitz [F. brevirostris] 380
Der schwarzköpfige Rothgirlitz [Fringilla alario] 381
Der Tottagirlitz [Fringilla totta] . . 383
Hagenbeck's gelbköpfiger Girlitz [Fringilla imberbis]; s. auch Nachtrag S. 684 400

Die Zeisige 384

Der schwarzköpfige Zeisig [Fringilla cucullata] 384
Der Trauerzeisig [Fringilla tristis] . 387
Der Fichtenzeisig [Fringilla pinus] . 393
Der Magellanzeisig [F. magellanica]; s. auch Nachtrag S. 684 394
Der Zeisig v. Arkansas [Fringilla psaltria] 395
Der Kordillerenzeisig [F. uropygialis] . . 395
Stanleyzeisig [Fringilla Stanleyi] 396
Der Mönchszeisig [Fringilla Lichtensteini] 396
Der schwarzbrüstige Zeisig [F. notata] . . 396
Der schwarze Zeisig [Fringilla atrata] . . 397
Der Zeisig v. Columbien [F. columbiana] 397
Der mexikanische Zeisig [F. mexicana] . 397
Yarrell's Zeisig [Fringilla Yarrelli] . . 398
Der kalifornische Zeisig [Fringilla Lawrencei] 398
Der Gebirgszeisig [Fringilla spinoides] . 399
Der bärtige Zeisig [Fringilla marginalis]; s. auch Nachtrag S. 684 399
Der abessinische Zeisig [F. nigriceps] . . 400
Der Zitronzeisig [Fringilla citrinellina] . 400
Der Maskenzeisig [Fringilla melanops] . 400
Der chinesische Grünfink [Fringilla sinica]; s. auch Nachtrag S. 684 400
Der algerische Grünfink [F. aurantiiventris] 401

Die Finken 401

Der Kanarienfink [Fringilla tintillon] . 401
Der Teydefink [Fringilla teydea] 402
Der Edelfink von Algier [F. spodiogenia]; s. auch Nachtrag S. 684 402
Der Himalaya-Stiglitz [F. caniceps] . . 402
Der Safranfink [F. brasiliensis] . . 403
Der kleine Safranfink [Fringilla Hilairi] 408
(Der Safranfink von Columbien [Fringilla columbiana]) 408
Der kleinste Safranfink [Fringilla minor]) 408
Der gelbbäuchige Girlitz [Fringilla luteiventris] 409
Der Kubafink [Fringilla canóra] . . . 410

Seite

Der größere Kubafink [F. lépida]; ſ. auch Nachtrag S. 684 416
Der Benezuelafink [Fringilla Frantzii] . 418
Der Jamaikafink [Fringilla zena] 418
Der Kronfink von Südamerika [Fringilla pileata] 419
Der Kronfink von Braſilien [F. cristata] 421
Der Kronfink von Ekuador [F. cruenta]. 422
Der Kronfink v. Bolivia [F. griseocristata] 422
Der Jakarini- oder Atlasfink [Fringilla jacarina] 422
Der gehäubte Springfink [F. ornata] . . 425
Der Indigofink [Fringilla cyánea] . 426
Der Papſtfink [Fringilla ciris] 430
Der liebliche Papſtfink [Fringilla amoena] 436
Der vielfarbige Papſtfink [F. versícolor]. 436

Die Sperlinge 437

Der Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung [Fringilla arcuata] 438
Swainſon's Sperling [F. Swainsoni] 439
Der Wüſtenſperling [Fringilla simplex] . 441
Der rothköpfige Sperling [Fringilla italica] 441
Der Weidenſperling [Fringilla salicícola] 441
Der braunköpfige Sperling [Fringilla castanóptera] 442
Der Motitaſperling [Fringilla motitensis] 442
Der Röthelſperling [Fringilla russata] . 442
Der Baumſperling [Fringilla arbórea] . 442
Der St. Jago-Sperling [F. jagoënsis] . 442
Der Steinſperling [Fringilla petronia] 442
Der kurzzehige Steinſperling [F. brachydáctyla] 444
Der Kehlſperling [Fringilla dentata]; ſ. auch Nachtrag S. 685 444
Der große Kehlſperling [Fringilla pyrgíta] 446
Der gelbhalſige Kehlſperling [Fringilla flavicollis] 446
Der größte Kehlſperling [F. flavígula] . 446
Der grauköpfige Kehlſperling [Fringilla canicapilla] 446
Der gelbbrüſtige Kehlſperling [Fringilla xanthosterna] 446
Der Augenbrauen-Kehlſperling [Fringilla superciliaris] 446
Der Goldſperling [Fringilla lútea]; ſ. auch Nachtrag S. 685 446
Der grüne Goldſperling [F. cuchlóra] . 448
Der ſchuppenköpfige Sperling [Fringilla frontalis] 448
Der ſchnurrbärtige Sperling [Fringilla lepidóptera] 450
Der Winter-Ammerſperling [Fringilla hiemalis] 451
Der Winter-Ammerſperling vom Oregon [Fringilla oregona] 456
Der braunſchultrige Winter-Ammerſperling [Fringilla dorsalis] 456
Der graue Winter-Ammerſperling [Fringilla cinérea] 457
Der grauköpfige Winter-Ammerſperling [Fringilla Woodhousei] 457

Seite

Der Geſellſchafts-Ammerſperling [Fringilla socialis] 457
Der Berg-Ammerſperling [Fringilla montícola] 459
Der Zwerg-Ammerſperling [Fringilla juncorum]; ſiehe Berichtigungen S. 685 . 460
Der blaſſe Ammerſperling [Fringilla pallida] 460
Brewer's Ammerſperling [F. Breweri] . . 460
Der ſchwarzkehlige Ammerſperling [Fringilla atrigularis] 460
Der Sing-Ammerſperling [Fringilla melódia] 460
Heermann's Ammerſperling [Fring. Heermanni] 463
Gould's Ammerſperling [Fringilla Gouldi] 464
Der rothe Ammerſperling [Fringilla rufína] 464
Der Trug-Ammerſperling [F. fallax] . . 464
Linkoln's Ammerſperling [F. Lincolni] . 464
Der Bruch-Ammerſperling [Fringilla palustris] 464
Der weißkehlige Ammerſperling [Fringilla albicollis] 465
Der Ammerſperling mit weißer Krone [Fringilla léucophrys] 467
Gambel's Ammerſperling [Fringilla Gambeli] 467
Der Kron-Ammerſperling [F. coronata] 467
Harris' Ammerſperling [F. quérula] . . 468
Der bärtige Ammerſperling [Fringilla mystacalis] 468
Der Morgen-Ammerſperling [Fringilla matutína] 468
(Der Ammerſperling von Bolivien; [Fringilla hypochondria]) 470
Der Savannen-Ammerſperling [Fringilla savanna] 470
Der nordiſche Ammerſperling [Fringilla sandwichensis] 471
Der Gras-Ammerſperling [F. graminea] 471
Der gelbflüglige Ammerſperling [Fringilla passerína] 471
Henslow's Ammerſperling [F. Henslowi] 472
Leconte's Ammerſperling [F. Lecontei] . 472
Der bleigraue Ammerſperling [Fringilla manimbe] 472
Der ſpitzſchwänzige Ammerſperling [Fringilla caudacuta] 472
Der Strand-Ammerſperling [Fringilla maritima] 472
Samuel's Ammerſperling [F. Samuëlis] 472
Der geſtreifte Ammerſperling [Fringilla grámmaca] 473
Der zweiſtreifige Ammerſperling [Fringilla bilineata] 473
Bell's Ammerſperling [Fringilla Belli] . 473
Der breitſchwänzige Ammerſperling [Fringilla lateralis] 473
Der weißbrüſtige Ammerſperling [Fringilla assimilis] 473
Cabanis' Ammerſperling [F. Cabanisi] . 473

Seite

Der schwarzrothe Ammersperling [Fringilla nigrorufa] 473
Der graurückige Ammersperling [Fringilla thoracica] 473
Der schiefergraue Ammersperling [Fringilla schistacea] 473
Der schwarzweiße Ammersperling [Fringilla melanoleuca] 474
Der Halsband-Ammersperling [Fringilla torquata] 474
Der olivengrüne Ammersperling [Fringilla olivácea] 474
Der Sommer-Ammersperling [Fringilla aestivalis] 474
Cassin's Ammersperling [F. Cassini] . . 474
Der rothkäppige Ammersperling [Fringilla ruficeps] 474
Der rothscheitlige Ammersperling [Fringilla rufivirgata] 474
Der Plata-Ammersperling [F. platensis] 474
Der fuchsrothe Ammersperling [Fringilla iliáca]; s. auch Nachtrag S. 685 474
Der Amsel-Ammersperling [F. Townsendi] 475
Der rothbraune Ammersperling [Fringilla rufescens] 475
Der Erd-Ammersperling [F. humeralis] . 475
Der stille Ammersperling [F. silens] . . 475
Der grünscheitelige Ammersperling [Fringilla affinis] 475
Der gelbschnäbelige Ammersperling [Fringilla flavirostris] 475
Der braunnackige Ammersperling [Fringilla brunneinucha] 475
Der keilschwänzige Ammersperling [Fringilla sphenúra] 475
Der schwarzgesichtige Ammersperling [Fringilla melanótis] 475
Der einfarbige Ammersperling [Fringilla unicolor] 475
Der Feld-Ammersperling [Fringilla rustica] 476
Der kohlschwarze Ammersperling [Fringilla carbonaria] 476
Gay's Ammersperling [Fringilla Gayi] . 476
Burmeister's Ammersperling [Fringilla Burmeisteri] 476
Der Lerchen-Ammersperling [Fringilla alaudina] 476
Strauch-Ammersperling [F. fruticéti] . . 476
Der gelbgestreifte Ammersperling [Fringilla xanthogramma] 476
Der Diuka-Ammersperling [Fringilla diuca]; auch Nachtrag S. 685 . . 477
Der gebänderte Diuka-Ammersperling [Fringilla fasciata] 478
Der Diuka-Ammersperling aus Bolivien [Fringilla speculífera] 478
Der braunohrige Ammersperling [Fringilla biarcuata] 478
Der weißohrige Ammersperling [Fringilla leucótis] 478
Der gelbkehlige Ammersperling [Fringilla flavigularis] 478

Seite

Der grünsteißige Ammersperling [Fringilla chrysopógon]; der weißnackige A. [F. albinucha]; der blaßnackige A. [F. pallidinucha]; der schwarzköpfige A. F. capitalis]; der zimmtfarbne A. [F. semirufa]; der weißstirnige A. [F. albifrons]; Deville's A. [F. Devillei]; der weißbrillige A. [F. ophthalmica]; der schwarzbrillige A. [F. postocularis] 478
Der rothäugige Grundammersperling oder Grundröthel [Fringilla erythrophthalma] 479
Der gefleckte Grundammersperling [Fringilla maculata] 481
Der weißschultrige Grundammersperling [Fringilla scapularis] 481
Baird's Grundammersperling [Fringilla Bairdi] 481
Abert's Grundammersperling [Fringilla Aberti] 481
Der braune Grundammersperling [Fringilla fusca] 482
Der grünschwänzige Grundammersperling [Fringilla chlorúra] 482
Der grüne Grundammersperling [Fringilla macronyx]; der rothbraune Grundammersperling [Fringilla rútila] 182

Die Gimpel [Pýrrhulinae] 483
Der Karmingimpel [Pýrrhula erythrína] 484
Der Rosengimpel [Pýrrhula rósea] . . . 489
Der Purpurgimpel [Pýrrhula purpúrea] 490
Der kalifornische Purpurgimpel [Pýrrhula californica] 492
(Cassin's Purpurgimpel; Pýrrhula Cassini) 492
Der Hausgimpel [Pýrrhula familiaris]; s. auch Nachtrag S. 685 492
Der rothbäuchige Gimpel [Pýrrhula rhodocolpus] 495
Der rothmantlige Gimpel [Pýrrhula rhodóchlamys] 495
Der Gimpel vom Sinai [P. sinaitica] 495
Der rothschultrige Gimpel [Pýrrhula rhodóptera] 495
Der Hakengimpel [Pýrrh. enucleátor] 495
Der rothköpfige Gimpel [Pýrrhula erythrocéphala] 502
Der kochenillerothe Gimpel [Pýrrhula coccinea]; der graubäuchige G. [P. griseiventris]; der mäusegraue G. [P. murína]; der pomeranzengelbe G. [P. aurantiaca]; der rothschwänzige G. [P. erithacus]; der Nepal-G. [P. nipalensis]; der aschgraue G. [P. cinerácea] 502
Der sibirische langschwänzige Gimpel [Pýrrhula sibirica] 503
Der blutrothe langschwänzige Gimpel [Pýrrhula sanguinolenta] 503
Der Wüstengimpel [P. githaginea] 504
Der düstre Wüstengimpel [P. obsoléta] . . 512

Seite

Die Kernbeißer und Kernbeißerfinken [Coccothraustínae] 513

Die Kernbeißer 514

Der Masken-Kernbeißer [Coccothraustes personatus] 514

Der schwarzschwänzige Kernbeißer [Coccothraustes melanúrus]; s. auch Nachtrag S. 685 515

Der japanesische Kernbeißer [Coccothraustes japonicus] 516

Der Kernbeißer mit fleischfarbenen Füßen [Coccothraustes carnipes] 516

Der gelbliche Kernbeißer [Coccothraustes icteroídes] 516

Der schwarzgelbe Kernbeißer [Coccothraustes melanoxanthus] 516

Der rosenbrüstige Kernbeißer [Coccothraustes ludovicianus] 516

Der schwarzköpfige Kernbeißer [Coccothraustes melanocéphalus] 523

Der grüne Kernbeißer [Coccothraustes viridis] 523

Der gelbe Kernbeißer [Coccothraustes tibialis] 523

Der graubäuchige Kernbeißer [Coccothraustes poliogaster] 524

Der gelbbäuchige Kernbeißer [Coccothraustes aureoventris]; der grünbäuchige K. [C. chrysópeplus]; der großschnäblige K. [C. magnirostris] . . 524

Die Kardinäle 524

Der rothe Kardinal [Coccothraustes virginianus] 524

Der purpurrothe Kardinal [Coccothraustes phoeníceus]; s. auch Nachtrag S. 685 . 540

Der spitzhäubige Kardinal [Coccothraustes sinuatus] 541

Der gehäubte graue Kardinal [Coccothraustes cucullatus] 541

Der Dominikaner graue Kardinal [Coccothraustes dominicanus] 541

Der braunkehlige graue Kardinal [Coccothraustes capitatus] 541

Der schwarzkehlige graue Kardinal [Coccothraustes gularis] 541

Der schwarzbäckige Kardinal [Coccothr. melanógenys] 550

Der grüne Kardinal [Coccothraustes cristatellus] 550

Der kleine grüne Kardinal [Coccothraustes cristatellínus] 554

Die Kernbeißerfinken 554

Der hellblaue Kernbeißerfink Coccothraustes coerúleus]; s. auch Nachtrag S. 685 554

Der dunkelblaue Kernbeißerfink [Coccothraustes Brissoni] 554

Der meerblaue Kernbeißerfink Coccothraustes glaucocoerúleus] 558

Seite

Der schwarze Kernbeißerfink [Coccothraustes niger] 558

Der schwarzköpfige Kernbeißerfink [Coccothraustes torridus] 560

Der dickschnäblige schwarze Kernbeißerfink [Coccothraustes crassirostris] 561

Maximilian's schwarzer Kernbeißerfink [Coccothraustes Maximiliani] 561

Die Pfäffchen 562

Das Schmuckpfäffchen [Coccothraust. ornatus]; s. auch Nachtrag S. 685 . . 562

Das blaugraue Pfäffchen [Coccothraustes intermedius]; s. auch Nachtrag S. 685 563

Das bleigraue Pfäffchen [Coccothraustes plúmbeus]; s. auch Nachtrag S. 685 564

Das rothschnäblige Pfäffchen [Coccothraustes hypoleucus]; s. auch Nachtrag S. 685 565

Das Erzpfäffchen [C. collarius]; siehe auch Nachtrag S. 685 566

Das weißstirnige Pfäffchen [Coccothraustes linéola]; s. auch Nachtrag S. 685 567

Das pomeranzengelbe Pfäffchen [Coccothraustes aurantius] 567

Das zweifarbige Pfäffchen [Coccothraustes bícolor] 568

Das Pfäffchen mit schwarzer Brustbinde [Coccothraustes pectoralis] 568

Hoffmann's Pfäffchen [Coccothraustes Hoffmanni] 568

Das Trauerpfäffchen [C. luctuosus] . . 568

Das weißkehlige Pfäffchen [Coccothraustes albogularis]; s. auch Nachtrag S. 685 . 569

Das schwarzkäppige Pfäffchen [Coccothraustes gutturalis] 569

Das gestreifte Pfäffchen [Coccothraustes lineatus] 569

Das Wedelpfäffchen [C. flabéllifer] . . . 570

Das rothbrüstige Pfäffchen [Coccothraustes hypoxanthus] 570

(Das zimmtfarbne Pfäffchen [Coccothraustes cinnamomeus]; das schwarzrothe P. [C. nigrorufus]; das rothhalsige P. [C. ruficollis]; das Telasko-P. [C. telasco]; das Zwerg-P. [C. minutus]; das Blau-P. [C. coerulescens]; das Brillen-P. [C. ophthalmicus]) 570

Das Lerchenpfäffchen [C. mitratus] 570

Das Düsterpfäffchen [Coccothraustes moestus] 570

Das einfarbige Pfäffchen [Coccothraustes cóncolor] 570

Das Riesenpfäffchen [Coccothraustes Euleri] 571

Das Kragenpfäffchen [C. leucopsis]; siehe auch Nachtrag S. 685 572

Morellet's Pfäffchen [C. Morelleti] . . . 572

Das gelbbürzelige Pfäffchen [Coccothraustes ochropýgus] 572

Seite

Die Ruder- oder Papageifinken 573

Der rußschwarze Papageifink [Coccothraustes fuliginosus] 573
Der Papageifink mit weißem Rückenfleck [Coccothraustes grossus] 574
Der große Papageifink [Coccothraustes magnus] 574
Der grauschwänzige Papageifink [Coccothraustes similis] 574
Der blaugraue Papageifink [Coccothraustes caesius] 574
Der dickschnäblige Papageifink [Coccothraustes maxillosus] 574
Der olivengrüne Papageifink [Coccothraustes oliváceus] 574
Der schwarzhalsige Papageifink [Coccothraustes atricollis] 574
Der schwarzkäppige Papageifink [Coccothraustes atriceps] 574
Der Riesen-Papageifink [Coccothraustes gigantódes] 575
Der größte Papageifink [Coccothraustes grandis] 575
Azara's Papageifink [Coccothraustes Azarae]; Orinoko-P. [C. orenocensis]; der Schopf-P. [C. occipitális] 575
Der elsterbunte Papageifink [Coccothraustes Leverianus] 575
Der größere Papageifink [C. major] . . . 575
Der kleinste Papageifink [C. minor] . . . 575
Der Diadem-Papageifink [Coccothraustes diadematus] 575
Der graumantelige Papageifink [Coccothraustes leucophaeus] 575
Der schwarze Papageifink [C. ater] . . . 576
Der orangeschnäbelige Papageifink [Coccothraustes aurantiirostris]; der vielfarbige P. [C. multicolor] 576

Die Ammern [Emberizinae] . . . 577

Der Weidenammer [Emberiza auréola] 578
Der Felsenammer [Emberiza fucata] . . 579
Der gelbbäuchige Ammer [Emberiza flaviventris] 580
Cabanis' Ammer [Emberiza Cabanisi] . 580
Der siebenstreifige Ammer [Emberiza tahapisi] 581
Der gestreifte Ammer [Emberiza striolata] 581
(Der Sahara-Ammer, Emberiza Saharae) 582
Der Ammer vom Vorgebirge der guten Hoffnung [Emberiza capensis] 582
Der Maskenammer [Emberiza personata] 582
Der grauköpfige Ammer [Emberiza spodiocéphala] 582
Der zierliche Ammer [Emberiza elegans] 583
Der Ammer mit gelbem Augenbrauenstreif [Emberiza chrýsophrys] 583
Stewart's Ammer [Emberiza Stewarti] . 583
Der Fichtenammer [E. pityornis] . . 584
Der röthliche Ammer [Emberiza rútila] . 587

Seite

Der Bauernammer [Emberiza rústica] . 588
Der Zwergammer [Emberiza pusilla] . . 588
Der lerchengraue Ammer [E. Impetuani] 589
Tristram's Ammer [Emberiza Tristrami] 589
Der veränderliche Ammer [E. variabilis] . 589
Der rostbärtige Ammer [Emberiza caesia] 589
Der gelbkehlige Ammer [Emberiza cinérea] 590
Der Gimpelammer [E. pyrrhuloídes] . . 590
(Der Sumpfammer [Emberiza palustris]; der graubürzelige A. [E. intermedia]) 591
Pallas' Ammer [Emberiza Pallasi] . . . 591
(Der Sperlings-Ammer [Emberiza passerina]; Hutton's A. [E. Huttoni]; der Schah-A. [E. shah]; Strachey's A. [E. Stracheyi]; der braunkäppige A. [E. castaniceps]; Giglioli's A. [E. Gigliolii]; der braunohrige A. [E. cioídes]; der schwarzohrige A. [E. ciopsis]; Ammer vom Libanon [E. meridionalis]) 591
Der braunköpfige Ammer [Emberiza lutéola]; s. auch Nachtrag S. 685 . . . 591
Der schwarzköpfige Ammer [Emberiza melanocéphala] 592
Der schwarzkehlige Ammer mit gelber Brust [Emberiza americana] 594
Townsend's Ammer [E. Townsendi] . . 597
Der zweifarbige Ammer [E. bícolor] . . 597
Der Schopfammer [Emberiza melanictera] 597
Der Schneeammer [Emberiza nivalis] . 599
Der Spornammer [Emberiza lapponica]; s. auch Nachtrag S. 686 600
Der gemalte Ammer [Emberiza picta] . 600
Der Schmuckammer [Emberiza ornata] . 601
Der schwarzschultrige Ammer [Emberiza melanóma] 601
Maccown's Ammer [Emberiza Maccowni] 601

Die Lerchen [Alaudínae] 602

Die Kalanderlerche [Alauda calandra] 603
Die zweifleckige Lerche [Alauda bimaculata] 607
Die Mohrenlerche [Alauda tatarica] 608
Die mongolische Lerche [Alauda mongolica] 610
Die sibirische Lerche [Alauda sibirica] . . 610
Die aschgraue Lerche [Alauda cinérea] . 611
Die rothköpfige Lerche [Alauda ruficeps] 611
Die Finkenlerche [Alauda deva] 612
Die kurzzehige Lerche [A. brachydáctyla]; s. auch Nachtrag S. 686 612
Die weißgraue Lerche [Alauda pispoletta] 614
Heine's Lerche [Alauda Heinei] 614
Buckley's Lerche [Alauda Buckleyi] . . . 614
(Die ungefleckte Lerche [Alauda immaculata]; die hermonische Lerche [A. hermonensis]; die großflüglige Lerche [A. macróptera] 614
Anderssson's Lerche [Alauda Anderssoni] . 615
Die kleinste Lerche [Alauda minor] 615
Die Malabarlerche [Alauda malabarica] 615
(Die kleinschnäblige Lerche; Alauda triborrhyncha) 615

Seite

Die japanische Lerche [Alauda japonica] 615
Die braune Lerche [Alauda infuscata]; die rothsteißige L. [A. erythropýga]; Blanford's L. [A. praetermissa]; die rothschnäblige L. [A. conirostris]) . . . 616
Die Wüstenlerche [Alauda deserti] . . . 616
Die rückenstreifige Lerche [Alauda cinctuta] 616
(Die fahle oder Sandlerche; Alauda pallida) 616
Die rothbäuchige Lerche [A. phoenicúra] 617
Die Theklalerche [Alauda Theklae] . . . 617
Die abessinische Lerche [Alauda abyssinica] 618
(Die kleinhäubige Lerche; A. micrólopha) 618
Die gelbe Lerche [Alauda flava]; s. auch Nachtrag S. 686 618
Die isabellfarbne Lerche [Alauda isabellina] 618
Die sandfarbige Lerche [Alauda arenicola] 618
Random's Lerche [Alauda Randoni] . . . 618
Dupont's Lerche [Alauda Duponti] . . . 618
Die dickschnäblige Lerche [Alauda crassirostris] 618
Die Alpenlerche [Alauda alpestris] . 620
Die Indianerlerche [Alauda chrysolaema]; s. auch Nachtrag S. 688 625
Die doppelhäubige Lerche [Alauda bílopha] 625
Die Ohrlerche [Alauda penicillata] . . . 625
Die langschnäblige Lerche [Alauda longirostris] 626
(Die gelbkehlige Lerche [Alauda petróphila]; die weißkehlige L. [A. albigula]; Brandt's L. [A. Brandti]) 626
Die assamische Lerche [Alauda assamica] . 626
Die rothbrüstige Lerche [Alauda affinis] . 626
Die rothflüglige Lerche [Alauda erythróptera] 627
Die weißwangige Lerche [Alauda cantillans] 627
(Die javanische Lerche; Alauda javanica) 627
Horsfield's Lerche [Alauda Horsfieldi] . . 627
(Die Hofa-Lerche; Alauda hofa) 628
Die Lerche von Kordofan [Alauda cordofanica] 628
Die einfache Lerche [Alauda simplex] . . 628
(Die zimmtrothe Lerche; Alauda rufocinnamomea) 628
Die bescheidne Lerche [Alauda modesta] 628
Die Bienenlerche [Alauda apiáta] 628
Die rostfarbige Lerche [Alauda planícola] 629
Gray's Lerche [Alauda Grayi] 629
Die braungefleckte Lerche [Alauda plebeja] 629
Die zweibindige Wüstenlerche [Alauda desertorum] 629
Jesse's Lerche [Alauda Jessei] 630

Seite

Die kleine zweibindige Wüstenlerche [Alauda africana] 630
Die weißbäckige Lerche [Alauda leucótis]; s. auch Nachtrag S. 686 . . 631
Smith' Lerche [Alauda Smithi] 632
Die weißstirnige Lerche [Alauda frontalis] 632
Die schwarznackige Lerche [Alauda melanauchen] 633
(Die schwarzkäppige Lerche; A. nigriceps) 633
Die graue Lerche; [Alauda grisea] 633
Die Falkenlerche [Alauda Clot-Beki] . . 634

Die Tangaren [Tanagrínae] . . . 635
Die Krontangara [Tanagra coronata] 637
Die Trauertangara [Tanagra melaleuca] 639
Die rothhäubige Tangara [Tanagra cristata] 640
Die kleine Trauertangara [Tanagra luctuosa] 641
Die vierfarbige Tangara [Tangara quadricolor] 642
Die purpurrothe Tangara [Tanagra brasilia] 643
Die schwarzbraune Tangara [Tanagra jacapa] 646
Die blutrothe Tangara [Tanagra sanguinolenta] 647
Die scharlachrothe Tangara [Tanagra rubra] 648
Die feuerrothe Tangara [Tanagra aestiva] 653
Die goldgelbe Tangara [T. ludoviciana] 656
Die zinnoberrothe Tangara [Tanagra saira] 656
Die Schmucktangara [Tanagra ornata] 657
Die Palmtangara [Tanagra palmarum] 658
Die blauflüglige Tangara [Tanagra cyanóptera] 658
Die meerblaue Tangara [Tanagra sayaca] 659
Die graue Tangara [Tanagra cana] . . 661
Die blaue Tangara [Tanagra episcopus] 662
Die vielfarbige Tangara [Tanagra fastuosa] 662
Die siebenfarbige Tangara [Tanagra tatao] 664
Die dreifarbige Tangara [Tanagra tricolor] 665
Die blauköppige Tangara [Tanagra festiva] 666
Die schwarzrückige Tangara [Tanagra melanóta] 666
Die gelbe Tangara [Tanagra flava] . . . 666
Die schwarzköppige Tangara [Tanagra brasiliensis] 667

Nachträge und Ergänzungen 668
Berichtigungen 687
Sachregister 691

Ende des ersten Bandes.

Verzeichniß der Abbildungen.

Tafel I.	Vogel	1.	Der graue Aſtrild [Aegintha cinérea].
	„	2.	Der gewellte Aſtrild [Aegintha astrild].
	„	3.	Der rothſchwänzige Aſtrild [Aegintha coerulescens].
	„	4.	Der orangebäckige Aſtrild [Aegintha melpóda].
	„	5.	Der goldbrüſtige Aſtrild [Aegintha sanguinolenta].
Tafel II.	Vogel	6.	Der kleine rothe Aſtrild [Aegintha minima].
	„	7.	Der Sonnenaſtrild [Aegintha Pháëthon].
	„	8.	Der dunkelrothe Aſtrild [Aegintha rubricata].
	„	9.	Der getigerte Aſtrild [Aegintha amandava].
	„	10.	Der blaue Aſtrild [Aegintha phoenicotis].
Tafel III.	Vogel	11.	Der Ringelaſtrild [Aegintha Bichenovi].
	„	12.	Der Dornaſtrild [Aegintha temporalis].
	„	13.	Der Ceresaſtrild [Aegintha modesta].
	„	14.	Der Auroraaſtrild [Aegintha phoenicóptera].
	„	15.	Der ſchwarzbäckige Aſtrild [Aegintha Dufresnei].
Tafel IV.	Vogel	16.	Die Zebra-Amandine [Spermestes castanótis].
	„	17.	Die Diamant-Amandine [Spermestes guttata].
	„	18.	Die Gürtel-Amandine [Spermestes cincta].
	„	19.	Die Schilf-Amandine [Spermestes castanóthorax].
	„	20.	Die lauchgrüne Papagei-Amandine [Spermestes prásina].
Tafel V.	Vogel	21.	Die kleine Elſter-Amandine [Spermestes cucullata].
	„	22.	Die zweifarbige Elſter-Amandine [Spermestes bicolor].
	„	23.	Die größte Elſter-Amandine [Spermestes fringillina].
	„	24.	Die ſchwarzbürzelige Bronze-Amandine [Spermestes melanopygia].
	„	25.	Das weiße japaneſiſche Mövchen [Spermestes acuticauda, *varietas* alba].
Tafel VI.	Vogel	26.	Die Silberſchnabel-Amandine [Spermestes cantans].
	„	27.	Die Malabar-Amandine [Spermestes malabarica].
	„	28.	Die Muskat-Amandine [Spermestes punctularia].
	„	29.	Die ſchwarzbrüſtige Nonnen-Amandine [Spermestes ferruginosa].
	„	30.	Die ſchwarzköpfige Nonnen-Amandine [Spermestes sinensis].
	„	31.	Die dreifarbige Nonnen-Amandine [Spermestes malaccensis].
Tafel VII.	Vogel	34.	Der ſtahlblaue Widafink [Vidua nitens].
	„	35.	Der Dominikaner-Widafink [Vidua principalis].
	„	36.	Der Paradies-Widafink [Vidua paradisea].
	„	37.	Der Hahnſchweif-Widafink [Vidua caffra].
	„	38.	Der gelbrückige Widafink [Vidua macroura].

Tafel VIII.	Vogel 32.	Die Bandamandine [Spermestes fasciata].
	„ 33.	Die Reisamandine [Spermestes oryzivora].
	„ 39.	Der rothſchnäblige Webervogel [Ploceus sanguinirostris].
	„ 40.	Ruß' rothſchnäbliger Webervogel [Ploceus Russi].
	„ 41.	Der rothköpfige Webervogel [Ploceus érythrops].
	„ 42.	Der Baya-Webervogel [Ploceus baya].
	„ 48.	Der dottergelbe Webervogel [Ploceus vitéllinus].
Tafel IX.	Vogel 43.	Der Napoleons-Webervogel [Ploceus melanogaster].
	„ 44.	Der Orange-Webervogel [Ploceus franciscanus].
	„ 45.	Der Sammt-Webervogel [Ploceus capensis].
	„ 46.	Der Oryx-Webervogel [Ploceus oryx].
	„ 47.	Der Madagaskar-Webervogel [Ploceus madagascariensis].
Tafel X.	Vogel 49.	Der ſchwarzköpfige oder Textor-Webervogel [Ploceus melanocéphalus].
	„ 50.	Der Larven-Webervogel [Ploceus larvatus].
	„ 51.	Der kaſtanienbraune Webervogel [Ploceus castáneofuscus].
	„ 52.	Der weißſchnäblige oder Alekto-Webervogel [Ploceus Alecto].
Tafel XI.	Vogel 53.	Der graue weißbürzelige Girlitz [Fringilla musica].
	„ 54.	Der buttergelbe Girlitz oder Hartlaubszeiſig [Fringilla butyrácea, *var.* Hartlaubi].
	„ 55.	Der gelbſtirnige Girlitz [Fringilla flaviventris].
	„ 56.	Der Safranfink [Fringilla brasiliensis].
	„ 57.	Der Trauerzeiſig [Fringilla tristis].
Tafel XII.	Vogel 57a.	Der Papſtfink [Fringilla ciris].
	„ 58.	Der Purpurgimpel' [Pyrrhula purpúrea].
	„ 59.	Der Indigofink [Fringilla cyánea].
	„ 60.	Der Kubafink [Fringilla canóra].
	„ 61.	Das blaugraue Pfäffchen [Coccothraustes intermedius].
	„ 62.	Der ſchuppenköpfige Sperling [Fringilla frontalis].
Tafel XIII.	Vogel 63.	Der rothe Kardinal [Coccothraustes virginianus].
	„ 64.	Der gehäubte graue Kardinal [Coccothraustes cucullatus].
	„ 65.	Der Dominikaner-Kardinal [Coccothraustes dominicanus].
	„ 66.	Der grüne Kardinal [Coccothraustes cristatellus].
	„ 67.	Der roſenbrüſtige Kernbeißer [Coccothraustes ludovicianus].
Tafel XIV.	Vogel 68.	Die purpurrothe Tangara [Tanagra brasiliensis].
	„ 69.	Die ſcharlachrothe Tangara [Tanagra rubra].
	„ 70.	Die vielfarbige Tangara [Tanagra fastuosa].
	„ 71.	Die feuerrothe Tangara [Tanagra aestiva].
	„ 72.	Die Trauertangara [Tanagra melaleuca].

Verzeichniß

der

Schriften über die fremdländiſchen Stubenvögel, welche vorzugsweiſe für dieſen Band benutzt worden.

Audubon, J. J., „The Birds of America etc.“ (New-York 1844).

Baird, S. F., „The Birds of North-America“. with the co-operation of J. Cassin and G. N. Lawrence (Philadelphia 1860).

Baird, S, F., **Brewer**, T. M. and **Ridgeway**, „A History of North-American Birds“ (Boston 1874).

Baldamus, E., „Naumannia“, Archiv für Ornithologie (Stuttgart 1851—1858).

Bonaparte, Ch. L., „American Ornithologie“ (Philadelphia 1825—1833).

Bechſtein, J. M., „Gemeinnützige Naturgeſchichte Deutſchlands, nach allen drei Reichen“ (Leipzig 1785—1795; Vögel, Band II bis IV, 1791—1795).

Buffon, „Naturgeſchichte der Vögel“ (Paris 1765; Wiener Ausgabe).

Burmeiſter, H., „Syſtematiſche Ueberſicht der Thiere Braſiliens“ (Zweiter Theil: Vögel; Berlin, 1854—1856).

Cabanis, J., „Journal für Ornithologie“ (Kaſſel und Leipzig, ſeit 1853).

Cabanis, J., v. d. Decken's „Reiſen“ III; Abtheilung Vögel (Leipzig und Heidelberg 1869).

Cabanis und **Heine**, „Museum Heineanum“ I bis IV (Halberſtadt, 1850—1863).

Chénu, „Encyclopédie d'Histoire naturelle“ (Paris; Vögel, IV bis VI).

Darwin, Chs., The Zoology of the Voyage of H. M. S. „Beagle“ (London 1840—43).

Desmarest, A. G., „Histoire naturelle des tangaras, des manakins et des todiers“ (Paris 1805).

Finſch und **Hartlaub**, „Die Vögel Oſtafrikas“ (v. d. Decken's „Reiſen“ IV; Leipzig und Heidelberg 1870).

Gentry, G., „Life Histories of the Birds of Eastern Pennsylvania“ (Philadelphia 1876).

Geßner's „Thierbuch“ (Frankfurt a. M. 1669).

Giebel, „Thesaurus ornithologiae“ (Leipzig 1874—1877).

Gould, J., „Handbook to the Birds of Australia“. I—II (London 1865).

Gray, G. R., „Handlist of Genera and Species of Birds“. I—III (London 1869—1871).

Hartlaub, G., „Syſtem der Ornithologie Weſtafrikas“ (Bremen 1857).

Hartlaub, G., „Ornithologiſcher Beitrag zur Fauna Madagaskars“ u. ſ. w. (Bremen 1861).

Heuglin, Th., „Ornithologie Nordoſtafrikas, der Nilquellen und Küſtengebiete des rothen Meeres und des Somallandes“ (Kaſſel 1869—1874).

Horsfield et Moore, „A Catalogue of the Birds in the Museum of the Hon. East-India Company". I—II (London 1856—1858).

Jerdon, T. C., „The Birds of India" (Calcutta 1862—64).

Layard, L. E., „The Birds of South-Africa" (Captown 1867).

Lichtenſtein, H., „Verzeichniß der Doubletten des zoologiſchen Muſeum zu Berlin" (Berlin 1824).

Noll, F. C., „Der zoologiſche Garten" (Frankfurt am M., ſeit 1850).

Nuttall, Th., „A Manual of the ornithologie of the United States of America and of Canada". I u. II (Boston 1832—1834).

Pelzeln, A., „Reiſe der Fregatte Novara" (Vögel; Wien 1865).

Pelzeln, A., „Zur Ornithologie Braſiliens". Reſultate von J. Natterer's Reiſen (Wien 1871).

Pelzeln, A., „Jahresberichte über die Leiſtungen in der Naturgeſchichte der Vögel" (Wien 1865).

„**Proceedings** of the Zoological Society of London" (1830).

Reichenbach, H. G. L., „Die Singvögel als Fortſetzung der vollſtändigſten Naturgeſchichte" (Dresden und Leipzig).

Rey, E., „Synonymik der europäiſchen Brutvögel und Gäſte" (Halle 1872).

Ruß, K., „Die gefiederte Welt" (Berlin, ſeit 1872).

Ruß, K., „Handbuch für Vogelliebhaber" (Hannover 1878; II. Auflage).

Salvin, O., und **Sclater**, Ph., „The Ibis" (London 1853).

Schlechtendal, E., „Monatsſchrift des deutſchen Vereins für Vogelkunde und Vogelſchutz" (Halle, ſeit 1876).

Sclater, Ph. L., „Synopsis Avium Tanagrinarum" (London 1856).

Sclater, Ph. L., „List of the vertebrated animals, now or lately living in the gardens of the Zoological Society of London" (London 1862—1877).

Stölker, K., „Ornithologiſche Beobachtungen" (1874—1875).

Tſchudi, J. J., „Unterſuchungen über die Fauna Peruana" (St. Gallen 1844—1846).

Vieillot, „Les oiseaux chanteurs" (Paris 1790).

Wallace, W. B., „The Malay Archipelago" (London 1869); deutſch von Dr. A. B. Meyer (Braunſchweig 1869).

Wied, M., Prinz zu, „Beiträge zur Naturgeſchichte von Braſilien" (Weimar 1825—1833).

Wilson, A., „American Ornithologie" (Philadelphia 1808—1814).

Einführung.

An Lehrbüchern der Vogelkunde ist in Deutschland kein Mangel; auch Handbücher, welche in Hinsicht der Verpflegung der Stubenvögel Rathschläge und Anleitungen gewähren, sind genug vorhanden. Die neuesten derartigen Werke behandeln zugleich die Züchtung der Vögel in der Gefangenschaft mit der gebührenden Sorgfalt.

Dennoch blieb bisher eine fühlbare Lücke, da es kein Buch giebt, welches die nach Europa aus allen übrigen Welttheilen in immer zunehmender Kopfzahl und Mannigfaltigkeit eingeführten Vögel eingehend schildert und in lebensvollen farbigen Abbildungen zeigt.

Ein solches Werk beabsichtige ich im Nachfolgenden zu schaffen, und um das volle Vertrauen meiner Leser zu gewinnen, sei es mir gestattet, zunächst zu berichten, wie dasselbe entstanden und in welcher Weise ich den reichen Stoff für seinen Inhalt gesammelt habe.

Seit meiner Jugendzeit habe ich mit der einheimischen Vogelwelt mich beschäftigt; ebenso wie Vater Bechstein und die meisten anderen Verfasser der Schriften über praktische Stubenvogel-Pflege, habe auch ich viele Jahre hindurch zahlreiche Vögel beherbergt. In neuerer Zeit wandte ich meine Aufmerksamkeit ausschließlich den fremdländischen Stubenvögeln zu. Eine beträchtliche Anzahl derselben hielt ich anfangs in Käfigen, dann aber richtete ich eine Vogelstube ein, von vornherein in der Absicht, möglichst viele fremdländische Vögel andauernd zu pflegen, um sie zu züchten. Selbstverständlich suchte ich dabei ihre Lebensweise und alle ihre Eigenthümlichkeiten, das ganze Wesen, die Liebesspiele, den Nestbau, die Form und Farbe der Eier, den Nestflaum und das Jugendkleid der Jungen, deren Verfärbung und Benehmen bis zur vollendeten Entwickelung kennen zu lernen. Bis jetzt sind über die Mehrzahl der zu uns gelangenden fremdländischen Vögel hinsichtlich ihres Freilebens in der Heimat erst sehr geringe Nachrichten bekannt geworden, weil die Reisenden und Forscher in

ferngelegenen unwirthlichen Gegenden nur selten Muße gehabt, diese Thiere ausreichend zu sehen und zu studiren. Da ich aber in meiner Vogelstube alle diejenigen Vögel, welche zur Brut geschritten sind, auf das gewissenhafteste beobachtet habe, wie mir auch von vielen anderen erfahrenen und kenntnißreichen Vogelzüchtern derartige Mittheilungen immerfort sehr reichlich zugekommen, so ist zweifellos zu erwarten, daß in diesem Buche die Naturgeschichte vieler fremden Vögel eine bedeutende Erweiterung finden wird.

Freilich kann das Leben der Vögel in der Gefangenschaft nur bedingungsweise als übereinstimmend mit ihrem Freileben angesehen werden. Während manche Arten, namentlich die kleinsten Finken, wol ganz treu an ihren Gewohnheiten auch in der Vogelstube festhalten, so zeigen andere und allerdings die meisten, ein durchaus verändertes Benehmen. In einer Hinsicht aber kann kaum eine bedeutsame Abweichung stattfinden — in der Brutentwickelung nämlich. Zwar mögen die dargebotenen, sehr fremdartigen Baustoffe dem Neste ein ungleich anderes Aussehen geben; niemals aber wird die Gestaltung und Form desselben die Erbauer verleugnen. Der Mangel irgend welcher nur in der Heimat vorhandenen Nahrung kann bewirken, daß die Farbe oder Zeichnung der Eier mehr oder minder bleich oder abweichend erscheint; mit dem Nestflaum und dem Jugendkleide ist dies jedoch nicht der Fall. —

Vor allen Dingen ist es meine Absicht, die Liebhaber auf diejenigen Vögel aufmerksam zu machen, welche unschwer, ohne große Mühe und Kosten zur Vermehrung zu bringen und zugleich in allen ihren Eigenschaften so liebenswürdig sind, daß sie allgemeine Verbreitung als Stubenvögel verdienen. Für ihre Pflege in Käfigen und Gesellschaftsbauern, sowie für ihre Zucht, einerseits freifliegend in einer Vogelstube und andererseits in Heckgebauern will ich Rathschläge geben, die also auf die Erfahrungen der bewährtesten deutschen Vogelwirthe gegründet sind.

Wol ist die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in Deutschland ebenso, wie bei fast allen gebildeten Völkern überhaupt, bereits seit geraumer Zeit zu Hause; manche Vogelarten, besonders Papageien, werden ja schon seit Jahrhunderten eingeführt. Trotzdem war diese Liebhaberei bis vor kurzem noch gleichsam in den Kinderschuhen; denn der deutsche Vogelhandel bot noch keine beachtenswerthe Fülle und Reichhaltigkeit, und von der Züchtung dieser Vögel war kaum irgendwo die Rede.

Dr. Karl Bolle, der hochgeschätzte Naturforscher und Reisende, welcher zu den ersten Vogelkundigen Deutschlands gehört, hat in der Zeitschrift „Naumania“ (Jahrgang 1858, S. 332 ff.) ein Verzeichniß der Vögel gegeben, welche in jener Zeit auf unsern Vogelmarkt gelangten. Es sind nur 51 Arten, unter ihnen befinden sich aber sonderbarerweise fünf Arten, welche seitdem aus dem

Handel leider wieder völlig verschwunden sind.*) Die Züchtung fremdländischer Vögel versuchten damals nur wenige wohlhabende Freunde und Kenner dieses Gefieders. Im übrigen wurden solche Vögel gleichsam nur als Schmuck- und Ziergegenstände gekauft, und man entnahm daher die minder farbenreichen Weibchen, wie die von dem Nonpareil oder Papstfink, dem rothen Kardinal, dem Paradies-Widahfink u. a., niemals mit. Dieselben wurden entweder von vornherein nicht eingeführt oder sie blieben bei den Händlern zurück.

Seitdem ich Schilderungen fremdländischer Vögel in der „Gartenlaube", in der „Kölnischen Zeitung", der Wiener „Neuen Freien Presse" und vielen anderen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, gewann die Liebhaberei einen außerordentlichen Aufschwung und zugleich lenkte sie in eine ganz neue Bahn. Man legte Vogelstuben an oder richtete Käfige ein, lediglich für den Zweck der Züchtung in größerem oder geringerem Maßstabe. Hunderte, ja bald Tausende von Briefen mit Anfragen über alle Verhältnisse dieser Vogelliebhaberei liefen bei mir ein, und nahmen mich bald so sehr in Anspruch, daß ich den Entschluß faßte, ein Werk über die fremdländischen Vögel zu schreiben.

Hierzu konnte ich mich um so mehr berufen fühlen, da ich nicht allein tagtäglich meine eigenen Erfahrungen bereicherte, sondern auch von den immer zahlreicher auftretenden Vogelzüchtern und Vogelfreunden (deren Namen ich am Schlusse dieses Werkes als meine Mitarbeiter dankbar nennen werde) fortdauernd die Mittheilungen der ihrerseits gewonnenen Erfolge und Erfahrungen erhielt. Ein Buch aber, welches ausreichende und wirklich zuverlässige Anleitung zur Kenntniß und zum Einkauf, zur Verpflegung und Zucht aller hierher gehörenden Stubenvögel geboten hätte, gab es damals, wenigstens in deutscher Sprache, noch nicht.

Vieillot, der berühmte französische Gelehrte und Vogelkundige, welcher in der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte, hatte bereits eine große Anzahl exotischer Vögel selber gehalten und beobachtet, zum Theil auch gezüchtet, dann beschrieben und abgebildet. Dies Werk „Les Oiseaux chanteurs" (Paris, 1790) war seitdem in der Literatur aller Länder eine der Hauptquellen über diese Vogelwelt. Dasselbe ist jedoch seines hohen Preises wegen nur in wenigen großen öffentlichen Bibliotheken vorhanden und daher den meisten Vogelfreunden nicht zugänglich.

Von größerem Werth für die deutschen Liebhaber ist das Werk von G. H. Ludwig Reichenbach: „Die Singvögel, als Fortsetzung der vollständigsten Naturgeschichte" (Dresden und Leipzig, Selbstverlag), welches, mit Abbildungen reich ausgestattet, die Beschreibungen fremdländischer Stubenvögel

*) Auf das Verhältniß der steigenden Einfuhr fremdländischer Vögel, wie sich dasselbe im Laufe der letzten Jahrzehnte gestaltet hat, werde ich weiterhin eingehend zurückkommen.

bietet. Leider enthält dies Buch jedoch bei weitem nicht sämmtliche Vögel des Handels, dagegen zeigt es viele, welche noch nicht lebend nach Europa gekommen; dann sind seine Angaben auch gar zu kurz und die Abbildungen nicht genügend.

Die übrigen größeren und kleineren Naturgeschichten der Vögel, Hand- und Lehrbücher waren theils bereits veraltet, mindestens in Bezug auf die fremdländischen Stubenvögel, theils aber auch nicht stichhaltig genug; so z. B. das sonst mit Recht geschätzte Werk „Illustrirtes Thierleben“ (Hildburghausen, 1864). Somit durfte ich mit gutem Muth an mein Unternehmen gehen.

Herr Verlagsbuchhändler Karl Rümpler in Hannover kam mir mit dem vollen Vertrauen entgegen, welches für die Ausführung eines solchen großartig angelegten Werkes durchaus nothwendig ist. Robert Kretschmer, damals unbestreitbar einer der hervorragendsten Meister auf dem Gebiete lebensvoller Darstellung der Vögel, wurde damit betraut, die Tafeln mit den farbigen Bildern dieser bunten und glänzenden Vogelwelt zu malen. Er machte die Studien dazu in meiner Vogelstube. Bedauerlicher Weise wurde aber durch die Erkrankung des Künstlers die Herstellung um volle drei Jahre verzögert und zuletzt ganz in Frage gestellt, da Herr Kretschmer, viel zu früh für die Wissenschaft und Kunst, einem Brustleiden erlag.

Die Anfragen der Vogelliebhaber und beginnenden Züchter, welche im Laufe der Zeit immer zahlreicher bei mir einliefen, veranlaßten mich, alle meine Erfahrungen zunächst noch immer weiter in den Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Da aber einerseits die Kenntniß der fremdländischen Stubenvögel bei uns in Deutschland, trotz der immer lebendiger erwachenden Liebhaberei, im allgemeinen eine nur zu geringe war, so daß bei Wahl und Ankauf gewöhnlich nur dem blinden Zufall gefolgt wurde, während zugleich in den Namen eine arge Verwirrung herrschte, und selbst die erste Anleitung zu einer naturgemäßen Verpflegung, wenigstens während der Nistzeit, mangelte, so gelangte ich bald zu dem Entschluß, vorläufig kurz gefaßte, doch für das Kennenlernen, die Haltung und Züchtung ausreichende Rathschläge in einer kleineren Schrift:

„Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler“*)

herauszugeben. Dies Handbuch, das durch ein Bedürfniß hervorgerufen war, zeigte einen raschen, erfreulichen Erfolg.

Dennoch nahmen die Anfragen der Vogelfreunde und Züchter noch immerfort in steigendem Maße zu, und, um der so regsam erwachten, durch ganz Deutsch-

*) Das **Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler** ist sodann in drei Theilen und zwar I. Fremdländische Stubenvögel, II. Die einheimischen Stubenvögel, III. Die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel (Verlag von Karl Rümpler in Hannover) erschienen.

land und natürlich auch in anderen Ländern verbreiteten Liebhaberei ein weiteres Genüge zu leisten, sah ich mich veranlaßt, eine eigene Zeitschrift für dieselbe unter dem Titel:

„Die gefiederte Welt"

(begonnen seit Anfang d. J. 1872, im Verlage des Herrn G. Goßmann, Inhaber der Verlagshandlung Louis Gerschel in Berlin) zu begründen. Diese Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler fand ebenfalls einen überraschend schnellen Eingang bei den Stubenvogel- und Geflügelwirthen; nicht in Deutschland allein, sondern auch in England, Schweden, Dänemark, Rußland, Frankreich, Italien, in der Schweiz und den Niederlanden, sowie in Nordamerika hat sie Leser — und dies zeugt von der erfreulichen Verbreitung der Vogelliebhaberei.

Die „Gefiederte Welt" erstreckt sich über alle Gebiete der Vogelkunde und Liebhaberei; sie berücksichtigt außer den fremdländischen auch die einheimischen Stubenvögel, das Leben, die Hegung und den Schutz der Vögel im Freien, und nicht minder giebt sie Auskunft über alles Hof- und Parkgeflügel, Hühner, Tauben und alle anderen Nutz- und Schmuckvögel; vorzugsweise verfolgt sie jedoch praktische Ziele, wie die Erwerbung, Behandlung und Züchtung der Vögel und all' dergleichen. —

Durch die Verzögerung, welche das Erscheinen des Werkes: „Die fremdländischen Stubenvögel" erlitten, sind nun aber bedeutsame Vortheile für dasselbe erwachsen. In diese Zeit fiel nämlich die Gründung des Berliner Aquarium, die Neugestaltung des zoologischen Gartens zu Berlin und die Neuschöpfung oder Vergrößerung ähnlicher Naturanstalten an mehreren anderen Orten — und durch alle dieselben ward die Empfänglichkeit für die Vogelliebhaberei in immer weiterem Umfange erweckt. Bald wurden zahlreiche Vogelstuben in ganz Deutschland eingerichtet, und ohne Anmaßung darf ich wol behaupten, daß auch mein Handbuch die Liebhaberei noch außerordentlich entfacht und in die weitesten Kreise getragen hat. Dadurch, namentlich aber durch die Wechselbeziehungen, welche die „Gefiederte Welt" unter allen Liebhabern wachgerufen, ist auch der Handel zu einer ungleich lebhafteren Entwickelung gelangt. Während nun die Züchtungen allenthalben viel eifriger betrieben werden, immer vielfältigere Ergebnisse liefern (durch deren freundliche und allseitige Mittheilungen der Stoff für das Buch desto reichhaltiger geworden), so hat zugleich der Vogelhandel in den letzten Jahren auch einen überraschenden Reichthum an bisher noch nicht herüber gebrachten, größtentheils sehr schönen und liebenswürdigen Arten geboten, die ich sämmtlich kennen zu lernen und zu schildern noch Muße genug gefunden.

Die bildliche Darstellung der lieblichsten und interessantesten Vögel für mein Werk hat jetzt Herr Emil Schmidt, der Schüler und Schwiegersohn Roßmäßler's, übernommen, und die bereits vorliegenden Tafeln geben den Beweis,

daß dieser Künstler in durchaus lebensvoller und naturtreuer Ausführung seinem älteren Genossen auf diesem Gebiete wahrlich nicht nachsteht.

Die Tafeln werden in Farbendruck von der Kunstanstalt des Herrn Theodor Fischer zu Kassel hergestellt. Der große Ruf, den Herr Fischer durch seine bisherigen Leistungen für die höchststehenden wissenschaftlichen Werke sich erworben, bürgt dafür, daß meine Leser diese Vogelwelt ebenso schön als lebenswahr vor sich sehen werden.

* * *

Verschiedene Ursachen sind es bekanntlich, welche die einheimischen Vögel, insbesondere die Kerbthierfresser unter ihnen, zurück- und dafür die fremdländischen hervortreten lassen. Der seit geraumer Zeit andauernde Streit über die zweckmäßigsten Maßnahmen des Vogelschutzes*) in Deutschland hat wenigstens soviel zur allgemeinen Ueberzeugung dargethan, daß die vorzüglichsten Singvögel nicht mehr durch Nesterausheben und massenweisen Fang vernichtet werden sollen. Wenn dies nun auch im allgemeinen der wirklichen Liebhaberei kaum Eintrag thun kann und die begeisterten Freunde des Vogelgesangs diese Vögel nach wie vor nicht zu entbehren brauchen, so ist es doch um so anerkennenswerther, wenn der harmlose Liebhaber seinerseits in keiner Hinsicht zur Verringerung der einheimischen Vögel beitragen, sondern lieber fremdländische halten will, welche doch zugleich namhafte Vortheile bieten.

Diese bestehen nämlich darin, daß nicht wenige fremdländische Vögel sich unschwer und ergiebig züchten lassen; selbstverständlich jedoch nur in dem Falle einer zweckmäßigen Behandlung. Dann aber zeigt sich diese Vogelzucht auch recht lohnend. Nachdem ich bereits im Jahre 1868 die weitesten Kreise der Vogelliebhaber zur Züchtung fremdländischer Stubenvögel angeregt, darf ich jetzt mit großer Genugthuung darauf hinweisen, daß von mehreren Arten, namentlich von Wellensittichen und Nymfen, sowie auch von manchen Prachtfinken, besonders Zebrafinken, Bandfinken und Karminfinken oder Amarantvögeln, schon gegenwärtig, wenigstens zeitweise, eine ungleich größere Anzahl hier gezüchtet, als aus ihren Heimatsländern eingeführt wird. Als die hauptsächlichsten Ziele und Zwecke solcher Vogelzucht, abgesehen von der Liebhaberei an und für sich, habe ich damals folgende hingestellt: Einerseits die Vermehrung und Verallgemeinerung der fremdländischen Stubenvögel als Ersatz für die einheimischen; andererseits vielleicht auch die Beschaffung einer Hülfsquelle für den Lebenserwerb unbemittelter Familien. Das erstere Ziel wird sich niemals vollständig erreichen lassen und dies ist auch nicht zu bedauern, denn jeder Gebildete wird der Liebhaberei nach allen Seiten hin volle Berechtigung zugestehen müssen. Dem andern Ziele rücken wir aber um

*) Vrgl. „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 6—45.

so erfreulicher entgegen; denn trotz der Hunderte in den Vogelstuben und Hecken gezüchteten Wellensittiche, Zebrafinken, Amarantvögel u. a. ist an eine Entwerthung dieser Vögel noch gar nicht zu denken; im Gegentheil schreitet ja die Liebhaberei und damit das Begehren nach denselben in der lebhaftesten Weise noch immer weiter fort. Selbstverständlich werde ich auf diese Vogelzucht, ihre Ausbreitung und Erfolge weiterhin eingehen und namentlich die durch Erfahrungen bis jetzt festgestellten Mittel und Wege ihrer immer größeren Hebung und Vervollkommnung mittheilen. —

Die Einfuhr fremdländischer Vögel ist bekanntlich nicht auf wenige Arten oder auf Körnerfresser allein beschränkt; sie umfaßt zwar im wesentlichen dieselben oder nahe verwandte Familien, deren Mitglieder wir unter den einheimischen Vögeln als Singvögel vorzugsweise schätzen, und außerdem bietet sie noch zahlreiche andere, welche als Schmuck- oder gelehrige Vögel besonderes Interesse beanspruchen dürfen, wie z. B. die Papageien. In den Reihen der fremdländischen Singvögel finden wir eine Anzahl, die den unsrigen durchaus ebenbürtig sind. Belassen wir der Nachtigal, dem Sprosser und deren Verwandten den anerkannten vollen Werth, so steht neben ihnen die amerikanische Spottdrossel, und andere fremde Drossel- und Sängerarten u. dgl. bleiben nicht viel hinter ihnen zurück; schätzen wir den Gesang einheimischer Finken, des Hänflings und seiner Genossen auch immerhin sehr hoch, so dürfen wir doch wahrlich nicht geringer die Lieder afrikanischer Finkenvögel, des Grauedelfink (oder richtiger Graugirlitz), des weißkehligen, gelbstirnigen und des gelbbäuchigen Girlitz u. a., sowie die Gesänge naheſtehender Amerikaner, des Purpurfink, Golddistelfink, Papstfink, Indigovogel, der westindischen Zeisige, der verschiedenen Pfäffchen und anderer, veranschlagen.

Da eine Sippschaft kleiner fremdländischer Vögel in ihrem bunten Gefieder, anmuthigen, liebenswürdigen und friedlichen Wesen, sowie durch leichte Züchtbarkeit ganz besondere Vorzüge zeigt, so ist es wol kein Wunder, daß sich dieselbe, die Schmuck- oder Prachtfinken, einer großen Beliebtheit erfreuen und dadurch allgemeinen Eingang gefunden haben. Ihnen folgen die Widahfinken, fälschlich Witwen genannt, und die Webervögel, welche freilich weniger lieblich, dagegen durch den alljährlich regelmäßig eintretenden Wechsel der Verfärbung aus dem grauen und unscheinbaren Kleide in das bunte und glänzende Prachtgefieder überaus interessant erscheinen und deren letztere auch in der Gefangenschaft sehr eifrig ihre kunstfertigen Nester erbauen, und daher ebenfalls großer Beliebtheit sich erfreuen. Die Prachtfinken, Widahfinken und Webervögel sind nicht allein die bei den deutschen Liebhabern verbreitetsten fremdländischen Stubenvögel, sondern sie bilden auch die bei weitem größte Mehrzahl derselben

Wer die Gabe des Gesanges von vornherein den bunten Farben vorzieht, hält sich lieber an die Reihen der übrigen Finkenvögel, in denen eigentliche Finken, Girlitze, Gimpel, Kernbeißer u. a. als tüchtige Sänger vertreten sind, von denen jedoch viele außerdem auch als recht bunte Schmuckvögel gelten können. Fremdländische Lerchen, Ammern und andere hierher gehörende, nahestehende Vögel kommen leider nur in unbeträchtlicher Anzahl in den Handel.

Die hervorragendsten Sänger treten uns, wie in der einheimischen so auch bei der fremdländischen Vogelwelt, unter den Kerbthier- oder Weichfutter-Fressern entgegen. Wir haben ihrer im Vogelhandel freilich keine so große Kopfzahl und Vielfältigkeit, als von den Körnerfressern, allein es befinden sich in ihren Reihen doch die herrlichsten der fremden und wol aller Singvögel überhaupt. Vornehmlich sind es die Drosseln, sodann aber auch einige den übrigen Sängern (Sylvia, *Latham*), besonders den Grasmücken, ferner den Meisen u. a. angehörende oder nahestehende Vögel, welche aus fernen Erdtheilen hergebracht werden. Recht zahlreich und in mehreren Arten giebt es sodann Starvögel und Verwandte (Stare, Trupiale oder Oriols); selbst von winzigen und überaus zarten Vogelarten, z. B. Honigsaugern, hat man neuerdings einige lebend bei uns eingeführt.

Die Papageien erscheinen nahezu ebenso viel und mannigfaltig auf dem Vogelmarkte, als die Finkenvögel und sie sind auch, zumal sie in ihren außerordentlich verschiedenartigen Geschlechtern mancherlei Ansprüche der Liebhaberei (Sprachgabe, Farbenpracht, Zahmheit, Liebenswürdigkeit und Züchtbarkeit) zu befriedigen vermögen, keineswegs minder gesucht und geschätzt.

Für besondere Liebhaber bieten sodann auch noch viele andere Vogelfamilien mindestens einzelne begehrte Gäste für den Käfig, die Vogelstube oder das Vogelhaus dar; so z. B. aus den Reihen der Krähenvögel, sogar der Raubvögel, der Klettervögel. Schließlich giebt es hier beliebte Erscheinungen aus den Sippschaften der Tauben, der Hühnervögel und selbst der Wasser- und Sumpfvögel, insofern man den Begriff der Stubenvogelliebhaberei etwas weiter, bis auf das Vogelhaus im Garten, füglich doch mit Recht ausdehnen darf.

Alle diese fremdländischen Stubenvögel will ich also möglichst nach eigener Anschauung schildern. Ich habe im Laufe der Jahre die auf den europäischen Vogelmarkt gelangenden Prachtfinken, Widahfinken und Webervögel in meiner Vogelstube gehalten und kennen gelernt. Dasselbe darf ich von den anderen fremdländischen Finkenvögeln, Lerchen, Ammern und Verwandten sagen. Dagegen konnte ich nicht alle Weichfresser des Vogelhandels selber beherbergen, sondern nur die hervorragendsten Sänger und die farbenprächtigsten unter ihnen, so namentlich fast sämmtliche Tangaren. Die Starvögel wiederum hatte ich in fast

allen Arten. Von den Papageien habe ich die Plattschweifsittiche (die australischen Prachtsittiche), Edelsittiche, Keilschwanzsittiche, Dickschnabelsittiche und Schmalschnabelsittiche bis auf die seltensten und kostbarsten, sowie die allergrößten verpflegt; von den Kurzschwänzen, den Amazonen und anderen sprechenlernenden Papageien hielt ich wenigstens die vorzüglichsten. Alle Zwergpapageien, soweit sie in den Handel gelangen, bewohnen beständig meine Vogelstube und von den Papageichen oder Fledermauspapageien und ebenso von den Lori's oder Pinselzünglern schaffte ich ebenfalls die Mehrzahl der in den letzten Jahren eingeführten an. Größere Vögel, welche zu den Krähenartigen, den Raubvögeln, Klettervögeln, Sumpf- und Wasservögeln gehören, konnte ich natürlich nicht selber halten. Dagegen habe ich die meisten Täubchen des Vogelhandels und auch von den Hühnervögeln, besonders von den kleineren Wachteln mehrere, längere Zeit hindurch beobachtet. Somit kenne ich die ganze reiche Vogelwelt, welche der Handel gegenwärtig für die Liebhaberei bietet, nach eigenen vieljahrelangen Erfahrungen; diejenigen Vögel aber, welche ich nicht selber erwerben konnte, fand ich in den zoologischen Gärten und im Berliner Aquarium und außerdem liegen mir in größter Fülle die Mittheilungen vor, über die Beobachtungen, welche meine Freunde und Mitarbeiter an allem diesem Gefieder seit geraumer Frist her gemacht haben.

In letzterer Zeit erschienene Werke, welche wol recht Vorzügliches bieten, zeigen doch einige Mißgriffe, durch die ihr Werth für den praktischen Gebrauch bedeutsam verringert wird. Man hat, im Eifer einer neueren Richtung folgend, eine fabelhafte Zersplitterung der Familien, Gattungen, Arten hervorgerufen, so daß der gebildete, jedoch nicht streng wissenschaftlich unterrichtete Liebhaber schwerlich in einem solchen Buche sich zurechtfinden kann. Auch bemühte man sich nur zu sehr, durch mehr oder minder glückliche Erfindung von neuen Namen die bereits herrschende Verwirrung noch ungleich größer zu machen. Dergleichen glaube ich vermeiden zu können.

Zunächst werde ich nur diejenigen Vögel ausführlich schildern, welche ich selber durch Anschauung kenne oder über die ich auf Selbstkenntniß und eigenem Studium beruhende Mittheilungen von bewährten Vogelkennern und Züchtern erhalten habe. Es bedarf wol nicht mehr des Hinweises, daß dies eben sämmtliche hierher gehörende Vögel sind, welche der Handel gegenwärtig nach Europa bringt. Denn einerseits stehe ich für diesen Zweck seit Jahren mit allen bedeutenden Vogelhandlungen Deutschlands, Englands und der Niederlande in Verbindung, und andererseits herrscht unter den deutschen Liebhabern ein wahrer Wetteifer darin, alle neu auftauchenden Erscheinungen des Vogelmarkts zu erwerben und kennen zu lernen. Die dann gesammelten Erfahrungen fließen mir fortdauernd für die „Gefiederte Welt“ reichlich zu.

Da der Vogelhandel, wie bereits erwähnt, einen nie geahnten Aufschwung genommen, so daß er fortwährend neue Vogelarten uns zuführt, so werde ich diejenigen fremden Vögel, welche bis jetzt noch nicht auf den europäischen Markt gekommen, aber den vorhandenen nahe verwandt sind oder solchen Gegenden entstammen, die uns schon reiche und noch immer zunehmende Ausbeute senden, selbstverständlich ebenfalls schildern; doch werde ich den Sachverhalt jedesmal ausdrücklich angeben. —

In Hinsicht der Eintheilung aller Stubenvögel sei hier vorläufig nur bemerkt, daß ich jede unnöthige Zersplitterung unterlassen will. Auf dem wissenschaftlichen Grunde aller Forschungen der hervorragendsten unserer zeitgenössischen Ornithologen fußend, werde ich die Anordnung der Gruppen, Ordnungen, Familien und Arten vornehmlich nach Cabanis: „Museum Heineanum“ (Halberstadt, 1850—63) und nach Gray: „Hand-list of genera and species of birds“ (London, 1869—71) treffen, im übrigen aber den Schriften der DDr. Professor Cabanis, Hartlaub und Finsch, Professor Schlegel, Sclater, Gould und Anderen folgen und auch die von ihnen gesichteten Namen festhalten.

Den deutschen Namen gegenüber erachte ich es als eine Pflicht, daß man nicht etwa in blinder Verbesserungssucht die doch einmal vorhandenen und allgemein eingebürgerten zu vernichten strebe. Im Gegentheil, ich will mich bemühen, die Bezeichnungen des Vogelhandels zu erhalten, soweit dieselben nur zutreffend und verständig sind. Wo es jedoch nothwendig ist, neue Namen zu geben, wird jeder gewissenhafte Vogelkundige einerseits soviel als möglich den bezeichnendsten Merkmalen, welche gewöhnlich in der lateinischen Benennung ausgedrückt sind, und andererseits auch den Aeußerungen des Volksmundes vorzugsweise Rechnung zu tragen suchen.

Einen Vortheil, sei es für den Einkauf bei Großhändlern, sei es bei Gelegenheit von Reisen oder schriftlichen Aufträgen an Freunde und Bekannte in der Ferne, soll mein Buch noch bieten, den nämlich, daß ich, außer dem wissenschaftlichen lateinischen und dem passendsten deutschen, nicht allein sämmtliche überhaupt noch verhandenen deutschen, sondern auch die englischen, französischen und sonstigen Namen anführen werde, soweit mir dieselben zugänglich sind.

Der Plan dieses Werkes zerfällt in drei Abtheilungen:

I. Die Beschreibung der Gruppen, Familien und jeder einzelnen Art aller fremdländischen Stubenvögel, nebst Schilderung ihrer Eigenthümlichkeiten im Freileben, wie in der Gefangenschaft. In der ersteren Hinsicht werde ich mich nur auf die Mittheilungen solcher Forscher verlassen, die in dem durchaus unangetasteten Rufe der strengsten Wahrheitsliebe und vollen Ehrenhaftigkeit stehen. Berichte, welche aus verschiedenen Reisewerken zusammengetragen und dann wol gar als eigene Beobachtungen hin-

gestellt sind, werde ich zu vermeiden wissen. Ebenso dürfen meine Leser davon überzeugt sein, daß in den Darstellungen des Gefangenlebens der Vögel jede Angabe von Anderen, sowie jede Annahme meinerseits, deren Thatsächlichkeit zweifelhaft sein könnte, von vornherein ausgeschlossen bleibt.

II. Rathschläge für den Einkauf, die Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Stubenvögel, nebst Beschreibung der Käfige, Züchtungsanlagen, Vogelstuben und Vogelhäuser und aller erforderlichen Geräthschaften und Hülfsmittel überhaupt, mit Angabe der besten Quellen für die Beschaffung derselben. Es ist wol überflüssig zu versichern, daß ich auf das gewissenhafteste mich bemühen werde, vorzugsweise in diesem Theile nur zuverlässige Anleitungen zu geben. Für dieselben sollen, außer den Ergebnissen der eigenen Erfahrungen und derer aller meiner Herren Mitarbeiter, auch die vorzüglichsten Schriften auf diesem Gebiete zu Rathe gezogen werden.

III. Eine Uebersicht, in welcher aus der großen Fülle der wissenschaftlichen Literatur wenigstens auf die hauptsächlichsten Werke zur weiteren Belehrung über jeden einzelnen Vogel hingewiesen ist. In dem ausführlichen Sachregister sodann soll jede Vogelart unter allen ihren Benennungen leicht aufzufinden sein.

Hiernach darf ich die Zuversicht aussprechen, daß mein Buch als ein verläßlicher Rathgeber nach allen Richtungen hin sich zeigen werde.

I. Die körnerfressenden Vögel.

(Hartfutter- oder Samenfresser).

Mit gutem Recht, wenn auch freilich nicht im wissenschaftlichen Sinne, scheidet man alle Stubenvögel nach ihrer Nahrung in zwei große Gruppen, deren eine sich also von Sämereien und die andere von Kerbthieren und Gewürm in der Freiheit ernährt und dem entsprechend in der Gefangenschaft gefüttert werden muß. Allerdings ist diese Eintheilung, so bezeichnend sie auch erscheint, doch nicht durchaus stichhaltig.

Viele Samenfresser bedürfen in der Gefangenschaft, entweder zeitweise für sich selber, oder zur Fütterung ihrer Jungen, durchaus der Fleischnahrung (frische oder getrocknete Ameisenpuppen, Mehlwürmer oder als Ersatz hartgekochtes Hühnerei, Quarkkäse u. dgl.), und in der Freiheit leben manche von ihnen während der warmen Jahreszeit vorzugsweise von derselben; andererseits dagegen verzehren auch die meisten Kerbthierfresser zuweilen Beeren und Früchte, ja sogar Samen und nicht wenige von ihnen ernähren sich von Kerbthieren nebst Sämereien zugleich.

Dennoch haben die neueren praktischen Naturgeschichten der Vögel und Handbücher der Vogelpflege eine solche Gegenüberstellung gewählt.

Gewöhnlich begreift man als Körnerfresser jedoch nur die Finkenvögel allein; ich habe aber bereits in meinem „Handbuch" auch die Papageien, Hühnervögel und Tauben zu ihnen gezählt und diese einfache Eintheilung werde ich auch hier im größeren Werke beibehalten. Da die Tauben, Hühner und verwandte Vögel für die Stubenvogel-Liebhaberei weniger von Bedeutung sind, und da ich die Papageien erst in dem zweiten Bande dieses Buches behandele, so kommen also zunächst nur die Finkenvögel in Betracht.

Als Stubenvögel finden und verdienen diese Körnerfresser vorzügliche Beachtung. Ihre Ernährung und Haltung ist mit viel geringeren Mühen und Kosten verbunden, als die der Kerbthierfresser. Dazu gestattet es ihre Verträglichkeit, daß man Hunderte von ihnen in demselben Raume beisammen halten und

züchten kann (nur einzelne Arten sind so ungesellig oder bösartig, daß man sie absondern muß). Sodann ist vor allem die Reinlichkeit der Käfige und Vogelstuben, welche mit Körnerfressern bevölkert sind, ungleich leichter zu ermöglichen. Der Gesang vieler von diesen Körnerfressern ist ein so angenehmer, daß er auch hohe Ansprüche wol zu befriedigen vermag. Zählt man dazu ihre Farbenpracht, Liebenswürdigkeit und leichte Züchtbarkeit, so sind dies doch reiche Vorzüge. Mit gutem Recht und voller Sachkenntniß empfehle ich daher die körnerfressenden Vögel hier nochmals*) als die begünstigten und erklärten Lieblinge einer anspruchslosen Vogelliebhaberei. Dies ist übrigens nicht meine Meinung allein, sondern eine sehr verbreitete; denn keine andere Vogelgruppe erfreut sich in so ausgedehntem Maße der Bevorzugung von Seiten der Liebhaber, keine andere findet man so vielartig und vielköpfig in den Käfigen und keine bildet einen so wichtigen Gegenstand des Vogelhandels aus fremden Zonen, sowie zugleich des Vogelfangs in der Heimat, als die Finkenvögel.

Der einfachen Uebersicht wegen folge ich der Eintheilung in Prachtfinken, Widahfinken, Webervögel, Finken, Gimpel, Kernbeißer, Ammern und Lerchen. Alle Welttheile wetteifern darin, uns ihre prächtigen Finkenvögel zu senden; in der größten Anzahl und in den meisten Arten werden dieselben aus Afrika eingeführt, dann folgen die absonderlich schönen Finken Australiens, darauf erst die amerikanischen und ostindischen, welche hinter denen der beiden ersteren Welten bis jetzt noch an Zahl und Arten, doch keineswegs an Schönheit der einzelnen Vögel zurückbleiben.

Ebenso, wie die Finkenvögel über alle Gegenden der Erde, mit ganz geringen Ausnahmen, in großer Mannigfaltigkeit verbreitet sind, so bewohnen und beleben sie auch fast jede Oertlichkeit; man sieht sie sowol im Walde, als auch auf den Feldern, auf Hochgebirgen und in flachen Ebenen, und nicht minder in der Nähe der menschlichen Wohnungen, als in Einöden und Wüsten. Die meisten leben gesellig, wenigstens zu Zeiten des Wanderlebens, wenn sie ziehen oder streichen; manche nisten auch gesellschaftsweise beisammen. Die Zugvögel unter ihnen treten aber keine bedeutenden Reisen an, sondern schweifen selten bis in einen fremden Erdtheil hinüber. Mehrere sind Standvögel, welche allenfalls nur, von äußerster Kälte und Nahrungsmangel gedrängt, die Heimat für geringe Zeit und auf kurze Strecken verlassen.

Ihre Nahrung besteht in den verschiedensten Sämereien, Beeren und anderen Früchten, sowie auch in Pflanzentheilen, als Knospen, Blüten, Blättern, Wurzeln, Rindenstückchen u. dgl., und bei vielen, wie schon erwähnt, auch für gewöhnlich oder zeitweise in Kerbthieren und Würmern. Sie bedürfen im allgemeinen einer

*) Vrgl. „Handbuch für Vogelliebhaber", Band I. S. 265; Band II. S. 248.

viel geringeren Nahrungsmenge, als die Insektenfresser. Dagegen ist Wasser zum Trinken und Baden nicht allein eins ihrer wichtigsten Lebensbedürfnisse, sondern sie müssen es auch in weit reicherem Maße zu erlangen suchen; deshalb empfinden sie die Noth des Wassermangels ungleich eher und stärker, als jene.

Alle diese Verhältnisse des Freilebens der Vögel sind aber erklärlicherweise für die Haltung und Züchtung von der weitreichendsten Bedeutung.

Nur der Vogelwirth, welcher die Eigenthümlichkeiten jeder Familie und jeder Art durchaus genau kennt, wird nach denselben die naturgemäße und zweckentsprechende Behandlung seiner Vögel zu regeln wissen. Dies ist nicht blos in Betreff der Ernährung, Reinlichkeit und aller der Erfordernisse nothwendig, welche man gewöhnlich als die allgemeinen Bedingungen sorgsamer Vogelpflege begreift; um befriedigender Erfolge in der Vogelzucht sich zu erfreuen, ist es vielmehr auch geboten, daß man die übrigen Lebensverhältnisse der Vögel, soweit es eben ausführbar ist, nachahmend herzustellen sucht. In den Abschnitten, welche die Verpflegung und Zucht behandeln, komme ich hierauf noch eingehend zurück. Hier sei nur zunächst ganz besonderer Nachdruck auf den Hinweis gelegt, daß der Liebhaber nur dann seine Vögel vortrefflich gedeihen sehen und eben nur in dem Falle Ergebnisse in ihrer Züchtung erzielen kann, wenn er das volle Leben, alle Gewohnheiten und Bedürfnisse der betreffenden Arten kennt und berücksichtigt.

Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es also von vornherein erforderlich, daß ein wirkliches Lehr- und Handbuch der Vogelpflege auch die ganze Lebensweise der Vögel ins Auge faßt, wie dieselbe einerseits von den Forschern und Reisenden in den Heimatsländern erkundet und insofern sie andererseits durch aufmerksame Beobachtung in der Gefangenschaft festgestellt ist. Eine solche nach allen Seiten hin möglichst befriedigende Kunde der fremdländischen Vögel beabsichtige ich eben in diesem Werke zu bieten.

Die Finkenvögel beleben, wie bei uns, so auch in anderen Welttheilen, durch Farbenpracht, anmuthige Beweglichkeit und Gesang in gleicher Weise die Landschaft. Sie wohnen, d. h. nisten in den verschiedensten Oertlichkeiten; ebensowol am Waldesrande, in Hainen und Gärten, als auch tief im Hochwald und in flachen Ebenen, wie im Gebirge, in der Nähe, an und sogar in den menschlichen Wohnstätten. Viele erbauen frei auf den Zweigen stehende oder an denselben herabhängende Nester, welche nicht selten außerordentliche Kunstfertigkeit zeigen; nicht wenige von ihnen sind Höhlenbrüter. Das Gelege besteht in drei bis sechs, höchstens bis zehn verschiedenfarbigen Eiern und dieselben werden bei diesen von dem Weibchen allein erbrütet, während bei jenen beide Gatten des Pärchens im Brüten abwechseln; die Jungen werden gewöhnlich von beiden gemeinsam gefüttert. Zwei bis drei Bruten in jedem Jahre darf man

bei den meisten als Regel erachten und daher ist ihre Vermehrung eine ziemlich bedeutende.

Manche Finkenvögel sind in ihren Heimatsländern so überaus zahlreich, daß sie die Erträge der Ackerwirthschaft und des Gartenbaues gefährden, während andere auch wiederum durch die Vertilgung schädlicher Kerbthiere oder Unkrautsämereien für das Gedeihen unserer Nutzgewächse mehr oder minder nützlich sich zeigen. Die große Fruchtbarkeit vieler fremdländischen Finken ergiebt zugleich, daß sie in reicher Anzahl und zu mäßigen Preisen nach Europa herübergeführt und in den Handel gebracht werden; nicht wenige unter ihnen sind in anscheinend unerschöpflichen Schwärmen vorhanden, so daß ihre Einfuhr für allezeit als gesichert erscheint; dies ist namentlich bei den kleinsten und schönsten in Afrika der Fall.

Dennoch haben weitblickende Forscher und Reisende, welche die Verhältnisse durchaus kennen, die Befürchtung ausgesprochen, daß alle diese Vögel, nach dem Maßstabe des Fortschreitens der Kultur, in längerer oder kürzerer Frist ihrer Vernichtung und dem vollständigen Aussterben entgegengehen, wie dies ja bereits mit manchen anderen Thieren geschehen ist. Diese Annahme dürfte umsomehr begründet erscheinen, seitdem man den unschönen und keinenfalls werthvollen europäischen Sperling unvorsichtigerweise nach anderen Welttheilen geholt und ihm dort die Gelegenheit für eine nur zu üppige Ausbreitung — und Verdrängung der edleren Verwandten — geboten hat.

Gleichviel aber, mag jene Befürchtung sich, hoffentlich jedoch erst in sehr ferner Zeit, bewahrheiten oder nicht — immerhin wird der Freund der lieblichen Vogelwelt auch von dem Gesichtspunkte der möglichen Verringerung aus jenen Umstand mit großer Freude begrüßen, daß viele und besonders die kleineren überseeischen Finken auch in der Gefangenschaft eine große, zuweilen geradezu erstaunliche Vermehrungskraft entwickeln.

Die hierin begründete, zuweilen sehr einträgliche Züchtung solcher Vögel berechtigt zu der Erwartung, daß mehrere und sogar zu den schönsten und liebenswürdigsten Arten gehörende sich unschwer in unseren Käfigen und Vogelstuben dem Kanarienvogel gleich einbürgern lassen, so daß sie, ebenso wie jener gelbe Hausfreund, in den Besitz und die Pflege des Menschen übergehen. Eine Hauptaufgabe derartiger Versuche wird es dann aber sein, bei denselben Mißgriffe und Unnatürlichkeiten und damit die Ausartung und das allmälige Verkommen der Nachzucht zu vermeiden. In den späterhin folgenden Abschnitten, welche die Zucht der Stubenvögel behandeln, gelange ich auch zu den bezüglichen Maßnahmen.

Nur ganz beiläufig sei darauf hingewiesen, daß eine Anzahl fremdländischer Finkenvögel auch die Möglichkeit bietet, in unserer Heimat im Freien sich akklimatisiren zu lassen. Vor allen gehört hierher der bekannte nordamerikanische rothe Kardinal. Herr Dr. Max Schmidt, Direktor des zoologischen Gartens in

Frankfurt a. M., hat durch jahrelange Erfahrungen festgestellt, daß sogar afrikanische Webervögel in mehreren Arten dort den Winter hindurch draußen zu überdauern vermochten. Bei derartigen Versuchen kommen sodann folgende Gesichtspunkte zur Geltung. Einerseits die Möglichkeit der Einbürgerung überhaupt und andererseits der Werth der betreffenden Vogelart, sei es als Schmuckvogel für Wald, Flur und Garten, als Gegenstand des Jagdvergnügens oder als Vertilger schädlicher Thiere. Auch in Betreff der Akklimatisation der fremdländischen Finkenvögel werde ich im letzten Theile dieses Buches eine Uebersicht der bekannt gewordenen Versuche und etwaigen Erfolge geben. —

Alle Finkenvögel zeigen in der Nistzeit eigenthümliche Liebesspiele, welche in Gesang, Flugkünsten oder verschiedenen, sehr sonderbaren Geberden bestehen. Bei vielen hängen die Pärchen in innigster Zärtlichkeit aneinander und ihre Liebesbezeigungen, wie Schnäbeln, Füttern aus dem Kropfe, Krauen im Gefieder u. s. w., sind zuweilen unerschöpflich. Der aufmerksame Blick des vogelkundigen Liebhabers vermag nicht selten bereits an diesen Aeußerungen ihres Liebeslebens zu erkennen, zu welcher Gruppe ein ihm sonst unbekanntes Vogelpärchen zu zählen ist. Daher erscheint es nothwendig zum gründlichen Kennenlernen der Vögel, auch auf diese Merkmale, welche hier nach andauernden Beobachtungen, sowol bei den Familien, als auch bei den einzelnen Arten angegeben sind, zu achten.

Der Gesang dieser Vögel ist, ebenso wie ihre Färbung, Lebensweise, Ernährung und ihr ganzes Wesen, mannigfaltig verschieden, und selbst bei den Nächstverwandten zeigt er sich sehr abweichend. Abgesehen von den Urtheilen der wenigen sachverständigen Kenner des Vogelgesanges, die es überhaupt giebt, wird bei allen anderen Liebhabern doch zweifellos gerade ihm gegenüber der persönliche Geschmack vorzugsweise zur Geltung kommen. Dies bewahrheitet nicht allein die Liebhaberei an den Vögeln in der Gefangenschaft, sondern es zeigt sich namentlich auch an den Urtheilen der Naturkundigen über den Gesang der Vögel im Freien. Wie sonderbar auseinandergehend und widersprechend sind z. B. die Schilderungen des Gesanges des vorhin erwähnten rothen Kardinals oder des wilden Kanarienvogels! Den ersteren nennt der Eine mit Begeisterung die Virginische Nachtigal, während der Andere ihn nur als einen Stümper bezeichnet u. s. w. Ein Ornithologe, dessen Urtheil wirklich in rechter Kenntniß der Vogelwelt begründet ist, wird daher den Streit, z. B. über den größeren Werth des Finkenschlags oder des Kardinalgesangs, für bedeutungslos und überflüssig erachten müssen.

Die Freude an manchen herrlichen Finken wird dem Liebhaber dadurch sehr verleidet, daß dieselben in der Gefangenschaft ihre lieblichen Farben verlieren; dies geschieht vornehmlich häufig mit dem Roth in allen Schattirungen und bekanntlich ebensowol bei den fremdländischen, als auch bei den einheimischen Vögeln. Mit voller Sicherheit sind die Ursachen dieses Farbenverlustes bis jetzt

noch nicht ermittelt worden; vielseitige Erfahrungen haben jedoch bereits mancherlei Anhaltspunkte ergeben, von denen aus sich vielleicht eine so zweckmäßige Behandlung dieser Vögel regeln läßt, daß dieselben auch in der Gefangenschaft in ihren schönsten Farben erhalten werden können. Bei jeder einzelnen der hierher gehörenden Vogelarten habe ich auch in dieser Hinsicht die mir mitgetheilten und eigene Erfahrungen angegeben.

Bei nachlässiger oder unzweckmäßiger Verpflegung sind die Finkenvögel im allgemeinen vielen Erkrankungen ausgesetzt; doch hat die Erfahrung längst festgestellt, daß dies bei den fremdländischen in viel geringerem Grade, als bei den einheimischen der Fall ist. Und daher muß doch wol selbst der oberflächliche Kenner die Vorliebe für die letzteren als ganz naturgemäß begründet erachten. Wenn diese Vögel, namentlich die anscheinend doch so zarten Prachtfinken, unter den ungünstigsten Verhältnissen die weite Reise aus ihren Heimatsländern hierher zu überstehen vermögen, wenn sie sich aus dem traurigen Zustande, in welchem sie meistens ankommen, überraschend bald erholen und durch eifriges Nisten beweisen, daß sie, trotz aller Entbehrungen und schlechter Behandlung, doch ihre volle Lebenskraft behalten haben; wenn sie dann nicht in scheinbarer, sondern wirklicher Anspruchslosigkeit viele Jahre hindurch gut ausdauern und sich durch zahlreiche Generationen züchten lassen, so sollte man doch wol einsehen, daß sie für die Stubenvögel-Liebhaberei geeigneter sind, als die meisten anderen Vögel.

Daher brauche ich die Finkenvögel wahrlich nicht weiter zu empfehlen; sie haben sich ja in den Käfigen und Vogelstuben vieler Tausende von Liebhabern durch die gesammte gebildete Welt verbreitet und eingebürgert. Wer sie noch verdrängen und anstatt ihrer die insektenfressenden Vögel ebenso verallgemeinern möchte — der gleicht jenem tapferen Kämpen, welcher den Kampf gegen die Windmühlenflügel nicht verschmähte.

Die Schmuck- oder Prachtfinken [Aeginthidae].*)

In neuerer Zeit hat sich die Liebhaberei in Deutschland, wie bereits erwähnt, ganz vorzugsweise dieser Gemeinschaft der kleinen Vögel zugewandt, welche man als die Prachtfinken zu bezeichnen pflegt. Ihre Reihen zeigen zweifellos auch die lieblichsten und liebenswürdigsten unter allen zu uns gelangenden fremdländischen Finkenvögeln.

Die Prachtfinken, welche den meisten unserer einheimischen Sperlingsvögel, namentlich aber den eigentlichen Finken sehr ähnlich sind, unterscheiden sich dennoch in sehr auffallender Weise von denselben.

Ihre Größe wechselt etwa von der des Goldhähnchens (c. $9{,}_5$ cm.; $3^2/_3$ Zoll) bis zu der eines Sperlings ($23{,}_5$—$24{,}_8$ cm.; 9—$9^1/_2$ Z.). Unter einander zeigen sie, trotz der Zusammengehörigkeit, doch mancherlei Verschiedenheiten. Der Schnabel weicht in Hinsicht seiner Dicke und mehr oder minder spitzen Form bei den einzelnen Arten sehr bedeutend ab; auch die Füße sind ungleich, bei einigen klein und zart, bei anderen kräftig und verhältnißmäßig groß. Mittellange Flügel mit zehn Schwungfedern, ein theils gerundeter, theils stufenförmig zugespitzter Schwanz und ein meistens sehr buntes, nur bei wenigen schlichtfarbiges, immer jedoch angenehm gefärbtes Gefieder bilden die übrigen äußeren Merkmale. Häufig sind die Männchen farbenprächtiger, als die Weibchen; bei manchen Arten erscheinen jedoch beide Geschlechter völlig gleich und sind dann nur an besonderen, bei jeder einzelnen Art angegebenen Kennzeichen zu erkennen.

Ein bemerkenswerthes Unterscheidungszeichen der Prachtfinken von anderen Finkenvögeln liegt darin, daß die Gatten eines Pärchens der ersteren sich nur schnäbeln und unter lebhaften Geberden gleichsam küssen, niemals aber wie diese sich gegenseitig aus dem Kropfe füttern. Sehr beliebt ist bei ihnen das gegenseitige Krauen im Gefieder, wobei der leidende Theil stets in behaglichster Weise das Köpfchen regungslos hinhält und dem Schnabel des Andern zuwendet.

Mit Ausnahme der Brützeit leben die meisten von ihnen sehr gesellig; man kann Hunderte und zwar gleichviel derselben oder verschiedener Arten in

*) Die Erklärung der deutschen und lateinischen Namen ist am Schlusse dieses Abschnitts nachzulesen.

den Käfigen der Vogelhändler dicht gedrängt sitzen sehen, wobei alle Augenblicke einer über den andern hinweghüpft, um an der andern Seite sich wieder anzuschmiegen.

Nicht minder bezeichnend ist das Familienleben. Eine solche Zärtlichkeit, als die, welche die Pärchen dieser kleinen Vögel zeigen, findet man kaum noch bei irgend welchen anderen Thieren. Inseparables oder Unzertrennliche hat man kleine Papageien genannt — doch noch viel inniger als diese hängen die Prachtfinken in den Pärchen aneinander; nur dann frißt der eine, wenn der andere ebenfalls zum Futter kommt, nur dann badet sich dieser, wenn auch jener im Wasser sitzt und auf dem Ruheplätzchen hocken beide so dicht gedrängt aneinander, als könnten sie gar nicht innig genug sich berühren. Ihre Ehe währt für das ganze Leben und unter vielen Hundert in einem Käfige befindlicher Prachtfinken kann man immer die zusammengehörenden Pärchen unterscheiden. Man kauft sie daher stets paarweise, da sie eben als die eigentlichen Unzertrennlichen betrachtet werden müssen. In einem Gesellschaftskäfig in großer Anzahl oder auch in einem kleinen Schmuckkäfig nur zu zweien beisammen, kann man sie aber auch in verschiedenen Arten oder gleichen Geschlechtern recht gut erhalten; sie sind dann nicht allein friedlich, sondern hängen fast ebenso innig aneinander, als die wirklichen und gleichartigen Pärchen. Ganz einsam bleiben sie jedoch für die Dauer nur selten am Leben.

Sobald die Nistzeit naht und zumal wenn ihnen wirklich Gelegenheit zur Brut geboten wird, hat die Geselligkeit und Verträglichkeit gewöhnlich ein Ende, indem eine hitzige Fehde der Männchen beginnt. Bei derselben handelt es sich weniger um Liebeseifersucht, als um die Wahl des günstigsten Nistplatzes, der Baustoffe für die Nester, sowie auch um das Futter u. dgl. Dennoch muß auch die Eifersucht wol ins Spiel kommen, denn man kann sich leicht davon überzeugen, daß gewöhnlich nur die Männchen gleicher oder nahe verwandter Arten einander bekämpfen, während ganz ungleichartige häufig auch in der Brutzeit friedlich beisammen leben und ungestört dicht nebeneinander nisten. Im allgemeinen wird die Behauptung wol zutreffend sein, daß zwei Vogelarten eine desto größere Feindschaft der Männchen zeigen, um so näher sie verwandt sind.

In Hinsicht des Gesanges läßt sich von diesen sonst so allerliebsten kleinen Vögeln leider nicht viel Rühmliches sagen. Einige, z. B. der Tigerfink, Karminfink, Schmetterlingsfink, lassen liebliche kleine Triller, eine melodische Strophe oder doch einen wohlklingenden Lockruf hören, allein von einer wirklichen Kunstfertigkeit kann keine Rede sein. Die meisten haben leise, langgezogene Töne, welche einförmig wie das Murmeln eines Bächleins beim Silberfasänchen, quitschend wie das Rad eines Karrens beim Bandfink, langgezogen, gleichsam bauch-

rednerisch beim Muskatvogel, schnurrend und spinnend bei den Elsterchen und Nonnen, dem Klingen kleiner Glöckchen ähnlich beim Reisvogel, wie die Laute einer Kindertrompete beim Zebrafink u. s. w. zu vernehmen sind. Fast sämmtliche Prachtfinken begleiten diese Laute oder doch die Liebesbewerbungen mit sehr sonderbaren Bewegungen, tanzartigem Aufundniederhüpfen u. dgl. Auf alle diese Eigenthümlichkeiten komme ich natürlich bei jedem einzelnen Vogel zurück.

Alle ohne Ausnahme bauen entweder überwölbte Nester mit seitlichem Einflug oder sie sind Höhlenbrüter. So mannigfaltig verschieden der Bau in der Anlage und Gestalt des Nestes sich aber auch bei den einzelnen Arten zeigt, immer läßt er auf den ersten Blick die allgemeinen, bezeichnenden Merkmale eines Prachtfinkennestes erkennen. Der Bandfink trägt eine kunstlose Unterlage aus Heuhalmen und Federn in einem Nistkasten zusammen; der Zebrafink schleppt entweder frei ins Gebüsch oder auch in eine Höhle allerlei grobes Genist und formt ein kunstloses Nest, an welchem die Kugelgestalt nur in Umrissen zu erkennen ist, das jedoch innen aus Federn und Haaren eine geglättete Mulde hat; der graue Astrild, das Orangebäckchen und der Amarantvogel formen aus dünnen biegsamen Halmen, Fasern und Fäden (besonders gern auch aus frischen Spargelzweigen) zierliche, kugelrunde und kunstvolle Nester, mit einem zirkelrunden, sehr engen Schlupfloch. Und zwischen diesen stufen sich nun in großer Mannigfaltigkeit die Nester aller übrigen ab.

Das Nest wird gewöhnlich in der Weise errichtet, daß das Männchen die Baustoffe herbeibringt und das Weibchen dieselben zum Kunstbau ordnet; zuweilen tragen auch beide Gatten des Pärchens die Fasern, Fäden, Halme u. dgl. ein und formen ebenso gemeinschaftlich das Nest. Sonderbar erscheint die Eigenthümlichkeit, daß manche Arten, z. B. der Schmetterlingsfink, auch während der Brut noch fortwährend an der Vervollkommnung des Nestes arbeiten, so daß namentlich das Männchen niemals zur Ablösung kommt, ohne einen Halm oder eine Feder mitzubringen.

Noch viel auffallender spricht für die Zusammengehörigkeit der Prachtfinken der Umstand, daß sie sämmtlich einfarbig weiße Eier legen. So verschiedenartig diese Eier in Hinsicht ihrer Größe und Form, sowie der Feinheit des Korns bei aufmerksamer Betrachtung auch erscheinen, so dürften die Abweichungen doch wol kaum ausreichend sein, um an denselben mit Sicherheit zu erkennen, von welcher Art ein solches Ei herstammt. Nur die Eier des Zebrafinken, welche zwar auch reinweiß sind, zeichnen sich durch einen bläulichen Schein aus.

Die Brutdauer beträgt bei den kleinsten Prachtfinken elf und bei den größten dreizehn Tage. In der Regel brüten beide Gatten eines Pärchens abwechselnd, nicht selten aber auch, insbesondere bei den kleinsten Arten, gemeinsam und unzertrennlich, so daß sie, ebenso wie für gewöhnlich, auch während der Brut immer

beisammen sind, zu derselben Zeit auf den Eiern sitzen, zum Futter und Wasser herunterkommen und wieder zugleich in das Nest hineinschlüpfen.

Die ganz kleinen Jungen gleichen denen anderer Finkenvögel. Für den geübten Blick sind sie bereits im frühesten Alter, einerseits an der Farbe des Nestflaums und andererseits an der Färbung der kleinen Drüsen, welche die Wachshaut zu beiden Seiten des Schnabels bildet, in den verschiedenen Arten sehr bestimmt von einander zu unterscheiden. Herrn Dr. Rey in Halle gebührt das Verdienst, auf diese verschiedene Farbe der Wachshautdrüsen zuerst hingewiesen zu haben.

In etwa 16—22 Tagen sind die Jungen so weit herangewachsen, daß sie flügge werden; bei vielen Arten sucht dann zur Nachtzeit die ganze Familie das Nest immer wieder auf, bei anderen aber übernachten die Jungen nach dem Ausfliegen niemals mehr im Nest. In etwa acht Tagen, während derer sie von beiden Alten noch immer gefüttert werden, sind sie völlig selbstständig und jene beginnen zum zweiten- oder drittenmale zu nisten. Jede Brut rundet sich, vom ersten Ei bis zum Flüggewerden der Jungen, fast regelmäßig auf vier bis fünf Wochen ab. In acht Monaten bis spätestens einem Jahre sind die jungen Vögel selber nistfähig; doch gehen die ersten Bruten, namentlich wenn sie bereits früher begonnen werden, fast immer zu Grunde.

Im Jugendkleide sind die Jungen nahezu aller Prachtfinken von den Alten durchaus verschieden, jedoch für den Kenner an ganz bestimmten Merkmalen als Angehörige dieser oder jener Art unschwer festzustellen. Man kann sich kaum etwas Hübscheres denken, als wenn z. B. ein Paar der buntfarbigen, rothgeschnäbelten Zebrafinken die Brut hervorführen, im einfarbig licht-mäusegrauen Gefieder, mit glänzend schwarzen Schnäbelchen.

Die Verfärbung aus diesem Jugendkleide zum Altersgefieder beginnt im allgemeinen schon in der dritten oder vierten Woche und ist in der Regel in der fünften bis achten Woche ganz vollendet; sie geht nicht durch eine Mauser, also den Wechsel und die Erneuerung des Gefieders vor sich, sondern dieselben, bleibenden Federn nehmen nur eine andere Färbung an. Die Beobachtung dieser Farbenveränderung ist vorzugsweise interessant. Beim jungen Karminfink oder Amarantvogel geht das fahle Graubraun allmälig immer mehr in reines Braun über; dann beginnt an der Brust oder an der Stirn hier und da eine Feder von der Spitze oder dem Grunde her sich glänzend dunkelroth zu färben, die Farbe verbreitet sich über die ganze Feder und in dieser Weise folgt an den verschiedensten Körpertheilen eine Feder der anderen, bis die farbigen immer zahlreicher werden und das Roth sich nach und nach über den ganzen Körper erstreckt. Sehr sonderbar sieht ein junger Karminfink in dem scheckigen Gefieder der noch unvollendeten Verfärbung aus. Bei dem jungen Zebrafink dunkelt der obere Theil

des Gefieders, während der untere heller wird; allmälig treten sodann sehr fein, doch immer bemerkbarer die Umrisse der verschiedenen Farben hervor: in der Mitte der Brust scheidet ein schwarzer Streif den schneeweiß werdenden Bauch von der schön hellgraubunten Brust, die gelben Bäckchen und die bunte Seitenzeichnung werden deutlicher, bis sie die vollen lebhaften Farben erlangen. Der Vorgang dieser Verfärbung vollendet sich keineswegs immer in einer bestimmten gleichwährenden Frist, sondern er erstreckt sich, jedenfalls von dem verschiedenartigen Ernährungszustande des Vogels bedingt, über einen sehr verschieden dauernden und wahrscheinlich nur in seinen äußersten Grenzen übereinstimmenden Zeitraum. Uebrigens hat die Verfärbung der jungen Prachtfinken in ihrem Vorgange große Aehnlichkeit mit der, durch welche sich die Webervögel und Widahfinken auszeichnen. Bei jeder einzelnen Art werde ich den Vorgang noch näher beschreiben.

Auch in ihrem Verhalten unterscheiden sich die jungen Prachtfinken von denen aller übrigen Finkenvögel. Beim Futterempfangen oder Erbetteln rütteln sie keineswegs die Flügel wie jene, oder hüpfen in ungeschickten Sprüngen hinter den Alten her; mäuschenflink und gewandt, vom Verlassen des Nestes an, läuft der junge Zebrafink, allerdings auch unter großem Geschrei, auf das alte Männchen oder Weibchen zu, trippelt dann ebenso hurtig mehrere Schritte schnurgerade rückwärts, legt nun den Kopf schräge seitwärts gerichtet auf den Boden und sperrt das emporgehaltene Schnäbelchen schreiend auf, bis er die Nahrung empfängt. Doch ist dies Benehmen nicht immer übereinstimmend, und ich muß es mir ebenfalls vorbehalten, dasselbe bei den einzelnen Vögeln zu schildern.

Viele Prachtfinken sind gegen Kälte und Nässe außerordentlich empfindlich, so daß man im Freien, selbst bei Schutz gegen die rauhen Nord- und Ostwinde, doch nur wenige Arten dauernd erhalten kann. Die erste Folge ungünstiger Witterungseinflüsse, oft sogar der nur um wenige Grade sinkenden Wärme, ist das Erkranken der Weibchen beim Eierlegen. Am zuträglichsten habe ich es gefunden, daß man die Wärme, zumal während der Brut, nicht viel unter 15 Grad R. (20 Grad C.) fallen und nicht über 22 Grad R. steigen lassen darf. Hiernach sind die Prachtfinken also bei gewöhnlicher Stubenwärme gut zu erhalten und auch glücklich zum Nisten zu bringen. Eine Anzahl zarterer Arten machen jedoch eine Ausnahme, indem ihre Bruten stets umkommen und die Weibchen fast regelmäßig sterben, wenn die Wärme nicht um einige Grade erhöht und zeitweiliges starkes Schwanken vermieden wird. Einige Züchter sollen guter Erfolge mit kleinen zarten Prachtfinken, z. B. dem Amarantvogel, sich erfreut haben, in einem ungeheizten Raume und zu einer Zeit, welche des Morgens eine Eiskruste in den Wassergeschirren zeigte. Ich habe alle solche Ver-

öffentlichungen sorgfältig gesammelt und werde sie bei den einzelnen Arten mittheilen.*)

Wenn man die allgemeinen Regeln der Vogelpflege nicht außer Acht läßt und diese Vögel einerseits besonders gegen Kälte, Nässe und Zugluft behütet, sie andererseits in geeigneter Oertlichkeit mit passenden Niststoffen versorgt, so kann man sie viele Jahre hindurch munter und gesund im Käfige erhalten und züchten. Die meisten Arten zeigen sich recht ausdauernd, natürlich nur dann, wenn sie von den Anstrengungen der Reise sich erholt haben und lebensfähig in die Hand des Besitzers gelangt sind.

Dabei beschränkt sich die Verpflegung in Hinsicht der Mühe und Kosten auf ein außerordentliches Geringes; ungeschälte weiße Hirse und Kanariensamen oder Glanz zum Futter, stets reines frisches Wasser zum Trinken und möglichst oft auch zum Baden, trockener sauberer Stubensand auf dem Boden des Käfigs, nebst Sepienschale und täglich oder mindestens hin und wieder ein wenig Grünkraut (am besten Vogelmiere, Alsine media) — das sind die Bedürfnisse, deren sorgsame Befriedigung in Verbindung mit der erforderlichen Reinlichkeit für die meisten Prachtfinken als völlig ausreichend erscheint. Senegal- oder Kolbenhirse, sowie andere südeuropäische und überseeische Hirsearten sind ihnen zur Abwechselung dienlich und werden gern verzehrt. Auch allerlei kleine Grassämereien, den Samen von Wegerich (Plantago major), Melde (Atriplex patula et A. hortensis) und anderen als unschädlich bekannten Gewächsen darf man natürlich den Vögelchen anbieten und Manches davon, namentlich die noch weichen, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehenden Gräsersamen fressen sie sehr gern.**) Zur Zeit des Nistens gehören zur zweckmäßigen Verpflegung der Prachtfinken noch einige weitere, jedoch ebenfalls nur geringe Erfordernisse; frische Ameisenpuppen und zerschnittene Mehlwürmer in der warmen Jahreszeit, aufgequellte Ameisenpuppen mit Eierbrot oder hartgekochtem Eigelb im Winter, sodann jederzeit eingequellte Sämereien sind zur Auffütterung der Jungen nothwendig. (Vrgl. die Abschnitte über Fütterung und Pflege.)

---

*) Herr Graf Yorck von Wartenburg, in dessen Vogelstube die kleineren und zartesten Prachtfinken sämmtlich vorzugsweise eifrig und mit den besten Erfolgen genistet haben, hält beständig einen sehr hohen Wärmegrad. Somit ist es mir möglich, die bezüglichen jahrelangen verschiedenartigsten Erfahrungen übersichtlich zusammenzustellen. (Vrgl. den Abschnitt über die Züchtung.)

**) Bedenklich erscheint es dagegen, wenn Jemand das sogenannte Scheuergesäme für die Prachtfinken zur Fütterung empfiehlt. Einerseits weiß jeder Sachverständige, daß unter diesen Unkrautsamen zahlreiche vorhanden sind, welche giftige oder doch scharfe Bestandtheile enthalten; andererseits wird jeder Vogelwirth, selbst wenn er im guten Glauben auf solche Rathschläge den Versuch wagen sollte, sich doch bald davon überzeugen, daß diese Samen von den Vögeln gar nicht berührt werden. Daher ist es um so verwunderlicher, daß die Empfehlung des Scheuergesämes in manchen Lehrbüchern der Vogelpflege sich immer wiederholt, ohne daß die Verfasser selber oder deren Freunde diese Fütterung jemals versucht haben.

Eine Aufforderung, den Prachtfinken noch größere Aufmerksamkeit zu schenken und für ihre immer weitere Verbreitung Sorge zu tragen, dürfte wol überflüssig sein. Gerade ihre Vorzüge sind bereits viel mehr gewürdigt, als die aller übrigen Finkenvögel. Nicht allein die Farbenmannigfaltigkeit und Schönheit ihres Gefieders, die Anmuth ihrer Bewegungen, ihr harmloses und zutrauliches Wesen haben ihnen unter den Vogelliebhabern zahllose Freunde erworben, sondern namentlich auch die Eigenthümlichkeit, daß sie so ungemein leicht ein liebliches Familienbild vor den Augen ihres Pflegers entfalten. Auch haben die deutschen Vogelzüchter bereits längst dafür Beweise geliefert, daß die Zucht mancher Arten, falls man sie unter günstigen Verhältnissen und mit dem nöthigen Verständniß, der richtigen Auswahl, geeigneter Pflege u. s. w. betreibt, sehr lohnend sein kann. Obwol die Prachtfinken wenn möglich an der Brutzeit ihrer verschiedenen Heimatsländer festhalten und also dann in unseren Herbst- und Wintermonaten zur Brut schreiten, so sind sie doch auch unschwer an das Nisten im Frühlinge zu gewöhnen. Dies hat die Züchtung vieler Vogelfreunde übereinstimmend durch zahlreiche Erfolge zu jeder Jahreszeit festgestellt und ferner, daß viele Arten ebenso im kleinen Käfige, als freifliegend in der Vogelstube mit nahezu gleichen guten Ergebnissen hecken. Die Erfahrung hat sodann auch gezeigt, welche von diesen Vögeln leicht und sicher, welche schwieriger und welche kaum oder gar nicht zu züchten sind. Alle diese Eigenthümlichkeiten werden bei jeder einzelnen Art und auch in dem Abschnitt über Züchtung hier erörtert.

Von dem Freileben der Prachtfinken ist im allgemeinen bis jetzt erst sehr wenig bekannt, denn viele Arten haben, außer dem Namen und der wissenschaftlichen Feststellung, noch keinerlei weitere Auskunft geboten, und daher zeigt sich die seltsame Erscheinung, daß manche von diesen Stubenvögeln in Hinsicht ihrer Lebensweise, Brutentwickelung und vieler anderen Eigenschaften in der Gefangenschaft bereits eingehend erkundet sind, während man über ihr Leben in der Heimat noch keinerlei Auskunft erhalten hat. Andere Arten sind allerdings mehr oder minder eingehend durch Naturforscher und Reisende in ihrer Lebensweise geschildert worden.

Nach deren Angaben halten sich die meisten Prachtfinken vorzugsweise in Grasebenen, im Hochgras oder im niedrigen und dichten Gebüsch, vielfach auch in der Nähe von Getreidefeldern und manche auch in Rohr- und Schilfdickichten auf. Ihre Nahrung besteht in den Sämereien der verschiedensten Gräser. Fast alle, mit nur wenigen Ausnahmen, verzehren aber auch kleine weiche Kerbthiere und deren Larven. (Dies ist namentlich in der Gefangenschaft von den einzelnen Arten festgestellt und muß bei der Verpflegung, insbesondere aber bei der Züchtung sorgsam beachtet werden.) Während der Nistzeit leben sie in kleinen Flügen

Eine Aufforderung, den Prachtfinken noch größere Aufmerksamkeit zu schenken und für ihre immer weitere Verbreitung Sorge zu tragen, dürfte wol überflüssig sein. Gerade ihre Vorzüge sind bereits viel mehr gewürdigt, als die aller übrigen Finkenvögel. Nicht allein die Farbenmannigfaltigkeit und Schönheit ihres Gefieders, die Anmuth ihrer Bewegungen, ihr harmloses und zutrauliches Wesen haben ihnen unter den Vogelliebhabern zahllose Freunde erworben, sondern namentlich auch die Eigenthümlichkeit, daß sie so ungemein leicht ein liebliches Familienbild vor den Augen ihres Pflegers entfalten. Auch haben die deutschen Vogelzüchter bereits längst dafür Beweise geliefert, daß die Zucht mancher Arten, falls man sie unter günstigen Verhältnissen und mit dem nöthigen Verständniß, der richtigen Auswahl, geeigneter Pflege u. s. w. betreibt, sehr lohnend sein kann. Obwol die Prachtfinken wenn möglich an der Brutzeit ihrer verschiedenen Heimatsländer festhalten und also dann in unseren Herbst- und Wintermonaten zur Brut schreiten, so sind sie doch auch unschwer an das Nisten im Frühlinge zu gewöhnen. Dies hat die Züchtung vieler Vogelfreunde übereinstimmend durch zahlreiche Erfolge zu jeder Jahreszeit festgestellt und ferner, daß viele Arten ebenso im kleinen Käfige, als freifliegend in der Vogelstube mit nahezu gleichen guten Ergebnissen hecken. Die Erfahrung hat sodann auch gezeigt, welche von diesen Vögeln leicht und sicher, welche schwieriger und welche kaum oder gar nicht zu züchten sind. Alle diese Eigenthümlichkeiten werden bei jeder einzelnen Art und auch in dem Abschnitt über Züchtung hier erörtert.

Von dem Freileben der Prachtfinken ist im allgemeinen bis jetzt erst sehr wenig bekannt, denn viele Arten haben, außer dem Namen und der wissenschaftlichen Feststellung, noch keinerlei weitere Auskunft geboten, und daher zeigt sich die seltsame Erscheinung, daß manche von diesen Stubenvögeln in Hinsicht ihrer Lebensweise, Brutentwickelung und vieler anderen Eigenschaften in der Gefangenschaft bereits eingehend erkundet sind, während man über ihr Leben in der Heimat noch keinerlei Auskunft erhalten hat. Andere Arten sind allerdings mehr oder minder eingehend durch Naturforscher und Reisende in ihrer Lebensweise geschildert worden.

Nach deren Angaben halten sich die meisten Prachtfinken vorzugsweise in Grasebenen, im Hochgras oder im niedrigen und dichten Gebüsch, vielfach auch in der Nähe von Getreidefeldern und manche auch in Rohr- und Schilfdickichten auf. Ihre Nahrung besteht in den Sämereien der verschiedensten Gräser. Fast alle, mit nur wenigen Ausnahmen, verzehren aber auch kleine weiche Kerbthiere und deren Larven. (Dies ist namentlich in der Gefangenschaft von den einzelnen Arten festgestellt und muß bei der Verpflegung, insbesondere aber bei der Züchtung sorgsam beachtet werden.) Während der Nistzeit leben sie in kleinen Flügen

oder Familien von zwei bis etwa acht Köpfen beisammen, und erst nach Beendigung des Nistens sammeln sie sich, gleich unsern Finkenvögeln, zu mehr oder minder großen Scharen an, welche dann wol in die Getreidefelder einfallen und erheblichen Schaden anrichten. Um sie, z. B. die Reisvögel, davon abzuhalten, daß sie überaus große Verheerungen verursachen, bedient man sich eigener Vorrichtungen zur Verscheuchung; doch tödtet man diese Vögel nirgends. Ebenso werden sie nur verhältnißmäßig selten in ihren Heimatsländern als Käfigvögel gehalten (z. B. der Tigerfink, den man in Ostindien seitaltersher sogar zu Kampfspielen abrichtete); meistens ist man jedoch gleichgültig gegen die reizenden Vögelchen und nicht selten sind sie erklärlicherweise sogar sehr verhaßt. Außer den Vogelfängern, welche ihren Schwärmen allerdings durch massenhaftes Einfangen großen Abbruch thun, werden sie auch noch von den Feinden aller übrigen kleinen Vögel, den Raubvögeln und Raubsäugethieren verfolgt und die Schlangen sollen nicht selten ihre Nester zerstören.

Die Heimat der Prachtfinken erstreckt sich nur auf die drei Erdtheile Afrika, Asien und Australien; weder in Amerika noch in Europa ist bis jetzt eine zu ihnen gehörende Art freilebend gefunden.

In sehr bedeutender, im Laufe der Zeit immer zunehmender Anzahl werden sie nach Europa eingeführt. Der Fang geschieht vorzugsweise mit großen Netzen bei der Tränke, und ich werde das verschiedene Verfahren desselben nach den Mittheilungen zuverlässiger Reisenden schildern. Die kleinen afrikanischen Prachtfinken, welche in Hinsicht der Kopf-, aber nicht der Artenzahl, am meisten die Käfige der Händler bevölkern, werden insgesammt als Senegalisten oder Senegalvögel, auch fälschlich Bengalisten (richtiger Bengueliſten) in den Handel gebracht und von den Großhändlern gewöhnlich zu je einhundert Pärchen mehrerer Arten untereinander an die Händler zweiter Hand abgesetzt. Die Prachtfinken Asiens, unter denen die meisten dickschnäbeligen, die sogenannten Nonnen u. a., sind viel weniger zahlreich; die australischen Prachtfinken, welche in vielen und besonders buntfarbigen Arten zu uns gelangen, kommen ebenfalls immer nur in geringerer Anzahl in den Handel. Manche Arten bleiben zuweilen längere Zeit, wol jahrelang, von dem europäischen Vogelmarkt fort und tauchen dann plötzlich wieder auf. Die verschiedenen Verhältnisse dieser Einfuhr sind in dem Abschnitt über den Vogelhandel zu finden.

Die Preise wechseln im allgemeinen von $1\frac{1}{2}$—6 Thaler für das Pärchen; seltene, namentlich schöne australische Arten sind noch so theuer, daß man sie wol mit 25, 35, 50—100 Francs bezahlt. Der Durchschnittspreis der beliebtesten Prachtfinken beträgt 3—4 Thaler für das Pärchen.

Gerade die Prachtfinken gehören zu den Vögeln, welche bereits seit sehr langer Zeit und in großer Anzahl in Frankreich, England und den Niederlanden

und dann auch in Deutschland eingeführt wurden. Schon vor länger als hundert Jahren waren sie in den Vogelhäusern wohlhabender französischer Liebhaber zahlreich zu finden und gerade sie wurden am meisten von reichen Holländern in sehr zweckmäßig, unsern neueren Gewächshäusern ähnlich eingerichteten Vogelkäfigen bereits gezüchtet. In einem später folgenden Abschnitt werde ich auf diese geschichtliche Seite der Vogelliebhaberei auch in Betreff der Prachtfinken ebenfalls zurückkommen. —

Zur leichten Auffindung eines Vogels und zum ausreichenden Kennenlernen ist eine zweckmäßige Eintheilung der Gruppen, Familien, Sippen und Arten durchaus erforderlich. Eine solche zu geben, ist freilich auf keinem Gebiete schwieriger, als in der Ornithologie, die bekanntlich in dieser Hinsicht ganz besonders krankt. In einem Werke aber, welches sich die allverständliche und wissenschaftliche Beschreibung zugleich zur Aufgabe gemacht, ist eine zweckmäßige Uebersicht vorzugsweise nothwendig.

Nach Reichenbach wurden die fremdländischen Finkenvögel unter der Bezeichnung Webefinken in eine große Gruppe zusammengefaßt, und diese in Prachtfinken, Witwenvögel oder Widahfinken und Webervögel eingetheilt. Seitdem man aber die ganze Familie der Finkenvögel viel einfacher in einzelne große Unterfamilien scheidet (vrgl. S. 13), erscheint die Reichenbach'sche Zusammenstellung um so mehr überflüssig, da dieselbe von vornherein den Uebelstand zeigte, daß den als Webefinken vereinigten Vögeln die innere Uebereinstimmung einheitlicher Merkmale doch eigentlich völlig mangelte. Somit darf ich hier die Prachtfinken ganz gesondert für sich als Unterfamilie innerhalb der großen Gemeinschaft der Finkenvögel hinstellen.

Auch die Eintheilung der Prachtfinken an sich ist wiederum nicht leicht auszuführen. In mannigfaltiger Weise hat man es versucht, sie in übersichtlichen Gruppen aneinander zu reihen; so wollte man sie in Streifenfinken, Kappenfinken, Gürtelfinken, Grasfinken, Rothschnäbelchen und andere, mehr oder minder wissenschaftlich begründete Sippen und Untersippen scheiden. Abgesehen aber von der doch immerhin zweifelhaften Berechtigung solcher Aufstellungen, erscheinen dieselben hier nicht allein überflüssig, sondern auch bedenklich, weil einerseits durch solche Zersplitterungen das Kennenlernen der Vögel sehr erschwert wird und weil andererseits die Merkmale solcher Scheidungen doch immer nur in den Anschauungen des Einzelnen beruhen, so daß also jeder Vogelkundige von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus seine besondere, von der des Andern völlig abweichende Eintheilung macht. Bevor es also ein befriedigendes, von allen Ornithologen übereinstimmend anerkanntes System der Vogelkunde giebt, sollten in den Schriften, welche vorzugsweise für die weitesten Kreise der Liebhaber und praktischen Züchter bestimmt sind, alle Zersplitterungen, als die Ursachen nur zu

nahe liegender Verwirrungen, sorgfältig vermieden werden — und dies ist eben nur dadurch zu erreichen, daß man eine so einfache Uebersicht als möglich wählt.

Deshalb scheide ich die ganze große Gemeinschaft der Prachtfinken nur in zwei Gruppen, bei denen als Kennzeichen die Gestalt der Schnäbel maßgebend ist, und zwar in 1) die Schwach- und Kleinschnäbeligen und 2) die Stark- und Großschnäbeligen. Diese Eintheilung ist ja bekanntlich schon früher mehrfach eingeführt und hat sich dann im allgemeinen Gebrauch der Liebhaber und Händler und selbst theilweise in der wissenschaftlichen Literatur eingebürgert. Dennoch werde ich auf die Merkmale der allgemein anerkannten Gattungen ebenfalls eingehen, jedoch nur soweit, als dies zur Kenntniß der Vögel für gebildete Liebhaber wünschenswerth oder nothwendig erscheint. In Betreff der einzelnen Arten ist übrigens ganz besondere Vorsicht erforderlich, denn die Verschiedenheiten der Gefiederfärbung sind zuweilen sehr auffallend und stellen sich schließlich doch nur als Altersunterschiede oder allenfalls als Lokal-Eigenthümlichkeiten ein und derselben Art heraus.

Die bisher gangbaren lateinischen Namen sind zum Theil hinfällig geworden; so z. B. die Bezeichnung Amadina*), welche in den letzteren Jahren für die Prachtfinken im allgemeinen fast überall gebräuchlich war. Dies Wort entbehrt von vornherein jedes wissenschaftlichen Werthes und daher bin ich, in Uebereinstimmung mit meinen Herren Mitarbeitern, zu dem Entschluß gelangt, dasselbe und ebenso auch die lateinische Bezeichnung Astrilda für eine große Vogelgruppe ganz fallen zu lassen. An Stelle derselben wählten wir nach reiflichster Erwägung andere, passende und korrekte Benennungen; meine Leser wollen nun also die Eintheilung der hierher gehörenden Vögel in folgender Weise beachten:

Schmuck- oder Prachtfinken (bisher Amadinae), Aeginthidae;

Schwach- und kleinschnäbelige Prachtfinken oder Astrilde**), Aeginthinae;

Stark- und großschnäbelige Prachtfinken oder Spermestinen (bisher Amadinen), Spermestinae.

Hiernach nenne ich also jeden klein- und schwachschnäbeligen Prachtfink Aegintha***) und jeden stark- und großschnäbeligen Prachtfink Spermestes.†) —

*) Amadina, *Swainson*, soll vielleicht von amare (lieben) abgeleitet sein; es ist jedoch durchaus sinnlos.

**) Die von dem vaterländischen Namen eines Vogels herrührende Benennung Astrild muß in der Mehrzahl Astrilde und nicht, wie fälschlich allgemein eingebürgert, Astrilden heißen.

***) Aegintha, *Cabanis*. Dies schöne aristotelische Wort eignet sich vortrefflich zur Benennung der ganzen Gemeinschaft, da es ohne besondere Nebenbedeutung einen kleinen, in Hecken, Gebüschen u. dgl. lebenden Vogel bezeichnet, auch Gelegenheit bietet, dem großen Altmeister unserer Wissenschaft verdiente Ehre zu erweisen.

†) Spermestes *Sws.* Das Wort σπερμα bedeutet Samen. Die Endung εστης hat den Werth einer sogen. Personalbezeichnung. Spermestes ist also ein Vogel, der vorzugsweise Samen liebt, —

Zum Einkaufe bei den Vogelhändlern bediene man sich des deutschen Namens, welchen ich als den gangbarsten oder passendsten in der Ueberschrift angegeben; aus den zoologischen Gärten und ähnlichen Anstalten bezieht man unter dem danebenstehenden lateinischen Namen. Beim Gebrauch dieses letzteren bitte ich aber recht sorgfältig auf die zweite Bezeichnung zu achten, wie dies in der wissenschaftlichen Anwendung ebenfalls geschieht, so daß man häufig nur diese allein zur Nennung eines Vogels benutzt, so z. B. minima (Aegintha seu Lagonosticta) der Karminfink oder Amarantvogel, astrild (Aegintha s. Habropyga) das Helenafasänchen oder der gewellte Astrild, guttata (Spermestes s. Stagonopleura) der Diamantvogel oder Tropfenfink.

Während sämmtliche Prachtfinken von den übrigen Finkenvögeln durch ganz bestimmte und nicht leicht zu übersehende Eigenthümlichkeiten, wie z. B. die reinweißen Eier sich unterscheiden, so ist dagegen ihre Trennung in Astrilde und Spermestinen leider keine durchaus verläßliche. Denn das Unterscheidungsmerkmal der Schnäbel ist nur dahin zu fassen, daß man an sich sehr verschieden geschnäbelte, einerseits schwach- und kleinschnäbelige und andererseits stark- und großschnäbelige Prachtfinken als zwei von einander unterscheidbare Gemeinschaften trennen kann. Wo aber läßt sich eine sichere Grenze in der Größe und Dicke dieser verschiedenen Schnabelformen auffinden? Bestimmter, wenigstens für eine oberflächliche Unterscheidung, könnte man allenfalls die geringere Körpergröße der Astrilde erachten.

Dennoch kommen, freilich nur bei aufmerksamster Beobachtung, gewisse Unterschiede ganz bedeutsam zur Geltung. Die im Körperbau, also in der weiteren Gestaltung der Schnäbel, des Gefieders, besonders in der Länge und Form der Schwänze u. s. w. sich ergebenden Abweichungen werde ich bei der Darstellung jeder dieser beiden Hauptgruppen noch besonders anführen. Hier sei zunächst nur auf gewisse Unterschiede hingewiesen, welche sich im Verhalten und in der Lebensweise dieser Vögel zeigen.

Jeder starkschnäbelige Prachtfink erscheint im Verhältniß zu seinen schwachschnäbeligen Verwandten in mehrfacher Hinsicht im Nachtheil. Zunächst fällt der Mangel an Zierlichkeit und Anmuth auf, welcher in der bei weitem geringeren Beweglichkeit begründet ist. Während der kleinere Prachtfink in jeder Schwanzbewegung, im Fluge und Hüpfen, wie in jeder Verrichtung überhaupt unnachahmlich schön ist — erscheint der größere Prachtfink in allem durchaus plump und ungeschickt. Dazu kommt, daß, wie schon erwähnt, ein wirklicher Gesang den Starkschnäbeln nicht allein fehlt, sondern daß ihre Laute auch, mindestens für das durch die Lieder guter Sänger verwöhnte Ohr, nicht immer angenehm und harmonisch ertönen, während die Kleinschnäbelchen wenigstens einen melodisch erklingenden, wenn auch noch so kleinen Sang hören lassen. Dagegen ist das

Singen der Spermestinen, gleich den dasselbe begleitenden Bewegungen, in viel höherem Grade komisch. Sodann treten auch Verschiedenheiten im Nestbau, in den Zärtlichkeitsbezeigungen der beiden Gatten eines Pärchens, in der Ernährung u. s. w. sehr bemerkbar hervor.

Die Astrilde

oder klein- und schwachschnäbeligen Prachtfinken.

Die kleinsten Prachtfinken oder Astrilde wechseln in der Größe von 10 cm. (3 Zoll) bis 13 cm. (5¼ Z.) Länge und einige von ihnen erscheinen daher fast noch kleiner, als das europäische Goldhähnchen. Ihre Kennzeichen sind: schlanke Gestalt, zartes und weiches, lebhaft oder doch angenehm gefärbtes Gefieder, mittellange, mehr oder minder gerundete Flügel, in denen die zweite, dritte oder vierte Schwinge wechselnd die längste ist; ein meistens langer, stufig gesteigerter oder keilförmiger, seltener kurzer, gerundeter oder gerade abgeschnittener Schwanz; ein gestreckter, kleiner und dünner, glänzender und bei vielen rother Schnabel, verhältnißmäßig hohe, zarte Füße mit kurzen Zehen. Die Färbung der Geschlechter ist theils von einander abweichend, theils aber auch völlig oder doch nahezu übereinstimmend.

Mit Entzücken erzählen die Reisenden von der anmuthigen Belebung mancher Landschaften gerade durch diese kleinen Finken — und nicht minder schwärmen viele Vogelfreunde von der Schönheit und Liebenswürdigkeit dieser ihrer kleinen Lieblinge im Käfige.

In der That sind diese Kleinschnäbelchen von vornherein als die beliebtesten aller Stubenvögel zu erachten. Sie zeichnen sich aber auch durch viele empfehlenswerthe Eigenschaften vor anderen aus. Ihre geringe Größe, Farbenschönheit, lebhafte Beweglichkeit, Friedlichkeit, Geselligkeit und gegenseitige Zärtlichkeit, ihre Anspruchslosigkeit und Ausdauer lassen sie dem Liebhaber, der nicht die höchsten Ansprüche macht, vorzugsweise lieb und werth erscheinen. Dazu kommen aber noch einige geschätzte Eigenthümlichkeiten, und zwar ihr kleiner, munterer Sang, welcher wenigstens niemals lästig werden kann; ferner zeigen sie sich immer schmuck und glatt im Gefieder und die meisten von ihnen entwickeln unschwer vor unsern Augen ein liebliches Familienbild. Schließlich können gerade diese Vögelchen nicht leicht langweilig und überdrüssig werden, da jeder einzelne oder doch jedes Pärchen für den Blick des aufmerksamen und verständnißvollen Beobachters ganz entschieden hervortretende persönliche Eigenthümlichkeiten zeigt.

Während des Nistens steigert sich die Lebhaftigkeit der Schwachschnäbelchen ganz außerordentlich und die Männchen der gleichen oder auch verschiedener Arten

beginnen dann wol eine lebhafte Fehde. Diese hindert jedoch nicht, daß mehrere Pärchen in der Vogelstube und selbst in einem geräumigen Käfige unweit von einander ihre Bruten mit besten Erfolgen aufbringen; eigentlich gesellig neben einander, wie z. B. die Webervögel, nisten sie jedoch nicht. Die Männchen der Astrilde zeigen das wunderliche Tänzeln der Prachtfinken in besonders anmuthiger Weise und während sie die Eigenthümlichkeit gemeinsam haben, daß sie bei diesem Liebestanze ein Hälmchen oder eine Faser im Schnabel tragen*), so sind doch ihre Bewegungen bei demselben sehr verschiedenartig, wie ich dies bei jeder einzelnen Art näher schildern werde.

Sie erbauen sämmtlich sehr zierliche, runde oder länglichrunde, nur selten beutelförmige Nester aus Grashalmen, Bast, verschiedenen Fäden und namentlich gern aus Agavefasern oder Pferdehaaren und frischen Spargelzweigen. Manche verschmähen Baumwollflöckchen und polstern die Nisthöhle nur mit weichen Federn aus. Das Schlupfloch zum Nest ist immer zierlich rund, sehr eng und zuweilen ganz versteckt. Einige Arten wechseln auch in der Gestalt der Nester und tragen zuweilen thurmartige hohe Haufen zusammen, auf deren Spitze dann die Mulde geformt wird; so z. B. das Grauvögelchen (der Astrild), welches sonst in der Regel ein sehr künstliches Nest herrichtet. Bei fast allen Kleinschnäbelchen bemerkt man namentlich jene sonderbare Eigenthümlichkeit, daß das zur Brutablösung kommende Männchen fast immer noch einen Halm, eine Feder oder dergleichen mitbringt.

Viele Arten entwickeln bei guter Pflege eine geradezu überraschende Fruchtbarkeit; man hat fünfzig, ja viel über hundert Eier von einem Pärchen gezählt, und ich werde bei den einzelnen Vögeln von zuverlässigen Beobachtern mitgetheilte Beispiele anführen, welche wahrhaft staunenswerth erscheinen. Einige Kleinschnäbelchen nisten in der Gefangenschaft sehr ergiebig und sicher, andere sind nur unter günstigen Verhältnissen mit Erfolg zu züchten und schließlich giebt es einige, denen man bis jetzt noch nicht die nothwendigen Erfordernisse zu bieten vermag, welche sie zur gedeihlichen Brut befähigen. Dies verschiedenartige Verhalten werde ich bei jeder einzelnen Art und außerdem auch in dem Abschnitt über Züchtung nach den bis jetzt festgestellten Erfahrungen angeben. Hier sei nur zunächst noch darauf hingewiesen, daß eigentlich alle kleinschnäbeligen Prachtfinken in der Gefangenschaft unschwer zur Brut schreiten, daß aber bei vielen oder eigentlich leider bei den meisten Arten die günstigen Verhältnisse und besonders die zum Auffüttern der Jungen nothwendige Nahrung noch nicht ausreichend ermittelt ist.

In Betreff des Futters verweise ich hier einerseits auf das bei den Prachtfinken im allgemeinen Gesagte und andererseits auf den Abschnitt über die Fütterung überhaupt. Man übersehe nur nicht, daß diese kleinen Prachtfinken auch

*) Vieillot sagte: wie einen Türkensäbel schwingen.

außer der Nistzeit Mehlwürmer, Ameisenpuppen oder dergleichen Fleischnahrung bedürfen. Neuerdings haben namentlich die Züchter, welche Versuche im Großen betreiben, mancherlei Nahrungsmittel gerade diesen Vögeln angeboten, und da sind denn auch bereits interessante und vielversprechende Ergebnisse festgestellt worden, so z. B. die Fütterung mit Maden, die Zugabe von kleinen, besonders noch nicht völlig reifen Grassämereien, die Darreichung des Gemisches aus hartgekochtem Eigelb oder Eierbrot mit Ameisenpuppen u. s. w. Alle derartigen Erfahrungen, soweit sie für die Züchtung der Vögel überhaupt beachtenswerth erscheinen, habe ich sorgfältig gesammelt, und die in dem betreffenden Abschnitt zu findenden Mittheilungen dürften daher so zuverlässig erscheinen, als dies bisher überhaupt zu erreichen möglich ist.

Weitere Erfahrungen müssen natürlich fortdauernd gemacht, von allen Seiten veröffentlicht und dann beherzigt werden. Dies ist der einzige Weg, auf welchem das durchaus nicht unmögliche Ziel erstrebt werden kann, daß man nämlich alle Vögel (und Thiere überhaupt), welche in der Gefangenschaft zu erhalten sind, auch mit mehr oder minder feststehender Sicherheit zu züchten vermag. Die Direktoren der zoologischen Gärten sind im großen in dieser Hinsicht bereits auf dem besten Wege und vornehmlich Doktor Bodinus in Berlin hat wahrhaft bewundernswerthe und in überraschender Zahl und Mannigfaltigkeit zunehmende Erfolge aufzuweisen. Streben wir Alle dahin, ähnliche Ergebnisse in der Vogelzucht zu erreichen, wo dieselben doch zweifellos viel eher als auf den meisten anderen Gebieten der Thierzucht zu erlangen sind.

Alles Nähere hierüber, die Regelung des Nistens, das Erzielen der Bruten nämlich in unserer milden Jahreszeit, wenn dieselben von natürlicher Wärme begünstigt werden und das allerzweckmäßigste Futter zur Aufzucht der Jungen, kleine frische Ameisenpuppen u. dgl., unschwer zu erlangen sind, finden die Leser in einem besonderen Abschnitt behandelt.

Bei einigen Kleinschnäbelchen ist die Unterscheidung der Geschlechter außerordentlich schwierig. Zwar habe ich bei jeder einzelnen Art die bisher festgestellten oder doch als verläßlich geltenden Unterscheidungsmerkmale angegeben; allein dieselben sind meistens nur für den scharfen Blick des Kundigen maßgebend. Einen einfachen Weg, um in den Besitz richtiger Pärchen zu gelangen, empfehle ich hier zunächst nach folgendem Verfahren. Man schafft von der betreffenden Art mehrere Exemplare an, sperrt dieselben in einen Käfig, welcher mehrere Abtheilungen mit leicht verschließbaren Thüren hat und trennt dann Abends die in jedem einzelnen Raum zusammensitzenden Pärchen. Auch kann man für diesen Zweck wol einfach mehrere Käfige neben einander stellen. Durchaus zuverlässig zeigt sich aber auch dies Verfahren eigentlich nur zur Brutzeit. Daß diese letztere eingetreten, erkennt man bei aufmerksamer Betrachtung daran, daß die Vögelchen sich im sogenannten Hochzeitskleide befinden, also ein lebhafter gefärbtes

Gefieder haben, namentlich aber, wie z. B. der graue Astrild und das Orangebäckchen am Unterleibe, Bürzel u. s. w. eine viel bemerkbarer hervortretende Färbung zeigen.

Zu den auffallendsten Eigenthümlichkeiten dieser kleinen Vögel gehört die schüchterne Aengstlichkeit. Daher werden sie wol zutraulich, niemals aber völlig zahm, denn selbst wenn sie dem Pfleger einen Mehlwurm aus der Hand nehmen, so geschieht dies doch regelmäßig mit aller möglichen Vorsicht, und irgend eine hastige Bewegung oder sonst etwas Außergewöhnliches versetzt sie sofort in die größte Aufregung, in welcher sich dann manche, so namentlich der Ringelastrild, wie toll und unsinnig geberden.

Nicht minder bezeichnend für sie ist die Neugierde, und zwar gewähren alle Kleinschnäbelchen das schönste Bild ihres anmuthig lebhaften Wesens, sobald irgend etwas Fremdartiges, sei es ein neuer Vogel oder auch ein anderer, lebloser Gegenstand in ihre Nähe gebracht wird. Das schrille Zit! gewöhnlich zuerst des Orangebäckchens, ruft die ganze Gesellschaft herbei und mit hoch emporgerichteten Köpfchen, in allen möglichen Richtungen geschwippten Schwänzen und unter fortwährendem verwunderten oder entrüsteten Gezirp und Gezwitscher umhüpfen sie die verdächtige Erscheinung wol stundenlang.

So einfach und anscheinend mühelos die Verpflegung dieser kleinen Astrilde aber auch erscheinen mag, zu Zeiten bedürfen sie doch großer und verständnißvoller Sorgfalt. Wenn sie von der weiten Reise, bei vernachlässigter Behandlung, im trübseligsten Zustande ankommen, so erholen sich die meisten in den Händen des Sachverständigen allerdings überraschend bald. Beim Einkauf der Liebhaber in den Großhandlungen muß man aber fast immer auf das Ersterben von mindestens Zweidrittheilen gefaßt sein. Zuweilen gehen auch in der angemessensten Behandlung sämmtliche Ankömmlinge ein, wenn sie infolge fahrlässiger Pflege unterwegs in einem krankhaften Zustande sich befinden, welcher meistens in Blutvergiftung beruht und gewöhnlich erst beim Wechsel der Fütterung und des Wassers zum Ausbruch kommt. Es ist ein Jammer, mit anzusehen, in welcher großen Anzahl dann zuweilen Karminfinken, Schmetterlingsfinken, Schönbürzel u. a. in den Käfigen der Händler erkranken und umkommen, besonders wenn sie die dann vorzugsweise nothwendige Wärme entbehren müssen.

Nicht sehr schwankende und niemals unter Stubenwärme sinkende Temperatur ist auch zum erfolgreichen Nisten der meisten dieser überaus zarten Vögelchen durchaus erforderlich. Wenn Jemand auch zufällig einmal ein Pärchen Karminfinken sogar bei einigen Graden Kälte unbeirrt nisten sah — so erscheint dies doch offenbar, selbst für den Blick des oberflächlichen Kenners dieser Vögel, nur als eine Ausnahme. Zahllose Erfahrungen haben es dagegen genügend festgestellt, daß mindestens Stubenwärme zur glücklichen Aufzucht der Jungen aller und

insbesondere der kleinsten Prachtfinken unumgänglich nothwendig ist. Ebenso unrichtig, als eine gegentheilige Behauptung, würde es sein, wenn man die kleinsten und zartesten Astrilde zum Anschaffen für den Anfänger in der Vogelpflege empfehlen wollte. Denn einerseits sind doch manche von ihnen, wie namentlich das Rothbürzelchen, der Schmetterlingsfink und das Helenafasänchen, gegen ungünstige Einflüsse nur zu empfindlich und andererseits nisten mehrere, wie der Grauastrild, das Orangebäckchen und das Goldbrüstchen, entweder gar nicht oder nur unter den günstigsten Verhältnissen mit guten Erfolgen. Dies ist übrigens bereits ziemlich allbekannt, und wer diese Vögel jemals selber gepflegt und gezüchtet hat, wird nichts Gegentheiliges behaupten können.

Ueber das Freileben der Astrilde sind bis jetzt erst die allergeringsten Mittheilungen veröffentlicht worden, und dies ist um so mehr zu bedauern, da sie, wie mit Bestimmtheit angenommen werden darf und bei einigen Arten auch bereits durch die Forscher und Reisenden ermittelt ist, eine sehr mannigfaltig voneinander abweichende Lebensweise führen. Die meisten halten sich freilich in grasreichen Ebenen oder in deren Nähe im Gebüsch, namentlich an den Ufern der Gewässer gesellschaftsweise auf, andere sollen aber auch tief im Urwald nur paarweise in Schilf und Rohr, in Gärten und Getreidefeldern und einige sogar inmitten der menschlichen Ortschaften leben. Von ihnen sind nur wenige den Nutzpflanzen der Ackerbauer schädlich, ganz natürlich darum, weil sie sämmtlich doch kein eigentliches Getreide mit Ausnahme der Durrha-Hirse verzehren können; an jener sollen ihre zahlreichen Schwärme allerdings zuweilen erheblichen Schaden verursachen. Solche großen umherschweifenden Scharen bestehen gewöhnlich in mehreren Arten, welche in ihrer geselligen Lebensweise im ganzen wol mit unseren heimischen Finkenvögeln übereinstimmen. Ihre Nahrung sind die kleinsten Sämereien der Gräser und sodann auch weiche kleine Kerbthiere und Gewürm.

Ebenso wie die Lebensweise, sind auch die Nistorte verschieden. Die meisten von ihnen nisten wol in dem mit Gras durchwachsenen Gebüsch, in keiner bedeutenden Höhe vom Boden, einige in Baumhöhlungen und manche sollen auch innerhalb der oder an den menschlichen Wohnungen nach Art unserer Sperlinge ihre Nester errichten. Sehr sonderbar erscheint es dabei, daß manche Reisenden von mehreren dieser Prachtfinken, so namentlich von dem Karminastrild, behaupten, daß sie kunstlose Nester bauen sollen, während zunächst ich, dann Dr. Rey in Halle und nachher noch zahlreiche andere aufmerksame Beobachter festgestellt haben, daß dieselben Vögel in der Gefangenschaft fast immer vorzugsweise künstliche und zierliche Nester herstellen. Die Form dieser Nester ist in der Regel länglichrund, seltener kugelrund oder beutelförmig. Das Gelege besteht aus drei bis acht, gewöhnlich aber nur aus drei bis vier sehr kleinen rein-

weißen Eiern, welche von beiden Gatten des Pärchens gemeinsam oder abwechselnd erbrütet, wie auch ebenso die Jungen aufgefüttert werden. In der Freiheit wird jedes Pärchen wol zwei bis drei Bruten hinter einander ausführen, denn in der Gefangenschaft erfolgen ihrer wol vier bis sechs, und wenn diese verunglücken, so nisten die Vögel nicht selten Jahr und Tag hindurch ununterbrochen fort.

Zu welcher Zeit die Mauser dieser kleinen Vögel im Freileben eintritt, ist von den Reisenden auch noch nicht festgestellt worden. In der Gefangenschaft mausern sie sonderbarerweise nicht regelmäßig, denn die meisten erhalten sich wol mehrere Jahre lang in demselben schönen und vollständigen Federkleide, welches allmälig, also in einer kaum wahrnehmbaren, immerwährenden Mauser erneuert wird. Andere dagegen, namentlich schlecht gepflegte Vögel, kommen wol plötzlich zum Verlust ihrer Federn, welcher sich nicht selten über den ganzen Körper erstreckt und nur äußerst langsam, besonders an Kopf und Schultern zuweilen erst nach vielen Monaten, wieder ersetzt wird. Solche Vögel gehen bei stärkerem Temperaturwechsel und mangelnder Pflege fast immer zu Grunde.

In den Käfigen der Händler und auch in denen der Liebhaber, welche diese kleinen Prachtfinken nicht zweckmäßig versorgen, verliert das Gefieder bei vielen Arten (z. B. Goldbrüstchen und Tigerfink) die schönen lebhaften Farben und verwandelt sich in düsteres Schwarzbraun bis Schwarz. Die Ursache dieser Erscheinung dürfte vorzugsweise im Mangel an Sonnenlicht, frischer Luft, sowie auch an nothwendigen Nahrungsstoffen begründet sein. Wenn solche Vögel in einer Vogelstube bei angemessener Verpflegung freifliegen, so erhalten sie nach längerer oder kürzerer Frist durch allmälige Erneuerung des Gefieders die naturgemäßen Farben wieder.

Die Farbenpracht des Federkleides dieser Vögel ist eine für das ganze Leben währende, sobald sie aus der Umfärbung des Jugendkleides sich gebildet hat. Sie nimmt mit dem höheren Alter zu, ist aber, mit nur wenigen Ausnahmen (wie namentlich beim Tigerfink) Veränderungen nach dem Wechsel der Jahreszeit nicht unterworfen.

Die Astrilde werden in der größten Anzahl von Westafrika, weniger von Süd- und Ostafrika und in den geringsten Sendungen von Australien und Asien in den Vogelhandel gebracht. Die Preise, zu welchen sie im Durchschnitt käuflich sind, habe ich bei jeder einzelnen Art angegeben. Um jeden dieser Vögel ausreichend kennen zu lernen, bitte ich zunächst das ausführliche Lebensbild, mit Berücksichtigung sämmtlicher Eigenschaften und der in diesen begründeten Hinweise für Pflege, Züchtung u. s. w., sodann aber auch die Abschnitte über Einkauf, Behandlung und Zucht aller Vögel überhaupt nachlesen zu wollen.

Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

Die eigentlichen Astrilde. Im Sprachgebrauch kennt man einen Blut- und Karminastrild, Dornastrild, Grauastrild, Ringelastrild u. a., welche keineswegs sämmtlich zu der Gattung gehören, die bei einigen Autoren ausschließlich den Namen Astrilda*] trägt. Die Vogelkundigen sind darüber uneinig, ob man die hierher gehörenden Vögel zu einer größeren Sippe vereinigen oder noch in mehrere Untersippen theilen darf. Auch stimmen sie keineswegs darin überein, welche Arten sie zu diesem oder den nahe verwandten Geschlechtern zählen. Cabanis und Reichenbach führen etwa neun bis zehn Arten als Astrilde auf; G. R. Gray dehnt sein Geschlecht Estrelda über fünfzehn Arten aus (von denen einige allerdings fraglich sind); ein populärer Schriftsteller reiht in die Sippschaft der Astrilden mehr als zwanzig Arten. Durch solche Meinungsverschiedenheiten wird eine große Verwirrung hervorgerufen und ich muß die Leser sehr um Geduld bitten, wenn ich dieselbe noch in einigen Beispielen veranschauliche, indem ich die verschiedenen Benennungen der hervorragendsten Autoren neben einander stelle. So heißt

bei Cabanis („Museum heineanum"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
das Goldbrüstchen — Sporaeginthus subflavus,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Uraeginthus phoenicotis;

bei Finsch und Hartlaub („Die Vögel Ost-Afrikas"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
der Karminastrild — Pytelia minima,
der Schmetterlingsfink — Pytelia phoenicotis;

bei Th. v. Heuglin („Ornithologie Nordost-Afrikas"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
das Goldbrüstchen — Habropyga subflava,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Uraeginthus phoenicotis;

bei Reichenbach („Die Singvögel"):
der Grauastrild — Astrilda cinerea,
das Goldbrüstchen — Pytelia subflava,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Mariposa phoenicotis;

bei Gray („Hand-List"):
der Grauastrild — Estrilda [Estrelda] cinerea,
das Goldbrüstchen — Estrilda [Sporaeginthus] subflava,
der Karminastrild — Estrilda [Lagonosticta] minima,
der Schmetterlingsfink — Estrilda [Mariposa] bengalus.

Selbst ein gebildeter Laie, sowie der eifrigste Vogelliebhaber wird sich in diesem Labyrinth der Benennungen nur mühsam oder gar nicht zurecht finden können. Deshalb hatte ich mit der Vereinfachung der Nomenklatur bereits begonnen, indem ich in meinem „Handbuch" I alle diese schwach- und kleinschnäbeligen Prachtfinken als Astrilden und auch unter der Bezeichnung Astrilda zusammenfaßte. Diese Eintheilung habe ich, wie vorhin dargelegt, auch jetzt noch festgehalten; nur mußte ich, um der Verwechselung zwischen den Angehörigen des wissenschaftlich aufgestellten Geschlechts Astrilda und der populären Bezeichnung Astrilde vorzubeugen, eine andere lateinische Benennung für die Kleinschnäbelchen wählen.

*] Loxia astrild *Linné*; Habropyga *Cabanis*; Estrelda *Gray*; Estrilda *Swainson*; Astrilda *Reichenbach*. Die Bezeichnung Astrilda ist jedenfalls von dem vaterländischen Namen eines Vogels abgeleitet.

Der graue Astrild [Aegintha cinerea].*)

Tafel I. Vogel 1.

Unter allen Prachtfinken erscheint auf unserm Vogelmarkt keiner so oft und ist keiner so gern gesehen, als gerade dies Vögelchen. Selbst wenn eine Vogelhandlung ihrer Hunderte erhält, so währt es gewöhnlich gar keine lange Zeit, bis sie sämmtlich Käufer gefunden haben. Diese Beliebtheit des kleinen, schlanken und zierlichen Vogels liegt ebensowol in seiner lieblichen, wenn auch schlichten Färbung, als auch in seinem anmuthigen, ungemein lebhaften Wesen begründet.

Das obere Gefieder des grauen Astrild ist dunkel aschgrau, mit einem Ton ins Bräunliche; die untere Seite ist heller aschgrau und an Unterbrust und Bauch rosenroth überhaucht. Dabei ist das Gefieder sehr zart und kaum sichtbar, zuweilen auch gar nicht dunkel gewellt; der Schwanz ist schwarz. Von dem hochrothen Schnäbelchen zieht sich durch das dunkle Auge, dasselbe oben und unten umsäumend, fast bis zum Ohr ein schmaler, glänzend rother Streifen, welcher dem beweglichen Köpfchen ein ungemein keckes Ansehen giebt. Im Hochzeitskleide verbreitet sich der rothe Anflug, wie zart überhaucht, über den ganzen Unterleib, die Brust und zuweilen sogar über Mantel und Hinterrücken und verstärkt sich zwischen den Beinen zum schönsten Rosenroth. Die Größe stimmt nahezu mit der des deutschen Zaunkönigs überein.

Die Heimat des grauen Astrild erstreckt sich wahrscheinlich so ziemlich über ganz Afrika, mit Ausnahme des Nordens. Ueber sein Freileben sind erst geringe Mittheilungen veröffentlicht; namentlich fehlen alle Nachrichten über das Nisten — und der allererste unserer Stubenvögel gehört daher zu denen, welche die seltsame Erscheinung zeigen, daß ihre Brutentwickelung zuerst in der Gefangenschaft beobachtet und beschrieben wurde.

Th. von Heuglin fand diesen Astrild nur in der Zeit von Januar bis Mai in Südnubien, Kordofan, Sennar und im Gebiet des weißen Nil, westwärts bis zum Kosanga-Fluß bis zur Höhe von etwa 2000 Meter hinauf, meistens in großen, ziemlich dicht zusammenhaltenden Flügen, welche, wie es scheint, ein sehr unstätes Wanderleben führen und sich unter beständigem, nicht sehr lautem Schwätzen und Piepen auf trockenem Hochgras in Hecken und Gebüsch, namentlich längs der Regenbetten lebhaft umhertreiben, gern zu baden scheinen und sich von feinen Grassämereien ernähren. Rüppel und Lefebvre sahen diesen Vogel in Abessinien; Heuglin bemerkte ihn dort nicht. Dagegen ist es sehr interessant, daß Dr. H. Dohrn den grauen Astrild auf den Kapverdischen Inseln gefunden. Er

*) Alle deutschen, sowie die lateinischen, englischen, französischen und sonstigen fremdländischen Namen, ferner die wissenschaftliche Beschreibung und alle weiteren derartigen Angaben sind immer am Schlusse der Schilderung eines jeden einzelnen Vogels zu finden.

erzählt, daß er in einigen Thälern mit reichem Pflanzenwuchs auf Santjago diese niedlichen Vögel in kleinen Scharen gesehen und meint, daß auch mehrere andere Arten (Schmetterlingsfink, Goldbrüstchen, Orangebäckchen u. a.) auf diesen Inseln zu finden sein werden. Ich will aber gleich darauf aufmerksam machen, sagt er, daß sie nur durch einen Zufall dorthin gelangt sind. Als ich nämlich im März d. J. 1865 in S. Vicente war, kam hier ein französischer Vogelhändler von Gorea mit Tausenden dieser Finken an, um nach Europa weiter zu reisen. Unglücklicherweise für ihn war aber der Postdampfer an der brasilianischen Küste gescheitert, und während seines wider Willen um mehrere Wochen verlängerten Aufenthalts entkamen ihm Hunderte dieser kleinen Vögel, so daß anzunehmen ist, es werden sich wenigstens einige vor den Angriffen der Raubvögel gerettet haben, um sich in der neuen Heimat einzuleben und zu vermehren.

Der graue Astrild und der ihm nahe verwandte gewellte Astrild (Helenafasänchen) gehören zu den fremdländischen Vögeln, welche schon seit länger als hundert Jahren in Europa eingeführt worden. Die älteren Schriftsteller verwechseln meistens beide oder auch mehrere nahe verwandte Arten, so Buffon und dann selbst noch Bechstein, während doch schon Edwards (1751) eine gute erkennbare Abbildung des ersteren giebt. Vieillot hat den grauen Astrild unter dem Namen Le Bengali cendré (*Oiseaux chanteurs* p. 6) beschrieben und abgebildet; er sagt jedoch nur sehr wenig über ihn. Schon damals war dieser kleine Vogel in Frankreich beliebt und häufig bei den Liebhabern; doch hielt er ihn für zarter als andere, z. B. den Schmetterlingsfink, und rieth daher, ihm große Sorgfalt und Wärme, namentlich dann nicht fehlen zu lassen, wenn er sehr entfedert soeben von der Reise angekommen oder wenn er nistet.

Nach allseitigen Erfahrungen ist dieser Prachtfink jedoch viel weniger weichlich, als zahlreiche andere und entfedert sieht man ihn fast niemals. Um dieser Vorzüge willen, und weil er zugleich ausdauernder als viele nahe verwandte Arten sich zeigt, schätzen ihn auch die Vogelhändler sehr hoch, und empfehlen ihn besonders den Anfängern in der Vogelliebhaberei, welche noch nicht Züchtungsversuche anstellen wollen.

Ein Pärchen grauer Astrilds gehörte zu denjenigen fremdländischen Vögeln, mit welchen ich meine Züchtungsversuche begann. Gleich in den ersten Tagen hatte ich Ursache, die wirklich seltsame Hurtigkeit dieser Vögelchen zu bewundern, denen ein Käfig von nur einem Viertelzoll (c. 7 mm.) Drahtweite zum Entschlüpfen für den Nothfall nicht zu eng war. Sobald ich den grauen Astrild im Laufe der Zeit näher kennen lernte, fand ich allerdings, daß er das Wohlgefallen der Vogelliebhaber in hohem Maße verdiene; denn seine allerliebste Lebhaftigkeit, zierliche Anmuth und Zutraulichkeit, kurz und gut, sein ganzes überaus lieb-

liches Wesen muß ihn ja jedem Freunde dieser kleinen Vögel sehr werth machen.

Einen wirklichen Gesang hat dieser Prachtfink nicht; beide Gatten des Pärchens lassen leise, wohlklingende Locklaute und ein leises Geflüster, und das Männchen bei den tänzelnden Liebesbewerbungen lautschmetternde Flötenrufe hören.

Wie bei vielen Thieren und namentlich den Vögeln, ist auch vorzugsweise bei den kleinsten Prachtfinken der Schwanz der Perpendikel oder Zeiger, welcher ihre Gefühle erkennen läßt. Dies zeigt sich dem Beobachter in sehr interessanter Weise. Am kühlen Morgen kauert das Pärchen im Gebüsch, dicht aneinander gedrängt und mit regungslosen Schwänzen; sobald die Sonne wärmere Strahlen herabsendet und die Gesellschaft der Kleinschnäbelchen lebendiger wird, gerathen zunächst die Schwänze in Bewegung und fast möchte ich behaupten, daß jede wechselnde Empfindung durch verschiedenartiges Schwippen mit dem Schwanze ausgedrückt werde. Jetzt fliegen sie zum Futterkorb, heißa! lustig wippen da die Schwänze schief aufwärts auf und nieder. Dann eilen sie zum Trinknapf, von wo ein Webervogel sie zurücktreibt und in ängstlichem Herunterschwippen des Schwanzes zeigt sich wiederum ein anderes Empfinden. Nachdem sie getrunken, flattern sie im Gebüsch umher, unruhig huschend und suchend. Jetzt scheinen sie das Gesuchte gefunden zu haben; ein Nestkörbchen ist es, in einem großen Drahtbauer hängend, und während das Männchen auf dem Rande des Körbchens und das Weibchen im Eingange des Bauers steht — wie anders wippen da wiederum die Schwänze; wagerecht von rechts und links gehen die zierlichen Bewegungen und augenscheinlich sind die beiden Vögel in eifrigster Erwägung und Berathung darüber, ob das Nestkörbchen wol zweckmäßig sei und allen Anforderungen genüge. Endlich ist die Wahl getroffen und das Männchen beginnt jetzt in förmlicher Hast die Baustoffe zur Errichtung des Nestes herbeizuschleppen, während das Weibchen anfangs anscheinend theilnahmlos dabeisitzt, nun aber in das bald gerundete Nest hineinschlüpft und den innern Ausbau vollendet. Dann, in der Mittagszeit, wenn die beiden grauen Astrilds, wie die meisten übrigen Prachtfinken, dicht aneinander gedrängt Ruhe gehalten haben, fliegt das Männchen plötzlich empor, erhebt das Köpfchen hoch und keck und beginnt nun ein drolliges Auf- und Niederhüpfen. Während es aber bei diesem Liebestanze seinen lautklingenden, melodischen dreisilbigen Ruf erschallen läßt und diesen vielmals wiederholt, flüchtet das Weibchen von dannen, wird tanzend und rufend verfolgt, eingeholt, und stürmisch im Flattern erfolgt die Begattung. Dr. Luchs schildert ein Pärchen Grauastrilds, welche seit vier Jahren bei einfacher Pflege sich wohl fühlen, als bewegliche kleine Gesellen, die schüchtern jedem andern kleinen Vogel ausweichen, ihren einfach zirpenden Ton beim Herumhüpfen oft hören lassen und sich, namentlich zur Nachtzeit, durch rege Wachsamkeit aus-

zeichnen. Ohne unruhig und störend zu werden, sind sie die ersten, welche ihr Schlafplätzchen verlassen, sobald ein Licht dem Käfige sich nähert.

Wenn man ein Pärchen graue Astrilds freifliegend nisten lassen will, so schreiten sie in den Monaten August und September und, wenn sie dann gestört werden, wieder im März und April mit außerordentlichem Eifer zur Brut. Sie erbauen verschiedenartige Nester. Aus feinen grünen Spargelästchen, die sie sehr geschickt selbst abzurupfen verstehen, formen sie in einem Körbchen, oder auf einer andern Unterlage, seltener frei im Gebüsch, zuweilen sogar im Rasen auf der Erde, ein kugelrundes, ungemein zierliches Nest, mit seitlichem, sehr engem und glatt gerundetem Schlupfloch, in welchem die Mulde mit zarten Grasrispen, Haaren, Baumwolle und weichen Läppchen ausgepolstert wird. Dies Nest ist ein wahres Kunstwerk. Zu anderer Zeit, da es keine frischen Spargelzweige gab, häuften sie aus allerhand Baustoffen einen förmlichen Thurm zusammen, welcher gegen sechs Zoll (15,7 cm.) hoch vom Nestkörbchen aus bis zur Decke des (offenstehenden) Bauers reichte, und auf diesem Thurm brachten sie eine ganz kleine, schwachumwölbte Mulde an. Dann wiederum bauten sie aus Agavefasern, Bast und Gras ebenfalls sehr künstliche Nester, mit oder ohne eine angehängte, wol drei Zoll (7,8 cm.) lange Einflugröhre, deren Schlupfloch zuweilen durch Fasern und Pferdehaare völlig verdeckt erschien. Sonderbar erscheint es, daß sie sehr eifrig kleine Stückchen Sepienschale, kleine Muscheln, Eischalen u. dgl. ins Genist tragen und gleichsam zum Schmuck darin verweben. Wunderlich ist es ferner, daß ein Pärchen nicht selten mehrere, zuweilen zahlreiche Nester an verschiedenen Orten, oft dicht über einander erbaut, bevor es endlich zur wirklichen, erfolgreichen Brut gelangt. Das Gelege besteht in drei bis fünf sehr kleinen, länglichen und spitzen, glänzend weißen Eiern, welche in elf Tagen von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd erbrütet werden.

So weit hatte ich das Nisten dieser kleinen Prachtfinken in meiner Vogelstube bereits oft beobachtet; jedesmal aber brüteten sie vergeblich oder ließen die soeben erbrüteten Jungen sterben. Als die Deutsche Ornithologische Gesellschaft in Berlin bei ihrer Jahres-Versammlung zu Anfang Octobers d. J. 1868 meine Vogelstube gemeinsam besuchte, mußte ich den Herren bedauernd erklären, daß ich die Zucht des grauen Astrild in der Gefangenschaft der regelmäßigen Mißerfolge wegen kaum für möglich hielt. Darüber kam der Winter heran und schon zu Ende des Decembers konnte ich in einer Sitzung jenes Vereins berichten, daß ich dennoch auch eine Brut dieses Vogels von fünf Jungen flügge werden gesehen. Noch dazu gab es in dieser Zeit gar nicht einmal die beste Nahrung zur Aufzucht aller dieser jungen Vögel, frische Ameiseneier nämlich, sondern die Astrilds fütterten ihre Jungen, ebenso wie die Amarantvögel und viele andere, mit einem Gemisch aus getrockneten aber eingequellten Ameisen-

puppen und hartgekochtem, feingeriebenem Eigelb, an welches sie sich inzwischen gewöhnt hatten, auf. Neuerdings giebt man lieber gutes Eierbrot anstatt des Eigelbs. Uebrigens ist, außer etwaiger nicht befriedigender Fütterung, besonders die Schüchternheit und Aengstlichkeit dieser kleinen Prachtfinken als die vornehmlichste Ursache des Verlorengehens ihrer Bruten zu erachten. Sie entwickeln dann aber nicht selten eine so große Fruchtbarkeit, daß man fünf bis sieben, ja acht bis zwölf Gelege mit 5 bis 8 Eiern jedesmal bei ihnen gezählt hat.

Meine Freude war sehr groß, als nach den vielen Fehlbruten, in denen drei Astrild-Pärchen recht friedlich nebeneinander Jahr und Tag hindurch beinahe ununterbrochen gewetteifert, endlich die ersten Jungen flügge wurden. Später haben sodann zwei Pärchen mehrere Bruten und zu verschiedenen Zeiten glücklich erzogen. Wol darf ich annehmen, daß ich auch den grauen Astrild, gleich vielen anderen fremdländischen Vögeln, zuerst in der glücklichen Brutentwickelung beobachten und schildern konnte. Später ist derselbe von den Herren Emil Linden in Radolfzell, H. Leuckfeld in Nordhausen, Dr. Rey in Halle, Freiherr von Beust auf Werthheim, Dr. Baldamus in Köthen und vielen Anderen gezüchtet worden, und meine Darstellung beruht daher zugleich in der Betheiligung aller meiner Mitarbeiter. Wir Alle stimmen darin überein, daß die Bemerkung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I: Der graue Astrild nistet unschwer in der Gefangenschaft, erzieht jedoch nur selten die Jungen glücklich, bis jetzt noch keineswegs durch gegentheilige Erfahrungen widerlegt ist.

Freifliegend in einer Vogelstube gelangt ein Paar dieser Vögelchen also wol einmal zur ergiebigen Brut, im Käfige dagegen, sei er auch noch so vortheilhaft eingerichtet, hängt der Erfolg immer nur von einem seltenen, glücklichen Zufall ab. Am besten läßt man die grauen Astrilds erst im Frühjahre, sobald es frische, ganz kleine Ameisenpuppen giebt, nisten, beachtet sorgfältig eine Wärme von 15—16 Grad R., welche auch zur Nachtzeit nicht tiefer sinken darf, und bietet ihnen Nistgelegenheiten an stillen Orten, wo sie keinen Störungen von anderen Vögeln oder Menschen ausgesetzt sind. Dazu wählt man am geeignetsten ein gewöhnliches Heckgebauer, in welchem mindestens 3—4 Zoll ($7,_8$—$10,_5$ cm.) hoch von der Decke einige Nestkörbchen angebracht sind, während man den oberen Boden mit Pappe bedeckt hat. Wenn man die Vögelchen frei fliegen läßt, kann dieses Bauer hoch oder niedrig hängen, denn sie nisten ebenso gern in der Nähe des Fußbodens, als nahe an der Zimmerdecke. Doch versäume man nicht, nach verschiedenen Seiten hin mehrere Drahtsprossen zu Schlupflöchern auszubiegen, weil die kleinen ängstlichen Wichte durch die Annäherung jedes größeren Vogels leicht so erschreckt werden, daß sie in blinder Furcht sich zwischen die Drahtstäbe festzwängen und sich beschädigen oder umkommen. Will man ein solches Pärchen in einen Käfig zur Hecke einsperren, so muß der Draht sehr eng,

weitestens dreiachtel Zoll (c. 10 mm.) geflochten und außerdem nicht zu dünn und biegsam sein. Diese Nistvorrichtung, also den Prachtfinken-Heckkäfig von ungefähr 14—15 Zoll (36,6—39,2 cm.) Höhe, 12—18 Z. (31,4—47 cm.) Länge und 10—12 Z. (26,2—31,4 cm.) Tiefe, hängt man an einer von der Mittags- oder Morgensonne getroffenen Stelle an der Wand, lieber etwas hoch, keinenfalls aber zu niedrig, auf; nöthigenfalls muß man dann aber einen kleinen Schirm aus Birkenruten an der einen Seite der Innenwand anbringen, hinter welchen die Vögelchen vor den zu heißen Sonnenstrahlen flüchten können.

(Da eine solche Einrichtung und Anordnung des Heckkäfigs eigentlich für alle kleinen Prachtfinken gilt, so habe ich hier vorläufig wenigstens das Nothwendigste angegeben. Eingehende Mittheilungen und Rathschläge für die Züchtung sind selbstverständlich weiterhin in den betreffenden Abschnitten zu finden.)

Die jungen Astrilds zeigen einen sehr schwachen bläulichen Nestflaum und sind an der schön blauweißen Wachshaut oder vielmehr den kleinen Drüsen zu beiden Seiten des Schnabels sogleich zu erkennen. Das Jugendkleid beim Verlassen des Nestes ist in folgender Weise gefärbt: Oberkopf und Rücken sind dunkel mäusegrau, Brust und Bauch heller bräunlichgrau, der hintere Unterleib ist gelbbraun; der Schwanz bräunlichschwarz; das Schnäbelchen ist glänzend schwarz; die Füße sind schwärzlichbraun, die Augen dunkel. Der rothe Augenbrauenstreif, der rosenrothe Anflug des unteren Körpers, sowie die wellige Zeichnung des Gefieders fehlen gänzlich.

Die Verfärbung zum Alterskleide findet in der Weise statt, daß das Gefieder gleichmäßig dunkler und hervortretender reingrau wird. Der rothe Augenbrauenstrich erscheint allmälig sehr fein und wird nach und nach stärker, während das Schnäbelchen heller zu werden beginnt und durch Fahlgelb und Gelbroth in das schöne Hochroth übergeht. Für den scharfen Blick werden dann auch die Wellenlinien allmälig sichtbar, während die rosenrothe Färbung des untern Körpers aber erst viel später bei der Parung der Vögelchen eintritt. Gewöhnlich beginnt diese Verfärbung etwa nach der dritten Woche vom Zeitpunkte des Flüggewerdens und ist mit der fünften bis achten Woche so weit vollendet, daß auch das Rosenroth, wenn dann gerade die Nistzeit trifft, schon schwach hervortritt.

Bastardzüchtungen von verschiedenen Arten dieser kleinen Prachtfinken scheinen ziemlich leicht und erfolgreich zu sein. So hat Herr Ingenieur Karl Hendschel in München eine solche Brut zwischen Astrild-Weibchen und Orangebäckchen-Männchen von zwei Pärchen mehrmals flügge werden gesehen; diese Mischlinge werde ich beim Orangebäckchen beschreiben. Herr Dr. Rey erhielt Mischlinge vom grauen und gewellten Astrild.

Beim grauen Astrild hält es außerordentlich schwer, die Geschlechter mit Sicherheit zu unterscheiden. In unseren Herbstmonaten, in denen diese kleinen

Afrikaner selbst in den Käfigen der Vogelhändler ihren Frühling mit der Verfärbung zum Hochzeitskleide feiern, erkennt man die Männchen wol an der lebhafteren und umfangreicheren Röthe des Unterleibes und dem etwas breiteren Augenstreif; allein zu anderer Zeit und bei jüngeren Vögeln sind die Weibchen dann doch nicht so leicht herauszufinden. Dazu ist die Liebebedürftigkeit dieser Vögel so groß, daß, wie schon in der Uebersicht der Prachtfinken gesagt, ihrer zwei von gleichem Geschlecht in einem Käfige gehalten, gewöhnlich die ganze Zärtlichkeit eines richtigen Paares zeigen. Dies ist aber zweifellos eine der Hauptursachen, an denen die glückliche Zucht des grauen Astrilds scheitert. Wenn man sicher gehen und nicht auf den Scharfblick des Vogelhändlers allein vertrauen will, so muß man ihn bitten, daß er von den auch im großen Vorrathskäfige immer nebeneinander weilenden Pärchen sich eins genau merke und zusammen herausfange. Oder man verfährt in der bereits Seite 31 angegebenen Weise. Dabei bleibt es dennoch immer rathsam, daß man, sobald ein Pärchen im Laufe von drei bis vier Monaten nicht nisten will, das Männchen oder Weibchen davon austausche.

Ohne zu nisten ist der graue Astrild bei gewöhnlicher Stubenwärme sehr gut zu erhalten und dauert, sowol paarweise im kleinen Käfige, als auch im Gesellschaftsbauer, wo er zu den verträglichsten gehört, viele Jahre hindurch sehr gut aus. Wenn die Wärme etwas tiefer sinkt, so ist es für diese kleinen Afrikaner nothwendig, daß sie zur Nacht einen wärmeren Schlupfwinkel haben. In der Vogelstube benutzt das Pärchen dann eins der selbstgebauten oder auch fremden Nester, und während das Weibchen brütet, übernachtet das Männchen auch in einem solchen. Es ist daher nothwendig, daß man auch den im Schmuckkäfige gehaltenen Astrilds dergleichen Gelegenheiten für die Nachtruhe bietet. Beim Einkauf achte man sorgfältig auf die späterhin angegebenen Gesundheitszeichen; wenn die Astrilds etwa sehr entfedert sind, so braucht man sich, bei sonstiger Gesundheit, nicht daran zu stoßen. Der Preis wechselt für das Pärchen zwischen $2^1/_2$ und 3 Thlr. in den Vogelhandlungen und beträgt oft nur 5 bis 6 Francs (1 Thlr. 10 Sgr. bis 1 Thlr. 18 Sgr.) bei den Großhändlern.

Den grauen Astrild mußte ich so ausführlich als möglich behandeln; denn einerseits ist er in der Reihenfolge der kleinsten Prachtfinken der erste und zugleich einer der beliebtesten und daher gilt das von ihm Gesagte zum Theil auch für die übrigen, so daß ich in den Schilderungen der letzteren mich vielfach auf ihn berufen kann; andererseits aber gebe ich alle diese Darstellungen fremdländischer Vögel gewissermaßen in dem Sinne einer Geschichte derselben und verzeichne also ihre Einführung und weitere Verbreitung, namentlich aber ihre Züchtung nach eigenen Erfahrungen und den Mittheilungen meiner Mitarbeiter zugleich. Hiernach wird also der Abschnitt über jeden einzelnen Vogel je nach dem

Maßstabe unserer Kenntniß und der Fortschritte, welche seine Einbürgerung und Züchtung unter den Liebhabern bereits gemacht, länger oder kürzer gefaßt werden.

Der graue Astrild heißt auch Grauastrild, Grauvögelchen, graues Fasänchen, kleines Fasänchen, graues Rothschnäbelchen oder blos Astrild.

Astrilde ordinaire (Vekemans in Antwerpen); Astrilde gris, Bec de corail ordinaire, Astric (bei den französischen Händlern; letztere Bezeichnung ist aber falsch); African Waxbill, Common Waxbill (bei Jamrach in London); auch The ashcoloured Astrild (bei andern Londoner Händlern).

Nomenclatur: Fringilla cinerea *Vieillot;* Fringilla troglodytes *Lichtenstein;* Estrelda cinerea et rubriventris *Gray;* Astrilda cinerea *Reichenbach;* Habropyga cinerea *Cabanis*, *v. Heuglin* etc. (Die weitere Angabe der Literatur ist am Schlusse dieses Bandes nachzulesen.)

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb, Oberkopf, Rücken und ganzer Mantel bräunlichgrau, ungemein fein, nur bei scharfem Blick bemerkbar und zuweilen gar nicht, dunkler gewellt; Kopfseiten, Kehle und Oberhals hell bräunlichgrau, rosenroth überhaucht, die ganze übrige Unterseite blaß braungrau, von der Brust bis nach dem hintern Unterleibe zunehmend rosa überlaufen, beim Männchen in der Nistzeit lebhaft rosenroth; Flügelschwingen bräunlichschwarz, mit helleren Außensäumen; obere Schwanzdecken schwarz, die beiden äußersten Schwanzfedern mit weißer Außenfahne, untere Schwanzdecken weiß; Schwanz gerundet. Durch das Auge an beiden Seiten bis über die Mitte des Kopfes hinaus ein rother Brauenstreif; Auge gelbbraun, Schnabel glänzend hochroth, Füße braun. Weibchen wie S. 41 angegeben. Jugendkleid S. 40.

Aegintha cinerea. Supra dilute griseo-rufescens, subtus pallidior, magis rubens, minutissime (interdum vix conspicue) fusco fasciolata et vermiculata; stria oculari coccinea; cauda cuneata nigra; abdomine medio roseo tincto; subcaudalibus albis; remigibus pallide brunneis; pogonio rectricum lateralium externo albo; rostro rubro.

Länge c. 9 cm. (3 Zoll 6 Linien), Flügel c. 4,4 cm. (1 Z. 8 L.), der gerundete Schwanz c. 3,9 cm. (1 Z. 6 L.).

Juvenis vertice dorsoque murinis; pectore ventreque dilutius subfusco cinereis; crisso testaceo; cauda subfusco nigra; rostro nigro, nitente; pedibus nigrescente fuscis; iride obscure fusca; *stria oculari et afflatu corporis inferioris rosaceo picturaque plumarum undulata prorsus nullis.*

Beschreibung des Eies: Farbe reinweiß, glänzend, Gestalt eiförmig mit deutlicher Spitze. Länge 15,5 mm., Breite 12 mm.

Ovum pure album, nitens; ovatum apice distincto.

Der gewellte Astrild [Aegintha astrild].

Tafel I. Vogel 2.

Heiß brennt die Mittagssonne durch das Fenster in die Vogelstube. Unter den sonst so beweglichen gefiederten Bewohnern ist fast regungslose Stille eingetreten. Viele von den Vögeln haben schattige Plätze zur Ruhe aufgesucht, die meisten liegen aber auf dem Fußboden im Sande oder vor den Fenstern ausgestreckt, mit gespreizten Flügeln und gesträubten Federn, um ihr Gefieder von den Sonnenstrahlen so recht durchwärmen zu lassen.

Plötzlich schallt ein lautklingender Ruf, der, mehrmals wiederholt und durch gleichsam vibrirende Töne verbunden, als ein eigenthümlicher, fast metallisch schrill lautender und doch nicht unmelodischer Sang ertönt, etwa wie dadädsih, dadädsih! Das Vögelchen, welches aus der Ruhe sich erhoben und ebenso sein Weibchen aufgescheucht hat, umhüpft oder umtanzt dies letztere in komischen Bewegungen.

Es ist der gewellte Astrild, von den Händlern Helenafasänchen genannt. Sein ganzes Gefieder erscheint dunkelgrau, unterhalb heller, an Backen und Kehle am hellsten weißlichgrau, und durchgängig sehr fein und zierlich dunkelbraun gewellt; Brust und Bauch sind schön dunkel rosenroth überlaufen; der Unterschwanz und hintere Theil des Unterleibes sind sammtschwarz; der Oberschwanz ist hellbraun und ebenfalls fein gewellt. Durch das Auge zieht sich ein blutrother Streif, vom glänzend korallenrothen Schnabel bis zum Ohr. Seine Größe ist etwas beträchtlicher, als die des nächstverwandten grauen Astrild. Das Weibchen ist unschwer zu erkennen; Größe bemerkbar geringer, Unterkörper weniger lebhaft roth, hinterer Unterleib nicht schwarz, sondern fahl gelblichgrau, die Wellenzeichnung überall matter.

Für den aufmerksamen Blick ist der gewellte Astrild an den stärkeren Wellenlinien, dem dunkleren Roth, dem längeren stufigen, oberhalb hellbraunen Schwanze und der bedeutenderen Größe von dem grauen Astrild von vornherein zu unterscheiden; auch erscheint er etwas ruhiger und minder hurtig.

Dies Vögelchen ist nicht allein überaus zart und reizend gefiedert, sondern auch in seinem Wesen unendlich lieblich. Immer beweglich, glatt, schmuck und reinlich in den Federn, niemals dummscheu, sondern, wenn auch sehr ängstlich doch zutraulich und bald sehr zahm, erwirbt es sich die Zuneigung der Vogelliebhaber und besonders die der Frauen im vollsten Maße. Fasänchen nennt man es, weil es bei dem Liebesgesang und Tanz einen fasanenartigen Anstand, wie Vieillot sagt, zur Schau trägt.

Auch der gewellte Astrild wurde von Edwards beschrieben und zuerst gut abgebildet, doch nahm dieser Schriftsteller fälschlich an, der Vogel sei aus Ostindien nach Lissabon gekommen, von wo man ihn in London erhalten hätte. In Lissabon soll, nach Seligman's Angaben, der Ritter Georg Shelroke zuerst im Besitz dieser kleinen Vögel von verschiedenen verwandten Arten gewesen sein. Die Einführung der sogenannten Senegalisten oder kleinen afrikanischen Prachtfinken nach Europa als Zier- und Schmuckvögel in immer zunehmender Anzahl dürfte also gegen die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts hin begonnen haben. Brisson und Buffon hatten den gewellten Astrild zwar schon früher als Edwards, aber mit fehlerhaftem Schwanze und daher jedenfalls nicht nach eigener Anschauung bildlich dargestellt; Beide berichten auch mancherlei Irrthümer, doch geben

sie bereits richtig Afrika als seine Heimat an, während wiederum Bechstein fälschlich auch die Kanarischen Inseln als dieselbe nennt.

Vieillot ist des Lobes voll über die Anmuth und Liebenswürdigkeit dieses Vogels, doch sind seine Angaben im übrigen nur gering. Er sagt schon, daß der Senegali rayé bei sorgsamer Pflege und namentlich nicht mangelnder Wärme ein Alter von neun bis zehn Jahren erreiche. Dies haben spätere Erfahrungen allerdings bestätigt und mehrfach gezeigt, daß die meisten kleinen Prachtfinken ein Jahrzehnt und darüber ganz vortrefflich in der Gefangenschaft ausdauern können.

Ueber das Freileben des gewellten Astrild ist ebenfalls erst wenig bekannt. Die Forscher und Reisenden (Guarney, Ayres, Layard, Zelebor u. A., besonders aber Th. von Heuglin) haben im ganzen Folgendes berichtet. Im Natallande ist er die gemeinste Finkenart, welche im Winter in unermeßlichen Zügen erscheint. Er besucht auch hier gern kultivirten Boden und ernährt sich von den Sämereien der Unkräuter. Auch soll er geflügelte Ameisen im Fluge fangen. Heuglin beobachtete ihn während der trockenen Jahreszeit von October bis Mai in denselben Gegenden als den grauen Astrild, wo er ebenfalls beständig zu wandern schien. Kleinere oder größere Scharen trieben sich zuweilen gemeinsam mit Gattungsverwandten im Hochgras der Steppen und Sümpfe, in Hecken, Baumwollfeldern und im Gebüsch längst der Gewässer umher, jedoch nicht in wasserlosen Gegenden. In Habesch waren solche Flüge noch in einer Höhe von mehr als 2—2500 Meter über dem Meere zu finden. Alle jene Gebiete dürfte aber auch diese Art nicht als Nistvogel bewohnen. Die einzelnen Gesellschaften halten eng zusammen und schwärmen zirpend von Busch zu Busch und von einem Grasschopf zum andern; oft läßt sich ein ganzer Flug auf einem Grashalm nieder, auch sieht man sie unter dem Gestrüpp auf der Erde nach ausgefallenen Sämereien emsig umhersuchen. Sie sind sehr lebhaft, unruhig und zuweilen recht mißtrauisch, oft aber auch, namentlich in der Nähe von Gehöften, wieder so wenig scheu, daß man sich ihnen bis auf wenige Schritte nähern kann. Im Kaplande, wo diese Vögelchen nicht selten in großen Scharen in das Getreide einfallen und erheblichen Schaden anrichten sollen, werden sie von den Landbauern mit Sämereien, die durch Arsen oder Strychnin vergiftet sind, in großer Anzahl vertilgt.

Noch weniger ist über das Nisten des gewellten Astrilds in der Heimat berichtet worden; man weiß nur, daß er nahe am Erdboden zwischen hohen und dichten Gräsern ein länglichrundes, überwölbtes Nest mit seitlichem Einflugloch aus zarten Halmen, Gräsern, Fasern und dergleichen formt.

Bis jetzt ist die Verbreitung dieser Art noch nicht sicher ermittelt, doch dürfte sich dieselbe besonders über die Wendekreisländer Afrikas und darüber hinaus, so ziemlich über den ganzen Süden, Osten und Westen dieses Erdtheils

erstrecken. Außerdem ist er eingeführt, größtentheils wol ebenso durch Zufall, als der graue Astrild, auf Madagaskar, Bourbon, Maurizius und den Maskarenen überhaupt, sowie auf St. Helena, und auf diesen Inseln, namentlich aber der letzteren, hat sich das Vögelchen so günstig vermehrt, daß es dort bereits in sehr großer Anzahl gefangen und in den Handel gebracht wird. Von dieser Insel hat es auch den Namen St. Helenafasänchen erhalten.

Als ich die Züchtungen fremdländischer Vögel begann, waren in Berlin die Helenafasänchen zeitweise außerordentlich selten und dann so theuer, daß man ein Pärchen wol mit dem doppelten Preise bezahlen mußte.*) Sie nisteten in meiner Vogelstube zuerst im Spätsommer und wählten die obere Decke eines Drahtbauers, welches von einem Paar jener kleinen Papageien, die man Unzertrennliche nennt, bewohnt war, und trugen in einer von Gesträuch begrenzten Ecke Genist zusammen. Dies bestand zu meiner Verwunderung nicht, wie bei den grauen Astrilds, aus feinen Fasern, Bast- und Heufäden, Pferdehaaren u. dgl., sondern aus gröberen Stoffen, wie trocken gewordener Vogelmiere, dicken Heuhalmen und Läppchen, und hieraus häuften sie einen sehr hohen Thurm zusammen. Dieses Nest wurde von den Papageien zerstört und die Fasänchen machten vorläufig keine weitere Anstalt zur Brut. Erst im nächsten Frühlinge, als ich einige frische Gesträuche in die Vogelstube brachte, begannen sie wieder und zwar in einem hochangebrachten großen Wermutbusch ein Nest zu bauen. Wiederum trugen sie dasselbe Genist zusammen und errichteten einen Thurm von nahezu zwei Handbreiten Höhe, welcher fast an die Zimmerdecke hinaufreichte. Hier formten sie aus Baumwollfäden, langen Pferdehaaren, Federn und Watte eine zierlich geglättete Nestmulde, welche sie aber nicht mehr mit einem Dache überwölbten. Dann hatten diese Vögel wiederum Unglück, denn sie wurden von einem Paar Schmetterlingsfinken aus dem fertigen Nest vertrieben. Diese letzteren

*) Durch den bedeutenden Aufschwung, welchen der Vogelhandel in der letzteren Zeit gewonnen, ist der Einkauf der Händler jetzt ungleich besser geregelt. Alljährlich im Spätsommer entnehmen die Kleinhändler, besonders vom Direktor Bekemans in Antwerpen oder von den Großhändlern in Bordeaux und anderen west- und südeuropäischen Hafenstädten, bedeutende Vorräthe an ‚gefiederter Waare', d. h. vorzugsweise afrikanische Prachtfinken, aber auch Wellensittiche, graue und grüne Kardinäle u. a. In der übrigen Zeit des Jahres werden sie durch die deutschen Großhändler Hagenbeck oder Lintz in Hamburg, Reiche in Alfeld, Gudera in Leipzig und Hieronymi in Braunschweig versorgt, welche theils selber einführen, theils von Chs. Jamrach in London, Bekemans oder Anderen entnehmen. Wenn trotzdem einzelne der gewöhnlichsten Arten gegen das Frühjahr hin zu mangeln beginnen, so werden solche nicht selten bereits durch bedeutende Züchtungen in deutschen Vogelstuben ersetzt und die Händler mit ihnen aus denselben zuweilen reichlich versehen. Diesen ganzen Verkehr vermittelt zum größten Theile die „Gefiederte Welt" und in den Abschnitten über Vogelzucht und Vogelhandel sind auch hier nähere Mittheilungen über denselben zu finden.

richteten sich sodann in demselben häuslich ein und erbrüteten und erzogen aus einem bereits von dem Fasänchen gelegten Ei glücklich ein Junges.

Die Helenafasänchen nisteten dann an einer andern Stelle weiter und ich fand reichlich die Gelegenheit, ihre Bruten kennen zu lernen. Auch sind sie bereits mehrfach in anderen Vogelstuben gezüchtet worden.

Der Nestbau wird ebenfalls in der Weise ausgeführt, daß das Männchen die äußere Gestalt des Nestes formt, dann nur das Genist herbeiträgt, während das Weibchen den innern Ausbau herstellt. Ebenso brüten beide Gatten des Pärchens abwechselnd und oft stundenlang gemeinschaftlich, in der Regel aber so, daß das Weibchen von dem Männchen immer nach etwa zwei Stunden auf eine halbe bis höchstens eine ganze Stunde abgelöst wird. Ueber Nacht brütet das Weibchen allein, während das Männchen dicht vor oder im Eingange des Nestes, bei kühlem Wetter auch in demselben sitzt. Das Nest gleicht gewöhnlich dem des grauen Astrild, doch ist es größer, weniger kunstvoll, hat niemals eine Flugröhre und auch kein sehr enges oder zierlich gerundetes Schlupfloch. Das Gelege aus 3 bis 5 Eiern wird in 11 Tagen erbrütet und die Fütterung der Jungen besteht anfangs in weicher Fleischnahrung, sowie aus feinen, späterhin größeren gequellten Sämereien nebst Grünkraut.

Der Nestflaum der Jungen ist bläulich und die kleinen Drüsen an den Schnabelseiten sind blauweiß. Im Jugendkleide erscheint das Gefieder an Oberkopf und Rücken aschgrau, Flügelschwingen und Oberschwanz dunkel schwärzlichgrau, Kehle weißlichgrau, Brust und Bauch hell aschgrau, bereits sehr schwach rosenroth überhaucht, und das ganze Gefieder zart gewellt, bis auf den fahlbraunen hintern Unterleib und dunkelbraunen Unterschwanz. Der rothe Streif um das Auge und den Schnabel ist lebhaft, jedoch sehr zart angedeutet. Auge schwarzbraun, Schnabel glänzend schwarz, die starken Füße bräunlichschwarz. Bei der Verfärbung tritt das Roth an Unterbrust und Bauch immer kräftiger hervor, während ebenso die dunkeln Wellenlinien deutlicher werden und dadurch das Gefieder weniger aschgrau und immer mehr dunkelbraun erscheint. Etwa in der fünften Woche beginnt der Schnabel lichter zu werden und geht dann durch immer hellere Schattirungen zum schönen Korallenroth über. In allem übrigen stimmt die Bruteutwickelung mit der des grauen Astrild überein.

Die Anmuth und Lieblichkeit des Helenafasänchens entfaltet sich namentlich, wenn man ein Pärchen frei in einer Vogelstube fliegen lassen kann. Dann gehören sie nicht allein zu den schönsten, sondern auch zu den liebenswürdigsten und friedfertigsten aller dieser kleinen Vögel. Ebenso verträglich und harmlos sind sie im Gesellschaftskäfige, wie im kleinen Bauer paarweise, auch im gleichen Geschlecht oder mit einem andern, nahverwandten Prachtfink zusammen. Dennoch darf man nicht zwei oder mehrere Pärchen in einem Raume nisten lassen;

die Männchen befehden sich zur Brutzeit gewöhnlich so heftig, daß keines der Pärchen zur erfolgreichen Aufzucht der Jungen gelangt. Auch hat man diesem Vögelchen etwas recht Böses nachgesagt. Herr Hauptmann von Schlegell in Altona beobachtete nämlich, daß die Helenafasänchen zuweilen ganz kleine, manchmal noch lebende Junge umhertrugen, und Herr Graf Yorck von Wartenburg bestätigte dies. Allein es ist nicht festgestellt worden, ob das Pärchen diese Jungen aus fremden Nestern gestohlen oder ob es die eigenen Jungen, wie dies auch andere Vögel leider nicht selten thun, aus dem Nest geworfen und fortgetragen. Da dieser Prachtfink nach entsprechender Fleischnahrung, vornehmlich Mehlwürmern, sehr lüstern ist, so liegt die Vermuthung nahe, daß ein Pärchen, welchem dies nothwendige Futter vielleicht fehlt, die eigenen oder fremde Jungen tödtet, um seine Gier zu befriedigen. Immerhin würde dies dann aber nur die absonderliche Untugend einzelner Vögel sein.

An einem Pärchen dieser Vögel, welche mich in meinem Arbeitszimmer aus der Vogelstube nebenan häufig besuchten, machte ich die Beobachtung, daß sie sehr gern und reichlich Stearin von einer Kerze naschten, und auch hieraus erhellt, wie nothwendig für sie, und natürlich alle Prachtfinken überhaupt Fett, am besten ein gewöhnliches Talglicht zur naturgemäßen Ernährung ist. Ebenso bemerkte Freiherr von Beust in Karlsruhe, daß die Helenafasänchen besonders mit frischen halbreifen Gräsersamen ihre Jungen glücklich durchfütterten.

In der weiteren Verpflegung, sowie in allen anderen, nicht besonders erwähnten Eigenthümlichkeiten stimmt der gewellte Astrild mit seinem nächsten Verwandten, dem grauen Astrild, überein. Doch wolle man darauf achten, daß das Helenafasänchen im Käfige nur selten zur erfolgreichen Brut gelangt, wenn derselbe nicht sehr groß und das Pärchen vor Beunruhigungen und Störungen geschützt ist. Als beste Nistvorrichtung giebt man ein umgekehrtes Harzerbauer, aus welchem man die obere und die eine schmale Seite fortgebrochen, so daß es oben und vorn offen ist.

Auch von diesem Prachtfink hat man bereits mehrfach Bastardbruten mit verwandten Arten erzielt. Herr Dr. Rey in Halle erzog vom gewellten und grauen Astrild Junge, Herr Baron von Freyberg vom gewellten und gelbbäckigen Astrild. Noch ungleich interessanter ist aber die Bastardbrut von einem männlichen Helenafasänchen und einem weiblichen Schmetterlingsfink, welche in der Vogelstube des Herrn Fabrikant Werner in Aarhuus in Dänemark flügge geworden. Diese Vögelchen waren im Jugendkleide oberhalb, an Kopf, Rücken und Flügeln dunkel schwarzgrau, Schwanz blauschwarz; unterhalb etwas heller, nur dunkelgrau mit röthlichem Anflug, besonders an dem noch lichteren Bauch; Schnabel dunkel blaugrau, mit himmelblauen Wärzchen der Wachshaut. Nach der Verfärbung erschienen die Männchen in folgendem wunderlichen Ge-

fieder: oberhalb die Farbe des Helenafasänchens, doch eine Schattirung dunkler und fast ohne Wellenzeichnung; dieselbe tritt nur verwaschen und unregelmäßig auf. Unterhalb, an Unterbrust, Bauch und Unterschwanz ist der Vogel dunkel blaugrau, nach den Seiten zu röthlich und an der Brust geht das Blau in Blauroth über. Von dem glänzend korallenrothen Schnäbelchen zieht sich, wie beim Helenafasänchen, ein breiter schön rother Streif ums Auge, der aber in einen etwas heller rothen, breiten Backenfleck sich erweitert. Die Weibchen sind einfarbig, fahlröthlichgrau mit sehr feinen dunklen Wellenlinien und unterhalb mit bläulichem Anflug. Noch ungleich interessanter erscheint aber die Bastardzucht zwischen Helena- und Silberfasänchen, welche dem Herrn Dreneckmann in Wernigerode geglückt ist. Auf die aus derselben hervorgegangenen Vögelchen werde ich in der Schilderung des Silberfasänchens zurückkommen.

Der gewellte Astrild heißt auch blos Astrild oder Fasänchen, großer Astrild, großes Fasänchen, rothbäuchiger Astrild, Rothbauch-Astrild, Helenafasänchen, Helenavogel, Helenavögelchen, Korallenschnäbelchen.

Astrild de St. Hélène (Vekemans); Astrild, Astrild undulée, Astrild du Sénégal, St. Hélène, Bec de cire, Bec de coraille undulée (bei den französischen Händlern); St. Helena-Waxbill (Jamrach), auch The undulée (bei den übrigen Londoner Händlern); St. Helena-fazantje (niederländisch); Red-bellied Waxbill (List of the animals in the Gardens of the Zoological Society of London).*)

Nomenclatur: Loxia astrild, *Linné*; Linaria cinerea orientalis, *Seligmann*; Senegalus striatus, *Brisson*; Fringilla astrild et rubriventris, *Vieillot*; Estrelda astrild et rubriventris, *Gray*; Habropyga astrild, *Cabanis, Heuglin, Finsch et Hartlaub;* Astrilda undulata, *Reichenbach.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb, ganze Oberseite, obere Schwanzdecken und Schwanzfedern hellbraun, mit feinen dunkleren Querlinien, welche auf dem Oberkopfe, Hinterkopfe und an den Halsseiten am zartesten und wenigsten sichtbar, auf den Schwanzfedern stärker, aber an der Außenfahne verwaschen sind; Schwingen dunkelbraun, mit sehr schmalen helleren Säumen an der Außenfahne; Zügelstreif hoch scharlachroth, das Auge ober- und unterhalb umsäumend; Kopfseiten, Kinn und Oberkehle bräunlichweiß; im übrigen unterhalb hellbraun mit dunkeln feinen Querlinien wie auf der Oberseite und blaß rosenroth überlaufen; Kehle und Kopf deutlicher rosenroth, in der Mitte der Unterbrust und des Bauches mehr oder weniger lebhaft scharlachroth; untere Schwanzdecken schwarz; untere Flügeldecken blaß rothgelblich-isabellfarben; Schwanz stufenförmig, stark gesteigert; Auge gelbbraun, Schnabel korallenroth, Füße dunkelbraun. Weibchen wie S. 43 angegeben. Jugendkleid S. 46.

Aegintha undulata. Supra pallide brunnea; tenuissime fusco fasciolata, subtus pallidior, similiter signata; crisso et subcaudalibus nigris; alis caudaque fuscis; rostro, striola per oculum mediisque pectoris et epigastrii coccineis; pedibus nigris; notaeo et gastraeo totis certa sub luce roseo lavatis.

*) Hier ist noch nachzutragen, daß der graue Astrild in der Liste des Londoner zoologischen Gartens Common Waxbill und in den Verzeichnissen der niederländischen zoologischen Gärten Grauwe St. Helena-fazantje benannt ist.

Länge 10,5 cm. (4 Zoll), Flügel 4,6 cm. (1 Z. 9 Linien), Schwanz 4,4 cm. (1 Z. 8 L.)

Juvenis: pileo dorsoque cinereis, remigibus et rectricibus nigro-cinereis; gula albido-cinerea, pectore abdomineque dilute cinereis, obsoletissime roseo-afflatis; plumis omnibus praeter crissum lurido-fuscum et subcaudales obscure fuscas, subtiliter undulatis; stria circa oculum rostrumque laete rubra, attamen tenuissima; iride nigro-fusca; rostro nitente, nigro; pedibus fortibus, subfusco-nigris.

Beschreibung des Eies: Länge 16 mm., Breite 12 mm. Farbe weiß, glänzend; Gestalt lange Eiform.

Ovum album, nitens, longiusculum.

Reichenbach führt sodann noch einen schwarzschwänzigen Astrild (A. nigricauda, *Rchb.*) an, welcher jedoch von dem grauen Astrild in Wirklichkeit sich nicht unterscheidet. Ferner hat man einen rothbäuchigen Astrild (A. rubriventris, *Vieill.*) beschrieben, welchen bereits Vieillot besessen und gezüchtet. Dieser l'Astrild à ventre rouge ist jedoch nur ein recht schönes, am Unterkörper lebhafter und kräftiger rothes Männchen des gewellten Astrild im Hochzeitskleide. Ebenso zeigt die westliche Lokalrasse (A. occidentalis, *Jard.*) keine wesentliche Abweichung von dem letzteren. Dagegen giebt es noch einige nahverwandte Arten, welche hier aufzuführen sind, obwol sie bisher noch nicht lebend in den europäischen Vogelhandel gelangten. Dies kann über kurz oder lang jedoch geschehen und ist, angesichts der immer lebhafter sich entwickelnden Liebhaberei für die kleinen Prachtfinken, wol sicher zu erwarten.

Der **Zügelastrild** [Aegintha rhodopýga] ist dem gewellten und noch mehr dem grauen Astrild sehr ähnlich und nur an den rothen oberen Schwanzdecken, rothgerandeten großen Flügeldecken und Armschwingen, sowie den an der Wurzelhälfte rothen Steuerfedern zu erkennen. Auch fehlt ihm der rosenfarbene Anflug an der Unterseite und das Roth am hintern Unterleibe völlig. Heuglin sagt, daß er ein Pärchen bei Keren an der Nordgrenze von Abessinien im dichten Gebüsch eines Regenbettes erlegt habe und daß der Vogel in Nordostafrika sehr selten sei. Weitere Nachrichten fehlen und daher bedarf es nur dieser beiläufigen Erwähnung.

(Habropyga rhodopyga, *Sund., Gray, Finsch et Hartlaub;* Fringilla frenata et effrenata, *Licht.;* Habropyga frenata, *Cab., Heugl.;* Habropyga leucotis, *Heugl.;* L'Astrild bridé; The bridled Astrild).

Der **rothbärtige Astrild** [Aegintha rufibarba] ist dem grauen Astrild ähnlich, doch etwas größer. Färbung oberhalb satter graubräunlich, ohne röthlichen Anflug, überall mit Ausnahme des Scheitels fein, doch sehr bemerkbar quergestreift; Kehle, Wangen und Unterschwanz grau-, fast reinweiß; unterhalb heller, ganz ohne rosenrothen Anflug und rothen Bauchfleck; Schwanz bläulichschwarz, obere Schwanzdecken schwarz, zuweilen fein hochroth gespitzt. Heuglin meint, daß dies Vögelchen im Nilgebiet nicht vorkomme. Im Berliner Museum sind von

Ehrenberg und Hemprich im südarabischen und abessinischen Küstenlande eingesammelte Exemplare vorhanden. Weiteres ist über den Vogel nicht bekannt. Sobald uns Afrika mehr aufgeschlossen wird, dürfen wir auch die Einkehr solcher seltenen Gäste in unsere Vogelstuben erwarten. Uebrigens kann ich nicht begreifen, weshalb man diesen Vogel eigentlich den rothbärtigen Astrild benannt hat.

(Fringilla rufibarba et buccalis, *Ehrbg.;* Habropyga rufibarba, *Cab., Heugl.;* Estrilda rufibarba. *Gray.* L'Astrild à barbe rouge; The red-bearded Astrild).

Der orangebäckige Astrild [Aegintha melpóda].

Tafel I. Vogel 4.

Es gehört jedenfalls ein aufmerksamer und zugleich liebevoller Blick dazu, um die Gewohnheiten dieser Vogelwelt so zu erforschen, daß man selbst bei den zahlreichen nahverwandten Arten an jeder einzelnen diejenigen Eigenthümlichkeiten aufzufinden vermag, welche als charakteristische Unterscheidungsmerkmale in Hinsicht der Lebensweise und des ganzen Wesens überhaupt gelten dürfen. Recht schwer hält dies namentlich bei diesen allerliebsten kleinen Prachtfinken. Hier sieht selbst der Kenner gewöhnlich keinen andern Unterschied, als die allerdings sehr auffallende und mannigfaltig verschiedene Färbung des Gefieders. Dennoch muß ich, da das oben genannte Ziel als eine der Hauptaufgaben aller Vogelliebhaberei zu erachten ist, dahin streben, das Lebensbild eines jeden einzelnen Vogels den Lesern in diesem Sinne vorzuführen.

Wenn gegen die Dämmerung hin die Bewohnerschaft der Vogelstube und insbesondere die Prachtfinken noch eine ungemeine Rührigkeit entfalten, indem sie entweder zuguterletzt den Futterplatz emsig bevölkern oder bereits um die bequemste Ruhestätte sich zanken, so erscheint der orangebäckige Astrild, von den Händlern Orangebäckchen genannt, als einer der lebhaftesten. Die ganze Gesellschaft ist harmlos mit ihren verschiedenen Verrichtungen beschäftigt, da macht der Beobachter eine unwillkürliche hastige Bewegung — und mit schrillem ßit, ßit! jagt das männliche Orangebäckchen alle Genossen sofort in die Flucht. Es ist nämlich der Warner unter diesen Vögeln. Förmlich mit Argusaugen scheint es über die Sicherheit der ganzen Gemeinschaft zu wachen; wenn das Fenster einer vorüberfahrenden Droschke einen plötzlichen Lichtschein an die Decke der Vogelstube wirft, wenn ein Papierdrachen oder ein Taubenschwarm in die Luft sich erhebt, namentlich aber bei jeder ungewöhnlichen Erscheinung in der Nähe, — als z. B. eine Besucherin ihren Muff mitgebracht — immer schreckt der Warnungsruf des Orangebäckchens diese ganze gefiederte Welt aus ihrer Gemüthlichkeit auf und versetzt sie nicht selten in stundenlange Unruhe. Dennoch durfte ich den kleinen

Störenfried nicht entfernen, da ich doch auch ihn züchten, seine Brut und Entwickelung beobachten wollte.

Uebrigens muß ich nebenbei bemerken, daß fast immer irgend ein Mitglied einer solchen Gesellschaft dies Wächteramt in mehr oder minder eifriger und auffallender Weise übernimmt, wie dies ja auch bei den Herden und Scharen freilebender Thiere vielfach beobachtet werden kann. Die in der Vogelstube gehaltenen und beisammen lebenden Vögel müssen sich also ebenfalls gleichsam als eine gesellige Gemeinschaft betrachten. Nachdem ich das Orangebäckchen späterhin nach glücklicher Züchtung und Erreichung meines Ziels entfernt hatte, um die fortwährenden Störungen abzustellen, welche für alle übrigen Bruten natürlich sehr schädlich sich zeigten — übernahm das Amt des Warners sogleich ein Hartlaubszeisig, zu anderer Zeit wiederum ein weiblicher Schmetterlingsfink, dann ein Männchen der grauköpfigen Zwergpapageien u. s. w.

Der orangebäckige Astrild ist einer der zierlichsten aller dieser kleinen Afrikaner. Sein Vorderkopf ist bläulichaschgrau, der Hinterkopf bräunlichgrau, das ganze obere Gefieder ist dunkler aschgrau mit schwarzbraunem Schwanz und glänzend fuchsrothem Bürzel. Dazu stehen die dunkel orangegelben Wangen nebst rothem Augenbraunenstreif, die grauweißliche Kehle und die fleischrothen Füße dem Vogel ungemein hübsch. Das Weibchen ist vom Männchen nur durch die viel weniger lebhafte Farbe der Bäckchen, Augenbrauen und des Bürzels zu unterscheiden. In der Größe stimmt auch dieser Prachtfink mit dem grauen Astrild überein, nur erscheint er schlanker.

Auch in seinen gewandten Bewegungen ist das Orangebäckchen jenem nahen Verwandten durchaus ähnlich, nur lebhafter und unruhiger, immer munter und regsam. Die angenehme Färbung mit den allerliebsten orangegelben Bäckchen, die schlanke, zierliche Gestalt und die Liebenswürdigkeit des Benehmens lassen dies Vögelchen wiederum zu den beliebtesten zählen. Dabei ist es durchaus nicht weichlich, sondern gehört zu den kräftigsten und ausdauerndsten unter diesen kleinen Prachtfinken. In einer Schmuckvolière und im Gesellschaftskäfige zeigt es eben jene anmuthige Beweglichkeit, welche viele Freunde der Prachtfinken sehr lieben. Sein zwitschernder Gesang ist von keiner Bedeutung, allein wenn das Männchen, den Schwanz zierlich ausbreitend und taktmäßig hin und her bewegend, den Kopf in die Höhe streckend, mit knixenden Bewegungen und unter lautem Geschmetter seinen Liebestanz aufführt, so entfalten auch diese Vögelchen ein allerliebstes Bild. Aeußerste Aengstlichkeit, gepaart jedoch mit einer gewissen Keckheit und vielwagenden Neugierde, dürften die bezeichnendsten Eigenthümlichkeiten dieses Vogels sein. Dr. Luchs rühmt vorzugsweise seine Sauberkeit und das immer glatte und volle Federkleid. In interessanter Weise schildert er die Neugierde eines Pärchens. Jede fremde Erscheinung umhüpfen sie schwanzwippend und jeden

ungewöhnlichen, auffallenden Laut beantworten sie mit einem mehrmals schnell wiederholten Srisrisrisri!

Vieillot sagt über den Bengali aux joués orangées sehr wenig; er hielt ihn für sehr weichlich und deshalb 22 bis 25 Grad Wärme bei seiner Züchtung für nothwendig. Reichenbach theilt auch beinahe nichts über ihn mit, als die unrichtige Behauptung, daß er einen zarten, lieblichen Gesang hören lasse. Ebenso haben die Afrikareisenden bis in die neuere Zeit hinauf über das Freileben dieses Vogels kaum erwähnenswerthe Angaben gemacht, und dies scheint um so mehr verwunderlich, da sie alle darin einig sind, daß dieser Astrild zu den zahlreichsten Finken Afrikas gehört. Seine Verbreitung dürfte nahezu die des grauen Astrild sein, sich jedoch vielmehr über den Westen Afrikas erstrecken. Beobachtet ist er am Senegal, Kap Lopez, in Angola u. s. w.; neuerdings fand ihn Dr. Reichenow häufig in den Ebenen an der Goldküste. Dieser Forscher meint, daß er nicht ins Gebirge hinaufgehe.

Wenn keine Störung eintritt oder überhaupt kein Gegenstand vorhanden ist, über den die Orangebäckchen in Entrüstung und Furcht gerathen können, so zeigen sie ebenfalls ein ungemein liebenswürdiges Benehmen. Ihre ausdrucksvollen Schwanzbewegungen erscheinen namentlich interessant bei der Wahl des Nistorts. Da wippen die Schwänze nicht hastig auf und ab, sondern von einer Seite zur andern in einem gewissen Bogen und diese Bewegungen drücken zweifellos die Gefühle der erwägenden und prüfenden Wahl aus. Die Oertlichkeit des Nestes muß immer dem hervorstechendsten Charakterzuge, eben der Aengstlichkeit, entsprechen; es steht entweder frei im sehr dichten Gebüsch oder ist in dem Korbnest eines hochhängenden, offenstehenden Käfigs angelegt. Hier wird nun in eifrigster Weise eingetragen und zwar schleppen beide, Männchen und Weibchen, mit gleichem Eifer eine ungeheure Masse von Baustoffen zusammen und formen daraus ein außerordentlich künstliches, kugelrundes Nest mit einem sehr engen, kreisrunden und zierlich geglätteten Schlupfloch, ohne angehängte Einflugröhre. Giebt es in der Vogelstube frische Spargelzweige, so baut das Orangebäckchen mit Vorliebe aus diesen, andererseits aber auch aus mancherlei anderen dünnen und biegsamen Stoffen, wie besonders gern aus Aloë- oder Agavefasern, welche den Webervögeln geboten werden.

Mit Bestimmtheit darf ich nicht behaupten, daß ich auch diesen Prachtfink zuerst in der Gefangenschaft gezüchtet; außer meiner Vogelstube ist er in denen der Herren Linden, Dr. Rey, Freiherr von Beust, Hendschel u. A. zum erfolgreichen Nisten geschritten, und in Uebereinstimmung mit den genannten Züchtern beschreibe ich dasselbe.

Die Brut besteht fast regelmäßig aus drei bis vier, jedoch auch bis zu sieben Eiern. Soweit gedeiht dieselbe übrigens sehr häufig, denn einerseits sind

dieſe kleinen Prachtfinken, ihrem hurtigen Weſen entſprechend, außerordentlich flink mit der Errichtung des Neſtes fertig und andererſeits entwickeln ſie ebenfalls eine ſtaunenswerthe Fruchtbarkeit. Allein zum glücklichen Ausfliegen der Jungen kommt es doch nur höchſt ſelten. Sobald irgend eine wirkliche oder vermeintliche Störung, nur ein unbeſtimmtes Geräuſch wahrnehmbar wird, huſchen ſie vom Neſt herunter und wol ſtundenlang ſcheltend und zirpend durch das Gebüſch, bevor ſie es wagen, wieder hineinzuſchlüpfen — um im nächſten Augenblick ebenſo davon zu flüchten. Nach der übereinſtimmenden Meinung aller erfahrenen Vogelwirthe gehört dieſer Vogel daher zu denen, welche am ſchwierigſten zu züchten ſind; denn ſelbſt als ich ein Pärchen gezähmt und ganz zutraulich gemacht hatte, vermochten ſie es durchaus nicht, dieſe ſeltſame Aengſtlichkeit zu überwinden, ſo daß auch aus ihrer Brut kein erfreuliches Ergebniß hervorging.

Beide Gatten des Pärchens brüten auch gemeinſchaftlich, denn ſie hängen ſo innig aneinander, daß ſie ſich kaum für Augenblicke trennen mögen. Die Brutdauer und Entwickelung der Jungen iſt der des grauen Aſtrild gleich. Der Neſtflaum der Jungen erſcheint gelblichgrau mit reinweißen Schnabeldrüſen. Das Jugendkleid iſt oberhalb hell aſchgrau, unterhalb noch heller grau, mit bräunlichem Grundton, Schwanz- und Flügelfedern dunkler, ſchwach röthlichgrau, Bürzel röthlichgelb, nur wie angehaucht, Bäckchen ſchwach hellgelb; Schnabel und Füße ſchwarz. Die Verfärbung beginnt ſchon in der dritten Woche, durch immer deutlicheres Hervortreten der farbigen Abzeichen, und iſt in der fünften Woche ſo weit vollendet, daß das Schnäbelchen durch immer hellere Schattirungen glänzend roth geworden.

In allem übrigen iſt der orangebäckige dem grauen Aſtrild durchaus gleich, auch im Preiſe. Bei den Großhändlern, beſonders in Antwerpen, ſtehen die Orangebäckchen faſt regelmäßig etwas höher und gelten meiſtens 6—8 Frcs. Sie kommen jedoch nur ſelten entfedert in den Handel und ſind faſt immer zu haben.

Die Seite 41 erwähnten Miſchlinge aus einer Brut vom männlichen Orangebäckchen und weiblichen grauen Aſtrild hatten folgendes Jugendkleid: Kopf, Hals und ganze Oberſeite fahl aſchgrau, Bruſt und Bauch weißlichgrau, letzterer ſchwach roſa angehaucht. Rings um das Auge war eine zarte roſenrothe Färbung bemerkbar, welche den Bäckchen des alten Männchens entſpricht. Schwanz ſchwarz, Bürzel zimmtbraun; Schnabel ſchwarz mit weißer Wachshaut. Nach der Verfärbung glichen die jungen Vögel in Geſtalt und Farbe vollſtändig dem grauen Aſtrild, nur zeigte ſich unterhalb des etwas breiteren rothen Augenbrauenſtreifs die Backenzeichnung des Orangebäckchens, aber nicht in gleicher Farbe, ſondern ſchön roſenroth und auf dem Bürzel hatten ſie das volle Fuchsroth des Orangebäckchens, während der Unterleib kräftig roſenroth überhaucht war. Die gleichen Miſchlinge haben außer Herrn Hendſchel auch noch andere Vogelliebhaber, beſonders Herr Freiherr von Beuſt auf Wertheim, gezogen.

Der orangebäckige Astrild heißt auch Orangebäckchen, Orangewange, orangebäckiges Fasänchen, Gelbbäckchen und gelbwangiger Astrild.

Joué orangé (bei Vekemans und den französischen Händlern); Orange-cheeked Waxbill (bei Jamrach und in der Liste des Londoner zool. Gartens); Bengueli au Melpoda à joués orangées (Pariser Händler); Orangé checked Melpoda (Londoner Händler); Oranje-backed Astrild (niederländisch).

Nomenclatur: Fringilla melpoda, *Vieillot;* Fringilla lippa, *Lichtenstein;* Habropyga melpoda, *Hartlaub, Cabanis etc.;* Estrilda melpoda, *Gray;* Melpoda lippa, *Reichenbach.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb, Rücken und Flügel röthlichhellbraun, Ober- und Hinterkopf bläulichaschgrau; Augenbrauenstreif, ober- und unterhalb des Auges gelblichroth; Wangen lebhaft orangeroth; Kehle grauweiß; unterhalb zart bräunlichaschgrau, nach hinten zu und an den Schenkeln dunkler, an der Brust und Bauchmitte heller aschgrau; hinterer Unterleib zart orangegelb; Schwanz dunkelbraun mit fuchsrothem Bürzel. Schnabel glänzend roth; Auge goldbraun, Füße bräunlichgrau. Weibchen wie Seite 52 angegeben; doch namentlich durch das Fehlen oder die viel schwächere Färbung des gelben Bauchflecks zu erkennen. Jugendkleid Seite 54.

Aegintha melpoda. Supra dilute brunnea, pileo dilute cinereo; cauda plumbea, tectricibus caudae superioribus coccineis; macula ante-oculari striolaque supraciliari laete miniato-aurantiacis, genis magis aurantiacis; subtus canescens, gula et pectore albidioribus, abdomine magis brunnescente; rostro rubro.

Länge 10 cm. (3 Z. 6 L.), Flügel $4{,}_8$ cm. (1 Z. 8 L), der gerade abgeschnittene Schwanz $4{,}_2$ cm. (1 Z. 6 L.).

Juvenis supra dilute cinerea, subtus fuscescente cana; remigibus et rectricibus obscurioribus, rufescente cinereis; uropygio obsolete vitellino; genis flavo-afflatis; rostro pedibusque nigris.

Beschreibung des Eies: Farbe reinweiß, matt; Gestalt länglich mit deutlicher Spitze. Länge 16 mm., Breite 12 mm. Ovum pure album; opacum, sublongum, apice distincto.

Der Sumpfastrild [Aegintha paludicola]. Heuglin erwähnt, als dem orangebäckigen Astrild sehr nahestehend, diesen Vogel, von dem es ihm jedoch nur gelungen ist, einige Weibchen zu erlegen. Da er eine vorzügliche Abbildung gegeben, nach welcher dieser Astrild mit keinem andern übereinstimmend erscheint, so will ich ihn hier wenigstens mitzählen, vorausseţend, daß demnächst Weiteres über ihn bekannt, bezüglich daß er auch lebend bei uns eingeführt werde. Der Reisende sagt über ihn Folgendes. Dieser Vogel steht dem orangebäckigen Astrild am nächsten, ist aber abweichend gefärbt von allen hierher gehörenden Verwandten. Sein Mantel ist ziemlich lebhaft hirschbraun, ohne Beimischung von Grau und die Querstreifung ist noch feiner, als beim grauen Astrild. Ich konnte nur wenige Weibchen dieser zweifellos neuen Art einsammeln und zwar in den Monaten Februar, März und April. Sie hielten sich im Hochgras der Sümpfe längs des Gazellenflusses auf der Insel Req, in Bongo und Dembo auf. Es sind recht muntere, geschwätzige Vögelchen, die sehr geschickt im Schilf und auf Gras-

stengeln umherklettern, sich wiegen und wenn sie aufgescheucht werden, niedrig, rasch und lärmend abstreichen, um auf dem nächsten Grasbusch wieder einzufallen. Die Locktöne bestehen in ziemlich leisem Zirpen und Schwätzen.

Da der Naturforscher keine Männchen davon erlegt hat, so verlohnt es sich nicht, eine nähere Beschreibung zu geben. Sollte das Vögelchen vor dem Schluß dieses Bandes noch auf den Vogelmarkt gelangen, so werde ich eine solche im Anhange bringen.

Nomenclatur: Habropyga paludicola, *Heuglin;* Estrelda paludicola, *Hgl.*

Der grüne Astrild [Aegintha viridis]. Reichenbach giebt auch eine Abbildung von dem Bengali vert Vieillot's, welchen der Letztere in zwei lebenden Exemplaren bei M. Becoeur gefunden hatte. Dies Vögelchen soll in der Mitte eines niedrigen Busches aus feinen Kräutern, Haaren und Federn sein Nest erbauen. Da aber Hartlaub bei gelegentlicher Erwähnung hinzusetzt, daß es eine, von ihm nie gesehene, erst weiterer Bestätigung bedürfende Art sei, und da alle übrigen Afrikareisenden den Vogel gar nicht mitzählen, so darf ich wol die Annahme aussprechen, daß hier eine Verwechslung vorliege — und zwar glaube ich, daß zu derselben der kürzlich von Hagenbeck eingeführte sogenannte grüne Bengalist oder richtiger gelbgrüner Astrild [A. formosa] geheißen, die Veranlassung gegeben. Die Schilderung desselben erfolgt weiterhin.

Nomenclatur: Fringilla viridis, *Vieillot;* Estrelda viridis, *Hartlaub, Gray;* Astrilda viridis, *Reichenbach.*

Der schwarzköpfige Astrild [Aegintha atricapilla].

In einer Sendung afrikanischer Vögel von Ch. Jamrach in London erhielt ich einen kleinen, düster gefärbten Prachtfink mit schwarzer Kopfplatte und bräunlich scharlachrothem Unterleibe. Es ist der von Verreaux zuerst beschriebene, in Westafrika, namentlich Gabon heimische Schwarzkopf-Astrild, welcher bis jetzt lebend noch nicht nach Europa gebracht sein dürfte. Denn meine Anfragen haben ergeben, daß man ihn weder in den größten zoologischen Gärten jemals erhalten, noch daß die Großhändler ihn bisher gesehen hatten. Das unscheinbare Vögelchen fällt nur besonders durch den schön rothen Bürzel ins Auge. Es steht dem grauen Astrild augenscheinlich sehr nahe, denn es zeigt durchaus die Lebensweise desselben, auch paarte sich das einzeln in meiner Vogelstube vorhandene Männchen sogleich mit einem Grauastrild-Weibchen.

Der schwarzköpfige Astrild ist oberhalb dunkelgrau, überall fein schwarz quergestreift, auf den Flügeln am stärksten, doch sind die großen Schwingen ungestreift schwarzbraun und der Oberschwanz reinschwarz; Kopfplatte reinschwarz; Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelroth. Unterhalb, Gesicht, Backen, Kehle und Oberbrust hellgrau, Unterbrust dunkler aschgrau, Bauch, Unterleib und Unterschwanz

schwarzgrau; Bauchseiten und Schenkel düster scharlachroth. Auge goldbraun; Schnabel schwarz mit gelber Wurzel des Unterschnabels; Füße dunkelbraun; Größe des gewellten Astrild.

Ueber die Lebensweise des Vogels in der Heimat ist fast gar nichts bekannt. Verreaux beschreibt ihn nur ganz kurz und auch die übrigen Forscher fügen nichts Weiteres hinzu. Auf den ersten Blick macht das Vögelchen den Eindruck, als sei es ein im engen, düstern Käfig schwarz gewordener Grauastrild und daher mag es wol zuweilen bei den Großhändlern vorhanden sein, aber übersehen werden.

Nomenclatur: Estrelda atricapilla, *Verreaux*, *Hartlaub*, *Gray*.

Wissenschaftliche Beschreibung (siehe oben).

Aegintha atricapilla. Cinerea, supra minutissime undulatim fasciolata; subtus tota cinerea; crisso nigricante; pileo, cauda, rostro pedibusque nigris; tergo, uropygio, supracaudalibus et hypochondriis dilute coccineis.

Länge 9 cm. (3½ Z.); Flügel 4,6 cm. (1 Z. 10,5 L.); Schwanz 3,3 cm. (1 Z. 8 L.).

Der schwarzbäckige Astrild [Aegintha Dufresnei].

Tafel III. Vogel 15.

Im Jahre 1869 erhielt Hagenbeck in Hamburg in einem Käfige mit seltenen australischen Vögeln zusammen zum erstenmale diesen kleinen Afrikaner, ein zierliches Vögelchen von der Größe des grauen Astrild. In meinem „Handbuch" habe ich ihn nach Reichenbach als Scharlachbürzel aufgeführt; richtiger ist jedoch die obige Benennung, weil es unter den Prachtfinken mehrere giebt, welche einen rothen Bürzel und Oberschwanz haben, so daß also leicht Irrthümer eintreten könnten.

Der schwarzbäckige Astrild fällt durch sein schwarzes Gesicht, mit weißlicher Kehle und gleichem Oberhals, bei angenehm grüngrauem Gefieder und glänzend scharlachrothem Bürzel, nebst schwarzem Ober- und rothem Unterschnabel, als eine liebliche Erscheinung ins Auge. In seinen anmuthigen Bewegungen ist er den nächsten Verwandten, Grauastrild und Orangebäckchen sehr ähnlich, doch etwas ruhiger.

Dies Vögelchen gehört zweifellos zu den seltensten Erscheinungen auf dem Vogelmarkt. Unter den Preisverzeichnissen der größten Handlungen führt ihn nur das von Ch. Jamrach in London auf, und meine Bemühungen, ihn noch einmal zu erlangen, waren bis zum Frühjahre 1874 durchaus vergeblich. Dann erst empfing ich wiederum von Hagenbeck zwei Männchen.

Die Literatur theilt über diesen Vogel äußerst wenig mit, obwol er in allen Museen vorhanden und wahrscheinlich in seiner Heimat gar nicht so sehr selten ist. Vieillot hat ihn in seinem großen Bilderwerk noch nicht aufgenommen, dagegen in dem systematischen Werke beschrieben.

Die Heimat des schwarzbäckigen Astrild erstreckt sich über Süd- und Westafrika. Die Reisenden haben ihn in Trupps von 8—10 Köpfen in Grasdickichten gefunden, deren Sämereien seine Nahrung bilden. Das Nest soll dem des Grauastrild ähnlich sein und etwa bis zur zweifachen Manneshöhe stehen. Weiteres ist über die Lebensweise nicht bekannt.

Heuglin beschreibt ein hierher gehörendes Vögelchen [A. Ernesti], welches er für eine vom schwarzbäckigen Astrild verschiedene Art hält, während Finsch beide als übereinstimmend erklärt. Für die Liebhaberei fallen sie jedoch ganz entschieden zusammen und daher sei die Schilderung des ersteren Reisenden hier angeführt.

Ein äußerst liebliches, munteres Vögelchen, das wir paar- und gesellschaftsweise in den Bogos-Ländern, Tigrie, Semien, bei Gondar und im Wololande etwa zwischen $1_{,33}$—$3_{,33}$ Tausend Meter Meereshöhe sahen. Es lebt vorzüglich an sonnigen Gehängen, in deren Nähe Gewässer sind, auf Felsen, Büschen und im Hochgras, und scheint Standvogel zu sein, der von uns in den Monaten August bis April beobachtet wurde. Im September fanden wir Junge und im Januar noch ein Nest mit sechs reinweißen Eiern in einer Felsritze. Es war nicht eben kunstreich, ähnlich dem des kleinen Karminastrild, angelegt. Die jungen Vögelchen gleichen den alten, sind aber viel blasser, an der Unterseite mehr isabellfahl gefärbt. Dieser Vogel ist scheu und flüchtig und daher nicht leicht zu erlegen. Sein Gesang (?), obwol nicht laut, ist recht lieblich und abwechselnd, der Lockton ein leises Zirpen. Der Magen enthielt Grassämereien.

Die ersten schwarzbäckigen Astrilde, von denen ich zwei richtige Pärchen erhielt, trugen sämmtlich den Todeskeim in sich und starben in wenigen Tagen, wie dies bei soeben angekommenen Vögeln ja leider nur zu häufig geschieht. Es ist wenig Hoffnung vorhanden, daß dieser kleine Prachtfink jemals in größerer Anzahl eingeführt werden könnte; er wird immer eine Seltenheit des Vogelmarkts bleiben.

Der schwarzbäckige Astrild wird auch Schwarzbäckchen, Dufresne's Scharlachbürzel oder blos Scharlachbürzelchen genannt.

In Ch. Jamrach's Preisliste steht er als Dufresni's Waxbill; in der Liste d. zool. Gart. v. London Dufresne's Waxbill; Schwart-baccen Astrild (niederländisch).

Nomenclatur: Fringilla Dufresnei, *Vieillot;* Fringilla neisna, *Lichtenstein;* Estrilda melanogenys, *Sundeval;* Estrelda Dufresnei, *Hartlaub;* Coccopygia Dufresni, *Reichenbach.* — Red-rumped Finch, *Brown;* The black-eared Veaver-Finch; Le tisserin Dufresne; Tisserin melanotis ou melanogenys.

Wissenschaftliche Beschreibung. Kopf, Oberhals und Ohrgegend dunkel grünlichgrau; Mantel und Schultern olivengrün mit zarten dunkleren Querlinien; Flügelschwingen braun mit gelblichgrünen Außenrändern; Schwanz schwarz, jede Feder fein heller gesäumt;

Hinterrücken, Bürzel und Oberſchwanzdecken ſchön ſcharlachroth. Unterhalb, Geſicht, Backen und Kehle tiefſchwarz; Halsſeiten und Kropf weißlichgrau; Bruſt, Bauch, Hinterleib und Unterſchwanz aſchgrau bis bräunlichgrau, zart ockergelb überhaucht. Oberſchnabel ſchwarz, Unterſchnabel gelblichroth; Füße ſchwärzlichbraun; Auge dunkelbraun. Das Weibchen zeigt dieſelben, jedoch matteren Farben und iſt an Backen und Kehle nur ſchwärzlich grüngrau, auch iſt der Bürzel weniger lebhaft roth.

Länge 10,5 cm. (4 Z.); Flügel 4,6 cm. (1¾ Z.); Schwanz 3,9 cm. (1½ Z.).

Aegintha Dufresnei. Pileo, regione parotica, unchaque obscure glauco-cinereis; interscapilio humerisque olivaceo-viridibus, subtiliter obscurius undulatis; remigibus fuscis, extus flavoviride marginatis; rectricibus nigris, tenuiter dilutius limbatis; tergo, uropygio tectricibusque supracaudalibus late puniceis; facie, genis gulaque atris; colli lateribus, guttureque incanis; pectore, abdomine crisso et tectricibus infracaudalibus cinereis subochraceo-afflatis; maxilla rostri nigra, mandibula fulva; iride obscure fusca; pedibus piceis. Femina itidem, sed obsoletius colorata genis gulaque solis nigricante glaucis; uropygio pallidius rubro.

Der rothſchwänzige Aſtrild [Aegintha coerulescens].

Tafel I. Vogel 3.

In Hinſicht ganz abſonderlicher Schönheit, welche ſo recht die Farbenpracht der Tropen wiederſpiegelt, ſteht der bei den Liebhabern und Händlern als Schönbürzel oder Grisbleu allbekannte Bengali grisbleu Vieillot's unter allen dieſen kleinen Prachtfinken hoch obenan.

Dies Vögelchen iſt am ganzen Körper, mit Ausnahme des Schwanzes, Bürzels und Hinterrückens, ſchön blaugrau, hinterwärts dunkler grau, und vorn erſcheint er gleichſam wie weiß bereift, während jene erwähnten Theile prachtvoll dunkel blutroth ſind. Das Schnäbelchen iſt dunkelroth, ein feiner Streif durchs Auge iſt ſchwarz und die Weichen ſind beiderſeits mit einigen weißen Pünktchen gezeichnet.

Vieillot ſagt über ihn, daß er ebenſo als die nächſten kleinen Verwandten dazu geeignet ſei, ſich bei uns einzubürgern und in der Gefangenſchaft fortzupflanzen. Er verlange dieſelbe Sorgfalt und hohe Temperatur, als die anderen zarten Arten, auch ſolle man ihm Gebüſch zum Aufenthalt geben.

Wiſſenſchaftlich unterſcheidet man drei hierher gehörende, einander überaus ähnliche Vögel. Der eigentliche rothſchwänzige Aſtrild [A. coerulescens] hat rothen Ober- und Unterſchwanz, ſowie rothen Bürzel und Unterrücken. Der zweite, welcher hier Natalaſtrild [A. incana] benannt ſei, zeigt nur die oberen Schwanzdecken, Bürzel und Hinterrücken roth, während die Schwanzfedern dunkelolivenbraun ſind. Rothbürzel [A. Perreini] iſt die paſſendſte Bezeichnung für den letzten, welcher ſich dadurch unterſcheidet, daß ſeine unteren Schwanzdecken und der hinterſte Theil des Unterkörpers ebenfalls ſchwarz gefärbt ſind. Nach meiner Anſicht handelt es ſich bei dieſen drei Vögeln wol nur um die verſchiedenen Altersſtufen oder allenfalls um Abänderungen mehrerer Lokalraſſen. In der er-

steren Annahme bestätigt mich das weiterhin beschriebene Jugendkleid und die Verfärbung. Da jedoch in den ausschließlich wissenschaftlichen Lehrbüchern alle drei als besondere Arten auseinandergehalten werden, so muß ich dieser Anschauung hier natürlich Rechnung tragen. Für die Liebhaber und Züchter aber haben die Verschiedenheiten drei so übereinstimmender Vögel keine weitere Bedeutung. Ich schildere daher das von den deutschen Vogelwirthen vielfach gehaltene und auch hier und da gezüchtete Rothschwänzchen oder Schönbürzelchen im allgemeinen und bemerke, daß dasselbe in allen drei Arten oder Varietäten in den Handel gelangt, am meisten der eigentliche Rothschwanz und viel seltener die beiden anderen.

Beim Beginn meiner Zuchtversuche hatte ich gerade mit diesem Vogel absonderliches Unglück. Nachdem ich fünf Pärchen zugleich angeschafft und dadurch auf dem schon mehrfach erwähnten Wege richtige Heckpaare erhalten, fand ich zunächst die Behauptung der Händler bestätigt, daß dieser Prachtfink vorzugsweise zart und weichlich sei. Gewöhnlich kommen die Rothschwänzchen in besonders entfedertem und kläglichem Zustande von den Transportschiffen aus in die Großhandlungen, und dann gehört bei den weiteren Versendungen nur wenig Nässe, Zugluft oder plötzliche Temperaturveränderung dazu, um den zarten Lebensfaden der Vögelchen zu vernichten. Haben sie sich jedoch erst einigermaßen erholt und wieder ein volles Gefieder erlangt, so sind sie gegen die Kälte doch nicht ganz so empfindlich, als manche andere Art, z. B. der Schmetterlingsfink.

Wenn der rothschwänzige Astrild aber wieder völlig erstarkt ist und mit den Vorbereitungen zum Nisten beginnt, so zeigt er sich erst in seiner vollen Schönheit. Dann kann man sich kaum ein lieblicheres Vogelpärchen denken, als gerade dieses. Anmuthig und zierlich in jedem Thun, sind sie den ganzen Tag hindurch in beständiger Regsamkeit. Dabei erscheinen sie ungleich zarter im Wesen, schüchterner und doch zutraulicher als der graue Astrild und die übrigen Verwandten. Es hält durchaus nicht schwer, diese Vögelchen so zu gewöhnen, daß sie nach kurzer Frist auf die Hand kommen und einen Mehlwurm aus den Fingern holen. Der Flug ist mehr schwebend und keineswegs so hurtig und hart, als bei den anderen. Auch ihre leisen wispernden Locktöne oder ihre hellen Flötenrufe erklingen sanft und melodisch, nicht schrill und gellend. Einen wirklichen Gesang hat auch dieser Astrild nicht.

Die Rothschwänzchen, welche sich in meiner Vogelstube sehr gut erholt hatten, begannen dann bald einander auf das hitzigste zu befehden, so daß ich bis auf ein Pärchen alle übrigen herausfangen mußte. Dieses fing sogleich an zu nisten. Beide Vögelchen trugen zarte Spargeläste, Bastfasern und Fäden in ein sehr hochhängendes Harzer Bauerchen, welches ein mit Leinewand ausgenähtes Körbchen enthielt, und in diesem formten sie ein kugelrundes Nest mit einem sehr engen, so kleinen Schlupfloch, daß man fast glauben mußte, der Vogel könne gar

nicht hindurch gelangen. Da gerade zu dieser Zeit noch sehr schöne Herbsttage einkehrten, so öffnete ich zwei große Fensterflügel der Vogelstube, welche mit einem Gitter aus Drahtgaze ausgestattet waren. Obwol der Rahmen des Gitterfensters an der einen Wand nur einen ganz geringen Zwischenraum hatte, so mußte ich doch annehmen, daß meine reizenden Schönbürzel durch diese Oeffnung entschlüpft seien, denn sie waren von jenem Tage an durchaus verschwunden. Ich bedauerte nun nicht allein das vor wenigen Tagen fertige verlassene Nest, sondern auch und noch viel mehr meine armen, den schon sehr rauhen Herbstnächten im Freien preisgegebenen Rothschwänzchen.

Der Ort, an welchem das Harzer Bauerchen hoch oben in der Nähe der Zimmerdecke sich befand, war sehr schwer zugänglich, weil unterhalb viel dichtes, gerade reichlich mit Nestern besetztes Gebüsch angebracht war. Bis zum Ausfliegen der Jungen aus einigen dieser Nester mußte ich die Untersuchung der Rothschwänzchenbrut also verschieben. Als ich aber dazu kam, jenes Harzer Bauerchen herunterzunehmen — wer beschreibt da meine Verwunderung und meinen Aerger! Zunächst fand ich das Nest der Rothschwänzchen völlig verschlossen, so daß ich nirgends eine Oeffnung entdecken konnte, und als ich das Schlupfloch ausräumte, sah ich, daß es mit den Rispen verschiedener zum Nestbau dienender Gräser fest verstopft war. Darinnen waren die beiden Vögelchen kläglich verhungert über fünf nahezu ausgebrüteten Eiern.

Weitere Beobachtung ließ mich dann zu folgendem Ergebniß gelangen. In der Vogelstube befand sich auch ein Pärchen Pfaffenvögel oder Gürtelgrasfinken, welche ebenso wie manche anderen Vogelarten die Gewohnheit haben, ein Nest nach dem andern in größter Emsigkeit auszubauen, dann zu verlassen, um schleunigst ein neues zu beginnen. So treiben sie es eine geraume Zeit hindurch, bis sie zuletzt ernsthaft nisten. Diese Vögel hatten nun, während die Rothschwänzchen sich bereits sehr frühe des Abends zur Ruhe begeben, das enge Schlupfloch hinter ihnen ganz ausgefüllt, indem sie die Gräserfahnen u. dgl. hineindrängten. Hätte ich eine Ahnung von dem Vorgange gehabt, so wären die eingesperrten Vögel noch wol zu retten gewesen; allein gerade in jenen Tagen konnte ich nicht Muße finden, anhaltend und aufmerksam wie sonst zu beobachten, weil ich von dringenden Arbeiten sehr in Anspruch genommen war.

Die rothschwänzigen Astrilde sind im Vogelhandel immer nur zeitweise zu haben und fehlen zuweilen Jahr und Tag völlig; auch werden sie überhaupt niemals in größerer Anzahl eingeführt. Da meine übrigen Pärchen inzwischen sämmtlich gestorben waren, so konnte ich in geraumer Frist keine anderen erhalten. Endlich überraschte mich Herr Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens von Berlin, damals noch von Köln aus, mit einem Paar. Nachdem diese beiden Vögel mehrere Monate hindurch in meiner Vogelstube gelebt, ohne Neigung zur

Brut zu zeigen, begannen sie allmälig verschiedene Nistgelegenheiten zu durchspähen und dann trugen sie mit einmal beide sehr eifrig weiche Grasrispen, Bast und Fäden (Spargelzweige gab es jetzt im Frühjahr nicht) in das Erkerchen eines großen, auch sehr hoch hängenden Käfigs ein. Das Nest war in fünf Tagen fertig und wurde mit Baumwollflöckchen und weichen Federn ausgepolstert. Das ebenfalls äußerst enge, vollkommen kreisrunde Schlupfloch war mit Agavefasern und Pferdehaaren zierlich gerundet und geglättet. Die Eier, wiederum fünf Stück, waren verhältnißmäßig nicht klein. Die Jungen haben einen dunkelbläulichen Flaum, blauweiße Wachshaut und sind gleich nach dem Ausschlüpfen aus den Eiern sonderbar winzig und häßlich.

Das Jugendkleid erscheint dem der Alten ähnlich und doch bedeutend abweichend. Flügel matt bläulichaschgrau, Kopf und Hals noch fahler grau, Backen fast silbergrau, Unterflügel dunkel silbergrau, Brust und Vorderrücken (gewöhnlich ganz kahl) hell mäusegrau, Hinterrücken dunkel mäusegrau, Bürzel, Ober- und Unterschwanz schwärzlichroth; Schnabel am Grunde düster gelblich fleischfarben, an der Spitze röthlich, Wachshaut sehr groß und schön bläulichweiß; Auge schwarz; Füße oberhalb röthlich horngrau, unterhalb (Sohle) fahl horngrau, Knöchel gelblich.

Nachdem die Rothschwänzchen in meiner Vogelstube sodann mehrfach genistet, theilten mir nach und nach auch Herr Emil Linden, Ingenieur C. Hendschel, Graf Yorck von Wartenburg und Herr Dr. Rey mit, daß auch sie dies Vögelchen gezüchtet hatten. Herr Freiherr von Beust, einer der glücklichsten Züchter aller dieser kleinsten Prachtfinken, schrieb dagegen, daß sie bei ihm noch niemals zur Brut geschritten, sondern mit dem Eintritt der kälteren Jahreszeit regelmäßig gestorben seien. Herr Dr. Rey hat aber sogar Mischlinge vom Rothschwänzchen und kleinen Amarantvogel gezogen.

In allen übrigen Eigenschaften, sowie in der weiteren Brutentwickelung, Verpflegung u. s. w. stimmt der rothschwänzige Astrild vollständig mit dem Grauastrild überein. Seine Züchtung ist selbst freifliegend in der Vogelstube schwierig und dürfte im kleinen Käfige kaum gelingen. Dieser Prachtfink gehört im Gesellschaftskäfige, wie einzeln gehalten, zu den liebenswürdigsten und verträglichsten aller Stubenvögel; nur während der Nistzeit werden die Männchen gegen einander, nicht aber gegen andere Vögel zänkisch. Man kauft das Pärchen gut gefiederte und eingewöhnte Rothschwänzchen für 5 bis 6 Thlr., soeben angekommene und sehr entfederte für 3 bis 4 Thlr., und in den Handlungen erster Hand stehen sie mit den Grauastrilds in gleichem Preise. Sie sterben aber nach der Ankunft gewöhnlich nur zu zahlreich, so daß man mindestens auf die Hälfte, oft auf Neunzehntel an Todesfällen unter ihnen gefaßt sein darf. Bei den Händlern zweiter und dritter Hand stellt sich noch der große Uebelstand heraus, daß die Vögelchen in engen

Käfigen zu vielen beisammen, sich gegenseitig nur zu sehr kahl rupfen, so daß sie dann jeder kühleren Temperatur um so leichter erliegen. In der Vogelstube oder im geräumigen Flugkäfige bei angemessener Verpflegung befiedern sie sich sehr bald wieder, auch zeigt sich hier das Kahlwerden überhaupt nur selten. Dagegen ist es auch mir vorgekommen, daß zum Beginn der kälteren Jahreszeit ein ganzer Flug selbstgezogener Rothschwänzchen, die sehr kräftig und gut gefiedert waren, nach und nach, ohne bemerkbare Veranlassung gestorben sind. Die Vogelstube war damals sehr vielköpfig bevölkert und die Rothschwänzchen wurden von größeren Vögeln aus den Webernestern vertrieben. Dies erachte ich als die einzige etwaige Ursache ihrer Erkrankung. Man sollte daher diese zarten Vögel nicht allein in der Vogelstube, sondern auch im Gesellschaftsbauer und in den Käfigen der Händler immer mit geeigneten Zufluchtsorten zur kühleren Nacht versorgen. Die Händler könnten dadurch, daß sie diesen und den verwandten kleinen Vögeln Nestkörbchen, welche mit Grasrispen gefüllt sind, bieten, viele von ihnen am Leben erhalten.

Die Verbreitung des rothschwänzigen Astrild erstreckt sich fast über ganz Westafrika, besonders Senegambien und Gabon. Der Natalastrild ist dagegen nur in Natal, Südmozambique, Inhambane und in der unteren Kafferei gefunden. Der Rothbürzel ist wiederum in Westafrika, Kasamanze und Kongo heimisch.

Diese drei Vögel zusammen werden auch Schönbürzel, Rothbürzel, Rothschwänzchen, blaugraues Rothschwänzchen, grauer Rothschwanz benannt und im Handel sind sie am bekanntesten unter der Bezeichnung Grisbleu.

Bengali grisbleu (Bekemans); Grey Waxbill (Jamrach); Queue de vinaigre (französische Händler); Cinereous Waxbill (Liste des Londoner zoologischen Gartens); Kleine Roodstaart-astrild of Grisbleu; Bengueli grisbleu, Cul beau cendré, Cul beau grison, Cul beau de port Natal; Cinereous bengueli, Cinerous fair-rump, Natal fair-rump, Black bellied fair-rump, Grey fair-rump.

Nomenclatur: Fringilla coerulescens, *Vieillot, Swainson, Bonaparte etc.*: Lagonosticta coerulescens, *Cabanis, Gray;* Estrelda coerulescens, *Swainson, Hartlaub;* Habropyga coerulescens et fimbriata, *Reichenbach;* Pytelia coerulescens, *Hartl. et Finsch, Reichenbach.* — Estrilda incana, *Sundevall;* Fringilla coerulescens, *Vieill., Bianconi;* Estrelda coerulescens ex Mozambique, *Lichtenstein;* Habropyga natalensis, *Cab.;* Habropyga natalensis et incana, *Reichenb.*; Pytelia incana, *Hartl. et Finsch.* — Fringilla Perreini, *Vieill.;* Estrelda melanogastra, *Swains., Bonap.;* Habropyga Perreini, *Cab., Reichb.;* Estrelda Perreini, *Gray, Hartl.*; Pytelia Perreini, *Hartl. et Finsch.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Der rothschwänzige Astrild ist aschgrau; Backen, Kinn und Oberkehle weißgrau; Unterleib und Hinterkörper dunkler schwärzlichgrau; Zügelstreif schwarz und über demselben ein verlaufener weißlicher Streif; an den Weichen einige kleine weiße Pünktchen. Hinterrücken, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken und Schwanzfedern scharlachroth. Schnabel schwärzlichroth, dunkler an der Spitze. Füße dunkelbraun, Auge braun. — Der Natalastrild unterscheidet sich von dem vorigen nur dadurch, daß die Schwanzfedern dunkel olivenbraun sind, die Flügelschwingen ebenfalls olivenbraun, an den Außenfahnen grau

geſäumt, der Schnabel dunkelröthlichgrau und die Füße heller grau. — Der Rothbürzel dagegen iſt an den unteren Schwanzdecken und am hinteren Unterleibe ſchwarz, ſonſt mit dem vorigen durchaus übereinſtimmend, hat alſo nur rothe obere Schwanzdecken und Schwanzfedern.

Aegintha coerulescens. Coerulescente-cinerea; gula pectoreque albidis; hypochondriis abdomineque imo obscurioribus; tergo, uropygio, tectricibus caudae superioribus et inferioribus, retricibus mediis totis pogonioque lateralium externo coccineis; maculis hypochondriorum perpaucis albis; rostro rufo-nigricante, pedibus fuscis. — Aegintha incana. Coerulescente-cinerea; uropygio et supracaudalibus intense coccineis; gula pallida, mento striolaque lori atris; cauda gradata nigra; crisso nigro-fusco; subalaribus albidis; rostro et pedibus nigris. — Aegintha Perreini. Coerulescente-cinerea; gula albicante; loris nigris; crisso, subcaudalibus caudaque nigricantibus; tergo, uropygio et tectricibus caudae superioribus obscure coccineis; rostro obscure coccineo, apice nigricante; pedibus pallidis.

Länge $9{,}9$ cm. ($3\frac{3}{4}$ Z.); Flügel $4{,}4$ cm. (1 Z. 8 L.); Schwanz $3{,}6$ cm. (1 Z. 5 L.).

Juvenis adultae similiter picta, sed capite colloque lividioribus; genis canescentibus, alis supra dilute subcoeruleo-cinereis, infra obscurioribus; pectore dorsoque (plerumque denudatis) dilutius tergo obscurius submurinis; uropygio candaque tota nigrescente rubris; basi rostri lurido-carnea, apice rubente; cera valde extensa, laete subcoeruleo-alba; iride nigro-picea; pedibus rufescente corneis, planta sordius cornea; malleolis tarsalibus flavido-incarnatis.

* * *

Die Schönfinken oder Amandaven. Von den eigentlichen Aſtrilden unterſcheiden ſich mehr oder weniger, ſowol im Körperbau, als auch in der Lebensweiſe, die nächſtfolgenden kleinen Prachtfinken, welche in allem Weſentlichen ſo übereinſtimmen, daß ſie ſich wieder zu einer einheitlichen Gruppe aneinander reihen laſſen. Hierher gehören die Geſchlechter Amandave [Sporaeginthus, *Cabanis*], Gürtelaſtrild [Zonogastris, *Cab.*] und Pünktchenaſtrild [Lagonosticta, *Cab.*]. Ich faſſe ſie unter der Bezeichnung Schönfinken zuſammen, weil ſie nicht blos zu den anmuthigſten, ſondern auch zu den farbenreichſten unter allen dieſen kleinen Vögeln zu zählen ſind. Uebrigens ſei noch darauf hingewieſen, daß derartige populäre Zuſammenſtellungen in Gruppen keinenfalls einen weiteren Werth beanſpruchen können, als den, mindeſtens einen Anhalt für das leichtere Kennenlernen und einen Hinweis auf die naturgemäße Zuſammengehörigkeit der wiſſenſchaftlich aufgeſtellten Gattungen zu gewähren. Als eine wirkliche Eintheilung iſt dieſe Gruppirung aber, wie ſchon Seite 35 bemerkt, jedenfalls nicht zu betrachten.

Der getigerte Aſtrild [Aegintha amandava].

Tafel II. Vogel 9.

Bereits frühe dunkelt der Herbſtabend heran und mit ihm erſtirbt das muntere bewegliche Leben in der Vogelſtube. Geſchäftig und emſig wispern die kleinen Prachtfinken im Gebüſch umher, denn ſie müſſen ja die Brut in den Neſtern noch reichlich ſatt füttern, damit ſie die lange Nacht hindurch ausdauern kann. Außer den heiſern Tönen der eifrig die Schnäbelchen aufſperrenden und zirpenden Jungen herrſcht jetzt aber nahezu völlige Stille im halbdunkeln Raum. Die meiſten Vögel haben ihre Schlafſtätten ſchon aufgeſucht, das Lärmen, Krächzen, Schreien und Ziſchen der Papageien, Starvögel, Weber und anderen iſt verſtummt und die Lieder der eigentlichen Sängerwelt laſſen ſich in dieſer



Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

Zeit nicht hören. Je mehr die Dämmerung überhand nimmt, um so fühlbarer wird die Stille. Da ertönt plötzlich neben uns ein lieblicher zarter Triller, dann wieder mit einer kleinen Abänderung und nochmals in etwas anderer Weise. Eine Familie Tigerfinken ist es, deren Mitglieder dort im Dickicht nebeneinander sitzen, ganz regungslos, während von Zeit zu Zeit der eine oder andere, gleichviel Männchen oder Weibchen, sich erhebt und seine wohlklingende Strophe erschallen läßt. Eine einzige Strophe ist es nur und doch erklingt sie so allerliebst, daß sie schon manchen Freund des Vogelgesangs innig erfreut hat. Jene Sänger sind kleine Astrilde, welche unter der Benennung Tigerfinken, im Vogelhandel wie bei den Liebhabern, allgemeiner Beliebtheit sich erfreuen.

Dazu kommt, daß auch das Gefieder dieser Vogelart ungemein lieblich erscheint. Ein altes Männchen im Hochzeitskleide ist am ganzen Oberkörper gelbbraun, mehr oder weniger dunkel gefärbt und gleichsam wie mit einem blutrothen bis dunkel goldrothen Ueberwurf gezeichnet. Der Unterkörper ist gelblichbraun bis dunkel schwarzbraun. Ein großer Theil des ganzen Körpers, insbesondere die Flügeldecken, Brust- und Bauchseiten und auch der schöne rothe Bürzel sind mit zahllosen weißen Tüpfeln übersäet. Der Schnabel ist glänzend roth, das Auge schön bernsteinbraun und von einem gelben Ringe umgeben. Das Weibchen ist schlicht einfarbig gelblichbraun, oberhalb dunkler und unterhalb heller braun bis lichtgelb. In der Größe und im Wesen stimmt der getigerte Astrild mit dem Grauastrild überein, nur ist er weniger schlank und wenn auch ebenso lebhaft, doch nicht so hurtig und beweglich.

Dabei ist das Federkleid des getigerten Astrild so sehr veränderlich, daß er nicht allein in den Geschlechtern und verschiedenen Altersstufen, sondern auch nach den Jahreszeiten fortwährend mit der Färbung und Zeichnung wechselt. Lange Zeit bei den Händlern vorhandene Vögel dieser Art, sowol Männchen als auch Weibchen, werden mit der Zeit immer dunkler, zuletzt bis tief schwarzbraun gefärbt. —

In früheren Jahren fehlten auch die Tigerfinken zeitweise und oft für lange Frist bei den Berliner Vogelhändlern*), und ich konnte im Beginn meiner Züchtungen nur zwei dunkelbraun gewordene Weibchen erhalten, deren Gefieder fast gleichmäßig düster und nur auf den oberen Flügeldecken mit wenigen weißen Punkten getüpfelt war; auch das Roth des Bürzels war in ein dunkles verloschenes Rothbraun übergegangen, doch die Schnäbelchen erschienen lebhaft roth. Ich brachte mir aus Paris ein Pärchen und zwei Männchen in Prachtkleidern mit und ließ alle sechs frei in der Vogelstube fliegen. In wenigen Tagen hatten

*) Neuerdings ist dies nicht mehr zu befürchten, denn namentlich die Vogelhandlung von K. Baudisch & Comp. in Triest führt sie in überaus großer Anzahl ein und versendet sie an die Händler und Liebhaber.

sich die drei Paare geordnet und bildeten nun, gesellig zusammenhaltend, einen lieblichen Flug, in welchem die sehr verschiedenen Färbungen dieser Vogelart vertreten waren. Denn ebenso wie das mitgebrachte Weibchen unterhalb hell bräunlichgelb und oberhalb gelblichbraun war, einen lebhaft rothen Bürzel und zahlreiche weiße Punkte zeigte, so hatte ich andererseits unter den Männchen nur das eine im vollen dunkelrothen Alterskleide, die beiden andern dagegen in verschiedenen Uebergangsfärbungen gewählt, in denen der rothe Ueberwurf bei dem einen erst spärlich, bei dem andern etwas mehr über den Oberkörper sich verbreitet, während auch die gelbbraune Grundfärbung abweichende Schattirungen zeigte. Die Vögel verhielten sich sehr ruhig etwa bis zum Mai, doch trat eine Erscheinung ein, die zweifellos ebenso interessant als auffallend ist. Die beiden alten Weibchen wurden, anfangs kaum merklich, doch stetig fortschreitend, im ganzen Gefieder lichter, zugleich traten die weißen Punkte immer stärker hervor, vermehrten sich und auch das Roth des Bürzels erschien allmälig lebhafter. Etwa im Beginn des Aprils schon war das Federkleid dieser beiden Vögel vollständig umgewandelt und glich dem oben beschriebenen normalen des Tigerfinken-Weibchens durchaus; nur erschien es kräftiger gefärbt, als das des mitgebrachten Weibchens und ebenso war auch das Roth der beiden älteren Männchen noch viel voller geworden. In der Mitte des April begannen sie ihre Liebesspiele.

Bei der Schilderung derselben muß ich zunächst auf den Gesang näher eingehen. Schon an den beiden alten Weibchen, so lange ich sie allein hatte, war es mir aufgefallen, daß jedes dieser Vögelchen sehr emsig kleine allerliebste Triller erschallen läßt, welche bei jedem Einzelnen etwas verschieden sind. Späterhin, wenn sie alle zusammen saßen, trillerten fast nur die Männchen, aber etwas lauter und volltöniger. Jetzt, im Beginne ihrer Liebeszeit, erhebt sich das Männchen schon mit dem ersten Morgengrauen, hüpft mit erhobenen Flügeln auf einen hervorstehenden Zweig, sträubt das Schwänzchen, klappt mit den Flügeln fortwährend auf und ab und ruft immerfort sein tillit! Dabei zeigt dasselbe eine ungemeine Lebhaftigkeit; es jagt ununterbrochen jeden kleineren Vogel aus der Nähe des Weibchens fort und greift selbst jeden größeren tapfer an. Das Liebesspiel besteht blos in einem ziemlich ungeschickt erscheinenden Umhüpfen des Weibchens von seiten des Männchens mit ausgebreitetem Schwanze und erhobenem Kopfe.

Nun begannen die beiden älteren Pärchen fast zu gleicher Zeit mit dem Nestbau und brachten auch ihre Bruten glücklich auf. Sie bauen je nach der Gelegenheit verschieden, doch stets niedrig über dem Boden, und ich will zwei solche von einander abweichende Nester beschreiben, von denen das eine frei ins Gebüsch, das andere in einer Ecke auf selbstgeschichteter Unterlage erbaut war. Das erstere bestand aus Papier- und Baststreifen, Pferdehaaren, Agavefasern,

Baumwollfäden, jedoch ohne Gras- und Heuhalme, obwol ich ihnen die mannigfaltigsten Gräser und auch Papyrusfäden geboten hatte. Es war zu einem hängenden, ziemlich tiefen Beutel geformt und mit einem, vorzugsweise aus Baumwollflocken und darüber aus Baststreifen, Fäden u. dgl. hergestellten Dache überwölbt. Zwei Schlupflöcher, von denen das eine sehr rund, das andere an der Wand befindliche, weniger ebenmäßig, führten, das erstere seitlich von unten, das zweite von oben hinein und waren besonders mit sehr zahlreichen, rund umgelegten Pferdehaaren gefestigt. Das Lager der Eier bildeten Baumwolle, weiche Papierschnitzel und Haare. Das zweite Nest, welches tief im Düstern hinter einem großen Bauer stand, enthielt im wesentlichen dieselben Baustoffe, jedoch zugleich viele Heuhalme, zugleich hatte dieses eine so entschieden abweichende Form, daß man es gar nicht als derselben Vogelart zugehörig erachten möchte. Im Gegensatze zu jenem luftigen, zierlichen Beutel bildete es einen sehr großen, unordentlich zusammengeschichteten Haufen, mit einer sonderbar weiten Nestmulde, welche nur halb überwölbt war. Als dieses Paar zum zweitenmale an einer ähnlichen Oertlichkeit, in deren Nähe ich täglich die Fütterungen besorgen mußte, nisten wollte, führte das Männchen ein halb überhängendes Dach in der Weise aus, daß das brütende Weibchen vor meinen Blicken geschützt war und dann ungestört sitzen blieb, gleichviel, während ich dicht daneben die Geschirre fortnahm und hinstellte. Wie bei fast allen diesen Prachtfinken ist das Männchen der eigentliche Baukünstler; dasselbe sammelt und trägt mit staunenswerthem Eifer die Neststoffe herbei, flicht und webt sie auch zusammen, während das Weibchen, gewöhnlich inmitten des Baues sitzend, nur ordnet, glättet und rundet.

Sobald der Nistplatz gewählt ist und der Nestbau angefangen wird, entwickeln diese sonst so friedlichen Vögel eine grenzenlose Unruhe und Unduldsamkeit; namentlich das Männchen verhält sich keinen Augenblick stille. Ein Pärchen hatte sein Nest gerade unterhalb eines Strauches angebracht, in dessen dichten Zweigen der gewöhnliche Schlafplatz für eine große Anzahl der Bewohner der Vogelstube war. Hier nun mußte der arme geplagte Wicht nicht allein über Tag die unablässig ankommenden Besucher vertreiben, sondern auch die ganze Dämmerung hindurch, wenn das Weibchen längst still auf den Eiern saß, sich mit ihnen herumjagen. Namentlich die kleinsten queckſilbernen Astrilde, Grauastrild, rothschwänziger und goldgelber Astrild machten ihm unendlich viel zu schaffen, indem ihrer fünf bis sechs in hurtigster Gewandtheit vor ihm herhüpften und sich nur schwierig fernhalten ließen; doch duldete er sie, wie alle übrigen kleinen, durchaus nicht und auch von den größeren Vögeln ließ er nur die unangefochten, welche keinen Spaß verstehen, wie die Sperlingspapageien, verschiedene Sittiche, Webervögel und andere. Die Befehdung der kleinsten Verwandten von seiner Seite ist jedoch immer nur als eine harmlose anzusehen, denn wirklich bösartig ist er keinenfalls.

Dabei erfüllt er dennoch treu und zuverlässig seine Gattenpflichten, welche darin bestehen, daß er einen großen Theil des Tages hindurch das Weibchen beim Brüten ablösen und späterhin die Jungen mit füttern muß. Das Gelege bestand jedesmal aus vier weißen länglichrunden Eiern. Der Nestflaum der Jungen ist hell gelbgrau, mit weißen Wachshautdrüsen. Das Jugendkleid erscheint in folgender Weise gefärbt: Brust gelbgrau, Bauch weißlichgelb, Hinterleib ein wenig dunkler, Kehle hellgrau, Kopf und Oberrücken bräunlichgrau, Flügel und Schwanz noch dunkler, letzterer schwärzlich. Als Kennzeichen der Art ist zu bemerken, daß die Spitzen der Flügeldeckfedern bräunlichgelbe Halbmonde zeigen, welche beim Stillsitzen des Vögelchens drei gleichmäßige Reihen von großen Tüpfeln bilden. Das Schnäbelchen ist glänzend schwarz, das Auge einfarbig dunkel und die Füße sind dunkelgrau. Schon in der dritten Woche beginnt die Verfärbung damit, daß der Schnabel heller, das Gefieder des unteren Körpers ebenfalls heller und das des oberen dunkler wird. Im Ganzen sind die Farbenübergänge so wechselvoll, daß der Vogel das beschriebene Prachtkleid erst nach zwei Jahren vollständig zeigt, während dieser Zeit aber immerfort in allen Theilen des Gefieders sich verändert. Nach acht Wochen etwa hat der Schnabel die lebhaft rothe Farbe angenommen, und von nun an dürfte, wie ich beobachtet, auch die Geschlechtsreife eintreten.

Sehr interessant entwickeln sich die ersten Verfärbungs-Uebergänge; wenn nämlich in der achten oder neunten Woche, nachdem der Schnabel schon roth geworden, beide Geschlechter aber noch durchaus sich gleichen und zwar mit lebhaft hellbräunlichem bis weißlich aschgrauem Unterkörper und dunkelbraunem Oberkörper, auf welchem letzteren die beschriebenen Halbmondchen verschwunden und dafür weiße runde Tüpfel erschienen sind, während das Roth des Bürzels bedeutend kräftiger geworden, wenn dann auf der Brust des Männchens die schöne rothe Färbung in den ersten versprengten Flecken zum Vorschein kommt, dann schattirt sich das Gefieder durch gelb, braun, roth und weiß in verschiedenen Nüancen, bis der herrliche rothe Ueberwurf und die regelmäßig stehenden weißen Pünktchen immer mehr sich geltend machen. Dabei ist der Vogel jedoch als Tigerastrild, von der Verfärbung an bis zum vollen Dunkelwerden, stets zu erkennen und wird auch von seinen vielen Liebhabern in allen diesen Kleidern gekauft.

Die Nistzeit beginnt nach mehrjährigen Erfahrungen in meiner Vogelstube im Herbst (September) und erstreckt sich etwa bis zum Januar hin auf drei bis vier Bruten; doch sind die Tigerfinken auch unschwer in unsern Frühlings- und Sommermonaten zur Hecke zu bringen, wenn man ihnen im Herbst die Nistgelegenheiten entzieht. —

In den Mittheilungen der älteren Schriftsteller über diesen Vogel sind vorzugsweise viele Irrthümer vorhanden, und diese finden eben darin ihre Erklärung, daß man die Exemplare mit den wechselnden Kleidern der Altersstufen und

Jahreszeiten immer für verschiedene Arten gehalten hat. Da der getigerte Bengalist, wie man ihn noch jetzt am häufigsten nennt, einerseits zu den ersten unter allen diesen kleinen Finken gehört, welche im Käfige gehalten worden und da er andererseits infolge der Gefangenschaft noch mannigfaltigeren Farbenveränderungen unterworfen ist, so hat er nicht allein, wie gesagt, zur Aufstellung jener zahlreichen Arten Veranlassung gegeben, welche in neuerer Zeit sämmtlich als völlig übereinstimmend auf eine zurückgeführt sind, sondern er zeigt auch den Vorzug vor den meisten seiner Verwandten, daß über ihn eine ausnahmsweise reiche Literatur sich angesammelt hat.

Buffon und Brisson haben einen Bengali piqueté und einen Bengali brun beschrieben und abgebildet und der erstere außerdem noch einen hierher gehörenden Vogel, welchen er (nach Kommerson) Serevan benennt. Vieillot schildert auch noch einen Amandava en habit d'hiver, welcher auch nur ein gewöhnlicher Tigerfink ist, der in der Gefangenschaft weiße Flügel- und Schwanzfedern bekommen hat — eine Erscheinung, die jedem aufmerksamen Vogelzüchter bekannt ist. Hiernach haben denn auch die neueren Schriftsteller und selbst G. R. Gray noch mancherlei Arten [z. B. Estrelda mystacea] aufgestellt, die natürlich alle zusammenfallen.

Vieillot preist den Amandava als einen überaus herrlichen Vogel, welcher mit hübschem Gesang ein schönes Gefieder vereinigt. Zugleich beklagt er bereits die vielen Irrthümer, welche der Wechsel der Farben verursacht. Er hält diesen Prachtfink übrigens für besonders weichlich und empfiehlt für seine Hegung und Züchtung 25 bis 30 Grad Wärme; auch soll man ihm zum Nisten grüne Aprikosenbäume bieten. Dieser Forscher kannte schon die Eigenthümlichkeit dieser Vogelart, daß das Weibchen einen eben so schönen, wenn auch schwächeren Gesang, als das Männchen hören läßt. Sieben bis acht Jahre hatte er ihn im Käfige erhalten und daher meint er, daß dies noch weit länger der Fall sein könne, wenn man ihm nur einen recht warmen Aufenthalt gewähre.

Der Missionär T. Philipps berichtet, daß diese Vögel in Indien während der Regenzeit etwa für zwei Annas der Kopf verkauft werden. Einige Raja's, sagt er, halten sich die Männchen, um diese kleinen Geschöpfe zum Kampfe abzurichten; auch sind sie dort um ihres prächtigen Gesanges willen geschätzt. Im Winter sterben sie oft von der Kälte und sind schwer durchzubringen. Daher ist es rathsam, ihnen das Nest eines Bayawebers zu bieten, in welches sie hineinkriechen und sich gegenseitig erwärmen. Sie werden leicht in Netzen gefangen. Auch Reichenbach hält den Tigerfink für vorzugsweise zart und weichlich und fügt Folgendes hinzu: In einer kostbaren, auf Java und andern Inseln Ostindiens mit großer Mühe und Sorgfalt zusammengebrachten Sammlung von Gruppen derartiger Vögel, welche ich von meinem seit vielen Jahren um das

Naturhistorische Museum in Dresden und um meine Kentnisse hochverdienten Freunde und Landsmanne Herrn Oberst von Schierbrandt erhielt, befindet sich auch ein Pärchen dieser Vögel nebst ihrem Neste mit Eiern, welche ich den reichen Dresdener Sammlungen aus allen Welttheilen eingereiht habe.... Für diejenigen Vogelfreunde, welche den Tigerfink erziehen, d. h. zur Fortpflanzung bringen wollen, wird es nicht ohne Interesse sein, zu erfahren, wie er im Vaterlande sein Nest baut. Dasselbe befindet sich zwischen hohen Gräsern, unserm Queckengras ähnlich. In geringer Höhe ist das ovale, oben zugewölbte Nestchen angebracht zwischen den Halmen und Blättern, mit denen es durch feinere Hälmchen verbunden ist. Es hat etwas über 12cm. Höhe, nur etwa 7cm. im Querdurchmesser und an der einen Seite, nahe der Deckenwölbung, ein länglichrundes Flugloch von 6cm. Höhe und 4cm. Breite. Schmale Grasblätter und feine Halme sind die Baustoffe, aus deren Zusammenbeugung das Nest hergestellt ist, und innerlich folgt eine Lage aus den zarten, fast haarartigen Rispen eines Schilfgrases. Somit können wir auch die feinen Grasrispen der bei uns einheimischen Schilf-, Strauß-, Lieschgräser dem Vogel darbieten, wenn wir ihm vorher locker zusammengebundene Büschel von Queckengras als Unterlage gegeben. Federn habe ich im Neste nicht gefunden; doch gewähren die dicht zusammengelegten Schilfgrasrispen durch ihre feinen Haare ein so weiches Lager, daß die Federn erspart werden können.

Diese Darstellung ergänzt Dr. H. A. Bernstein von Java aus in Folgendem: Dieser kleine, ungemein niedliche Vogel bewohnt in der hiesigen Gegend vorzüglich die weiten, stillen Alang-Alang-Wildnisse, sowie die mit kurzem Gestrüpp und dergleichen bedeckten Gegenden, kommt dagegen in der durchweg bebauten nächsten Umgebung meines Wohnortes nur selten vor. Sein Nest habe ich mit Hülfe einiger in meinen Diensten stehenden Eingeborenen dreimal gefunden, und zwar stets in geringer Höhe über dem Boden in den Zweigen eines niedrigen, im dichten Alang-Alang stehenden Strauches. Diese Nester haben eine vollkommen kugelförmige Gestalt, mit seitlichem Eingang, welcher eng und eben nur groß genug ist, um die Vögel hindurch zu lassen. Sie sind ziemlich regelmäßig aus Halmen und wolletragenden Grasrispen erbaut und ihre innere, gut ausgerundete Höhlung ist mit feiner Graswolle gefüttert. In dieses weiche und warme Nest legt das Weibchen seine fünf bis sechs glänzend weißen Eier. An den kürzlich ausgekrochenen Jungen fällt der Umstand auf, daß die schwarze Farbe des Schnabels und der inneren Mundtheile erst in einer Anzahl zerstreuter Flecken vorhanden ist und von diesen aus sich allmälig weiter entwickelt, so daß diese im übrigen fleischfarbenen Theile schwarz gefleckt und gesprenkelt erscheinen und dadurch ein eigenthümliches Aussehen zeigen.

Auch Jerdon giebt nur wenig näheres über den Vogel an. Er fand ihn häufig in Südindien, in buschigen Gründen und auf Wiesen, aber auch nicht

ſelten in Gärten, beſonders bei ſolchen Städten, in deren Nähe Wälder ſind. Hier ernähren ſich die Schwärme von Sämereien, welche ſie in großen Maſſen vernichten und Schaden dadurch verurſachen. Am zahlreichſten ſollen ſie in einigen Theilen von Myſore ſein. Nach Elliot iſt der Tigerfink allgemein verbreitet in Dharwa; beſonders ſieht man ihn in den Zuckerrohrfeldern in großen Flügen, mit dem Nonnenvogel von Malakka geſellig. Inbetreff des Neſtes beſtätigt Jerdon die Angaben von Bernſtein und fügt noch hinzu, daß es gewöhnlich zwiſchen den Stengeln der Ravala hängt. Man fängt die Tigerfinken in manchen Gegenden in großer Anzahl mit den Nonnenvögeln und andern zugleich. Auch Jerdon erzählt, daß die Eingeborenen dies Vögelchen gern in Käfigen halten und zum Kämpfen abrichten. Blyth fand den getigerten Aſtrild in vielen Theilen Indiens in ungeheuren Scharen und F. B. Hamilton vorzugsweiſe längs der Fluß- und Stromufer in den Rohrdickichten während der Regenzeit in Schwärmen umherſtreichend. Blyth giebt auch an, daß dieſer Prachtfink zweimal im Jahre mauſere und daß nach Beendigung der Brut das Männchen die Farbe des Weibchens annehme.

Die Brutzeit des getigerten Aſtrild fällt in den Monat Oktober und ſeine Heimat erſtreckt ſich faſt über das ganze Feſtland und die Inſeln Oſtindiens.

Seit dem letzten Jahre iſt im Handel eine zweite Art oder vielleicht nur Lokalraſſe zuerſt von Baudiſch in Trieſt und dann auch von Hagenbeck in Hamburg eingeführt worden, der hochrothe Tigerfink [Aegintha punicea], welcher ſich von dem erſteren durch ungleich dunkler rothe Färbung, zahlreichere und größere Pünktchen, ein wenig bedeutendere Größe, namentlich aber durch einen weißen Streif unterhalb des Auges, den beide Geſchlechter zeigen, unterſcheidet und eine längere und lauter erklingende Strophe hören läßt. Für die Liebhaberei und Züchtung hat dieſe Trennung in zwei Arten, ſelbſt wenn ſie als ſolche geſchieden werden müßten, keine weitere Bedeutung. Da die Männchen der letzteren aber ſchöner erſcheinen, ſo wählte ich ein ſolches hier für die bildliche Darſtellung.

Abgeſehen von jenen harmloſen Befehdungen anderer Vögel während des Niſtens, gehört der Tigerfink zu den verträglichſten und gemüthlichſten unter allen Aſtrilden, ſowol in der Vogelſtube, als auch im Geſellſchaftskäfige. Er iſt ausdauernd in dieſem, wie auch im kleinen Käfige parweiſe gehalten und es iſt faſt unbegreiflich, weshalb die älteren Schriftſteller gerade für ihn ſo hohe Wärmegrade verlangen. Selbſt unter ſehr ungünſtigen Verhältniſſen, in den Schaufenſtern der Händler erhält er ſich beſſer, als viele andere, und da er immer gern gekauft wird, ſo zählt er zu den Lieblingen der Vogelhändler, wie aller Freunde dieſer kleinen Vögel. Dr. Luchs rühmt den Tigeraſtrild vornehmlich wegen der lieblichen Geſangsart, die das Männchen vom Januar bis in den

August (aber auch zu jeder andern Zeit) recht fleißig ertönen läßt, eine einfache, melancholisch weich flötende Strophe, etwa wie dididididadodododoh! gewissermaßen erinnernd an den Gesang unseres heimischen Tannenlaubvogels (Ficedula rufa, *Lath.*). Nur ein großer Uebelstand bleibt zu beklagen, die Veränderlichkeit seines Gefieders nämlich. Wenn die Vögelchen gewöhnlich noch jung und alle übereinstimmend gelbgrau ankommen, so beginnen die Männchen bald das Prachtkleid anzulegen; dann zeigen sich unter beiden Geschlechtern hier und da weißgescheckte und weißschwänzige und in den Vogelstuben wird wol einer im zweiten oder dritten Jahre ganz oder doch theilweise schneeweiß. In engen Käfigen aber, namentlich wenn diese an düstern oder dumpfigen Orten stehen, wird das Gefieder allmälig gleichmäßig immer dunkler, tief braun bis schwarz. Dabei wachsen die Nägel der Zehen, wenn sie nicht zeitweise verschnitten werden, zu ungeheuerlichen Gebilden heran. Noch schlimmer aber arten die Schnäbel aus, denn entweder wächst der obere oder untere weit über den andern hinaus oder beide wuchern lang hervor und zersplittern an der Spitze kron- oder pinselförmig. (Näheres hierüber in dem Abschnitt: Krankheiten.)

Bei der dunkeln Färbung kommt zweifellos der Mangel an Licht zur Wirkung. Denn einerseits sind die bereits dunkel gewesenen Tigerfinken, welche ich von den Händlern zur Beobachtung entnommen, nachdem sie sich in meiner Vogelstube licht gefärbt hatten, niemals wieder dunkel geworden, und andererseits kann man unschwer feststellen, daß die Vögelchen auch im engen Käfige, wenn dieser nur an einer hellen Wand hängt, nicht ihre hellen Farben verlieren. Wol aber verändert sich nach beendigter Brutzeit das Gefieder in der Weise, daß es in allen Schattirungen immer matter wird und sich zu einem schlichtgrauen Winterkleide entfärbt; der Schnabel behält jedoch immer dasselbe glänzende Roth.

In dem „Handbuch für Vogelliebhaber" hatte ich angegeben, daß der Tigerfink leicht und zuverlässig nistе, und zwar nach den Erfahrungen, die ich an den ersten drei Pärchen gemacht, deren Nachkommen sodann auch in einzelnen Paaren in Käfigen Junge erzogen. Im Weiteren scheinen die Züchter dann aber durchgängig nicht so gute Erfolge erreicht zu haben; zahlreiche Mittheilungen von verschiedenen Seiten sprechen Klagen darüber aus, daß gerade diese Vogelart unter den günstigsten Verhältnissen gar nicht nistet oder in den seltenen Fällen doch die Jungen sterben läßt. Daher ist dieser Astrild bis jetzt nur sehr selten gezüchtet worden. Vielleicht täusche ich mich nicht in der Annahme, daß die in den letzteren Jahren wol ausschließlich bei den Händlern vorhanden gewesene hochrothe Lokalrasse ungleich schwieriger zur Brut schreitet, als die andere. Nächst mir hat dann Dr. Rey von dem getigerten Astrild glücklicher Züchtung sich erfreut und sogar Mischlinge von demselben und dem Schmetterlingsfink erzielt. Zu allererst haben die Tigerfinken bei Herrn Dr. Bodinus, damals noch in Köln, genistet.

Zur Züchtung im kleinen empfehle ich die beim Grauaftrild Seite 41 beschriebene Vorrichtung, doch muß der Heckkäfig etwas größer sein, damit man einen kleinen dichten Busch darin anbringen kann. Denn die Tigerfinken nisten fast regelmäßig in einem frei ins Gebüsch gebauten Nest und nur im Nothfall in einem Harzer Bauerchen. In Hinsicht der übrigen Behandlung sind nur dieselben Maßregeln, die bei allen kleinen Prachtfinken vorgeschlagen und besonders beim Grauaftrild angegeben, zu beachten.

Der Preis beträgt bei den Händlern zweiter und dritter Hand zwischen 3 und 4 Thlr. für das Pärchen und im Großhandel 4 bis 6 Frcs., doch gelangen sie in manchen Jahren nur in geringer Anzahl auf den Markt, und dann kosten sie selbst beim Masseneinkauf 7 bis 8 Frcs.

Der getigerte Aftrild heißt auch Tigerfink, Tigeraftrild, Tigerbengalist, Tigervogel, getigerter Bengalist*) und Amandava.

Bengali piqueté (Vekemans); Amandave, Bengali piqueté (Pariser Händler); Amaduvade Finch (Jamrach und Verzn. d. zool. Grt. v. London); Getygerde Amandava (holländisch); Lal or Lal Munia (Hindostan, nach Hamilton, Jerdon u. A.); Menyiring, Java Amaduvade (Horsfield); Ussing der Sundanesen (Bernstein).

Nomenclatur: Fringilla amandava, *Linné;* Estrelda amandava, *Jerdon, Hartlaub, Gray;* Sporaeginthus amandava, *Cabanis.* — Fringilla punicea, *Horsfield;* Estrelda punicea, *Blyth, Gray, Bonaparte;* Fringilla mystacea, *Vieillot.* — Amandava piqueté ou pointillé; Amanduvade Weaver-Finch; Amandava rouge vif; Carmin Weaver-Finch.

Wissenschaftliche Beschreibung. An Stirn, Schultern und Mantel dunkelbraun, mit deutlich hervortretenden rothen Federrändern, Flügelschwingen und -Decken schwarzbraun, Ober- und Unterschwanz schwarz, jede Feder am Außenrande weiß gesäumt; unterhalb, mit Einschluß des Gesichts, an Kehle, Brust, Bauch und Seiten hellbraun bis tief schwarzbraun, jede Feder schön gelblich- bis zinnoberroth breit gerandet, (so daß beim vollgefärbten alten Männchen, Tafel II, Vogel 9, das ganze Gefieder dunkelgelbroth erscheint, während die braune Färbung der unteren Federtheile wie feine Schuppen hervortritt); Brust- und Bauchseiten, Bürzel, obere Flügel- und obere Schwanzdecken weiß getüpfelt (diese runden weißen Pünktchen sind auf den Flügeldecken am größten und stehen hier auch gleichmäßig reihenweise). Vom Oberschnabel aus zieht sich, jedoch nur bis dicht um das Auge, ein schwarzer Streif (bei der hochrothen Varietät unterhalb desselben noch ein weißer Streif). Auge schön bernsteinroth; Schnabel glänzend hochroth mit schwarzer Firste; Füße fleischroth. Das Weibchen ist oberhalb dunkel gelblichbraun, an Flügeldecken und Schwanz schwarzbraun; unterhalb heller bräunlichgelb, an Brust- und Bauchmitte zuweilen weißgelb, Bürzel und obere Schwanzdecken gelbroth, Seiten und Flügeldecken weiß gepunktet. Jugendkleid wie Seite 68 angegeben.

Aegintha amandava: fronte, humeris et interscapilio obscure fuscis, plumis distincte rubro-marginatis; remigibus et alarum tectricibus nigro-fuscis; cauda superiore et inferiore nigra, rectricibus singulis exterius albo-limbatis; subtus: facie, gula, pectore, abdomine et hypochondriis brunneis, ipsis nigro-fuscis,

*) Im Gegensatz zu diesen eigentlichen Bengalisten müssen die verwandten afrikanischen Prachtfinken in richtiger Bezeichnung also Benguelisten genannt werden.

margine plumae cujusque lato luteo, quin imo zinnabarino. [♂ plane adultus Tab. II, av. 9 itaque totus obscure aurantio-ruber partibus interioribus plumarum emissis squamulas effingentibus fuscas]; pectoris abdominisque lateribus, uropygio, tectricibus alar., caudaeque superioribus albo-punctatis [punctis albis tectricum praesertim alarum majoribus atque ordinatim dispositis]; loris annuloque orbitali nigris [var. rubicunda sub hac stria nigra offerens albam; iride rubente lutea; culmine rostri sanguinei nigro nitido; pedibus rubente carneis. — Femina: supra subtestaceo-fusca; tectricibus al. caudaque nigro-fuscis; subtus fuscante gilva; mediis pectoris abdominisque interdum albido-flavis; uropygio et supracaudalibus fulvis; hypochondriis alarumque tectricibus albo-punctulatis.

Länge 9cm. (3 ♂. 6 ♀.), Flügel 4,4cm. (1 ♂. 8 ♀.), Schwanz faſt gerade abgeſchnitten 3,9cm. (1 ♂. 6 ♀.).

Juvenis: capite dorsoque subfusco-cinereis, alis obscurioribus, maculis terminalibus earum tectricum semilunaribus ferrugineis, series punctorum avis quiescentis magnorum tres componentibus, iisque signa specifica offerentibus; cauda nigricante; gula incana; pectore flavo-cinereo; abdomine albido-flavo, crisso paululum obscuriore; rostro nigro nitido; iride picea; pedibus obscure cinereis.

Beſchreibung des Eies: Farbe reinweiß, glatt und glänzend, Geſtalt kurzoval. Länge 14mm., Breite 12mm.,

Ovum pure album, nitens, breviovatum.

Der gelbgrüne Aſtrild [Aegintha formosa].

Dieſer Aſtrild hat ſich in allen Vogelſtuben bereits das Bürgerrecht erobert, obwol er doch nur ſeit kurzer Friſt (Spätſommer d. J. 1873) durch die Hagenbeck'ſche Großhandlung zuerſt in Deutſchland eingeführt worden. In der Geſtalt, Größe und im Weſen iſt er dem nächſten Verwandten, dem allbekannten Tigerfink, ſehr ähnlich, doch zeigt er ſich ungleich ruhiger und ſtiller.

Seine Färbung iſt anſprechend, ſo daß er mindeſtens zu den ſchöneren Prachtfinken gezählt werden muß: oberhalb dunkel olivengrün, Flügel und Schwanz dunkel grünlichbraun, durch grüne Außenſäume der Federn, namentlich an den Schwingen; unterhalb blaßgelb, an Bruſt, Bauch und dem hinteren Unterleib ſchön lebhaft gelb; Bruſt- und Bauchſeiten dunkelbraun, weiß und gelb gebändert. Auge gelbbraun, Schnabel glänzend roth, Füße grau. Das Weibchen unterſcheidet ſich nur dadurch, daß die gelbe Färbung an Bruſt, Bauch und Unterleib viel blaſſer iſt.

Karl Hagenbeck ſchreibt: meines Wiſſens iſt der grüne Bengaliſt bis jetzt weder im Vogelhandel, noch in den zoologiſchen Gärten vorhanden geweſen; er dürfte daher bei uns in der Gefangenſchaft noch nicht beobachtet ſein. — In gleicher Weiſe bietet auch die Literatur nur geringe Angaben über ihn (Verreaux, Jerdon) und ſelbſt der Katalog des Muſeums der Oſtindiſchen Geſellſchaft führt ihn nicht einmal auf. Hartlaub ſah ihn zwar ſchon zu Anfang der ſechsziger Jahre einmal lebend in London, giebt aber nichts Näheres an. Ueber ſeine Lebensweiſe im Freien iſt nichts bekannt, als daß er in ſeiner Heimat, Centralaſien und insbeſondere Mittelindien, zahlreich ſein ſoll. In Indien hält

man ihn vielfach im Käfige und es ist um so mehr verwunderlich, daß er noch nicht früher und häufiger zu uns gelangte.

Die gelbgrünen Astrilde in meiner Vogelstube leben recht friedlich beisammen. Gewöhnlich sitzen sie alle, vier Männchen und drei Weibchen, in einer halbdunkeln Ecke tief hinten und etwa mannshoch im Gebüsch regungslos dicht nebeneinander oder sie hüpfen eben so gesellig nahrungsuchend an der Erde umher. Dann erscheinen sie wol lebhaft, beweglich und anmuthig, während sie sonst den Eindruck sehr stiller und ruhiger Vögel machen. Auch zur Nistzeit werden sie nicht auffallend erregt und ihrer Schüchternheit und versteckten Lebensweise halber sind ihre besonderen Eigenthümlichkeiten schwierig zu bemerken. Das Liebesspiel besteht nur im Umhüpfen des Weibchens, ganz ebenso wie es der Tigerfink zeigt; das Männchen sucht auch mit sehr ähnlich klingendem, zirpendem Geschrei jeden andern Vogel aus der Nähe der Brut zu vertreiben. Doch wagt es sich nur an kleinere Genossen und schlüpft auch sogleich furchtsam-still ins tiefere Gebüsch, sobald ein Mensch sich regt. Das erste Nest war fast nur aus weichen Baststreifen mit weichen dicken Sackfäden, in der Form eines gegen drei Handbreiten hohen, schiefstehenden Thurmes, dessen Eingang von oben hinab führte, kunstlos errichtet. Nachdem das Pärchen aus demselben durch Diamantvögel vertrieben war, erbaute es ein zweites Nest aus gleichen Stoffen, aber in kugelrunder Form und mit seitlichem Flugloch. Zum erfolgreichen Nisten ist es jedoch noch nicht gekommen, weil die Vögelchen zu ängstlich sind und sich von allen andern verscheuchen lassen. Ein Züchtungsversuch in dem Seite 41 beschriebenen Prachtfinken-Heckkäfig wird wahrscheinlich zum guten Ergebniß führen. Mir ist ein solcher freilich noch nicht gelungen.

Neuerdings hat Herr Baudisch in Triest diesen Astrild in größerer Anzahl auf den Vogelmarkt gebracht. Der Preis ist noch ziemlich hoch, 4 bis 5 Thlr. für das Pärchen.

Der gelbgrüne Astrild erfreut sich ebenfalls bereits mehrerer Benennungen und zwar, grüner Bengalist, grünes Gelbbrüstchen, Schönfink und nach Reichenbach recht unpassend weißseitiger Aurora-Senegali. (In den Preisverzeichnissen der auswärtigen Händler ist er noch nicht aufgeführt.)

Nomenclatur: Estrelda formosa, *Verreaux;* Estrelda lateralis, *Verr., Bnp., Hartl.;* Pytelia formosa, *Gray;* Pytelia lateralis, *Reichb.;* Harrelal der Hindostaner.

Wissenschaftliche Beschreibung (siehe oben).

Aegintha formosa. Supra dilute olivaceo-virens, remigibus nigris, dorsi colore limbatis; gutture pallide ex olivaceo-cinerascente; pectore et abdomine medio sulfureo-flavis; lateribus pulchre et late olivaceo- et albido-fasciatis; subalaribus albidis; subcaudalibus flavis, basi albidis; rostro corallino; pedibus carneis; rectricibus nigris, mediis canescentibus.

Länge 9 cm. (3 Z. 6 L.), Flügel 4,6 cm. (1 Z. 9 L.), Schwanz 3,9 cm. (1 Z. 6 L.).

Der goldbrüstige Astrild [Aegintha sanguinolenta].

Tafel I. Vogel 5.

Kaum beginnt der Tag zu grauen, da erschallt ein leises schiep! von Zeit zu Zeit sich wiederholend, immer lauter und lebhafter und immer schneller aufeinander folgend, bis es zuletzt in einen eintönigen, doch nicht mißlautigen Morgengesang übergeht. Wenn fünf bis sechs dieser kleinen Sänger zugleich in einer Vogelstube sich hören lassen, so ähnelt ihr Geschrei dem Frühlingskonzert der Sperlinge in der Fliederlaube; nur ungleich zarter, weniger schrill und dafür lieblicher ist es, als der Sang der Spatzen.

Dieser Prachtfink, unter dem Namen Goldbrüstchen allbekannt, ist einer der kleinsten, aber auch der schönsten und wiederum beliebtesten unter allen. Am ganzen Oberkörper ist er olivengrünlichbraun, am Unterkörper schön citronengelb und beim alten Männchen ist die Brust herrlich orange- oder goldroth. Dazu der karminrothe Augenbrauenstreif und das glänzend rothe Schnäbelchen, die unbeschreibliche Anmuth und Zierlichkeit — und in der That, dies Vögelchen verdient wol, ein Liebling aller Welt zu sein.

Das Goldbrüstchen ist eine der gewöhnlichsten Erscheinungen im Vogelhandel und da es sich jahrelang, selbst in den Käfigen der Händler bei angemessener Pflege gut erhält, so ist es auch fast allenthalben immerwährend käuflich zu haben. Um seiner Schönheit willen wird es ebensowol in allen Vogelstuben, als auch in Gesellschaftskäfigen oder kleineren Sammlungen und selbst parweise im kleinen Bauer ungemein viel gehalten.

Die Heimat des goldgelben Astrild erstreckt sich vornehmlich über Westafrika, doch dürfte er so ziemlich über den ganzen Erdtheil verbreitet sein; auch ist er auf Madagaskar und einigen andern der nächsten, sowie auf den Capverdischen Inseln eingeführt (vrgl. S. 37). Dennoch haben die Forscher (Lefebre, Verreaux, Layard u. A.) nur ganz kurze Angaben über sein Freileben gemacht. Am ausführlichsten berichtet Heuglin. Er fand diesen Vogel in zwei sehr fern von einander gelegenen Gegenden und zwar in der Dembea-Ebene und Provinz Fogara und dann auf der Reginsel im Quellsee des Gazellenflusses, jedesmal im Monat März. Kleine Familien von fünf bis zehn Köpfen, unter denen nur wenige alte Männchen an ihrer lebhaften Färbung schon von weitem zu erkennen waren, strichen flüchtig um Gehöfte und trieben sich auf Stoppelfeldern und im Hochgrase, auch auf Rohrstengeln umher und fielen seltener in Gebüsche oder auf niedrige kahle Baumgipfel ein. Im Tana-Becken hielt sich die Art gesondert, während sie am Reqsee zuweilen mit Grauastrilds und andern Verwandten gemeinschaftlich flog. Auch dieser Reisende meint, daß die Goldastrilds im Geschrei, im Fluge und in ihren Zusammenrottungen den Feldsperlingen gleichen.

Vieillot sagt über den Senegali auroré sehr wenig, auch hat er ihn nicht gezüchtet. Reichenbach bemerkt: ich kann nach eigener Beobachtung angeben, daß die jungen Vögel ganz olivengrau sind und deshalb habe ich einen solchen im Uebergangskleide abgebildet, wie er hier verstorben war. Ob derselbe jung aus Afrika herübergekommen oder in Deutschland erbrütet ist, hat er nicht mitgetheilt. Es ist aber bekannt, daß sehr viele junge Prachtfinken, z. B. Elstervögelchen, noch im grauen Jugendkleide oder in der begonnenen Verfärbung eingeführt werden, und daher könnte dies auch wol mit dem Goldbrüstchen der Fall gewesen sein.

Da ein Pärchen der goldbrüstigen Astrilde ebenfalls zu den ersten fremdländischen Vögeln gehörte, welche ich, anfangs in einzelnen kleinen Heckkäfigen und dann in der Vogelstube hielt, so wird auch diese Art wol zu denen zu zählen sein, die ich zuerst gezüchtet habe. Bald darauf hat sie dann auch in zahlreichen andern Vogelstuben und Heckkäfigen genistet — und nun zeigt auch dieser Vogel die seltsame Erscheinung, daß seine Entwickelung in der Gefangenschaft eingehend erkundet ist, während man sie in der Freiheit noch keineswegs kennt.

Die Goldbrüstchen nisten ebensowol im kleinen Käfige, als auch freifliegend in der Vogelstube fast immer überraschend bald. Mein erstes Pärchen brachte es aber in mehreren Bruten hintereinander nicht weiter, als bis zu Eiern oder ganz kleinen Jungen, die am ersten bis spätestens sechsten Tage regelmäßig starben. Von den abwechselnd brütenden beiden Gatten suchte der abgelöste, Männchen oder Weibchen, um die Zeit, wenn die Brut soeben aus den Eiern gekrochen, jedesmal mit sichtbarer Angst rastlos nach irgend etwas Fehlendem umher. Sie kamen dann, sobald die Thür der Vogelstube geöffnet wurde, in das Zimmer nebenan und durchstöberten mit förmlich fieberhafter Hast die Gewächse des Blumentisches. Ich bot alles Mögliche auf, um dieses mir leider unbekannte Bedürfniß zu befriedigen. Eingequellte Ameisenpuppen, weicher Käse oder Quark, eingeweichtes altbackenes Weißbrot, feinzerhacktes Rinderherz, hartgekochtes Hühnerei u. dgl. wurde gegeben, doch nichts davon nahmen die Vögel an. Das Männchen ließ sich gewöhnlich mit einer weichen Feder abfinden. Es gehört nämlich zu den Prachtfinken, welche die Gewohnheit haben, daß sie nicht allein zum Ausbau des Nestes, sondern auch, besonders wenn die Jungen soeben aus den Eiern geschlüpft sind, immer noch Federn und andere weiche Baustoffe herbeischleppen und nie ohne etwas dergleichen im Schnabel zur Ablösung beim Brüten kommen. Das Weibchen aber gab sich nicht zufrieden, bis endlich das ängstliche Umherflattern Beider zeigte, daß die Brut wiederum zugrunde gegangen.

Zunächst blieb mir nichts weiter übrig, als noch zwei Pärchen dieser Vögel anzuschaffen, um festzustellen, ob vielleicht blos die individuelle Unfähigkeit des ersteren die Schuld an den Mißerfolgen trage. Alle drei Pärchen nisteten nun

in rastloser Emsigkeit — und alle drei vermochten keine einzige Brut aufzubringen. Sobald aber der Sommer nahte, bot der Berliner Vogelmarkt frische Ameisenpuppen, und als von diesen recht kleine, zarte gefüttert wurden, gelangte das erste Paar, welches bereits siebenmal vergeblich genistet, doch noch zur Erziehung von fünf Köpfen. Auch die andern erfreuten sich dann gleicher Erfolge. Späterhin, als die Goldbrüstchen mehr eingewöhnt waren, fütterten die Alten sowol, als auch die von mir gezüchteten jungen Pärchen ihre Bruten mit einem Gemisch aus getrockneten, aber eingequellten Ameisenpuppen, darüber geriebenem Eierbrot und zerschnittenen Mehlwürmern fast immer glücklich groß. Darin stimmen nun alle Züchter überein, daß dieser Vogel trotz des eifrigen Nistens doch nur selten die Jungen glücklich zum Flüggewerden bringt.

Das Eheleben der Goldbrüstchen ist ein vorzugsweise interessantes. Dicht gedrängt, zärtlich aneinandergeschmiegt vielmehr, sitzen die beiden Vögelchen regungslos; oder sie krauen sich gegenseitig im Gefieder, namentlich am Kopfe herum, wobei der leidende Theil in komischer Weise dem andern den Kopf ausgestreckt hinhält, ihn langsam drehend und wendend, damit jener doch ja recht bequem alle Seiten durchnesteln kann. Dann fliegen sie beide herab zur Erde, huschen hier in anmuthiger Beweglichkeit nahrungsuchend umher, schwingen sich wieder empor und nun beginnt der Liebestanz des Männchens, welcher drolliger als bei den meisten andern Prachtfinken ist. Es streckt den ein wenig geöffneten Schnabel tief zum Boden hinab, hält den Hals dabei sonderbar umgedreht, mit gesträubten Federn, breitet den Schwanz fächerartig aus und erhebt hin und wieder das Köpfchen zur wunderlich-gravitätischen Verbeugung. Dabei läßt es einen schrillklingenden Sang ertönen. Die Begattung des Goldbrüstchens unterscheidet sich dadurch von denen aller übrigen Verwandten, daß sie sehr häufig wiederholt wird; besonders die im kleinen Käfig gehaltenen Pärchen üben sie wol unzählige Male im Tage aus, und es gibt vielleicht keinen andern Vogel, der in dieser Hinsicht das Goldbrüstchen übertrifft. Nur in der Zeit der Liebe, bis zum beginnenden Brüten, wol auch bis zum Auskommen der Jungen erhebt das Männchen täglich seinen Morgengesang. Es hockt dann auf einem der höchsten Zweige, oft vom Nest weit entfernt und zirpt unaufhörlich, je nach der Jahreszeit bis gegen sieben oder acht Uhr. Förmlich andächtig sitzt der kleine goldgelbe Sänger da und läßt sich durchaus nicht dadurch beirren, daß die meisten Vögel schon längst an den Futterkörben sich versammelt haben. Wenn es mehrere Goldbrüstchen sind, so sucht jedes die andern zu überschreien. Plötzlich erstirbt das Lied, sie eilen zum Futterplatze, jagen hier alle Genossen und selbst viel größere Vögel aus dem Wege, sättigen sich in augenscheinlicher Hast und lösen dann ihre Weibchen in den Nestern ab. Ziemlich regelmäßig von zwei zu zwei Stunden wechseln Männchen und Weibchen beim Brüten.

Während der goldbrüstige Astrild zur Ernährung doch zweifellos auf die Sämereien niedriger Gräser an der Erde angewiesen ist, dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein, daß er sich am liebsten auf den Spitzen mittelhoher Bäume aufhält. In der Vogelstube wählen ebensowol die nicht nistenden Pärchen, als auch die Männchen, deren Weibchen brüten, immer die höchsten freistehenden, dünnen Zweige zur Nacht- oder Mittagsruhe. Auch das Nest wird stets in der Höhe angebracht; die drei alten Pärchen und später auch die jungen schon heckenden bewohnten immer hochhängende Harzer Bauerchen, überflochtene Strohkörbchen oder die kleinsten, vorn offenen Frühauf'schen Nistkasten; niemals fand ich ein Nest niedrig oder frei im Gebüsch stehend. Im Gegensatz zu den andern nahverwandten Prachtfinken, erbauen die Goldbrüstchen stets nachlässig, aus Papier- und Baststreifen, Baumwollfäden, Agavefasern und Heuhalmen sehr lose zusammengeschichtet, überwölbt, mit seitlichem, weiten und kaum gerundeten Flugloch, innen dagegen einigermaßen sorgfältig geglättet, mit Pferdehaaren, Watteflöckchen und Federn ausgepolstert.

Das Gelege besteht meistens aus drei bis vier, doch auch sieben und sogar bis neun Eiern. Der Nestflaum ist weiß; die Schnabelwarzen sind gelblich. Das Jugendkleid ist schlicht hell gelbgrau, oberhalb etwas dunkler, die Flügelfahnen und Schwanzfedern sind dunkelbraun, auf dem Bürzel läßt ein schwaches, doch deutlich wahrnehmbares Röthlichgelb die Art erkennen, der rothe Augenbrauenstreif fehlt aber, das Schnäbelchen ist glänzend schwarz, die Augen sind dunkelbraun, die Füße schwarzbraun. Bereits im Alter von drei Wochen beginnt die Verfärbung. Das ganze Gefieder blaßt sich merklich ab, auch der Schnabel wird heller, mehr und mehr treten zugleich an den Seiten die weißlichen Flecke und dunkeln Zeichnungen hervor. In fünf Wochen ist das untere Gefieder hell gelblich, das obere dunkler braun geworden; erst nach acht Wochen ist die Verfärbung in der Weise vollendet, daß das Gelb schönen Glanz und Tiefe angenommen und das durch Fahlgelb in Röthlichbraun wechselnde Schnäbelchen schön glänzend roth geworden. Auch der etwa in der sechsten Woche sichtbar werdende Augenbrauenstreif ist in der achten Woche vollkommen ausgebildet. Dann ist der Vogel fortpflanzungsfähig. Erst im zweiten Jahre zeigt sich das lebhafte Orangeroth des Männchens an der Brust; es dehnt sich so aus, daß es im fünften Jahre zuweilen Hals, Brust und den oberen Bauch gleichmäßig überdeckt. So schön gefärbte Männchen sind aber sehr selten. Bei denen, welche die Vogelstuben bevölkern oder in den Vogelhandlungen vorhanden sind, bildet das Orangeroth an der Oberbrust gewöhnlich nur eine mehr oder minder breite Binde.

Wenn die Bruten des Goldbrüstchens glücken, so zeigt es eine sehr beträchtliche Vermehrung, und man wird keinenfalls fehlgreifen in der Annahme, daß dies Vögelchen in der Freiheit alljährlich drei- bis viermal niste und jedesmal

zwischen vier bis sechs Junge erziehe. Gehen aber die Bruten in der Gefangenschaft fehl, sei es durch Störung oder weil die angemessene Nahrung zum Auffüttern der Jungen mangelt, so entwickeln diese Vögel eine seltsame oder geradezu widernatürliche Fruchtbarkeit. In der Vogelstube des Herrn Dr. Rey in Halle erbrütete ein Paar Goldbrüstchen im Laufe eines Jahres 54 Junge und außerdem wurden ihnen 67 Eier fortgenommen, so daß das Weibchen also 121 Eier gelegt hatte. Natürlich kommt bei einer solchen übermäßigen Erzeugung der Vogel um. Es ist daher eine hochwichtige Aufgabe der rationellen Züchtung, diese erstaunliche Leistungsfähigkeit in naturgemäße Bahnen zu lenken.

Ebenso wie der getigerte, wird auch der goldbrüstige Astrild bei den Vogelhändlern mit der Zeit regelmäßig tief braunschwarz gefärbt. Ganz in derselben Weise, wie ich diese Farbenveränderung S. 72 beschrieben, findet sie auch bei diesem Vogel hin und zurück statt.

Im großen Gesellschaftskäfige mit verschiedenen Vögeln zusammen, wie bei den Händlern oder in kleinen Gebauern in wenigen Pärchen, immer zeigen sich die goldbrüstigen Astrilde sehr sanft, verträglich und untereinander ungemein zärtlich. Während des Nistens aber und namentlich im Beginn desselben werden auch sie zu Raufbolden, die mit jedem andern Vogel anbinden und nur der Uebermacht weichen. Ihre Befehdung ist aber niemals eine gefährliche; junge oder kranke Vögel greifen sie nicht an. Für den kleinen Schmuckkäfig sind sie um ihrer Lieblichkeit willen sehr zu empfehlen; den Sperlingsgesang lassen sie in demselben nicht hören und selbst ein nistendes Männchen, welches jedoch außerhalb der Vogelstube ein Heckbauer bewohnt, stimmt dieses Lied nicht an.

Obwol das Goldbrüstchen, wie erwähnt, zu den Prachtfinken gehört, welche am beliebtesten sind und am häufigsten gekauft werden, so steht es doch unter denen, die man gleichsam als die Märtyrer der Liebhaberei ansehen kann, hochobenan. Diese zarten Zier- und Schmuckvögel werden vorzugsweise von den Frauen gern in eleganten Käfigen in den Salons gehalten, wo sie dann zum Leidwesen der empfindsamen Besitzerinnen nur zu bald einem kläglichen Schicksal erliegen. Beiläufig möchte ich daher auf die Uebelstände des Haltens solcher Luxusvögel einmal hinweisen.

Einige ganz einfach-alltägliche Verhältnisse sind es, die vielen Stubenvögeln, besonders den weichlicheren, nur zu verhängnißvoll entgegentreten. Das Reinigen der Zimmer des Morgens, so nothwendig es für das menschliche Wohlergehen auch ist, wird doch für die Vögel verderbenbringend. Das dabei erforderliche Oeffnen der Fenster bewirkt, selbst wenn direkter Zug vermieden werden kann, ein plötzliches Sinken der Temperatur um mehrere Grade, durch das Abstäuben, Fegen, Sprengen oder gar Dielenscheuern wird eine stauberfüllte, naßkalte, kurz und gut ungesunde Luftmischung erzeugt, welche Erkältung, Schnupfen, Lungen-

entzündung u. dgl. ebenſo bei den Vögeln, wie bei den Menſchen hervorruft. Da wundern ſich dann die Vogelliebhaberinnen nicht ſelten darüber, daß ihre Vögel bei beſter Pflege, ohne alle Veranlaſſung, wie ſie meinen, krank geworden und eingegangen — und lediglich dieſe Unachtſamkeit und Unkenntniß trägt die Schuld daran, daß die Vogelliebhaberei gar viele Anhänger, bezüglich Anhängerinnen, wieder verliert. Als die wichtigſte Regel einer erſprießlichen Verpflegung ſei auch bei dieſer Gelegenheit die Nothwendigkeit hervorgehoben: daß wir jedes Thier zunächſt recht kennen lernen müſſen, bevor wir es ſchätzen, lieben und angemeſſen verpflegen können. —

Das Goldbrüſtchen gehört zu den billigſten unter allen Benguelisten oder afrikaniſchen Prachtfinken. Man kauft das Pärchen in den Vogelhandlungen für $2^1/_2$ bis 3 Thlr. und im Frühjahr, wenn die kleinen Afrikaner knapp ſind, für $3^1/_2$ bis höchſtens 4 Thlr. Bei den Großhändlern wechſelt der Preis zwiſchen 4, 5 und 6 Frank. Es kommt faſt niemals entfedert in den Handel, auch ſterben gewöhnlich nicht ſo viele nach der Ankunft als von den verwandten Arten.

Der goldbrüſtige Aſtrild heißt auch Goldaſtrild, Goldbrüſtchen, Citronvögelchen, Auroravögelchen, Aurora-Senegaliſt, Goldblättchen.

Bengueli zèbré oder Zèbrés, deutſch Gelbborſten (Bekemans); Zebra Waxbill (Jamrach und Liſte des Lond. zool. Gart.); Sénégali ventre jaune, Astrild ventre orange (Pariſer Händler); Little Aurore-Senegali (andere Londoner Händler); Oranje of Zebra-senegali (holländiſch).

Nomenclatur: Fringilla sanguinolenta, *Temminck;* Estrelda sanguinolenta, *Lichtenstein, Swainson;* Fringilla subflava, *Vieillot;* Estrelda subflava, *Gray, Layard;* Sporaeginthus subflavus, *Cabanis, Hartlaub;* Habropyga subflava, *Heuglin;* Pytelia subflava, *Reichenbach;* Dwarf-Finch, *Latham.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberhalb olivengrünlichbraun, Flügelſchwingen wenig dunkler braun, Schwanzfedern ſchwärzlichbraun, Bürzel und vorderer Oberſchwanz gelblichroth; unterhalb, Kehle, Bruſt und Bauch ſchön citronengelb, mit orangerother Bruſtbinde und gleichem Hinterleib, beim alten Männchen die Bruſt und zuweilen auch der Bauch herrlich orangeroth; Bruſt- und Bauchſeiten olivengrünlichgrau, mit zarten weißen Mondflecken und bräunlichen Bändern gezeichnet; Unterſchwanz ſchwärzlich, jede Feder mit weißem Endſaum. Ein Augenbrauenſtreif, welcher das Auge umſchließt und bis zum Hinterkopf ſich zieht, ſcharlachroth; das ſchön gelbbraune Auge hat bis zu dem korallenrothen Schnabel einen feinen ſchwarzen Zügelſtreif; die Füße ſind röthlich. Das Weibchen iſt oberhalb ebenfalls olivengrünlichbraun mit röthlichgelbem Bürzel, unterhalb bräunlichgelb, Kehle, Bruſt- und Schenkelſeiten graugelb, mit dunkleren Wellenlinien; untere Schwanzdecken röthlichgelb.

Aegintha sanguinolenta. Supra olivaceo-fusca, subtus rubro-aurantia; superciliis et uropygio rubris; gula, pectoris ventrisque lateribus flavis; hypochondriis dorso concoloribus, albo-undulatis; cauda nigra, albo-terminata rostro et pedibus rubris.

Länge c. $8{,}5^{cm}$. ($3^1/_4$ Z.), Flügel $4{,}3^{cm}$. ($1^7/_{10}$ Z.), der gerundete Schwanz $3{,}5^{cm}$. ($1^2/_5$ Z.).

Juvenis flavido-canescens, subtus obscurius; remigibus et rectricibus obscure fuscis; uropygio afflatum offerente rubidogilvum, signum velut specificum; rostro nigro, nitido; iride nigro-fusca; pedibus nigro-fuscis.

Beschreibung des Eies: Farbe weiß, schwach glänzend, Gestalt länglich-eiförmig, mit undeutlicher Spitze. Länge 13,5 bis 14 mm., Breite 10,5 bis 11,5 mm.

Ovum album, subnitens, sublongo-ovatum, apice indistincto.

Der kleine rothe Astrild [Aegintha minima].

Tafel III. Vogel 6.

Draußen toben die ersten Herbststürme. Alles Milde, Trauliche und Schöne rüstet sich zum Scheiden und wir nehmen trauernd Abschied von dem muntern Leben und Weben in der freien Natur. Gerade in dieser Zeit — im Verlaufe des Monats September — pflegt sich in der Vogelstube eins der lieblichsten Bilder traulichen Familienlebens eines Vogelpärchens zu entfalten.

Dies ist der unter dem Namen Amarantvogel oder kleiner Amarant allen Liebhabern wohlbekannte Prachtfink. Seine Grundfarbe ist blutroth bis karminroth, am Oberrücken und Oberschwanz, sowie an den Flügeldecken röthlich dunkelbraun mit olivengrünlichem Ton. Der glänzend rothe Schnabel mit schwarzer Firste, ein schöngelber Augenring und zierliche weiße Pünktchen an den Brustseiten verschönern sein Ansehen, und, namentlich wenn sein Gefieder in den Sonnenstrahlen glänzt, erscheint auch er uns als einer der lieblichsten Tropenvögel, welche lebend nach Europa eingeführt werden. Das Weibchen ist schlicht einfarbig dunkelbraun, unterhalb heller, und an dem rothen Bürzel, Oberschwanz und Augenbrauenstreif zu erkennen; auch hat es die Seitenpünktchen. In der Größe ist er dem Grauastrild gleich, in der Gestalt aber gedrungener.

Der Karmin- oder Blutastrild, wie er von den Reisenden gewöhnlich genannt wird, gehört zu den fremdländischen Vögeln, über welche, namentlich durch Hartmann, v. Heuglin und Speke die ausführlichsten Nachrichten veröffentlicht worden.

Seine Verbreitung erstreckt sich insbesondere über Mittelafrika, von der Ostküste bis zum Westen, doch ist er auch im Nordosten und südlich bis zum 10. Grade n. Br. gefunden. Somit dürfte er gleich dem grauen Astrild im ganzen tropischen Afrika heimisch sein. In den Nilländern ist er überall zu finden und besonders häufig in Dongola, Nubien, Kordofan, Senar, Abessynien, Bogosland, Tigreh, Bongo u. s. w.

Professor Dr. Robert Hartmann vergleicht ihn mit unserm Haus- und Feldsperling, weil er vorzugsweise gern an den menschlichen Wohnungen und selbst innerhalb derselben nistet und z. B. in Südnubien und im Ostsudan in keiner Ortschaft fehlen soll. Auch seine Lebensweise stimmt mit der unserer Sperlinge überein. Außer der Brutzeit trifft man ihn gewöhnlich nahe bei den Gebäuden, in den Gärten und auf den Feldern, aber ebenso auch in den Steppen und im Urwalde mit Schmetterlingsfinken, Stahlfinken und anderen zusammen, oft in großen Schwärmen. Der genannte Forscher beobachtete im Mai ganze Wolken

von Karminfinken am blauen Nil, und Heuglin ſah außerordentlich große Scharen bei oder innerhalb der Stadt Dongola. Familienweiſe lebt dieſer Aſtrild in den Dörfern, ſeltener in unbewohnten Gegenden und im Gebirge, wo er z. B. in Abeſſynien bis zu 3000 Meter (9000 Fuß) Meereshöhe hinaufgeht. Heuglin ſagt: die Blutfinken ſind liebe, muntere Vögelchen, welche zutraulich in die Stallungen und ſelbſt in die Zimmer kommen, um Körnchen, Brocken u. dgl. aufzupicken. Der Lockton beſteht in lebhaftem Zirpen, der Geſang iſt einfach, aber nicht ohne Melodie. Auf Bäumen und Gebüſch bemerkte ich dieſe Vögelchen über Tag ſelten; ſie halten ſich lieber auf der Erde, an Bewäſſerungsgräben, Düngerhaufen, ſowie auf Mauern, Dächern und in Fenſtern auf und verlaſſen ihre einmal eingenommenen Standorte ſehr ungern, ſolange Menſchen in der Nähe hauſen. Im Schutz und in der Kühle der Citronenbäume pflegen ſie ſich allabendlich, wenigſtens im Hochſommer zur Nacht einzufinden. Unter eifrigem, feinen Piepen und Gezwitſcher ſammeln ſie ſich gegen Sonnenuntergang und lärmen noch eine gute Zeit fort, ehe ſie zur Ruhe kommen.

Das Neſt ſteht auf Dachſparren, unter Strohdächern, in Mauerlöchern und ſogar in Mattenzelten, auch ſoll es beſonders häufig in den einſamen verlaſſenen und verfallenden Hütten, ſeltener dagegen im Gebüſch und Graſe am Boden zu finden ſein, oder wol gar auf Bäumen; doch iſt die letztere Behauptung noch nicht erwieſen. Ein wenig zuverläſſiger Reiſender giebt auch an, daß ſolche Neſter, gleichviel ob er ſie in und an den Gebäuden oder im Freien auf der Erde im dürren Graſe geſehen, aus großen Halmen roh zuſammengefügt geweſen, mit einem flachen Neſtnapf aus Gräſern u. dgl. Heuglin behauptet freilich ebenfalls, daß er von dieſem Vogel kunſtloſe Neſter gefunden.*) Hiermit ſtimmen die Beobachtungen keineswegs überein, welche die Züchter ſeit Vieillot gerade am Amarant in aufmerkſamſter Weiſe und mit übereinſtimmenden Ergebniſſen gemacht.

Schon der genannte franzöſiſche Forſcher hat den Petit senegali rouge mit Erfolg gezüchtet und ſchildert ihn in folgender Weiſe. Dieſe Vögelchen ſind ſanft und zutraulich und untereinander ſo zärtlich, daß ſie ſtets geſellig und am liebſten dicht gedrängt zuſammen ſitzen, beſonders die Nacht hindurch. Zur Paarungszeit aber ſondern ſich die einzelnen Pärchen ab und bekämpfen ſich gegenſeitig, ſo daß man ſie trennen muß. Jedes Männchen lebt jetzt nur für ſein Weibchen; vor der Begattung ſetzt es ſich in ſeine Nähe mit einem Hälmchen

*) In den Schriften der übrigen Afrikaforſcher, wie *Antinori* „Catalogo descrittivo di una Collezione di Uccelli fatta nell' interno dell' Africa centrale norte", *Andersson* „Birds of the Damara Land", *Layard* „Birds of South Africa", *Blanford* „Geology and Zoology of Abyssinia", welche des Vogels erwähnen, iſt über ſeine Niſtweiſe leider ebenfalls nichts Näheres angegeben.

im Schnabel, hüpft in kleinen Sprüngen empor, tritt abwechselnd mit den Beinen auf den Zweig, auf dem es sitzt, und singt nun zum Vorspiel seines Genusses. Der angenehme, doch sehr kleine Gesang wird mehrmals munter und freudig wiederholt. Erfolgt aber die Parung durch die Weigerung des Weibchens nicht, so wird das Männchen ärgerlich und treibt es umher. Beide bauen gemeinsam das Nest, außen von Hälmchen und Moos und innen mit Federn und Pflanzenwolle ausgepolstert, etwa so groß wie ein Straußenei, mit dem Flugloch seitwärts in der Mitte. Zur Brutzeit verlangen diese Vögel 25 Grad Wärme und sie nisten vorzugsweise in unserm Winter. Durch Trennung der Geschlechter kann man die Nistzeit wol hinausschieben, doch machen sie dann höchstens zwei Bruten. Will man ihre Zucht betreiben, so bleibt es immer Regel, mehr Weibchen als Männchen anzuschaffen, weil die ersteren leichter sterben. Alle diese und weitere Angaben Vieillot's vermag ich noch bedeutsam zu ergänzen.

Der Amarant gehört zu den Vögeln, welche auch bei den deutschen Züchtern vielfach und mit dem besten Erfolge genistet haben. In meiner Vogelstube war er einer der ersten, die mit besonderm Glück ihre Jungen großzogen. Vornehmlich auf diesen Astrild (nächst Bandfink und Zebrafink) gründeten sich meine Erfahrungen, als ich in der „Gartenlaube" die erste Anregung zur Einbürgerung und Züchtung dieser lieblichen Vögel in der Häuslichkeit gab. Obwol ich aber den Amarant mit außerordentlichem Erfolge gezogen, so glaube ich doch nicht behaupten zu dürfen, daß auch er bei mir zuerst genistet hat. Unter den vielen Vögeln, die Herr Leuckfeld in Nordhausen, einer der früheſten und glücklichſten deutſchen Vogelzüchter, flügge werden gesehen, war auch der Amarant. Außerdem haben dann die Herren Emil Linden, Graf Yorck von Wartenburg, Freiherr v. Beust, Instrumentfabrik-Besitzer Grimm in Stettin, Baron v. Freyberg, Dr. Rey und andere diesen Prachtfink freifliegend und selbst in kleinen Käfigen vielfach gezüchtet.

Der rothe Astrild ist ein Kosmopolit, der sich in jede Lage zu schicken und immer aus ihr den möglichsten Vortheil zu ziehen weiß. Auch seine eigenthümliche Schwanzbewegung spricht für einen ruhigen, bedächtigen Charakter. Nicht seitwärts hin- und herschwankend, sondern gleichsam nachdenklich erwägend auf und ab geht der Schwanz, und nur bei starker Erregung zeigt er ein ruckweises, heftiges Emporschnellen. Das erste Pärchen in meiner Vogelstube schlüpfte täglich mit unglaublicher Dreistigkeit beim Oeffnen der Thür uns über die Köpfe in die Wohnstube, um hier irgend einen mangelnden Baustoff oder von den vielen Blumentöpfen Würmchen u. dgl. zu suchen. Noch viel verwunderlicher war es aber, daß diese Vögel durch die der anderen wegen nur ganz wenig geöffnete Thür wieder zurückkehrten. Dies habe ich nur bei wenigen Arten außer ihnen, wie Goldbrüstchen und Grauastrilds, beobachten können, während andere, sonst sehr schlaue Vögel, z. B. die kleinen Elsterchen,

wenn sie sich in ein anderes Zimmer verflogen, selbst bei viel weiter geöffneter Thür gar nicht leicht zurückfinden können.

Das Nest erbaut dieser Astrild mit ähnlicher Weltweisheit an den verschiedensten Oertlichkeiten, sobald ihm diese nur günstig erscheinen; er wählt ebensowol Harzbauerchen als auch geschlossene Nistkasten, irgend welche Höhlen oder ganz offene Nistkörbchen, wenn diese nur unter überhängendem Strauchwerk verborgen sind; ganz frei im Gebüsch steht das Nest niemals. Die Unterlage des Nestes ist aus gröberen Halmen, selbst trockenen Blättern oder solchem Vogelkraut geschichtet, die Wände und die Ueberwölbung sind aus weichen und langen Papier- und Baststreifen, allerlei Fäden, Pferdehaaren oder Agavefasern und Heuhalmen aufgebaut und das Lager für die Eier ist aus Baumwollflöckchen, kurzen weichen Haaren, Hede, Federn, Läppchen u. dgl. hergestellt. Immer ist das Nest oben überwölbt, kugelrund von Gestalt, mit einem seitlichen, sehr kleinen und zierlich gerundeten, zuweilen ganz verdeckten Schlupfloch. Im Spätsommer, wenn man den Vögeln frische Spargelzweige bieten kann, führen sie fast ausschließlich von den langen weichen Aestchen derselben einen ungemein künstlichen Bau aus.

Alle Züchter dieses Vogels haben darauf hingewiesen, daß gerade sein Nest zu den vorzugsweise kunstvollen gehöre; insbesondere Dr. Rey und Baldamus schildern dasselbe als solches und der erstere vergleicht es mit dem des Laubsängers. Gern benutzt der Amarant fremde Nester und man kann ihn daher mit Erfolg zur Brut anregen, wenn man alte wohlgesäuberte Sperlingsnester u. a. in der Vogelstube in Nistkörbchen oder Harzerbauerchen steckt. Er gehört auch zu den Prachtfinken, die während der Brut bei der Ablösung und besonders wenn schon kleine Junge vorhanden sind, immer noch eine Feder mitbringen.

Das Gelege besteht in drei bis sieben, fast regelmäßig aber in vier Eiern. Der Nestflaum der Jungen ist bräunlichweiß und an den Schnabelwinkeln stehen je zwei weiße und ein blaues Wärzchen. Das Jugendkleid ist oberseits bräunlich fahlgrau, unterseits etwas heller bräunlichgrau; nur das zarte, noch düstere Roth am Bürzel bis zum Mittelschwanz und an den Außenfahnen der Steuerfedern läßt die Art mit Bestimmtheit erkennen. Der Schnabel ist glänzend schwarz; das Auge ist dunkel ohne gelbe Lider; ebenso fehlen die Pünktchen an den Seiten. Die Verfärbung beginnt in der dritten bis fünften Woche und ist in sechs Wochen, oft aber auch erst nach Monaten vollendet. Ihre Dauer hängt von dem Fütterungszustande, namentlich aber von der Witterung ab; je höher der Wärmegrad in der Vogelstube, um so schneller und besser verfärben sich die jungen Prachtfinken. Mit einzelnen rothen Federn an Stirn, Hals und Brust beginnend, schreitet die Farbe über den ganzen Körper fort, während das Schnäbelchen sich ebenfalls allmälig röthet. Beim Weibchen geht in gleicher Weise das Graubraun in Gelblichbraun über.

Im übrigen gleicht die ganze Brutentwickelung wiederum der des grauen Astrild und auch die Verpflegung ist übereinstimmend. Der Amarant gehört zu den Prachtfinken, welche vorzugsweise leicht auch im kleinen Heckkäfige ihre Bruten aufbringen und in der Seite 41 angegebenen Vorrichtung mit bestem Erfolge zu züchten sind. Nur wolle man eine Bedingung nicht außer Acht lassen, die ausreichender Wärme nämlich. Zwar muß ich als Kuriosität beiläufig erwähnen, daß in der Vogelstube des bekannten Eierkundigen, Dr. Baldamus, ein Pärchen dieser Vögel nistete und die Jungen glücklich erzog, während an jedem Morgen das Wasser zu Eis gefroren war. Wenn man nun aber von einem Ausnahmefall ohne weiteres darauf schließen wollte, daß diese zarten Tropenvögel sämmtlich in ungeheizten Stuben bei unserm Winter ihre Jungen erziehen können, so beruht das nur in Unkenntniß. Nach den übereinstimmenden Erfahrungen aller namhaften Züchter ist es nicht zu bezweifeln, daß das leider nur zu häufige räthselhafte Erkranken der Weibchen, welches schon Vieillot beklagt, sowie das Ersterben der Jungen trotz der besten Verpflegung lediglich in der mangelnden Wärme oder stark schwankenden Temperatur des Züchtungsraumes begründet ist. Herr Graf Yorck von Wartenburg, welcher in seiner Vogelstube gleichmäßig mindestens 16 Grad R. erhält, hat sich ohne Frage in Deutschland der glücklichsten Züchtungsergebnisse mit den kleinen Prachtfinkenarten zu erfreuen. Näheres bitte ich in dem Abschnitt über Züchtung nachzulesen.

Von besonderer Wichtigkeit ist eine hohe, nicht schwankende Wärme aber während der Verfärbung der jungen Amarantvögel. Auch in dieser Hinsicht sind weiterhin im genannten Abschnitt eingehende Rathschläge zu finden.

Der Amarant ist wiederum einer der beliebtesten Prachtfinken. Er hält sich, einmal eingewöhnt, viele Jahre hindurch vortrefflich. Sowol in der Vogelstube als auch im kleinen Schmuckkäfige gehört er zu den verträglichsten. Zwar befehdet er während der Brut die nächsten Verwandten, goldbrüstige, getigerte, gelbgrüne u. a. Astrilde eifrig, jedoch unschädlich. In meiner Vogelstube nisteten alle diese Arten in zahlreichen Pärchen, ohne einander wesentlich zu stören. Der Amarant lebt auch mit seinen Jungen von mehreren Bruten familienweise friedlich beisammen. Dr. Luchs rühmt seine Liebenswürdigkeit in folgender Weise. In einem Schwarm verschiedener kleiner Astrilde im Gesellschaftskäfige zeigt er sich als der ruhigste und sanftmüthigste. Wenn des Morgens beim Füttern die kleine Gesellschaft in emsiger Hast herbeieilt und auf dem sandigen Boden die verstreuten Körnchen aufzupicken beginnt, so geht dies bescheidene Vögelchen jedem andern aus dem Wege und macht weder am Futterkasten, noch am Trinknapf oder an der Badewanne einem den Vorrang streitig. Sein Ruheplätzchen ist immer das, welches die anderen ihm übrig lassen, und wenn sich das Federvölkchen zur Nacht zurechtsetzt und auf den Stangen dicht

gedrängt aneinander reihet, dann ist dem geduldigen Amarant fast immer die Rolle des Flügelmanns beschieden, während die anderen, selbst wenn sie einmal aus der Linie heraushüpfen, sich keck und dreist wieder in dieselbe hineindrängen. Sehr schön ist der Anblick, wenn in der bunten Reihe der Zufall dem karminrothen Vögelchen den hell gelbgrünen Astrild oder den himmelblauen Schmetterlingsfink nachbarlich zugeführt hat; entzückend aber, wenn eben diese zu dreien eine bunte Kette darstellen. — Nach der Ausfärbung bleibt das Gefieder immer gleichmäßig schön. Von einem wirklichen Gesange kann freilich nicht viel die Rede sein; er besteht nur in einem hellklingenden dreisilbigen Ruf, der mehrfach wiederholt wird.

Die Vogelhändler halten den Amarant für einen der weichlichsten unter den kleinen Vögeln, und dies ist bedingungsweise in der That richtig, indem er besonders bald nach der Ankunft ungünstigen Einflüssen, wie Zugluft, naßkaltem Wetter u. dgl., gar zu leicht erliegt. Dazu kommt noch die Gewöhnung von der Senegalhirse an unsere weiße Hirse, ferner der Wechsel des Trinkwassers, die häufige Beunruhigung durch das Herausgreifen — und die soeben importirten Vögel, namentlich aber die Amarant-, Schmetterlingsfinken und Rothschwänzchen sterben gewöhnlich in nur zu großer Anzahl. Um gegen solche Verluste sich zu bewahren, sollte man sie in einem recht geräumigen Käfige oder besser freifliegend in einem Kämmerchen, dieses wie jener reichlich mit Strauchwerk und auch mit warmen Nestern ausgestattet, in gleichmäßiger warmer Temperatur recht reinlich halten und mit bester weißer Hirse, wenn möglich nebst Senegal- oder Kolbenhirse, verpflegen. Nothwendige Erfordernisse sind noch trockener, nicht zu kalter Sand und Sepienschale oder anderer Kalk. Außer den bereits genannten schädlichen Einflüssen sind die Vögelchen dann aber auch vor eiskaltem Trinkwasser, sowie vorläufig vor Grünkraut, Quellfutter und anderen Beigaben zu bewahren.

Eine ebenso sonderbare als betrübende Erscheinung ist die, daß die schönsten und kräftigsten alten Amarantvögel auffallend leicht zu Grunde gehen, wenn sie aus der Vogelstube gefangen und in einen Käfig gebracht werden. Ob die Beängstigung oder ein unüberwindlicher Freiheitstrieb die Ursache — wer kann es wissen! Immerhin aber ist es rathsam, daß man die größtmöglichste Vorsicht beachtet.

Der Preis für den Rothastrild wechselt zwischen drei bis vier Thaler für das Pärchen und beträgt bei den Großhändlern vier bis sechs Franken. Sehr kahle Vögel dieser Art einzukaufen ist immer gewagt; mindestens achte man auf die im Abschnitt über den Einkauf gegebenen Vorsichtsmaßregeln. In allem übrigen verweise ich nochmals auf das beim Grauastrild Gesagte.

Der kleine rothe Astrild heißt auch Amarantvogel, Amarant, kleiner oder kleinster Amarant, kleinster Senegalist, Zwergfink oder Zwergastrild, Karminfink oder Karminastrild, Blutastrild, Rothastrild, Tausendschön und Feuervögelchen.

Amaranthe und Amarante (Vekemans und die französischen Händler); Firefinch und Firebird (Jamrach in London); Kleine Vuurvogeltje of Amaranthe (niederländisch).

Nomenclatur: Fringilla minima, *Vieillot, Heugl.*; Fringilla senegala, *Lichtst.*; Estrilda minima, *Rüppell*; Estrelda minima, *Gray, Sclater, Bonp., Hartl.*; Lagonosticta minima, *Cab., Antin., Hartm., Heugl., Reichb.*; Lagonosticta ignita et L. senegala, *Reichb.*; Pytelia minima, *Hartl.* et *Finsch.*

Fringilla senegala, *Linné*; Senegalus ruber, *Brisson*; Le Senegali, *Büffon.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Kopf, Hals, Bürzel, obere Schwanzdecken und ganze Unterseite dunkel purpurroth, an den Brustseiten mit kleinen weißen Pünktchen; Mantel und Schultern rehbraun, roth verwaschen (jede Feder mit purpurnem Endsaum), Schwingen- und Deckfedern dunkel rehbraun mit schwach purpurrothen Außensäumen, Oberschwanz tiefbraun, jede Feder mit rother Außenfahne; untere Flügeldecken, Hinterleib und untere Schwanzdecken blaß rehbraun, Unterschwanz bräunlich schwarz. Schnabel roth, mit schwarzer Firsten- und Dillenkante; Auge dunkelbraun mit nacktem gelben Ring umgeben; Füße röthlich fleischfarben. Das Weibchen ist rehbraun, unterhalb an Bauch und Seiten okerbräunlich; Brustseiten mit einzelnen größeren weißen Pünktchen; Flügelschwingen und Schwanzfedern braunschwarz, letztere am Grunde der Außenfahne purpurroth, untere Schwanzdecken düster weiß; Zügel und Augenbrauenstreif, Bürzel und obere Schwanzdecken purpurroth. Schnabel wie beim Männchen.

(Die weißen Pünktchen fehlen zuweilen ganz, die rothe Färbung erscheint mehr oder minder hell und dehnt sich wol über den ganzen Mantel und die Flügeldecken aus, während andererseits bei manchen die olivenbraune Färbung sich über die ganze Oberseite mit Einschluß der Stirn erstreckt. Da ich von zwei ungepunkteten Eltern mehrere Bruten von Jungen mit den Pünktchen gezogen und da sowol der intensive Ton, als auch die Ausdehnung der rothen Färbung vom Alter und von dem Verpflegungszustande abhängt, so fallen sicherlich die abgezweigten Arten oder Lokalrassen [wie Estrelda lateritia, *Heugl.*] als übereinstimmend fort.)

Aegintha minima. Capite, collo, uropygio, supracaudalibus latereque toto inferiore saturate coccineis; pectoris lateribus albo-punctulatis; interscapilio humerisque ochraceo-fuscis, rubro-lavatis [limbo terminali plumae singulae coccineo]; remigibus et tectricibus al. subochraceo-fuscis, exterius coccineo-sublimbatis; pogoniis exteris rectricum fuscarum coccineis; tectricibus subalaribus, abdomine et infracaudalibus dilute fuscescentibus; rectricibus infra subfusco-nigris; culmine gonateque rostri rubri nigris; iride picea; superciliis nudis laete flavis; pedibus rubido-carneis. — ♀: lurido-fusca, abdomine, lateribus, sparsim albo-punctulatis; remigibus et rectricibus fusco-nigris, harum basi pogonii coccinea; subcaudalibus albidis; loris, stria ophthalmica, uropygio et supracaudalibus coccineis; rostro maris.

Länge c. 9cm. (3 Z..6 L.), Flügel c. 4,4cm. (1 Z. 8 L.), der gerundete Schwanz c. 3,3cm. (1 Z. 3 L.).

Juvenis: supra lurido-cinerea, subtus dilutius; rubedine uropygii usque caudam mediam et pogoniorum rectricum externorum obsoletissima, eaque signo certe specifico; rostro nigro nitido; iride obscura; annulo superciliari flavo punctulisque hypochondriorum albidis adhuc nullis.

Beschreibung des Eies: Farbe kalkweiß, wenig glänzend, Struktur feinkörnig; Gestalt eiförmig mit stumpfer Spitze. Länge 15mm., Breite 12mm.

Ovum cretaceum, subopacum, granulosum, ovatum apice obtuso.

Der **rothbrüstige Astrild** [Aegintha rufopicta] unterscheidet sich von dem vorigen durch die olivenbraune Oberseite, während nur die Stirn, Kopfseiten und

die ganze Unterseite weinroth gefärbt sind; die Größe ist übereinstimmend. Von dem nächstfolgenden dunkelrothen Astrild, dem er ebenfalls sehr nahe steht, ist er durch helle untere Schwanzdecken und weinrothe Stirn verschieden. Ich habe im Lauf der Jahre sorgfältig darauf geachtet, ob unter den zahllosen, von den Großhändlern eingeführten kleinen Amarantvögeln diese Art wol einmal vorhanden sein würde, allein es ist mir niemals ein Exemplar vorgekommen. Der Vogel ist daher für die Liebhaberei vorläufig noch nicht zugänglich, doch wird er demnächst wol ebenfalls eingeführt werden. Eine Seltenheit dürfte er immerhin bleiben, denn Heuglin fand nur wenige Köpfe in Bongo und Wau in Centralafrika, vor und nach der Regenzeit auf Gebüsch unfern von Gewässern. Auch an der Goldküste hat man ihn beobachtet und seine Verbreitung soll sich über das westliche Mittelafrika erstrecken. Ueber seine Lebensweise ist Näheres nicht bekannt. Die meisten Afrikareisenden und Schriftsteller erwähnen ihn gar nicht die übrigen nur kurz (Allen, Sharpe, Fraser, Hartl. und Finsch). Eine schöne Abbildung hat Fraser und nach derselben auch Reichenbach eine gegeben.

Rothbrüstiger Astrild, rothbrüstiger Senegali, rothbrüstiger Amarant, Rothbrustamarant.

Estrelda rufopicta, *Fraser*; Lagonosticta rufopicta, *Hartl.*, *Sharpe*, *Heugl.*; Lagonosticta lateritia, *Finsch*, *Heugl.*; Estrelda lateritia, *Heugl.*

Der dunkelrothe Astrild [Aegintha rubricata].

Tafel II. Vogel 8.

Für den begeisterten Freund dieser kleinen Vögel giebt es gewiß nichts Verlockenderes, zugleich aber auch Täuschungsreicheres, als eine Anzahl derselben, welche gleichsam als gaukelnde Irrlichter auftauchen, den Wanderer erfreuend, um dann plötzlich zu verschwinden und nichts zurückzulassen, als das Bedauern über die leider nur zu bald dahingeschwundene Erscheinung — über den Tod des schönen Vogels und über den materiellen Verlust zugleich. Solche Vögel hat der Handel in letzterer Zeit recht viele gebracht, und wir dürfen bei dieser Gelegenheit mit Freude und Stolz darauf hinweisen, daß bei uns in Deutschland die Vogelliebhaberei und mit ihr das auf die Erforschung der Naturgeschichte gerichtete Streben wahrlich nicht minder lebhaft ist, als in anderen Ländern. Derartige Seltenheiten des Vogelhandels gelangen gegenwärtig nicht mehr wie früher blos zufällig aus Unkenntniß der Großhändler hierher, sondern sie werden vielmehr in den betreffenden Hafenplätzen, besonders aber in Hamburg, London, Bordeaux im regsten Wetteifer der Händler aufgekauft und jetzt gerade vorzugsweise nach Deutschland eingeführt. Durch die lebhafte Nachfrage sind aber auch die Preise in nur zu bedeutende Höhe gestiegen. —

Den ersten dunkelrothen Astrild, ein Männchen, erhielt ich von Herrn Geupel-White in Leipzig. Dieser Vogel ist lebhaft dunkelroth, viel düsterer als der kleine Amarant und am Oberkopf, wie an Rücken, Flügeln und ganzem

Oberkörper dunkel braungrau, am Steiß und den unteren Schwanzdecken rein schwarz; Zügelstreif, Bürzel und Oberschwanz sind lebhaft roth. Die Größe ist bedeutender als die des kleinen rothen Astrild.

Das Vögelchen blieb lange einsam in der Vogelstube und schloß sich seinen kleineren Verwandten nicht an; auch als ich nur ein einzelnes Weibchen derselben fliegen ließ, parte es sich nicht mit diesem. Es starb plötzlich im schönsten Gefieder, ohne ermittelbare Veranlassung. Dann sandte mir Fräulein Hagenbeck mehrere Köpfe dieser Art. Sie waren kürzlich erst angekommen und sehr schlecht gefiedert. Auch waren sie noch nicht völlig ausgefärbt, sondern am Rücken bedeutend heller, mit einem Ton ins Grünliche; an den Seiten hatten sie größere weiße Pünktchen, während das alte Männchen, welches ich ebenfalls schlecht gefiedert erhalten, das sich aber sehr gut herausgemustert hatte, die Punkte auch in voller Bekleidung gar nicht zeigte.

Vieillot schildert den Sénegali rouge als einen munteren und lebhaften Vogel, dessen Gesang, wenn mehrere in einem Käfig beisammen sind und sich gegenseitig zu überbieten suchen, als ein harmonisches, liebliches Konzert erschalle. Sie sollen so unverträglich sein, daß man die einzelnen Pärchen durchaus absondern oder sie wenigstens in einem sehr großen Käfige halten muß. Das Nest stehe inmitten sehr dichter Gebüsche, hauptsächlich aus Gräsern und Moos erbaut und enthalte gewöhnlich vier Eier. Gegen Kälte sei dieser Vogel während der Nistzeit und der Mauser so empfindlich, daß man die Wärme nicht unter 22 bis 25 Grad R. sinken lassen dürfe. Für gewöhnlich aber halte er sich sogar in einer Temperatur von nur 10 bis 15 Grad recht gut.

Die Heimat dieses Astrild ist Südafrika; gefunden ist er besonders in Natal und Kaffernland, doch überall nur selten und in wenigen Köpfen. Heuglin sah ihn im Gebiet der Bogos in 13—1700 Meter (4—5000 Fuß) Meereshöhe, zur Regenzeit parweise flüchtig über buschiges Felsen- und Hügelland schweifend. Auch in den warmen, tiefen Thälern des Gala-Landes beobachtete er ihn. Weitere Mittheilungen haben die Reisenden und Forscher über ihn nicht gemacht. Außer meiner Vogelstube, erhielten ihn noch die Sammlungen der Herren Emil Linden, Graf Yorck von Wartenburg, Apotheker Jaenicke in Hoyerswerda und A. F. Wiener in London. Es ist ein stilles, sehr heimlich im dichten Gebüsch lebendes Vögelchen, das außer seiner Schönheit keinerlei auffallende Eigenthümlichkeiten zeigt. Das Liebesspiel ist dem des kleinen Amarant fast völlig gleich, nur breitet er den Schwanz dabei fächerartig aus. Zum Nestbau und zu näherer Beobachtung des Brutgeschäfts ist es bei mir leider nicht gekommen. Die meisten, besonders die Weibchen, starben bald nach der Ankunft und auch die Männchen, welche die Mauser glücklich überstanden, erlagen eins nach dem andern plötzlich, ebenso wie das erste, ohne daß ich die Ursache ergründen konnte. Dasselbe be-

klagt Herr Graf Yorck. Herr Jaenicke schreibt mir noch ergänzend: Mein dunkler Amarant lebt seit drei Jahren. Es ist ein gewandter Vogel, der flüchtig durch die Zweige hüpft und überall neugierig durchkuckt. Sein Gesang besteht nur in wenigen Strophen, die er aber oft und ziemlich laut wiederholt. Er scheint eine, wenn auch nur laue Freundschaft für ein Weibchen des Schmetterlingsfink, nicht aber für das des kleinen Amarant zu haben.

Der dunkelrothe Astrild wurde auch dunkler oder unrichtig dunkelrother, besser blos dunkler Amarant, schönrother Senegali und Karminastrild (ebenfalls fälschlich) benannt.

(In den Preislisten der Großhändler ist er noch nicht mitgezählt, obwol er von Zeit zu Zeit in den Vogelhandel gelangt. Die Verzeichnisse der großen zoologischen Gärten führen ihn ebenfalls noch nicht auf.)

Nomenclatur. Fringilla rubricata, *Lichtenstein*; Estrelda rubricata, *Gray, Licht., Vieillot, Layard, Bonp., Ayres, Hartl.* et *Finsch*; Lagonosticta rubricata, *Cabanis, Reichb., Heugl.*; Lagonosticta rhodopareia, *Heugl.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberkopf, Nacken und Kopfseiten olivengrünlich graubraun, übrige Oberseite dunkel olivengrünlich braun, obere Schwanzdecken und der Grund der äußeren Schwanzfederfahnen dunkel purpurroth, die übrigen Schwanzfedern unter- und oberseits schwarz; Zügel, Halsseiten, Kinn, Kehle, Brust und Bauchseiten dunkel weinroth, Brust- und Bauchmitte blaßbräunlich, Schenkel und Hinterleib dunkler braun, untere Schwanzdecken schwarz; die rothen Federn der Brustseiten mit einzelnen weißen Pünktchen. Schnabel dunkelbräunlich horngrau, der untere mit hellerem Grunde; Auge dunkelbraun, von einem gelben Liderringe umgeben; Füße bräunlich bleigrau.

Aegintha rubricata: pileo, cervice, interscapilio et alarum tectricibus saturate cinnamomeo-canis; loris, antiis, collo antico, pectore et abdomine laete rubris; pectoris lateribus et hypochondriis large albo-punctulatis; crisso, subcaudalibus et rectricibus nigerrimis; uropygio, tectricibus caudae superioribus et margine rectricum externa basin versus laete rubris; genis roseo-indutis; rostro plumbeo, apice nigro; pedibus fusco-plumbeis; iride fusca.

Länge $10{,}5^{cm.}$ (4 Z.), Flügel $4{,}8^{cm.}$ (1 Z. 10 L.), Schwanz c. $3{,}9^{cm.}$ (1 Z. 6 L.)

Der **Larvenastrild** [Aegintha larvata] gehört wiederum zu denen, welche bis jetzt nur ausgestopft in den Museen vorhanden sind, obwol er doch in Westafrika und namentlich in Abessynien, also in den bekannteren Gegenden dieses Erdtheils heimisch sein soll. Er ist an Ober- und Hinterkopf bräunlichgrau und an der übrigen Oberseite düsterroth, die oberen Schwanzdecken und Steuerfedern sind dunkel purpurroth; das Gesicht und die Kopfseiten, Kehle, Bauchmitte, Unterleib und Unterschwanz sind schwarz, die ganze übrige Unterseite ist schön und lebhaft weinroth; die Brustseiten sind mit herzförmigen weißen Fleckchen geziert. Schnabel bleigrau; Auge braun; Füße dunkel bleigrau. Heuglin sagt, die purpurne Färbung ist zuweilen mehr oder weniger lebhaft und die Unterschwanzdecken sind auch purpurfarben überlaufen. Der Vogel ist so selten, daß man ihn erst in wenigen Museen (Frankfurt, Leyden, Stuttgart) findet, und das Weibchen ist noch gar nicht bekannt. Rüppell fand den Larvenastrild in den Thälern von Semión und Heuglin in West-Abessynien im Januar und April auf 13—1700 Meter (3000 bis 5000 Fuß) Meereshöhe im

Bambusgebüsch, wo er sehr scheu und flüchtig, still und verborgen lebt und sich von feinen Grassämereien ernährt.

[Amadina larvata, *Rüppell;* Habropyga larvata, *Bonap.;* Lagonosticta larvata, *Hartl., Heugl.*]

Der **schwarzkehlige Astrild** [Aegintha nigricollis], welchen Heuglin beschreibt, ist dem vorigen sehr ähnlich; er soll sich nur durch rothen Scheitel, weniger lebhaft rothen Nacken und rothgrauen Unterleib (und schwarzen oder schwärzlichen Hals?) unterscheiden. Sie dürften also wol zusammenfallen, und was der Reisende über die Lebensweise sagt, wird für beide, sowie auch für die folgenden Nächstverwandten Geltung haben. Dieser reizende Astrild findet sich paarweise und in kleinen Gesellschaften bis zu fünf Köpfen im dichten und hohen Grase, auf Lichtungen in Wau, Djur und Bongo in Centralafrika und ist hier wol Standvogel, obgleich wir ihn während der eigentlichen Sommerregenzeit nicht beobachteten. Schüchtern und flüchtig treibt er sich in den undurchdringlichen Gräserdickichten umher. Im Mai sind die Männchen lebhaft weinroth angehaucht und singen recht laut und angenehm; dann muß wol die Parungszeit sein.

[Estrelda nigricollis, *Heugl.;* Lagonosticta nigricollis, *Heugl.*]

Der **weinrothe Astrild** [Aegintha vinacea] von Westafrika unterscheidet sich von dem Larvenastrild wiederum nur durch grauen Scheitel, weinrothe Färbung des Rückens und weit geringere Größe [Estrelda vinacea, *Hartl.;* Lagonosticta vinacea, *Cab., Heugl.*]. — Sehr nahe verwandt oder vielleicht ganz übereinstimmend ist ein in Südafrika und Madagaskar heimischer Astrild [Aegintha margaritata], über welchen jedoch noch nichts weiter bekannt geworden, als daß ihn Hartlaub und Heuglin beiläufig anführen.

Hartlaub's Astrild [Aegintha Hartlaubi] wird in dem Decken'schen Reisewerk mitgezählt und mag auch hier erwähnt sein. Professor Bianconi beschreibt ihn nach einem von Fornasini aus Südmosambik eingesandten Exemplare: Oberseite dunkelgrün, Schwingen braun, außen grünlich, innen weißlich gesäumt, Schwanzfedern wie der Rücken; Vorderhals grau, etwas grünlich verwaschen, Brust und Bauch auf grauschwärzlichem Grunde mit weißen runden Flecken geziert, jede einzelne Feder trägt am Ende, durch den Schaft getrennt, zwei weiße Flecke; After und untere Schwanzdecken schmutzig weiß. Schnabel kurz, schwarz mit horngelber Basis; Beine röthlich. Länge 9 cm. [Amadina Hartlaubi, *Bianconi;* Pytelia Hartlaubi, *Finsch* et *Hartl.*]

Reichenow's Astrild [Aegintha Reichenowi], eine sehr ausgezeichnete Art, wurde leider nur in einem Exemplare von Dr. Anton Reichenow in den Camerunbergen gesammelt und von Dr. Hartlaub beschrieben: Kopf, Hals und Unterseite des Körpers sind gelbolivengrün, Rücken, Bürzel und Oberschwanzdecken bräunlich karminroth, Deckfedern und letzte Armschwingen bräunlichroth außen gesäumt. Länge 12 cm. Pytelia Reichenowi, *Hartl.*]

* * *

Als Schmetterlingsastrilden läßt sich wiederum eine Gruppe absondern, welche sich ebenfalls durch mancherlei Merkmale auszeichnet. Ein schwebender, in der Luft gleichsam gaukelnder Flug hat dem Hauptvertreter derselben, dem blauen rothbäckigen Astrild, den volksthümlichen Namen Schmetterlingsfink gebracht, und ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich ihn und seine nächsten Verwandten, mit Hinweis auf die Darlegung Seite 64, zusammenfasse. Es sind die Angehörigen der Geschlechter Granatastrild [Uraeginthus, *Cabanis*] und Keilschwanzastrild [Uropytelia, *Finsch*], welche hierher gehören.

Der blaue Astrild [Aegintha phoenicotis].

Tafel II. Vogel 10.

Die bereits erwähnte, naheliegende und doch so scharfsinnige Bemerkung, daß die Schwanzbewegung eines Thieres für seine Charaktereigenthümlichkeit bezeichnend sei, bestätigt sich auch wiederum bei diesem blauen Astrild, den alle Liebhaber als Schmetterlingsfink oder Cordon bleu kennen, und läßt ihn als einen ebenso ruhigen und sanften, wie hübschen Vogel erscheinen.

Sein Gefieder ist auf der ganzen Oberseite bräunlichfahlgrau, an Gesicht, Brust, Seiten und Schwanz aber himmelblau. Ein schön karminrother, länglichrunder Fleck ziert jede Backe und giebt dem Gesicht, mit dem schwärzlichrothen Schnabel und dem gelblichen Augenringe, ein ganz absonderliches Aussehen. Das Weibchen hat dieselbe, nur viel mattere Färbung, auch fehlt ihm der Wangenfleck.

Männchen und Weibchen sitzen wol stundenlang dicht nebeneinander und liebkosen, d. h. nesteln und krauen sich im Gefieder, ohne jemals in ihrer Zärtlichkeit stürmisch zu werden. Dasselbe stille Wesen kennzeichnet sie am Futter- und Trinknapf, selbst am Neste und beim Liebesspiel. Ja, sogar dann, wenn zwei Männchen kämpfend in der Luft sich umeinander drehen und unter erzürntem Zit, zit! sich befehden, ist die Erregung keine sehr große. Dabei entbehren sie indessen keineswegs der Anmuth; im Gegentheil, auch dieser Vogel gewährt uns ein ungemein liebliches Bild in seinem furchtlosen und zutraulichen Wesen, mit seinen harmonisch schönen Farben, wenn er den scharfen und doch so wohllautigen Lockton Zit, zit! oder sein entrüstetes Täk, täk, täk! erschallen läßt, sobald wir dem Neste nahen oder wenn eine auffallende Erscheinung sich zeigt. Auch sein einfacher Sang, der freilich nur in etwas schrillen, doch melodisch klingenden Rufen besteht, ist angenehm.

Jetzt schwebt er schmetterlingsartig gaukelnd über dem Nistgebüsch, plötzlich huscht er auf einen hohen, hervorragenden Zweig, läßt seine Rufe erschallen und verschwindet schnell im Dickicht, um nach einer Weile wieder hervorzukommen und dasselbe Spiel zu wiederholen. Dann hüpft das Weibchen herbei, das Männchen fliegt davon, kehrt aber sogleich mit einem Halm im Schnabel zurück, und nun beginnt das ebenso reizende als komische Liebesspiel, welches dem des kleinen rothen Astrild gleicht. Während desselben sitzt das Weibchen regungslos,

nur mit Schwanz und Flügeln leise zitternd da, bis die Begattung erfolgt. Diese geschieht nicht, wie bei vielen Finken schnell abbrechend, sondern dauert wol eine bis drei Minuten, während derer das Männchen sich flatternd über dem Weibchen erhält. Eine wahrhaft rührende Zärtlichkeit fesselt auch diese beiden Vögelchen aneinander, so daß sie immer in unmittelbarer Nähe beisammenweilen und zur Nacht sich so dicht aneinander drängen, daß sie fast einen gemeinsamen Federball bilden. Ebenso wie bei den Tigerfinken pflegen auch bei diesen die Weibchen, besonders die alten, einsamen, sehr emsig zu singen. Bevor ich aber mit der Schilderung ihrer Lebensweise in der Gefangenschaft fortfahre, muß ich auf die Mittheilungen über das Freileben eingehen.

Die Zeit wird uns Alles lehren und uns zu Beobachtungen führen, welche jeden Zweifel zerstreuen können. Diese Worte Buffon's, die er inbetreff der kleinen afrikanischen und ostindischen Prachtfinken (Senegalis und Bengalis) geschrieben, bewahrheiten sich als eine herrliche Prophezeihung, denn die Beobachtung in der Gefangenschaft gewährt in der That bereits mehr Anhalt für die Naturgeschichte dieser Vögel, als bisher das Studium ihres Freilebens geboten. Nachdem der genannte Schriftsteller darüber geklagt, daß wegen der Veränderlichkeit der Farben die sichere Feststellung der Arten so ungemein schwierig sei, fügt er hinzu, daß die Schilderung wol am besten daran thue, sich wenigstens nach der Wahrscheinlichkeit zu richten. Doch er erkennt das Trügerische dieses Weges sehr wohl und meint, man müsse den Pinsel ergreifen und die Vögel zugleich lebensvoll vors Auge führen. In dieser Unsicherheit liegt nun aber vorzugsweise der bedauerliche Umstand begründet, daß die ältesten und älteren Schriftsteller im ganzen doch ungemein wenig über die Lebensweise dieser fremdländischen Vögel mittheilen, und daß hier und da eine werthvolle Beobachtung kaum zu benutzen ist, weil man nicht mit Sicherheit weiß, welche Art der Verfasser gerade meint.

Ueber den blauen Astrild herrschten vornehmlich sonderbare Irrthümer und Streitigkeiten. Von Brisson wurde er als Le Bengali, aus Bengalen herstammend beschrieben und diese unrichtige Meinung theilten Le Vaillant, Daudin u. A. Sodann hatte man diesen Vogel in zwei Arten geschieden, deren eine als Maripoſa mit dem rothen Wangenfleck, die andere als Kordonbleu ohne denselben bezeichnet wurde. Buffon meint, daß dies wol richtig sein müsse, weil die Vögel ohne rothen Wangenfleck viel zahlreicher als die rothbäckigen seien. Doch läßt er es sich bereits von P. Martin durch den Hinweis widerlegen, daß eben sehr viele noch nicht ausgefärbte Junge eingeführt werden, welche jene Färbung erst später erhalten. Prinz Bonaparte, also ein Schriftsteller der neueren Zeit, nimmt den Irrthum aber wieder auf und führt das eine Geschlecht als Fringilla bengala und das andere als F. angolensis an. Bruce und dann Swainson, welche den Vogel in seiner Heimat beobachteten, wissen die Geschlechter

richtig zu unterscheiden. Martin fügt auch die Angabe hinzu, daß alle diese kleinen Finken damals namentlich durch die Portugiesen, von ihren Kolonien an der Küste von Angola aus, nach Europa gebracht wurden.

Die Verbreitung des blauen Astrild dürfte sich über fast ganz Afrika erstrecken; wohin bisher die Reisenden und Forscher vorgedrungen, überall haben sie ihn gefunden. Zugleich gehört er zu den Astrilden, welche Dr. Dohrn, wie Seite 36 erwähnt, auf den Kapverdischen Inseln beobachtete. Dennoch ist bis jetzt auch sein Freileben erst wenig bekannt; am ausführlichsten hat dasselbe v. Heuglin geschildert. Dieser zarte Vogel, sagt er, lebt in Abessynien bis zu 2300 Mtr. (7000 Fuß) Meereshöhe; ich fand ihn ferner in Takah, Senar, am weißen Nil und in Kordofan. Nirgends gerade häufig, rottet er sich nicht, gleich seinen Verwandten, in größere Gesellschaften zusammen, sondern zeigt sich meist nur einzeln und parweise, sowol in Dornhecken um Dörfer und Gehöfte, als auch in der Waldregion, namentlich in der Nähe von Gewässern. Er ist Standvogel und brütet in eigenthümlichen Nestern, die, oberflächlich betrachtet, keine bestimmte Form haben und einem im Gebüsch hängengebliebenen Strohschöpfchen gleichen, auch wirklich nur sehr lose zwischen den Zweigen der Bäume oder in Hecken sitzen und zwar in einer Höhe von $1,_{25}$—$2,_5$ Mtr. (4—8 F.). Das ganz geschlossene Nest besteht äußerlich aus sehr feinen trockenen Strohhalmen, deren Spitzen gewöhnlich nach einer bestimmten Richtung schräg nach oben hin zusammenlaufen; ein verstecktes, kleines Schlupfloch führt in die mit Gräsern, Federn und Wolle sehr zart ausgefütterte Nesthöhle. Vor, nach und während der Regenzeit sah ich darin drei bis sechs reinweiße, etwas walzenförmige Eier, die durch das Bebrüten undurchsichtig und milchig werden. Wahrscheinlich benutzt dieser Astrild zuweilen die Nester kleinerer Webervögel, wie dies das Silberschnäbelchen ebenso zu thun pflegt. Trotz jener gegentheiligen Behauptung hat Professor Hartmann aber im Urwalde von Nordostafrika hier und da recht große Flüge beobachtet, und es erscheint doch auch von vornherein unwahrscheinlich, daß dieser Vogel unter seinen Verwandten eine Ausnahme machen und sich dort, wo er zahlreich vorhanden ist, nicht ebenfalls zeitweise zusammenscharen sollte. Diesen blauen Astrild vergleicht der letztgenannte Forscher, ebenso wie den rothen, mit unseren Sperlingen.

Auch dieser Prachtfink gehört zu den Vögeln, mit denen man bereits im vorigen Jahrhundert eifrige Züchtungsversuche gemacht hat. Vieillot, Brisson, Laurence u. A. haben ihn zur Brut gebracht und bei uns in Deutschland ist er neuerdings von den meisten Züchtern ebenfalls mit mehr oder minder günstigen Ergebnissen gezogen und beobachtet worden. Schon Vieillot beschreibt das Nest, und da seine Angaben mit denen der späteren Züchter übereinstimmen, so will ich die Leser nicht durch Wiederholungen ermüden, sondern eine Schilderung von Herrn Hermann Leuckfeld in Nordhausen anfügen. Wol selten

hat ein Vogelfreund mit solcher innigen Liebe für seine Pfleglinge und mit so vollem Verständniß des Vogellebens beobachtet, als der Genannte, und deshalb glaube ich zugleich eine Pflicht der Pietät gegen den verstorbenen Freund zu erfüllen, wenn ich seine ausführliche Darstellung hier mittheile. Dieselbe wird insbesondere ein beherzigenswerthes Beispiel des Scharfsinns und der unermüdlichen Ausdauer zeigen, welche diejenigen Züchter, die namhafter Erfolge sich erfreuen, zum Erringen derselben aufzubieten pflegen.

Von einem herumziehenden Vogelhändler, erzählt er, kaufte ich ein Paar Schmetterlingsfinken unter dem ächt menagerie-wissenschaftlichen Namen: indische blaue Zaunkönige. Ich hielt sie in einem geräumigen Käfige, hatte aber wenig Vergnügen an ihnen, da sie sich zu ruhig verhielten und trotz ihrer nach Vogelanschauung jedenfalls gemüthlichen Wohnung durchaus nicht zum Nisten entschließen wollten. Nachdem ich eine große, luftige und sonnige Vogelstube eingerichtet und in diese das Pärchen gebracht, zeigten sie sich munterer, das Gefieder wurde schöner, wie man es niemals bei den in engen Käfigen zusammengepferchten Vögeln findet; leider jedoch starb bald das Männchen an der Abzehrung. Rührend war es anzusehen, wie sich das gesunde Weibchen neben den unbeweglich mit gesträubtem Gefieder hockenden Kranken setzte, sich dicht und innig anschmiegte, als ob es durch die eigene Wärme ihm neues Leben geben wollte; wie es den Bedauernswerthen zärtlich am Kopfe kraute und dann zuweilen, wol ärgerlich über sein gleichgültiges Benehmen, ihn mit dem Schnabel anstieß, hin und wieder über ihn forthüpfte, um an der andern Seite die leider nutzlosen Versuche zu wiederholen. Endlich eines Morgens fand ich das Männchen todt.

Durch die Güte eines bekannten Ornithologen, der meine Leidenschaft in betreff der Züchtungsversuche mit fremdländischen Vögeln kannte, erhielt ich dann wieder ein Paar Schmetterlingsfinken mit dem Bemerken: Sie werden an diesen Vögeln wenig Freude haben, da sie selten nisten und sehr zarter Natur sind. Dies Pärchen machte sich zunächst in seinem neuen Aufenthaltsorte gründlich bekannt; zaunkönigsähnlich durchschlüpfen sie beide die Tannengebüsche, lockend und schnätternd. Schon in einigen Tagen begannen sie sich inniger zu liebkosen, indem sie sich dicht aneinander drängten, sich schnäbelten, gegenseitig krauten und an dem Kopfe herum knabberten. Ein zärtlicher Stoß mit dem Schnäbelchen unterbricht von Zeit zu Zeit das Wohlgefühl des Gekrauten, der vor Behagen die Augen schließt und das Köpfchen an allen Seiten dem Schnabel des andern zuwendet. Dann erhebt das Männchen seine Stimme zum schmetternden Gesange und beginnt das Weibchen umherzujagen, bis schließlich die Begattung dem Spiele ein Ende macht.

Bald begann das Pärchen in einem dicht gezweigten Tannenbaum mit dem Nestbau, bei dem beide die Stoffe zutrugen. Das fertige Nest hatte eine kugel-

förmige Gestalt, ein sehr enges rundes Schlupfloch, welches seitwärts sich befand und zwar so, daß der Eingang von unten hinaufführte. Es stand nur etwa einen Fuß hoch über dem Erdboden. Nach Vollendung des Baues und des Geleges verschwand das Weibchen auf etwa 10—14 Tage im Neste, während welcher Zeit das Männchen treulich dabei Wache hielt, aber nur auf ganz kurze Frist, wenn das Weibchen zum Futter flog, hineinschlüpfte. Sobald ich mich näherte, zeigte es die vermeintliche Gefahr sogleich mit schnätternder Stimme an, mit einem Täk, täk, täk! welches an das der Meisen erinnert. Mehrere Bruten gingen zu Grunde, bis ich endlich davon überzeugt zu sein glaubte, daß das dargereichte Futter zur Aetzung für die Jungen nicht geeignet war. Nur über frische Ameisenpuppen fielen die Alten mit wahrer Gier her. Konnte ich dieselben aber nicht bieten, so durchmusterten die Schmetterlingsfinken alles übrige vorhandene, verschiedenartige Futter; doch vermochten sie augenscheinlich nichts davon für die Jungen zu verwenden. Ich sann nun darüber nach, ob nicht ein gedeihliches Ersatzmittel zu finden sei und machte einen Versuch, welcher den besten Erfolg zeigte. Hartgekochtes Eigelb hatten die Vögel bis jetzt immer verschmäht. Ich gewöhnte sie nun in folgender Weise daran. Sehr fein zerrieben vermischte ich es so mit ganz frischen Ameisenpuppen, daß an jeder einzelnen der letzteren ein wenig Eigelb haften bleiben mußte. Während die Vögel getrocknete Ameisenpuppen, selbst wenn solche in Milch oder Wasser aufgequellt worden, durchaus unberührt ließen, dagegen die frischen mit großem Eifer verzehrten, mußten sie jetzt stets Eigelb mitschlucken, dadurch fanden sie bald Geschmack daran und fraßen es dann auch allein, in Ermangelung der Ameisenpuppen mit demselben Heißhunger.*) Sie brüteten jetzt abermals, und zu meiner Freude bemerkte ich, daß in den ersten Tagen nach dem Entschlüpfen der Jungen, während das Weibchen das Nest gar nicht verließ, das Männchen die ganze Familie mit dem Eigelb fütterte, bis dann auch das Weibchen sich daran betheiligte und beide gemeinsam die Jungen zum glücklichen Ausfliegen brachten. Es waren diesmal nur zwei, dann aber zogen sie sogar eine Brut von sieben Köpfen auf. Der Naturfreund und Vogelliebhaber kann sich kaum ein reizenderes Bildchen als diese Familie denken; die allerliebsten, sämmtlich gleichmäßig aussehenden Kleinen, umflattert von den Alten in zärtlichster, stets besorgter Liebe. —

Aus meiner Vogelstube habe ich diese Mittheilungen noch in Folgendem zu ergänzen. Mit wenigen Ausnahmen stehen die Nester der Schmetterlingsfinken immer frei im Gebüsch, keineswegs jedesmal niedrig, sondern gewöhnlich hoch oben an der Decke. Die Form ist fast regelmäßig ein runder,

*) Nähere Mittheilungen über diese Fütterung in verschiedenen Gemischen sind weiterhin in dem betreffenden Abschnitte zu finden.

flacher Beutel, mit einem seitlichen, meistens von überhängenden Grasrispen u. dgl. völlig verdeckten Schlupfloch. In der Regel trägt das Männchen die Baustoffe allein herbei, während das Weibchen das Nest formt. Die Unterlage, wie auch die Seitenwände bestehen aus Heuhalmen, Bastfäden, Papierstreifen und wenigen Pferdehaaren oder Agavefasern und die Auspolsterung ist aus Streifen von Seidenpapier, Baumwollfäden und Federn hergestellt. Während das Nest von außen unordentlich erscheint, ist es innen sehr sorgsam gerundet und künstlich ausgelegt. Gewöhnlich wird der Nestbau in 7—9 Tagen vollendet; aber noch immer, wenn das Weibchen längst brütet, trägt das Männchen Halme und Federn herzu und kommt niemals ohne diese oder jene zur Ablösung. Bei manchen Paaren brüten die Männchen viel anhaltender als bei andern.

Die Jungen haben einen blaugrauen Flaum und bläulichweiße Wärzchen am Schnabel. Das Jugendkleid ist überall gleichmäßig schlicht fahlgrau, an der ganzen Unterseite etwas heller; nur die Brust, die Seiten und der Bürzel nnd Oberschwanz lassen durch ein sehr mattes Blau, das an ersterer Stelle am bemerkbarsten hervortritt, den Vogel als seine Art erkennen. Das Schnäbelchen ist schwarz, das Auge schwarz, die Füße sind dunkelgrau; der rothe Wangenfleck fehlt beiden Geschlechtern. In der fünften bis achten Woche beginnt die Verfärbung, indem an den betreffenden Stellen ein immer kräftiger werdendes Blau erscheint und bei den Männchen ebenso die rothe Wangenzeichnung zum Vorschein kommt. Sobald dieser Vogel vollkommen ausgefärbt ist, behält er dasselbe Kleid für immer bei.

Der blaue Astrild, obwol beiweitem nicht der kleinste, ist doch zweifellos der zarteste unter allen Prachtfinken. Die Weibchen sterben vorzugsweise leicht beim Eierlegen, zumal dann, wenn die Wärme in der Vogelstube beträchtlich sinkt oder schwankt. Unmittelbar nach der Ankunft bei den Großhändlern und von diesen aus in den kleineren Vogelhandlungen oder bei den Liebhabern stirbt dieser Vogel oft noch zahlreicher als der Amarant, und das bei jenem Gesagte erscheint diesem gegenüber namentlich beherzigenswerth. Bei guter Pflege dauert er aber ebensowol im kleinen Schmuckkäfige, als auch in der Vogelstube ebenfalls eine Reihe von Jahren hindurch aus. Auch er gehört zu den beliebtesten Prachtfinken, ist aber als weichlich bekannt und erliegt den beim Goldbrüstchen erörterten Uebelständen der gewöhnlichen Liebhaberei besonders leicht. Seine Züchtung im Käfige gelingt eher, als die mancher andern Prachtfinken, doch sind als durchaus erforderliche Bedingungen die beim Grauastrild angegebene geeignete Fütterung und eine hohe gleichmäßige Wärme niemals außer Acht zu lassen. Näheres über die Verpflegung und Züchtung, sowie auch über die Legenoth u. s. w. ist weiterhin in den schon mehrfach erwähnten Abschnitten zu finden. Der Preis wechselt für das Pärchen zwischen 9—12 Reichs-Mark (3—4 Thlr.) und steht

in den Großhandlungen mit dem des Grauaſtrild gleich. Der Vogel iſt faſt das ganze Jahr hindurch bei den Händlern zu haben.

Noch muß ich die bereits S. 46—47 berührte intereſſante Erfahrung erzählen. Ein Blauaſtrild-Pärchen hatte ein Paar Helenafaſänchen aus ſeinem Neſt vertrieben und niſtete darin ungeſtört weiter. Als die Zeit des Ausfliegens der Jungen heranrückte, fiel mir das ſehr laute, ſonderbare Geſchrei auf, welches ich von jungen Schmetterlingsfinken noch niemals gehört hatte. Ich wartete jedoch geduldig ab und ſah ſodann aus dem Neſte ein junges Helenafaſänchen hervorkommen. Die Eltern deſſelben, von denen bis dahin noch keine Brut bei mir flügge geworden, hatten alſo, bevor ſie von den Schmetterlingsfinken vertrieben waren, bereits ein Ei gelegt und dieſes war von den Pflegeeltern, deren eigene Eier nichts taugten, ausgebrütet, und das Junge ward mit großer Sorgfalt erzogen. Es gewährte einen ſonderbaren Anblick, dieſe drei Vögel, von denen der eine doch ein ganz fremder, zärtlich dicht aneinander geſchmiegt ſitzen zu ſehen oder wie das Faſänchen, um das ſeine wirklichen Eltern ſich niemals kümmerten, mit großem Geſchrei von den Schmetterlingsfinken ſeine Nahrung empfing.

Der blaue Aſtrild heißt auch Kordonbleu, Schmetterlingsfink, Schmetterlingsaſtrild, fälſchlich blauer Bengaliſt, richtiger Bengueliſt, blaues Rothbäckchen, Blaubändchen und Mariposa (v. Heuglin nennt ihn fälſchlich Granataſtrild).

Bengali cordon-bleu *(Vekemans)*; Cordon-bleu (franzöſiſche Händler); Crimson-eared Waxbill (*Jamrach* und Verzeichniß des zoologiſchen Gartens von London); Blauwe Astrild of Bengali (holländiſch); Azulinha (portugieſiſch).

Nomenclatur: Estrelda phoenicotis Swainson, *Hartl.*, *Bp.*, *Sclat.*, *Hartm.*, *Heugl.*, *Antin.*; Fringilla bengalus, *Briss.*, *Gml.*, *Lath.*, *Shaw*, *Vieill.*; Fringilla angolensis et bengalus, *Linné*, *Bechst.*; Estrelda benghala, *Gray*; Uraeginthus phoenicotis, *Cab.*, *Heugl.*; Mariposa phoenicotis, *Rchb.*; Pytelia phoenicotis, *Hartl.* et *Finsch.*

Blue-bellied Finch, *Latham*; Pinçon à ventre bleu; Mariposa a joues de carmin; The crimson eared Bengueli.

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberhalb rehbraun, ſchwach röthlich angehaucht; Bürzel und obere Schwanzdecken, Zügel, ſchmaler Augenbrauenſtreif, Kopfſeiten und alle unteren Theile lebhaft himmelblau, Schwanzfedern düſterer blau, am Rande der Innenfahne ſchwärzlich grau; Bauch, After und untere Flügeldecken zart röthlich rehbraun, ebenſo die unteren Schwanzdecken, mit Ausnahme der längſten, welche blau ſind; an der Ohrgegend ein großer länglicher, lebhaft purpurrother Fleck. Der Schnabel iſt ſchwärzlichroth mit ſchwärzlichen Schneidenrändern und ſchwärzlicher Spitze; die Füße ſind gelblich horngrau. Das Auge iſt hellbraun, von einem ſchmalen gelben Rande umgeben. Das Weibchen ſtimmt faſt völlig überein, nur iſt das Blau nicht ganz ſo lebhaft und der rothe Wangenfleck fehlt. Das Jugendkleid iſt Seite 98 beſchrieben.

Aegintha phoenicotis. Supra dilute brunnea, cauda gradata; uropygio, supracaudalibus et corpore subtus pallide coeruleis; abdomine medio crissoque cervinis; macula parotica circumscripte lilacino-coccinea; rostro et pedibus rubentibus, illius apice et tomiis nigricantibus. ♀ pallidior; macula parotica coccinea nulla.

Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5 cm. (c. 2 Z.), der stark gestufte Schwanz 5,3 cm. (c. 2 Z.).

Juvenis ubique unicolor lurido-cinerea, subtus dilutius; colore pectoris distinctius; laterum caudaeque obsoletius subcoeruleo, eoque signo velut specifico; rostro irideque nigris; pedibus obscure cinereis, macula sexus utriusque coccinea adhuc nulla.

Beschreibung des Eies: Länge 10—15 mm., Breite 12 mm., Farbe schwach gelblichweiß, glänzend, Gestalt stumpf eiförmig.

Ovum flavido-album, nitidum, obtuse ovatum.

Der granatrothe Astrild [Aegintha granátina].

Während der vorhin geschilderte Schmetterlingsastrild bekanntlich zu den gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts gehört, war sein nächster Verwandter, der Granatastrild, bis jetzt wenigstens nach Deutschland wol noch nicht lebend eingeführt. Zwar hat Bechstein ihn mitgezählt, doch giebt dieser Schriftsteller als das Vaterland fälschlich Brasilien an und nennt ihn brasilischen Fink. Zuerst bekannt wurde der Vogel durch Edwards, welcher eben und nach ihm Latham u. a. den Irrthum verbreiteten, daß er aus Amerika herstamme. Seeligmann erzählt: dieser wunderbare und noch unbeschriebene Vogel gehörte der Frau Scrafton zu London; er kam von Brasilien, wo er selten und theuer ist. Brisson bezeichnet sodann richtig Afrika als seine Heimat und beschreibt ihn auch sehr eingehend. Buffon benannte ihn Grenadin de la côte d'Afrique.

Der Granatastrild ist röthlich kastanienbraun mit violetten Wangen, an Stirn, Bürzel und unterm Hinterleib glänzend kornblumenblau, und mit rothem Schnäbelchen. Es ist ein ganz absonderlich schöner Prachtfink. In Gestalt und Wesen ist er dem Schmetterlingsastrild durchaus gleich; die Größe ist ein wenig beträchtlicher.

Der erste lebende Vogel dieser Art, welcher nach Europa gebracht worden, dürfte der sein, welchen die Marquise de Pompadour in Paris 1754 erhielt. Sie war bekanntlich eine begeisterte Freundin fremdländischer Vögel und hatte diesen Astrild drei Jahre hindurch am Leben.

Vieillot schildert den Grenadin als einen der schönsten und zierlichsten, aber auch weichlichsten aller dieser kleinen Finken; er preist sein sanftes und doch so lebhaftes Wesen und seinen lieblichen Gesang. In Hinsicht desselben sind ältere und neuere Schriftsteller, so namentlich Vieillot, nach ihm Reichenbach und dann auch v. Heuglin, wirklich recht anspruchslos, denn sie loben fast regelmäßig diese kleinen Prachtfinken als treffliche Sänger. Ich führe solche Angaben selbstverständlich jedesmal an; in allen den Fällen jedoch, in welchen nach dem übereinstimmenden Urtheile aller Züchter und Beobachter in der Gefangenschaft der betreffende Vogel nicht oder kaum nennenswerth singt, habe ich dies einfach als Thatsache hingestellt. Das Nest steht in niedrigem Gebüsch, allenfalls 1,75 m. (etwa 4—5 Fuß) hoch und ist aus zartem Moos, Grashalmen und

Pflanzenwolle gebaut. In der Brutentwickelung wird der granatrothe wahrscheinlich, ebenso wie in der Lebensweise, mit dem blauen Astrild durchaus übereinstimmen. Der genannte französische Forscher warnt dringend, den Vogel namentlich während der Brut, welche ebenfalls am häufigsten in unserm Spätherbst und Winter beginnt, sowie auch in der Mauser den Einwirkungen von Nässe und Kälte auszusetzen; die Wärme dürfe niemals unter 16 Grad R. sinken. Auch er weist immer wieder darauf hin, daß alle diese Astrilde neben dem Körnerfutter zugleich Fleischnahrung, also Ameisenpuppen oder Mehlwürmer, bekommen müssen, und daß dies wenigstens zur Aufzucht der Jungen durchaus nothwendig ist.

Im Spätherbst des Jahres 1874 erhielt ich von dem Händler Herrn Fockelmann in Hamburg ein Männchen und zwei Weibchen Granatastrilde, und dies werden jedenfalls die ersten sein, welche jemals lebend hier vorhanden gewesen. Denn Dr. Bolle („Naumannia" 1858) führt diese Art in dem Verzeichniß der fremdländischen Vögel, welche im deutschen Vogelhandel vorkommen, nicht auf und seitdem dürfte sie schwerlich eingeführt sein.*)

Die Verbreitung des granatrothen Astrild erstreckt sich so ziemlich über ganz West- und Südafrika. In der neueren Literatur (Henderson, Anderson) ist so viel als garnichts über ihn vorhanden, und wir müssen daher hoffen, daß er demnächst häufiger lebend herübergebracht und dann in der Gefangenschaft beobachtet und beschrieben werde. Wenn dieser Wunsch auch wirklich in Erfüllung gehen sollte, so wird der Vogel doch niemals in großer Anzahl auf den Vogelmarkt kommen, da er in der Heimat wahrscheinlich nicht zahlreich vorhanden ist.

Sollte mir die Züchtung gelingen, so werde ich die Schilderung des Brutverlaufs nebst der Abbildung des Vogels im Nachtrage bringen.

Schon die älteren Schriftsteller erwähnen, daß diese Art in vielfachen Abänderungen vorkommt. Daudin beschreibt ein Exemplar mit mattschwarzem Unterleibe, von welchem man noch nicht festgestellt, ob es eine Varietät oder bloße Lokalrasse ist. Der von Vieillot geschilderte **dreifarbige Astrild** (dreifarbige Mariposa, L'Azurouge; Aegintha tricolor) dürfte ebenfalls nur eine Varietät oder vielleicht gar ein Mischling sein, denn der Vogel, den der genannte Forscher von Bécoeur erhielt und den alle späteren Schriftsteller anführen, ist seitdem nirgends wieder aufgefunden worden. Dieser Hinweis genügt daher für ihn. —

Der granatrothe Astrild, Granatastrild, Granatfink, Granatvogel, rother Schmetterlingsastrild, ist lange vor seiner Einführung in den deutschen

*) Soeben schreibt mir Herr A. F. Wiener in London Folgendes: Der Granatfink ist trotz seiner Seltenheit doch bereits in meinem Besitz gewesen. Vor etwa vier Jahren kaufte ich zufällig drei Köpfe ganz billig auf einer Reise nach Liverpool, aber sie gingen leider bald sämmtlich ein. Seitdem habe ich dies Vögelchen freilich niemals wieder lebend gesehen.

Vogelhandel gleichsam als unsichtbarer Gast in allen Schriften und Handbüchern über diese Vögel mitgezählt worden. Die Preisverzeichnisse der deutschen Händler führten ihn ebenfalls fast regelmäßig auf. In der Liste der Vögel des zoologischen Gartens von London ist er aber ebensowenig vorhanden, als in denen der übrigen größeren und kleineren derartigen Anstalten. Die Verzeichnisse von Jamrach und Bekemans enthalten ihn auch nicht.

Nomenclatur: Fringilla granatina, *L.*, *Vieill.*; Granatinus, *Briss.*; Estrelda granatina, *Hartl.*; Uraeginthus granatinus, *Cab.*; Mariposa granatina, *Rchb.*

Le Grenadin; The Granat-Finch; Pinson rouge et bleu.

Capitaine d'Orénoque (früher bei den Portugiesen und vielleicht auch noch gegenwärtig).

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb, an Stirn, Kopf, Nacken, bis zu den Schultern und fast der ganze Unterkörper einfarbig zimmtbraun; schmaler Stirnrand, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken ultramarinblau; Schwingen fahl erdbraun, noch heller gesäumt; Oberschwanz mattschwarz, Unterschwanz wenig heller und marmorirt; Backenfleck vom Auge bis zum Ohr violett; Kinn und obere Kehle reinschwarz; Auge dunkelbraun; Schnabel blutroth; Füße röthlichgrau. Weibchen: oberhalb, an Kopf und Hinterhals fahl röthlichbraun, Rücken und Flügel fahlbraun, Bürzel hellblau; ganze Unterseite hellgelblichbraun; Wangenfleck hellviolett.

Aegintha granatina: castanea; genis pulchre et circumscripte violaceis; fronte et uropygio cyaneis; gula, abdomine imo caudaque longa et valde gradata nigris; rostro rubro; pedibus carneis.

Länge $12{,}3^{cm}$. ($4^3/_4$ Z.), Flügel $5{,}3^{cm}$. ($2^1/_4$ Z.), der gestufte Schwanz $6{,}2^{cm}$. ($2^1/_2$ Z.).

Der Buntastrild [Aegintha melba].

Dieser Vogel gehört zu denen, welche seit altersher aus ihren Heimatsländern nach Europa herübergebracht worden, aber bis zur Gegenwart nur höchst selten zu haben und theilweise sogar aus dem Vogelhandel wieder verschwunden sind (vrgl. S. 2). Die ältesten Schriftsteller erwähnen ihn regelmäßig, später wird er aber nicht mehr lebend eingeführt; Dr. Bolle zählt ihn in seiner Liste ebenfalls nicht mit.

Buffon, Brisson und die noch früheren Naturforscher, wie Seeligmann u. a., bringen über diesen Prachtfink vorzugsweise viele falsche Angaben, insbesondere dahin, daß sie als Vaterland Amerika oder Asien angeben. Derartige Irrthümer, welche sich ja bei zahlreichen Vögeln wiederholen, haben sich leider bis in ganz neuere Schriften hinauf erhalten. Erklärlich scheint es bei diesem Vogel wol dadurch, daß er einerseits den meisten der älteren Autoren nicht aus Anschauung bekannt gewesen, und daß andererseits auch die zeitgenössischen Ornithologen bis jetzt in mancher Hinsicht in Zweifel über ihn waren. Erst ganz kürzlich haben Finsch und Hartlaub mit Sicherheit festgestellt, daß die bisher getrennten Arten (s. Nomenclatur) sämmtlich in eine einzige zusammenfallen.

Es würde überflüssig sein, diesen Astrild hier eingehend zu besprechen, weil er bis zur neuesten Zeit eine der allerseltensten Erscheinungen des Vogelmarkts

ist. Allein gerade er darf wol entschieden als der farbenreichste unter allen gelten*) und zugleich bietet sich die Aussicht, daß er demnächst recht häufig unsere Vogelstuben bevölkern werde. Denn er ist über den größten Theil Afrikas verbreitet und in seiner Heimat auch zahlreich zu finden. Im Gebiete der Kapkolonie fehlt er; dagegen ist er auf Madagaskar, Bourbon und Mauritius heimisch geworden. Durch Zufall verschleppt, hat er sich auf diesen Inseln eingebürgert und vermehrt. Sein Fehlen, bezüglich seine Seltenheit im europäischen Vogelhandel erscheint daher von vornherein verwunderlich.

Der Buntastrild ist oberhalb olivengrünlichgelb, jede Feder an der Außenfahne gelb gerandet, die Schwanzfedern sind schwarzbraun mit düster scharlachrother Außenfahne, die beiden mittelsten Federn einfarbig scharlachroth, obere Schwanzdecken glänzend scharlachroth; Stirn, Backen und das übrige Gesicht, auch die Oberkehle sind lebhaft dunkel zinnoberroth, die Unterkehle bis zur Unterbrust ist orangegelb, jede Feder mit zwei schmalen dunkeln Querlinien und zwei rundlichen weißen Flecken gezeichnet, die Brustseiten sind mit weißen Tropfenflecken geziert, die übrige Unterseite ist weiß, dunkel bräunlich quergebändert, der hintere Unterleib und Unterschwanz sind weiß mit verlaufenen dunkeln Querlinien. Auge roth, Schnabel glänzend korallenroth, Füße hellbräunlich. Das Weibchen ist an Kopf, Nacken und Hinterhals düster grau, Mantel und übrige Oberseite sind düster olivengrün, Schwingen olivengrünlichbraun, Oberschwanzdecken und Schwanzfedern düster roth; Gesicht hellgrau, Unterseite weiß, dunkelbraun quergewellt, am breitesten an den Bauch- und Schenkelseiten, an der Kehle einige weiße-Tropfenflecke, Bauch und untere Schwanzdecken weiß.

Vieillot sagt, daß man zu seiner Zeit nur das Männchen kannte und daß auch dieses äußerst selten war. Er hielt den schönen Vogel zugleich für ungemein weichlich und verlangte, daß man ihm für gewöhnlich, nur um ihn am Leben zu erhalten, Wärme von 20 Grad R. bieten müsse; zum Nisten könne er allerhöchstens in einem Gewächshause gelangen.

Heuglin fand diesen Astrild in den wärmeren Theilen des nordöstlichen Afrika fast überall. Er hält ihn für einen Standvogel, dessen Sommer- und Winterkleid kaum verschieden ist. Man sieht ihn immer, sagt er weiter, nur einzeln und paarweise unter Baumgruppen, im dichten Gebüsch und in Hecken; trockene, sandige Gegenden sagen ihm mehr zu als andere, und er führt ein sehr stilles, wenig bemerkbares Leben. In den Gipfeln hoher Bäume habe ich ihn

*) Diese Meinung drücken die Schriftsteller aller Völker und Zeiten übereinstimmend in den ihm beigelegten Namen aus: Beau Marquet, *Buffon*, *Vieillot*; Beautiful Finch, *Latham*; Green Goldfinch, *Edwards*, Fringilla elegans, *Schaw.*; u. s. w. Ich glaube daher sowol diesen Benennungen, als auch denen des Handels am besten zu genügen, wenn ich ihm den Namen gebe, welcher allen diesen Bezeichnungen möglichst entspricht.

nie gesehen, ebensowenig im Steppengras; obgleich er sich gewöhnlich kaum einige Fuß hoch über dem Boden herumtreibt, so kommt er doch nur für Augenblicke auf die Erde herab und läuft dort nicht viel umher. Er ist von sehr sanfter Natur, durchaus nicht scheu und läßt nur selten seinen leisen, einfachen Gesang aus den kahlen Dorngebüschen her ertönen. Ueber das Brutgeschäft kann ich leider nichts mittheilen. —

Wenn zum Beginn des Monats September hin Direktor Vekemans in Antwerpen auch zahlreiche kleine Vögel in den verschiedensten Arten herbeischafft, um die alljährliche Versteigerung so großartig als irgend möglich erscheinen zu lassen, so pflegt er jedesmal einige Erwerbungen darunter vorzuzeigen, welche noch nicht oder doch nur selten auf dem Vogelmarkt vorhanden sind. Hierzu gehörten auch mehrmals einige Pärchen Buntastrilde, die aber der deutschen Liebhaberei bisher kaum zugänglich gewesen, sondern fast immer nach England oder nach den Niederlanden vorweg und zu recht hohen Preisen verkauft wurden. Im Jahre 1874 hatte Gudera in Leipzig zum erstenmal eine kleine Anzahl dieser Prachtfinken nach Deutschland eingeführt und daher ist auch diese Art jetzt in manchen unserer Vogelstuben zu finden. In seinem Wesen erscheint er dem Schmetterlingsastrild sehr ähnlich; weiterhin kann ich aber sein Gefangenleben nicht schildern, denn das Pärchen, welches ich erhielt, war krankhaft und ist sogleich gestorben. Vor dem Abschluß dieses Werkes darf ich aber eine nähere Darstellung im Nachtrage wol versprechen, denn einerseits besitzen diesen Astrild mehrere meiner Herren Mitarbeiter, namentlich Dr. F. Franken in Baden-Baden, und andererseits hoffe ich auch selber baldigst wieder ein neues Pärchen zu erhalten.

Der Buntastrild oder die bunte Pytelie (v. Heuglin), zierlicher Aurora-Senegali (Reichenbach), Zierfink, oder grüner Stieglitz der älteren Schriftsteller, ist in den Preisverzeichnissen der meisten Händler noch nicht zu finden.

L'élégante *(Vekemans)*; Crimson-faced Waxbill (*Jamrach* und Liste des zoologischen Gartens von London).

Nomenclatur: Fringilla melba, *Linné*, *Seeligm.*, *Gml.*, *Vieill.*; Fringilla speciosa, *Bodd.*; Fringilla elegans, *Gml.*, *Lath.*, *Vieill.*, *Bechst.*, *Hgl.*; Estrilda elegans, *Rüpp.*; Pytelia melba, *Strickl.*, *Gray*, *Rchb.*, *Hartl.* et *Finsch*; Pytelia speciosa, *Gray*; Zonogastris elegans et melba, *Cab.*, *Hartm.*, *Heugl.*; Pytelia citerior [et P. afra], *Hartl.*, *Hgl.*; Zonogastris citerior, *Hgl.*; Pytelia elegans, *Antin.*, *Bp.*, *Mont.*, *Rchb.*; Marquetia elegans, *Rchb.*

Wissenschaftliche Beschreibung siehe oben.

Aegintha melba: supra dilute olivacea; fronte, loris, regione ophthalmica, mento gulaque superiore miniato-scarlatinis; gula reliqua et pectore dilute flavis; pileo et cervice pallide brunneo-fasciolatis; subcaudalibus albis; cauda cum tectricibus superioribus conspicue rubra; rostro rubente; pedibus pallidis.

Länge 12 cm. (4½ Z.), Flügel 5 cm. (2 Z. 2 L.), der gerade abgeschnittene Schwanz 4,4 cm. (1 Z. 9 L.).

Der rothrückige Astrild [Aegintha erythronóta]. Seit Vieillot's l'Astrild à moustaches noires schleppen die Schriftsteller einen wunderlichen Vogel von einem Werke in das andere, während derselbe in Wirklichkeit garnicht vorhanden ist oder allenfalls auf einer Verwechselung beruht. Diese Reichenbach'sche Brunhilda, von einem der neueren populären Naturhistoriker geschildert, als eine der seltensten Arten der Gruppe, welche Südwest- und Innerafrika bewohnt und bis jetzt wahrscheinlich lebend noch nicht nach Europa gebracht worden, ist gewiß kein anderer, als der Seite 92 beschriebene schwarzkehlige Astrild Heuglin's. Man vergleiche nur bei Reichenbach, nicht die phantastische Abbildung T. II Nr. 13, sondern T. XVIII Nr. 158 und dann Vieillot, „Oiseaux chanteurs" T. XLV mit Heuglin's Darstellung im „Journal für Ornithologie", 1868 T. I Fig. 1, und meine Vermuthung wird nicht ungerechtfertigt erscheinen.

* * *

Wachtelastrilde oder Wachtelfinken [Ortygospiza, Sund.] hat man recht bezeichnend eine Prachtfinkenfamilie genannt, welche sich von allen übrigen durch sehr auffallende Merkmale unterscheidet und der Aufmerksamkeit in hohem Maße werth ist. Schon der erste Blick belehrt uns, daß wir es hier mit ganz eigengearteten Vögelchen zu thun haben, und noch mehr überzeugt uns davon ihre Lebensweise, welche von der aller Verwandten abweicht. Ich werde dies bei der Beschreibung weiter ausführen.

Der Rebhuhnastrild [Aegintha atricollis].

Als ich im Sommer des Jahres 1874 in Hamburg zur Geflügelausstellung als Preisrichter anwesend war, fand ich bei dem Händler Herrn Fockelmann ein Pärchen dieses kleinen Vogels vor, den ich wol als Wachtelfink erkannte, da ich schon im Januar von Herrn Wiener in London einen gestorbenen, nahe verwandten erhalten hatte; doch wußte ich nicht, welche Art es sei. Herr Dr. Finsch, der ebenfalls von Bremen herüber gekommen, stellte ihn als die obengenannte fest. Die Wachtelastrilde gehören zu den seltensten Erscheinungen des Vogelhandels und werden auch nur immer in wenigen Pärchen eingeführt, die dann größtentheils krankhaft sind, angegriffen von der Reise oder durch schlechte Behandlung, und regelmäßig bald eingehen. Das Vögelchen ist auf den ersten Blick zwar unscheinbar, zeigt sich aber sehr niedlich. Oberhalb fahlbraun, jede Feder mit dunklerer Mitte, die Federn der Flügelschwingen grauweiß gesäumt, Schwanzfedern schwärzlich braun, weiß gespitzt; Gesicht, also Stirn, Kehle bis zur Oberbrust, schwarz; letztere schwärzlich grau, weiß quergestreift (mit Halbmöndchen gezeichnet), Brust- und Bauchseiten ebenso, aber auf heller grauem Grunde; Brustmitte rostbraun, Bauch weißlich gelb, untere Flügel- und Schwanzdecken fahl bräunlich gelb. Auge röthlich braun; Schnäbelchen roth mit sehr breiter schwarzer Firste; die hochbeinigen Füße rosenroth mit langer, gerader, spornartiger

Kralle an der Hinterzehe. Weibchen ganz gleich, bis auf den Mangel des schwarzen Gesichts, anstatt dessen eine weiße Kehle, ferner weißer Zügel- und Augenbrauenstreif. Die Größe stimmt etwa mit der des grauen Astrild überein, doch ist die Gestalt gedrungener, gleichsam runder.

Ueber das Freileben sagt Heuglin, daß er sich in kleinen Trupps von fünf bis acht Köpfen flüchtig und scheu auf kahlem, steinigem Hügellande oder auch in der Nähe von Gewässern, zuweilen in Gesellschaft von Graugirlitzen, umhertreibe, niedrig und schwirrend fliege, rätschend auf Steinhaufen einfalle und nicht zu bäumen scheine. Lefebvre fand ihn im Mai zahlreich auf Wiesen, längs der Wildbäche und auf Getreidefeldern. Rüppell erwähnt ihn nur und auch die übrigen Reisenden geben nichts näheres über ihn an. Die Heimat erstreckt sich von Westen aus bis tief in das innere Afrika.

In der Vogelstube fällt der Rebhuhnastrild durch seine Lebensweise sogleich auf. Ich hatte mit einer Sendung kleiner Prachtfinken in verschiedenen Arten von Herrn Poisson in Bordeaux noch vier Köpfe erhalten. Alle bleiben in einer Schar beisammen, halten sich fast nur an der Erde auf und wenn sie aufgejagt werden, so kreisen sie mit wachtelartigem, doch ungleich leichterem Flügelschlage hoch an der Decke einigemale durch den Raum und lassen sich meistens auf bestimmten Stellen, nur selten aber auf einem starken Ast oder auf dem Fensterbrett, sonst immer auf dem Boden, nieder. Hier laufen sie, nicht finkenartig hüpfend, sondern lerchenartig trippelnd geschäftig hin und her und lagern sich gern in die glattgedrückten Vertiefungen der an einer Seite des Raumes befindlichen Grasrasen. So macht dieser Prachtfink nun in der Gestalt, selbst in der Zeichnung und im Laufen den Eindruck eines winzigen Feldhühnchens, und der erwähnte französische Händler benennt ihn daher auch nicht unpassend Perdrix. Hühnerartiges Scharren, wie es bekanntlich auch manche Finkenvögel zeigen, ist bei ihm freilich nicht zu bemerken, auch trinkt er nicht hühnerähnlich schlürfend und dann den Kopf emporstreckend. Zweifellos nistet er aber an der Erde, wo er auch den größten Theil des Lebens zubringt. Wenn man für ein solches Pärchen Gräser und Gestrüpp auf dem Boden in der Vogelstube herrichtet und wenn sie von größern Vögeln nicht gestört sind, so werden sie wol unschwer zur Brut schreiten. Im Käfige dagegen dürften sie niemals sich wohl befinden, weil sie eines weiten Raumes zum Umherlaufen bedürfen und bei jeder Beängstigung wachtelartig empor, mit dem Kopfe nach der Decke hüpfen. In einer kurzen populären Beschreibung ist gesagt, daß dieser Vogel ein widerwärtig knarrendes Geschrei habe. Die meinigen lassen nur einen einsilbigen, lauten, aber nicht unangenehm klingenden Lockruf hören. Der sehr emsig vorgetragene Gesang besteht in dem mehrmals zwitschernd wiederholten Lockton, während das Vögelchen sich vom Sitz erhebt und den Kopf emporrichtet.

Chrom. Lith Th. Fischer. Cassel.

Der Rebhuhnaſtrild iſt auch als ſchwarzkehliger Wachtelfink oder Mohrwachtelfink bezeichnet worden. In den Preislisten der Großhandlungen und ebenſo in den Verzeichniſſen der zoologiſchen Gärten iſt er nicht zu finden. Jamrach nannte ihn brieflich Quail-Finch und bei den franzöſiſchen Händlern dürfte er wol allgemein L'Astrild perdrix heißen.

Nomenclatur: Fringilla atricollis, *Vieillot, Less.;* Estrelda polyzona, *Mus. Berol., Leſeb.;* Amadina polyzona, *Rüpp., Hartl., Gray;* Ortygospiza atricollis, *Bocg., Sund., Cass., Heine, Rchb., Heugl.;* Amadina lunulata, *Temm., Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben.

Aegintha atricollis: pallide brunnea; facie gulaque nigricantibus; alis et cauda brevi brunneis; subtus fasciolis irregularibus, interruptis albidis, obscure marginatis; pectore inferiore medio concolore, dilute cinnamomeo; abdomine imo medio, crisso et subcaudalibus isabellinis, his fusco-marginatis; rostro rubente; pedibus pallidis. ♀ obsoletius tincta, fasciolis inferioribus latioribus, minus distinctis.

Länge 9,1 cm. (3½ Z.); Flügel 4,8 cm. (1 Z. 10 L.); Schwanz 3,3 cm. (1 Z. 3 L.).

Der Wachtelaſtrild [Aegintha polyzóna].

Dieſer Vogel ſoll von dem vorigen nur dadurch verſchieden ſein, daß er um das Auge ober- und unterhalb weiße Striche und eine ebenſolche Kehle hat. Doch ſind die Beſchreibungen ſo unbeſtimmt, daß die Annahme nicht zu fern liegen dürfte, beide ſeien ein und dieſelbe Art und nur Geſchlechtsunterſchiede. Die Zukunft muß es feſtſtellen, ob dies ein Irrthum iſt. Der von Herrn Wiener in London mir überſandte Vogel war leider auf der Poſt unterwegs zu ſehr zerquetſcht, ſo daß ich ihn nicht mehr mit Sicherheit unterſuchen konnte. Auch im Berliner Muſeum vermag ich aus den wenigen Exemplaren mir kein feſtes Urtheil zu bilden. Für die Liebhaberei iſt übrigens die Scheidung in zwei Arten auch hier gleichgültig. Die Lebensweiſe wird ebenſo wie die Geſtalt und Färbung nahezu, wenn nicht völlig übereinſtimmend ſein. Eine nähere Beſchreibung als die des Weibchens vom Rebhuhnaſtrild, allenfalls mit mehr oder minder ſchwärzlichem Geſicht, weiß ich von dieſem Wachtelaſtrild auch nicht zu geben; dagegen füge ich die lateiniſche Beſchreibung an.

Aegintha polyzona: supra fusco-cinerascens, subtus nigricante alboque fasciolata; mento et periophthalmiis albis; gula genis et fronte nigris; pectore subrufescente; subcaudalibus albidis; cauda brevi angusta, albo-terminata; maxilla nigricante, mandibula rubente.

Länge 9,1 cm. (3½ Z.); Flügel 5,2 cm. (2 Z.); Schwanz 4,6 cm. (1 Z. 9 L.).

Nomenclatur: Fringilla polyzona, *Temminck;* Ortygospiza polyzona, *Snd., Bnp., Hrtl.; Rchb.;* Fringilla multizona, *Lefb.*

* * *

Als eigentliche Aegithinen oder Dornaſtrilde faſſe ich eine Anzahl vornämlich auſtraliſcher Prachtfinken zuſammen, welche ſowol im Körperbau, als auch in der Lebensweiſe einander gleichen, während ſie von den Syſtematikern allerdings in zahlreiche Sippen getrennt ſind. Einige von ihnen nähern ſich bedeutend den Spermeſtinen oder Dickſchnäbeln, doch darf ich ſie mit Sicherheit noch hierher zählen, weil namentlich ihre größere Beweglichkeit und ihr lebhafteres,

zierlicheres Liebesspiel sie von jenen bedeutsam unterscheidet. Als Gegensätze stehen sich hier z. B. der Ringelastrild [Aegintha annulosa] und der Zebrafink [Spermestes castanotis] recht bezeichnend gegenüber, wie ich dies weiterhin ausführen werde.

Der Dornastrild [Aegintha temporalis].

Tafel III. Vogel 12.

In der Einführung des fremdländischen Gefieders auf den europäischen, bezüglich deutschen Vogelmarkt liegt immerhin auch ein gewisses historisches Interesse. Die ältesten Erscheinungen sind und bleiben manchmal die seltensten; andere tauchen plötzlich auf, überschwemmen den Handel in Hülle und Fülle, um dann wieder für immer zu verschwinden; noch andere, die vorher niemals, selbst nicht einmal in einzelnen Köpfen vorhanden gewesen, werden hergebracht, erhalten sich dauernd in den Vogelhandlungen und bürgern sich in allen Vogelstuben ein. Gewöhnlich haben wir Ursache, den Wetteifer der Großhändler zu bewundern, zuweilen spielt aber auch der Zufall in wunderlicher Weise mit.

Der Dornastrild wurde nicht auf dem regelmäßigen Wege durch den Großhandel, sondern durch die bedeutendste Handlung zweiter Hand in Berlin von W. Mieth zuerst in größerer Anzahl eingeführt. Etwa zehn Pärchen waren in Antwerpen unmittelbar von einem Schiffe aus gekauft. Herr Mieth wußte den Vogel nicht richtig zu benennen, hieß ihn schlichtweg australisches Rothbürzelchen, und so fanden die auf den ersten Blick unscheinbaren Astrilde um so weniger Käufer, als damals, vor ungefähr einem Jahrzehnt, die Liebhaberei für die seltenen Erscheinungen des Vogelmarktes in Deutschland noch keineswegs lebhaft erwacht war. Bevor ich aber meine eigenen Erfahrungen mittheile, muß ich wiederum auf die Naturgeschichte des Vogels eingehen.

Dieser einfarbig graugrüne Prachtfink wird ungemein verschönt durch die lebhaft rothen, sehr breiten Augenbrauenstreifen und den prächtig rothen Bürzel; das Schnäbelchen ist glänzend roth, mit schwarzer Firste.

Shaw und Latham hatten den Vogel bereits beschrieben, als ihn Vieillot noch für unbekannt hielt, in dem großen Bilderwerke unter der Bezeichnung Le Sénégali quinticolor darstellte und in seinen herrlichen fünf Farben pries. Außer der Beschreibung giebt er aber keine weitere Nachricht über ihn. Gould in den „Birds of Australia“ schildert ihn als einen der verbreitetsten Vögel von Neusüdwales und Südaustralien, wo er überall in den Gärten und auf den offenen Weideländereien zu finden ist und sich von den Sämereien der Gräser und Kräuter ernährt. Besonders zahlreich zeigt er sich in der Umgebung von Sydnei und auch im dortigen botanischen Garten. Trotz seiner großen Lebhaftigkeit ist er leicht zu zähmen, so daß sogar alt eingefangene Vögel in einigen Tagen ganz zutraulich wurden. Im Herbst sammeln sich große Scharen und treiben sich streichend umher. Gegen das Frühjahr hin trennen sie sich in einzelne

Pärchen und erbauen ihre großen, leicht bemerkbaren Nester aus trockenen Gräsern und mit Distelwolle ausgepolstert in niedriges Gebüsch. Das Gelege besteht in fünf bis sechs weißen, schön fleischfarben durchscheinenden Eiern. Die Brutentwickelung ist von Caley beobachtet worden. Nach Angaben von F. W. Hutton ist er von europäischen Kolonisten nach Neuseeland gebracht und hat sich dort bereits stark vermehrt.

Das Bolle'sche Verzeichniß zählt den Dornastrild noch nicht mit. Die zoologischen Gärten Deutschlands haben ihn nur selten aufzuweisen und in Paris fand ich ihn weder in den großen zoologischen Anstalten, noch bei den Händlern. In den deutschen Vogelhandlungen ist er immer nur zeitweise und in wenigen Pärchen zu haben. Chr. Hagenbeck führt ihn ziemlich regelmäßig alljährlich, jedoch nur in geringer Anzahl ein; Hieronymi in Braunschweig brachte ihn manchmal aus England mit und C. Gudera in Leipzig erhält ihn zuweilen. Ch. Jamrach in London hat ihn in jedem Jahre, wenn die großen australischen Transporte kommen, und hin und wieder ist er auch von Bekemans zu beziehen. Diese Angaben gelten, nebenbei bemerkt, im allgemeinen auch für alle selteneren australischen Vögel überhaupt.

Zu den vier Dornastrilden, welche ich von Mieth entnommen, schickte mir Hagenbeck kurz darauf noch zwei Köpfe unter der Bezeichnung australische Fasänchen, und diese sechs Vögel waren durchaus übereinstimmend gefärbt und gezeichnet, ganz gleich groß und ließen sich garnicht von einander unterscheiden. Gegen das Frühjahr hin konnte ich aber bemerken, daß zwei von ihnen sich auffallend veränderten, indem das matte, fahle Aschgrau an Brust, Hals und Seiten mit einem schönen Bläulichweiß gleichsam überhaucht wurde. Aus dem Benehmen war sodann unschwer zu erkennen, daß diese beiden Männchen und die vier übrigen Weibchen waren. Sie lebten aber ganz friedlich beisammen, und nachdem ich ein Pärchen davon an den sehr glücklichen Züchter Herrn Leuckfeld (vrgl. S. 95) abgegeben, fing das zurückbehaltene Paar im Herbst an zu nisten. Leider wurde die erste Brut durch Webervögel zerstört und eine neue begannen sie erst im Juni des nächsten Jahres.

Obwol Gould von der außerordentlichen Lebhaftigkeit des Dornastrild spricht, erschienen sie in der Vogelstube sämmtlich als sehr stille, phlegmatische Vögel. Anfangs glaubte ich, daß dies in einem gewissen krankhaften, durch schlechte Behandlung hervorgerufenen Zustande begründet sei; nachher aber zeigten sich alle, welche ich im Laufe der Zeit angeschafft, in derselben ruhigen Lebensweise. Während der Liebeszeit waren sie allerdings etwas lebendiger geworden, doch steht ihre Lebhaftigkeit mit der des Grauastrild u. a. in keinem Vergleich. Beim Liebesspiel sitzt das Weibchen regungslos da und wird vom Männchen mit schief seitwärts gehaltenem Schwanze in drolligen Sprüngen

umhüpft. Außer einem einsilbigen, wispernden Lockton ließ er nichts, geschweige denn einen Gesang hören. Von dem Benehmen in der Vogelstube schließe ich auf die Lebensweise in der Freiheit dahin, daß der Vogel keineswegs dichtes Buschwerk und Dornen, sondern im Gegentheil freie sonnige Plätze liebt. Das Nest in der Vogelstube wurde aus Grasrispen, Fasern und Halmen, fast kugelrund und innen sorgfältig geglättet, doch von außen anscheinend liederlich, ähnlich dem des blauen Astrild, welches ich S. 97 beschrieben, gebaut. Es steht gewöhnlich in einem freihängenden Harzer Bauerchen, nur sehr selten blos in lichtem Gebüsch. Das Männchen schleppt allein die Baustoffe herbei und führt den äußeren Bau auf, das Weibchen dagegen schlüpft dann erst hinein und ordnet innen und rundet aus. Das Gelege enthält bis zu acht Eiern und die Brutdauer beträgt zwölf Tage. Das Brüten geschieht abwechselnd und die Jungen werden mit Eigelbfutter, doch am besten mit frischen Ameisenpuppen und zerschnittenen Mehlwürmern aufgefüttert. Sie sind ungemein zart und wachsen sehr langsam. Der Nestflaum ist bläulichgrau. Das Jugendkleid ist am ganzen Oberkörper düster fahlgrau, schwach olivengrünlich schimmernd, am Unterkörper fahl gelblichgrau, mit grauschwarzem Ober- und Unterschwanz. Die rothe Färbung der Augenbrauen und des Bürzels ist bereits vorhanden und läßt den Vogel als die Art erkennen, allein sie ist nur ganz zart und schwach angedeutet. Die Verfärbung vermag ich leider nicht zu anzugeben, weil die Jungen stets vor derselben gestorben. In meiner Vogelstube — jedenfalls zuerst in der Gefangenschaft — sind im Lauf der Jahre zwei Bruten glücklich flügge geworden und späterhin hat ihn dann auch Herr Linden in Radolfzell gezüchtet. Weitere glückliche Erfolge sind mir aber nicht bekannt geworden.

Dieser Prachtfink macht durchaus nicht den Eindruck eines sehr zarten Vogels und da auch fast alle verwandten Australier bekanntlich nicht zu weichlich sind, so hielt ich das häufige Sterben der meisten frisch eingeführten nur für eine Folge der Vernachlässigung auf der Ueberfahrt. Dann ist es mir aber vorgekommen, daß in einer ausnahmsweise kalten Nacht zu Anfang des Monats Juni zwei soeben flügge gewordene Junge gestorben und zugleich das alte Weibchen an Unterleibsentzündung erkrankt war. Vorsichtiger Schutz gegen mangelnde Wärme während der Brut und nicht minder so lange die Mauser dauert, dürfte daher doch dringend rathsam erscheinen. Die krankhaft angekommenen Dornastrilde habe ich mit gutem Erfolge mit wässeriger Rhabarbertinktur behandelt. Näheres bitte ich über dies Verfahren im Abschnitt Vogelkrankheiten nachzulesen.

Wenn das australische Fasänchen, unter welchem Namen dieser Prachtfink am bekanntesten ist, auch nicht zu den allerschönsten gehört, so macht es doch einen sehr angenehmen Eindruck in seinen harmonischen Farben und sowol in der Vogelstube, als auch im Gesellschaftskäfige gehört es zu den sanftesten und fried-

fertigsten unter allen kleinen Vögeln. Der Preis beträgt 18 — 24 Mark (6—8 Thlr.) für das Pärchen und selbst im Großhandel 11—12 engl. Schillinge. Da der Vogel in seiner Heimat nicht selten ist, so läßt sich wol annehmen, daß er mit der Zeit immer häufiger eingeführt und bei zweckmäßiger Behandlung auch lebensfähig ankommen und unsere Vogelstuben bevölkern wird.

Der Dornastrild, Augenbrauen-Dornastrild (*Rehb.*), oder das australische Fasänchen wird von den kleineren Händlern auch grünes Rothschwänzchen und australischer Rothbürzel genannt.

L'Aeginthe (*Vekemans*); Australian Waxbill (*Jamrach* und L. d. zool. Grt. v. London); Red-eye-browed Finch (*Gould*); Temporal Finch (*Latham*); Red-Bill (Kolonisten); Goo-lung-ag-ga (Eingeborne von Neusüdwales); Roode Venkbrauw-Astrild (holländisch).

Nomenclatur: Fringilla temporalis, *Latham*, *Vig. Jard.*; Fringilla quinticolor, *Vieill.*; Amadina temporalis, *Gray*, *Mitch.*; Estrelda temporalis, *Gould*; Aegintha temporalis, *Cabanis*, *Gld.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb olivengrünlichgrau; Stirn, Hinterkopf und Backen reiner grau; Halsseiten bis an die Schultern mit lebhaft grünlichgelbem Schein; Flügelschwingen braun, jede Feder mattgrünlichgelb gesäumt; Oberschwanz bräunlichschwarz; Kehle weißlichgrau; Hals, Brust, Seiten unterhalb der Flügel und Unterschwanz hellgrau; Brust- und Bauchmitte, Hinterleib und untere Flügeldecken grünlichgrauweiß; Zügel und breiter Augenstreif, Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachroth; Auge dunkelbraun; Schnabel glänzendroth mit schwarzer First- und Dillenkante; Füße gelblichweiß. Das Weibchen ist düsterer, ohne den bläulichen Färbungston an Brust und Seiten; es ist aber schwierig und nur dann zu unterscheiden, wenn das Männchen, etwa vom März bis Juli, das Hochzeitskleid trägt. Jugendkleid wie Seite 110 angegeben.

Aegintha temporalis: supra olivaceo-cinerea fronte, occipite genisque cinereis; colli lateribus usque ad humeros viride flavo-imbutis; remigibus fuscis, virente flavido-limbatis; cauda cana; collo, peetore et infracaudalibus cineraceis; tectricibus subalaribus subglauco-canis; loris, stria lata ophthalmica, uropygio et supracaudalibus puniceis; culmine gonateque rostri nitidi rubri nigris; iride picea; pedibus gilvis. ♀ dilutior afflatu colli laterum viride flavo ac pectoris laterumque coerulescente carens (nonnisi a ♂ nuptialem a Martio usque ad Julium vestem gerente distincta).

Länge 13 cm. (5 Z.); Flügel $5_{,8}$ cm. ($2^1/_2$ Z.); Schwanz $5_{,4}$ cm. (2 Z.).

Juvenis: supra lurido-cinerascens, obsolete olivaceo-micans; subtus gilvo-cinerea; cauda tota nigrescente; superciliis uropygioque obsoletissime puniceis, iisque signis jam specificis.

Beschreibung des Eies: Farbe reinweiß, glatt und glänzend, fleischfarben durchscheinend; Gestalt länglichrund; Länge 16 mm.; Breite 14 mm.

Ovum albissimum, laeve, nitidum, carneo-pellucidum et longiusculum.

Der Sonnenastrild [Aegintha Phäethon].

Tafel II. Vogel 7.

Die Strahlen der Morgensonne dringen durch das hohe Fenster bis zur Rückwand der Vogelstube und erhellen hier selbst das dichteste, mit Nestern besetzte Gebüsch. In dieser Beleuchtung, welche nur im Frühjahr und dann wiederum

im Herbst früh und abends eintritt, dünkt uns die hier versammelte Vogelwelt in erhöhter Schönheit und Pracht. Dann verdient der Vogel, den ich jetzt beschreiben will, seinen Namen Phaëthon*) im vollen Sinne des Worts. Er ist einfarbig, oberhalb dunkler, unterhalb reiner roth und erglänzt nun, als wäre er von lauterem Golde, wenn er auf einem Zweige sich wiegend sein Liebesspiel beginnt.

Als ein wahrhaft bewundernswerthes Wesen müßte dieser Sonnenvogel uns erscheinen, wenn seine Schönheit zugleich mit herrlichem Gesange verbunden wäre. In Wirklichkeit aber läßt er nur ein mehr komisches, als wohllautendes Schnurren erschallen, bei welchem er, den Kopf hoch erhebend und den Schnabel im größten Eifer bewegend, den langen, gestuften Schwanz fächerförmig ausgebreitet, sich gleichsam gravitätisch von einer Seite zur andern wendet und dann diesen Liebestanz plötzlich mit einem lauten, flötenden Ruf abbricht.

Dieser Prachtfink wurde zuerst von Hombron und Jacquinot im Jahre 1841 beschrieben und abgebildet und zwar nach der Sammlung, welche die Mannschaften der Korvetten L'Astrolabe und La Zélée mitgebracht hatten. Dann giebt Gilbert eine Schilderung und schließlich stellt ihn Gould in ausführlicherer Weise dar. Der Vogel ist ein Bewohner von Grasebenen, besonders solchen, auf denen Pandanus oder Schraubenfichten stehen. Er ernährt sich von Grassämereien und fliegt aufgescheucht immer zu denselben Bäumen. Vom Juli bis November sammeln sich dichte Scharen, zuweilen zu mehreren Hunderten, unter denen jedoch nur sehr wenige Männchen im ausgefärbten Gefieder sind. Zum Ende des Novembers hin sondern sie sich in Pärchen oder kleinen Flügen von höchstens sechs Köpfen und die Männchen erscheinen dann im vollen rothen Prachtkleide. Näheres über die Lebensweise und das Nisten theilen die Reisenden nicht mit. Die Heimat dürfte sich nahezu über ganz Nord- und Ostaustralien erstrecken. Umsomehr ist es verwunderlich, daß er im Vogelhandel so außerordentlich selten sich zeigt.

Der Sonnenastrild soll zuerst im Mai 1861 von Sidney aus lebend nach London in den zoologischen Garten gebracht sein. Seitdem dürften ihn auch die bedeutenderen Händler von Zeit zu Zeit wenigstens in kleiner Anzahl erhalten haben, denn die meisten führen ihn in den Preisverzeichnissen regelmäßig auf. Unter der Bezeichnung australischer Amarant, sandte mir Karl Hagenbeck etwa in der Mitte der sechsziger Jahre ein Pärchen, von welchem das Weibchen leider sogleich starb. Das Männchen war lange Zeit der schönste Astrild in meiner Vogelstube; doch gelang es mir nicht, wieder ein Weibchen zu erlangen. Mit einem andern Verwandten aber parte er sich niemals, sondern lebte einsam

*) φαεθων leuchtend, auch Beiname des Sonnengottes.

und als ziemlich bösartiger Störenfried in der damals nur aus Prachtfinken bestehenden Gesellschaft. Für gewöhnlich war er zwar verträglich, doch zeitweise fuhr er boshaft auf die kleinen Vögel los und wehe diesen, wenn sie ihm nicht rechtzeitig aus dem Wege zu schlüpfen vermochten; sie wurden dann, insbesondere noch unbeholfene Junge, arg zerzaust. Ich gab dies einzelne Männchen daher an Herrn Emil Linden in Radolfzell ab. Bald darauf ließ mir Herr Hagenbeck zwei Pärchen zukommen, und die Verehrer solcher lieblichen Vogelwelt werden meine Freude gerade über diese Ankömmlinge zu ermessen wissen — aber auch meine Betrübniß, als ich sah, daß dieselben und die mit ihnen zugleich angekommenen übrigen australischen Prachtfinken sämmtlich von der Reise her todtkrank waren. Nur ein Männchen blieb am Leben und dieses zeigte sich in späteren Jahren wol ebenso prächtig als das erste, aber bedeutend friedlicher und nach seinem ruhigen Wesen zu schließen, würde dieser Vogel wol unschwer in der Gefangenschaft nisten. Obwol ich bis jetzt kein anderes Weibchen für ihn bekommen konnte, und er sich auch nicht mit den nächstverwandten Arten, wie Dornastrild parte, so baute er doch für sich allein sehr häufig nach und nach mehrere Nester und zwar auffallend unordentlich, nur aus groben Halmen, Bast und Agavefasern, doch nach Prachtfinkenart gerundet und mit Federn und Baumwollflocken ausgepolstert. Sie waren in irgend einem passenden Winkel angebracht, hinter einem großen Käfige u. s. w., und ich glaube kaum, daß dieselben den im Freien errichteten entsprechen werden, da es doch nur Vergnügungsnester eines einzelnen Männchens waren. Herr Linden besitzt ein Pärchen, doch ist dasselbe nicht zur Brut gekommen und meines Wissens hat den Vogel bis jetzt noch überhaupt Niemand gezüchtet. Sobald Australien mehr aufgeschlossen wird, ist die zahlreichere Einfuhr auch dieser Art wol zu erwarten und damit werden wir einen der herrlichsten Stubenvögel gewinnen.

Im deutschen Vogelhandel ist der Sonnenastrild immer nur zufällig für den Preis von 36—45 Mark (12—15 Thlr.) für das Pärchen zu erhalten. Ein Großhändlerpreis ist wol nicht anzugeben. In Paris kostete das Pärchen 80 Frcs.

Der Sonnenastrild oder australische Amarant, von Reichenbach Karminphaëton genannt, heißt auch Rubinvogel.

Le Phaëthon *(Vekemans);* Le Rubin d'Australie (Pariser Händler); Crimson Finch *(Jamrach* und L. d. zool. Grt. v. London); Vuurvink (holländisch); Red Finch (Ansiedler von Port-Essington); Jng-a-däm-oon (Eingeborene von P.-E.)

Nomenclatur: Fringilla Phaëthon, *Hombron* et *Jacquinot;* Estrelda Phaëthon, *Gould;* Neochmia Phąëthon, *Gray, Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberkopf dunkelgraubraun; Hinterhals, Rücken und Bürzel bräunlichgrau, jede Feder fein roth gerandet; Flügeldecken dunkelgraubraun, mit breiten rothen Rändern; Flügelſchwingen ſchwärzlichbraun, mit feinen rothen Federſäumen; das ganze Gefieder des Oberkörpers erhält durch die rothe Säumung der Federn einen röthlichen Ton; Oberſchwanz roth, jede Feder bräunlich fein geſäumt; Zügel, Geſicht, Kopfſeiten, obere Schwanzdecken, Kehle, Bruſt und Bauchſeiten dunkelſcharlachroth; Bruſtſeiten fein weißpunktirt; Bauchmitte, Hinterleib und Unterſchwanz tiefſchwarz; Schnabel glänzend karminroth, mit röthlichweißem Grund des Unterſchnabels; Auge dunkel bernſteinbraun; Füße röthlichfleiſchfarben. Weibchen: oberhalb graubraun, röthlich überhaucht; Geſicht und Kinn, Oberſchwanzdecken und oberer Schwanz matt ſcharlachroth; Bruſt und die weißgepunkteten Seiten röthlich braungrau; Bauchmitte und Hinterleib bräunlichgelb.

Aegintha Phaëthon. Pileo cinereo-fusco; cervice, dorso et uropygio subfusco-cinereis, plumis eorum subtiliter rubro-marginatis; tectricibus al. cinereo-fuscis, late rubro-marginatis, remigibus nigricante fuscis, subtiliter rubro-limbatis; plumis rubro-limbatis afflatum lateri toti superiori afferentibus rubentem; loris, facie tota, gula, pectore, hypochondriis et supracaudalibus intense puniceis; pectoris lateribus minutim albo-punctulatis; abdomine medio, crisso et infracaudalibus aterrimis; rectricibus ambabus mediis sanguineis, externis fuscis, his exterius rubro-limbatis; rostro coccineo, nitido, basi mandibulae rubente albida; iride rubiginosa; pedibus rubente carneis. ♀ cinereo-fusca, rubente imbuta; facie, mento, supracaudalibus, caudaque rectricibus ambabus mediis dilute sanguineis; pectore et hypochondriis ferrugineo-cinereis, his albo-punctulatis, ventre crissoque sordide flavis.

Länge 12 cm. (4 2/3 Z.); Flügel 5,2 cm. (2 Z.); der ſtark geſtufte Schwanz 6,3 cm. (2 1/2 Z.).

Der Ceresaſtrild [Aegintha modesta].

Tafel III. Vogel 13.

Erſt im Jahre 1872, nachdem mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I erſchienen war, wurde ein Prachtfink nach Deutſchland gebracht, welchen Reichenbach ſeines einfachen und doch ſo anſprechenden Gefieders halber als Sinnbild der Beſcheidenheit*) bezeichnete. Da einige Händler ihn auch unter der Benennung Bänderbürzelfink ausboten, ſo gab dieſer Vogel zu vielfachen Verwechſelungen (namentlich mit dem Ringelaſtrild) und Irrthümern Anlaß. Ich beſchrieb ihn als neue Erſcheinung des deutſchen Vogelmarkts in der Zeitſchrift „Gefiederte Welt“, Jahrgang 1873, Nr. 10. und gab ihm den obigen Namen. Herr Auguſt F. Wiener in London ſchickte mir dann ein geſtorbenes Männchen und ſchrieb: der Vogel gehört jedenfalls zu den zarteſten auſtraliſchen Finken, denn er hat bei mir niemals Anſtalt zur Brut gemacht, obwol ich mehrere Pärchen beſitze, und zweimal iſt es mir vorgekommen, daß die anſcheinend ganz geſunden Ceresaſtrilde plötzlich

*) Aidemosyne modesta. Das griechiſche ai geht nach üblicher Latiniſirung der griechiſchen Wörter immer in æ über; es muß alſo: Aedomósyne heißen, wobei der Accent auf dem o nicht zu überſehen iſt, denn die Gefahr falſcher Betonung liegt hier nahe. Es lautet alſo wörtlich: beſcheidene Beſcheidenheit. Rchb. hat überhaupt kein Glück mit ſeinen Namen. Wenn er z. B. den goldbrüſtigen Aſtrild kleinen Aurora-Senegali benennt, ſo iſt das eben nichts weniger als gut erfunden.

todt von der Stange gefallen. Im Gegensatz dazu habe ich bessere Erfahrungen mitzutheilen. Die drei Pärchen, welche ich erhalten, zeigten sich als keineswegs weichliche Vögel, denn sie gewöhnten sich gut ein und fingen auch bald an zu nisten.

Bevor ich aber den Vogel und sein Brutgeschäft näher schildere, muß ich mir eine Abschweifung inbetreff der australischen Prachtfinken überhaupt erlauben. Nach ihrem Körperbau und ruhigen Wesen zu schließen, sollten dieselben zweifellos zu den kräftigsten Stubenvögeln gehören und dennoch sterben gerade sie in überaus großer Anzahl — freilich meistens nur unmittelbar nach der Einführung. Die Ursachen dieser betrübenden Thatsache liegen jedenfalls in der schlechten Behandlung während der Ueberfahrt begründet und ich werde dieselben, sowie ihre etwa mögliche Abstellung weiterhin eingehend erörtern. Zunächst sei hier nur angerathen, daß man die soeben angekommenen Prachtfinken niemals ohne weiteres in die Vogelstube fliegen lasse, sondern sie vorläufig in Käfigen bei einfacher Körnerfütterung, mit Ausschluß weiterer Zugaben halte und ihnen namentlich keine frischen Ameisenpuppen, sondern nur ein bis zwei Mehlwürmer für den Kopf biete. —

Gould sah den Ceresastrild häufig in Pärchen oder kleinen Flügen im niedrigen Gebüsch und auf der Erde, wo sie Gras- und Krautsämereien suchten. Gilbert fand das kuppelartig aus Gräsern gebaute Nest mit fünf bis sechs weißen Eiern. Näheres über das Freileben des Vogels giebt er nicht an und auch von anderer Seite ist nichts bekannt geworden. Die Heimat dürfte sich über ganz Südaustralien erstrecken, wo er hauptsächlich auf den weiten Grasebenen zu finden ist.

In der Vogelstube ist er anmuthig und lieblich. Auf den ersten Blick dünkt er uns allerdings wol als unscheinbar, oberhalb schlicht braun und nur an den Flügeldecken mit reihenweis stehenden weißen Punkten. Unterhalb aber ist das weiße Grundgefieder angenehm braun quergestreift. Eine schön sammtbraune Kopfplatte, ein tiefschwarzer Kehlfleck und ein glänzendschwarzer Schnabel geben ihm ein hübsches Aussehen.

Die sehr harmlos und verträglich in meiner Vogelstube lebenden Ceresastrilde schritten sehr bald zur Brut und zwar nisteten zwei Pärchen ohne Störung unweit von einander. Das Nest wurde regelmäßig in einem im Harzer Bauerchen angebrachten oder im dichten Gebüsch stehenden Körbchen angelegt und aus trockenen Grashalmen und Fasern gewölbt, aber ohne besondere Kunstfertigkeit. Das Gelege besteht fast immer aus vier verhältnißmäßig großen Eiern*); die

*) In Gould's „Birds of Australia" sind dieselben irrthümlich 1/2 Zoll lang (half an inch) und 3/8 Zoll (by three eights) breit angegeben.

Brutdauer beträgt zwölf Tage. Das Jugendkleid ist oberhalb einfarbig düster erdgrau, unterhalb schmutzig weißgrau, ganz ohne die Querstreifenzeichnung. Nur bei sehr genauer Betrachtung lassen sich zarte dunkle Linien bemerken. Die braune Kopfplatte und die schwarze Kehlfärbung fehlen. Das Schnäbelchen ist hell bleigrau. Mit Sicherheit darf ich wol behaupten, daß ich diesen Astrild zuerst und bis jetzt allein in der Gefangenschaft gezüchtet habe. Dies erscheint mir aber verwunderlich, da der Vogel doch gar nicht mehr selten, sondern bereits in allen Vogelstuben zu finden.

Herr Wiener sagt, daß Ch. Jamrach in London ihn Cherryfinch (Kirschenfink) benannt hat und zwar der kirschbraunen Stirnplatte wegen. Ganz neuerdings ist das Vögelchen übrigens in einen schlechten Ruf gekommen, denn Herr Dr. Luchs machte die unangenehme Erfahrung, daß ein Männchen in der Gesellschaft der kleinsten und zartesten Verwandten sich sehr bösartig gezeigt und getigerte, goldbrüstige und graue Astrilde umgebracht hatte. Es ist aber ebenso bedauerlich als wahr, daß sich in jeder Vogelgesellschaft, namentlich wenn sie eng zusammengedrängt wohnen muß, regelmäßig ein Stärkerer zum Tyrannen aufwirft und nur zu oft mehr oder minder erheblichen Schaden anrichtet. Auch ist solche Bösartigkeit zuweilen blos die persönliche Eigenthümlichkeit des einzelnen Vogels. Im größeren Raum freifliegend haben sie sich bei mir niemals als Raufbolde gezeigt.

Der Ceresastrild ist auch Bänderbürzelfink und bescheidene Aidemosyne genannt worden.

Modeste (Vekemans und ebenso auch wol bei den französischen Händlern); Modest Grass-Finch (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Plain-coloured Finch, (Gould). In den übrigen Listen ist dieser Vogel noch nicht vorhanden.

Nomenclatur: Amadina modesta et Estrelda modesta, *Gould;* Aidemosyne modesta, *Rchb., Gray.*

Wissenschaftliche Beschreibung: oberhalb braungrau, Stirn und Oberkopf dunkel kirschroth; Zügel und Kehle schwarz, Gesicht und Halsseiten weiß mit schmalen bräunlichen Querstreifen; Unterseite, Hinterrücken und Oberschwanzdecken weiß mit breiteren braunen Querstreifen; Bauchmitte und Unterschwanzdeckfedern weißlich; Flügelschwingen mit sehr feinem weißen Außensaum (an jeder Feder); Schwingen 2. Ord. (Armschwingen) an der Außenfahne mit breitem weißen Endsaum; Schulterfedern und Flügeldecken mit weißen Endflecken, welche am Vorderflügel zu 4—5 Querbändern zusammentreten; Schwanz schwarz, die 3 äußeren Steuerfedern jederseits mit weißen Endsäumen; Schnabel schwarz; Auge dunkelrothbraun mit schwärzlichem Rand umgeben; Füße graulich fleischfarben. — Weibchen ebenso gefärbt mit Ausnahme der weißen Kehle und der kleinen und braunen Kopfplatte.

Aegintha modesta: supra fusco-cinerea, fronte pileoque obscure cerasinis; loris gulaque nigris; facie collique lateribus albis, subfusco-fasciolatis; latere inferiore, tergo et supracandalibus albis, transverse fusco-fasciatis; abdomine medio et infracaudalibus albidis; marginibus remigum exterioribus tenuissime albidis, pogonio

secundariorum externo late albido-terminato; maculis albis scapularium et alar. tectricum terminalibus, parum in IV—V series ordinatim dispositis; cauda nigra, rectricibus ternis exterioribus late albo-terminatis; rostro nigro; iride badia, nigricante marginata; pedibus canescente carneis. ♀ concolor, gula alba ac pileo fusciore et breviore exceptis.

Länge 11,6 cm. (4½ Zoll); Flügel 5,8 cm. (2¼ Z.); Schwanz 5,2 cm. (2 Zoll).

Juvenis: supra unicolor fusco-cinerea; subtus lurido-incana et fasciolis tenuissimis fuscis et colore pilei brunneo gulæque nigro prorsus nullis; rostro dilute plumbeo.

Ovum albissimum, opacum, longiusculum et subacutum.

Beschreibung des Eies: Farbe rein weiß, matt, Gestalt länglich und spitz. Länge 16 mm., Breite 14 mm.

Der Aurora-Astrild [Aegintha phoenicóptera].

Tafel III. Vogel 14.

Bei näherer Betrachtung tritt uns die Färbung dieses Vogels, das prachtvolle Hochroth der Flügel, des Bürzels und Schwanzes, das angenehme Grau des Vorderkörpers und die liebliche Wellenzeichnung der unteren Seite in harmonischer, wirklich vollendeter Schönheit entgegen. Die schlanke, langgestreckte Gestalt ähnelt der des Helena-Astrild und auch die Größe ist ziemlich übereinstimmend.

Auch über ihn haben die Forscher und Reisenden (Swainson, Lesson, Antinori) fast gar nichts mitgetheilt, sondern ihn lediglich beschrieben; nur Heuglin giebt an, daß er ihn als Standvogel auf Lichtungen in den Urwäldern von Wau und Bongo, im niedrigen Gebüsch und Hochgras gefunden. Er lebe immer parweise, sei nirgends häufig, ziemlich scheu und lebhafter als andere, nahverwandte Arten. Seine Heimat scheint sich nur über einen kleinen Theil von Central- und Westafrika zu erstrecken, und da man ihn blos ausnahmsweise in kleinen Scharen beisammen getroffen, so wird er wol niemals in größerer Anzahl eingeführt werden. Wie zu den prächtigsten, so gehört dieser Astrild in der Gefangenschaft daher leider auch zu den allerseltensten Prachtfinken. Um so mehr freue ich mich darüber, daß es mir geglückt ist, ihn ebenfalls zu züchten und daß er die ziemlich sichere Aussicht bietet, in unseren Vogelstuben sich zu vermehren.

Den ersten Aurora-Astrild, ein einzelnes Männchen, erhielt ich von Herrn Hagenbeck im Herbste 1870. Erst nach zwei Jahren sandte mir dieselbe Großhandlung noch zwei Köpfe, und da ich die Geschlechter nicht zu unterscheiden vermochte, so ließ ich sie alle zusammen in der Vogelstube frei fliegen. Sie zeigten sich, im Gegensatz zu Heuglin's Behauptung, als auffallend stille, ruhige Vögel, welche nicht dichtes Gebüsch, sondern vielmehr freie, sonnige Plätze lieben und vorläufig friedlich beisammen lebten, bis sich ein Pärchen gesondert hatte und nun den dritten verjagte, ohne ihn jedoch sehr heftig zu befehden. Wenn

das Pärchen mittags vor einem Fenster in der Sonne saß, so entfaltete es ein Bild von entzückender Pracht und vorzüglich, wenn das Männchen sein komisches Liebesspiel begann. Unter eifrigen Knixen oder vielmehr anmuthigen Verbeugungen, mit emporgehaltenem Schwanze, umhüpft es das Weibchen, bis auch dieses in Bewegung geräth, so daß sie sich gleichsam tanzend um einander drehen, und dann erfolgt flatternd die Begattung. Dies Tänzeln dauert eine geraume Frist, und zunächst das Männchen und dann das Weibchen lassen fortwährend ein einsilbiges, ziemlich schrilles Zit, zit! erschallen. Das Nest wurde in sehr versteckter Weise in einem im dichtesten Gebüsch hängenden Nestkörbchen oder Harzer Bauerchen überwölbt, aber nicht besonders kunstvoll gebaut. Regelmäßig bestand das Gelege aus vier ziemlich großen Eiern. Brutdauer 12 Tage. Der Flaum der Jungen ist schwach gelblich weiß und die Wachshautwärzchen sind rein weiß. Das Jugendkleid ist ober- und unterhalb gleichmäßig düster und matt schwärzlich blaugrau, der ganze Unterkörper mit hellen, sehr zarten Querlinien gezeichnet; an den Schultern, Flügelrändern, auf dem Bürzel und Schwanz zeigt sich düsteres Roth. Das Schnäbelchen ist horngrau und die Füße sind schwärzlich. Die Verfärbung geht allmälig und langsam vonstatten, indem das Roth an den Flügeln, am Hinterrücken und Schwanz immer kräftiger, das Aschgrau am Vorderkörper reiner hervortritt, während der Unterkörper heller wird und die dunklen Querlinien sich stärker abheben. Erst nach einem Jahre gleicht das junge Männchen vollkommen dem alten.

Im Sommer d. J. 1874 erlangte ich von einem Liebhaber, Herrn Böttcher in Berlin, noch ein Pärchen, welches derselbe in Hamburg von einem der kleineren Händler gekauft hatte. Diese Vögel waren jedoch leider krank und starben nicht allein, sondern steckten mir auch die übrigen an, sodaß sämmtliche Jungen, die ich bis dahin gezogen hatte, zugrunde gingen.

In der Vogelstube zeigt sich der Aurora-Astrild durchaus verträglich; selbst in der Nistzeit befehdet er seinesgleichen nicht erheblich. Ihn zu erlangen muß immer als besonderer Glücksfall gelten und sein Preis wechselt daher auch außerordentlich, von 18 Mark (6 Thlr.) bis zu 75 Mark (25 Thlr.) für das Pärchen. Besondere Liebhaber gerade dieses Vogels werden immer am besten daran thun, sich an Fräulein Hagenbeck in Hamburg zu wenden, oder einen Bekannten damit zu beauftragen, daß er bei kleineren Händlern in allen Hafenstädten häufig nachsehe und kaufe, sobald der Zufall ihnen einige Köpfe dieser Art zugebracht hat.

Der Aurora-Astrild wird von Reichenbach Rothflügel-Aurora-Senegali genannt, eine Bezeichnung, die wol überflüssig ist.

In den Preislisten von Bekemans und Jamrach ist er nicht vorhanden, ebenso nicht in den Verzeichnissen der zoologischen Gärten.

Nomenclatur: Pytelia phoenicoptera, *Swainson, Bnpt., Hrtl., Antn., Rchb., Hgl.;* Zonogastris phoenicoptera, *Cab.;* Estrelda erythroptera, *Lesson.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb schön aschgrau, Oberkopf bis zum Nacken zart dunkelgrau gewellt; Flügel hochroth durch rothe Außensäume der Schwungfedern; obere Flügeldecken, Hinterrücken, Bürzel und oberer Schwanz prächtig hochroth; unterhalb zart aschgrau mit querlaufenden weißlichen Linien, welche an der Kehle ganz fein sind und bis nach hinten immer breiter werden; Unterschwanz einfarbig aschgrau. Auge dunkel bernsteinroth, Schnabel schwarz, Füße blaß fleischroth. Das Weibchen unterscheidet sich durch dunklere bräunliche Schattirung der rothen Farbe und durch stärkere weiße Linien am Unterkörper, während das alte Männchen von der Kehle bis zur Unterbrust nicht selten einfarbig aschgrau ist. Jugendkleid s. oben.

Aegintha phoenicoptera: saturate cinerea, subtus pallidius; pectore delicatius, abdomine reliquo latius undulatim albo-fasciatis; uropygio, superioribus caudae tectricibus, alae tectricum remigumque marginibus exterioribus coccineis; caudae superiore coccinea, interiore cinerea; rostro nigro; iride fusca; pedibus pallidis.

Juvenis: unicolor nigrescente-cæsia, subtus dilutius fasciolata; humeris alarmarginibus, uropygio caudaque rubro-imbutis; rostro corneo-cinereo; pedibus nigricantibus.

Länge $10{,}5^{cm.}$ (4 Z.), Flügel $5{,}2^{cm.}$ (2 Z.), Schwanz $4{,}6^{cm.}$ ($1^3/_4$ Z.)

Beschreibung des Eies: Farbe rein weiß, glatt und glänzend, Gestalt lang und spitz, Länge $16^{mm.}$, Breite $14^{mm.}$

Ovum albissimum, laeve, nitidum, sublongum et acutiusculum.

Der Streifenastrild [Aegintha lineata]. Heuglin entdeckte in den Kollaländern West-Abessiniens diese verwandte Art, von welcher er sagt: „Der ganze Ton des Gefieders ist heller, als bei dem vorigen, die Streifung der Brust ist deutlicher, der Schwanz länger, die rothe Färbung kräftiger und mehr verbreitet, der Schnabel ist viel schlanker und roth. Ich habe nur zwei Männchen dieser schönen Art eingesammelt und zwar in den Monaten April und Mai; beide fand ich in der Nähe der Quellen des Goang und Rahad in Westabessinien, gemeinschaftlich mit kleinen Elsterchen und Larvenastrilde in Bambusdickichten. Vom Herzog P. von Würtemberg wurde dieser Vogel in Fazoql aufgefunden. Näheres ist leider nicht bekannt."

Zonogastris lineata, *Cab., Hgl., Hrtl.;* Pytelia lineata, *Hgl.;* Pytelia polysona *Prz. Würtb.*

Der Ringelastrild [Aegintha Bichenovi].

Tafel III. Vogel 11.

Bei Gelegenheit der Pariser Weltausstellung sah ich zum erstenmal ein Pärchen Ringelastrilde und fand am Käfige die Angabe, daß dieselben dort gezüchtet seien — in welche Behauptung ich freilich bescheidene Zweifel setzte. Der Preis sollte 100 Frks. für das Pärchen betragen und am nächsten Tage waren sie bereits verkauft. Der Besitz dieser wunderhübschen Silberastrilde erschien mir damals als eins der Ideale, von denen man ja bekanntlich nicht

erwarten darf, daß sie erreichbar seien, und doch hatte ich bereits im Jahre 1872 ein volles Dutzend dieser Prachtfinken vor mir.

Gould beobachtete diesen Astrild im Dezember in kleinen Flügen von 4 bis 8 Köpfen auf den Grasebenen im Innern Australiens, namentlich in solchen Gegenden, in denen hie und da niedere Bäume und Gebüsche stehen. Die Vögelchen waren wenig scheu und flogen bei der Annäherung nur auf die nächsten Aeste. Ihrer kurzen, gerundeten Flügel wegen traut ihnen der Forscher die Fähigkeit für weiten und ausdauernden Flug nicht zu. Ueber die Lebensweise und Brutentwickelung vermag er nichts anzugeben, er weiß nur, daß die Hauptnahrung in kleinen Gräser- und Krautsämereien besteht. Die Verbreitung soll sich über den ganzen Süden und Osten Australiens erstrecken und der Vogel dürfte dort überall ziemlich häufig vorhanden sein.

Der Ringelastrild scheint auf den ersten Blick einfach gefärbt und dennoch ist er sehr schön. Oberkopf, Nacken, Halsseiten und Oberrücken sind aschgrau mit vorn sehr feinen und hinten breiten, querlaufenden, dunkeln und hellen Wellenlinien gezeichnet, welche sich an den Schultern dicht an einander drängen, und von ihnen aus ist die ganze obere Seite des schwärzlich-grauen Flügels mit regelmäßig reihenweise stehenden viereckigen, weißen Punkten gezeichnet (gegittert), die schwärzlichen großen Schwungfedern zeigen die weißen Punkte nur am Außensaum, während die Innenfahne einen breiten gelblichweißen Saum hat, so daß der ganze Unterflügel auch bis zur Schulter gelblichweiß ist, die äußerste Schwungfeder hat die Gitterpunkte nicht; der Hinterrücken ist schwarz, der Bürzel reinweiß, die oberen und unteren Schwanzdecken sind tief schwarz und der Schwanz ist bräunlichschwarz; ein breites schwarzes Stirnband, von einem Auge zum andern, zieht sich verschmälert im Bogen um Schläfe und Ohr bis zur Kehle hinab und umschließt das reinweiße Gesicht; ein zweites schwarzes Band trennt die ebenfalls weiße Brust von dem gelbweißen Bauch und übrigen Unterkörper. Das Auge ist braun, der Schnabel schön silbergrau, die Füße sind dunkel blaugrau. Das Weibchen ist durchaus gleichgefärbt und vom Männchen nicht zu unterscheiden; allenfalls erscheint für den scharfen Blick der schwarze Brustgürtel schmäler.

Auch der Ringelastrild gehört zu den Vögeln, deren Brut und Entwickelung zuerst in der Vogelstube erforscht worden. Jamrach in London führt ihn alljährlich, wenn auch nur in beschränkter Anzahl, ein und von dort aus brachten ihn dann Geupel-White in Leipzig und Zuckerkandel in Dresden zeitweise in einigen Pärchen nach Deutschland. Hagenbeck erhielt im Jahre 1874 eine beträchtliche Sendung, und so ist auch dieser Prachtfink gegenwärtig wol bereits bei allen bedeutenderen Züchtern zu finden.

Wenn die Ringelastrilde kürzlich erst angekommene und namentlich ältere Vögel sind, so zeigen sie im Gegensatz zu den meisten afrikanischen Verwandten

eine ganz seltsame stürmische Unbändigkeit. Durch bittere Erfahrungen klug geworden, hält wol jeder Vogelwirth alle neuankommenden Gäste vorläufig eine zeitlang abgesondert in einem Käfige. Ich hatte mehrere Pärchen Silberastrilde und andere australische Prachtfinken zusammen in einem geräumigen Drahtkäfige, wo sie sich zunächst erholen sollten, doch tobten sie leider bei jedem Nahen meinerseits wie unsinnig umher. Diese Furchtsamkeit — die freilich mit ihrem Benehmen im Freien im Widerspruch zu stehen scheint, bei alteingefangenen Vögeln aber wol erklärlich ist — artete in eine wahre Raserei aus, sobald ich abends Licht in das Zimmer brachte. Am nächsten Morgen lagen mehrere Silberastrilde mit eingestoßenen Köpfen todt am Boden. Auch andere Vogelfreunde haben ähnliches Unglück mit ihnen gehabt. Rathsam ist es daher, diese Prachtfinken nach der Ankunft, wenn sie gesund und kräftig erscheinen, ohne weiteres sogleich in die Vogelstube fliegen zu lassen. Sind sie dagegen kränklich, so setze man sie in einen dichten Käfig mit Holzstäben, an denen sie sich doch nicht so leicht beschädigen können.

Das Vögelchen entfaltet in der Vogelstube eine ganz absonderliche Schönheit, welche erhöht wird durch seine Anmuth, Lebhaftigkeit und Zutraulichkeit, sobald es erst eingewöhnt ist. Auch schreitet es vorzugsweise leicht zur Brut, die fast immer erfolgreich ist, wenn keine Störungen eintreten.

Das Nest wird jedesmal möglichst hoch an der Decke und fast immer in den von anderen Vögeln hergestellten Bauten eingerichtet. Grasrispen, Baumwollflocken und Federn dienen zum Auspolstern eines Webervogel- oder größeren Prachtfinken-Nestes. Das Gelege besteht aus vier bis sieben sehr runden Eiern. Brutdauer elf Tage. Der Nestflaum der Jungen ist reinweiß. Das Jugendkleid ist oberhalb fahlmäusegrau, unterhalb weißlichgrau; an der Stirn, am Halse und an der Unterbrust sind die schwarzen Ringel fein angedeutet, ebenso erscheinen die dunkelgrauen Flügel bereits zart mit weißlichen Punkten gegittert. Die Verfärbung beginnt sehr frühe durch das kräftige Hervortreten der schwarzen Ringelstreifen und Gitterpunkte, geht aber sehr langsam vor sich, sodaß die reinschwarzen obern und untern Schwanzdecken und der reinweiße Bürzel erst im zweiten Jahre sichtbar werden.

Freiherr von Beust in Werthheim hat den Ringelastrild ebenfalls mehrmals mit Glück gezüchtet, das Pärchen in seiner Vogelstube baute vorzugsweise gern in einem dichten Gebüsch aus Pfriemenstrauch. Hoffentlich wird auch dies Vögelchen durch sein überaus leichtes Nisten sich in allen Vogelstuben als regelmäßiger Gast einbürgern. Der Preis beträgt 36—45 Mark (12—15 Thlr.) und in London, unmittelbar nach der Ankunft, bereits 1 £ und darüber für das Paar.

Der Ringelastrild heißt auch Silberastrild, Bichenov's Gitterflügler (Rchb.) und Gitterflügel.

Astrild de Bichenow (Vekemans); Bicheno's Finch (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Double Banded-Finch (Jmrch., brieflich).

Nomenclatur: Fringilla Bichenovii, *Vig.* et *Horsf.*; Estrelda Bichenovii, *Gould*; Stictoptera Bichenovii, *Gld*, *Rchb.* — Bicheno's Finch, *Gld.*; Stictoptère Bichenow, *Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung, ſ. oben.

Aegintha Bichenovii. Fronte nigra, fascia, dein nigra faciei toti, mento gulaeque cunctis albis circumdata; pileo, cervice, colli lateribus, dorso et humeralibus subfusco-cinereis, antice subtilissime, postice latius transverse fusco-undulatis, humeralibus pariter densissime signatis; fascia pectori albido et abdomini testaceo-albo interposita nigra; ala superiore nigricante cinerea, ordinatim clathrorum instar albo-punctulata; remigibus nigricantibus; margine primorum praeter extimum extero albo-punctato; pogonio remigum cubitalium omnium extero maculas bifarias, posteriorum interno vittas offerente albas; tectricibus subalaribus gilvo-albidis; fascia ante uropygium album ut supra- et infracaudalibus nigris; cauda subfusco-nigra; rostro caesio; iride fusca; pedibus plumbeis. ♀ omnino concolor cingulo pectoris nigro, tantum angustiore.

Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5,3 cm. (2 Z.), Schwanz 5,5 cm. (2 1/8 Z.).

Juvenis: supra lurido-cinerea, subtus caneseens, obsoletissimis ut cingulis faciei, colli pectorisque nigris, ut maculis alarum cinerearum albidis.

Beſchreibung des Eies: Farbe reinweiß, glatt und glänzend, Geſtalt kurzoval. Länge 15 mm., Breite 13 mm.

Ovum albissimum, laeve, nitidum, brevi-ovatum.

Der Gitteraſtrild [Aegintha annulosa] unterſcheidet ſich von dem vorigen nur dadurch, daß er keinen weißen Bürzel, alſo zwiſchen dem Unterrücken und den oberen Schwanzdecken nur eine gleichmäßige ſchwarze Färbung hat. Dieſe Art iſt zuerſt, nebſt vielen verwandten andern Vögeln, von den Offizieren des britanniſchen Schiffes „Adler" geſammelt worden. Gould erhielt ihn von den Herren Bynoe und Dring. Seine Heimat ſoll ſich über die Nordweſtküſte Auſtraliens und die Halbinſel Koburg erſtrecken, wo er an grasreichen Flußufern in Familien von 6 bis 10 Köpfen zu finden iſt. Näheres über ſeine Lebensweiſe iſt nicht bekannt.

Unter den vielen Ringelaſtrilde, welche im Laufe der Jahre eingeführt worden, hat man nie ein Exemplar ohne weißen Bürzel bemerkt. Fern ſei es von mir, daß ich in die Angaben eines Forſchers wie Gould Zweifel ſetzen ſollte, allein die Thatſache, daß das Jugendkleid der zuerſt geſchilderten Art eine ſchwärzlich graue, gleichmäßige Färbung des Hinterrückens, Bürzels und Oberſchwanzes zeigt, verleitet mich faſt zu der Annahme, daß der als beſondere Art erachtete im Nordoſt erlegte Vogel nur das Jugendkleid des Ringelaſtrilds ſei. Sollte ich mich irren, ſo werden beide wol nur als Lokalraſſen zu unterſcheiden ſein.

Der gemalte Aſtrild [Aegintha picta].

Dieſen Prachtfink hielt Gould für ſo ſchön, daß er ihn mit einem Kunſtwerk des Malers verglich und dies in der lateiniſchen Bezeichnung ausdrückte.

Nur ein einziges Exemplar hatte Mr. Bynoe von der Nordweſtküſte Auſtraliens mitgebracht, jedoch ohne Angaben über die Lebensweiſe hinzuzufügen. Es iſt wol bekannt, daß dem erſtgenannten Forſcher eine Anzahl ſeltener Vögel und darunter auch jener Balg geſtohlen worden. Somit wäre dieſer Aſtrild bis auf weiteres verloren geweſen, denn ſeitdem hat ihn niemand wieder entdeckt, wenn nicht der kunſtreiche Griffel der Frau Gould ſein Bild der Nachwelt erhalten hätte.

Alle Freunde der gefiederten Welt werden aber meine Ueberraſchung ermeſſen, als ich gerade dieſe merkwürdige Art unerwartet ſah. Herr Wiener überſandte mir im Herbſt 1873 ein ſoeben geſtorbenes Weibchen mit folgenden Angaben: „vor einigen Monaten fand ich ein Pärchen zufällig bei einem Friſeur in Liverpool. Der Mann nannte den Vogel auſtraliſcher Berg-Diamant. Ein Pärchen aber kaufte ich ſchon vor etwa vier Jahren von einem Drahtarbeiter in London. Seitdem konnte ich den Vogel aber niemals wiederfinden. In ſeiner Lebensweiſe ähnelt er dem bekannten Diamantfink.“

Gould beſchreibt den Vogel in folgender Weiſe: oberhalb, Kopf, Mantel und Flügel braun, Schwanz ſchwarzbraun; Geſicht, Vorderhals und Bürzel tief ſcharlachroth, Bruſt und ganze Unterſeite pechſchwarz, Seiten reichlich weiß geſprenkelt (mit kleinen Tropfenflecken), Bauchmitte dunkel ſcharlachroth gefleckt. Oberſchnabel ſchwarz, Unterſchnabel roth mit ſchwarzem Grunde; Beine fleiſchroth. — Das Weibchen, welches mir vorliegt, iſt oberhalb vielmehr olivengrünlich braun und Kehle und Bruſt ſind graugrün und das Roth am Unterkörper fehlt ganz. Wiener ſchreibt über das Männchen, daß die olivengrüne Färbung etwas kräftiger und Kehle und Bruſt karminroth überflogen ſind. Die Vögel waren, als ſie nach London gelangten, jedenfalls noch jung. Trotz der abweichenden Färbung hat aber Herr Profeſſor Dr. Cabanis den Vogel mit Sicherheit feſtgeſtellt, und es kann gar kein Zweifel daran walten, daß das zoologiſche Muſeum von Berlin ein ausgeſtopftes und die herrliche Sammlung des Herrn Wiener ein lebendes Exemplar dieſer hochintereſſanten Art beſitzen.

Der gemalte Aſtrild heißt nach Rchb. gemalter Buntfink; in den Liſten der Händler iſt er natürlich nicht enthalten.

Nomenclatur: Emblema picta, *Gld, Rchb.;* Painted Finch, *Gld.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung, ſ. oben.

Aegintha picta. Supra fusca; facie, collo et uropygio intense puniceis; pectore et gastraeo piceis; lateribus large albo-guttatis; abdomine medio puniceo-maculato; maxilla basique mandibulae rubrae nigris; pedibus carneis. ♀ supra subolivaceo-fusca, gula pectoreque cinerascente viridibus; rubore colli abdominisque carens.

Länge: 8,2 cm. (3 1/8 Z.), Flügel 5,8 cm. (2 1/4 Z.), Schwanz 4,2 cm. (1 5/8 Z.).

Der Binſenaſtrild [Aegintha ruficauda].

Es iſt ein bekannter Brauch oder richtiger eine Unſitte vieler Händler, daß ſie in den Preisverzeichniſſen manche Vögel fortdauernd mit aufzählen, ohne daß

sie dieselben jemals einführen. Dies ist z. B. der Fall mit Gould's Rothschwanzfink. Derselbe soll zwar nach der „Revised List of the vertebrated Animals“ schon im Mai 1860, dann auch noch in den Jahren 1861 und 1864 lebend in den zoologischen Garten von London gelangt sein, allein keiner von den Großhändlern weiß mit Sicherheit anzugeben, daß er ihn jemals besessen.

Auch diesen Astrild übersandte mir Herr Wiener in einem gestorbenen Männchen. Dasselbe war jedoch bereits so sehr in Verwesung übergegangen, daß ich es nur mit Mühe feststellen konnte. Der Vogel ist oberhalb olivengrünlich braun, Schwanz dunkelbraun, jede Feder an der Außenfahne düster roth und die beiden mittleren ganz einfarbigroth; Stirn, Wangen, Zügel und Ring ums Auge sind zinnoberroth, an den Seiten fein weiß gepunktet; Brust und Seiten olivengrünlichgrau und ebenfalls mit weißen einförmigen Punkten gezeichnet, welche nach hinten zu immer größer werden; Bürzel und obere Schwanzdecken bräunlichroth mit großen weißen Flecken; Unterkörper, Bauch und Hinterleib düster gelblichweiß. Schnabel scharlachroth; Auge gelblichbraun; Füße dunkelgelb. Das Weibchen soll ganz ebenso gefärbt, nur kleiner sein. Das Jugendkleid beschreibt Gould als oberhalb olivengrünlich braun, Wangen grau ohne Roth; unterhalb ockergelb, ohne Tüpfel; Schnabel röthlichbraun, Füße bräunlichgelb. Die Heimat soll sich über Südaustralien und Neusüdwales erstrecken.

Gould fand den Vogel an den pflanzenreichen, abschüssigen Ufern des Flusses Namoi, immer nur in wenigen Köpfen. Sein Lieblingsaufenthalt dürften die Binsen längs der Gewässer sein und die Nahrung soll in kleinen Gräsern und Krautsämereien bestehen. Ueber die Lebensweise ist nichts Näheres bekannt.

Der Binsenastrild von Rchb. ist Rothschwänzige Bathilda, ferner Rothsterzfink und in England Rothschwanzfink genannt. Red-tailed Finch, Gould (Jamrach u. Brz. d. zool. Gartens v. London). In den übrigen Listen ist er nicht vorhanden.

Nomenclatur: Amadina ruficauda, *Gould;* Bathilda ruficauda, *Rchb., Gld.;* Estrelda ruficauda.

Wissenschaftliche Beschreibung s. oben.

Aegintha ruficauda. Supra olivaceo-fusca; fronte, loris, annulo ophthalmico, genisque cinnabarinis, his albo-punctalatis; pectore lateribusque subolivaceo-cinereis, antice minutius, postice latius albo-punctulatis; uropygio et supracaudalibus sanguineis, albo-maculatis; abdomine lurido-gilvo; cauda obscure fusca, pogonio rectricum lateralium extero, ambarum mediarum utroque rubro; rostro puniceo; iride ferruginea; pedibus luteis. ♀ concolor, paululum minor.

Länge $12_{,6}$ cm. ($4^1/_2$ Z.), Flügel $5_{,4}$ cm. ($2^1/_8$ Z.), Schwanz $4_{,8}$ cm. ($1^3/_4$ Z.), mit verlängerten Mittelfedern.

Juvenis: supra subolivaceo-fusca, genis cineraceis, rubore vacuis; subtus ochracea immaculata; rostro ladio; pedibus fulvis.

Die Amandinen*)

oder groß- und starkschnäbeligen Prachtfinken.

Jeder großschnäbelige Prachtfink ist im Vergleich zu seinen kleinschnäbeligen Verwandten in mancher Hinsicht im Nachtheil. Dies mögen Unterschiede sein, welche nur bei sehr aufmerksamer Beobachtung zur Geltung kommen, vorhanden sind sie sicherlich.

Zunächst fällt der Mangel an Zierlichkeit und Anmuth auf, welcher in der beiweitem geringeren Beweglichkeit begründet ist. Während der kleine Astrild in jeder Schwanzbewegung, im Fluge und Hüpfen, wie in jeder Verrichtung überhaupt unnachahmlich schön ist, erscheint besonders die größere Amandine durchaus plump und ungeschickt. Dazu kommt, daß ein wirklicher Gesang jenen Großschnäbeln nicht allein fehlt, sondern daß ihre Töne auch häufig nichts weniger als angenehm und harmonisch klingen. Dagegen dünkt uns dieses Singen, ebenso wie das begleitende Tänzeln, in viel höherem Grade komisch als bei den Astrilden.

Die Größe der Amandinen wechselt von der größerer Astrilde (also etwa $10{,}5^{cm.}$ oder 4 Z.) bis zu der unseres Haussperlings (also $24{,}9^{cm.}$ oder $9\frac{1}{2}$ Z.). Ihre Unterscheidungs- und Kennzeichen sind folgende. Eine mehr gedrungene und kräftige Gestalt, derberes und festeres, nur selten seidenweiches, in der Regel schlicht, doch angenehm gefärbtes Gefieder; die Flügel sind mehr oder minder kurz und gerundet, mit zweiter, dritter oder vierter längster Schwinge; der Schwanz ist meistens kurz und gerade abgeschnitten, der Schnabel ist dick, stark, gewöhnlich gewölbt, seltener gestreckt, mit mehr oder minder eingebogenen Schneidenrändern; die hohen und kräftigen Füße haben auffallend starke Krallen.

Obwol auch mehrere von den Amandinen — namentlich die prächtigen Australier — durch die geschätztesten Eigenschaften der Prachtfinken im allgemeinen sich die Zuneigung der Liebhaber erworben und daher in den Vogelstuben und Schmuckkäfigen eingebürgert haben, so giebt es doch andererseits eine beträchtliche Anzahl unter ihnen, welche weder Anmuth noch erwähnenswerthe Schönheit zeigen, sehr schwierig oder garnicht in der Gefangenschaft nisten und daher nicht selten langweilig werden, bezüglich für die Dauer jeden Reiz verlieren.

Die starkschnäbeligen Prachtfinken erbauen sämmtlich ungleich weniger kunstvolle Nester, als die Kleinschnäbelchen. Während ich schwankend war, ob ich die, höchstens mit einem mittelgroßen Schnabel ausgestatteten australischen Arten, wie

*) Wie S. 27 bemerkt, ist die von Swainson eingeführte Benennung Amadinen unbrauchbar, weil sinnlos. Um jedoch dem Sprachgebrauch möglichst entgegenzukommen, wähle ich für diese Vogelgruppe die Benennung Amandinen, abgeleitet von amandus, liebenswerth.

den Zebra-, Diamant- und Bartfink, zu den Astrilden oder Amandinen mitzählen sollte, war für mich außer den plumpen Bewegungen auch der Nestbau maßgebend; die Nester derselben bestehen nur aus unordentlichen, zusammengeschleppten Haufen mit einer mehr oder minder sorgfältig ausgepolsterten Höhlung.

Nur wenige Amandinen nisten regelmäßig in der Gefangenschaft; mehrere schreiten allenfalls zuweilen und ausnahmsweise zur Brut; die meisten aber stehen geradezu im Gegensatz zu den Astrilden, indem sie selbst bei jahrelanger sorgsamster Pflege kaum einmal einen Nistversuch machen. Ueber ihre Zucht bitte ich näheres in dem betreffenden Abschnitt nachzulesen. In Hinsicht der Fütterung stimmen sie mit den Schwachschnäbelchen überein, nur berühren viele unter ihnen weder Ameisenpuppen, noch sonstige animalische Nahrung, wie Eigelb oder Eierbrot.

Bei den meisten Amandinen ist die Unterscheidung der Geschlechter sehr schwierig, nicht selten garnicht zu ermöglichen. Die Färbung ergiebt selbst für den Vogelkundigen keine sicheren Merkmale und das Seite 31 angegebene Verfahren führt hier auch kaum zum Ziel; denn einerseits äußern selbst die Pärchen, welche sich bereits zusammengefunden haben, keineswegs eine große Zärtlichkeit und andererseits zeigt sich bei dem bereits ausgefärbten Vogel auch in der Brutzeit keine Erhöhung der Farben, das sogenannte Hochzeitskleid.

Eine Zutraulichkeit und Zahmheit ist bei ihnen nicht leicht zu erzielen und dies liegt eben in ihrem stillen, wenig regsamen Wesen, ihren geringen Bedürfnissen und auch wol in einer nichts weniger als bedeutenden geistigen Begabung, wenigstens bei einigen, wie den sog. Nonnen.

Auffallend ist es, daß diese anscheinend kräftigen, starken Vögel doch beinahe weichlicher als ihre kleinsten Verwandten sich zeigen. Sobald sich die Elsterchen, Bandvögel, Diamantvögel u. a. eingewöhnt haben, gehören sie allerdings zu den ausdauerndsten aller Stubenvögel. Sogleich nach der Ankunft aber ersterben auch sie zuweilen in der beiweitem größten Anzahl. Noch verwunderlicher aber ist es, daß sich manche, z. B. einige Nonnen, niemals für die Dauer erhalten lassen und daß noch andere, so namentlich der Schilffink, nach bester Eingewöhnung, im tadellosen Gefieder und bei vollem Körper ohne erklärbare Ursache nicht selten plötzlich sterben.

Auch das Freileben der Amandinen ist im allgemeinen noch wenig bekannt. Sie halten sich wol in denselben Oertlichkeiten auf, in denen man die Astrilde findet; nur weniger im Urwalde und in der Nähe menschlicher Wohnungen, mehr dagegen in Gras-, Bambus- und Dschungeldickichten, sowie in den Zuckerrohrfeldern, zur Brutzeit parweise, dann in Familien und noch später in mehr oder minder großen Schwärmen, welche mit Lärm umherstreichen und in den Durrah- und Reisfeldern nicht selten erheblichen Schaden anrichten. Ihre Nahrung besteht

vorzugsweise in den mehligen Sämereien der mannigfaltigen Gräser und verwandten Krautgewächse, und manche von ihnen dürften, wie ich dies aus dem Leben der Vogelstube schließe, weder Kerbthiere noch Früchte genießen.

Die Nistorte sind, soweit dieselben bisher von den Reisenden erforscht worden, nicht so mannigfaltig verschieden gewählt, als die der kleinsten Verwandten. Die vorhin erwähnten Dickichte, seltener höheres Gesträuch oder Baumhöhlen, nehmen die Nester auf, welche bei vielen, z. B. dem Silberfasänchen, kleinen Elsterchen und Bandfink, durchaus kunstlos, bei anderen, wie den Nonnen und den australischen Prachtfinken, in großen, aber wenigstens überwölbten Ballen bestehen. Eine besondere Kunstfertigkeit im Nestbau zeigt keine von den Amandinen.

In der Brutentwickelung, Verpflegung der Jungen u. s. w. stimmen sie mit den Kleinschnäbelchen überein. Ueber die Verfärbung der Jungen im Freien, sowie über die Mauser der alten Vögel ist noch nichts ermittelt worden; nur die Beobachtung in der Vogelstube gewährt über manche Arten in dieser Hinsicht Auskunft. Ihre Färbung wechselt im Alterskleide nicht mehr. In den Käfigen der Händler verlieren auch viele von ihnen die Farbe und werden schwarz; so besonders die Bandamandine, der Muskatfink und Reisvogel.

Die Einfuhr der Amandinen geschieht im umgekehrten Verhältniß zu den Astrilden in ungleich mehreren Arten aus Asien und Australien als aus Afrika. Eine Uebersicht dieser Einführung gebe ich in dem Abschnitte über den Vogelhandel.

Die Bandamandine [Spermestes fasciata].

Tafel VIII. Vogel 32.

Allbekannt unter dem Namen Bandfink oder Bandvogel, ist dieser Prachtfink eigentlich als das Urbild der Sippschaft der Amandinen anzusehen. Seine Eigenthümlichkeiten, die ich eingehend schildern werde, wiederholen sich bei allen übrigen Verwandten mehr oder minder wahrnehmbar. Zugleich gehört er zu den fremdländischen Stubenvögeln, welche zu allererst, wie noch jetzt, meistens von Dongola und Kordofa her, nach Europa eingeführt, schon sehr frühe von den Holländern und von Vieillot gezüchtet worden, sich bis zur Gegenwart herab allgemeiner Beliebtheit erfreuen und stets in größter Anzahl die Käfige der Händler bevölkern.

Obwol die Bandamandine zu den am schlichtesten gefärbten Tropenvögeln gezählt werden muß, so darf man sie doch nicht unschön nennen. Die Grundfarbe ihres Gefieders ist angenehm rehbraun, oberhalb dunkler und unterseits lichter, überall aber schwarzbraun gewellt und hell gefleckt. Diese gleichmäßige schuppenartige Zeichnung wird verschönert durch ein karminrothes, breites Halsband, welches über die weiße Kehle läuft. Eine fernere Zierde ist der an den

Brustschild des Rebhuhns erinnernde rothbraune Fleck auf der Unterbrust. Das Weibchen hat weder das rothe Halsband noch den braunen Schild. Alle bisher geschilderten Prachtfinken übertrifft dieser bedeutend in der Größe, denn er ist dem einheimischen Zeisig gleich, doch kräftiger und gedrungener gebaut.

Die Verbreitung erstreckt sich wahrscheinlich nahezu über den ganzen Erdtheil und namentlich ist er in Mittelafrika allenthalben häufig zu finden. Antinori, Heuglin, R. Hartmann und andere Reisende haben ihn beobachtet und über sein Freileben mancherlei mitgetheilt. Dasselbe dürfte im allgemeinen dem des rothen Astrild gleichen, wie beide auch fast immer in denselben Oertlichkeiten angetroffen werden. Während der Nistzeit, welche je nach dem Theile Afrikas vom September bis Januar beginnt, findet man sie parweise und nach der Regenzeit schlagen sie sich in der Weise anderer Finkenvögel zu mehr oder minder großen Flügen zusammen und schwärmen umher.

Dr. Karl Bolle hat den Bandfink im Jahre 1859 wol zuerst bei uns in Deutschland gezüchtet und in seiner geistvollen Weise geschildert. Es ist, sagt er, nach dem Reisfink vielleicht der verbreitetste fremdländische Vogel in den europäischen Käfigen. Man trifft ihn tief im Binnenlande, wie ich ihn unter andern selbst in Süddeutschland*) und auf dem Vogelmarkte zu Mailand fand. Ich sah diese Vögel auf den Kanarischen Inseln sich mit der größten Leichtigkeit vermehren und auch in Deutschland ist ihr Hang zum Nisten ein fast unwiderstehlicher. — In neuerer Zeit haben alle Vogelfreunde und Züchter, welche ich hier bereits mehrfach genannt, theils in großen Anlagen, theils aber auch in engen Käfigen glückliche Bruten der Bandamandine erzielt.

Gerade dieser bekannteste und gemeinste der Prachtfinken giebt auch den schlagendsten Beweis für die hochwichtigen Dienste, welche unter Umständen die Züchtung eines Vogels in der Gefangenschaft zur Erforschung seiner Naturgeschichte leisten kann. Ueber das Brutgeschäft hat bis jetzt kein Afrikareisender Auskunft gegeben. Alfred Brehm, der soeben von Hamburg abgegangen und die Direktion des Berliner Aquarium übernommen und mit dem ich damals verkehrte, wunderte sich höchlich darüber, als ich ihm eine in meiner Vogelstube flügge gewordene Bandamandinen-Brut zeigen und ihn darauf aufmerksam machen konnte, daß die jungen Männchen bereits mit dem rothen Kehlband das Nest verlassen. Es erscheint daher auch weiter nicht auffallend, daß der genannte Schriftsteller in seiner Naturgeschichte mancherlei irrthümliche Angaben macht und zwar nach dem Reichenbach'schen Werke, in welchem gesagt ist, der Bandfink lege roth gepunktete Eier und das junge Männchen erhalte erst im ausgefärbten Zustande das Halsband und den Bauchfleck. —

*) Angesichts der gegenwärtigen Verbreitung der Vogelliebhaberei ist dies dort glücklicherweise nicht mehr als eine Seltenheit anzusehen; im Gegentheil.

Gleich manchen der kleinen Astrilde gehören auch einige Amandinen zu den Vögeln, welche in der Gefangenschaft dunkel bis tief schwarzbraun gefärbt werden, und unter ihnen der Bandfink. Das erste Pärchen, welches ich anschaffte, waren solche mißfarbigen, im Gefieder sehr abgestoßenen und zerlumpten Exemplare, die sich aber, freifliegend in der Vogelstube, binnen ganz kurzer Zeit erholten und das naturgemäße Aussehen wieder erlangten. Sie begannen auch sogleich zu nisten. Während sie bis dahin harmlos und friedlich unter den anderen Vögeln gelebt, zeigten sie jetzt mit einmal ein ganz verändertes Betragen; sie zerstörten nämlich zahlreiche Nester. Herausgefangen und in einen ziemlich geräumigen Käfig mit einem angehängten Nistkasten eingesperrt, bezogen sie den letzteren schleunigst. Sie schleppten nur wenige grobe Baustoffe, dicke Heuhalme, Fasern, Fäden u. dgl., hinein, trugen einige Federn dazu und auf diesem unordentlichen Lager erstand eine Brut von vier Jungen. Zu meinem großen Bedauern wurden diese aber lebendig aus dem Neste geworfen, und wenn ich sie auch zurückbrachte, so hatten sie immer wieder dasselbe Schicksal. Dies wiederholte sich bei mehreren Bruten, obwol ich den Vögeln alle möglichen, zum Auffüttern der Jungen etwa geeigneten Nahrungsmittel, wie aufgequellte Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, hartgekochtes Eigelb, Eierbrot, weichen Käse oder Quark u. s. w., anbot. Dann wechselte ich das Weibchen, aber auch in der neuen, ebenfalls bald erfolgenden Brut wurden die Jungen getödtet. Endlich bemerkte ich, daß jedesmal das Männchen der Unhold war, welcher gleichsam mit wichtiger Miene, aber ganz geheimnißvoll, die gesunden, lebensfrischen Jungen vernichtete. Nach den an anderen Vögeln erzielten glücklichen Ergebnissen lag mir nun doch viel daran, auch vom Bandfink unter allen Umständen eine Brut flügge werden zu sehen und diese eingehend zu beobachten. Ich ließ daher ein anderes Paar frei fliegen, selbst auf die Gefahr hin, daß sie viel Unheil stiften würden. Dies geschah unmittelbar nach einer neuen Einrichtung der Vogelstube zuanfang des Monats Oktober. Obwol nun zahlreiche Pärchen zum nisten sich rüsteten, verursachten die Bandfinken doch diesmal keine Störung. Sie hatten es sehr eilig und bauten sofort in einer wagerecht hängenden Arzneiglas-Schachtel (Papphülse) aus denselben groben Stoffen ihr Nest. Im Verlaufe der bereits begonnenen Brut sind die Bandamandinen, ganz ebenso wie für gewöhnlich in der Vogelstube oder im Käfige, durchaus verträglich.

Der Vorgang der Brut ist folgender: Das Männchen schleppt alle Baustoffe selbst herbei, während das Weibchen sich zuerst nicht darum bekümmert; dann aber ordnet das letztere den innern Ausbau, soviel oder sowenig vielmehr von einem solchen die Rede sein kann. Die Bandamandine gehört nämlich zu den Prachtfinken, die beim Nestbau garkeine Kunstfertigkeit entwickeln. Sie wählt vorzugsweise gern einen bis auf das Flugloch ganz geschlossenen

Kasten oder das schon gewölbte Nest eines geschickter bauenden Verwandten. In den erstern werden nur wenige grobe Halme und Fasern eingetragen und eine vorsorgliche Ueberwölbung des Lagers ist dann nicht nothwendig. Die Eier werden einen Tag um den andern gelegt. Brutdauer 12 Tage; beide Gatten des Pärchens brüten abwechselnd, das Weibchen bei Nacht allein, bei Tage aber das Männchen längere Zeit als jenes. Die Jungen haben einen spärlichen bläulichen Nestflaum, weiße Wachshautdrüsen und sehen zuerst ganz weiß, später schwärzlichblau aus. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens fast gleich, nur viel heller, beinahe weißlichgrau, ohne den bräunlichen Ton. Das Männchen hat auf der weißen Kehle bereits das schöne rothe, jedoch noch sehr zarte und nicht so breite Band, als bei dem alten Vogel. Auch die Rebhuhnzeichnung auf der Unterbrust ist in zartem und hellem Braun angedeutet; der Schnabel ist dunkelgrau und Füße sind weißgrau. Die Verfärbung geschieht in der Weise, daß alle Farben allmälig hervortreten.

Sobald die erste Brut der Bandfinken dem Flüggewerden nahe war, trieben die alten wieder den vorhin erwähnten argen Unfug; sie zerstörten ein fremdes Nest nach dem andern, bis sie schließlich, nach dem Ausfliegen der eigenen Jungen, doch wieder in ihrem alten Nistkasten sich einrichteten. In dieser Zeit offenbart sich der Charakter dieses Vogels von einer recht gemeinen Seite. Als einen Strolch, nach des Dichters Wort: einen Schelm und Dieb, darf man ihn ansehen. Schon seine ganze Erscheinung ist die der verkörperten Unverschämtheit und zugleich Feigheit. Jetzt sitzt er nebst seinem Weibe regungslos auf einem Aste oder läßt seinen schnurrenden Sang hören, plötzlich stoßen sie beide ihren Sperlingsruf aus und stürzen sich in das Nest eines kleinen Verwandten, in welchem sie herumwirthschaften, als sei es ihr Eigenthum. Dennoch gefällt es ihnen nicht, sie verlassen es nach wenigen Minuten, um auf ihren Sitz zurückzukehren. Nun möchten sie gern in das Nest des Zebrafinken dringen, allein sie wagen es nicht, denn der gefürchtete ist in der Nähe. Kaum aber fliegt er fort, so huschen sie hurtig herbei, und wehe jetzt seinen Jungen oder Eiern; sie würden erdrückt und hinausgeworfen, wenn er nicht wachsam wäre und die Strolche sofort wieder vertriebe. Wenn die Zebra-Amandine aber ergrimmt herbeieilt, flüchten die beiden Feiglinge ängstlich davon und lassen sich mehrmals durch die ganze Vogelstube jagen, obwol der Verfolger wenig mehr als halb so groß ist. Nur gegen die kleinen, sehr zarten Astrilde ist der Bandfink frech und tyrannisch. Jeden Widerstand fürchtet und flieht er dagegen, sodaß z. B. das noch kleinere, aber tapfere Elstervögelchen ihn stets siegreich in die Flucht schlägt.

Jedenfalls ist aber der Schaden, welchen ein Bandamandinen-Paar die Nistzeit hindurch in der Vogelstube anzurichten vermag, ein sehr beträchtlicher. Dennoch mußte ich den meinigen die Freiheit lassen, um auch diese Art in ihrer

ganzen Entwickelungsgeschichte kennen zu lernen. Dieser Vogel giebt auch besonders ein Beispiel für die Züchtungserträge, welche man unter günstigen Verhältnissen von manchen und vielleicht von den meisten Prachtfinken erzielen kann. Die erste Brut des Pärchens, von neun Eiern, ging durch einen Zufall verloren; dann brachten sie am 8. November zwei, am 25. Dezember vier, am 13. Februar drei, am 2. April vier, am 15. Mai fünf und am 20. Juni nochmals drei Junge zum Flüggewerden. Dazu kann ich noch angeben, daß dasselbe Pärchen im nächsten Jahre in einem Käfige noch schneller hintereinander, wenn auch nur viermal nistete. Bei anderen habe ich später beobachtet, daß günstigenfalls die Brut im Käfige ganz ebenso ertragsreich als in der Vogelstube ist. Nach meiner Anleitung züchtete dann Herr A. Schuster in Löwenberg die Bandfinken im großen und mit bedeutendem Erfolge. Frau Geheimsekretär Hedwig Proschek in Wien erzog von einem Pärchen, welches drei Jahre hindurch ununterbrochen nistete und während dieser ganzen Zeit keine Mauser zeigte, in 45 Bruten mit mehr als 240 Eiern 176 Junge. Erst beim Beginn der 46. Brut starb das Weibchen an Legenoth, an welcher es übrigens schon früher gelitten. Im Alter von zwei bis drei Monaten waren die jungen Weibchen schon nistfähig. Die gezüchteten Männchen sangen in einer Weise, die von der eingeführter durchaus verschieden ist. — Dennoch ist diese Vogelzucht leider nicht so einträglich, als sie sein könnte, weil nämlich in jedem Jahre, namentlich zur Herbstzeit, in den zahlreichen Vogelsendungen aus Afrika vorzugsweise viele Bandfinken sich befinden, wodurch der Preis so fällt, daß sich der Verkauf der gezogenen Jungen kaum verlohnt.

Bei mäßigen Ansprüchen kann die Bandamandine, sowol durch ihr hübsches Aussehen als auch durch ihr komisches Betragen viel Vergnügen machen. Gleichviel, ob in der Brutzeit oder nicht, läßt das Männchen seinen Sang unzähligemal im Tage hören. Dr. Bolle vergleicht denselben sehr treffend mit dem der Rauchschwalbe; im übrigen lautet er etwa wie das Quitschen eines im Sande mahlenden Karrens; doch macht er keinen unangenehmen Eindruck, sondern stimmt so recht harmonisch mit dem wunderlichen Liebestanze überein. Der Vogel erhebt sich auf dem Aste, wendet den Kopf singend rechts und links und begleitet dies Schnurren mit knixenden Bewegungen, welche von wahrhaft grotesker Grazie sind. In der Zärtlichkeit beider Gatten des Pärchens, in den Liebkosungen und dem fortwährenden Beisammensein sind sie den kleinsten Prachtfinken gleich. Wenn sie einander aus den Augen verloren haben, lassen sie sogleich den sperlingsähnlichen Lockruf erschallen und wird der eine herausgefangen, so ertönt das schiep des andern immer ängstlicher und schriller, bis der vermißte sich wieder eingefunden hat. Eine leidenschaftliche Naturanlage, sagt der genannte Forscher, und die Heftigkeit von oft nichts weniger als platonischen Wallungen verleiten das Männchen nicht selten dazu, seinem Weibchen übel zu

begegnen, wenn dasselbe sich den Anforderungen seiner Sinnlichkeit nicht unbedingt fügen will. Ich sah ihn demselben Gewalt anthun zu einer Zeit, da es kränkelnd sich nach Ruhe sehnet.

Der Bandfink hält in der Gefangenschaft mehr als zehn Jahre aus. Von seiner Züchtung in der Vogelstube rathe ich entschieden ab. Dagegen nistet er im Käfige, selbst zu mehreren Pärchen beisammen, ohne alle Umstände. Die Ursache des Zugrundegehens der Bruten sind nach meinen Erfahrungen vornehmlich Störung, unpassende Fütterung und mangelnde Wärme. Bei einem auffallenden Geräusch, einer ungewohnten Erscheinung und namentlich bei der Untersuchung des Nestes gebehrden sie sich, besonders das Weibchen, fast immer wie unsinnig, und am wunderlichsten ist es, daß nach einer solchen Störung in den meisten Fällen die Brut verloren ist. In Hinsicht der Fütterung glaube ich, daß die Gewöhnung an Ameisenpuppen, Eigelb, Eierbrot u. dgl. (wie im Abschnitt über Züchtung angegeben) beizeiten geschehen muß. Daraus mag dann freilich das trübselige Umbringen der Jungen sich herschreiben, weil das zu üppige Männchen die nächste Brut nicht geduldig abwarten will. Allein es geschieht nur ein- oder höchstens zweimal und dann erzielt dasselbe Pärchen gewöhnlich noch vier bis fünf glückliche Bruten. Ich schlage vor, die beiden ersten Gelege von vornherein fortzunehmen. Dr. Stölker verhinderte dadurch die Unthat, daß er das Männchen, sobald Junge vorhanden waren, aus dem Käfig entfernte, jedoch in demselben Zimmer beließ, sodaß sie einander locken konnten. Das Weibchen erzog die Brut allein und ein Junges, welches vorher schon etwa $1\frac{1}{2}$ Fuß tief herabgeworfen und bereits ganz kalt war, erholte sich doch noch und blieb am Leben. Was die Wärme anbetrifft, so kann ich mit Bestimmtheit behaupten, daß die Bandfinken, sobald die Temperatur unter 10^0 R. sinkt, die Brut verlassen. Zuweilen geschieht dies, wie ich schließlich noch bemerken will, auch aus Ursachen, auf die man nicht so leicht kommt. So hat das Männchen die Gewohnheit, jedesmal zur Brutablösung einen Halm oder dgl. mitzubringen und wenn nun solche Baustoffe im Käfige gerade fehlen, so kann auch dies wol die Ursache zum Verderben der Brut werden. Alles übrige inbetreff der Zucht ist weiterhin zu finden. Der Preis beträgt für gutgefiederte Vögel 2, $2\frac{1}{2}$ bis 3 Thlr. für das Pärchen, und im Großhandel, bei Entnahme von 100 Paar verschiedener Prachtfinken zusammen, manchmal nur $3—3\frac{1}{2}$ Francs.

Die Bandamandine oder Halsbandamandine heißt auch Bandfink, Bandvogel, Halsbandvogel und gebänderter Kernbeißer (Bchst.), Halsband-Weberfink (Rchb.).

Le Cou-coupé (Vekemans); Cou-coupé, Grivelin à cravatte, Collier rouge, Gorge-coupée, Collerette (Pariser Händler); Fasciated Finch (Jamrach); Cut-throat Finch (List of the Zoological Gardens of London); Bandvogeltje (holländisch); Degollado (spanisch).

Nomenclatur: Loxia fasciata, *Gml.; Vieill.;* Fringilla detruncata, *Licht., Rpp.;* Loxia jugularis, *Shaw;* Amadina fasciata, *Ant., Lefb., Sw., Bp., Gr., Brw., Hgl., Hrtl., Bll., Rchb.;* Sporothlastes fasciatus, *Cabanis, Hyl.*

Fasciated Grosbeak, *Brown;* Le Cou-coupé, la Loxie fasciée, *Vieillot.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberhalb fahl röthlichbraun, jede Feder mit einer ſchwarzen querlaufenden Zickzacklinie gezeichnet, am Oberkopf und Nacken ſehr ſchmal und dicht, nach abwärts zu immer breiter; Flügelſchwingen dunkelbraun, jede Feder mit fahlem Außenſaum, die kleinen Flügeldeckfedern heller braun mit röthlichgelbem Rande und einer ſchwärzlichen Bogenlinie; Oberſchwanz dunkelbraun, weiß geſpitzt, die mittelſten Federn einfarbig braun; Kinn und oberer Kehlrand weiß; über die Kehle von einem Ohr zum andern ein breites karminrothes Band; an der Unterbruſt eine breite, matt kaſtanienbraune Binde; unterhalb röthlichbraun, Bruſtſeiten und Unterſchwanzdecken mit ſchwärzlichen Zickzacklinien, Bauchmitte und hinterer Unterkörper reinweiß, untere Schwanzſeite bräunlichweiß. Schnabel röthlichweiß mit bläulicher Spitze; Auge braun, Füße fleiſchfarben. Das Weibchen hat weder das rothe Halsband, noch die braune Bruſtzeichnung, die Kehle iſt ſchwach bräunlichweiß und die Bruſtmitte weiß mit zarten dunkeln Querlinien; im übrigen ſtimmt die Färbung mit der des Männchens überein.

Spermestes fasciata. Dilute fulvo-cervinus, lineolis brevibus nigricantibus variegatus et fasciatus; mento gulaque albis; fascia gulari coccinea; abdomine medio rufo; rectricibus lateralibus fumoso-nigricantibus, extimorum apice margineque extero conspicue albis; rostro dilute plumbeo; pedibus rubellis; iride umbrina. ♀ fascia gulari coccinea et macula abdominali rufa nullis.

Länge 12,5 cm. (4¾ Zoll); Flügel 6,5 cm. (2 Z. 5 L.); Schwanz 4 cm. (1 Z. 7 L.).

Juvenis: feminae adultae fere concolor, sed dilutior, canescens; ♂ semiannulo gulari rubro, angusto obsoletissimo; pectore subfusco-vario; rostro obscure cinereo; pedibus canescentibus.

Beſchreibung des Eies: Länge 19 mm., Breite 14 mm. Farbe kalkweiß, matt. Geſtalt ſtark gewölbt mit ſtumpfer Spitze.

Ovum cretaceum, opacum, convexissimum apice obtuso.

Die Rothkopf-Amandine [Spermestes erythrocéphala].

In der Geſtalt und nahezu auch in der Größe, welche etwas beträchtlicher iſt, ſowie im ganzen Weſen, gleicht der Rothkopf dem Bandfink. Daher wunderte ich mich gar nicht darüber, als er faſt denſelben ſchnurrigen Sang, nur leiſer erſchallen ließ, begleitet von ebenſolchem Tänzeln. Die älteren Schriftſteller und ſelbſt noch Buffon und Latham waren in dem Irrthum befangen, daß dieſer Vogel in Amerika heimiſch ſei. Zuerſt Edwards und dann Vieillot bezeichneten Afrika richtig als das Vaterland und gaben Abbildung und Beſchreibung. Der letztgenannte Forſcher hat den Grivelin oder Moineau de paradis lebend beſeſſen und damals ſoll derſelbe in Paris und London keineswegs überaus ſelten geweſen und ſogar bereits mehrfach gezüchtet worden ſein. Vieillot rühmt die Zutraulichkeit in der Gefangenſchaft, ſein leichtes Niſten und hält ihn nicht für weichlich; doch warnt er vor jeder Störung und Beunruhigung, weil namentlich die Weibchen ſehr ängſtlich ſind und leicht das Neſt verlaſſen. Näheres theilt er aber nicht mit.

Heuglin hat die Rothkopf-Amandine niemals selber beobachtet. Lefebvre sammelte sie im Mai d. J. 1841 in Abessynien, wo sie jedoch nur zeit- und strichweise vorkommen soll. Zahlreicher ist sie in Südafrika, wo ganze Scharen die Gärten besuchen. Die Heimat soll sich nur über den Süden des Erdtheils erstrecken, doch hat man sie ja auch mehrfach in Westafrika gefunden. Eingehendere Mittheilungen sind nicht veröffentlicht worden.

Dr. Bolle zählt sie in seinem Verzeichniß nicht mit. Auf der Reise nach den Kanarischen Inseln hat er sie aber in Lissabon gesehen und meint, daß dieser Vogel Angola's dort häufiger zu haben sei als in Deutschland. Und in der That, die beiden Männchen, welche ich von Fräulein Hagenbeck erhielt, dürften wol die ersten sein, welche jemals bei uns eingeführt worden. Nachdem ich diese Art in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" (Nr. 4, 1874) als neue Erscheinung des deutschen Vogelmarktes beschrieben, theilte mir Herr C. F. Wiener in London folgendes mit: „Ihre Rothkopffinken sind mir wohlbekannt, denn ich hätte sie, bevor sie von hier nach Hamburg gebracht wurden, beinahe gekauft. Sie kamen von Paris hierher und ihrer Seltenheit wegen hat der Besitzer sie in Frankreich, England und in den Niederlanden vielfach auf Ausstellungen geschickt. Sie sind schon eine lange Zeit in Europa und als sie jetzt endlich verkäuflich waren, habe ich sie nicht erworben, weil ich sie für zu alte Knaben hielt."

Dennoch machte ich mit ihnen einen Züchtungsversuch in der Weise, daß ich ihnen Weibchen der am nächsten stehenden Art und zwar der Bandamandine zur Gesellschaft gab. Die beiden Männchen kümmerten sich zunächst um die Weiber nicht; dann fingen sie an, dieselben mit Schnabelhieben zu verfolgen, während sie doch sonst gegen die gesammte Bewohnerschaft der Vogelstube nur Gleichgültigkeit zeigten. Wiederum nach einer Frist aber geriethen die beiden Alten in einen bis dahin wol noch niemals stattgefundenen, eifrigen Hader. Einer verjagte den andern und der schwächere schloß sich nun mit einmal den Bandfinkenweibern innig an. Jetzt aber begannen diese eine ebenso heftige Fehde, das eine von ihnen wurde ebenfalls vertrieben — und das Ende vom Liede war, daß sich die ganze Gesellschaft in zwei Pärchen theilte, welche seitdem friedlich neben einander leben. Das eine Paar brütet rastlos, aber vergeblich; das andere jedoch hat bereits mehrere Bruten glücklich aufgebracht.

Das Jugendkleid des männlichen jungen Bastards ist oberhalb der jungen Bandamandine im Jugendkleide gleich, nur matter gefärbt, alle größeren Federn sind breit fahl gesäumt, namentlich die Schwanzfedern; der Kopf ist mäusegrau, dunkler geschuppt, an der Stirn bis etwa zur Hälfte hinauf, ist jedes Federchen roth geschuppt; das Kinn ist grau, dunkler geschuppt, dann folgt ein weißliches Band, darauf abwärts ein rothes Band aus zarten Schüppchen der grauen Federn bestehend, dann wieder ein weißliches Band mit dunklen Schuppen. Die

Rebhuhnzeichnung an der Bruſt iſt nur ſchwach angedeutet, der Bauch iſt reinweiß. Das Schnäbelchen iſt glänzend ſchwarz; Auge ſchwarz, Füße weißlich horngrau.

Im Herbſt d. J. 1874 wurden die Rothkopf-Amandinen von Bekemans und Gudera in mehreren Pärchen in den Handel gebracht und natürlich ſogleich verkauft. Ein Paar gelangte in die reich bevölkerte Vogelſtube des Herrn Graf Rödern und ein ſolches auch in die meinige. Auch dieſe Vögel waren leider ſämmtlich nicht in voller Geſundheit und bis jetzt iſt die Züchtung noch nicht gelungen. Die oben erwähnte Baſtardzucht dagegen geht in lebhafter Weiſe fort und ich will demnächſt verſuchen, die alten Rothkopf-Männchen mit jungen Baſtard-Weibchen zu paren, um wenn möglich davon weitere Nachzucht zu erzielen. Indem ich nämlich vorausſetze, daß die rothköpfige Amandine nicht ſobald wieder eingeführt wird, hoffe ich durch ergiebige Züchtung der ſo überaus naheverwandten beiden Arten einen ſtehenden Vogelſchlag heranzuziehen, der für die Liebhaberei immerhin intereſſant erſcheinen wird.

Ebenſo wie die Bandamandine, iſt auch der Rothkopf in der Vogelſtube ein übler Gaſt. Das eine alte Männchen niſtet zwar ruhig, ohne andere Neſter zu behelligen, doch überfällt es nicht ſelten einen kleineren Vogel und rauft ihm wüthend Federn aus; ein jüngeres Männchen aber trieb das unheilvolle Neſterzerſtören ebenſo arg als der Bandfink. In Hinſicht der Verpflegung und Züchtung ſind beide übereinſtimmend.

Die Rothkopf-Amandine oder Paradies-Amandine wird auch rothköpfige Amandine (Amadine), Paradies-Sperling und Rothkopf genannt.

Le Moineau de paradis (Bekemans und franzöſiſche Händler). In der Preis-Liſte von Jamrach, ſowie in dem Verzeichniß des zoologiſchen Gartens von London iſt er nicht vorhanden. Roodkopvogeltje (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia erythrocephala, *L.*; Amadina erythrocephala, *Swns.*, *Smth.*, *Bp.*, *Lrd.*, *Hrtl.*, *Edw.*; Sporothlastes erythrocephalus, *Cab.*, *Hgl.*; [Loxia brasiliana *Gml.*, *Vieill.*; Cardinalis angolensis, *Briss.*; Loxia maculosa, *Burch.*; Fringilla reticulata, *Vogt*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Ganzer Kopf nebſt Nacken und Kehle hochroth; im übrigen oberhalb bräunlichgrau, Bürzel und Oberſchwanzdecken reingrau, Deckfedern der Flügel, Hinterſchwingen und Schwanzfedern mit weißem Endfleck gezeichnet, wodurch über dem Flügel zwei weiße Binden gebildet ſind; Bruſt und Bauch fahlbraun, jede Feder mit einem länglichen, dunkler braunen, fein ſchwarz geränderten Querfleck; Unterbruſt kaſtanienbraun, heller geſchuppt. Schnabel röthlichweiß; Auge hellbraun; Füße lichtfleiſchfarben. Das Weibchen iſt etwas dunkler, ohne rothen Kopf, mit weißlicher Kehle und hellgrauem, zart dunkel geſchupptem Unterkörper.

Das Jugendkleid ſoll nach Rchb. aſchgraubraun ſein, jede Flügeldeck- und Schwanzfeder mit grauem Endfleck, die Schwingen mit bläulichgrauen Außenſäumen und die Unterſeite mit weniger zahlreichen Flecken. Bei dieſer Beſchreibung iſt aber der rothe Kopf vergeſſen, denn ich bin davon überzeugt, daß das junge Männchen, ebenſo wie der Bandfink im weſentlichen ausgefärbt, alſo mit bereits rothem Kopfe das Neſt verläßt. Ich habe deshalb eine ausführliche Beſchreibung des Miſchlings im Jugendkleide S. 134 gegeben.

Spermestes erythrocephala. Supra saturate cinerascens, subtus albida, squamatim nigro-maculata, lateribus rufescentibus; pileo, genis et gula dilute coccineis; alis albido bifasciatis; rectricibus lateralibus apice albis; rostro brunnescente, subtus pallidiore, rubente; pedibus dilute carneis; iride rufescente-fusca. ♀ paulo minor, capite dorso concolore, nec coccineo.

Länge $13{,}6^{cm.}$ ($5^1/_4$ Z.), Flügel $7{,}2^{cm.}$ ($2^3/_4$ Z.), Schwanz $5{,}3^{cm.}$ (2 Z.)

Die Reisamandine [Spermestes oryzivora].

Tafel VIII. Vogel 33.

Ein hübsch gefärbter Vogel, an Kopf und Kehle reinschwarz mit weißen Backen. Das ganze übrige Gefieder ist bläulichaschgrau, mit Ausnahme der dunkleren Flügelschwingen, des rosenröthlichen Unterleibes und schwarzen Schwanzes. Der freilich zu groß und fast plump aussehende Schnabel ist glänzend rosenroth. Die Größe ist etwa die des einheimischen Feldsperlings.

Auch der Reisfink gehört zu den bekanntesten und seit ältester Zeit her nach Europa eingeführten überseeischen Stubenvögeln. Buffon erwähnt ihn nur ganz kurz. Vieillot sagt, daß der Padda sowol seines entsprechenden Gefieders, welches wie mit einem pflaumenartigen Duft überhaucht erscheint, als auch seiner Sauberkeit und Schmuckheit wegen allgemein beliebt sei und daß er daher zahlreich über's Meer gebracht werde. Er sei aber weichlich und nur zwei bis drei Jahre am Leben zu erhalten. Nur wenn man ihm eine wärmere Temperatur biete und ihn außer Hirse und Kanariensamen auch mit Reis füttere, könne er wol sechs bis sieben Jahre ausdauern. Das Weibchen habe keine weißen Backen und der junge Vogel braune. Diese letzteren Angaben sind Irrthümer, welche bei den älteren Schriftstellern allverbreitet waren.

Die Heimat der Reisamandine erstreckt sich über Java, Sumatra, Borneo und Malakka. Wallace fand sie auf Lombok. Die massenhafte Ausfuhr des Vogels nach allen Weltgegenden hin ist die Ursache, daß er, ebenso wie manche anderen Finken in mehreren fremden, jedoch seiner Heimat entsprechenden Ländern einheimisch wurde. So lebt er nach Jerdon jetzt in großer Anzahl wild bei Madras und nach Swinhoë's Angaben ist er in Südchina eine gewöhnliche Erscheinung. Bernstein vermuthet, daß er auf Sumatra, wo er nur in der Umgegend von Padang vorhanden sein soll, ebenfalls durch Einfuhr eingebürgert wurde. Von Bourbon (Réunion) und Mauritius ist dies durch Newton und Maillard mit Bestimmtheit festgestellt. Jedenfalls ist die Ansiedelung auf den genannten Inseln schon in einer frühen Zeit geschehen, denn der von Buffon beschriebene Calfat (von Commerson auf Isle de France beobachtet) ist wol nur auf den Reisvogel zu beziehen. Kirk und v. d. Decken erlegten ihn auch auf der Insel Sansibar, wo er ebenfalls durch Zufall oder Absicht eingeschleppt worden, und deshalb haben Finsch und Hartlaub ihn als afrika-

nischen Vogel in dem großen Reisewerk aufgenommen, aus welchem ich die obigen Angaben entlehne. Nach einer Mittheilung von Masson sollte er auch in der algerischen Sáhara vorkommen, doch hält man dies für einen Irrthum, der auf Verwechselung mit einem andern weißbäckigen Vogel beruht. Dagegen ist er, wie F. W. Hutton sagt, nebst vielen Vögeln aus allen Welttheilen auf Neu-Seeland durch europäische Kolonisten ausgesetzt worden, er gehört aber nicht zu denen, welche sich dort sogleich vermehrt haben.

Hochinteressant ist die Schilderung, welche Dr. H. A. Bernstein von dem Freileben des Reisvogels in seiner eigentlichen Heimat, der Insel Java giebt: Gleich unserm europäischen Feldsperlinge bewohnt er ausschließlich die bebauten und kultivirten Landstriche und in diesen ist er eine der gewöhnlichsten Finkenarten. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich nicht von einander; die Jungen kann man an ihrem mehr einförmigen, graulichen Gefieder leicht erkennen. Während der Zeit, in der die Reisfelder unter Wasser gesetzt sind, d. h. in den Monaten November bis März oder April, in denen der angepflanzte Reis heranwächst und der Ernte entgegenreift, halten sie sich parweise oder in kleinen Familien in Dorfgehölzen und Gebüschen auf und ernähren sich hier von mancherlei Sämereien, kleinen Früchten und wol auch von Insekten und Würmern. Sobald aber die Reisfelder sich gelb zu färben beginnen und durch Ablassen des Wassers trocken gelegt werden, begeben sich diese Vögel oft in großen Scharen dorthin und verursachen nicht selten merklichen Schaden, so daß man sie in aller möglichen Weise zu vertreiben sucht. In den Gegenden, die besonders von diesen gefiederten Dieben zu leiden haben, erbaut man in der Mitte des Feldes ein auf vier hohen Bambuspfählen ruhendes kleines Wachthaus, von dem aus nach allen Richtungen hin zahlreiche Fäden zu den in gewissen Entfernungen durch das ganze Feld gesteckten, dünnen Bambusstöcken laufen, an denen große dürre Blätter, bunte Lappen, Puppen, hölzerne Klappern u. dgl. hängen. Wenn nun der in dem Wachthäuschen, wie eine Spinne in ihrem Gewebe sitzende Eingeborene an den Fäden zieht, dann rasseln alle trockenen Blätter, zappeln die Puppen, ertönen die Klappern und erschrocken fliehen die ungebetenen Gäste. Auch nach der Ernte haben die Vögel auf den bis zum Eintritt der Regenzeit, d. h. bis gegen den November hin brachliegenden Reisfeldern reichliche Nahrung. In dieser Zeit sind sie ziemlich fett und liefern, besonders die Jungen, ein beliebtes Gericht, weshalb ihnen eifrig nachgestellt wird. Das Nest fand ich bald im Gipfel mancher Bäume, bald zwischen den zahlreichen, die Stämme der Arengpalmen bedeckenden Schmarotzergewächsen und zwar in Größe und Gestalt verschieden, auf den Bäumen meistens größer und ziemlich regelmäßig halbkugelförmig, an den Palmstämmen aber kleiner und von weniger bestimmter Form in der Mitte nur unbedeutend vertieft. Alle sind

denen Beweis, dafür, daß er zu den Prachtfinken gehört. Das Pärchen hält unzertrennlich zusammen und das Männchen führt genau den schnurrigen, hüpfenden Liebestanz des kleinen Elsterchens auf. Das Nest wird in irgend einer Höhlung oder auch frei im Gebüsch angelegt, im letztern Falle ziemlich geschickt in runder Gestalt und mit engem, seitlichem Schlupfloch aus Bast, Fäden, Halmen erbaut, und mit Grasrispen, auch wol weichen Läppchen, Watte u. dgl. ausgepolstert. Das Gelege besteht in vier bis sechs reinweißen Eiern. Das Jugendkleid ist oberhalb düster, einfarbig chokoladenbraun, unterhalb weißlich graubraun; Schnabel schwarz, Füße schwärzlichbraun. Die Verfärbung beginnt etwa in der sechsten Woche, indem das Gefieder oberhalb dunkler und unterhalb heller bis zuletzt reinweiß wird. Erst nach einem Jahre zeigen die Kopffedern den Metallglanz und dann ist auch der sehr langsam hervortretende gelbbraune Seitenfleck (s. wissenschaftliche Beschreibung) vollständig ausgebildet. Manche Pärchen nisten leicht und ergiebig, andere dagegen machen in Jahr und Tag keine Anstalt zum Nestbau.

Die größte Elsteramandine, oder das Riesenelsterchen, heißt auch größtes Elsterchen, Kuttenelsterchen und Kuttenweber (fälschlich von Rchb.).

La Nonnette d'Afrique, la plus grande Nonnette (Vekemans und französische Händler); Pied Grass-Finch (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London; nach dem letztern ist der Vogel zuerst im Februar 1871 gekommen).

Nomenclatur: Amadina fringilloïdes, *Gray, Hrtl.*; Munia fringilloïdes, *Bp., Lss.*; Amauresthes fringilloïdes, *Rchb., Hrtl.* et *Fsch.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Hals, Kinn, Kehle, Bürzel, obere Schwanzdecken und Schwanz schwarz mit stahlgrünem Schein, im Nacken, auf dem Bürzel und an den oberen Schwanzdecken purpurviolet schimmernd; Schwingen und Deckfedern dunkelbraun; Mantel, Schultern und Hinterrücken rothbraun, jede Feder in der Mitte dunkler und mit hellerm Endsaum, wodurch auf der Schulter fünf bis sechs kleine weiße Streifen gebildet werden; Kropf und übrige Unterseite, nebst den unteren Flügeldecken weiß; hinterer Unterleib gelbbräunlichweiß; an den Brustseiten ein großer, schwarzer und hinter diesem, bis nach den Weichen, ein länglicher, hell leberbrauner Fleck. Der große 1,5 cm. (7 Linien) lange Schnabel dunkelblau, Unterschnabel hell bleigrau; Auge dunkelbraun; Füße bleigrau. Weibchen fast völlig gleich, nur an dem kleinern braunen Seitenfleck*) und kaum geringerer Größe zu unterscheiden.

Spermestes fringillina. Supra intense fusca, alarum tectricibus albostriolatis; capite, collo, macula utrinque pectorali, uropygio caudaque cum tectricibus superioribus nigris, nitore subchalybeo; corpore inferiore reliquo, subalaribus et subcaudalibus albidis; rostro ploceino nigro-caerulescente, subtus pallidiore; pedibus nigricantibus.

Länge 11,8 cm. (4½ Z.); Flügel 5,7 cm. (2 Z. 2 L.); Schwanz 3,5 cm. (1 Z. 4 L.).

Juvenis: supra unicolor, obscure brunnea; subtus subfusco-cana; rostro nigro; pedibus nigricante fuscis.

Beschreibung des Eies: Farbe mattweiß, Gestalt länglich. Länge 18 mm., Breite 12 mm.

Ovum cretaceum, longiusculum.

---

*) Dieser große, in die Augen fallende, leberbraune Fleck ist in allen bisher vorhandenen Beschreibungen (Reichenbach, Finsch und Hartlaub u. A.) sonderbarerweise nicht erwähnt.

Die kleine Elster-Amandine [Spermestes cucullata].

Tafel V. Vogel 21.

Das kleinste Elsterchen ist einer von den Prachtfinken, welche sich am leichtesten in der Gefangenschaft fortpflanzen und einbürgern. Dasselbe wird jedoch erst seit kaum einem Vierteljahrhundert lebend eingeführt und war Vieillot und den übrigen älteren Schriftstellern nicht bekannt. Gegenwärtig gehört es zu den Afrikanern, welche in der größten Anzahl herübergebracht werden, fortwährend in allen Vogelhandlungen zu haben, sehr einträglich züchtbar und überall beliebt sind. Die Färbung erscheint unansehnlich, schwärzlichbraun und weißbunt; um so liebenswürdiger ist das Benehmen. Größe des grauen Astrild, aber gedrungener und kräftiger.

Die Verbreitung erstreckt sich über das ganze tropische Afrika. Auf Portoriko ist es, nach H. Bryant, angesiedelt, wie der europäische Spaz auf Havanna. Ich traf, sagt Heuglin, diesen lebhaften und niedlichen Prachtfink unmittelbar vor und während der Regenzeit an zwei Oertlichkeiten, in Westabessynien meist im Bambusgebüsch, und in Zentralafrika mehr im Hochgras und auf niedrigen Bäumen, in der Nähe von Lichtungen und Büschelmaisfeldern. Er scheint Standvogel zu sein und lebt gewöhnlich in kleinen Familien von vier bis acht Köpfen beisammen, die sich selten trennen. So schwärmen sie, lärmend und emsig nach Grassamen suchend, beständig umher. Im raschen Fluge und immer dicht zusammenhaltend, unter pfeilschnellen Wendungen und Zickzackbewegungen streicht die Schar zur Tränke, wo sie schwätzend badet und dann ebenso eilig wieder zu ihren Standorten zurückkehrt; auch läßt sie sich, namentlich in den Abendstunden, dicht an einander gedrängt, schwirrend auf schwanken Aesten nieder. Der Gesang ist nicht laut, etwas rätschend, girlitzartig. Das Nisten in der Freiheit hat Dr. H. Dohrn in den „Proceedings of the Zool. Soc. of London“ 1872 beschrieben, und mit demselben stimmt der schon früher vom Direktor des zoologischen Gartens in Breslau, Dr. Schlegel, dann von mir, ferner von Dr. Rey, Dr. Stölker u. A. in der Gefangenschaft beobachtete und geschilderte Brutverlauf durchaus überein.

Das Vögelchen nistet ebensowol in dem S. 41 erwähnten Käfige, als auch freifliegend in der Vogelstube und das Nest wird regelmäßig in einer Höhlung mit engem Schlupfloch, einem Nistkasten oder mit Papier überklebten Harzer Bauerchen, aus Heuhalmen, Bast, Baumwollfäden, weichen Läppchen u. dgl. kunstlos aufgehäuft und mit Haaren und Baumwolle, niemals aber mit Federn ausgepolstert. Beide Gatten des Pärchens tragen ein und mit solchem Eifer, daß das Nest in einigen Tagen fertig ist. Sie brüten nicht abwechselnd, sondern gemeinsam, immer zu gleicher Zeit und lassen sich nicht leicht stören, so daß man

die Eier oder Jungen dreist besichtigen darf. Die Brutdauer währt 12 Tage; die Jungen verlassen zwischen dem 16. bis 18. Tage das Nest und der Verlauf der Brut vom ersten Ei bis zum Ausfliegen rundet sich auf nahezu fünf Wochen ab. Soeben ausgeflogen benehmen sich die Jungen ähnlich, wie S. 22 von den Zebrafinken angegeben. Die Fütterung beschreibt Dr. Rey sehr interessant: „Sechs Junge saßen in einer Reihe und sobald der erste Schreier befriedigt war, hüpfte die Alte diesem auf den Rücken, um von hier aus den zweiten zu versorgen. So rückte sie immer weiter, bis die ganze Reihe gesättigt war." In der Regel nisten sie drei- bis viermal hintereinander und jedes Gelege besteht in 4 bis 7 Eiern; doch muß man die flüggen Jungen entfernen, weil diese die Alten im nisten stören. Im September beginnt die Heckzeit und dauert bis zum Januar; im Frühlinge erfolgen gewöhnlich auch noch einige Bruten.

Das Jugendkleid ist fast gleichmäßig chokoladenbraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller gelblichbraun; Unterflügel hell bräunlichgelb, Schwanz schwarzbraun; Schnabel schwarz. Die Verfärbung tritt, wenn die Vögelchen gut gefüttert sind, von der vierten Woche an allmälig ein und ist etwa nach drei Monaten vollendet. Zuweilen verlangsamt sie sich aber auch, sodaß die aus Afrika eingeführten jungen Vögel bei den Händlern oft sehr zahlreich noch im Jugendkleide und mehr oder minder fleckig, in allen möglichen Uebergangsstufen zu sehen sind.

Im Gesellschaftskäfige ist das kleine Elsterchen zänkisch und tyrannisch gegen alle übrigen; in der Vogelstube vertreibt es selbst viel größere Vögel, z. B. die Reisamandine, tapfer vom Futterplatz und sogar aus deren Nestern. Liebhaber der Prachtfinken schätzen besonders seine Munterkeit, Hurtigkeit und sein komisches Wesen. Beim Liebesspiel krächzt das Männchen mit weit aufgesperrtem Schnabel seinen schnurrenden Sang und hüpft während desselben mit gleichsam wichtiger Geberde taktmäßig auf und ab, bleibt aber auf derselben Stelle sitzen und wendet sich nur singend rechts und links. Zu der Beliebtheit des Vogels trägt auch der Umstand bei, daß er überall, nach Schlegel wol gar auf dem Schreibpult oder Nähtisch, im kleinsten Käfige heimisch zu machen ist. Als die erste Brut bei uns flügge wurde, befand ich mich gerade in Paris, um die Weltausstellung des Jahres 1867 zu sehen, und meine Frau verzeichnete sorgfältig den ganzen Vorgang. Die Nistvorrichtung war oberhalb des Ofens in der Wohnstube angebracht und den Vögelchen zuliebe wurde nur durch Gazefenster gelüftet. Bewundernswerth erschien insbesondere die Geschicklichkeit, mit welcher die Alten jedes einzelne Junge geleiteten, damit es beim ersten Ausfluge nicht verunglückte. Als nach der beendeten Brut das Nest untersucht wurde, bot dasselbe keine geringe Ueberraschung. Meine Frau hatte es sich gar nicht zu erklären gewußt, wo eine zeitlang mancherlei kleine Dinge des täglichen Gebrauchs, welche räthselhafter Weise

verschwanden, geblieben sein könnten. Jetzt kamen dieselben sämmtlich zum Vorschein, und zwar eingefädelte Nähnadeln, nebst ganzen Knäuelchen, Bandstückchen, Besätze und was sonst noch zu derartigen Kleinigkeiten gehört. Alles hatten die kleinen Schelme mit Hast und Eifer in ihr Nest getragen, heimlich, sobald Niemand im Zimmer anwesend war. Trotz all' der Nadeln aber erfreuten sich die Jungen doch der vortrefflichsten Entwickelung. Nach meinen Erfahrungen, welche späterhin durch die anderer Züchter bestätigt worden, nisten die hier gezogenen Elsterchen ebenso ergiebig als die Wildlinge. Unter beiden giebt es hier und da ein Pärchen, welches durchaus nicht zur Brut schreiten will. In dem betreffenden Abschnitt komme ich auch auf diese Zucht weiterhin zurück. Die Verpflegung stimmt mit der für die kleinsten Astrilde angegebenen überein; sie bedürfen zum Aufziehen der Jungen auch Ameisenpuppen, Eierbrot u. dgl. Bei guter Pflege zeigen sie ebenfalls eine erstaunliche Fruchtbarkeit. Bemerkt sei noch, daß mehrere Männchen in der Vogelstube beisammen anfangs zwar eifrig einander bekämpfen, dann aber ungestört nisten. Bei Herrn Dr. Rey heckte ein Männchen erfolgreich mit zwei Weibchen. Graf York von Wartenburg erzog Mischlinge von kleinen Elsterchen mit dem braunbunten japanesischen Mövchen und Herr Möckel in Hamburg solche vom kleinen und Glanz-Elsterchen.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist sehr schwierig. Wenn zwei Elsterchen nebeneinander sitzen, so ist das kaum bemerkbar kleinere mit reinweißer Brust stets das Männchen, während das Weibchen an den Brustseiten noch mehr oder minder gefleckt erscheint. Außerdem ist das Liebestänzeln das einzig sichere Kennzeichen des ersteren. Alle übrigen Merkmale, wie das Fehlen oder der geringere Umfang des metallgrünen Schulter- und Seitenflecks sind nicht stichhaltig. Um ein richtiges Pärchen sicher zu erhalten, verfahre man wie beim Reisvogel angegeben. Zuweilen gelangen die Elsterchen in großer Anzahl nach Europa und sind dann zu $7,_5$—9 Mark für das Pärchen feil. Manchmal werden sie aber auch in längerer Zeit gar nicht oder nur spärlich eingeführt und dann bezahlt man die hier gezüchteten mit 12—15 Mark. Im Großhandel kosten sie im Durchschnitt 5 Francs und in den Hafenstädten bei Entnahme von 100 Paar $3^1/_2$ Francs. Sie kommen selten entfedert und erbärmlich in den Handel, und halten sich auch besser als die meisten Astrilde; doch sind auch sie manchmal von einer ansteckenden Krankheit befallen.

Die kleine Elster-Amandine heißt auch kl. Erzamandine oder Kappenfink, kleinstes Elsterchen, Elstervogel, Hirundelchen und bronzefleckiger Kappen-Weberfink (Rchb.).

La Bandelette (Vekemans); Hirondelle, Nonnette de Calcutta, Nonne französische Händler); Hooded-Finch (Vrzn. d. zool. Grt. v. London und Jamrach's

Liſte; fälſchlich in den Briefen Jamrach's auch Bronze-Maniken of Africa); Monnikskap-amadina (holländiſch); Naháidsche (Inhambane, nach Prof. Peters).

Nomenclatur: Amadina cucullata, *Sndv.*, *Gray*, *Hrtl.*; Spermestes cucullata, *Sws.*, *Bp.*, *Mll.*, *Cab*, *Css.*, *Hrtl. Sclt.*, *Mntr.*, *Ptrs.*, *Rchb.*, *Dhrn.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Loxia prasipteron, *Lss.*; Spermestes [Coccothraustes] scutatus, *Hgl.*, *Cab.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Kopf, Kinn, Kehle und Kropf ſchwarz mit lebhaftem, purpurkupferbraunem Metallſchimmer, Oberkopf ſtahlgrün ſchimmernd; Nacken, Halsſeiten und übrige Oberſeite braun, Schwingen an der Außenfahne ſehr ſchmal bräunlich geſäumt, an der Innenfahne breiter roſtfahl gerandet; die kleinen Schulterdecken metallgrün; Bürzel und obere Schwanzdecken bräunlichweiß mit ſchmalen ſchwärzlichen Querlinien; unterhalb reinweiß, Unterbruſtſeiten metalliſchſchwarzgrün, Bauch und Schenkelſeiten braun mit breiten weißen Querlinien, welche nach hinten zu immer ſchmaler werden; untere Flügeldecken roſtfahl, untere Schwanzdecken weiß mit ſchmalen, weit abſtehenden, dunkelbraunen Querlinien, Schwanz ſchwarz. Schnabel ſchwarz, Unterſchnabel hell bleigrau; Auge dunkelbraun; Füße dunkel hornbraun. Weibchen überſtimmend. Jugendkleid ſ. S. 146.

Spermestes cucullata. Supra brunnescens; capite et gutture nigris, nitore purpurascente-aeneo; uropygio et supracaudalibus albido-fuscoque-fasciolatis; macula utrinque pectorali fusco-aenea, altera scapulari aeneo-virescente; abdomine albo; hypochondriis et subcaudalibus fusco-fasciolatis; cauda cuneata nigra; rostro caerulescente nigro, mandibula pallidiore; pedibus fuscente plumbeis; iride fusca.

Länge $9{,}1^{cm.}$ ($3\frac{1}{2}$ Z.), Flügel $4{,}8^{cm.}$ (1 Z. 10 L.), Schwanz $2{,}8^{cm.}$ (13 L.).

Juvenis: fere unicolor brunnea, supra obscurius, subtus dilutius, flavicante fusca; subalaribus subfusco-gilvis; cauda nigro-fusca; rostro nigro.

Beſchreibung des Eies: kalkweiß, feinkörnig, nett. Geſtalt ſehr länglich, mit deutlicher Spitze. Länge $14^{mm.}$, Breite $11^{mm.}$

Ovum cretaceum, granulosum, sublongum apice distincta.

Die zweifarbige Elſter-Amandine [Spermestes bicolor].

Tafel V. Vogel 22.

Dies reizende Vögelchen, welches an der ganzen oberen Seite rein und glänzend bläulichſchwarz und unterhalb weiß iſt, kommt immer nur in einigen Pärchen in den Handel. Nach und nach hat es ſich jedoch in den meiſten Vogelſtuben eingebürgert. Wer dieſe Art zuerſt eingeführt und wann dies geſchehen, vermag ich nicht anzugeben. Im ganzen Weſen gleicht ſie dem kleinen Elſterchen, doch niſtet ſie nicht ſo leicht und ſicher. Zuerſt erzielte Herr Major von Bomsdorf in Berlin in einem großen Heckkäfige, welchen verſchiedene Prachtfinken bewohnten, eine glückliche Brut, und dann wurden auch zwei ſolche in meiner Vogelſtube flügge. Späterhin iſt dies Elſterchen noch mehrfach, von den Herren Ingenieur Hendſchel, Graf York von Wartenburg u. A. gezüchtet worden; doch gehört es zu denen, welche nur in einzelnen Pärchen gut, in den meiſten aber weder ergiebig noch zuverläſſig hecken, auch bringt jedes Pärchen gewöhnlich nur einmal Junge zur vollen Entwickelung.

Das Jugendkleid iſt oberhalb dunkel blaugrau, an Kopf und Kehle ſchwärzlich, unterhalb bräunlichgrauweiß; Schnäbelchen bläulichſchwarz, Füße ſchwarzbraun. Die S. 147 erwähnten Miſchlinge glichen im Jugendkleide völlig

wie dieſe Jungen aus. Ausgefärbt iſt ein ſolcher, welchen ich beſitze, dem zweifarbigen Elſterchen gleich, nur an den Seiten und am Bürzel wie das kleine Elſterchen gezeichnet.

In Hinſicht des Niſtens und der Brutentwickelung, Verpflegung u. ſ. w. ſtimmt das zweifarbige mit dem kleinen Elſterchen überein. Frau Cäcilie Lottermoſer in Warmbrunn theilte mir zuerſt die böſe Erfahrung mit, daß ein Paar dieſer Elſterchen in einem Verſandtbauer einem Helena-Aſtrild während der Fahrt einen Fuß vollſtändig abgebiſſen hatten, und dergleichen Fälle haben ſich dann wiederholt. In der Vogelſtube zeigt es ſich jedoch feige und beiweitem nicht ſo lebhaft als der kleinere Verwandte. Das Männchen tänzelt und ſchnurrt in derſelben Weiſe und dies iſt das einzige Unterſcheidungsmerkmal der Geſchlechter.

Der Preis pflegt zwiſchen 12 bis 18 Mark (4—6 Thlr.) für das Paar zu ſchwanken und im Großhandel ſind ſie in beträchtlicher Anzahl wol noch nicht zu haben.

Die Verbreitung erſtreckt ſich wahrſcheinlich nur über Weſtafrika, denn bis jetzt iſt der Vogel blos an der Goldküſte gefunden. Ueber das Freileben iſt noch gar nichts bekannt und in der geſammten wiſſenſchaftlichen Literatur iſt außer der Beſchreibung über ihn nichts vorhanden.

Die zweifarbige Elſter-Amandine oder das zweifarbige Elſterchen wird auch Glanz-Elſterchen und ſonderbarerweiſe Doppelfarb genannt.

Le Bicolore (Vekemans und die franzöſiſchen Händler; in Jamrach's Liſte und dem Vrzn. d. zool. Grt. v. London nicht aufgeführt; auch in den holländiſchen Liſten nicht vorhanden).

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberhalb, an Kopf, Rücken, Flügeln nebſt Kehle, Oberbruſt und Seiten ſchwarz; unterhalb von der Unterbruſt bis zu den Unterſchwanzdecken nebſt den Unterflügeln weiß; an den Bruſt- und Bauchſeiten tritt die ſchwarze Färbung zackig unter dem Flügel hervor. Schnabel dunkel bleiblau; Auge braun, Füße bläulichſchwarz. Weibchen gleich. Jugendkleid S. 148.

Spermestes bicolor. Corpore supra, gutture, pectore et lateribus nigris; abdomine, subalaribus, crisso et subcaudalibus albis, rostro caeruleo-nigricante; pedibus nigris.

Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,8 cm. (1½ Z.).

Nomenclatur: Amadina bicolor, *Fraser*; Spermestes bicolor, *Bp.*, *Hrtl.*, *Rchb.*

Juvenis: supra obscure glauca, capite gulaque nigricantibus; subtus subfusco-canescens; rostro subcoeruleo-nigro; pedibus nigris.

Beſchreibung des Eies: ſchwach glänzend weiß; Geſtalt ſehr länglich mit deutlicher Spitze. Länge 14,2 mm., Breite 11,4 mm.

Ovum album, subnitidum, longiusculum, apice distincto.

Die **gitterflügelige Elſter-Amandine** [Spermestes poënsis], ein nahverwandter Vogel, welcher nur dadurch von dem vorigen verſchieden iſt, daß er auf dem Mittelflügel eine breite, faſt dreieckige, weiß und ſchwarz gegitterte, und auf dem Unter-

rücken und Bürzel eine weiß- und schwarzstreifige Zeichnung hat. Sonst stimmt er in allem übrigen mit jenem überein. Die Heimat ist Westafrika und über das Freileben ist nichts bekannt. Obgleich man in einem Handbuch gesagt, daß diese Art in unseren Käfigen sehr selten sei, also vorkomme, so habe ich sie doch noch niemals erhalten; auch sämmtliche Großhändler kennen sie gar nicht. Jene Angabe wird daher wol auf Irrthum oder Verwechselung beruhen.

Die gitterflügelige Elsteramandine wurde auch Gitter- und Netzflügel oder Kappen-Weberfink von Fernando-Po *(Rchb.)* benannt. — In allen Preisverzeichnissen der Händler, sowie in den Listen der zoologischen Gärten ist das Vögelchen nicht vorhanden. — Amadina poënsis, *Fraser;* Spermestes poënsis, *Bp.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Glänzend schwarz, Vorderschwingen klein und dicht weißgetropft, zweite Reihe, Bürzel und Bauchseiten weiß gebändert, Bauch, Unterschwanzdecken und Unterflügel weiß; Schnabel schwarzblau, Beine schwarz. Das Jugendkleid giebt *Rchb.* wie folgt an: oberhalb dunkelbraungrau, Schwanz und Flügel schwärzer, Kinn und Kehle aschgraulich, Bauch und Unterschwanzdecken blaßröthlichgelb, Schnabel bleifarbig.

Die **rothrückige Elster-Amandine** [Spermestes rufodorsalis]. Diese Art, die der vorigen wiederum sehr nahe steht, entdeckte Herr Professor Peters in Inhambane in Südmozambik und später wurde sie auch vom Baron v. d. Decken in Mombas und Sansibar erlegt. Sie unterscheidet sich von dem gitterflügeligen Elsterchen durch braune Färbung der oberen Theile. Lebend ist sie noch nicht eingeführt worden. In der Heimat wird der Vogel Tengatenga genannt (Ptrs.).

[Spermestes rufodorsalis, *Ptrs.*, *Licht.*, *Cab.*, *Fnsch.* et *Hrtl.;* Amadina punctipennis, *Bnc.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Hals, Kinn, Kehle und Kropf kohlschwarz, übrige Oberseite schön braun; größte obere Flügeldecken mit weißen Schaftstrichen; Schwingen braunschwarz, an der Außenfahne mit feinen weißen Randflecken, an der Innenfahne breit weiß gerandet; Bürzel und obere Schwanzdecken schwarz, fein weiß gepunktet; Unterseite und untere Flügeldecken weiß, Brustseiten schwarz, Bauch- und Schenkelseiten schwarz und weiß gepunktet; Schwanz schwarz; Schnabel bläulichweiß; Füße bräunlich. Jugendkleid: oberhalb braun mit etwas rothbraun verwaschener Mantelmitte; Schwingen und Schwanzfedern braunschwarz, die ersteren an der Außenfahne fahlweiß gerandet; Kinn und Kehle rothbräunlich; übrige Unterseite weiß. Uebergangskleid: Kopf und Bürzel noch braun, die schwarzen Federn der Schenkelseiten noch mit weißem Punkte; auf dem schwarzen Kropfe stark mit braunen und fahlen Federn gemischt. (*Fnsch.* und *Hrtl.* nach den von Peters und v. d. Decken gesammelten Exemplaren.)

Die **Zwergelster-Amandine** [Spermestes nana]. In der Uebersicht der Vögel Madagaskars giebt Dr. Hartlaub die Beschreibung des Zwergelsterchens, welches in den Museen von Paris und Philadelphia vorhanden und nach Sganzin, der es le petit Marteau nennt, auf jener Insel nicht selten sein soll. Es ist nur $7_{,8}^{cm.}$ (3 Zoll) groß, oberhalb bräunlich, unterhalb dunkelgrau mit olivengrünen Oberschwanzdecken und schwarzem Schwanz. Hoffentlich wird es demnächst lebend herüber gebracht, da wir ja zahlreiche Vögel von Madagaskar erhalten. [Pyrrhula nana, *Pucher*; Spermestes nana, *Bp.*, *Hrtl.*]

* * *

Bronzemännchen, Silberfasänchen und **Muskatvögel** nennt man im Vogelhandel eine Anzahl indischer und afrikanischer Prachtfinken, mit welchen sich die Liebhaberei seit den ältesten Zeiten her beschäftigt, und die sich trotz der Unscheinbarkeit ihrer Farben bis heutigen Tages großer Beliebtheit erfreuen. Büffon und andere ältere Schriftsteller faßten sie unter den Bezeichnungen Jacobin und Domino zusammen, gaben aber keine klare Uebersicht, sodaß man aus den Schilderungen kaum oder nur schwierig erkennen kann, welche Art gemeint ist. Prof. Cabanis zählt sie sämmtlich zu der Gattung Lanzenschwänzchen [Uroloncha]; andere Schriftsteller theilen sie in mehrere Geschlechter. Das Freileben aller dieser Arten ist ziemlich bekannt. Dagegen haben sich einige noch nicht in der Gefangenschaft vermehrt; andere werden in Japan schon seit vielen Jahrhunderten, dem Reisvogel gleich, gezüchtet. In der Heimat leben sie in der Weise anderer Finkenvögel, zur Nistzeit parweise und nach derselben in großen Scharen beisammen. Dann werden sie auf den Reisfeldern und an anderen Nutzgewächsen schädlich. Alle sind Zugvögel. Ihre großen ballförmigen Nester aus Gräsern, Rispen und Fasern stehen in Gebüschen von Bambusrohr, Schilf, wilden Rosen u. dgl. Sie sind vorzugsweise Samenfresser, die wol kaum oder nur zur Fütterung der Jungen Insekten verzehren. (Nach Hodgson, mit dessen Angaben auch die Lebensweise der afrikanischen Arten übereinstimmt.)

Die gestreifte Bronze-Amandine [Spermestes striata].

Das Bronzemännchen ist ein düster gefärbter, oberhalb brauner, unterhalb weißer Vogel mit schwarzem Kopf, dessen ganzes oberes Gefieder heller gestrichelt erscheint. Seine Größe ist etwas beträchtlicher als die des kleinen Elsterchens. Er ist auf dem ganzen Festlande von Ostindien und Ceylon heimisch und sehr häufig. Jerdon sagt, daß er ihn an der Malabarküste in den Kornfeldern und auf offenen Stellen des dichten Buschwaldes, gelegentlich auch an den Landstraßen und sogar auf den Höfen neben und in den Stallungen gesehen, wo sich Flüge von sechs bis acht Köpfen umhertreiben und nach Sämereien suchen. Obwol dieser Prachtfink zu den schlichtesten gehört, ist er doch nicht ungern gesehen und daher in vielen Vogelstuben zu finden. Er ist im Wesen nicht so beweglich, flink und anmuthig als ein Elsterchen, sonst aber ebenso anspruchslos und ausdauernd und durchaus friedfertig. Seinen komischen, schnurrenden Sang trägt er vor, während er den Schwanz fächerförmig spreizt und den Kopf gravitätisch hin und her wendet. Die Geschlechter sind nicht verschieden gefärbt und das Männchen ist nur durch sein Schnurren festzustellen. Manche Pärchen hecken sehr leicht selbst im Käfige, andere aber gar nicht. In der Vogelstube bauen sie in einem Harzerbauerchen, oder in irgend einem Winkel das Nest. Die Brutentwickelung ist mit der des kleinen Elsterchens übereinstimmend. Das erste Pärchen, welches in meiner Vogelstube nistet, war ungleichartig, ein gestreiftes und ein schwarzbürzeliges Bronzemännchen. Die Jungen sahen aber wie die anderer Paare aus.

Das gestreifte Bronzemännchen oder der weißrückige Haarstrichfink hat noch keine weiteren deutschen Namen. In der Reihe der starkschnäbeligen Prachtfinken benenne ich es gestreifte Bronze-Amandine.

Le Domino (Vekemans und die französischen Händler); Striated Finch (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Gestreepte Amadina (holländisch);

Schakari-Munie (Bengalen); Tau-tesa (in Arakan; bedeutet nach Blyth (Waldsperling).

Gross-bec de l'Ile Bourbon (Brisson); Jacobin ou Domino (Buffon); Striated Grosbeak (Latham).

Nomenclatur: Loxia striata, *L.*; Amadina striata, *Blth.*, *Gr.*: Munia striata *Blth.*; Uroloncha striata, *Cab.*; Trichogrammóptila striata, *Rchb.*; Fringilla leuconota, *Tmm.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb dunkelbraun, jede Feder mit bräunlichweißem Schaft, wodurch das Gefieder hier fein gestrichelt erscheint; Vorderkopf, Gesicht, Kehle und Kropf bräunlichschwarz, ganze übrige Unterseite, sowie Unterflügel und Bürzel weiß mit schwachem bräunlichen Anflug; Ober- und Unterschwanzdecken röthlichdunkelbraun, Schwanz rein schwarzbraun; Schnabel bläulichschwarz; Auge braun; Füße schwärzlichgrau.

Spermestes striata: Supra fusca, scapo plumae singulae fuscante albo, notaeum exhibente tenuiter lineolatum; sincipite, facie, gula juguloque subfusco-nigris; gastraeo reliquo, subalaribus et uropygio albis fuscante imbutis; supra-et infracaudalibus badiis, cauda nigro-fusca; rostro subcoeruleo-nigro; iride fusca; pedibus nigricante cinereis.

Jugendkleid einfarbig dunkel bläulichgrau, unterhalb heller, düster weißlichgrau; Schnabel schwarz; Füße grau.

Juvenis: unicolor coerulescente cinerea, subtus dilutius, sordide ineana; rostro nigro; pedibus cinereis.

Beschreibung des Eies: mattweiß; Länge 15 mm., Breite 11,5 mm.

Ovum: album, opacum.

Die schwarzbürzelige Bronze-Amandine [Spermestes melanopygia].

Tafel V. Vogel 24.

Diese der vorigen sehr nahverwandte Art unterscheidet sich nur dadurch, daß die ganze Oberseite keine weißen Schaftstriche erkennen läßt und daß der Bürzel nicht weiß, sondern wie die ganze Oberseite braun ist. Die Heimat beschränkt sich auf Java und Borneo und der Vogel kommt blos zuweilen in einigen Köpfen in den Handel. Zur Brut ist er meines Wissens bei uns in der Gefangenschaft außer dem S. 151 erwähnten Mischpaar noch nicht gelangt. Reichenbach erhielt vom Oberst von Schierbrand drei Pärchen mit ihren Nestern, welche melonenförmig, 16 cm. hoch und 10 cm. breit, aus feinen Hirsegräsern mit langen haarartigen Rispen gebaut, theils im Schilf, theils zwischen Astgabeln eingezwängt hängend und mit den Blättern der Pflanzen bedeckt oder von den Ranken eines Schlinggewächses umwunden sind. Von außen bestehen sie aus den locker zusammengebogenen Zweigen der Gräser und innen sind sie mit den feinen Rispen einer Zuckerrohrart ausgepolstert, welche aus dem seitlich in der Mitte befindlichen 4 cm. weiten Flugloch hervorragen. In der Lebensweise, Brutentwickelung und in allem übrigen gleicht dies Bronzemännchen dem gestreiften durchaus. Als Herr Emil Schmidt in meiner Vogelstube die Studien für die Entwürfe der Abbildungen machte, war hier gerade nur diese seltenere Art vorhanden und daher wurde sie auf der achten Tafel dargestellt.

Das schwarzbürzelige Bronzemännchen oder die schwarzbürzelige Bronze-Amandine ist auch weißbäuchige oder Weißbauchmunie und weißrückiger Haarstrich-Weberfink *(Rchb.)* benannt.

Le Domino (Bekemans und die französischen Händler; ebenso bei Jamrach und den übrigen Händlern mit d. v. übereinstimmend); Prit (auf Java, nach Horsfield).

Nomenclatur: Loxia melanopygia, *L.*; Amadina melanopygia, *Gray*; Uroloncha melanopygia, *Cab.*; Trichogrammóptila melanopygia, *Rchb.*; Spermestes leucogastroides, *Moore.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb röthlich chokoladenbraun, haarfein gelblichweiß gestrichelt; Stirn, Gesicht, Kropf und Brust tiefschwarz; Unterbrust und Bauch weiß, Bürzel und Schwanzdecken schwarzbraun, Schwanz heller röthlichbraun.

Spermestes melanopygia: Supra brunnea, tenacissime flavo-lineolata; fronte, facie, jugulo pectoreque nigerrimis; abdomine albo; uropygio et supracaudalibus e fusco nigris; cauda dilute brunnea.

Das Ei ist mattweiß; 16 mm. lang, 11½ mm. breit.

Ovum: album, opacum.

Die spitzschwänzige Bronze-Amandine [Spermestes acuticauda].

Auch dieses Bronzemännchen ist dem gestreiften so ähnlich, daß man es kaum für eine besondere Art halten dürfte. Ich habe mehrere Exemplare neben jenem gehabt und könnte einen Unterschied allenfalls nur darin finden, daß das Weiß des Unterkörpers schmutzig braun und bei genauem Blick fein schuppenartig dunkelbraun gezeichnet erscheint, Kehle und Oberbrust sind sehr fein weiß gestrichelt. Hodgson beobachtete den Vogel in Tenassarim in großen Scharen immer auf dem Boden. Die Heimat erstreckt sich über den Osten Indiens, Japan, Südchina und die Inseln Formosa und Heinan. Obwol dies Bronzemännchen ein sehr weites Verbreitungsgebiet hat und dort sehr gemein ist und trotzdem es von den Japanesen schon seit vielen hundert Jahren in zahlreichen Varietäten gezüchtet wird, so ist es in der ursprünglichen Art im Handel bei uns doch keineswegs häufig. Im Laufe der Jahre habe ich nur einmal fünf Köpfe erlangen können; das gestreifte Bronzemännchen dagegen ist bei Hagenbeck und Jamrach alljährlich zu haben. Eine Brut vom Spitzschwänzchen konnte ich nicht erzielen, während doch gerade seine Geschichte, wie ich weiterhin mittheilen werde, dasselbe bereits vollständig als Hausthier eingebürgert betrachten läßt.

Das spitzschwänzige Bronzemännchen oder die spitzschwänzige Bronze-Amandine ist auch Spitzschwanzmunie benannt worden.

Le Domino (Bekemans und die französischen Händler); Sharptailed-Finch (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London). In den übrigen Preisverzeichnissen nicht vorhanden. — Sharptailed-Munia (Hodgson); Petap Penang (Malaien nach Blyth).

Nomenclatur: Spermestes acuticauda, *Hgds.*; Munia acuticauda [leuconota, molucca], *Hdgs.*; Amadina acuticauda, *Blyth*; Uroloncha molucca, *Cab.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb dunkelbraun, kaum bemerkbar heller

gestrichelt; Flügelränder fahl bräunlichgelb; Kopf, Kehle und Kropf schwarzbraun, Kehle bis zur Oberbrust mit weißen Schaftstrichen; unterhalb weiß, schuppen- oder bogenartig dunkelbraun quergebändert. Das Weibchen ist nicht verschieden.

Spermestes acuticauda: Supra fusca, vix dilutius lineolata; marginibus alar. luride ochraceis; capite, gula juguloque nigro-fuscis; scapis plumarum a gula usque ad pectus albidis; subtus alba, squamatim sive arcuatim usco-fasciata. ♀ haud distincta.

Die japanesischen Mövchen. In gleicher Weise, wie S. 141 vom Reisvogel angegeben, hat man in Japan auch vom Bronzemännchen durch Züchtung, die schon vorhin erwähnten Spielarten erzeugt, welche dem ursprünglichen Vogel gar nicht mehr gleichen. Bekemans brachte im Jahre 1871 kleine weiß- und braunbunte Prachtfinken in den Handel, welche Herr Professor Dr. Cabanis sogleich als eine gleichsam künstlich erzogene Varietät einer Art der Gattung Lanzenschwänzchen bestimmte. Diese Japanesischen Mövchen, wie ich sie benannt, fanden bei uns in Deutschland bereitwillige Aufnahme und wurden bald in überaus großer Anzahl, zunächst in der braunbunten, dann in einer schneeweißen und schließlich auch in einer gelbbunten Spielart eingeführt.

Die Japanesen, welche solche Spielereien bekanntlich lieben und ebenso wie in der Zwergbaum- und Blumenzucht und künstlichen Fischzucht, auch in der Geflügel- und Schmuckvögelzucht erstaunlicher Leistungen sich erfreuen, haben gerade in der letzteren die überraschendsten Erfolge aufzuweisen.

Herr Reyer in Triest berichtet über dieselben folgendes: „Man soll nicht glauben, daß die Reisvögel und Bronzemännchen, gleicherweise wie der Kanarienvogel in Europa, eines Zeitraums von 300 Jahren bedurften, um solche durchgreifenden Veränderungen zu erleiden. Zwar wird dort, wie alle Kultur überhaupt, so auch die Vogelzucht, wol gewiß seit Jahrtausenden sich herschreiben, aber nicht das Alter der Züchtung, sondern vielmehr die Art und Weise derselben ist es, welche die Veränderung hervorbringt. Der japanesische Züchter vermag vom rohen Wildling in wenigen Generationen die vollkommen schneeweiße Kulturrasse zu erzielen. Das Verfahren dieser Züchtung besteht darin, die Vögel durch die reichlichste Verpflegung zur Brut zu bringen und die letztere unter den günstigsten Verhältnissen zur üppigsten Entfaltung, bei welcher sodann gar keine besondere Zuchtwahl nothwendig ist, indem die Vögelchen ganz von selber in der mannigfaltigsten Weise ausarten."

Es machte mir ganz besonderes Vergnügen, diese japanesische Zucht nun in meiner Vogelstube fortzusetzen, und ich habe dabei folgende Ergebnisse gewonnen. Ich hatte eine große Anzahl dieser Vögel von allen drei Färbungen angeschafft, und zunächst zeigte es sich, daß die reinweißen ungemein zart und ein echtes Erzeugniß der künstlichen Züchtung sind. Die meisten können das freie Fliegen in der Vogelstube nicht ertragen. Nur wenige erhalten sich frisch und munter am Leben, während die Mehrzahl nicht die Kraft und Gewandtheit besitzt, sich tapfer durchzuschlagen; sie verunglücken im Badewasser, fallen irgendwo hinter ein Bauer u. drgl. oder bleiben im dichten Gebüsch hängen und kommen elend um. Im Käfige dagegen sind sie sehr ausdauernd und nisten auch leicht und ergiebig. Als eine durch menschliche — leider nur zu wenig naturgemäße — Pflege hervorgerufene Kulturrasse erscheinen sie aber zugleich darin, daß sie zahlreichen Krankheiten ausgesetzt sind und unter ungünstigen Verhältnissen namentlich leicht erblinden. Die gelbbunte Varietät ist etwas kräftiger und die braunbunte steht in dieser Hinsicht bereits dem ursprünglichen Vogel sehr nahe. Alle drei Varietäten arten aber leicht aus und ihre Nachkommenschaft wechselt daher fortwährend in dem äußern Aussehen. Die braunbunten, welche ich zuerst züchtete, ergaben mehrfach ganze Bruten oder doch einzelne Junge reinweiß. Sodann zogen die reinweißen mitunter auch ein gelbbuntes oder braunbuntes Junges auf, und in einem Nest der gelbbunten wurden einmal Junge flügge, welche gelb- und braunbunt zugleich gescheckt waren. Nicht selten fielen auch Rückschläge; so befand sich in einem Nest der reinweißen ein Junges, welches sich von einem wildgefangenen

Bronzemännchen nur durch eine weiße Kehle unterschied. Auch Bastarde kommen vielfach vor. In einer Brut der braunbunten Mövchen war ein junger Vogel ganz einfarbig chokoladenbraun, und bei aufmerksamer Beobachtung bemerkte ich sodann, daß eine sehr kräftige schwarzköpfige Nonne mit den alten gemeinsam die Brut fütterte. Das seltsame junge Vögelchen starb leider unmittelbar nach dem Ausfliegen und ging im Gebüsch verloren.

Das weiße Japanesische Mövchen (Spermestes acuticauda, *varietas* alba; Tafel V, Vogel 25) ist eine liebliche Erscheinung, von rein- und zartweißem Gefieder mit röthlichweißem Schnabel, dunkelbraunen Augen und rosenrothen Füßen. — Das gelbbunte Japanesische Mövchen (S. acuticauda, *var.* flavo-maculata) stimmt mit dem vorigen überein, nur ist das weiße Federkleid mit unregelmäßigen kaninchengelben Flecken gezeichnet. — Das braunbunte Japanesische Mövchen (S. acuticauda, *var.* griseo-maculata) ist wiederum dem letztern gleich, aber braun gescheckt, wobei an den braunen Federn die helleren Rippen deutlich hervortreten und die ursprüngliche Abstammung erkennen lassen.

Bekemans nannte die Mövchen anfangs Muscades blanches et panachés (übrigens war der Irrthum viel verbreitet, daß diese wunderliche Varietät vom Muskatvogel gezüchtet sei); späterhin wurden sie von Bekemans und den französischen Händlern auch als Bengalis blancs et panachés bezeichnet. Bei Jamrach hießen sie von vornherein white, yellow or nanking and grey Bengalies; von den deutschen Händlern werden sie als graubunte, oder auch schwarzbunte, gelbbunte und schneeweiße Bengalisten und neuerdings ganz allgemein als dergleichen Japanesische Mövchen ausgeboten.

Die Silberschnabel-Amandine [Spermestes cantans].

Tafel VI. Vogel 26.

Mit einem Fasan hat das allbekannte sog. Silberfasänchen keine Aehnlichkeit. Seine Benennung ist daher jedenfalls aus der französischen Bec d'argent, Silberbeckchen, d. i. Silberschnäbelchen, entstanden. Linné hieß diesen Vogel: den singenden. Doch verdient er diese Bezeichnung weniger eines etwaigen vorzüglichen Gesanges, als der Eigenschaft wegen, daß er in eifrigster Weise sein Liedchen leise und zwitschernd, ununterbrochen, gleichsam wie ein rinnendes Bächlein, ertönen läßt. Ebenso anspruchslos erscheint auch die Färbung des Gefieders. Die ganze Oberseite ist hell leberbraun, dunkel gestrichelt und gewellt, Flügelschwingen, Schwanz und Bürzel sind schwärzlich und die ganze Unterseite ist düster weiß; der Schnabel ist hell bleigrau — also etwa silberfarben.

Dieser Prachtfink ist erst seit dem Jahre 1776 bekannt, von Pierre Brown beschrieben und abgebildet. Ueber sein Freileben berichtet von Heuglin: Ich sah ihn parweise und in kleinen Flügen, die sich nach der Regenzeit immer mehr zusammenrotteten. Für die zwischen 3—5 Eier enthaltende Brut

werden häufig verlassene Webervogelnester benutzt und nach Bedürfniß ziemlich dicht mit Federn, Haaren und Wolle ausgefüttert. Die Nistzeit fällt in die Monate August bis Oktober; Vierthaler entdeckte aber auch ein Nest im Januar. Es scheint ein echter Tropenvogel zu sein, der wol nicht über 5—6000 Fuß hoch steigt und nicht wandert. Er lebt am Ufer von Gewässern, auf Inseln, um Maisfelder, Baumwollpflanzungen und Gehöfte und selbst an Wasserbrunnen, aber nirgends gerade in auffallender Anzahl. Selten treiben sich diese Lanzenschwänzchen auf der Erde herum, mehr in Hecken, Gebüsch und auf kahlen Birnbäumen. Die Verbreitung erstreckt sich sehr weit über das nordöstliche und Mittelafrika.

Vieillot schildert la Loxie grise in folgendem: Weniger empfindlich gegen Witterungseinflüsse als andere Tropenvögel, genügt unsere Sommerwärme dazu, daß sie sich fortpflanzt, und wenn sie gegen Winterkälte geschützt ist, neun bis zehn Jahre am Leben bleibt. Diese Vögel sind so verträglich, daß nicht selten vier bis fünf Pärchen in einem Nest beisammen brüten und die Jungen erziehen; man findet dann bis achtzehn Eier in demselben. Aber es ist besser, daß man die Pärchen gesondert hält, da in den Gesellschaften doch wol Mißhelligkeiten vorkommen, die größeren Jungen die kleineren erdrücken oder die stärkeren den schwächeren die Nahrung vor den Schnäbeln fortschnappen. Es ist fraglich, ob diese Lebensweise in der Gefangenschaft der in der Freiheit gleicht oder ob dort die einzelnen Pärchen sich trennen. Ich habe beobachtet, daß, je geräumiger der Käfig, desto geringer die Zahl derjenigen war, welche gemeinschaftlich nisteten; aber in der kalten Jahreszeit vereinigten sie sich stets alle während der Nacht und auch fast immer bei Tage. Ich habe drei Bruten hintereinander von ihnen flügge werden gesehen und die letzte erforderte nicht größere Sorgfalt, als die anderer Finken.

Inbetreff der Zucht giebt dieser Forscher sodann Rathschläge, die aber zu besorgt sind, da dies Vögelchen zu denen gehört, welche namentlich freifliegend in der Vogelstube ohne alle weiteren Umstände und auch meistens mit gutem Erfolg nisten.

Zuerst hat Dr. Karl Bolle das Silberfasänchen gezüchtet und eingehend geschildert: „Die Vögelchen lieben es parweise oder zu mehreren dicht an einander geschmiegt auf einem Aste zu sitzen und die ganze Gesellschaft ist wahrhaft unzertrennlich. Von einander abgesondert rufen sie mit ängstlich zirpenden, zuletzt scharf und ungeduldig klingenden Tönen. Ihre kurzen Flügel gestatten ihnen in der Heimat wol keinen weiten oder besonders hohen Flug; dafür schlüpfen sie mit der Behendigkeit einer Maus durch das Gezweig. Am Boden hüpfen sie mit schief nach oben gerichteten Schwänzen umher. Einer Höhlung bedürfen sie zu jeder Zeit, auch wenn sie nicht nisten, zur Nachtruhe. Das Männchen ist

allein der Baumeister des Nestes; niemals habe ich gesehen, daß das Weibchen auch nur einen Halm herzutrug; es begnügt sich damit, ruhig im Neste oder vor demselben sitzend, die Huldigungen des thätigen Gatten entgegen zu nehmen. Diese Eigenthümlichkeit stellt diese und einige nahverwandte Amandinen auf die höchste Stufe unter den finkenartigen Vögeln; denn nirgends tritt das Gefühl der elterlichen Liebe so stark und fürsorglich bei dem Geschlechte auf, welches es sonst mit den ehelichen Pflichten leichter zu nehmen pflegt. Ist die Nisthöhlung weit, so wird sie mit einem fabelhaften Wust angefüllt. Alles ist dem Vogel dazu recht, Heu, Moos, Baumwolle, Zwirn, Papierstückchen, ja selbst frisches Grün, wie Vogelmiere u. dgl. In einem geräumigen Nistkasten oder einem Harzer Bauerchen, auch wol ganz frei im Gebüsch, wird ein überwölbtes Nest gebaut; eine enge Höhle wird nur mit möglichst weichen Stoffen ausgepolstert. Bei jedem lauten Geräusch streichen die Vögel vom Nest, um bald vorsichtig zurückzukehren. Die Jungen sind anfangs fast ganz kahl und sehr häßlich, schwärzlichroth, mit gelben Wachshautwärzchen. In den ersten sechs bis neun Tagen entwickeln sie sich langsam, nachher um so schneller. Sie bleiben lange nackt, nehmen allmälig eine bläuliche Färbung an und man möchte sie dann eher für kleine ekelhafte Amphibien, als für Vögel ansehen. Ameisenpuppen werden zur Fütterung ganz verschmäht und ebenso Grünkraut. Man kann daher diesen Prachtfink, nebst seinen nächsten Verwandten, zu den ausschließlichen Körnerfressern zählen, welche nicht einmal ihre Jungen mit Fleischnahrung ätzen. Brutdauer 11 Tage. Am 21. Tage verlassen die Jungen das Nest und 25 Tage alt fressen sie selber. Alljährlich folgen bis fünf Bruten hintereinander.

Das Jugendkleid ist dem der Alten fast völlig gleich, nur erscheint es fahler und verwaschener, weil die Wellenlinien der Rücken- und Flügelfedern noch gar nicht zu bemerken sind; das Schnäbelchen ist glänzend bläulichschwarz. Die Verfärbung beginnt bereits in der zweiten Woche durch Hervortreten der Wellenzeichnung und Hellerwerden des Schnabels. Mit fünf Wochen ist der junge Vogel ausgefärbt. Dr. Bolle zog auch vom Silber- und dem nächstverwandten Malabar-Fasänchen Mischlinge, und solche wurden dann auch in meiner Vogelstube flügge.

Das Silberfasänchen gehört zu den verträglichsten und ausdauerndsten Bewohnern der Vogelstube und des Gesellschaftskäfigs. Sein komisches Singen, bewegliches, anmuthiges und sanftes Wesen, so wie auch sein hübsches Aussehen, besonders aber sein leichtes und dankbares Nisten haben es auch in neuerer Zeit sehr beliebt gemacht; zugleich zählt es zu denen, welche seit alters her bis jetzt regelmäßig in überaus großer Anzahl eingeführt werden und beständig in allen Vogelhandlungen zu haben sind. Die Geschlechter sind schwierig zu erkennen, und selbst das ist ein trügerisches Zeichen, daß die Männchen

eine gelbere Kehle und Vorderbruſt haben; für einen ſcharfen Blick erſcheint der Schnabel des Männchens viel dunkler bleigrau, während der des Weibchens heller ſilbergrau iſt; ein ſicheres Merkmal ergiebt aber nur das erwähnte, ziemlich laute Singen des Männchens. Der Preis beträgt im Kleinhandel 7,5—9 Mark für das Pärchen und im Großhandel zu 100 Paar ſind ſie für 2, 3½—5 Francs verkäuflich.

Die Silberſchnabel-Amandine oder das Silberfaſänchen, auch Silberbeckchen oder Silberſchnäbelchen genannt, heißt ſonſt noch blos Silberſchnabel, Lanzenſchwänzchen, und afrikaniſcher Sänger-Weberfink (Rchb.).

Le Bec d'argent (Vekemans und die franzöſiſchen Händler); African Silverbill (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Zilverbekje (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia cantans, *Gml., Lth., Bchst., Rpp.*; Coccothraustes cantans, *Vll., Hgl.*; Amadina cantans, *Gray, Strckl., Bp. Hgl., Jrd., Hrtl., Hrtm., Antn., Bll., Vrth.*; Uroloncha cantans, *Cab., Hgl., Kng., Wrth.*; Euodice cantans, *Rchb.*; Spermestes cantans, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb hellbraun, Ober- und Hinterkopf mit verwaſchenen dunklen Längsflecken; Mantel, Schultern und Bürzel mit undeutlichen, ſchmalen, dunkelbraunen Querlinien; Kopf- und Halsſeiten gelblichbraun; Schwingen dunkelbraun, an der Innenfahne roſtiſabell gerandet; Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung, hinterer Bürzel und Oberſchwanzdecken ſchwärzlichbraun; Kinn und Oberkehle gelblichbraun, übrige Unterſeite weiß, auf dem Kropfe, an den Seiten und untere Flügeldecken ſchwach roſtbräunlich; Schwanz dunkel ſchwärzlichbraun. Schnabel bläulichſilberweiß; Auge braun, Füße bleifarben. Weibchen S. 157. Jugendkleid ſ. oben.

Spermestes cantans. Supra pallide brunnea, obsolete fasciolata; subtus albida; mento et gula brunneo-rufescentibus; uropygio caudaque cum tectricibus superioribus nigricantibus; rectricibus tenuiter rufescente-limbatis, mediis longioribus, acutis; colli et pectoris lateribus pallide rufescentibus; rostro argenteo; iride fusca; pedibus plumbeis.

Länge 11,8 cm. (4½ Z.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), der zugeſpitzte Schwanz 3,8 cm. (1½ Z.).

Juvenis: adultae fere concolor, nisi luridior et obsoletior, lineolis undulatis dorsi alarumque adhuc nullis; rostro nitido subcoeruleo-nigris.

Beſchreibung des Eies: Stumpf, eigeſtaltig, gelblich durchſcheinend; Länge 15 mm., Breite 11,2 mm.

Ovum: flavido-pellucens obtuso ovatum.

Die Malabar-Amandine [Spermestes malabarica].

Tafel VI. Vogel 27.

Die meiſten Liebhaber verwechſeln das Malabar-Faſänchen mit dem Silberfaſänchen und doch läßt dieſes ſich auf den erſten Blick erkennen. Es iſt oberhalb hell chokoladenbraun, am Oberkopf dunkler braun, Schwingen und Schwanz ſind ſchwärzlich, letzterer mit purpurnem Schimmer, der Bürzel iſt weiß; unterhalb, von der Kehle bis zum Hinterleib, iſt es bräunlichweiß, an den Seiten mit zarten chamois Mondfleckchen gezeichnet. Schnabel bläulichgrau; Auge braun; Füße bläulichfleiſchfarben. Das Weibchen iſt nicht verſchieden. Die Heimat erſtreckt ſich über ganz Indien und Ceylon.

In der Lebensweiſe und dem ganzen Weſen, ſowie auch im Geſange gleicht

dieſer Vogel ſeinem afrikaniſchen Verwandten, und ebenſo iſt das nur etwas rauhere und kürzere Schnurren des Indiers kaum zu unterſcheiden, wenn man ihn nicht ſieht. Der Lockruf erſchallt ziemlich laut cheet cheet (ſchiht). Auch die Brutentwickelung iſt übereinſtimmend. Das Jugendkleid iſt faſt einfarbig ſehr dunkel bräunlichgrau, unterhalb kaum merklich heller; Schnäbelchen glänzend ſchwarz. Dieſe beiden Amandinen ſind ſo nahe verwandt, daß ſie in der Vogelſtube immer zuſammenleben und niſten. Dr. Bolle hatte ſchon Miſchlinge gezogen, und in meiner Vogelſtube wurden ſolche ebenfalls flügge, trotzdem beide Geſchlechter von dieſer, wie von jener Art vorhanden waren. Das Jugendkleid eines ſolchen Baſtards iſt oberhalb chokoladenbraun mit ſchwärzlich geſchupptem Oberkopf; unterhalb gelblichgraubraun; der Bürzel iſt roſenroth; Schnabel bleigrau; Füße hell fleiſchfarben. Nach der Verfärbung ſind die Jungen kaum von dem alten Malabar-Faſänchen verſchieden, allenfalls etwas lichter und gelblicher gefärbt; aber der Bürzel iſt ſchwarz und weiß geſcheckt, indem jede ſchwarze Feder eine weiße, zuweilen auch roſenrothe Spitze hat.

Ueber das Freileben der Malabar-Amandine haben die Reiſenden ziemlich ausführliche Nachrichten gegeben. Das Neſt iſt rund mit einer ſeitlichen Oeffnung, aus zarten Gräſerfaſern und Blütenriſpen von Seidengras manchmal ſehr zierlich gewebt und mit Federn oder weichen Riſpen ausgefüttert; nicht ſelten iſt es aber auch grob und unordentlich, kaum gerundet. Sykes fand es in dem Gabelzweige einer Mimoſe und Theobald in einem dornigen Buſch dicht am Wege, unverſteckt; nach dem erſteren bewohnen ſie auch häufig die verlaſſenen Neſter der Webervögel. Die Angaben der Beobachter ſchwanken zwiſchen 6, 10 bis 25 Eier in jedem Gelege; im letztern Falle hatten aber mehrere Weibchen zuſammen ein Neſt bezogen. Burgeß meint, daß ſie jährlich zwei Bruten machen, weil er ſolche im März und November gefunden und Theobald auch noch im Oktober und Dezember. Dies ſtimmt mit dem Verhalten in der Vogelſtube überein, denn die meiſten Prachtfinken niſten hier entweder vom September bis Dezember oder vom März bis zum Juli, oft auch zu den beiden Zeiten.

Nach Hamilton's Mittheilung wird dies Vögelchen in Kalkutta häufig gezähmt und parweiſe im Käfige gehalten. Man bringt das Pärchen hinaus, befeſtigt den einen an einer Schnur und läßt den andern fliegen; dieſer kehrt jedoch ſtets zurück und ſetzt ſich zu ſeinem Gefährten.

Obwol der Vogel in Indien nirgends ſelten und in Bengalen recht häufig iſt, kommt er doch nur wenig herüber, und wenn die Händler ihn kennen, hat er einen Preis von 10,5 bis 12 Mark.

Das Malabar-Faſänchen oder die Malabar-Amandine wird auch Bleiſchnäbelchen und Malabarfink genannt.

Le Bec de plomb (Vekemans und die franzöſiſchen Händler); Indian Silverbill (Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); in den niederländiſchen

Liſten nicht vorhanden. Piduri (Bengalen); Sar Munia (Bengalen); Chorga (Hindus); Churchura (Indien).

Nomenclatur: Loxia malabarica, *L.*; Munia malabarica, *Blth.*, *Bp.*, *Thbld.* Amadina malabarica, *Jrd.* et *Slb.*, *Blth.*, *Gray*, *Hrtl.*; Enodice malabarica, *Rchb.*; Loxia bicolor, *Tick*; Lonchura Cheet, *Lyk.*; Spermestes Cheet, *Jrd.*, *Brg.* Malabar Grosbeak, *Lth.*, *Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: ſ. eingangs.

Spermestes malabarica: Supra brunnea, pileo obscuriore; remigibus caudaque nigricantibus, hac pulchre purpureo-micante; uropygio albo; gastraeo genisque subfusco-albis; lunulis hypochendriorum tenuibus gilvis; rostro subcoeruleo-cinero; iride fusca; pedibus coerulescente carneis. ♀ concolor. — Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1¼ Z.).

Jugendkleid: ſ. S. 159.

Juvenis: fere unicolor fusco-nigricans; subtus vix dilutior; rostro nigro, nitido.

Beſchreibung des Eies: Eiförmig mit ſtumpfer Spitze, kalkweiß, faſt glanzlos; Länge 15 mm., Breite 12 mm.

Ovum: cretaceum, subopacum, ovatum apice obtuso.

Die Muskat-Amandine [Spermestes punctularia].

Tafel VI. Vogel 28.

Der Muskatvogel gehört zu den häufigſten Prachtfinken des Handels und zugleich zu denen, welche ſeit altersher eingeführt worden. Schon ſeit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts iſt er bekannt und wurde von Klein als chineſiſcher oder roſtbrauner Sperling beſchrieben und dann von Albin im Jahre 1834 zuerſt abgebildet. Edwards hieß ihn Gowry-, or Coury-Bird, weil er nach den Angaben des Schatzmeiſters der oſtindiſchen Compagnie für die kleine Gowry genannte Schnecke gekauft werden konnte. Briſſon ſtellt ihn als Gros-bec tacheté de Java fehlerhaft dar und auch Buffon und Vieillot geben ſchlechte Abbildungen. Der letztere hatte den Domino und Gros-bec épervin nicht gezüchtet und behauptet irrthümlich, daß das Weibchen unterſeits ungefleckt weiß ſei, während die Geſchlechter durchaus nicht verſchieden gefärbt ſind.

Es ſind vier Arten oder wol nur Lokalraſſen, welche ich unter der Geſammtbezeichnung Muskatvogel zuſammenfaſſen darf. Sie ſtimmen in der Größe, nahezu auch in der Färbung und vollſtändig in der Lebensweiſe überein. Um ſie unterſcheiden zu können, laſſe ich zunächſt die Beſchreibung folgen.

Der gepunktete Muskatvogel [S. punctularia] iſt oberhalb röthlichbraun, Stirn, Kopfſeiten, Kinn und Kehle ſind dunkelbraun, Wangen, Flügeldeck- und Schwungfedern verwaſchen dunkler gewellt; Bürzel dunkel aſchgraubraun, roſtgelblich quergebändert, Schwanz ſchwärzlichgraubraun; unterhalb weiß, dunkelbraun geſchuppt, Unterbauch, Hinterleib und untere Flügeldecken einfarbig ſchmutzig weiß. Schnabel bläulichſchwarz, Unterſchnabel heller; Auge braun; Fuß horngrau. Das Weiben iſt gleichgefärbt. Seine Verbreitung erſtreckt ſich über Java, Malakka, Flores, Lombok und Timor; auf Mauritius iſt er verwildert. — Der gewellte Muskatvogel [S. undulata] iſt mit dem vorigen faſt völlig gleich, nur

oberhalb etwas fahler braun, sehr fein, aber deutlich heller gestrichelt, der Bürzel erscheint schwach grünlichgelb überhaucht und ebenso sind die äußeren Schwanzfedern gesäumt. Der Schnabel ist ganz dunkel horngrau. Er ist in ganz Indien, besonders aber im Osten und Norden, sowie auf Ceylon heimisch. — Der gelbschwänzige Muskatvogel [S. topela; diese Bezeichnung ist einem vaterländischen Namen des Vogels entlehnt] ist oberhalb und an der Kehle etwas dunkler, fast chokoladenbraun und auf dem ganzen Mantel fein und kaum bemerkbar weißlich gestrichelt; die Oberschwanzdecken und der Schwanz sind fahl grünlichgelb. Als seine Heimat ist Südchina nebst den Inseln Formosa und Heinan bekannt. — Der rothbraune Muskatvogel [S. fuscans] ist einfarbig dunkel chokoladenbraun, Oberkopf fein heller gestrichelt, an Stirn, Gesicht, Kehle und Brust, sowie Oberschwanz schwärzlichbraun; die ganze untere Seite ist einfarbig braun. Schnabel bräunlichschwarz, Unterschnabel mit gelblicher Spitze und Wurzel; Fuß bräunlichgrau. Man hat ihn bisher nur auf der Insel Borneo entdeckt. — Die gleiche Größe aller vier ist beträchtlicher, die Gestalt gedrungener als die des Silberfasänchens; erstere übertrifft ein wenig die des einheimischen Zeisigs.

Für die Liebhaberei ist die Scheidung des Muskatvogels in jene vier Arten überflüssig, zumal auch die Lebensweise, soviel oder so wenig dieselbe nämlich erkundet worden, durchaus nicht von einander abweichend sich zeigt. Dieser niedliche, fein gezeichnete Prachtfink, sagt Bernstein von dem auf Java lebenden, ist hier merklich seltener, als die ihm nahverwandten Nonnen und ich habe daher keine reichen Beobachtungen über sein Freileben sammeln können. Die Nahrung besteht in den Samen von mancherlei Pflanzen, vorzugsweise von Gräsern; reife Reiskörner sind für ihn zu hart und daher gehen die Gefangenen, welche man wie die Reisvögel damit zu erhalten hofft, sehr bald zugrunde, es sei denn, daß man den Reis in Wasser eingeweicht oder halb gekocht hätte. Das Nest habe ich mehrmals gefunden. Es stand immer in ansehnlicher Höhe über dem Boden, zwischen den die Stämme der Arengpalmen bedeckenden Schmarotzergewächsen, einmal sogar in der Fruchttraube einer solchen Palme. Es hat eine mehr oder weniger rundliche Gestalt mit weitem, schief nach einer Seite gerichteten Eingange. Zur Herstellung des nicht sehr festen, besonders von außen ziemlich lockern Baues werden ausschließlich Halme, Rispen und Blätter verschiedener Gräser benutzt. Das Gelege bilden 4—6 weiße Eier. Auch berichten Jerdon, Pearson und Hodgson über das Freileben und deren kurze Angaben gehen dahin, daß dasselbe mit dem der Malabar-Amandine übereinstimmt.

Des hübschen Gefieders wegen wird der Muskatvogel überall, namentlich von Anfängern in der Liebhaberei, häufig gekauft und er ist in den Vogelhandlungen fast immer zu haben. Er ist in jeder Gesellschaft harmlos und friedlich; auch läßt er einen kleinen Sang erschallen, welcher banchrednerisch erklingt und bei dem javanischen Vogel mit einem lautern Akkord schließt. Dennoch wird man seiner gewöhnlich bald überdrüssig, weil er ein stilles, nichts weniger als anmuthiges Wesen hat. Obwol er kräftig, ausdauernd und nicht scheu ist, gehört er in der Gefangenschaft zu denen, die am schwierigsten zu züchten sind. Während die meisten Pärchen jahrelang in der Vogelstube oder

in einem Käfige leben, ohne zu niſten, kommt ein ſolches dann doch wol einmal dazu, ein Neſt zu erbauen und allenfalls auch Eier zu legen, allein flügge Junge ſind höchſt ſelten.

In meiner Vogelſtube errichteten javaniſche Muskatvögel theils frei in dem Gebüſche, theils in einem geräumigen Käſtchen oder auf der Decke eines hoch an der oberen Wand hängenden Drahtbauers mehrere Neſter, welche von außen wie ein wirrer Haufen von allerlei grobem Geniſt ausſahen, innen jedoch mit Federn und Baumwolle ſorgfältig ausgepolſtert waren. Der Brutverlauf gleicht dem des Silberfaſänchens. Ich habe im Laufe der Jahre nur zweimal Junge erzielt, von denen jedoch nur eins am Leben geblieben. Das Jugendkleid iſt einfarbig fahl graubraun; Schnabel, Auge und Füße ſind ſchwarz. Man kauft das Paar für 7,5 bis 10,5 Mark.

Unter den Hunderten von Muskatvögeln, welche alljährlich von Bordeaux, Antwerpen, London und Hamburg aus in den Handel gebracht werden, habe ich ſtets nur zwei Raſſen einigermaßen ſicher unterſcheiden können, und zwar den gepunkteten und den gewellten, deren Kennzeichen ſchon von Horsfield am zutreffendſten dahin feſtgeſtellt worden, daß der letztere am Schwanz und an den oberen Schwanzdecken dunkel braunroth, der erſtere dagegen weißlich- oder gelblichgrau iſt. Die beiden anderen konnte ich niemals finden. Die Muskatvögel, welche ſich längere Zeit bei den Händlern befinden, werden ebenſo wie bekanntlich manche anderen Vögel ſchwarz, dagegen faſt gleichmäßig dunkelbraun gefärbt, und dieſe gleichen vollſtändig der rothbraunen Muskat-Amandine von Borneo. Sollte es daher nicht wahrſcheinlich ſein, daß die letzteren, nur unterwegs auf der Ueberfahrt im Käfige ſchwarz geworden, in ihrer Heimat aber mit den übrigen übereinſtimmen? In der Literatur ſind darüber keine ſicheren Angaben vorhanden.

Die Muskat-Amandine oder der Muskatvogel, auch Domino (Topela, Röthelmunie) genannt, heißt nach Bernſtein auf Java Peking; Tela-Munia (Hindoſtan), Simbaz (Maſuri), Sing-baz or Sheene-baz (Hindoſtan), Shubz Munia (Bengalen.)

Le Domino (Bekemans und Pariſer Händler); Nutmeg-bird (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Muskaatvogel (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia punctularia, *L.*; Munia punctularia, *Blth.*; Fringilla punctularia, *Hay*, *Blth.*, *Gray*; Uroloncha punctularia, *Cab.* — Loxia undulata, *Lth.*; Munia [Amadina] undulata, *Blth.*, *Gray*; Amadina punctularia, *Pears.*, *Blth.*, *Strckl.*; Lonchura nisoria, *Syk.*; Spermestes nisoria, *Jrd.*; Munia lineiventris, *Hodgs.* — Munia topela, *Swinhoë.* — Munia fuscans, *Cass.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben.

Spermestes punctularia: Supra ferrugineo-fusca; fronte, facie, mento gulaque obscure fuscis; genis, remigibus et alar. tectricibus elute obscurius

Chrom: Lith: Th. Fischer Cassel.

werden häufig verlassene Webervogelnester benutzt und nach Bedürfniß ziemlich dicht mit Federn, Haaren und Wolle ausgefüttert. Die Nistzeit fällt in die Monate August bis Oktober; Vierthaler entdeckte aber auch ein Nest im Januar. Es scheint ein echter Tropenvogel zu sein, der wol nicht über 5—6000 Fuß hoch steigt und nicht wandert. Er lebt am Ufer von Gewässern, auf Inseln, um Maisfelder, Baumwollpflanzungen und Gehöfte und selbst an Wasserbrunnen, aber nirgends gerade in auffallender Anzahl. Selten treiben sich diese Lanzenschwänzchen auf der Erde herum, mehr in Hecken, Gebüsch und auf kahlen Birnbäumen. Die Verbreitung erstreckt sich sehr weit über das nordöstliche und Mittelafrika.

Vieillot schildert la Loxie grise in folgendem: Weniger empfindlich gegen Witterungseinflüsse als andere Tropenvögel, genügt unsere Sommerwärme dazu, daß sie sich fortpflanzt, und wenn sie gegen Winterkälte geschützt ist, neun bis zehn Jahre am Leben bleibt. Diese Vögel sind so verträglich, daß nicht selten vier bis fünf Pärchen in einem Nest beisammen brüten und die Jungen erziehen; man findet dann bis achtzehn Eier in demselben. Aber es ist besser, daß man die Pärchen gesondert hält, da in den Gesellschaften doch wol Mißhelligkeiten vorkommen, die größeren Jungen die kleineren erdrücken oder die stärkeren den schwächeren die Nahrung vor den Schnäbeln fortschnappen. Es ist fraglich, ob diese Lebensweise in der Gefangenschaft der in der Freiheit gleicht oder ob dort die einzelnen Pärchen sich trennen. Ich habe beobachtet, daß, je geräumiger der Käfig, desto geringer die Zahl derjenigen war, welche gemeinschaftlich nisteten; aber in der kalten Jahreszeit vereinigten sie sich stets alle während der Nacht und auch fast immer bei Tage. Ich habe drei Bruten hintereinander von ihnen flügge werden gesehen und die letzte erforderte nicht größere Sorgfalt, als die anderer Finken.

Inbetreff der Zucht giebt dieser Forscher sodann Rathschläge, die aber zu besorgt sind, da dies Vögelchen zu denen gehört, welche namentlich freifliegend in der Vogelstube ohne alle weiteren Umstände und auch meistens mit gutem Erfolg nisten.

Zuerst hat Dr. Karl Bolle das Silberfasänchen gezüchtet und eingehend geschildert: „Die Vögelchen lieben es parweise oder zu mehreren dicht an einander geschmiegt auf einem Aste zu sitzen und die ganze Gesellschaft ist wahrhaft unzertrennlich. Von einander abgesondert rufen sie mit ängstlich zirpenden, zuletzt scharf und ungeduldig klingenden Tönen. Ihre kurzen Flügel gestatten ihnen in der Heimat wol keinen weiten oder besonders hohen Flug; dafür schlüpfen sie mit der Behendigkeit einer Maus durch das Gezweig. Am Boden hüpfen sie mit schief nach oben gerichteten Schwänzen umher. Einer Höhlung bedürfen sie zu jeder Zeit, auch wenn sie nicht nisten, zur Nachtruhe. Das Männchen ist

allein der Baumeister des Nestes; niemals habe ich gesehen, daß das Weibchen auch nur einen Halm herzutrug; es begnügt sich damit, ruhig im Neste oder vor demselben sitzend, die Huldigungen des thätigen Gatten entgegen zu nehmen. Diese Eigenthümlichkeit stellt diese und einige nahverwandte Amandinen auf die höchste Stufe unter den finkenartigen Vögeln; denn nirgends tritt das Gefühl der elterlichen Liebe so stark und fürsorglich bei dem Geschlechte auf, welches es sonst mit den ehelichen Pflichten leichter zu nehmen pflegt. Ist die Nisthöhlung weit, so wird sie mit einem fabelhaften Wust angefüllt. Alles ist dem Vogel dazu recht, Heu, Moos, Baumwolle, Zwirn, Papierstückchen, ja selbst frisches Grün, wie Vogelmiere u. dgl. In einem geräumigen Nistkasten oder einem Harzer Bauerchen, auch wol ganz frei im Gebüsch, wird ein überwölbtes Nest gebaut; eine enge Höhle wird nur mit möglichst weichen Stoffen ausgepolstert. Bei jedem lauten Geräusch streichen die Vögel vom Nest, um bald vorsichtig zurückzukehren. Die Jungen sind anfangs fast ganz kahl und sehr häßlich, schwärzlichroth, mit gelben Wachshautwärzchen. In den ersten sechs bis neun Tagen entwickeln sie sich langsam, nachher um so schneller. Sie bleiben lange nackt, nehmen allmälig eine bläuliche Färbung an und man möchte sie dann eher für kleine ekelhafte Amphibien, als für Vögel ansehen. Ameisenpuppen werden zur Fütterung ganz verschmäht und ebenso Grünkraut. Man kann daher diesen Prachtfink, nebst seinen nächsten Verwandten, zu den ausschließlichen Körnerfressern zählen, welche nicht einmal ihre Jungen mit Fleischnahrung ätzen. Brutdauer 11 Tage. Am 21. Tage verlassen die Jungen das Nest und 25 Tage alt fressen sie selber. Alljährlich folgen bis fünf Bruten hintereinander.

Das Jugendkleid ist dem der Alten fast völlig gleich, nur erscheint es fahler und verwaschener, weil die Wellenlinien der Rücken- und Flügelfedern noch gar nicht zu bemerken sind; das Schnäbelchen ist glänzend bläulichschwarz. Die Verfärbung beginnt bereits in der zweiten Woche durch Hervortreten der Wellenzeichnung und Hellerwerden des Schnabels. Mit fünf Wochen ist der junge Vogel ausgefärbt. Dr. Bolle zog auch vom Silber- und dem nächstverwandten Malabar-Fasänchen Mischlinge, und solche wurden dann auch in meiner Vogelstube flügge.

Das Silberfasänchen gehört zu den verträglichsten und ausdauerndsten Bewohnern der Vogelstube und des Gesellschaftskäfigs. Sein komisches Singen, bewegliches, anmuthiges und sanftes Wesen, so wie auch sein hübsches Aussehen, besonders aber sein leichtes und dankbares Nisten haben es auch in neuerer Zeit sehr beliebt gemacht; zugleich zählt es zu denen, welche seit alters her bis jetzt regelmäßig in überaus großer Anzahl eingeführt werden und beständig in allen Vogelhandlungen zu haben sind. Die Geschlechter sind schwierig zu erkennen, und selbst das ist ein trügerisches Zeichen, daß die Männchen

eine gelbere Kehle und Vorderbruſt haben; für einen ſcharfen Blick erſcheint der Schnabel des Männchens viel dunkler bleigrau, während der des Weibchens heller ſilbergrau iſt; ein ſicheres Merkmal ergiebt aber nur das erwähnte, ziemlich laute Singen des Männchens. Der Preis beträgt im Kleinhandel 7,5—9 Mark für das Pärchen und im Großhandel zu 100 Paar ſind ſie für 2, $3^1/_2$—5 Francs verkäuflich.

Die Silberſchnabel-Amandine oder das Silberfaſänchen, auch Silberbeckchen oder Silberſchnäbelchen genannt, heißt ſonſt noch blos Silberſchnabel, Lanzenſchwänzchen, und afrikaniſcher Sänger-Weberfink (Rchb.).

Le-Bec d'argent (Vekemans und die franzöſiſchen Händler); African Silverbill (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Zilverbekje (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia cantans, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*, *Rpp.*; Coccothraustes cantans, *Vll.*, *Hgl.*; Amadina cantans, *Gray*, *Strckl.*, *Bp. Hgl.*, *Jrd.*, *Hrtl.*, *Hrtm.*, *Antn.*, *Bll.*, *Vrth.*; Uroloncha cantans, *Cab.*, *Hgl.*, *Kng.*, *Wrth.*; Euodice cantans, *Rchb.*; Spermestes cantans, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb hellbraun, Ober- und Hinterkopf mit verwaſchenen dunklen Längsflecken; Mantel, Schultern und Bürzel mit undeutlichen, ſchmalen, dunkelbraunen Querlinien; Kopf- und Halsſeiten gelblichbraun; Schwingen dunkelbraun, an der Innenfahne roſtiſabell gerandet; Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung, hinterer Bürzel und Oberſchwanzdecken ſchwärzlichbraun; Kinn und Oberkehle gelblichbraun, übrige Unterſeite weiß, auf dem Kropfe, an den Seiten und untere Flügeldecken ſchwach roſtbräunlich; Schwanz dunkel ſchwärzlichbraun. Schnabel bläulichſilberweiß; Auge braun, Füße bleifarben. Weibchen S. 157. Jugendkleid ſ. oben.

Spermestes cantans. Supra pallide brunnea, obsolete fasciolata; subtus albida; mento et gula brunneo-rufescentibus; uropygio caudaque cum tectricibus superioribus nigricantibus; rectricibus tenuiter rufescente-limbatis, mediis longioribus, acutis; colli et pectoris lateribus pallide rufescentibus; rostro argenteo; iride fusca; pedibus plumbeis.

Länge $11,8^{\text{cm.}}$ ($4^1/_2$ Z.), Flügel $5,2^{\text{cm.}}$ (2 Z.), der zugeſpitzte Schwanz $3,8^{\text{cm.}}$ ($1^1/_2$ Z.).

Juvenis: adultae fere concolor, nisi luridior et obsoletior, lineolis undulatis dorsi alarumque adhuc nullis; rostro nitido subcoeruleo-nigris.

Beſchreibung des Eies: Stumpf, eigeſtaltig, gelblich durchſcheinend; Länge 15 mm., Breite $11,2^{\text{mm.}}$

Ovum: flavido-pellucens obtuso ovatum.

Die Malabar-Amandine [Spermestes malabarica].

Tafel VI. Vogel 27.

Die meiſten Liebhaber verwechſeln das Malabar-Faſänchen mit dem Silberfaſänchen und doch läßt dieſes ſich auf den erſten Blick erkennen. Es iſt oberhalb hell chokoladenbraun, am Oberkopf dunkler braun, Schwingen und Schwanz ſind ſchwärzlich, letzterer mit purpurnem Schimmer, der Bürzel iſt weiß; unterhalb, von der Kehle bis zum Hinterleib, iſt es bräunlichweiß, an den Seiten mit zarten chamois Mondfleckchen gezeichnet. Schnabel bläulichgrau; Auge braun; Füße bläulichfleiſchfarben. Das Weibchen iſt nicht verſchieden. Die Heimat erſtreckt ſich über ganz Indien und Ceylon.

In der Lebensweiſe und dem ganzen Weſen, ſowie auch im Geſange gleicht

dieſer Vogel ſeinem afrikaniſchen Verwandten, und ebenſo iſt das nur etwas rauhere und kürzere Schnurren des Indiers kaum zu unterſcheiden, wenn man ihn nicht ſieht. Der Lockruf erſchallt ziemlich laut cheet cheet (ſchiht). Auch die Brutentwickelung iſt übereinſtimmend. Das Jugendkleid iſt faſt einfarbig ſehr dunkel bräunlichgrau, unterhalb kaum merklich heller; Schnäbelchen glänzend ſchwarz. Dieſe beiden Amandinen ſind ſo nahe verwandt, daß ſie in der Vogelſtube immer zuſammenleben und niſten. Dr. Bolle hatte ſchon Miſchlinge gezogen, und in meiner Vogelſtube wurden ſolche ebenfalls flügge, trotzdem beide Geſchlechter von dieſer, wie von jener Art vorhanden waren. Das Jugendkleid eines ſolchen Baſtards iſt oberhalb chokoladenbraun mit ſchwärzlich geſchupptem Oberkopf; unterhalb gelblichgraubraun; der Bürzel iſt roſenroth; Schnabel bleigrau; Füße hell fleiſchfarben. Nach der Verfärbung ſind die Jungen kaum von dem alten Malabar-Faſänchen verſchieden, allenfalls etwas lichter und gelblicher gefärbt; aber der Bürzel iſt ſchwarz und weiß geſcheckt, indem jede ſchwarze Feder eine weiße, zuweilen auch roſenrothe Spitze hat.

Ueber das Freileben der Malabar-Amandine haben die Reiſenden ziemlich ausführliche Nachrichten gegeben. Das Neſt iſt rund mit einer ſeitlichen Oeffnung, aus zarten Gräſerfaſern und Blütenriſpen von Seidengras manchmal ſehr zierlich gewebt und mit Federn oder weichen Riſpen ausgefüttert; nicht ſelten iſt es aber auch grob und unordentlich, kaum gerundet. Sykes fand es in dem Gabelzweige einer Mimoſe und Theobald in einem dornigen Buſch dicht am Wege, unverſteckt; nach dem erſteren bewohnen ſie auch häufig die verlaſſenen Neſter der Webervögel. Die Angaben der Beobachter ſchwanken zwiſchen 6, 10 bis 25 Eier in jedem Gelege; im letztern Falle hatten aber mehrere Weibchen zuſammen ein Neſt bezogen. Burgeß meint, daß ſie jährlich zwei Bruten machen, weil er ſolche im März und November gefunden und Theobald auch noch im Oktober und Dezember. Dies ſtimmt mit dem Verhalten in der Vogelſtube überein, denn die meiſten Prachtfinken niſten hier entweder vom September bis Dezember oder vom März bis zum Juli, oft auch zu den beiden Zeiten.

Nach Hamilton's Mittheilung wird dies Vögelchen in Kalkutta häufig gezähmt und parweiſe im Käfige gehalten. Man bringt das Pärchen hinaus, befeſtigt den einen an einer Schnur und läßt den andern fliegen; dieſer kehrt jedoch ſtets zurück und ſetzt ſich zu ſeinem Gefährten.

Obwol der Vogel in Indien nirgends ſelten und in Bengalen recht häufig iſt, kommt er doch nur wenig herüber, und wenn die Händler ihn kennen, hat er einen Preis von 10,5 bis 12 Mark.

Das Malabar-Faſänchen oder die Malabar-Amandine wird auch Bleiſchnäbelchen und Malabarfink genannt.

Le Bec de plomb (Vekemans und die franzöſiſchen Händler); Indian Silverbill (Jamrach u. Brzn. d. zool. Grt. v. London); in den niederländiſchen

Liſten nicht vorhanden. Piduri (Bengalen); Sar Munia (Bengalen); Chorga (Hindus); Churchura (Indien).

Nomenclatur: Loxia malabarica, *L.*; Munia malabarica, *Blth., Bp., Thbld.* Amadina malabarica, *Jrd.* et *Slb., Blth., Gray, Hrtl.*; Euodice malabarica, *Rchb.*; Loxia bicolor, *Tick;* Lonchura Cheet, *Lyk.*; Spermestes Cheet, *Jrd., Brg.* Malabar Grosbeak, *Lth., Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: ſ. eingangs.

Spermestes malabarica: Supra brunnea, pileo obscuriore; remigibus caudaque nigricantibus, hac pulchre purpureo-micante; uropygio albo; gastraeo genisque subfusco-albis; lunulis hypochendriorum tenuibus gilvis; rostro subcoeruleo-cinero; iride fusca; pedibus coerulescente carneis. ♀ concolor. — Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1¼ Z.).

Jugendkleid: ſ. S. 159.

Juvenis: fere unicolor fusco-nigricans; subtus vix dilutior; rostro nigro, nitido.

Beſchreibung des Eies: Eiförmig mit ſtumpfer Spitze, kalkweiß, faſt glanzlos; Länge 15 mm., Breite 12 mm.

Ovum: cretaceum, subopacum, ovatum apice obtuso.

Die Muskat-Amandine [Spermestes punctularia].

Tafel VI. Vogel 28.

Der Muskatvogel gehört zu den häufigſten Prachtfinken des Handels und zugleich zu denen, welche ſeit altersher eingeführt worden. Schon ſeit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts iſt er bekannt und wurde von Klein als chineſiſcher oder roſtbrauner Sperling beſchrieben und dann von Albin im Jahre 1834 zuerſt abgebildet. Edwards hieß ihn Gowry-, or Coury-Bird, weil er nach den Angaben des Schatzmeiſters der oſtindiſchen Compagnie für die kleine Gowry genannte Schnecke gekauft werden konnte. Briſſon ſtellt ihn als Gros-bec tacheté de Java fehlerhaft dar und auch Buffon und Vieillot geben ſchlechte Abbildungen. Der letztere hatte den Domino und Gros-bec épervin nicht gezüchtet und behauptet irrthümlich, daß das Weibchen unterſeits ungefleckt weiß ſei, während die Geſchlechter durchaus nicht verſchieden gefärbt ſind.

Es ſind vier Arten oder wol nur Lokalraſſen, welche ich unter der Geſammtbezeichnung Muskatvogel zuſammenfaſſen darf. Sie ſtimmen in der Größe, nahezu auch in der Färbung und vollſtändig in der Lebensweiſe überein. Um ſie unterſcheiden zu können, laſſe ich zunächſt die Beſchreibung folgen.

Der gepunktete Muskatvogel [S. punctularia] iſt oberhalb röthlichbraun, Stirn, Kopfſeiten, Kinn und Kehle ſind dunkelbraun, Wangen, Flügeldeck- und Schwungfedern verwaſchen dunkler gewellt; Bürzel dunkel aſchgraubraun, roſtgelblich quergebändert, Schwanz ſchwärzlichgraubraun; unterhalb weiß, dunkelbraun geſchuppt, Unterbauch, Hinterleib und untere Flügeldecken einfarbig ſchmutzig weiß. Schnabel bläulichſchwarz, Unterſchnabel heller; Auge braun; Fuß horngrau. Das Weiben iſt gleichgefärbt. Seine Verbreitung erſtreckt ſich über Java, Malakka, Flores, Lombok und Timor; auf Mauritius iſt er verwildert. — Der gewellte Muskatvogel [S. undulata] iſt mit dem vorigen faſt völlig gleich, nur

oberhalb etwas fahler braun, sehr fein, aber deutlich heller gestrichelt, der Bürzel erscheint schwach grünlichgelb überhaucht und ebenso sind die äußeren Schwanzfedern gesäumt. Der Schnabel ist ganz dunkel horngrau. Er ist in ganz Indien, besonders aber im Osten und Norden, sowie auf Ceylon heimisch. — Der gelbschwänzige Muskatvogel [S. topela; diese Bezeichnung ist einem vaterländischen Namen des Vogels entlehnt] ist oberhalb und an der Kehle etwas dunkler, fast chokoladenbraun und auf dem ganzen Mantel fein und kaum bemerkbar weißlich gestrichelt; die Oberschwanzdecken und der Schwanz sind fahl grünlichgelb. Als seine Heimat ist Südchina nebst den Inseln Formosa und Heinan bekannt. — Der rothbraune Muskatvogel [S. fuscans] ist einfarbig dunkel chokoladenbraun, Oberkopf fein heller gestrichelt, an Stirn, Gesicht, Kehle und Brust, sowie Oberschwanz schwärzlichbraun; die ganze untere Seite ist einfarbig braun. Schnabel bräunlichschwarz, Unterschnabel mit gelblicher Spitze und Wurzel; Fuß bräunlichgrau. Man hat ihn bisher nur auf der Insel Borneo entdeckt. — Die gleiche Größe aller vier ist beträchtlicher, die Gestalt gedrungener als die des Silberfasänchens; erstere übertrifft ein wenig die des einheimischen Zeisigs.

Für die Liebhaberei ist die Scheidung des Muskatvogels in jene vier Arten überflüssig, zumal auch die Lebensweise, soviel oder so wenig dieselbe nämlich erkundet worden, durchaus nicht von einander abweichend sich zeigt. Dieser niedliche, fein gezeichnete Prachtfink, sagt Bernstein von dem auf Java lebenden, ist hier merklich seltener, als die ihm nahverwandten Nonnen und ich habe daher keine reichen Beobachtungen über sein Freileben sammeln können. Die Nahrung besteht in den Samen von mancherlei Pflanzen, vorzugsweise von Gräsern; reife Reiskörner sind für ihn zu hart und daher gehen die Gefangenen, welche man wie die Reisvögel damit zu erhalten hofft, sehr bald zugrunde, es sei denn, daß man den Reis in Wasser eingeweicht oder halb gekocht hätte. Das Nest habe ich mehrmals gefunden. Es stand immer in ansehnlicher Höhe über dem Boden, zwischen den die Stämme der Arengpalmen bedeckenden Schmarotzergewächsen, einmal sogar in der Fruchttraube einer solchen Palme. Es hat eine mehr oder weniger rundliche Gestalt mit weitem, schief nach einer Seite gerichteten Eingange. Zur Herstellung des nicht sehr festen, besonders von außen ziemlich lockern Baues werden ausschließlich Halme, Rispen und Blätter verschiedener Gräser benutzt. Das Gelege bilden 4—6 weiße Eier. Auch berichten Jerdon, Pearson und Hodgson über das Freileben und deren kurze Angaben gehen dahin, daß dasselbe mit dem der Malabar-Amandine übereinstimmt.

Des hübschen Gefieders wegen wird der Muskatvogel überall, namentlich von Anfängern in der Liebhaberei, häufig gekauft und er ist in den Vogelhandlungen fast immer zu haben. Er ist in jeder Gesellschaft harmlos und friedlich; auch läßt er einen kleinen Sang erschallen, welcher bauchrednerisch erklingt und bei dem javanischen Vogel mit einem lautern Akkord schließt. Dennoch wird man seiner gewöhnlich bald überdrüssig, weil er ein stilles, nichts weniger als anmuthiges Wesen hat. Obwol er kräftig, ausdauernd und nicht scheu ist, gehört er in der Gefangenschaft zu denen, die am schwierigsten zu züchten sind. Während die meisten Pärchen jahrelang in der Vogelstube oder

in einem Käfige leben, ohne zu niſten, kommt ein ſolches dann doch wol einmal dazu, ein Neſt zu erbauen und allenfalls auch Eier zu legen, allein flügge Junge ſind höchſt ſelten.

In meiner Vogelſtube errichteten javaniſche Muskatvögel theils frei in dem Gebüſche, theils in einem geräumigen Käſtchen oder auf der Decke eines hoch an der oberen Wand hängenden Drahtbauers mehrere Neſter, welche von außen wie ein wirrer Haufen von allerlei grobem Geniſt ausſahen, innen jedoch mit Federn und Baumwolle ſorgfältig ausgepolſtert waren. Der Brutverlauf gleicht dem des Silberfaſänchens. Ich habe im Laufe der Jahre nur zweimal Junge erzielt, von denen jedoch nur eins am Leben geblieben. Das Jugendkleid iſt einfarbig fahl graubraun; Schnabel, Auge und Füße ſind ſchwarz. Man kauft das Paar für 7,5 bis 10,5 Mark.

Unter den Hunderten von Muskatvögeln, welche alljährlich von Bordeaux, Antwerpen, London und Hamburg aus in den Handel gebracht werden, habe ich ſtets nur zwei Raſſen einigermaßen ſicher unterſcheiden können, und zwar den gepunkteten und den gewellten, deren Kennzeichen ſchon von Horsfield am zutreffendſten dahin feſtgeſtellt worden, daß der letztere am Schwanz und an den oberen Schwanzdecken dunkel braunroth, der erſtere dagegen weißlich- oder gelblichgrau iſt. Die beiden anderen konnte ich niemals finden. Die Muskatvögel, welche ſich längere Zeit bei den Händlern befinden, werden ebenſo wie bekanntlich manche anderen Vögel ſchwarz, dagegen faſt gleichmäßig dunkelbraun gefärbt, und dieſe gleichen vollſtändig der rothbraunen Muskat-Amandine von Borneo. Sollte es daher nicht wahrſcheinlich ſein, daß die letzteren, nur unterwegs auf der Ueberfahrt im Käfige ſchwarz geworden, in ihrer Heimat aber mit den übrigen übereinſtimmen? In der Literatur ſind darüber keine ſicheren Angaben vorhanden.

Die Muskat-Amandine oder der Muskatvogel, auch Domino (Topela, Röthelmunie) genannt, heißt nach Bernſtein auf Java Peking; Tela-Munia (Hindoſtan), Simbaz (Maſuri), Sing-baz or Sheene-baz (Hindoſtan), Shubz Munia (Bengalen.)

Le Domino (Bekemans und Pariſer Händler); Nutmeg-bird (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Muskaatvogel (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia punctularia, *L.*; Munia punctularia, *Blth.*; Fringilla punctularia, *Hay*, *Blth.*, *Gray*; Uroloncha punctularia, *Cab.* — Loxia undulata, *Lth.*; Munia [Amadina] undulata, *Blth.*, *Gray*; Amadina punctularia, *Pears.*, *Blth.*, *Strckl.*; Lonchura nisoria, *Syk.*; Spermestes nisoria, *Jrd.*; Munia lineiventris, *Hodgs.* — Munia topela, *Swinhoë.* — Munia fuscans, *Cass.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben.

Spermestes punctularia: Supra ferrugineo-fusca; fronte, facie, mento gulaque obscure fuscis; genis, remigibus et alar. tectricibus elute obscurius

Chrom. Lith. Th. Fischer Cassel.

undulatis; uropygio cinereo-fusco, subferrugineo fasciolato; cauda nigricante fusca, subtus albida, fusco-squamulata; abdomine crisso et tectricibus subalaribus unicoloribus, sordide albis; rostro subcoeruleo-nigro; mandibula dilutius; iride fusca; pedibus corneis. ♀ fere concolor. Länge 12 cm. (4 7/12 Z.); Flügel 5,2 cm. (2 Z.); Schwanz 3,3 cm. (1 1/4 Z.)

Jugendkleid s. S. 162.

Juvenis: unicolor, luride cinereo-fusca; rostro, iride pedibusque nigris.

Beschreibung des Eies: Reinweiß, länglichrund; Länge 1 mm., Breite 11 mm.

Ovum: albissimum, oblongum.

* * *

Nonnen [Dermophrys, *Hodgson;* Maia, *Reichenbach*] werden von den Händlern einige zusammengehörende Prachtfinken genannt, welche sämmtlich als sonderbare Vögel erscheinen, mit starken Schnäbeln und Krallen, mit theils schönem, theils seltsamem Gefieder und von stillem, gleichsam geheimnißvollem Wesen. Bis vor kurzem waren die meisten von ihnen ziemlich selten im Handel, jetzt sind sie gemein. Ihre Gestalt und Größe ist nahezu die der Muskatamandine. Als Stubenvögel zeichnen sie sich weder durch Gesang noch besondere Anmuth aus, auch lassen sie sich von allen Prachtfinken am schwierigsten züchten, und daher verdienen sie keineswegs, daß die Liebhaberei sich vorzugsweise mit ihnen beschäftige.

Die weißköpfige Nonnen-Amandine [Spermestes Maja].*)

Unter allen kleinen fremdländischen Vögeln dünkt namentlich dem beginnenden Liebhaber der Prachtfink, welchen die Händler weißköpfige Nonne nennen, sehr wunderlich. Dies liegt jedoch weniger in seinem Benehmen, als vielmehr in seinem Aussehen. Sein ganzer Körper, mit Ausnahme des Kopfes und Halses, ist einfarbig angenehm braun. Kopf und Hals aber sind reinweiß oder doch wenigstens grau- oder bräunlichweiß. Dieses eigenthümliche Aussehen zeigen Männchen und Weibchen im Alter in nahezu gleicher Weise, und je älter sie sind, desto reiner wird das Weiß des Kopfes.

Die weißköpfige Nonne wurde im Jahre 1752 durch Osbeck's Reise bekannt. Vieillot sagt über Le Majan nur wenig, so daß man voraussetzen kann, er habe sie noch nicht selber beobachtet. Reichenbach fügt folgendes hinzu: „In neuerer Zeit wurden diese Vögel oft aus Ost- und Südindien, insbesondere aus Sumatra und Borneo zu uns gebracht. Sie sind durch ihre Sanftmuth und hübschen Anstand mehr, als durch ihren schwachen Gesang beliebt. Ich erhielt kürzlich aus Sumatra vier Pärchen mit ihren Nestern und Eiern und ein fünftes Nest befand sich schon in der Thienemann'schen Sammlung. Die großen, melonenförmig zwischen Schilfgräsern erbauten Nester haben ein länglichrundes Flugloch von 5 cm. Querdurchmesser. Sie sind

*) Bei den Indiern die weibliche Hälfte der großen Urgottheit, war Maja in der griechischen Götterlehre die Tochter des Atlas und die Mutter des Merkur. Welchen Zusammenhang der Naturforscher (Linné) aber zwischen diesen Bedeutungen und dem harmlosen Vögelchen gefunden, ist wol schwer zu erklären.

aus hirsenartigen Gräsern sehr unordentlich und locker zusammengeflochten, außen mit vielen schmalen und breiten Grasblättern umwunden und inwendig wieder mit dem überaus feinen seidenhaarigen Königszuckergras dick ausgefüttert und durchwebt. Die zwei bis drei Eier sind mattweiß. In dem einen Neste ist das Flugloch etwas hoch angebracht und der Vogel hat hier von dem Unterrande der Oeffnungen fast 12 cm. (4 Zoll) tief, wo die Eier liegen, gesessen." — Näheres über das Freileben ist noch nicht veröffentlicht, doch wird dasselbe im allgemeinen mit dem aller verwandten Dickschnäbel und im besondern mit dem der nächstfolgenden eingehend geschilderten Art übereinstimmen.

Die in meiner Vogelstube befindlichen Pärchen bewohnten ein sehr dichtes Gebüsch über dem Ofen, huschten bei jedem Geräusch sogleich in ihre Schlupfwinkel, waren oft tagelang gar nicht zu sehen und nur an ihren einsilbigen flötenden Locktönen zu bemerken. Dabei zeigten sie sich jedoch keineswegs stürmisch wild. Allmälig belauschte ich, daß sie eifrig, jedoch immer nur zeitweise Genist in das Rohr- und Grasdickicht auf dem Ofen trugen. Dies geschah auch so heimlich, daß es stets unterblieb, wenn ich oder ein Anderer in der Vogelstube anwesend war, und ich konnte es nur beobachten, wenn ich geraume Zeit hindurch mich dort ganz regungslos verhielt. In dieser Zeit besuchte mich Alexander von Homeyer, dessen geübter Blick aus dem Benehmen der Vögel sogleich erkannte, daß sie dort oben nisteten. Einige Tage später sah ich nach und fand in der That ein Nest, welches, in dem Röhricht stehend, aus groben Niststoffen unordentlich zusammengeschichtet war. Die Grundlage war aus dicken Grashalmen, Papierstreifen, Moos u. drgl. zusammengetragen und darauf von etwas handlicheren Halmen ein sehr geräumiges Gewölbe mit ungeschicktem, weit offenen Flugloch, welches fast von oben nach unten führte, errichtet und innen fast nur mit Baumwollflöckchen ausgefüttert. Das Gelege bestand in drei Eiern. Brutdauer 12 Tage. Die Jungen verließen erst am 25. und 26. Tage das Nest. Schon mit dem Anfang der Brut begannen die alten Nonnen eingequellte Sämereien und Ameisenpuppen mit Eigelb zu fressen und hiermit fütterten sie auch vornehmlich die Jungen heran.

Das Jugendkleid ist oberhalb fahlbraun, unterhalb matt bräunlichweiß, Schnäbelchen glänzendschwarz. Diese Jungen waren so unbeholfen, daß sie fast acht Tage hindurch, nachdem sie aus dem Neste geschlüpft, regungslos auf der Erde in den düstersten Winkeln und im dichten Gebüsche zerstreut saßen. Dann aber fingen sie an, schnell und geschickt zu fliegen.

Die Verfärbung tritt erst nach vollen vier Monaten ein, in der Weise, daß einzelne Federn auf der Brust und am Halse in das schöne, glänzende Braun übergehen, während der hintere Theil des Körpers allmälig dunkelt und nach und nach braunschwarz wird. Sehr wunderlich erscheinen die jungen, weiß

und braun gescheckten Vögel inmitten des Farbenwechsels. Ob trotz der zahlreichen Versuche auch anderwärts noch eine Brut zur Entwickelung gelangt ist, weiß ich nicht anzugeben. Herr Linden hat eine solche in seinem Vogelhause zwar flügge werden gesehen, leider jedoch nichts darüber mitgetheilt.

Das Liebesspiel des Männchens ist ein besonders komisches. Beide Vögel sitzen eine geraume Zeit hindurch still nebeneinander auf einem Ast und lassen nur hin und wieder den kurzen, pfeifenden Lockton erschallen. Dann erhebt sich das Männchen schwerfällig, streckt den Kopf schief in die Höhe, breitet das kurze Schwänzchen aus und beginnt einen äußerst eifrigen Gesang, bei dem man Kehle und Schnabel in emsigster Bewegung sieht, der aber nicht wie beim Bandfink von auf- und niederhüpfendem Tänzeln, sondern nur von einem leisen, gleichsam automatischen Hin- und Herbewegen des Kopfes begleitet wird. Vergeblich strengte ich mich aber an, diesen Gesang zu hören. Um ihn kennen zu lernen, stellte ich ein Pärchen in einem Käfig eine geraume Zeit hindurch auf meinen Schreibtisch und beobachtete es anhaltend. Da diese Vögel nichts weniger als munter sind, so könnten sie trotz ihrer absonderlich hübschen Färbung doch jedenfalls als äußerst langweilig gelten, allein jetzt stimmt das Männchen seinen Gesang an, welcher ihm zweifellos unser Interesse gewinnen muß. Es setzt sich jetzt auf den Fußboden, erhebt wie würdevoll den Kopf und singt im größten Eifer. Man sieht den Schnabel in der lebhaftesten Bewegung, nicht minder die Muskeln der Kehle, doch so aufmerksam man immerhin lauscht, es ist durchaus kein Laut zu vernehmen. Dieser sonderbare, inwendige Gesang währt etwa Minute, dann schließt er mit einem melodischen, ziemlich lauten Tilit!

Obwol die weißköpfige Nonne nicht zu den seltensten Vögeln gehört, so ist sie in den Vogelhandlungen doch immer nur in wenigen Pärchen vorhanden. Sie wird am meisten mit anderen ostindischen Vögeln zusammen von Hagenbeck in Hamburg eingeführt. Der Preis beträgt zwischen $7_{,5}$ bis 12 Mark für das Pärchen und im Großhandel aus erster Hand 3 bis 6 Schillinge.

Die weißköpfige Nonnen-Amandine oder weißköpfige Nonne heißt auch Maja, weißköpfige Maja, Nonne, Nonnenvogel, Nonnenfink, Nonnen-Weberfink (Rchb.).

La Nonnette à tête blanche (Vekemans); Capucin à tête blanche, Mahian à tête blanche (französische Händler); White-headed Finch (Jamrach); Maja Finch (Vrzn. des zool. Grt. v. London); Nonnetje (holländisch). Bondol (Java); Pipit (Sumatra); Petap Whobun (Malaien).

Nomenclatur: Loxia Maja, *L., Lth., Vieill.*; Munia Maja, *Blth., Bp.*; Amandina Maja, *Gray, Blth., Rchb.*; Fringilla Maja, *Hrsf.*; Dermophrys Maja, *Cab.* [Maia sinensis, *Brss.*; Loxia leucocephala, *Rffll.*]. Malacca Grosbeak, *Edw.*; the white-headed Grosbeak, *Lth.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf weiß, abwärts nach der Kehle und dem Nacken zunehmend bräunlich überlaufen; Ober- und Unterkörper lebhaft kaſtanienbraun; Bauch, Hinterleib und Unterſchwanzdecken ſchwarzbraun; Unterflügel röthlichbraun. Schnabel hell blaugrau; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen iſt an Stirn und Wangen nicht ſo reinweiß; ſicher iſt das Männchen aber nur an dem Liebesſpiel zu erkennen. Länge 10,5 cm. (4 Z.), Breite 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1¼ Z.).

Spermestes Maja: Capite albo, cleorsum gulam cervicemque paulatim subfuscius imbuto; notaeo et gastraeo laete badiis; abdomine, crisso et infracaudalibus nigro-fuscis; subalaribus ferrugineo-fuscis; rostro subcoeruleocano; iride fusca; jondibus plumbeis. ♀ fronte genisque sordide albis.

Jugendkleid S. 164.

Juvenis: supra luride-fusca, subtus fuscante albida; rostro nigro, nitido.

Beſchreibung des Eies: Reinweiß, Geſtalt länglich, Länge 14 mm., Breite 10 mm.

Ovum: albissimum, longiusculum.

Die ſchwarzbrüſtige Nonnen-Amandine [Spermestes ferruginosa].

Tafel VI. Vogel 29.

Die weißköpfige Nonne mit ſchwarzer Kehle unterſcheidet ſich von der vorigen im weſentlichen nur dadurch, daß ſie von der Kehle bis zum Hinterleib tief ſchwarz gefärbt iſt.

Die Heimat beſchränkt ſich auf Java und Flores; ob ſie auch auf Borneo vorkommt, iſt noch nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt. Ueber das Freileben berichtet Bernſtein: „Dieſer Vogel iſt in den bebauten Gegenden Javas eine ſehr gewöhnliche Erſcheinung. Die Geſchlechter ſind nicht verſchieden, allenfalls zeigt das alte Männchen etwas kräftigere Färbung. Während die Reisfelder beſtellt und unter Waſſer geſetzt ſind, bewohnt die Nonne kleine Feldhölzer, Gebüſche und Hecken längs der Wege zwiſchen Feldern und Wieſen, zumal aber die aus Alangalang und kurzem Gebüſch gebildeten Wildniſſe. Sobald der Reis zu reifen beginnt, fällt ſie in großen Scharen auf die Felder ein und richtet merklichen Schaden an. Kleiner und in ihren Bewegungen gewandter als der Reisvogel, iſt ſie in der Gefangenſchaft ebenſo kräftig und ausdauernd, auch verträglich gegen andere Vögel. Sie wird daher hier auch häufig als Stubenvogel gehalten. Ihre Lockſtimme iſt ein helles wit, wit, wit! Einen Geſang habe ich nicht gehört, dagegen fand ich oft das Neſt. Daſſelbe ſteht immer niedrig, höchſtens einige handhoch über dem Boden, in einem kleinen Strauche oder im Graſe, von den Halmen geſtützt und getragen, niemals jedoch unmittelbar auf der Erde. Es hat eine rundliche Form mit ſeitlichem Einflugloch, ausſchließlich aus den Halmen und Riſpen wolltragender Gräſer hergeſtellt, iſt es von außen loſe, zerzauſt, auch aus gröberen Stoffen nebſt Alangblättern, innen dagegen ſorgfältiger geflochten und mit weicher Graswolle reich ausgepolſtert. Das Ge-

lege besteht aus vier, häufiger 6—7 Eiern. Im übrigen gleicht die Lebensweise dieser Nonne dem der bisher geschilderten Dickschnäbel."

Dr. Bolle zählt den Vogel in seinem Verzeichnisse bereits mit; Reichenbach hat ihn aber nicht lebend gesehen und den älteren Schriftstellern war er nicht bekannt. Ich erhielt das erste Pärchen im Jahre 1869, nachdem diese Nonne seit sehr langer Zeit im Handel gefehlt hatte. Damals betrug der Preis 24 bis 30 Mrk., seitdem wird sie häufiger eingeführt und man kauft sie für 9 bis 12 Mrk. Doch gehört sie immer noch zu den selteneren Vögeln. Bei mir hat sie nicht genistet, und ich glaube auch nicht, daß sie bis jetzt in der Gefangenschaft gezüchtet ist.

Die schwarzbrüstige Nonnen-Amandine, schwarzbrüstige Nonne oder weißköpfige Nonne mit schwarzer Kehle heißt auch schwarzbrüstige Maja.

La Nonnette à tête blanche et à poitrine noire (Vekemans und die französischen Händler); Javan Maja-Finch (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Zwartkeel-nonnetje (holländisch); Bondol (Sundanesen).

Nomenclatur: Loxia ferruginosa, *Sprrm.*; Fringilla majanoïdes, *Tmm.*; Munia ferruginea, *Bp., Brnst.*; Dermophrys ferruginea, *Cab.*; Munia ferruginosa, *Rchb.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb lebhaft kastanienbraun; Kopf weiß, nach dem Nacken hin zart rostbraun überhaucht; Kinn, Kehle, Brust bis zum Hinterleib tiefschwarz, nach den Seiten und hinterwärts in Braun übergehend. Schnabel hell blaugrau; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen hat einen weniger reinweißen Kopf, Kehle und Brust sind mehr bräunlichschwarz. Länge 10,5 cm. (4 Z. 7 L.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1¼ Z.).

Spermestes ferruginosa: Supra lacte badia capite albo, cervicem versus subtiliter ferrugineo afflato; gastraeo nigerrimo, hypochondria crissumque versus fuscescente; rostro dilute glauco; irride fusca; pedibus plumbeis. ♀ capite sordide albo; gula pectoreque fuscante nigris.

Das Jugendkleid ist nach Rchb. oberhalb erdbraun, unterhalb hell rostgelb. Es wird wol mit dem der vorigen übereinstimmen.

Juvenis: prioribus certe concolor, sec. Rchb. supra cinereo-fusca, subtus dilute ferruginea.

Beschreibung des Eies: Rein mattweiß, Gestalt länglich, Länge 15 mm., Breite 11 mm.

Ovum: opacum album, longiusculum.

Die schwarzköpfige Nonnen-Amandine [Spermestes sinensis].

Tafel VI. Vogel 30.

Die schwarzköpfige Nonne ist im Aeußern als ein Gegenstück, im Wesen aber als die nächste Verwandte der beiden vorhergehenden Amandinen zu betrachten. Ihre Färbung ist eben so schön und tief braun, an Kopf und Hals aber reinschwarz. Die Größe ist kaum merkbar beträchtlicher.

Die Heimat ist fast ganz Ostindien, Ceylon und Sumatra. Am häufigsten sieht man sie im Süden, wo sie wie ihre Verwandten an den Flußufern,

im Hochgrase und in Zuckerrohrfeldern lebt und sich nach der Brut in großen Schwärmen umhertreibt. Das Nest ist nach Hodgson groß und ballförmig, mit einer kleinen seitlichen Oeffnung und aus Gräsern und Fasern der langblätterigen Fichte gewebt. Die Eier sind zahlreich.

Der Vogel wurde von Edwards i. J. 1743 zuerst beschrieben. Vieillot sagt über den Mungul wenig; man solle ihn seiner Empfindlichkeit wegen im warmen Gewächshause halten. Dies ist jedoch nicht nöthig, da diese, wie alle Nonnenvögel überhaupt, sobald sie eingewöhnt, keineswegs weichlich sind.

Diese Nonne ist früher immer nur selten eingeführt worden. Dr. Bolle hatte sie bei der Aufstellung seines Verzeichnisses noch nicht gesehen. Ich konnte anfangs ebenfalls kein Pärchen bekommen, obwol die älteren Berliner Händler, wie Mieth und Schmidt, behaupten, daß sie dieselbe zuweilen genug erhalten haben. In Paris fand ich sie vielfach. Neuerdings hat sie Hagenbeck zeitweise in großer Zahl empfangen, sodaß sie jetzt fast immer in den Vogelhandlungen zu haben ist. In meiner Vogelstube wurden im Laufe der Zeit nur zwei Bruten von einem und zwei Jungen flügge und diese verschwanden so spurlos im Gebüsch, daß ich sie nicht mehr beschreiben konnte. Zum Nest war jedesmal die geräumige Brutstätte eines Diamantvogels benutzt und nur durch hineingeschleppte Grasrispen verengt worden. Das Männchen ist übrigens ein eifriger Sänger, der seinen eintönigen, langgezogenen, lauten Sang wol stundenlang erschallen läßt.

Die schwarzköpfige Nonnen-Amandine oder schwarzköpfige Nonne wird auch Mongole, Chinese und Chinesenfink genannt.

Le Mungul, Capucin à tête noire (Bekemans und die französischen Händler); Black-headed Finch (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Jacobijen (holländisch).

Nomenclatur: Coccothraustes sinensis, *Brss.*; Munia sinensis [et rubronigra], *Blth.*, *Hdgs.*, *Cat.*, *Rchb.*; Amadina sinensis, *Gray*; Loxia atricapilla, *Vieill.*; Lonchura melanocephala, *Mc. Clelland*; Spermestes melanocephalus, *Hdgs.*, *Blth.* — Chinese Sparrow, *Edw.*; Malacca Grosbeak, *Lth.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb lebhaft kastanienbraun, der ganze Kopf, Nacken und Oberbrust reinschwarz; Schwanz und Oberschwanzdecken kastanienbraun; unterhalb ebenfalls braun, Bauch und Hinterleib schwarz; Unterflügel fahlbraun. Schnabel hell blaugrau; Auge braun; Fuß bleigrau.

Spermestes sinensis: Supra saturate badia, capite toto, cervice pectoreque nigerrimis; cauda et supracaudalibus badiis, abdomine crissoque nigris; subalaribus luride fuscis; rostro subcoeruleo-cano; iride fusca; pedibus plumbeis. Länge 12 cm. (4 7/12 Z.), Flügel 5,2 cm. (2 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1 1/4 Z.).

Jugendkleid nicht bekannt.

Die dreifarbige Nonnen-Amandine [Spermestes malaccensis].

Tafel VI. Vogel 31.

Die dreifarbige Nonne oder schwarzköpfige Nonne mit weißem Bauch ist der schönste aller dieser Dickschnäbel. Sie gleicht der vorigen völlig, nur mit dem Unterschiede, daß sie unterhalb, von der Unterbrust bis zu den Bauchseiten nebst Unterflügeln, reinweiß, während der Bauch, untere Hinterleib nebst Unterschwanz reinschwarz sind. Schnabel, Augen und Füße, sowie die Größe sind ebenfalls übereinstimmend.

Die Verbreitung erstreckt sich über den Süden Indiens bis zum Westen, über Ceylon und Java. Das Freileben schildert wiederum Bernstein. Nicht weniger zahlreich als der Reisvogel und die schwarzbrüstige kommt auch die dreifarbige Nonne im westlichen Java überall in den bebauten, sowie in den mit Gras und kurzem Gestrüpp bewachsenen Gegenden vor. Im dichten Hochwalde dagegen wird man alle diese Vögel vergeblich suchen. Sie ist ein harmloses, liebes Vögelchen, das, die Fortpflanzungszeit ausgenommen, in kleinen Gesellschaften lebt. Da sie wenig scheu ist, kann man ganz nahe herankommen und ihr Thun und Treiben genau beobachten. Der Lockruf, welchen sie besonders beim Auffliegen hören läßt, klingt fein und sanft, pikt! oder auch piüht! und nach ihr ist der malayische Name gebildet. Das Nest wird in geringer Höhe angelegt, in den Zweigen eines Strauches, oft dicht an vielbetretenen Pfaden. Es ist mehr oder weniger rundlich mit seitlichem, von oben hinabführendem Flugloch, aus feinen Wurzeln, Halmen und Stengeln außen nur lose, innen fester gewebt. Das Gelege besteht in 4—7 Eiern.

Vieillot giebt über den Jacobin wenig an. Reichenbach sagt, daß diese Art schon seit langer Zeit lebend eingeführt worden und Dr. Bolle, der sie irrthümlich Bronzemännchen nennt, zählt sie ebenfalls mit. Im deutschen Vogelhandel hat sie lange gefehlt oder sie ist doch nur zeitweise vorhanden gewesen. Ich erhielt sie erst nach dem Erscheinen des „Handbuch für Vogelliebhaber" und seitdem hat sie Hagenbeck alljährlich in beträchtlicher Zahl in den Handel gebracht. Trotzdem ich aber beständig mehrere Pärchen in der Vogelstube habe, ist noch nicht ein einziges Mal eine Brut von ihnen begonnen.

Die dreifarbige Nonnen-Amandine, dreifarbige Nonne oder schwarzköpfige Nonne mit weißem Bauch wird auch Jakobin, Malakkafink, Malakkamunia und fälschlich auch Elstervogel oder Bronzemännchen (Rchb.) genannt.

Le Jacobin, Nonnette à tête noire, à ventre blanc et noir (Vekemans und die französischen Händler); Black-headed Finch (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Jakobijn (holländisch). Uebrigens wird sie in allen diesen Verzeichnissen mit der vorigen verwechselt. Burung prit (Malayen und Sundanesen, *Brnst.*); Nukl-nore (Hindostaner, *Jrd.*).

Nomenclatur: Loxia malacca, *L., Rffl., Lth., Vll.;* Munia malacca, *Blth., Bp.;* Spermestes malacca, *Jrd.;* Amadina malacca, *Blth., Gray;* Dermophrys malacca, *Cab.;* [Coccothraustes javensis, *Brss.;* Amadina sinensis *Blth.*]. — White-breasted Indian Sparrow, *Edw.;* Malacca Grosbeak, *Lth.;* Black-headed Finch, *Jrd.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung S. 169.

Spermestes malaccensis: Poriori concolor, nisi subtus a pectore usque ad hypochondria cum subalaribus albissima, abdomine et infracaudalibus nigerrimis; rostro, iride, pedibus corporisque magnitudine plane prioris. Länge 12 cm. ($4^7/_{12}$ Z.), Flügel $5{,}_2$ cm. (2 Z.), Schwanz $3{,}_5$ cm. ($1^1/_4$ Z.).

Das Jugendkleid iſt nicht bekannt.

Beſchreibung des Eies: Glänzend weiß; Länge 14—15 mm., Breite 10—11 mm.

Ovum: nitidum album.

Die Schilf-Amandine [Spermestes castanóthorax].

Tafel IV. Vogel 19.

Zu den indiſchen Dickſchnäbeln ſtellen die Forſcher als nahverwandt auch eine auſtraliſche Gattung, und die Beobachtung ergiebt in der That, daß die Schilffinken als Nonnen anzuſehen ſind. Die Heimat derſelben ſoll ſich über den Nordoſten Auſtraliens erſtrecken.

Der Schilffink iſt auf den erſten Blick ein hübſcher Vogel. Am Oberkopf und Nacken bräunlichgrau, dunkler geſtrichelt; die übrige Oberſeite röthlichbraun, Schultern etwas heller, Bürzel fahl gelblichbraun, Schwanzfedern dunkelbraun, gelb geſäumt; Wangen ſchwärzlichfein braun, hell geſtrichelt, Kehle bräunlichſchwarz; die Bruſt hebt ſich von der letzteren hell kaſtanienbraun ſcharf ab und wird von dem weißen Bauch durch einen ſchwarzen Gürtel getrennt, welcher ſich an beiden Bauchſeiten als zackige Einfaſſung fortſetzt, bis zum ebenfalls ſchwarzen Hinterleib und Unterſchwanz. Schnabel hell blaugrau; Auge braun; Füße graubraun. Das Weibchen iſt kaum zu unterſcheiden; das Bruſtſchild iſt matter gelblichbraun und der ſchwarze Gürtel unterhalb deſſelben ſchmaler. Größe und Geſtalt der Nonnen.

Gould hat den Schilffink im Freileben nicht kennen gelernt. Er empfing nur wenige Exemplare von B. Bynoë und den Offizieren des Schiffes ‚Adler' oder fand ſie im Muſeum zu Sydnei. Ueber die Lebensweiſe konnte er nur erfahren, daß der Vogel im Schilf an den Fluß- und Seeufern wie die Bartmeiſe umherklettere. Von anderer Seite iſt ſeitdem auch noch nichts näheres mitgetheilt worden.

Bis vor wenigen Jahren war der Schilffink im Handel noch ſehr ſelten und nach dem zoologiſchen Garten von London, alſo nach Europa überhaupt, iſt er erſt ſeit dem Jahre 1860 eingeführt worden. Gegenwärtig gehört er zu den gewöhnlichen Erſcheinungen des Handels, iſt alljährlich zu haben, wenn auch niemals in bedeutender Anzahl. Gleich manchen anderen Auſtraliern zeigt er ſich unmittelbar nach der Ankunft faſt regelmäßig ſo weichlich, daß die Mehrzahl ſtirbt. Da jedoch die übrigen ſich jahrelang vortrefflich halten, ſo ſteht es feſt, daß dieſe, wie leider auch beinahe alle Vögel überhaupt, während der langen Ueberfahrt ſchlecht verpflegt werden und faſt immer krankhaft ankommen. Uebrigens gehen manche Schilfamandinen ſelbſt nach langer Zeit und obwol ſie anſcheinend ganz

gesund sind, nicht selten plötzlich ein. Die Todesursache ist dann immer eine in Fettsucht entartete Leber.

Der bauchrednerisch langezogene Sang wird sehr eifrig vorgetragen und schließt mit lautem, hohen tih! ab. Bei Herrn Linden in Radolfzell nistete ein Pärchen mit gutem Erfolge; die meinigen dagegen ließen mehrere Jahre vergeblich warten, bis dann endlich zwei Paar zu gleicher Zeit in Harzer Bauerchen und Pappkästchen aus groben Niststoffen, Halmen, Seegras, Fasern, getrockneter Vogelmiere ein kunstloses Nest formten und mit Federn auspolsterten. Die Jungen starben vor der Verfärbung.

Die Schilf-Amandine oder der Schilffink, kastanienbrüstiger Schilffink, braunrückiger Schilffink (Rchb.), könnte am passendsten Schilfnonne genannt werden.

Le Tisserin à poitrine châtaine (Vekemans); Diamant brun, Diamant à bavette châtaine (französische Händler); Chestnut-breasted Finch (Jamrach); Chestnut-eared Finch (Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Kastanjevink (holländisch).

Nomenclatur: Amadina castaneothorax, *Gld.*; Donacola castaneothorax, *Gld. Rchb.* [Donacola bivettata, *Rchb.*].

Wissenschaftliche Beschreibung S. 170.

Spermestes castanóthorax: Pileo et cervice e fusco cinereis, obscurius lineolatis; notaeo reliquo ferrugineo-fusco, humeris dilutioribus; uropygio luride subfusco; rectricibus fuscis, flavente limbatis; genis nigricante fuscis tenuiter dilutius lineolatis; gula subfusco-nigra; pectore circumscripte dilute badio; cingulo inter hoc et abdomini albo interjecto nigro, per hypochondrium utrumque ad crissum nigrum in limbum dentatum transiente; infracaudalibus nigris; rostro subcoeruleo-cano; iride fusca; pedibus cinereo-fuscis. ♀ vix distincta, nisi clipeo pectorali obsoletius ferrugineo, cinguloque vicinante nigro angustiore. Länge 10,5 cm. (4 Z.), Flügel 5,5 cm. (2 1/8 Z.), Schwanz 3,3 cm. (1 1/4 Z.)

Das Jugendkleid ist einfarbig fahl graubraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller. Die Verfärbung kann ich nicht angeben, da die Jungen vor derselben starben.

Juvenis: unicolor subcinereo-fusca; subtus dilutius.

Beschreibung des Eies: glänzend weiß; Länge 15 mm., Breite 11 mm.

Ovum: album, nitidum.

Die weißbrüstige Schilf-Amandine [Spermestes pectoralis].

Ein Vogel, welcher nur höchst selten im Handel vorkommt und den ich gar nicht als eingeführt mitzählen würde, wenn er nicht in den Vogelsammlungen der Herren E. Linden und A. F. Wiener lebend vorhanden wäre. Gould erhielt ihn zuerst von E. Dring, Offizier des Schiffes ‚Adler', welcher ihn von der Nordwestküste Australiens brachte, ohne jedoch über sein Freileben etwas mitzutheilen. Kopf, Mantel und Flügel sind graubraun, Flügeldeckfedern an den Spitzen klein weißgefleckt; Schwanz schwärzlichbraun; Kehle und Gesicht vom Oberschnabel bis unter's Auge und zum Ohr tiefschwarz; über die Brust ein breites Band aus schwarzen, weißgespitzten Federn,

Bruſt- und Bauchſeiten mit ſchwarzen, weißgeſäumten Halbmöndchen gezeichnet; Bauch und Unterſchwanz röthlich weißgrau; Schnabel hell horngrau; Auge braun; Füße fleiſchfarben. Länge $11{,}8^{cm.}$ ($4^1/_2$ Zoll); Flügel $5{,}9^{cm.}$ ($2^1/_4$ Zoll); Schwanz $4{,}6^{cm.}$ ($1^3/_4$ Zoll). In der Gefangenſchaft hat der Vogel nicht geniſtet und ſeine Lebensweiſe iſt der des vorigen gleich.

Nomenclatur: Amadina pectoralis, *Gould;* Donacola pectoralis, *Gld.; Rchb.* — White-breasted Finch, *Gld.*

Spermestes pectoralis: Capite, interscapilis alisque cinereo-fuscis; tectricibus alar. minutim albo terminatis; cauda nigricante-fusca; gula facieque a maxilla usque ad regionem auricularem nigerrimis; fascia pectorali lata nigra, albo-lineolata; pectore et hypochondriis lunulas nigras, albolimbatas gerentibus; ventre crissoque rubente incanis rostro pallide carneo; iride fusca; pedibus carneis.

Die gelbe Schilf-Amandine [Spermestes flaviprymna]. Nur beiläufig ſei dieſer Vogel erwähnt, da Gould blos ein einziges Exemplar erhalten konnte, und ſeitdem auch andere Forſcher die Art nicht wieder aufgefunden haben. Es muß ein ſehr hübſcher Prachtfink ſein: Kopf hell rehbraun, Rücken und Flügel licht kaſtanienbraun; ganze Unterſeite hell röthlichgelb; Oberſchwanzdecken wachsgelb, Unterſchwanzdecken ſchwarz, Schwanz braun. Schnabel blaugrau; Auge roth; Füße braun. Länge $11{,}8^{cm.}$ ($4^1/_2$ Zoll); Flügel $5{,}9^{cm.}$ ($2^1/_4$ Z.); Schwanz $4{,}6^{cm.}$ ($1^3/_4$ Z.). In der Geſtalt ſteht er ebenfalls den Nonnen nahe, doch dürfte er ungleich lebhafter ſein und in der Lebensweiſe eher mit der Bartamandine übereinſtimmen.

Die gelbe Schilfamandine nennt Reichenbach gelbbürzeliger Schilf-Weberfink und Gelbbürzel. — Donacola et Munia flaviprymna, *Gld.;* Dermophrys flaviprymnus, *Cab.*

Die Zebra-Amandine [Spermestes castanótis].

Tafel IV. Vogel 16.

Kein anderer unter den auſtraliſchen Prachtfinken iſt ſo beliebt und überall eingebürgt als einer der kleinſten, allbekannt unter dem Namen Zebrafink. Nicht allein ein ſehr hübſches, buntes Gefieder zeichnet ihn vor vielen anderen aus, ſondern er hat auch außerdem noch Eigenſchaften, welche als ganz beſondere Vorzüge zu erachten ſind.

Oberhalb an Kopf, Hals und Rücken iſt er bräunlichaſchgrau, die Flügel ſind braungrau, jede Feder heller breit geſäumt; der Oberſchwanz iſt ſchwarz und jede Feder hat drei große, querovale weiße Binden, die in den weißen Bürzel übergehen; jede Wange iſt auf zart perlgrauem Grunde mit einem röthlichkaſtanienbraunen runden Fleck geziert, neben welchem vom Auge aus ein vertikaler ſchwarzer, dann ein breiter weißer und wieder ein feiner ſchwarzer Streif das braune Bäckchen von dem glänzend gelblichrothen Schnabel trennen; Kehle Hals und Oberbruſt ſind perlgrau, fein ſchwarz gewellt und durch eine ſchmale ſchwarze Binde begrenzt; Unterbruſt, Bauch und Hinterleib ſind reinweiß; an den Seiten, unterhalb der Flügelränder, zieht ſich eine lebhaft kaſtanienbraune, fein weißgepunktete Binde an beiden Seiten hin; Auge braunroth; Füße gelblichroth Das Weibchen iſt oberhalb fahlbraun, Flügelſchwingen und Schwanz ſchwärzlichgraubraun; Backenſtreif ſchwarz und daneben ein weißer Streif vom Schnabel bis zur Kehle; unterhalb gelblichgrauweiß; der ſchöne Wangenfleck, die Seitenfärbung und die perlgraue Bruſt fehlen.

Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel

Der Zebrafink wird wol über das ganze innere Australien verbreitet sein. Gould und andere Reisende fanden ihn in den Ebenen mit zerstreuten Bäumen und vielem Graswuchs zwar immer nur in kleinen Flügen, doch sehr zahlreich, in der Nähe des Bodens nach der in Grassämereien bestehenden Nahrung suchend. Die Lebensweise dürfte der verwandter Prachtfinken, insbesondere der Elster-Amandinen ähnlich sein. Näheres hat Gould aber nicht mitgetheilt. Vieillot hat den Vogel gezüchtet und giebt auch eine Abbildung des Jugendkleides. Ob aber der Bengali moucheté derselbe Vogel ist und ob also die Molukkischen Inseln nur fälschlich als Vaterland genannt waren, hat man bis jetzt noch nicht feststellen können.

In der Vogelstube ist die Lebensweise und Brutentwickelung dieser Amandine bereits so eingehend erforscht, wie dies kaum bei irgend einem andern Vogel der Fall sein dürfte. Bis vor wenigen Jahren waren auch die Zebrafinken immer nur zeitweise käuflich vorhanden. Einerseits brachten die Großhändler, am meisten noch Hagenbeck in Hamburg, zuweilen, namentlich in den Frühjahrsmonaten, einen Schub in den Handel, der aber niemals recht vielköpfig war, und andererseits züchtete Bekemans in Antwerpen u. a. diese Vogelart oder kaufte sie von anderen belgischen Züchtern auf, und aus diesen beiden Quellen wurden die Händler in Deutschland versorgt. Nicht selten mangelte die Art dann gänzlich und wol für längere Zeit in den Handlungen. Der Preis betrug damals noch 24 Mark für das Pärchen und ging erst, nachdem gerade diese Vogelart immer reichere Ergebnisse lieferte, bis auf 18 Mark hinab. Als die Züchtung der Prachtfinken in weiterem Umfange sich ausbreitete, war es wol ganz natürlich, daß alle Welt vorzugsweise nach dem Zebrafink griff; er zeigte sich ja als der dankbarste von allen. Die an ihm gemachten Erfahrungen sind zugleich maßgebend für die gesammte Stubenvogelzucht, und ich will sie daher so schildern, wie ich sie selber gemacht habe, indem ich davon überzeugt bin, daß dieselben in allen Vogelstuben und Einzelhecken ziemlich übereinstimmend sein werden.

Von Hagenbeck erhielt ich drei Pärchen eingeführter Wildlinge und von Bekemans drei Paar gezüchteter. Um zunächst ihre Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen, ließ ich sie, nachdem ich die ersteren sämmtlich gekennzeichnet hatte, frei in der Vogelstube fliegen. Wie ich vorausgesetzt, hatten sich bereits während der Hersendung die Pärchen zusammengefunden, so daß ich ganz nach Wunsch beobachten konnte. Kaum waren einige Tage vergangen, als sämmtliche Pärchen schon mit großem Eifer zu nisten begannen. Das eine Paar wählte ein Harzer Bauerchen mit Korbnest, das zweite eine Pappschachtel, das dritte ein hölzernes Kästchen, das vierte erbaute aus freier Hand ins Gebüsch ein Nest — kurz und gut, jede Gelegenheit war ihnen recht. Auch in Hinsicht der Baustoffe waren sie nicht wählerisch, sonderbarerweise wurden sogar immer die gröbsten Dinge,

kleine Reiser, Stroh- und Heuhalme, trockene und selbst frische Vogelmiere, Moos u. dgl., zusammengeschleppt, zum unordentlichen, keineswegs künstlichen Haufen geformt und darin ward dann eine Höhlung mit Federn, Baumwolle, Haaren ausgepolstert. Das eine Pärchen der Wildlinge brachte vier und ein Paar der gezüchteten sogar sieben Jungen glücklich zum Ausfliegen; die Bruten aller übrigen aber gingen zugrunde. Dies wiederholte sich mehrmals. In einer auffallenden, nur ihnen eigenthümlichen Rastlosigkeit erbaut jedes Pärchen sein Nest, das Weibchen legt ein bis zwei Eier, häufig auch gar keins, dann verlassen sie das Nest und beginnen sogleich ein neues zu errichten. Dies währt zuweilen monatelang und manche Pärchen kommen so gar nicht zur Brut. Da ist es dann am besten, ihnen die Nistgelegenheit ganz zu entziehen und sie etwa sechs bis acht Wochen in einem Käfige ganz abgesondert zu halten. Das erwähnte Wildlingspaar brütete fünfmal und das Antwerpener zweimal mit gutem Erfolge. Immer wird man die Erfahrung machen, daß unter den Zebrafinken einige Pärchen überaus ergiebig, andere aber nur zu unzuverlässig nisten. Vermag man mit Scharfblick und Sorgfalt recht gute Heckvögel auszuwählen, so kann man einen überraschend reichen Ertrag erzielen. Fünf Bruten mit durchschnittlich vier Jungen sind gar nicht außergewöhnlich und manchmal bringt ein Paar wol dreißig Junge ohne eine Pause zu machen hervor.

Der Zebrafink, das Männchen sowol als auch das Weibchen, macht von vornherein einen angenehmen Eindruck. Seine bunten Farben kommen umsomehr zur Geltung, da er durchaus nicht scheu, sondern vielmehr dreist und zutraulich ist, und zwar ebenso der Wildling, wie der in der Gefangenschaft gezüchtete Vogel. Obwol sie keineswegs gesellig zusammenhalten, leben die Pärchen doch ungestört nachbarlich, weil sie sich gegenseitig nichts anhaben können. Ihre Befehdungen sind ganz schnurrig. In sichtbarer Entrüstung laufen sie einander entgegen, stellen sich dicht gegenüber und nicken im größten Eifer mit den Köpfen, mit den Schnäbeln hackend, ohne sich aber im geringsten zu berühren; keiner weicht dem andern und ein eintöniger, oft wiederholter Ruf giebt ihren Aerger kund — bis sie ebenso wieder auseinanderfliegen. Der Lockton ist ein sonderbarer, einsilbiger Laut, den man allenfalls mit dem Ton einer Kindertrompete, wie tä, tä, vergleichen könnte. Munter wird er drei- bis viersilbig wiederholt, und ein wenig langgezogen, ist dies auch der ganze Gesang des Männchens. Ebenso komisch erscheint das Liebesspiel. Beide Gatten eines Paares hüpfen irgendwo im Gezweige, augenscheinlich in größtem Eifer und voller Wichtigkeit unaufhörlich hin und her, und zwar in der Weise, daß einer am andern fortwährend vorüberrennt, wobei die Trompetentönchen auf das lustigste erschallen, bis die Begattung erfolgt. Eine drollige Beweglichkeit, welche aber von der anmuthigen Flüchtigkeit der kleinen afrikanischen Astrilde himmelweit verschieden ist,

während er dagegen im ganzen Wesen gleichsam eine gewisse Würde zur Schau trägt, kennzeichnet den Zebrafink in allem Thun. In der Vogelstube, wie im kleinen Käfige ist er verträglich, nur darf man in der Vogelstube nicht mehrere Pärchen halten, weil sie die Nester anderer Vögel gar gern einnehmen und in der Weise der Bandamandine, doch nicht ganz so arg, zerstören.

So niedlich und liebenswürdig ein Pärchen dieser Vögel auch ist, so unleidlich kann dasselbe aber in der Wohnstube durch seine eintönigen, den ganzen Tag hindurch unzähligemal hintereinander ausgestoßenen Trompetentöne werden. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn man ihnen die Gelegenheit zum nisten versagt; während desselben aber rufen sie beiweitem nicht so laut und anhaltend.

Der naturgeschichtliche Verlauf der Zebrafinken-Brut ist folgendek. Das Gelege besteht in 4 bis 7 Eiern. Brutdauer 11 Tage. Beide Gatten des Pärchens brüten abwechselnd, das Männchen mehr am Vormittage, und zur Nacht sitzen sie beide, sowie auch späterhin die bereits ausgeflogenen Jungen, welche noch geraume Zeit hindurch gefüttert werden, alle zusammen im Nest. Der Nestflaum ist gelblichweiß. Das Jugendkleid ist einfarbig fahl gelblich mäusegrau; unterhalb kaum heller grau; ein breiter weißer Streif trennt den glänzend schwarzen Schnabel vom Auge; Kopfseiten und Kehle fahlgrau; Flügelschwingen dunkelgrau, heller gesäumt; Schwanz schwärzlich, weiß gebändert; Füße fleischfarben. Das Benehmen der Jungen ist bereits S. 22 geschildert. Gar komisch sieht es aus, wenn eine ganze Schar dieser Kleinen unter gewaltigem Zirpen das Futter von den Alten erbettelt. Die Verfärbung geht in folgender Weise vor sich. In der fünften Woche wird an der Brust eine feine schwarze Linie bemerkbar, welche allmälig immer mehr hervortritt, von derselben unterwärts wird das Gefieder immer heller, bis es durch Schmutziggelb in reines Weiß übergeht, das obere Gefieder dunkelt immer mehr und nimmt einen schwach bräunlichen Ton an. Jetzt kommen nach und nach die Umrisse aller Zeichnungen zum Vorschein; der Bürzel scheidet sich mit reinem Weiß von dem schwarzen Oberschwanz, auf welchem die größerwerdenden weißen Pünktchen Querstreifen bilden. Von dem weißen Backenstreif sondert sich ein tiefschwarzer ab und ebenso werden immer kräftiger die röthlichbraunen Bäckchen sichtbar, an den Seiten wird die kastanienbraune Färbung sichtbar, auf der die weißen Tüpfel sich bilden, Hals und Brust werden perlgrau und fein schwarz gebändert. Der Schnabel blaßt ab und geht durch fahlgelb in rothgelb über. Bei dem Weibchen beschränkt sich die Verfärbung auf das Erscheinen des schwarzen Backenstreifs neben dem weißen, das obere Gefieder dunkelt, der Bauch wird reinweiß, sowie der Schnabel rothgelb. Gewöhnlich ist diese Verfärbung in etwa acht Wochen vollendet und dann beginnen die jungen Vögel auch sogleich zu nisten.

Jetzt tritt aber ein großer Uebelstand ein, denn diese jungen Vögel entfalten eine solche Rastlosigkeit, daß sie die alten Pärchen und auch andere nur zuviel stören; sie müssen daher herausgefangen und in einen besondern großen Käfig gebracht werden, wo man ihnen aber jedenfalls Nistkästchen mit Baustoffen bieten muß, weil sie andernfalls des Nachts sich erkälten und erkranken.

Die Zucht der Zebra-Amandinen ist überaus leicht und außerordentlich ergiebig, wenn man ihnen nur die nöthige Sorgfalt zuwendet. Ihre Fruchtbarkeit ist fast ebenso groß als die der Goldbrüstchen, nur mit dem Unterschiede, daß

sie kräftiger sind und die Jungen besser großziehen. Herr Maler Dr. Robert Geißler erzählt: „Winters und Sommers ohne Unterlaß setzen sie ihre schwarzschnäbeligen Jungen in die Welt, und kaum verfärben sich nach 6 bis 8 Wochen deren Schnäbel roth, so schleppen auch diese schon wieder Baumaterial in irgend einen nestartigen Winkel und legen Eier. Sonderbares kann ich von einem kaum 8 Monate alten Pärchen berichten. Daß dasselbe bereits vier lebenskräftige Junge erzogen, ist an sich schon bemerkenswerth; dann aber wurde das in einem Reisigdickicht stehende Nest immerfort vergrößert, ohne daß die Vögel zu einer wirklichen Brut gelangten. Durch die reichliche Fütterung mit Ameisenpuppen und hartgekochtem Hühnerei waren die Vögelchen zu üppig geworden, und als wir endlich den immer mehr anschwellenden Nestbau untersuchten, fanden wir darin 34 Eier. Als die Eifütterung dann etwas eingeschränkt wurde, kam wieder eine regelmäßige Brut zu Stande. Nun wimmelt es in meiner Vogelstube von trompetenden Zebrafinken und dieser ganze Segen ist einem einzigen Pärchen in kurzer Zeit entsprossen. Denn ‚als der Großvater die Großmutter nahm', das ist erst $1^3/_4$ Jahre her". Herr Baron von Freyberg in Regensburg züchtete in drei Bruten 19 Junge. Eine interessante Erfahrung machte Herr Apotheker E. Meier in Thorn, die nämlich, daß ein Männchen die Jungen, von welchen das Weibchen gestorben war, glücklich allein auffütterte. Auffallend ist es, daß dieser dreiste, durchaus nicht scheue Vogel sehr leicht die Eier verläßt, wenn man das Nest berührt oder auch nur hineinsieht. Vor jeder Störung sei daher dringend gewarnt. Der Versuch, die Eier anderer, werthvoller Vögel von den so leicht nistenden Zebrafinken erbrüten zu lassen, ist bisher noch niemals geglückt; dennoch dürfte ein Erfolg wol zu ermöglichen sein.

In dem Abschnitt über Vogelzucht werde ich seine Züchtung vorzugsweise eingehend schildern. Dieselbe bietet ja immerhin noch die Aussicht auf einen guten Ertrag. Nachdem die Anzahl der hier gezüchteten, die der eingeführten Zebra-Amandinen — obwol von allen australischen Prachtfinken gerade dieser am reichlichsten herübergebracht wird — bereits ganz bedeutend übertrifft, so sind die Preise für die letzteren zwar schon bis auf 9 Mark und für die ersteren auf 7,5 M., wol gar bis auf 6 M. herabgegangen; dennoch ist es günstigenfalls sehr einträglich, wenn man die eben so kosten- als mühelose Zucht im mehr oder minder großartigen Maßstabe sachgemäß und dann auch mit Glück betreibt. Und wer nur ein Pärchen zum Vergnügen und aus Freude an der Thierwelt halten will, kann wahrlich keine dankbarere Vogelart wählen.

Die Zebra-Amandine oder der Zebrafink heißt auch braunwangiger Bänderschwanzfink, braunöhriger Bandbürzler (Rchb.), Zebra-Diamant.

Le Moineau mandarin (Vekemans und französische Händler); Diamant zébré, Zébré d'Australie (französische Händler); Chestnut-eared Finch (nach

Gould, Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Zebra-Finch (Jamrach brieflich); Zebravink (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia guttata, *Vieill.;* Amadina castanotis, *Gould, Gray;* Stagonopleura castanotis, *Cab.;* Taeniopygia castanotis, *Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 172.

Spermestes castanótis: Supra capite, collo dorsoque subfusco-cinereis; remigibus fuscescentibus, dilutius limbatis; tectricibus caudae superioribus nigris, singulis fascias ovales ternas exhibentibus albas, in uropygium album transientes; genis cinnamomeis; lineola verticali nigra regionem inter rostrum aurantio-rubrum et oculum albam utrinsecus terminante; gula, collo pectoreque incanis, subtilissime nigro-undulatis, hoc fasciam angustam nigram gerente; abdomine crissoque albis; stria laete badia praeter hypochondrium utrumque albo-punctulata; iride rufa; pedibus fulvis. ♀ supra luride fusca; remigibus caudaque nigricante fuscis; stria juxta genas nigra, inde regione reliqua usque ad rostrum gulamque alba; subtus luride albida macula genarum laete cinnamomea coloreque pectoris incano nullis.

Jugendkleid ſ. S. 175.

Juvenis: supra concolor, luride cineracea remigibus al. obscure cinereis, pallidius limbatis; subtus vix dilutius cinerea; capitis lateribus gulaque sordide cinerascentibus; cauda nigricante, albo-fasciata; stria lata, rostro nigro nitido oculoque interposita alba; pedibus carneis.

Beſchreibung des Eies: Geſtalt länglich mit zarter, glatter Schale, Farbe auffallend bläulichweiß; Länge 15 mm., Breite 13 mm.

Ovum: longiusculum, e coeruleo album; testa tenui, laevi.

Die Diamant-Amandine [Spermestes guttata].

Tafel IV. Vogel 17.

Eine Anzahl der von Auſtralien zu uns gelangenden Prachtfinken wird von Frankreich her im Vogelhandel mit der Bezeichnung von Edelgeſteinen bedacht; unter ihnen iſt der bekannteſte und zugleich einer der ſchönſten, der gewöhnliche Diamantvogel.

Sein Oberkörper iſt bräunlichgrau, Stirn, Oberkopf und Nacken ſind heller weißlichgrau, ſo daß ihn Vieillot blaßköpfiger Fink [Fringille leucophore] und Latham ſogar weißköpfiger Fink [White-headed Finch] benannten. Der Unterkörper iſt ſchneeweiß und ein ſehr breiter ſammtſchwarzer Gürtel umgiebt die Bruſt und beide Seiten. An dem letzteren heben ſich große weiße Punkte von dem tiefen Schwarz ſchön ab. Prachtvoll aber erſcheint das glänzende Scharlachroth am Unterrücken und Bürzel. Der Schnabel iſt dunkelroth. Die Verbreitung erſtreckt ſich, ſoweit bis jetzt erforſcht, über Südauſtralien. Gould fand ihn hier an verſchiedenen Orten, in Neuſüdwales und auf den Liverpool-Ebenen, vorzugsweiſe in trockenen, ſteinigen, mit einzelnen Bäumen und wenig Geſträuch bewachſenen Gegenden. Im nahen Fluge leuchtet die rothe Stelle des Unterrückens prächtig hervor. Das nach Prachtfinkenweiſe runde, gewölbte, aus Gräſern gebaute, ſehr große und ſeitwärts mit einer kurzen Ein-

Bruſt- und Bauchſeiten mit ſchwarzen, weißgeſäumten Halbmöndchen gezeichnet; Bauch und Unterſchwanz röthlich weißgrau; Schnabel hell horngrau; Auge braun; Füße fleiſchfarben. Länge 11,8 cm. (4½ Zoll); Flügel 5,9 cm. (2¼ Zoll); Schwanz 4,6 cm. (1¾ Zoll). In der Gefangenſchaft hat der Vogel nicht geniſtet und ſeine Lebensweiſe iſt der des vorigen gleich.

Nomenclatur: Amadina pectoralis, *Gould;* Donacola pectoralis, *Gld.; Rchb.* — White-breasted Finch, *Gld.*

Spermestes pectoralis: Capite, interscapilis alisque cinereo-fuscis; tectricibus alar. minutim albo terminatis; cauda nigricante-fusca; gula facieque a maxilla usque ad regionem auricularem nigerrimis; fascia pectorali lata nigra, albo-lineolata; pectore et hypochondriis lunulas nigras, albolimbatas gerentibus; ventre crissoque rubente incanis rostro pallide carneo; iride fusca; pedibus carneis.

Die gelbe Schilf-Amandine [Spermestes flaviprymna]. Nur beiläufig ſei dieſer Vogel erwähnt, da Gould blos ein einziges Exemplar erhalten konnte, und ſeitdem auch andere Forſcher die Art nicht wieder aufgefunden haben. Es muß ein ſehr hübſcher Prachtfink ſein: Kopf hell rehbraun, Rücken und Flügel licht kaſtanienbraun; ganze Unterſeite hell röthlichgelb; Oberſchwanzdecken wachsgelb, Unterſchwanzdecken ſchwarz, Schwanz braun. Schnabel blaugrau; Auge roth; Füße braun. Länge 11,8 cm. (4½ Zoll); Flügel 5,9 cm. (2¼ Z.); Schwanz 4,6 cm. (1¾ Z.). In der Geſtalt ſteht er ebenfalls den Nonnen nahe, doch dürfte er ungleich lebhafter ſein und in der Lebensweiſe eher mit der Bartamandine übereinſtimmen.

Die gelbe Schilfamandine nennt Reichenbach gelbbürzeliger Schilf-Weberfink und Gelbbürzel. — Donacola et Munia flaviprymna, *Gld.;* Dermophrys flaviprymnus, *Cab.*

Die Zebra-Amandine [Spermestes castanótis].

Tafel IV. Vogel 16.

Kein anderer unter den auſtraliſchen Prachtfinken iſt ſo beliebt und überall eingebürgt als einer der kleinſten, allbekannt unter dem Namen Zebrafink. Nicht allein ein ſehr hübſches, buntes Gefieder zeichnet ihn vor vielen anderen aus, ſondern er hat auch außerdem noch Eigenſchaften, welche als ganz beſondere Vorzüge zu erachten ſind.

Oberhalb an Kopf, Hals und Rücken iſt er bräunlichaſchgrau, die Flügel ſind braungrau, jede Feder heller breit geſäumt; der Oberſchwanz iſt ſchwarz und jede Feder hat drei große, querovale weiße Binden, die in den weißen Bürzel übergehen; jede Wange iſt auf zart perlgrauem Grunde mit einem röthlichkaſtanienbraunen runden Fleck geziert, neben welchem vom Auge aus ein vertikaler ſchwarzer, dann ein breiter weißer und wieder ein feiner ſchwarzer Streif das braune Bäckchen von dem glänzend gelblichrothen Schnabel trennen; Kehle Hals und Oberbruſt ſind perlgrau, fein ſchwarz gewellt und durch eine ſchmale ſchwarze Binde begrenzt; Unterbruſt, Bauch und Hinterleib ſind reinweiß; an den Seiten, unterhalb der Flügelränder, zieht ſich eine lebhaft kaſtanienbraune, fein weißgepunktete Binde an beiden Seiten hin; Auge braunroth; Füße gelblichroth Das Weibchen iſt oberhalb fahlbraun, Flügelſchwingen und Schwanz ſchwärzlichgraubraun; Backenſtreif ſchwarz und daneben ein weißer Streif vom Schnabel bis zur Kehle; unterhalb gelblichgrauweiß; der ſchöne Wangenfleck, die Seitenfärbung und die perlgraue Bruſt fehlen.

Alten tragen, ſolange es irgend geht, die Entleerungen der Jungen ſorgfältig fort und daher bleibt das Neſt verhältnißmäßig ſauber. Zur Aufzucht der Jungen bedürfen ſie durchaus Fleiſchnahrung, aufgeweichtes Eierbrot, Eigelbfutter, friſche Ameiſenpuppen oder kleingeſchnittene Mehlwürmer.

Bei dieſem Vogel ſind die Geſchlechter beſonders ſchwer zu unterſcheiden; dem ſcharfen Blicke erſcheint das Weibchen kaum merklich kleiner und neben dem Männchen läßt es unmittelbar oberhalb des Schnabels von einem ſchwarzen Zügelſtreif zum andern eine merklich blaſſere, faſt weißgraue Stirnbinde erkennen, während das Männchen hier wie am ganzen Oberkopf gleichmäßig grau gefärbt iſt. Zuverläſſig iſt dies Merkmal aber nur bei ganz alten Vögeln, denn die jüngeren haben ſämmtlich die blaſſere Stirn.

Im Geſellſchaftskäfige iſt die Diamant-Amandine harmlos und friedlich, in der Vogelſtube dagegen ſehr bösartig gegen alle kleineren, welche ihrem Neſte nahen, ohne daß ſie jedoch andere in deren Brut ſtört; im Heckkäfige aber, und mag derſelbe noch ſo groß ſein, gehört der Diamantfink zu den ärgſten Raufbolden. Als eine der ſchönſten unter allen Amandinen darf ein Pärchen übrigens wol in keiner Sammlung fehlen.

Die Diamant-Amandine, der Diamantvogel oder Diamantfink, iſt auch Tropfenfink, blos Diamant oder Diamantſperling genannt.

L'oiseau Diamant (Bekemans); diamant ordinaire (franzöſiſche Händler); Spotted-sided Finch (nach Gould, Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Diamant-Sparrow (Jamrach brieflich); Diamantvogeltje (holländiſch). — Spotted Grosbeak, *Lewin;* White-headed Finch, *Lath.;* Spotted-sided Grosbeak, *Lath.*

Nomenclatur: Loxia guttata, *Shw.;* Fringilla Lathami, *Vg.* et *Hrsf.;* Fringilla leucocephala, *Vieill., Lth.;* Amadina guttata, *Gray, Mtch.;* Amadina Lathami, *Gld.;* Stagonopleura guttata, *Cab., Gld., Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberkopf und Nacken bis zum Rücken ſchwach bräunlichgrau, Mantel und Flügel dunkler braungrau, Bürzel und Schwanzdecken glänzend ſcharlachroth; ein breiter Zügel vom Schnabel bis ans Auge und ebenſo eine breite Binde zwiſchen Hals und Bruſt tiefſchwarz; Backen grauweiß; Kehle, Hals, ſodann Unterbruſt, Bauch und Hinterleib reinweiß; die tiefſchwarzen Seiten mit großen weißen Tropfenflecken gezeichnet, Unterflügel bräunlichweiß; Schwanz reinſchwarz; Schnabel blutroth mit lilafarbenem Grunde; Auge röthlichbraun von einem roſenrothen, fein geperlten Ringe umgeben; Fuß ſchwärzlichbraun.

Spermestes guttata: Pileo et cervice subfusco-canis; interscapilio alisque fusco-cinereis; uropygio et supracaudalibus laetissime puniceis; loris latis et fascia pectorali lata atris; genis incanis; gula, collo, abdomine crissoque albis; guttis albis hypochondriorum atrorum amplis; subalaribus sordide canis; cauda nigra; basi rostri sanguinei lilacina; iride subrubra; annulo palpebrali subroseo, granuloso; pedibus e nigro fuscis.

Jugendkleid ſ. S. 179.

Juvenis: supra fuscante cinerea; gula, pectore, abdomine et infracaudalibus sordide albidis; cingulo pectorali, hypochondriis caudaque nigricante cinereis; uropygio

jam laete rubente; hocce et reliquis picturis avicula facile dignoscenda, etiam ab adultae magnitudine parum discrepans.

Beschreibung des Eies: Gestalt rundlich, Farbe glänzend weiß, Schale glatt und feinkörnig; Länge 19 mm., Breite 15 mm.

Ovum: subrotundum, nitidum, album, laeve, granulosum.

Die Feuerschwanz-Amandine [Spermestes nitida].

Von Fräulein Hagenbeck erhielt ich einen Prachtfink, welcher durch seine zarte Schönheit, noch mehr durch sein zahmes, ungemein zutrauliches Wesen mich entzückte. Oberhalb gelblichbraun, unterhalb aschgrau, ist es auf den ersten Blick unscheinbar, allein das ganze Gefieder ist zart, oberhalb schwarz und unterhalb weiß querwellenförmig gezeichnet, an Stirn, Nacken und Kehle am feinsten, nach den Flügeln, sowie nach der Brust und dem Bauch hin mit immer breiteren Wellenlinien. Ein breiter Zügelstreif, schmaler Ring ums Auge und eben solches Stirnband schwarz; die unteren Schwanzdecken reinschwarz und der obere Schwanz bräunlichschwarz; Bürzel und obere Schwanzdecken bis fast zur Hälfte der Außenfahnen an den mittleren Schwanzfedern prachtvoll glänzend scharlachroth; Schwanz im übrigen schwärzlichbraun, unterhalb aschgrau, die äußeren Federn mattschwarz quergestreift. Schnabel blutroth; Auge braunroth; Füße horngrau.

Die älteren Schriftsteller bezeichneten diese Amandine vorzugsweise als die schöne [Fringilla bella, *Vigors*, *Horsfield;* Loxia bella, *Latham*, *Vieillot*]. Auf mich machte das Vögelchen einen ganz eigenthümlichen Eindruck, mehr noch seines Benehmens, als seines Aussehens wegen. Sobald ich in die Vogelstube trat, kam es sogleich herbeigeflogen, mir auf den Arm und versuchte fortwährend, in den Rockärmel oder in die hohle Hand zu kriechen. Dabei war es augenscheinlich von fieberhafter Unruhe getrieben; es suchte immerfort nach irgend einem Futter oder dergleichen, welches ich ihm leider nicht zu bieten vermochte, und ließ dabei seine langgezogenen, tieftraurig ertönenden, flötenden Rufe hören. Mit Betrübniß sah ich ein, daß der Feuerschwanz zugrunde gehen werde, und nachdem ich ihm jedes mögliche Futter, alle Sämereien, welche ich nur beschaffen konnte, Apfelsinen, Feigen und andere Früchte, fein gehacktes Fleisch und allerlei Weichfutter u. s. w. vergeblich gereicht, starb er nach einigen Tagen wirklich. Herr Wiener, welcher mich aus London bald darauf besuchte, gab eine Erklärung dahin, daß die Schiffskapitäne manche Vögel aus irgend einem Grunde im Dunkeln zu halten pflegen und daß dieser Prachtfink vielleicht gerade dadurch umgekommen, daß ich ihn frei in der Vogelstube fliegen ließ. In meinem Besitz ist diese Art jedoch lange genug gewesen, um mich beurtheilen zu lassen, daß er ebenso im Körperbau, wie in der Lebensweise der Diamant-Amandine sehr verwandt ist.

Nachdem der Feuerschwanz bereits von den älteren, vorhingenannten Ornithologen beschrieben worden, gab Gould eine treffliche Abbildung und Schilderung. Die Heimat erstreckt sich über Vandiemensland und Neusüdwales, wo er wahrscheinlich als Standvogel in Scharen von 6 bis 12 Köpfen in den Ebenen

und an lichten Waldstellen lebt, bis in die Gärten der Kolonisten kommt und sich von Grassämereien ernährt. Im pfeilschnellen Fluge leuchtet das schöne Roth des Unterrückens wie beim Diamantfink auffallend hervor. Sein schwermüthiger Lockton erschallt noch länger gezogen und trauriger als der des letzteren. Seiner Zutraulichkeit, Anmuth und schönen Färbung wegen sehen die Ansiedler das Vögelchen sehr gern. Das Nest, welches Gould in Vandiemensland häufig sah, stand ganz frei, ohne irgendwie verborgen zu sein, im Gezweige niedriger Bäume, zu mehreren beisammen, etwa in fußbreiter Entfernung von einander. Es ist aus Gräsern und Pflanzenstengeln kuppelförmig gewölbt, mit dem Flugloch ziemlich von oben herab. Das Gelege besteht in 5—6 Eiern.

Es wäre wünschenswerth, daß dies liebliche Vögelchen demnächst oft und zahlreich eingeführt werde, und dies läßt sich vielleicht erwarten, sobald der Vogelhandel zwischen dem fünften und ersten Erdtheil besser geregelt und namentlich in Hinsicht der Verpflegung des kleinen Gefieders verständiger betrieben wird.

Die Feuerschwanz-Amandine oder der Feuerschwanz wird von Rchb. bürzelglänzender Gürtelastrild, von Gould mit der Bezeichnung der Ansiedler von Vandiemensland feuerschwänziger Fink (Fire-tailed Finch) und von den Eingebornen auf Neusüdwales Wee-bong genannt.

Die Preislisten der Händler, sowie das Verzeichniß des zoologischen Gartens von London führen diesen Vogel noch nicht auf.

Nomenclatur: Loxia bella et nitida, *Lth.*; Loxia bella, *Vieill.*; Fringilla bella, *Vg.* et *Hrsf.*; Amadina nitida, *Gray* et *Mtch.*; Estrelda bella, *Gould*, *Gray*; Zonaeginthus nitidus, *Cab.*, *Rchb.*; Zonaeginthus bellus, *Gould.* — Black-lined Grosbeak, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 181.

Spermestes nitida. Supra flavente fusca, tenuiter nigro-undulata; subtus cinerea, albo-undulata; undulis frontis, cervicis gulaeque subtilissimis, deorsum dilatantibus; stria lororum lata, annulo oculari angusto fasciaque frontali nigris; infracaudalibus nigris; cauda supra fuscante nigra, subtus cinerea; uropygio, supracaudalibus dimidioque basali pogonii rectricum intermediarum externi igneo-puniceis; rectricibus reliquis nigrescente fuscis, subtus cinereis, exteris transversim subnigro-fasciolatis; rostro sanguineo; iride badia; pedibus corneis.

Beschreibung des Eies (nach Gould): Schön fleischfarbenweiß, Gestalt länglich; Länge $8^1/_2$ Linien ($18{,}5^{mm.}$), Breite $6^1/_2$ L. ($14{,}2^{mm.}$).

Ovum: pulchre carneo-album, longiusculum.

Die rothohrige Amandine [Spermestes oculea].

In der Färbung sowol als auch im Wesen und in der Lebensweise steht dieser Vogel dem vorigen durchaus nahe. Gould fand ihn nur im Gebiet des Schwanenflusses an der Westküste Australiens hier und da recht häufig in offenen, von Dickicht begrenzten Grasebenen mit Moorboden in der Nähe von Landseen und Flüssen, ebenfalls als Standvogel. Mr. Gilbert beobachtete ihn an einsamen, stillen Orten im Dickicht. Gleich den beiden vorher geschilderten läßt auch er den langgezogenen, melancholischen Lockton erschallen. Im Munde der

Eingeborenen von Westaustralien giebt es eine Sage, daß dieser Vogel einst einen Hund gestochen, sein Blut getrunken und davon den rothen Schnabel bekommen habe.

Ich erhielt ein leider todt angekommenes Männchen mit anderen australischen Vögeln zusammen von Fräulein Hagenbeck i. J. 1873 und vermuthe, daß auch dieser Prachtfink wol schon früher zuweilen lebend herübergekommen. Zahlreich dagegen dürfte er niemals im Vogelhandel werden. Die rothohrige Amandine wird von Rchb. augenfleckiger oder rothöhriger Gürtelastrild, und auch Sperlingsastrild geheißen. — In den Preislisten der Händler und in den Verzeichnissen der zoologischen Gärten ist er nicht vorhanden.

Nomenclatur: Fringilla oculea, *Quoy* et *Gaim.*; Zonaeginthus oculeus, *Cab.*, *Gld.*, *Rchb.* — Red-eared Finch, *Gld.*; Native Sparrow (einheimischer Sperling) der Ansiedler am Schwanenfluß; Jéé-ree der Eingeb. im Flachland und Dwér-den-ngool-gnánneer bei den Eingeb. der Gebirgsgegenden von Westaustralien.

Wissenschaftliche Beschreibung. Grundfarbe des vor., doch oberhalb mehr graubraun, Flügel und Schwanz kräftig und das übrige zart dunkel quergebändert; Kinn und Kehle fahlbraun mit feinen Querlinien; Auge von einem vom Schnabel bis zum Ohr reichenden, schwarzen Streif umgeben, neben welchem vom Auge bis hinters Ohr ein glänzend scharlachrother ovaler Fleck sich erstreckt; Hinterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken und der Grund der mittleren Schwanzfedern glänzend scharlachroth; unterhalb bräunlichschwarz mit großen, weißen Tropfenflecken. Schnabel blutroth, am Grunde perlgrau; Auge braunroth; Füße gelbgrau. Weibchen dem Männchen gleichgefärbt. Länge 12,5 cm. (4 3/4 Zoll); Flügel 5,5 cm. (2 Zoll); Schwanz 5 cm. (etwa 2 Zoll).

Spermestes oculea: Colore prioris, at supra magis in cineraceum vergente; alis caudaque distinctus, reliquis tenuiter obscurius fasciatis; mento gulaque luride fuscis, transverse lineolatis; stria a rostro usque ad aurem, oculum includente nigra; subter hanc macula ovali usque ad aurem posticam saturate punicea; subtus e fusco nigra, albo-guttata; basi rostri sanguinei incana; iride badia; pedibus e flavido cinereis. ♀ haud distincta.

Die Gürtel-Amandine [Spermestes cincta].

Tafel IV. Vogel 18.

Mit dem S. 57 beschriebenen Schwarzbäckchen zugleich führte Karl Hagenbeck den Bartfink, wie diese Amandine gewöhnlich genannt wird, im Frühjahr 1869 zuerst ein. Die wenigen, damals vorhandenen Pärchen starben jedoch sämmtlich an einer ansteckenden Krankheit, und dann fehlte der Vogel fast noch zwei Jahre, bis er endlich wieder erschien. Seitdem wird er fast alljährlich regelmäßig, ebenso wie der Diamantvogel herübergebracht. Theils durch diese Sendungen von Australien, theils durch recht ergiebige Züchtung hier, hat er sich so verbreitet, daß er gegenwärtig in jeder Vogelstube zu sehen ist. Nach dem zoologischen Garten von London gelangte er schon im Juni 1861 mit einem von Sidney kommenden Schiffe. In der Gestalt und Größe dem Diamantfink außerordentlich ähnlich, ist er in der Färbung wie im Benehmen ganz bedeutend verschieden. Dennoch sind beide Vögel sehr nahe verwandt. Dies zeigt sich nicht

kleine Reiser, Stroh- und Heuhalme, trockene und selbst frische Vogelmiere, Moos u. dgl., zusammengeschleppt, zum unordentlichen, keineswegs künstlichen Haufen geformt und darin ward dann eine Höhlung mit Federn, Baumwolle, Haaren ausgepolstert. Das eine Pärchen der Wildlinge brachte vier und ein Paar der gezüchteten sogar sieben Jungen glücklich zum Ausfliegen; die Bruten aller übrigen aber gingen zugrunde. Dies wiederholte sich mehrmals. In einer auffallenden, nur ihnen eigenthümlichen Rastlosigkeit erbaut jedes Pärchen sein Nest, das Weibchen legt ein bis zwei Eier, häufig auch gar keins, dann verlassen sie das Nest und beginnen sogleich ein neues zu errichten. Dies währt zuweilen monatelang und manche Pärchen kommen so gar nicht zur Brut. Da ist es dann am besten, ihnen die Nistgelegenheit ganz zu entziehen und sie etwa sechs bis acht Wochen in einem Käfige ganz abgesondert zu halten. Das erwähnte Wildlingspaar brütete fünfmal und das Antwerpener zweimal mit gutem Erfolge. Immer wird man die Erfahrung machen, daß unter den Zebrafinken einige Pärchen überaus ergiebig, andere aber nur zu unzuverlässig nisten. Vermag man mit Scharfblick und Sorgfalt recht gute Heckvögel auszuwählen, so kann man einen überraschend reichen Ertrag erzielen. Fünf Bruten mit durchschnittlich vier Jungen sind gar nicht außergewöhnlich und manchmal bringt ein Paar wol dreißig Junge ohne eine Pause zu machen hervor.

Der Zebrafink, das Männchen sowol als auch das Weibchen, macht von vornherein einen angenehmen Eindruck. Seine bunten Farben kommen umsomehr zur Geltung, da er durchaus nicht scheu, sondern vielmehr dreist und zutraulich ist, und zwar ebenso der Wildling, wie der in der Gefangenschaft gezüchtete Vogel. Obwol sie keineswegs gesellig zusammenhalten, leben die Pärchen doch ungestört nachbarlich, weil sie sich gegenseitig nichts anhaben können. Ihre Befehdungen sind ganz schnurrig. In sichtbarer Entrüstung laufen sie einander entgegen, stellen sich dicht gegenüber und nicken im größten Eifer mit den Köpfen, mit den Schnäbeln hackend, ohne sich aber im geringsten zu berühren; keiner weicht dem andern und ein eintöniger, oft wiederholter Ruf giebt ihren Aerger kund — bis sie ebenso wieder auseinanderfliegen. Der Lockton ist ein sonderbarer, einsilbiger Laut, den man allenfalls mit dem Ton einer Kindertrompete, wie tä, tä, vergleichen könnte. Munter wird er drei- bis viersilbig wiederholt, und ein wenig langgezogen, ist dies auch der ganze Gesang des Männchens. Ebenso komisch erscheint das Liebesspiel. Beide Gatten eines Paares hüpfen irgendwo im Gezweige, augenscheinlich in größtem Eifer und voller Wichtigkeit unaufhörlich hin und her, und zwar in der Weise, daß einer am andern fortwährend vorüberrennt, wobei die Trompetentönchen auf das lustigste erschallen, bis die Begattung erfolgt. Eine drollige Beweglichkeit, welche aber von der anmuthigen Flüchtigkeit der kleinen afrikanischen Astrilde himmelweit verschieden ist,

während er dagegen im ganzen Wesen gleichsam eine gewisse Würde zur Schau trägt, kennzeichnet den Zebrafink in allem Thun. In der Vogelstube, wie im kleinen Käfige ist er verträglich, nur darf man in der Vogelstube nicht mehrere Pärchen halten, weil sie die Nester anderer Vögel gar gern einnehmen und in der Weise der Bandamandine, doch nicht ganz so arg, zerstören.

So niedlich und liebenswürdig ein Pärchen dieser Vögel auch ist, so unleidlich kann dasselbe aber in der Wohnstube durch seine eintönigen, den ganzen Tag hindurch unzähligemal hintereinander ausgestoßenen Trompetentöne werden. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn man ihnen die Gelegenheit zum nisten versagt; während desselben aber rufen sie beiweitem nicht so laut und anhaltend.

Der naturgeschichtliche Verlauf der Zebrafinken-Brut ist folgendek. Das Gelege besteht in 4 bis 7 Eiern. Brutdauer 11 Tage. Beide Gatten des Pärchens brüten abwechselnd, das Männchen mehr am Vormittage, und zur Nacht sitzen sie beide, sowie auch späterhin die bereits ausgeflogenen Jungen, welche noch geraume Zeit hindurch gefüttert werden, alle zusammen im Nest. Der Nestflaum ist gelblichweiß. Das Jugendkleid ist einfarbig fahl gelblich mäusegrau; unterhalb kaum heller grau; ein breiter weißer Streif trennt den glänzend schwarzen Schnabel vom Auge; Kopfseiten und Kehle fahlgrau; Flügelschwingen dunkelgrau, heller gesäumt; Schwanz schwärzlich, weiß gebändert; Füße fleischfarben. Das Benehmen der Jungen ist bereits S. 22 geschildert. Gar komisch sieht es aus, wenn eine ganze Schar dieser Kleinen unter gewaltigem Zirpen das Futter von den Alten erbettelt. Die Verfärbung geht in folgender Weise vor sich. In der fünften Woche wird an der Brust eine feine schwarze Linie bemerkbar, welche allmälig immer mehr hervortritt, von derselben unterwärts wird das Gefieder immer heller, bis es durch Schmutziggelb in reines Weiß übergeht, das obere Gefieder dunkelt immer mehr und nimmt einen schwach bräunlichen Ton an. Jetzt kommen nach und nach die Umrisse aller Zeichnungen zum Vorschein; der Bürzel scheidet sich mit reinem Weiß von dem schwarzen Oberschwanz, auf welchem die größerwerdenden weißen Pünktchen Querstreifen bilden. Von dem weißen Backenstreif sondert sich ein tiefschwarzer ab und ebenso werden immer kräftiger die röthlichbraunen Bäckchen sichtbar, an den Seiten wird die kastanienbraune Färbung sichtbar, auf der die weißen Tüpfel sich bilden, Hals und Brust werden perlgrau und fein schwarz gebändert. Der Schnabel blaßt ab und geht durch fahlgelb in rothgelb über. Bei dem Weibchen beschränkt sich die Verfärbung auf das Erscheinen des schwarzen Backenstreifs neben dem weißen, das obere Gefieder dunkelt, der Bauch wird reinweiß, sowie der Schnabel rothgelb. Gewöhnlich ist diese Verfärbung in etwa acht Wochen vollendet und dann beginnen die jungen Vögel auch sogleich zu nisten.

Jetzt tritt aber ein großer Uebelstand ein, denn diese jungen Vögel entfalten eine solche Rastlosigkeit, daß sie die alten Pärchen und auch andere nur zuviel stören; sie müssen daher herausgefangen und in einen besondern großen Käfig gebracht werden, wo man ihnen aber jedenfalls Nistkästchen mit Baustoffen bieten muß, weil sie andernfalls des Nachts sich erkälten und erkranken.

Die Zucht der Zebra-Amandinen ist überaus leicht und außerordentlich ergiebig, wenn man ihnen nur die nöthige Sorgfalt zuwendet. Ihre Fruchtbarkeit ist fast ebenso groß als die der Goldbrüstchen, nur mit dem Unterschiede, daß

sie kräftiger sind und die Jungen besser großziehen. Herr Maler Dr. Robert Geißler erzählt: „Winters und Sommers ohne Unterlaß setzen sie ihre schwarzschnäbeligen Jungen in die Welt, und kaum verfärben sich nach 6 bis 8 Wochen deren Schnäbel roth, so schleppen auch diese schon wieder Baumaterial in irgend einen nestartigen Winkel und legen Eier. Sonderbares kann ich von einem kaum 8 Monate alten Pärchen berichten. Daß dasselbe bereits vier lebenskräftige Junge erzogen, ist an sich schon bemerkenswerth; dann aber wurde das in einem Reisigdickicht stehende Nest immerfort vergrößert, ohne daß die Vögel zu einer wirklichen Brut gelangten. Durch die reichliche Fütterung mit Ameisenpuppen und hartgekochtem Hühnerei waren die Vögelchen zu üppig geworden, und als wir endlich den immer mehr anschwellenden Nestbau untersuchten, fanden wir darin 34 Eier. Als die Eifütterung dann etwas eingeschränkt wurde, kam wieder eine regelmäßige Brut zu Stande. Nun wimmelt es in meiner Vogelstube von trompetenden Zebrafinken und dieser ganze Segen ist einem einzigen Pärchen in kurzer Zeit entsprossen. Denn ‚als der Großvater die Großmutter nahm', das ist erst $1^3/_4$ Jahre her". Herr Baron von Freyberg in Regensburg züchtete in drei Bruten 19 Junge. Eine interessante Erfahrung machte Herr Apotheker E. Meier in Thorn, die nämlich, daß ein Männchen die Jungen, von welchen das Weibchen gestorben war, glücklich allein auffütterte. Auffallend ist es, daß dieser dreiste, durchaus nicht scheue Vogel sehr leicht die Eier verläßt, wenn man das Nest berührt oder auch nur hineinsieht. Vor jeder Störung sei daher dringend gewarnt. Der Versuch, die Eier anderer, werthvoller Vögel von den so leicht nistenden Zebrafinken erbrüten zu lassen, ist bisher noch niemals geglückt; dennoch dürfte ein Erfolg wol zu ermöglichen sein.

In dem Abschnitt über Vogelzucht werde ich seine Züchtung vorzugsweise eingehend schildern. Dieselbe bietet ja immerhin noch die Aussicht auf einen guten Ertrag. Nachdem die Anzahl der hier gezüchteten, die der eingeführten Zebra-Amandinen — obwol von allen australischen Prachtfinken gerade dieser am reichlichsten herübergebracht wird — bereits ganz bedeutend übertrifft, so sind die Preise für die letzteren zwar schon bis auf 9 Mark und für die ersteren auf 7,5 M., wol gar bis auf 6 M. herabgegangen; dennoch ist es günstigenfalls sehr einträglich, wenn man die eben so kosten- als müheloſe Zucht im mehr oder minder großartigen Maßstabe sachgemäß und dann auch mit Glück betreibt. Und wer nur ein Pärchen zum Vergnügen und aus Freude an der Thierwelt halten will, kann wahrlich keine dankbarere Vogelart wählen.

Die Zebra-Amandine oder der Zebrafink heißt auch braunwangiger Bänderschwanzfink, braunöhriger Bandbürzler (Rchb.), Zebra-Diamant.

Le Moineau mandarin (Vekemans und französische Händler); Diamant zébré, Zébré d'Australie (französische Händler); Chestnut-eared Finch (nach

Gould, Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Zebra-Finch (Jamrach brieflich); Zebravink (holländisch).

Nomenclatur: Loxia guttata, *Vieill.;* Amadina castanotis, *Gould, Gray;* Stagonopleura castanotis, *Cab.;* Taeniopygia castanotis, *Rchb.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 172.

Spermestes castanótis: Supra capite, collo dorsoque subfusco-cinereis; remigibus fuscescentibus, dilutius limbatis; tectricibus caudae superioribus nigris, singulis fascias ovales ternas exhibentibus albas, in uropygium album transientes; genis cinnamomeis; lineola verticali nigra regionem inter rostrum aurantio-rubrum et oculum albam utrinsecus terminante; gula, collo pectoreque incanis, subtilissime nigro-undulatis, hoc fasciam angustam nigram gerente; abdomine crissoque albis; stria laete badia praeter hypochondrium utrumque albo-punctulata; iride rufa; pedibus fulvis. ♀ supra luride fusca; remigibus caudaque nigricante fuscis; stria juxta genas nigra, inde regione reliqua usque ad rostrum gulamque alba; subtus luride albida macula genarum laete cinnamomea coloreque pectoris incano nullis.

Jugendkleid s. S. 175.

Juvenis: supra concolor, luride cineracea remigibus al. obscure cinereis, pallidius limbatis; subtus vix dilutius cinerea; capitis lateribus gulaque sordide cinerascentibus; cauda nigricante, albo-fasciata; stria lata, rostro nigro nitido oculoque interposita alba; pedibus carneis.

Beschreibung des Eies: Gestalt länglich mit zarter, glatter Schale, Farbe auffallend bläulichweiß; Länge 15 mm., Breite 13 mm.

Ovum: longiusculum, e coeruleo album; testa tenui, laevi.

Die Diamant-Amandine [Spermestes guttata].

Tafel IV. Vogel 17.

Eine Anzahl der von Australien zu uns gelangenden Prachtfinken wird von Frankreich her im Vogelhandel mit der Bezeichnung von Edelgesteinen bedacht; unter ihnen ist der bekannteste und zugleich einer der schönsten, der gewöhnliche Diamantvogel.

Sein Oberkörper ist bräunlichgrau, Stirn, Oberkopf und Nacken sind heller weißlichgrau, so daß ihn Vieillot blaßköpfiger Fink [Fringille leucophore] und Latham sogar weißköpfiger Fink [White-headed Finch] benannten. Der Unterkörper ist schneeweiß und ein sehr breiter sammtschwarzer Gürtel umgiebt die Brust und beide Seiten. An dem letzteren heben sich große weiße Punkte von dem tiefen Schwarz schön ab. Prachtvoll aber erscheint das glänzende Scharlachroth am Unterrücken und Bürzel. Der Schnabel ist dunkelroth. Die Verbreitung erstreckt sich, soweit bis jetzt erforscht, über Südaustralien. Gould fand ihn hier an verschiedenen Orten, in Neusüdwales und auf den Liverpool-Ebenen, vorzugsweise in trockenen, steinigen, mit einzelnen Bäumen und wenig Gesträuch bewachsenen Gegenden. Im nahen Fluge leuchtet die rothe Stelle des Unterrückens prächtig hervor. Das nach Prachtfinkenweise runde, gewölbte, aus Gräsern gebaute, sehr große und seitwärts mit einer kurzen Ein-

flugröhre ausgestattete Nest steht gewöhnlich in den Zweigen von Gummi- oder Apfelbäumen und enthält 5 bis 6 Eier. Gould erzählt, daß er es auch mehrmals im Unterbau eines Adlerhorstes gesehen, wie es ja auch bei uns vorkommt, daß Sperlinge scharenweise den großen Strauchbau eines Storchnestes bewohnen, ohne daß dieser arge Räuber ihrer Brut habhaft werden kann. Am 23. Oktober erstieg Natty, Gould's schwarzer Begleiter, ein Nest auf einer hohen Kasuarina, auf welchem der Adler brütete, während der Fink daneben auf den Reisern saß, und brachte die Eier beider Vögel herab.

Der Diamantvogel ist schon seit dem Jahre 1792 bekannt, zuerst abgebildet im Museum Leverianum. Vieillot hält ihn für weniger weichlich als die übrigen australischen Arten, doch hat er ihn nicht selber gezüchtet, auch beschreibt er das Weibchen falsch. Der Vogel war damals überaus selten. Seitdem ist er immer von Zeit zu Zeit lebend in Europa vorhanden gewesen. Nach Bechstein befand er sich in der Sammlung des Herzogs von Meiningen — der wol zu den ersten gehörte, welche in Deutschland viele fremdländische Stubenvögel hielten — noch nicht. Dr. Bolle zählt ihn in seinem Verzeichniß aber mit, obwol doch der Zebrafink in demselben fehlt. Bis zur Gegenwart war der erstere dennoch im Handel recht selten und nur zeitweise zu haben; erst seit kurzem wird er von Hagenbeck und besonders von Jamrach alljährlich in sehr großer Anzahl eingeführt.

In der Vogelstube erscheint die Diamant-Amandine weder so anmuthig-beweglich als die kleinsten Astrilde, noch so lebhaft als der Zebrafink. Sie ist ruhiger und stiller als die meisten Verwandten. Eine besondere Eigenthümlichkeit zeigt sie darin, daß sie nicht in der Weise anderer Finkenvögel trinkt, nach jedem Wasserschluck mit hochgerichtetem Kopfe schlürfend, sondern taubenähnlich schluckend. Ein tief flötender Lockton, welcher in seiner Sonderbarkeit am stillen Abend fast wie ein Aufschrei aus tiefer Brust hallt, und dann einige sonore Baßlaute sind alles, was sie hören läßt. In den letzteren besteht auch der Liebesgesang. Das Männchen setzt sich neben das Weibchen auf einen Ast, erhebt sich, läßt den Körper wieder herabfallen und wiederholt dies Knixen gleichsam taktmäßig, indem die wunderlichen Baßtöne erschallen, welche von dem Weibchen mit den langgezogenen melancholischen Flöten beantwortet werden. Während des Knixens hält das Männchen den Kopf sehr komisch nach unten gerichtet, so daß der Schnabel fast die Brust berührt. Das Nest wird am liebsten auf der Decke eines hochhängenden, mit lichtem Gesträuch belegten Käfigs erbaut; seltener wählen sie ein großes Harzer Bauer, einen hohlen Baumast oder sonst eine Höhlung. Sie schleppen allerlei grobes Genist, vorzugsweise gern aber lange weiche Faststreifen und Strohhalme, zum großen thurmartigen Haufen zusammen und polstern innen mit Federn, Baumwolle und Haaren aus. Die Brutdauer

beträgt 12 Tage. Beide Gatten des Pärchens brüten abwechselnd und die Jungen entwickeln sich sehr langsam, so daß sie erst nach etwa 24 Tagen das Nest verlassen. Jede Brut ist in etwa fünf Wochen vom ersten Ei bis zum Flüggewerden vollendet. Das Jugendkleid ist an Oberkopf, Hals, Nacken und Rücken tief braungrau; Kehle, Brust, Bauch und Unterschwanz graulichweiß; Brustgürtel, Seiten und Schwanz schwärzlich dunkelgrau; Bürzel zart, doch bereits lebhaft roth; Schnäbelchen glänzend schwarz mit bläulichweißer Wachshaut. An der rothen Farbe des Bürzels, sowie an den übrigen Zeichnungen ist die Art sogleich zu erkennen und die Größe bleibt wenig hinter der des alten Vogels zurück. Bei der Verfärbung erscheinen zuerst an den weißen Seiten aschgraue Punkte angedeutet, dann tritt an der Oberbrust und neben dem Schnabel am Auge allmälig Schwarz hervor, an Kehle und Bauch wird das Weiß immer reiner; der Oberkörper dunkelt und nimmt den bräunlichen Ton an, das Roth wird kräftiger; der Schnabel röthet sich zuerst an der Wurzel (s. Tafel XX. Vogel 100; in dieser Verfärbungsstufe etwa im Alter von 6 bis 8 Wochen, beschreibt Gould den jungen Vogel); das Schwarz wird dann immer voller und die weißen Seitenpunkte runden sich ab.

Die Züchtung der Diamant-Amandine ist nicht so leicht, als die der nächstverwandten Arten. Um ein glückliches Ergebniß zu erzielen, bedarf es zunächst der größten Geduld und Ausdauer. Wenn diese Prachtfinken soeben von der Ueberfahrt anlangen, sind sie oft in einem unendlich kläglichen Zustande. Entfedert wie kaum eine andere Art und durch und durch krankhaft, gehen sie regelmäßig in bedeutender Anzahl zugrunde, wenn man sie nicht in sachgemäßer Weise behandelt. Ich komme darauf in einem besondern Abschnitt zurück. Als die nöthigste Pflege sei nur angeführt, daß man ihnen dann jedenfalls die Gelegenheit bieten muß, um sich Schlafnester erbauen zu können, in welchen sie des Nachts die erforderliche Wärme finden. Sie tragen sogleich mit Hast und Eile namentlich weiche Bastfasern ein, polstern emsig mit Federn und Rispen aus und sitzen wol zu vier bis sechs Köpfen dicht aneinander gedrängt des Nachts und auch den größten Theil des Tages hier warm und weich. Dabei erholen sie sich gewöhnlich recht gut, und bewohnen viele Monate, ja wol jahrelang das immer mehr ausgebaute Nest, bis endlich hin und wieder ein Weibchen Eier zu legen beginnt. Aber auch dann kommen sie keineswegs immer zur glücklichen Brut. Ich habe in einem solchen gewaltigen Nestballen Dutzende von verdorbenen Eiern gefunden. Manchmal aber, ehe man es sich versieht, ist ein Nest voller Jungen glücklich flügge. Dies würde viel häufiger geschehen, wenn nicht der große Uebelstand sich zeigte, daß die Vögel in der guten Pflege sich bald zu fett fressen und dann zum Nisten untauglich sind. In den Abschnitten über Züchtung werde ich dies nach den Erfahrungen aller meiner Herren Mitarbeiter, sowie nach meinen eigenen näher erörtern.

Wie ich mit Bestimmtheit anzugeben vermag, haben auch die Herren Graf York von Wartenburg, Emil Linden und Robert Grimm glückliche Bruten erzielt. Der erstere beobachtete, daß sie zuweilen das große Nest in zwei Abtheilungen erbauen, in deren hinterer das Weibchen brütet. Die

Alten tragen, ſolange es irgend geht, die Entleerungen der Jungen ſorgfältig fort und daher bleibt das Neſt verhältnißmäßig ſauber. Zur Aufzucht der Jungen bedürfen ſie durchaus Fleiſchnahrung, aufgeweichtes Eierbrot, Eigelbfutter, friſche Ameiſenpuppen oder kleingeſchnittene Mehlwürmer.

Bei dieſem Vogel ſind die Geſchlechter beſonders ſchwer zu unterſcheiden; dem ſcharfen Blicke erſcheint das Weibchen kaum merklich kleiner und neben dem Männchen läßt es unmittelbar oberhalb des Schnabels von einem ſchwarzen Zügelſtreif zum andern eine merklich blaſſere, faſt weißgraue Stirnbinde erkennen, während das Männchen hier wie am ganzen Oberkopf gleichmäßig grau gefärbt iſt. Zuverläſſig iſt dies Merkmal aber nur bei ganz alten Vögeln, denn die jüngeren haben ſämmtlich die blaſſere Stirn.

Im Geſellſchaftskäfige iſt die Diamant-Amandine harmlos und friedlich, in der Vogelſtube dagegen ſehr bösartig gegen alle kleineren, welche ihrem Neſte nahen, ohne daß ſie jedoch andere in deren Brut ſtört; im Heckkäfige aber, und mag derſelbe noch ſo groß ſein, gehört der Diamantfink zu den ärgſten Raufbolden. Als eine der ſchönſten unter allen Amandinen darf ein Pärchen übrigens wol in keiner Sammlung fehlen.

Die Diamant-Amandine, der Diamantvogel oder Diamantfink, iſt auch Tropfenfink, blos Diamant oder Diamantſperling genannt.

L'oiseau Diamant (Bekemans); diamant ordinaire (franzöſiſche Händler); Spotted-sided Finch (nach Gould, Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Diamant-Sparrow (Jamrach brieflich); Diamantvogeltje (holländiſch). — Spotted Grosbeak, *Lewin;* White-headed Finch, *Lath.;* Spotted-sided Grosbeak, *Lath.*

Nomenclatur: Loxia guttata, *Shw.;* Fringilla Lathami, *Vg.* et *Hrsf.;* Fringilla leucocephala, *Vieill., Lth.;* Amadina guttata, *Gray, Mtch.;* Amadina Lathami, *Gld.;* Stagonopleura guttata, *Cab., Gld., Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberkopf und Nacken bis zum Rücken ſchwach bräunlichgrau, Mantel und Flügel dunkler braungrau, Bürzel und Schwanzdecken glänzend ſcharlachroth; ein breiter Zügel vom Schnabel bis ans Auge und ebenſo eine breite Binde zwiſchen Hals und Bruſt tiefſchwarz; Backen grauweiß; Kehle, Hals, ſodann Unterbruſt, Bauch und Hinterleib reinweiß; die tiefſchwarzen Seiten mit großen weißen Tropfenflecken gezeichnet, Unterflügel bräunlichweiß; Schwanz reinſchwarz; Schnabel blutroth mit lilafarbenem Grunde; Auge röthlichbraun von einem roſenrothen, fein geperlten Ringe umgeben; Fuß ſchwärzlichbraun.

Spermestes guttata: Pileo et cervice subfusco-canis; interscapilio alisque fusco-cinereis; uropygio et supracaudalibus laetissime puniceis; loris latis et fascia pectorali lata atris; genis incanis; gula, collo, abdomine crissoque albis; guttis albis hypochondriorum atrorum amplis; subalaribus sordide canis; cauda nigra; basi rostri sanguinei lilacina; iride subrubra; annulo palpebrali subroseo, granuloso; pedibus e nigro fuscis.

Jugendkleid ſ. S. 179.

Juvenis: supra fuscante cinerea; gula, pectore, abdomine et infracaudalibus sordide albidis; cingulo pectorali, hypochondriis caudaque nigricante cinereis; uropygio

jam laete rubente; hocce et reliquis picturis avicula facile dignoscenda, etiam ab adultae magnitudine parum discrepans.

Beschreibung des Eies: Gestalt rundlich, Farbe glänzend weiß, Schale glatt und feinkörnig; Länge 19 mm., Breite 15 mm.

Ovum: subrotundum, nitidum, album, laeve, granulosum.

Die Feuerschwanz-Amandine [Spermestes nitida].

Von Fräulein Hagenbeck erhielt ich einen Prachtfink, welcher durch seine zarte Schönheit, noch mehr durch sein zahmes, ungemein zutrauliches Wesen mich entzückte. Oberhalb gelblichbraun, unterhalb aschgrau, ist es auf den ersten Blick unscheinbar, allein das ganze Gefieder ist zart, oberhalb schwarz und unterhalb weiß querwellenförmig gezeichnet, an Stirn, Nacken und Kehle am feinsten, nach den Flügeln, sowie nach der Brust und dem Bauch hin mit immer breiteren Wellenlinien. Ein breiter Zügelstreif, schmaler Ring ums Auge und eben solches Stirnband schwarz; die unteren Schwanzdecken reinschwarz und der obere Schwanz bräunlichschwarz; Bürzel und obere Schwanzdecken bis fast zur Hälfte der Außenfahnen an den mittleren Schwanzfedern prachtvoll glänzend scharlachroth; Schwanz im übrigen schwärzlichbraun, unterhalb aschgrau, die äußeren Federn mattschwarz quergestreift. Schnabel blutroth; Auge braunroth; Füße horngrau.

Die älteren Schriftsteller bezeichneten diese Amandine vorzugsweise als die schöne [Fringilla bella, *Vigors*, *Horsfield;* Loxia bella, *Latham*, *Vieillot*]. Auf mich machte das Vögelchen einen ganz eigenthümlichen Eindruck, mehr noch seines Benehmens, als seines Aussehens wegen. Sobald ich in die Vogelstube trat, kam es sogleich herbeigeflogen, mir auf den Arm und versuchte fortwährend, in den Rockärmel oder in die hohle Hand zu kriechen. Dabei war es augenscheinlich von fieberhafter Unruhe getrieben; es suchte immerfort nach irgend einem Futter oder dergleichen, welches ich ihm leider nicht zu bieten vermochte, und ließ dabei seine langgezogenen, tieftraurig ertönenden, flötenden Rufe hören. Mit Betrübniß sah ich ein, daß der Feuerschwanz zugrunde gehen werde, und nachdem ich ihm jedes mögliche Futter, alle Sämereien, welche ich nur beschaffen konnte, Apfelsinen, Feigen und andere Früchte, fein gehacktes Fleisch und allerlei Weichfutter u. s. w. vergeblich gereicht, starb er nach einigen Tagen wirklich. Herr Wiener, welcher mich aus London bald darauf besuchte, gab eine Erklärung dahin, daß die Schiffskapitäne manche Vögel aus irgend einem Grunde im Dunkeln zu halten pflegen und daß dieser Prachtfink vielleicht gerade dadurch umgekommen, daß ich ihn frei in der Vogelstube fliegen ließ. In meinem Besitz ist diese Art jedoch lange genug gewesen, um mich beurtheilen zu lassen, daß er ebenso im Körperbau, wie in der Lebensweise der Diamant-Amandine sehr verwandt ist.

Nachdem der Feuerschwanz bereits von den älteren, vorhingenannten Ornithologen beschrieben worden, gab Gould eine treffliche Abbildung und Schilderung. Die Heimat erstreckt sich über Vandiemensland und Neusüdwales, wo er wahrscheinlich als Standvogel in Scharen von 6 bis 12 Köpfen in den Ebenen

und an lichten Waldstellen lebt, bis in die Gärten der Kolonisten kommt und sich von Grassämereien ernährt. Im pfeilschnellen Fluge leuchtet das schöne Roth des Unterrückens wie beim Diamantfink auffallend hervor. Sein schwermüthiger Lockton erschallt noch länger gezogen und trauriger als der des letzteren. Seiner Zutraulichkeit, Anmuth und schönen Färbung wegen sehen die Ansiedler das Vögelchen sehr gern. Das Nest, welches Gould in Vandiemensland häufig sah, stand ganz frei, ohne irgendwie verborgen zu sein, im Gezweige niedriger Bäume, zu mehreren beisammen, etwa in fußbreiter Entfernung von einander. Es ist aus Gräsern und Pflanzenstengeln kuppelförmig gewölbt, mit dem Flugloch ziemlich von oben herab. Das Gelege besteht in 5—6 Eiern.

Es wäre wünschenswerth, daß dies liebliche Vögelchen demnächst oft und zahlreich eingeführt werde, und dies läßt sich vielleicht erwarten, sobald der Vogelhandel zwischen dem fünften und ersten Erdtheil besser geregelt und namentlich in Hinsicht der Verpflegung des kleinen Gefieders verständiger betrieben wird.

Die Feuerschwanz-Amandine oder der Feuerschwanz wird von Rchb. bürzelglänzender Gürtelastrild, von Gould mit der Bezeichnung der Ansiedler von Vandiemensland feuerschwänziger Fink (Fire-tailed Finch) und von den Eingebornen auf Neusüdwales Wee-bong genannt.

Die Preislisten der Händler, sowie das Verzeichniß des zoologischen Gartens von London führen diesen Vogel noch nicht auf.

Nomenclatur: Loxia bella et nitida, *Lth.;* Loxia bella, *Vieill.;* Fringilla bella, *Vg.* et *Hrsf.;* Amadina nitida, *Gray* et *Mtch.;* Estrelda bella, *Gould, Gray;* Zonaeginthus nitidus, *Cab., Rchb.;* Zonaeginthus bellus, *Gould.* — Black-lined Grosbeak, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 181.

Spermestes nitida. Supra flavente fusca, tenuiter nigro-undulata; subtus cinerea, albo-undulata; undulis frontis, cervicis gulaeque subtilissimis, deorsum dilatantibus; stria lororum lata, annulo oculari angusto fasciaque frontali nigris; infracaudalibus nigris; cauda supra fuscante nigra, subtus cinerea; uropygio, supracaudalibus dimidioque basali pogonii rectricum intermediarum externi igneo-puniceis; rectricibus reliquis nigrescente fuscis, subtus cinereis, exteris transversim subnigro-fasciolatis; rostro sanguineo; iride badia; pedibus corneis.

Beschreibung des Eies (nach Gould): Schön fleischfarbenweiß, Gestalt länglich; Länge $8^1/_2$ Linien ($18{,}5^{mm.}$), Breite $6^1/_2$ L. ($14{,}2^{mm.}$).

Ovum: pulchre carneo-album, longiusculum.

Die rothohrige Amandine [Spermestes oculea].

In der Färbung sowol als auch im Wesen und in der Lebensweise steht dieser Vogel dem vorigen durchaus nahe. Gould fand ihn nur im Gebiet des Schwanenflusses an der Westküste Australiens hier und da recht häufig in offenen, von Dickicht begrenzten Grasebenen mit Moorboden in der Nähe von Landseen und Flüssen, ebenfalls als Standvogel. Mr. Gilbert beobachtete ihn an einsamen, stillen Orten im Dickicht. Gleich den beiden vorher geschilderten läßt auch er den langgezogenen, melancholischen Lockton erschallen. Im Munde der

Eingeborenen von Westaustralien giebt es eine Sage, daß dieser Vogel einst einen Hund gestochen, sein Blut getrunken und davon den rothen Schnabel bekommen habe.

Ich erhielt ein leider todt angekommenes Männchen mit anderen australischen Vögeln zusammen von Fräulein Hagenbeck i. J. 1873 und vermuthe, daß auch dieser Prachtfink wol schon früher zuweilen lebend herübergekommen. Zahlreich dagegen dürfte er niemals im Vogelhandel werden. Die rothohrige Amandine wird von Rchb. augenfleckiger oder rothöhriger Gürtelastrild, und auch Sperlingsastrild geheißen. — In den Preislisten der Händler und in den Verzeichnissen der zoologischen Gärten ist er nicht vorhanden.

Nomenclatur: Fringilla oculea, *Quoy* et *Gaim.*; Zonaeginthus oculeus, *Cab.*, *Gld.*, *Rchb.* — Red-eared Finch, *Gld.*; Native Sparrow (einheimischer Sperling) der Ansiedler am Schwanenfluß; Jéé-ree der Eingeb. im Flachland und Dwér-den-ngool-gnánneer bei den Eingeb. der Gebirgsgegenden von Westaustralien.

Wissenschaftliche Beschreibung. Grundfarbe des vor., doch oberhalb mehr graubraun, Flügel und Schwanz kräftig und das übrige zart dunkel quergebändert; Kinn und Kehle fahlbraun mit feinen Querlinien; Auge von einem vom Schnabel bis zum Ohr reichenden, schwarzen Streif umgeben, neben welchem vom Auge bis hinters Ohr ein glänzend scharlachrother ovaler Fleck sich erstreckt; Hinterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken und der Grund der mittleren Schwanzfedern glänzend scharlachroth; unterhalb bräunlichschwarz mit großen, weißen Tropfenflecken. Schnabel blutroth, am Grunde perlgrau; Auge braunroth; Füße gelbgrau. Weibchen dem Männchen gleichgefärbt. Länge 12,5 cm. (4 3/4 Zoll); Flügel 5,5 cm. (2 Zoll); Schwanz 5 cm. (etwa 2 Zoll).

Spermestes oculea: Colore prioris, at supra magis in cineraceum vergente; alis caudaque distinctus, reliquis tenuiter obscurius fasciatis; mento gulaque luride fuscis, transverse lineolatis; stria a rostro usque ad aurem, oculum includente nigra; subter hanc macula ovali usque ad aurem posticam saturate punicea; subtus e fusco nigra, albo-guttata; basi rostri sanguinei incana; iride badia; pedibus e flavido cinereis. ♀ haud distincta.

Die Gürtel-Amandine [Spermestes cincta].

Tafel IV. Vogel 18.

Mit dem S. 57 beschriebenen Schwarzbäckchen zugleich führte Karl Hagenbeck den Bartfink, wie diese Amandine gewöhnlich genannt wird, im Frühjahr 1869 zuerst ein. Die wenigen, damals vorhandenen Pärchen starben jedoch sämmtlich an einer ansteckenden Krankheit, und dann fehlte der Vogel fast noch zwei Jahre, bis er endlich wieder erschien. Seitdem wird er fast alljährlich regelmäßig, ebenso wie der Diamantvogel herübergebracht. Theils durch diese Sendungen von Australien, theils durch recht ergiebige Züchtung hier, hat er sich so verbreitet, daß er gegenwärtig in jeder Vogelstube zu sehen ist. Nach dem zoologischen Garten von London gelangte er schon im Juni 1861 mit einem von Sidney kommenden Schiffe. In der Gestalt und Größe dem Diamantfink außerordentlich ähnlich, ist er in der Färbung wie im Benehmen ganz bedeutend verschieden. Dennoch sind beide Vögel sehr nahe verwandt. Dies zeigt sich nicht

allein im Körperbau und durch das überaus leichte Zusammenparen, sondern auch durch das eigenthümliche S. 178 erwähnte Wassertrinken. Das Gefieder der Gürtelamandine ist am Oberkopf, Oberhals und an den Backen aschgrau, an den letzteren etwas heller bläulichgrau; ein breiter schwarzer Streif zieht sich vom Schnabel zum Auge, und von der Unterseite des ersteren dehnt sich über die Kehle und den ganzen Vorderhals eine tief sammtschwarze Färbung in der Form eines breiten, zugerundeten Brustlatzes aus; Brust, Bauch und Hinterrücken sind hell kastanienbraun, Flügel dunkelbraun und jede Feder am Außenrande zart heller gesäumt; von dem tiefschwarzen Unterrücken aus erstreckt sich ein eben solcher Gürtel oberhalb der Beine um den Unterleib; Bürzel, Ober- und Unterschwanzdecken nebst Hinterleib reinweiß; Schwanz schwarz. Schnabel glänzendschwarz; Auge dunkelbraun; Füße rosenroth. Das Weibchen ist kaum merklich kleiner, in den Farben düsterer und namentlich an dem etwas schmaleren, matter schwarzen Gürtel zu erkennen.

Gould beobachtete den gebänderten Grasfink, wie er ihn nennt, vielfach in den Liverpool-Ebenen und in den nördlichen offenen Gegenden, selten jedoch nach der Küste hin und in Neusüdwales nur einmal. Zweifellos, meint er, sind die großen Ebenen im Innern die eigentliche Heimat und die Verbreitung ist bis jetzt noch nicht bekannt. Auch über die Lebensweise vermochte der Forscher nichts näheres anzugeben, doch wird dieselbe wol mit der aller Verwandten übereinstimmen.

In der Gefangenschaft erscheint er ungleich anmuthiger und beweglicher als der Diamantvogel und läßt einen kleinen, unter beständigem Kopfnicken vorgetragenen Gesang nebst den langgezogenen Lockrufen sehr oft hören. Auch das Weibchen nickt fortwährend, wenn sie beide in großer Geschäftigkeit, und fast regelmäßig sogleich nach der Ankunft in der Vogelstube, mit dem Nestbau beginnen. Gerade wie bei den Zebrafinken hecken manche Pärchen leicht und ergiebig, mit Gelegen von vier bis neun und sogar zwölf Eiern in mehreren Bruten hintereinander, während andere im größten Eifer zahlreiche Fehlbruten machen. Sie wählen mit Vorliebe ein Harzer Bauer, eine eingerichtete Kokosnuß oder dgl. und erbauen aus Bast- und Agavefasern ein kugelrundes Nest, welches mit Federn und Watteflöckchen ausgestopft wird. Herr G. Schmey in Koburg beschreibt eine Brut in folgender Weise:

„Im Februar d. J. 1871 brachte ich drei Pärchen Bartfinken aus Hamburg mit, welche wol von der ersten größeren Einfuhr dieser Vögel nach Deutschland herrührten. Trotz der empfindlichen Kälte kamen sie ganz gesund hier an. Der Käfig mit einem Pärchen stand im Wohnzimmer dicht neben dem Klavier, auf welchem täglich gespielt wurde und auf eine Brut zählte ich garnicht, weil ich annahm, daß die Vögel durch das Spiel gestört würden. Zu meiner Freude schleppte das Männchen jedoch trotzdem sofort Grashalme, Würzelchen, am meisten aber Kokosfasern und Schafwolle herbei und binnen wenigen Tagen hatte das Weibchen daraus in einem offenen Korbnest ein rundes, ziemlich festes Nest mit seitlichem Flugloch geformt, zu dessen Ausfütterung sehr gern Schwanen-

federn genommen wurden. Das Gelege bestand in vier Eiern, aus denen beide Vögel abwechselnd in zwölf Tagen die Jungen erbrüteten. Gegen Störung sind sie nicht empfindlich, denn ich durfte den Käfig selbst in ein anderes Zimmer bringen, ohne daß sie sich beunruhigt zeigten. Nach 22 Tagen verließen die Jungen das Nest und folgten den Alten mit lautem, bettelnden Geschrei. Drei Bruten folgten in Zwischenräumen von wenigen Wochen hintereinander. Das alte Pärchen war so eifrig, daß es bereits die dritte Hecke anfing, als die Jungen der zweiten noch nicht völlig selbstständig waren. Diese wurden von den mitleidigen älteren Geschwistern mitgefüttert. Aus dem vierten Gelege wurde nichts mehr."

Bei Herrn Apotheker Jänicke in Hoyerswerda zogen die Pfaffenvögel ihre Jungen in einer Volière im Freien, trotz aller Störungen durch Weber- und andere große Vögel, auf. Seitdem ist diese Art von zahlreichen Züchtern mit mehr oder minder guten Erfolgen zur Brut gebracht, so namentlich auch von Herrn Buchhändler Fiedler in Agram und dem Königl. Tänzer Freysing in Berlin. Nach einer Mittheilung des Herrn Ministerial-Sekretär E. Schmalz in Wien hat aber Frau Hedwig Proschek neben vielen anderen gerade diese Vögel mit fabelhaftem Glück gezüchtet. Von einem Pärchen, welches zwei Jahre hindurch fast ununterbrochen nistete, erzielte sie die wirklich staunenswerthe Zahl von 92 Jungen. In dem betrff. Abschnitt werde ich diese Züchtung, welche nur parweise in Einzelkäfigen betrieben wird, eingehend schildern. Jugendkleid: Kopf schmutzig-mäusegrau; Halsseiten lichter bläulichgrau; Kehle und Brustlatz, sowie der Gürtel braunschwarz; Rücken und ganzer Mantel matt lichtbraun, Schwanzdecken und Unterleib düsterweiß; Schwanz braunschwarz; Schnabel grauschwarz; Füße röthlichgrau. Herr Fiedler sagt: „Die ganze Erscheinung des jungen Vogels ist, als wenn ein alter durch einen feinen durchsichtigen, grauen Schleier gesehen würde." Die Verfärbung geht ähnlich der beim Zebrafink beschriebenen in der achten bis zwölften Woche vor sich, indem besonders das Blaugrau des Kopfes, das Schwarz der Kehle und das Schwarz und Weiß des Hinterleibes kräftiger und schärfer getrennt neben einander hervortreten.

In Hinsicht der Verpflegung, sowie in allem übrigen stimmt der Bartfink mit dem Diamantvogel überein.

Die Gürtel-Amandine oder der Bartfink wird auch Pfaffenvogel, Gürtelgrasfink und Gürtel-Rasenweber-Fink (Rchb.) genannt.

Le tisserin du gazon à ceinture (Vekemans); Diamant à bavette (französische Händler, falsch); Banded Grass-Finch (Jamrach u. Brzn. d. zool. Grt. von London; nach Gould); Gebande Grasvink (holländisch).

Nomenclatur: Amadina cincta, *Gould*; Poëphila cincta, *Gould*, *Rchb.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 184.

Spermestes cincta. Pileo, genis, nuchaque cinereis; lateribus capitis collique canis; loris latis, gula, mentoque instar subuculae atris; pectore, abdomine dorsoque dilute badiis; alis fuscis, margine remigum extero dilutius limbato;

cingulo a tergo circa femora ventremque nigro; uropygio, supra- et infracaudalibus albis; cauda nigra; rostro nitido nigro; iride fusca; pedibus subrubris. ♀ vix minor, obscurior cingulo nigro angustiore, dilutiore.

Jugendkleid s. S. 185.

Juvenis: Capite luride cinereo; colli lateribus dilute caesiis; gula, subucula cinguloque fusco-nigris; interscapilio dorsoque fuscantibus; abdomine caudaeque tectricibus sordide albis; cauda e fusco nigro; rostro cinerascente nigro; pedibus rubente cinereis.

Beschreibung des Eies: rundlich, glänzend weiß, glattschalig, Länge 18 mm, Breite 15 mm.

Ovum: subrotundum, nitidum, album, laeve.

Gould's spitzschwänzige Gürtel-Amandine [Spermestes Gouldi]*) ist der vorigen sehr ähnlich und unterscheidet sich auf den ersten Blick nur durch den spitzen, in zwei einzelne lange Federn auslaufenden, schwalbenähnlichen Schwanz. Kopf, Nacken und Kopfseiten sind bläulichaschgrau; Rücken und Flügel gräulichbraun; Schwingen fahl braungrau; ein Streif vom Schnabel bis zum Auge, sowie Kinn und Kehle reinschwarz; Unterseite lebhaft röthlichbraun; wie bei der vorigen zieht sich ein breites, schwarzes Band zwischen dem Unterrücken und reinweißen Bürzel hinab und scheidet auch hier den Unterleib vom ebenfalls weißen Hinterleib und den weißen Unterschwanzdecken; Schwanz schwarz und seine beiden haarfein zugespitzten Mittelfedern doppelt so lang als die anderen. Schnabel röthlichgelb; Auge braun; Füße gelb. Das Weibchen ist kaum verschieden. Länge 15 cm. (5 3/4 Zoll); Flügel 6,2 cm. (2 3/8 Z.); Schwanz 9,8 cm. (3 3/4 Z.) Die Heimat erstreckt sich über das nördliche und nordöstliche Australien.

Gould's spitzschwänzige Gürtel-Amandine ist auch Spitzschwanzfink oder spitzschwänziger Grasfink genannt worden. — Amadina acuticauda, *Gld.*; Poëphila acuticauda, *Gld.*, *Rchb.*; Spermestes Gouldi, *Russ.* — Long-tailed Grass-Finch, *Gould.*

Die Masken-Gürtel-Amandine [Spermestes personata] steht wiederum den beiden vorigen sehr nahe. Oberhalb lichtzimmtbraun; rund um den Schnabel, an der Stirn schmal bis zum Auge und etwas breiter an der Kehle, ein tiefschwarzes Band; Flügeldecken dunkler braun, Schwingen mit gelben Außensäumen; Unterrücken, Bürzel, Hinterleib und Unterschwanzdecken weiß, letztere fein schwarz längsgestrichelt; Schwanz bräunlichschwarz, ebenfalls mit verlängerten, jedoch nicht haarfein ausgezogenen Mittelfedern; unterhalb heller gelbbraun; von einem Schenkel zum andern, aber nicht über den Rücken, eine breite schwarze Binde. Schnabel orangegelb; Auge roth; Füße fleischroth. Das Weibchen ist gleichgefärbt. Länge 8,2 cm. (3 1/8 Zoll); Flügel 5,9 cm. (2 1/4 Zoll); Schwanz 5,2 cm. (2 Zoll). Die Verbreitung dürfte sich nur über den Nordwesten Australiens ausdehnen. Gilbert sah bei Port Essington Flüge von 20—40 Köpfen, welche schwache Rufe, wie twit und einen melancholischen Lockton hören ließen.

„Es ist nicht minder lehrreich", sagt Reichenbach, „die Uebereinstimmung derjenigen Arten zu verfolgen, welche entgegengesetzte Gegenden eines großen

*) Um Doppelnamen innerhalb der Familie der Aegithiden zu vermeiden, muß ich für die bereits S. 153 vorhandene Bezeichnung Spermestes acuticauda hier eine andere wählen; ich thue dies, indem ich dem Forscher die gebührende Ehre erweise.

Welttheils, wie z. B. die von Australien, bewohnen, als zu beobachten, wie schön jeder eigenthümliche Charakter in den Arten einer jeden natürlichen Gruppe sich ausspricht. Die drei neuentdeckten Arten der Gattung Gürtel- oder Gras-Amandine bieten ein schlagendes Beispiel dafür; sie haben nicht nur eine Aehnlichkeit in der tief reh- und zimmtbraunen Färbung ihres Gefieders, sondern auch in dem auffallenden schwarzen Bande, welches sich hinten um den Leib schlingt." Gould erhielt den letztern Vogel in der Sammlung vom Schiffe ‚Adler' durch Mr. Bynoë, dessen Eifer ihn in den Stand setzte, so manche Arten der australischen Fauna kennen zu lernen, und er rühmt mit Recht den Eifer der Offiziere des mehrfach erwähnten Schiffes, welche durch Naturbeobachtungen ihr Andenken verewigt haben, so die Herren Charles Darwin*), Kapitän Wickham, Kapitän Stokes, Dring u. A. — Ueber die Lebensweise dieser Vögel ist nichts bekannt, doch stehen sie jedenfalls in derselben, ebenso wie im Aeußern, dem Bartfink nahe. Lebend eingeführt wurden diese beiden Arten wol noch nicht, denn sie sind meines Wissens noch in keinem zoologischen Garten zu finden.

Die Masken-Gürtel-Amandine oder der Masken-Grasfink (Rchb.) wurde von Gould Masked Grass-Finch benannt. — Poëphila personata, *Gld.*, *Rchb.*

Die weißbäckige Gürtel-Amandine [Spermestes leucótis].

Unter anderen seltenen Vögeln, welche Herr R. Hieronymi in Braunschweig in den englischen Hafenstädten von kleinen Händlern und Schiffern aufgekauft hatte und mir zur Bestimmung übersandte, befand sich auch ein einzelnes Männchen dieser reizenden Art. Sie gleicht in der Gestalt und im Wesen durchaus dem Bartfink, auch zeigt sie dasselbe sonderbare Kopfnicken, nur weicht sie in der Färbung bedeutend ab und erscheint fast noch schöner. Oberkopf, Mantel und Flügel kastanienbraun, letztere etwas dunkler; von der Stirn zieht sich rings um den Schnabel und über die Oberkehle ein tiefschwarzes Band, neben demselben, unter dem Auge bis hinters Ohr, erstreckt sich ein runder, reinweißer Backenfleck; Unterkörper, von der Kehle bis zum Bauch, licht röthlichbraun; Unterrücken, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken weiß, erstere außen zackig schwarz gesäumt; vom Rücken aus reicht ein sehr breites, tiefschwarzes, unterhalb fein weiß gesäumtes Band um den Unterleib; Schwanz schwarz; Schnabel gelbgrau; Auge braun; Füße roth. Weibchen übereinstimmend. Länge 12,4 cm. (4 3/4 Zoll); Flügel 5,9 cm. (2 1/4 Zoll); Schwanz 5,4 cm. (2 1/4 Zoll). Dieser Prachtfink gehört zu denen, welche auf Dr. Leichardt's Expedition von der Moreton-Bay nach Port Essington entdeckt wurden. Gilbert erlegte ihn in der Nähe des Flusses Lynd am 3. Juni 1845 und bemerkte in seinem Tagebuch, daß die Art mit der Masken-Amandine sehr

*) Bemerkenswerth muß es für jeden Vogelfreund erscheinen, daß auch der berühmte Forscher Darwin hier zuerst als eifriger Ornithologe auftritt.

nahe verwandt ist, sich aber durch die Färbung bedeutsam unterscheidet. Ueber die Lebensweise wird nichts angegeben. Mir ging das Vögelchen, nachdem es mit einem Bartfink sich gepart, leider in der Mauser zugrunde, während es so federlos war, daß es nicht einmal zum Ausstopfen taugte.

Die weißbäckige Gürtel-Amandine wurde auch Weißbäckchen oder weißöhriger Grasfink (Rchb.) benannt. In den Listen der Händler und dem Vrzn. d. zool. Grt. von London nicht vorhanden. — Poëphila leucotis, *Gld.*, *Rchb.* — White-eared Grass-Finch, *Gld.*

Spermestes leucotis. Pileo, interscapilio alisque badiis, hisce paullulum obscurioribus; fascia circa rostrum gulamque atra, juxtim macula genarum rotunda alba usque ad aurem posteriorem vergente; subtus dilute rufa; tergo, uropygio, infra- et supracaudalibus albis, hisce exterius serratim nigro-limbatis; fascia perampla atra a dorso abdomini circumdata, infra tenuiter albo-limbata; cauda nigra; rostro luride cinereo; iride fusca; pedibus rubris. ♀ haud distincta.

Frau Gould's Amandine [Spermestes Gouldae]. Eine der herrlichsten aller Prachtfinkenarten hat der berühmte Naturforscher ganz besonders ausgezeichnet, indem er sie dem Andenken seiner Gattin, Mistreß Gould, widmete, jener muthigen Frau, welche ihn auf seinen Reisen begleitete, alle Gefahren mit ihm theilte und ihm treu und immer heiter zur Seite stand; die sich aber namentlich dadurch ein unsterbliches Verdienst erwarb, daß sie, als eine hervorragende Künstlerin, die Vögel für seine Prachtwerke malte. Dieser Vogel ist oberhalb an Flügeln und Mantel schön dunkelgrün; Hinterkopf, Halsseiten und ein Band über den Kopf hellgrün; Vorderkopf, Gesicht bis zum Ohr und Kehle tiefschwarz; Oberbrust lila, fast rosenroth; Unterbrust, Bauch nebst Schwanzdecken lebhaft dunkelgelb; Oberschwanz schwarz; Unterflügel und Unterschwanz aschgrau. Schnabel gelblichroth, an der Spitze blutroth; Füße fleischroth. Länge $9{,}8^{cm.}$ ($3^3/_4$ Zoll); Flügel $6{,}5^{cm.}$ ($2^1/_2$ Zoll); Schwanz $6{,}5^{cm.}$ ($2^1/_2$ Zoll), mit zwei wenig verlängerten Spitzen. Das Jugendkleid ist oberhalb licht olivengrün; Vorderschwingen und Schwanz braun; Kopf einfarbig grau mit weißem Kinn; Unterseite düster leberbraun; Auge dunkelbraun. Die Heimat dürfte sich nur auf das Gebiet des Viktoria-Flusses an der Nordwestküste Australiens beschränken. Das erste Männchen, von Mr. Bynoë dort und zwei junge Vögel von Mr. Gilbert zu Port Essington erlegt, waren anfangs die einzigen, welche Gould erhalten konnte. Gilbert beobachtete sie zu 4—7 Köpfen am Rande der Mangle-Dickichte, wo sie ungemein flüchtig und scheu sich umhertrieben und immer in die Spitzen der höchsten Gummibäume flogen, wie dies keine anderen verwandten Prachtfinken zu thun pflegen. Die Stimme ist ein klagender Ton, ein langgezogenes, zweisilbiges twit. Ihre Nahrung besteht in den Samen der hohen Gräser u. a. Gewächse.

Frau Gould's Amandine nennt Reichenbach: Gould's Gras-Weberfink; er spricht die Hoffnung aus, daß diese schöne Art dereinst für Sammlungen und Vogelhäuser ein beliebter Gast sein werde. Bis jetzt ist der Vogel jedoch noch niemals lebend nach Europa gelangt. — Amadina Gouldiae, Poëphila*) Gouldiae, *Gld.*; Chloëbia Gouldiae, *Rchb.* —

*) Daß die Wortbildung Poëphila, Chloëbia falsch ist, und richtig Poóphila, Chloóbia lauten müßte, sei nur bemerkt, ohne Aenderung dieser Wörter in der Synonymik.

Spermestes Gouldae. Supra, interscapilio alisque laete obscure viridibus; occipite, colli lateribus vittaque supra caput dilute viridibus; sincipite, facie usque ad aurem gulaque atris; jugulo e roseo lilacino; pectore, abdomine et infracaudalibus laete luteis; subalaribus cineraceis; cauda nigra, subtus cinerea; apice rostri aurantii sanguineo; pedibus carneis. — Juvenis: supra dilute olivacea; remigibus exterioribus caudaque fuscis; capite unicolore cinereo; mento albo; subtus obscure hepatica; iride fusca.

Die **wunderschöne Amandine** [Spermestes mirabilis]. Dieser Prachtfink dürfte noch herrlicher sein, als der vorige. Oberhalb ist er ebenfalls lebhaft grün; Oberkopf und Wangen karminroth, von einem schmalen schwarzen Bande umzogen, welches sich vorn verbreitert und die Kehle bedeckt, darauf folgt ein himmelblaues Band, das am Nacken breiter ist; Oberbrust lila, durch einen orangefarbenen Streif vom gelben Bauch getrennt; Bürzel und Oberschwanzdecken hellblau; Schwanz grünlichschwarz und die beiden mittelsten Federn zu fadenförmigen Spitzen bedeutend verlängert. Schnabel röthlichweiß; Füße fleischroth. Länge etwa 11 cm. ($4^1/_4$ Zoll); Flügel 5,9 cm. ($2^1/_4$ Zoll); Schwanz 3,8 cm. ($1^1/_2$ Zoll). Die Naturforscher Hombron und Jacquinot erlegten drei Exemplare in der Raffles-Bay an der Nordwestküste Australiens, wo der Vogel nur selten vorkommt, sodaß sie seine Lebensweise nicht kennenlernen konnten. Daher verfielen sie in den Irrthum, daß die vorherbeschriebene grünköpfige Art das Weibchen dieser rothköpfigen sei. Durch Forschungen von Mr. Gilbert und besonders von Mr. Elsey ist diese Annahme jedoch widerlegt worden. Letzterer fand am Viktoria-Fluß Hunderte von Vögelchen dieser beiden Arten und stopfte zahlreiche für das Londoner zoologische Museum aus, sodaß also keine Ungewißheit mehr möglich ist. Lebend ist auch diese Amandine noch nicht eingeführt worden und ob die beiden farbenreichsten Arten aller Prachtfinken wol jemals unsere Vogelstuben bevölkern werden — wer kann es wissen?

Die wunderschöne Amandine heißt Reichenbach den wunderschönen Gras-Weberfink. — Poëphila mirabilis, *Hmb.* et *Jcq.*, *Gld.*; Chloëbia mirabilis, *Rchb.* — Beautiful Grass-Finch, *Gld.* — Spermestes mirabilis. Supra laete viridis, fascia angusta atra pileum cum genis definiente gulaeque superinduta, juxtim vitta coerulea in cervicem versus dilatante; fascia aurantia pectori et abdomini interjecta; uropygio et supracaudalibus dilute coeruleis; cauda virescente nigra, rectricibus ambabus intermediis in apices perlongos filiformes eductis; rostro rubente albo; pedibus carneis.

* * *

Papagei-Amandinen darf man eine Gruppe ganz absonderlich erscheinender Prachtfinken nennen, deren hauptsächliches Kennzeichen ein grünes, mehr oder minder buntes Gefieder ist. In jener Benamung folge ich dem Forscher Gmelin, welcher der einen Art die Bezeichnung S. psittacea beigelegt hat. Reichenbach heißt sie Scharlach- oder Stummelschwänze [Erythrura, *Swns.*; Acalanthe, *Vieill.*; Amblynura, *Rchb.*]; in einer neueren Naturgeschichte sind sie als Sittichfinken angeführt. Nur das eine dieser Vögelchen gelangt lebend nach Europa, während alle übrigen im Handel wol noch niemals vorgekommen.

Die lauchgrüne Papagei-Amandine [Spermestes prásina].

Tafel IV. Vogel 20.

Der von den Händlern als ostindischer Nonpareil ausgebotene Prachtfink ist oberhalb tief grün, an Stirn, Gesicht und Kehle bis zum Kropf lebhaft blau; Flügelschwingen schwärzlichbraun, außen schmal olivengrün gesäumt und innen fahlgelb gerandet; Brust, Bauch und Seiten bräunlichgelb, roth angehaucht und an der Brust- und Bauchmitte in volles Scharlachroth übergehend; Schwanz schwärzlichbraun, jede Feder mit breitem, rothem Außenrande, die beiden mittelsten sehr verlängerten Federn und die oberen Schwanzdecken scharlachroth. Schnabel schwarz; Auge braun; Füße fleischroth. Dem Weibchen fehlen das blaue Gesicht, der rosenrothe Brustanflug und die scharlachrothen langen Schwanzfedern. Es ist oberhalb düster grün, unterhalb fahl bräunlichgelb mit rothbraunem Schwanz. Im Alter tritt das Blau um den Schnabel schwach hervor, auch verlängern sich die beiden mittelsten Schwanzfedern ein wenig. Größe des Riesenelsterchens.

Wer die Abbildung betrachtet, wird zugeben, daß ein kurzer, treffender Namen für diesen Vogel schwer zu geben ist; Scharlachschwanz (Rchb.) ist nicht stichhaltig, weil nur die beiden mittleren Schwanzfedern scharlachroth sind. Somit hielt ich mich an das lateinische Wort prasina, zumal auch unter den Amandinen die grüne Färbung nicht oft bemerkt wird.

Mit Sicherheit ist wol kaum festzustellen, seit welcher Zeit dieser Prachtfink zuerst nach Europa gebracht worden. Vieillot hat ihn kurz erwähnt, Bechstein war er unbekannt, Bolle zählt ihn nicht mit und bis zur neuesten Zeit ist er immer nur selten im Handel zu haben. Viele der ältesten und erfahrensten unter den jetzt lebenden Händlern kennen ihn gar nicht. Das erste Pärchen, welches ich sah, hatte Herr C. Lintz in Hamburg an den alten Bewig in Berlin gesandt, bei welchem früher manchmal gar seltene Vögel zu finden waren. Später bezog man die eben so schöne als seltene lauchgrüne Amandine zuweilen von Herrn Dr. Funk in Köln und gegenwärtig wird sie hin und wieder von Karl Hagenbeck oder Bekemans eingeführt. Auch sie kommt leider regelmäßig in den meisten Exemplaren todtkrank an*) und die wenigen, welche ich am Leben behielt, waren immer nur Weibchen. Es ist eine sonderbare Erscheinung, daß von manchen Vogelarten oft nur ein Geschlecht gut oder doch besser als das andere die Reisebeschwerden übersteht.

In der wissenschaftlichen Literatur ist fast gar nichts über diesen Vogel vorhanden. Die Heimat beschränkt sich nur auf die Inseln Java und Sumatra. Raffles sagt, daß er auf der letztern gemein ist und in den Reisfeldern be-

*) Dieser überaus bedeutsame Uebelstand in der Einfuhr fremdländischer Vögel verdient eine ernste Besprechung; dieselbe soll ihm in diesem Werke weiterhin zutheil werden.

deutenden Schaden verursacht. Im übrigen soll die Lebensweise der anderer Prachtfinken gleichen, und die Nahrung besteht hauptsächlich in Gras- u. a. kleinen Samen. Das Nest soll in Felsenlöchern oder zwischen Steinhaufen kunstlos gebaut sein. Näheres ist aber nicht mitgetheilt.

Als Bewohner der Vogelstube würde der Vogel, wenn häufiger zu haben, seines wirklich herrlichen Gefieders wegen, sich wol allgemeiner Beliebtheit erfreuen, umsomehr da er harmlos und verträglich, sowie ausdauernd zugleich ist und wahrscheinlich auch überaus leicht zur Brut schreitet. Einen Gesang habe ich nicht gehört, da mir die Männchen zu früh starben. Der Lockton ist ein schrilles zit. Die Fütterung, Verpflegung und Züchtung wird von der verwandter Finkenvögel nicht abweichen, welche für gewöhnlich nur Sämereien fressen, zur Nistzeit aber auch Ameisenpuppen u. dgl. verbrauchen. Der Preis ist hoch, etwa 42—45 Mark und im Großhandel mindestens 24 Mark.

Die lauchgrüne Papagei-Amandine, der sog. ostindische Nonpareil, Scharlachschwanz oder lauchgrüner Scharlachschwanz, wurde auch Vierfarb benannt. Quadricolor (Vekemans); Fire-tailed Finch (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Roodstaart-vink (holländisch). In den Listen der deutschen Händler als Scharlachschwanz oder ostindischer Nonpareil angeführt.

Nomenclatur: Fringilla prasina, *Sparrmann, Hrsf., Vll.;* Loxia prasina, *Rffl.;* Amadina prasina, *Gray;* Erythrina prasina, *Blth.;* Erythrura prasina, *Sprrm., Hrsf., Hrtl., Rchb.;* Erythrura viridis, *Swns.;* Emberiza quadricolor, *Gml.;* Lonchura quadricolor, *Lyk.;* Fringilla sphenura, *Tmm.* — Binglis (auf Java, *Hrsf.*); Rannas (Malayen auf Sumatra, *Rffl.*). — Grosbec de Java, *Buff.;* Red-rumped Bunting, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 190.

Spermestes prasina. Supra saturate viridis; mento, facie gulaque usque ad jugulum laete coeruleis; remigibus nigricante fuscis, exterius olivaceo-limbatis, interius luride marginatis; pectore, abdomine et hypochondriis fulvis, rubente afflatis; pectore abdomineque mediis saturate puniceis; rectricibus nigrescente fuscis, singulis late rubro-marginatis; supracaudalibus et rectricibus ambabus intermediis subelongatis puniceis; rostro nigro; iride fusca; pedibus carneis. ♀ facie coerulea et afflatu pectoris roseo et rectricibus ambabus longis puniceis nullis; ceterum supra sordide viridis; subtus luride fulva; cauda rufescente; grandior aevo circa rostrum subcoerulea. Länge 12 cm. (47/12 Z.), Flügel 5,6 cm. (2 1/6 Z.), Schwanz 6,2 cm. (2 1/3 Z.).

Jugendkleid (nach Sprrm.): Oberhalb bräunlich, Flügelfedern fahl gesäumt; unterhalb ganz fahl.

Reichenbach beschreibt nach Hartlaub („Proceedings" 1858) eine Anzahl hierher gehörender Amandinen, welche jedoch für die Liebhaberei keine Bedeutung haben, weil ihre Einführung kaum zu erwarten ist. Manche derselben sind noch nicht sicher als Arten festgestellt und fallen wol mit anderen zusammen. Einige mag Vieillot besessen haben und dieselben sind dann, wie ja überhaupt auch nicht wenige andere überseeische Vögel, seit jener Zeit aus dem Handel leider wieder völlig verschwunden.

Die **dreifarbige Papagei-Amandine** [Spermestes trichroa], ein Prachtfink, der vorzugsweise geringe Aussicht einer Einführung im lebenden Zustande bietet, weil er sogar in den meisten Museen noch kaum vorhanden ist, sei hier dennoch an-

gefügt, da der Reisende von Kittlitz eine Schilderung seines Freilebens gegeben, mit welchem das aller Verwandten, namentlich das der nächststehenden lauchgrünen Amandine, zweifellos übereinstimmen wird: „Dieser schöne, kleine Vogel ist in seiner Heimat, der Insel Ualan weniger selten, als er seiner Schlauheit und versteckten Lebensweise wegen erscheint. Er lebt einzeln (wol pärchenweise) fast überall, wo Pflanzungen von Bananen u. dgl. sind, hält sich hier gern niedrig an der Erde im Verborgenen. Wenn er aufgescheucht wird, fliegt er sehr weit und läßt dabei seinen Lockton, ein scharfes und feines zitt, zitt, hören. Einen Gesang vernahm der Forscher nicht. Seine Nahrung sind kleine Sämereien, besonders die Samen einer Distelart. Die Geschlechter scheinen nicht verschieden zu sein. Das Gefieder ist einfarbig schön papageigrün mit blauen Wangen und düster blutrothem, keilförmig zugespitzten Schwanz. Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Beine hell fleischfarben. Größe 12 cm. (4⁷/₁₂ Z.) — Fringilla trichroa, *Kttl.*; Erythrura Kittlitzii, *Bp.*, *Hrtl.*; Estrelda trichura, *Gray*; Erythrura trichroa, *Bp.*, *Hrtl.*, *Rchb.*

Die **eigentliche Papagei-Amandine** [Spermestes psittácea] oder der eigentliche und schönste Papageifink ist prächtig dunkelgrün, am ganzen Kopf bis zum Halse und ebenso am Bürzel und Schwanz glänzend scharlachroth; Schnabel braunschwarz, Auge orangeroth, Füße braun. Seine Heimat ist Neukaledonien, sein Freileben nicht bekannt. Vieillot hat ihn abgebildet, doch nichts über ihn angegeben. Rchb. nennt ihn Papagei-Weberfink und Br. Sittichfink. — Fringilla psittacea, *Gm.*; Fringilla pulchella, *Frstr.*; Estrelda psittacea, *Gr.*; Erythrura psittacea, *Bp.*, *Hrtl.*; Acalanthe psittacea, *Vll.*, *Rchb.*; Poëphila Paddoni, *Gllr.* — Parrot-Finch, *Lath.*; Chardonneret acalanthe, *Vll.* — Tenie (Eingeb. von Neukaledonien); Dumbeea und Guerubeea (Eingeb. der Insel Nu).

Die **kurzschwänzige Papagei-Amandine** [Spermestes cyanóvirens]. Dem vorigen ähnlich und vielleicht noch schöner, mit scharlachrothem Kopf, prächtig blaugrünem Rumpf und blutrothem Schwanz, bedarf dieser, selbst in seiner Heimat, den sogenannten Schiffer- oder Feehn-Inseln nur selten vorkommende Vogel hier wol blos der Erwähnung. — Geospiza cyanovirens Pealei; Erythrura cyanovirens, *Hrtl.* et *Fnsch*; Amblynura cyanovirens, *Rchb.*

* * *

„Als noch Segelschiffe an der Westküste von Afrika häufig anlegten, empfingen wir von dort zahlreiche schöne Vögel, deren manche seitdem aus dem Handel völlig fortgeblieben sind, so z. B. der Granatastrild und die rothköpfige Amandine." Diese Klage des alten, vielerfahrenen Lintz trat mir lebhaft vor Augen, wenn ich im Laufe der Zeit hin und wieder einen Samenknacker [Spermospiza, *Gray*] erhielt, einen Vogel aus jener Gruppe, welche einige Ornithologen zu den Kernbeißern, andere aber und wol mit größerm Recht zu den Prachtfinken stellen.

Die rothbrüstige Samenknacker-Amandine [Spermestes haemátina] und Die geschuppte Samenknacker-Amandine [Spermestes Luchsi].*)

Zu verschiedenen Zeiten sandte mir Fräulein Hagenbeck einen einzelnen dieser Dickschnäbel. Es sind stattliche, tiefschwarze Vögel mit glänzend scharlachrother Brust, die letztere Art mit weißgeschupptem Unterleibe. Die Größe ist der unseres Feldsperlings etwa gleich.

Vieillot sah die Loxie mouchetée nur ausgestopft in Perreine's Sammlung und schildert sie ganz kurz. Die Richtigkeit seiner Behauptung aber, daß die Samenknacker einen angenehmen Gesang hören lassen, ein halbkugeliges, oben offenes Nest erbauen und blaue, rothgefleckte Eier legen, ist zu bezweifeln, obwol andere Schriftsteller dieselbe kaum mit Vorbehalt nachgeschrieben haben. Entweder gehören die Vögel zu den Prachtfinken, zu welchen sie von jenen doch ohne weiteres gezählt werden, dann aber hätte eine solche Angabe von vornherein als unrichtig bezeichnet werden müssen; oder Hartlaub hat Recht, indem er die Samenknacker zu den Kernbeißern stellt, welche letzteren allerdings farbige Eier legen und mehr oder minder gut singen. Nach meiner Ueberzeugung sind sie jedoch Amandinen.

Die Heimat beider Arten erstreckt sich über Westafrika, doch ist die Gesammtverbreitung noch keineswegs bekannt. Reichenow fand die letztere dieser beiden Arten in den Kamerunniederungen und Bergen häufig, sowie auch in Aguapim.

In meiner Vogelstube hielten sich die Samenknacker jahrelang vortrefflich und alle zeigten sich im Wesen übereinstimmend, als stille, sehr dreiste, doch durchaus nicht zutrauliche, gewöhnlich im dichten Gebüsch sich verbergende Vögel. Einen Gesang habe ich niemals vernommen, und da ich immer nur zeitweise einen einzelnen hatte, so kann ich über das Nisten u. s. w. leider nicht berichten. Sobald der Vogelhandel sich dem Westen Afrikas wieder regsamer zuwendet, werden wir, neben vielen anderen schönen Vögeln, auch die Samenknacker wol häufiger sehen, da sie nach den Mittheilungen der ältesten Großhändler früher nicht selten eingeführt worden.

Die rothbrüstige Samenknacker-Amandine ist auch, wenig passend, Blutknacker und blutbrüstiger Samenknacker (Rchb.) benannt. — Blue-beaked Weaverbird (Jamrach und Vrz. des zool. Grt. v. London). In Paris hatte die Vogelhandlung von Ruspini ein Exemplar unter dem Namen le Rouge-noir.

Nomenclatur: Loxia haematina, *Vll.*; Fringilla punctulata, *Voigt*; Spermophaga cyanorhyncha, *Sws., Jrd., Slb.*; Spermospiza haematina, *Gray, Hrtl., Rchb.* — Crimson-breasted Grosbeak, *Lath.*; la Loxie haematine, *Vieill.*

*) Auch für diesen Vogel mußte ich einen andern Namen suchen, da die Bezeichnung S. guttata bereits früher für die Diamant-Amandine, S. 177, vergeben war. Ich wählte die Bezeichnung meinem Freunde Dr. Luchs in Warmbrunn zu Ehren, der als liebevoller Züchter und gelehrter Forscher zugleich eine solche Anerkennung verdient.

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberhalb einfarbig tiefſchwarz, Wangen und Halsſeiten fahler bräunlichſchwarz; Kehle, Unterhals und ganze Bruſt glänzend ſcharlachroth, das Roth zieht ſich an den Bauchſeiten mehr oder minder tief herab; Unterflügel und Unterſchwanz grauſchwarz. Schnabel bläulichſchwarz, Spitze und Schneidenränder roth; Auge dunkelbraun; Füße hornfarben. — Weibchen oberhalb dunkel braungrau; Kehle, Vorderhals, Bruſt und Seiten ſcharlachroth, Stirn und Wangen matter roth, Oberſchwanzdecken glänzendroth, Bauch dunkel graubraun mit vielen weißen Flecken. — Jugendkleid bräunlichſchwarz, unterhalb etwas heller, auf der Bruſt einige ſcharlachrothe und auf den Oberſchwanzdecken dunkelröthliche Federn (nach Caſſin).

Spermestes haemátina: supra unicolor atra genis collique lateribus fuscante nigris; gula, jugulo, pectore et hypochondriis fulgide puniceis; subalaribus et infracaudalibus cineraceo-nigris; tomiis apiceque rostri coerulescente nigri rubris; iride fusca; pedibus corneis. Länge 13,9 cm. (5 1/3 Z.); Flügel 5,4 cm. (2 1/12 Z.); Schwanz 2,8 cm. (1 1/12 Z.).

Die geſchuppte Samenknacker-Amandine wurde auch blos Samenknacker oder weißbetropfter Samenknacker (Rchb.) geheißen. — Blue-beaked Weaverbird (Brzn. d. zool. G. v. London).

Nomenclatur: Loxia guttata, *Vll., Vrr.;* Spermospiza guttata, *Gray, Hrtl., Rchb., Rchn.;* Spermestes Luchsi, *Rss.* — Crimson-breasted Grosbeak, *Lath.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Sie iſt der vorigen ganz gleich, nur zieht ſich das Scharlachroth höher bis zu den Backen hinauf, bildet auch einen Zügelſtreif und erſtreckt ſich zugleich über die oberen Schwanzdecken; der Bauch iſt bräunlichſchwarz mit zahlreichen kreisrunden weißen Doppelpunkten. Schnabel glänzend ſchwarzblau, Schneidenränder und Spitze roth; Auge braunroth mit weißen Lidern; Füße ſchwärzlichfleiſchfarben mit gelben Zehenſohlen. — Das Weibchen iſt oberhalb mehr braunſchwarz und die rothe Färbung iſt etwas beſchränkter, auch düſterer; die weißen Punkte ſind kleiner. — Jugendkleid bräunlichſchwarz mit einigen ſcharlachrothen Federchen an Kehle und Bruſt, Oberſchwanzdecken glänzendroth (nach du Chaillu). Beim jüngeren Vogel: Auge dunkel; Schnabel ſchwarzblau mit gelbbraunen Kanten; Füße ſchwarz oder grünlich ſchwarzgrau (Rchn.).

Spermestes Luchsi: praecedenti simillima, at colore puniceo altius usque ad genas vergente; loris angustis et supracaudalibus puniceis; punctis bifariis albis abdominis fuscante nigri crebris; tomiis apiceque rostri nitidi subcoeruleo-nigri rubris; iride fusca; pedibus obscure carneis. ♀ supra magis subfusco-nigra, parcius rubro-signata, maculis albis minoribus. Länge 13,9 cm. (5 1/3 Z.); Flügel 6,3 cm. (2 5/12 Z.); Schwanz 4,8 cm. (1 5/6 Z.). — Nach Rchn. Länge 14—15 cm.; Flügel 6,5 cm.; Schwanz 5 cm.

Dem Plane meines Werkes gemäß, glaube ich in den vorſtehenden 50 Arten alle Prachtfinken geſchildert zu haben, welche bisher lebend nach Europa eingeführt worden. Es ſind 23 Aſtrilde und 27 Amandinen. Daran habe ich 13 Aſtrilde und 11 Amandinen gereiht, welche noch nicht im Vogelhandel vorhanden geweſen, die jedoch den erſteren nahe verwandt ſind oder die Ausſicht bieten, daß ſie demnächſt ebenfalls in unſeren Käfigen und Vogelſtuben erſcheinen werden. Die obige Darſtellung dieſer ebenſo beliebten als liebenswürdigen Vogelfamilie dürfte nun wol die ausführlichſte ſein, welche bis jetzt veröffentlicht worden; dennoch kann ſie keineswegs ſchon als eine vollſtändige, durchaus erſchöpfende gelten. Sobald einerſeits noch wenig bekannte Striche, namentlich im Innern Afrikas und Auſtraliens nebſt mehreren Inſeln, der Forſchung und dem Weltverkehr weiter erſchloſſen ſein werden und wenn andrerſeits der Großhandel zahlreiche unzugängliche oder wieder vernachläſſigte Gegenden lebhaft eröffnet, ſo dürfen wir nicht allein darauf hoffen, daß die zoologiſchen Muſeen noch mit mancher neuentdeckten Art bereichert werden, ſondern auch darauf, daß die Einfuhr überſeeiſcher Vögel nach Europa beiweitem mannigfaltiger wird. Dann aber können wir erſt eine vollendete, wiſſenſchaftliche und allverſtändliche Beſchreibung aller Prachtfinken erwarten. Selbſtverſtändlich werde ich diejenigen Arten, welche bis zum Schluß dieſes Buches noch eingeführt werden ſollten, in einem Anhange nachholen.

Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

Die Widafinken [Viduae].

Von dem weſtafrikaniſchen Landſtrich Wida trägt eine Familie ſehr auffallend geſtalteter Finken den Namen, welcher eine wunderliche Auslegung gefunden. Linné hat ihn in Vidua*) verwandelt und die Uebertragung dieſes Wortes in alle Sprachen wurde im Handel und in der Liebhaberei um ſo leichter eingebürgert, da die meiſten der hierher gehörenden Vögel in dunklen Farben und mit langen Schleppſchwänzen erſcheinen; man nennt ſie daher volksthümlich überall Witwenvögel.

Obwol die Widafinken im allgemeinen, in der Lebensweiſe, Ernährung u. ſ. w., mit den Prachtfinken übereinſtimmen, ſo zeigen ſie doch auch ſehr bedeutſame Unterſchiede. Sie haben ſämmtlich ein anſpruchsloſes, graues Federkleid, welches aber mit der Brutzeit in ein glänzendes, buntes Prachtkleid übergeht und ſich nach beendetem Niſten wieder zum grauen Gefieder zurückverfärbt; dies geſchieht theils durch Farbenwechſel, theils durch eine beſchränkte Mauſer. Zugleich verlängern ſich dann die mittleren Schwanzfedern um das doppelte bis dreifache der Länge des ganzen Körpers und nehmen dabei eine dach- oder pultartig gewölbte, ſchwertförmige oder hahnenſchwanzartige Geſtalt und ein marmorirtes Ausſehen an.**) Dieſe langwallenden Schwanzfedern, ſowie die ſchönen Farben verleihen dem Vogel eine ganz abſonderlich maleriſche Pracht. Wenn das Gefieder grau zu werden anfängt, ſo fallen die langen Schwanzfedern, aber nur ſie allein, aus und in einigen Wochen wachſen an ihrer Stelle andere nach, welche vorläufig jedoch nur die gewöhnliche Länge des Schwanzes erreichen und grau ſind.***)

*) Mit Berückſichtigung der Sitte, daß für die Genusnamen doch nur altklaſſiſche Worte gewählt werden dürfen und daß es am wenigſten thunlich erſcheint, eine Linné'ſche Bezeichnung umzuſtoßen, wenn man nicht einen vollgültigen Erſatz für dieſelbe findet, wagte ich nicht, das Wort Vidana (alſo Widavogel) unterzuſchieben. Möge lieber die Meinung zur Geltung kommen, daß die ſchwarze, weiße und braune Färbung des Prachtkleides und der ſchleppenartige Schwanz wirklich einen Hinweis auf die Erſcheinung einer menſchlichen Witwe geſtatte und mögen alſo dieſe Vögel immerhin volksthümlich Witwen benannt werden.

**) Die Bildung der Schwanzfedern der im Vogelhandel als Paradieswitwen bekannten Vögel (Steganura) ſchildern Finſch und Hartlaub in folgender Weiſe: „Die vier mittleren Schwanzfedern zeichnen ſich durch eine höchſt merkwürdige Geſtaltung aus. Sie haben eine ſehr breite, aufrechtſtehende Fahne und fühlen ſich hornartig an. Die beiden mittelſten ſind breiter, aber bedeutend kürzer als das fünfte Paar, von elliptiſcher Form mit fadenförmig vorragendem nackten Schafte. Das fünfte Paar iſt außerordentlich verlängert und verſchmälert ſich vom breiten Grunde bis zu der ſtumpfen Spitze allmälig."

***) In der überſichtlichen Schilderung der Webervögel werden die Leſer eine eingehende Beſchreibung des Vorgangs der Verfärbung finden.

In ihrem Aeußern, in der Haltung und den Bewegungen stehen die Widafinken den Ammern und Lerchen nahe (schon Linné stellte sie zu den ersteren), doch haben sie eine abweichende, besondere Eigenthümlichkeit, indem sie nämlich beim Futtersuchen auf der Erde hühnerähnlich scharren. Wenn der Vogel hin- und hertrippelt, fährt er plötzlich blitzschnell vor- und rückwärts und dies wiederholt sich von Zeit zu Zeit, indem er hin und wieder ein Körnchen aufpickt.

Alle Widafinken sind nur in Afrika heimisch. Ihr Freileben wird zweifellos dem anderer Finkenvögel gleichen; es ist überaus wenig bekannt. Die meisten Arten bewohnen vorzugsweise sumpfige Gegenden, Wiesen, Ufer u. dgl. Einige sollen zuzeiten an Hirse u. a. Getreide recht schädlich werden. Männchen und Weibchen leben nicht in der zärtlichen Ehe, welche die Prachtfinken zeigen, sie kümmern sich vielmehr anscheinend garnicht um einander. Die Brutzeit hindurch findet man sie jedoch parweise und späterhin in mehr oder minder großen Scharen beisammen. Von verschiedenen Seiten ist die Behauptung aufgestellt worden, daß sie in Vielehe leben, und diese Annahme dürfte, sei es nur bei einigen oder bei allen Arten, immerhin zutreffend sein. Während der Liebeszeit sind die sonst stillen, harmlosen Vögel sehr erregt und erscheinen dann durch ihre tanzartigen Bewegungen in der Luft sehr auffallend. Ueber ihre Fortpflanzung haben die Reisenden bis jetzt noch fast garkeine Mittheilungen gemacht, und umsomehr ist es zu bedauern, daß bisher auch noch keine nennenswerthen Zuchterfolge erlangt sind. Die Größe wechselt von der eines Zeisigs bis zu der eines Stars. Ihre Nahrung in der Freiheit besteht, mit der aller verwandten Finken übereinstimmend, in kleinen Sämereien von Gräsern und Kräutern, sowie auch fragelos in Kerbthieren. Im Käfige füttert man sie mit Hirse und Spitz- oder Kanariensamen nebst Zugabe von Ameisenpuppen, Mehlwürmern und derartigen Gemischen.

Die Verfärbung geschieht, dem Frühlinge ihrer Heimatsstriche entsprechend, bei den meisten Arten mit dem Beginn unserer Herbstmonate, und nur in dieser Zeit können sie auch zur Brut schreiten. Ihr Nisten läßt sich daher nicht, wie das der Prachtfinken, durch Entziehung der Gelegenheiten bis zu unserer warmen Jahreszeit verschieben; sie gelangen in das Hochzeitskleid, gleichviel ob sie Gelegenheit zur Hecke finden oder nicht. In dieser Frist werden die Männchen, welche allein den Farbenschmuck anlegen, auch in der Gefangenschaft außerordentlich stürmisch. Ihre Liebestänze führen sie nicht auf der Erde oder auf einem Zweige sitzend, sondern, wie schon erwähnt, fliegend in der Luft aus, indem sie über ihren Weibchen oder auch über anderen Vögeln einige Minuten schnell auf- und niederhüpfend flattern. Dabei wird der lange Schwanz malerisch auf- und niedergeworfen, während sie ein lautes, nicht besonders melodisches Geschrei erschallen lassen. Im übrigen ist ihr Gesang, welchen sie auch außer der Nistzeit, vornehmlich aber im Prachtgefieder sehr eifrig hören lassen, für

ein nicht zu sehr verwöhntes Ohr keineswegs unangenehm; in der Liebeszeit wird er aber zu viel von gellenden Tönen unterbrochen. Ueberhaupt gerathen die Männchen dann in eine förmlich fieberhafte Unruhe, fliegen den ganzen Tag mit wehenden und wallenden Schwänzen hin und her und zwar gewöhnlich ein und denselben Strich. Im grauen Gefieder sind die Männchen und Weibchen gleicherweise harmlos und gegen alle übrigen Vögel friedfertig; im Prachtkleide dagegen zeigen einige Arten eine nur zu große Unverträglichkeit, sodaß man sie im Gesellschaftskäfige oder gar in der Vogelstube, wo viele Pärchen nisten, nicht halten darf. Schon durch die fortwährende Unruhe, das hastige Fliegen, namentlich aber durch das Wehen der langen Schwänze, werden alle übrigen Vögel in Furcht gejagt, die kleineren und kleinsten oft in tödtliche Angst und selbst große in arge Unruhe. Keinenfalls darf man einen Widafink im Prachtgefieder plötzlich in eine Vogelstube bringen, wenn man nicht auf überaus viel Unheil gefaßt sein will. Die Dominikaner-Wida sollte man in einem von Prachtfinken u. a. kleinen Vögeln bewohnten Raum garnicht halten, weil sie, wie ich weiterhin ausführen werde, zu bösartig ist. Die harmlose Paradieswida dagegen darf man wol in der Vogelstube halten, wenn man nur die Vorsicht beachtet, daß man sie im grauen Kleide fliegen läßt, sodaß sie das Prachtgefieder allmälig anlegt.

Unter allen fremdländischen Stubenvögeln hält es, nach den übereinstimmenden Erfahrungen aller Vogelwirte, am schwersten, die Widafinken zu züchten. Selbst, wenn man das Opfer bringt, es zu dulden, daß ein Pärchen dieser Vögel lange Zeit hindurch andere in den Bruten stört, so erreicht man dennoch kaum jemals den Erfolg, daß sie selber nisten, und wenn dies auch wirklich einmal geschieht, so bringen sie doch schwerlich die Jungen zum Flüggewerden. Ein Zuchtversuch im Käfige hat von vornherein keine Aussicht auf Gedeihen, wenn der letztere nicht sehr umfangreich ist, sodaß er dem Männchen freien Raum für seine stürmischen Bewegungen gewährt. Die Ursachen der erschwerten Züchtung dieser Vögel liegen aber nicht allein in der Lebhaftigkeit der Männchen, sondern auch in der außerordentlichen Schüchternheit der Weibchen begründet; hauptsächlich aber wol darin, daß wir ihnen irgend einen nothwendigen Nahrungsstoff, oder vielleicht richtiger, die geeignete Nistgelegenheit und die passenden Dinge zum Nestbau nicht zu bieten vermögen. Bevor die Naturforscher in der Heimat dieser Vögel eingehende Studien über die Ernährung und Brutentwickelung gemacht, ist an ihre Züchtung kaum zu denken. Anleitung zu Züchtungsversuchen mit ihnen in Gewächshäusern — wie solche schon Vieillot vorgeschlagen und wie sie in Holland bereits im vorigen Jahrhundert angestellt worden — werde ich weiterhin geben.

Im übrigen sind die Widafinken als Stubenvögel sehr geschätzt und zwar mit Recht. Sie vereinigen mit der Schönheit des Gefieders eine große Anspruchslosigkeit, sodaß sie sich bei einfacher Pflege im Käfige, wie in der Vogel-

ſtube viele Jahre hindurch munter und ziemlich ausdauernd zeigen; im allgemeinen ſind ſie freilich etwas weichlicher als die Prachtfinken. Beſonders wenn ſie ſoeben eingeführt worden, ſterben ſie oft in nur zu großer Anzahl, an Krankheiten, deren Keim die Reiſeanſtrengungen gelegt und welche namentlich durch das veränderte Futter (anſtatt afrikaniſcher Hirſe, gewöhnliche weiße) zum Ausbruch kommen. Eingewöhnt erhalten ſie ſich aber vortrefflich; ſo hat Herr Dr. Luchs eine Dominikanerwitwe, welche ſich ſeit zehn Jahren des beſten Wohlſeins erfreut. Nur wenige Arten gelangen regelmäßig und in beträchtlicher Anzahl in den Handel. Die übrigen ſind mehr oder minder ſelten und daher koſtbar. Die Preiſe für die einzelnen ſind ſehr verſchieden; man kauft die erſteren für etwa 9 bis 15 Mark das Pärchen, während die letzteren mit 24 bis 45 Mark und darüber bezahlt werden.

Der ſtahlblaue Widafink [Vidua nitens].

Tafel VII. Vogel 34.

Der allbekannte Stahlfink oder Atlasvogel fällt in jeder Sammlung durch ſein hübſches Ausſehen auf. Er erſcheint tiefſchwarz, metallblau glänzend, und das ſchneeweiße Schnäbelchen, ſowie die roſenrothen Füße heben ſich von dem Gefieder lieblich ab. Die Geſtalt iſt zierlich und anmuthig und das Federkleid ſtets glatt und ſchmuck. Größe etwa die des Zeiſigs.

Gewöhnlich wird der Atlasvogel zu den Prachtfinken gezählt, jedenfalls aber mit Unrecht, denn er zeigt ſich faſt in jeder Hinſicht mit den Widafinken übereinſtimmend; er hat den alljährlichen Farbenwechſel, das hühnerähnliche Scharren, das flughüpfende Liebesſpiel, ſowie das ſtürmiſche Weſen. Dagegen unterſcheidet er ſich dadurch von ihnen, daß er nicht den verlängerten Schwanz erhält, während er im Neſtbau und den reinweißen Eiern den erſteren wiederum gleicht. Man darf ihn daher wol als ein Mittelglied zwiſchen den Wida- und Prachtfinken anſehen. Hervorragende Vogelkundige, wie namentlich Cabanis, ſtellen ihn jedoch ohne weiteres zu den erſteren, und dieſem Beiſpiele folge ich.

Bereits die älteſten Autoren, Aldrovandi (italieniſcher Schriftſteller des 17. Jahrhunderts) u. A., erwähnen den Vogel, doch ſind ſie bis auf Buffon in mancherlei Irrthümern inbetreff ſeiner befangen. Vieillot berichtigte dieſelben ſodann dahin, daß der immer fälſchlich indiſcher oder braſilianiſcher Sperling genannte Comba-sou nur in Afrika heimiſch iſt. Er ſchildert ſein lebhaftes Weſen und ſeine Zankſucht anderen Vögeln gegenüber und bezeichnet ihn beſonders als Quälgeiſt der kleinen Aſtrilde; ungleich muthiger als kräftig, ſcheut er ſich nicht, ſelbſt mit größeren Vögeln zu kämpfen. Sein Geſang wird verſchieden beurtheilt; einige Beobachter finden ihn nicht unangenehm, anderen da-

gegen gefällt er nicht. Der Munterkeit, Zierlichkeit und seines schönen Gefieders wegen ist er aber bei allen beliebt. Das Weibchen ist nicht weniger unruhig und kein geringerer Schreier als das Männchen. Zur Brut zu bringen sind sie nur in einem großen mit immergrünen Pflanzen ausgestatteten Käfige und bei einer Wärme von 24 bis 26 Grad. Doch giebt der Forscher nicht an, ob er wirklich einen Züchtungserfolg erzielt habe. Seitdem ist der Vogel immer eingeführt worden. Bechstein, der ihn nach Gmelin glänzender Fink nennt, sagt, daß das Pärchen damals 4 Louisd'or kostete.

„Die Beobachtungen, welche über das Freileben dieses Vogels veröffentlicht worden, sind ziemlich widersprechend. Nach A. E. Brehm ist er der zweite Tropenvogel, dem man, von Norden kommend, überall häufig begegnet. Der Genannte versichert, das Nest, ein wirrer Grashaufen, werde auf Bäumen angelegt, wogegen Th. v. Heuglin dasselbe, aus Strohhalmen, Lappen, Federn u. dgl. zusammengesetzt, unter Dachsparren, in Giebeln und selbst in Mauerlöchern fand.“*) Mit den Angaben des letzteren Naturforschers sind auch die von Speeke, Kirk, R. Hartmann u. A. gleichlautend. Heuglin beschreibt das Nest als dem des Haussperlings ganz ähnlich und mit Haaren und Fäden fein ausgepolstert. Zuweilen soll es in verlassenen Schwalbennestern gebaut sein. Das Gelege besteht in drei bis fünf reinweißen, beim Bebrüten bläulich scheinenden Eiern. Nistzeit sind die Monate Juli bis Anfang September (nach Br. Januar bis März) und die Verfärbung der Männchen zum Hochzeitskleide erfolgt mit dem Beginn der Regenzeit. Sperlingsähnlich kommt das muntere, arglose Vögelchen selbst bis ins Innere der Häuser, um Brosamen und Speisereste zu suchen oder an den Wasserbehältern seinen Durst zu löschen. Gewöhnlich hausen nur wenige Pärchen in einem Gehöft gesellig mit kleinen rothen Astrilden. Im ganzen östlichen Sudan vertritt der stahlblaue Widafink die Stelle des Haussperlings. Er ist am Nil bis zum 23. Gr. nördl. Breite und in Abessynien bis zu 2500 Meter Höhe hinauf überall einer der häufigsten Standvögel (nach Br. Zugvogel). R. Hartmann sah freilich auch große Schwärme, zu welchen der Stahlfink sich jedoch zeitweise wol ebenso, wie unsere nicht wandernden Finkenvögel zusammenschlagen wird.

Die älteren Ornithologen unterschieden eine zweite Art, den stahlgrünen Widafink (Vidua aenea). Neuere Forschungen von Finsch und Hartlaub haben jedoch ergeben, daß derselbe nicht als selbstständige Art, sondern nur als Lokalrasse anzusehen ist. Heuglin giebt an, daß er den stahlgrünen

*) Die obigen Worte aus dem Werke „Die Vögel Ost-Afrikas“ (v. d. Decken's Reisen IV. Band) von Dr. O. Finsch und Dr. G. Hartlaub, veranlassen mich zu dem Hinweise, daß ich Behauptungen des Dr. A. E. Brehm leider niemals als Quellen zu benutzen vermag, weil sie mit denen aller anderen Afrikareisenden nur zu häufig im Widerspruch stehen.

Vogel ausschließlich in Waldgegenden, z. B. im magern, halbdürren Buschwald von Ostabessynien und im Gebiet des weißen Nil gefunden, wo er einzeln oder parweise lebe, ein scheues, flüchtiges Wesen habe und wahrscheinlich in Baumhöhlen niste.

Betrachtet man den blauen und grünen Stahlfink nur als zusammengehörende Lokalrassen, so erstreckt sich die Verbreitung über den größten Theil des tropischen Afrika.

Die üblen Eigenschaften, welche nach Vieillot auch Reichenbach u. A. dem Atlasvogel zuschreiben, kommen in der Vogelstube wenig zur Geltung. Er zeigt sich vielmehr durch muntere Keckheit, Ruhe- und Rastlosigkeit, als durch wirkliche Bösartigkeit störend; er erschreckt Prachtfinken und andere kleinere Vögel, namentlich ihre Weibchen dadurch, daß er in der Weise anderer Widafinken-Männchen in der Luft hüpfend und unter gellendem Geschrei einige Minuten über ihnen flattert; niemals aber beißt er andere Vögel wirklich. Er ist viel mehr ein muthwilliger Necker als ein bösartiger Raufbold. Die Männchen untereinander aber kämpfen so heftig und hartnäckig, daß man zur Nistzeit niemals ihrer mehrere beisammen haben darf. Auch mit den verwandten Paradieswida-Männchen befehden sie sich heftig und andauernd.

Jahrelang habe ich regelmäßig ein Pärchen in der Vogelstube gehalten und alles mögliche versucht, um ein glückliches Züchtungsergebniß zu erlangen; ich schaffte zahlreiche an, behielt das kräftigste Paar, wechselte dann auch wieder mit diesem, bot die mannigfaltigste Fütterung, mancherlei Nistgelegenheiten und die verschiedensten Baustoffe — dennoch habe ich nur eines einzigen Erfolges mich erfreut. Zunächst bemerkte ich, daß das eine Weibchen das Nest eines Pärchens kleiner rother Astrilde fortwährend umkreiste und hin und wieder hineinschlüpfte. Die Prachtfinken ließen sich dadurch gar nicht behindern, und so hoffte ich, daß sie aus den etwa hineingelegten Eiern Pflegekinder erziehen würden. Allein das erstere Weibchen kam nicht einmal zum Eierlegen, weil die Brut in der Nähe der Thür sich befand und Störungen ausgesetzt war, um welche sich die Prachtfinken freilich nicht kümmerten. Nach längerer Zeit trug das Stahlfink-Weibchen in ein bereits benutztes, sehr unreinliches Zebrafinkennest auf den zusammengedrückten Bau grobe Halme ein und formte auf demselben eine halbüberdachte Nestmulde. Das Gelege von 5 Eiern wurde vom Weibchen allein in 12 Tagen erbrütet, während das Männchen das Nest mit Eifersucht bewachte und alle anderen Vögel, selbst sehr große, mit Geschrei und Flügelschlägen vertrieb.

Das Jugendkleid ist oberhalb fahlbraun, jede Feder blaßröthlich gerändert. Ueber den Kopf längs des Scheitels und an den Seiten laufen drei fahlröthliche Streifen; Schwanz schwärzlichbraun; unterhalb, Brust, Seiten, Unterflügel und Unterschwanz fahlgelblich; Bauch und Hinterleib reinweiß. Im ersten

Jahre verfärben ſich die jungen Männchen nur theilweiſe, ſodaß ſie geſcheckt erſcheinen. Der alte kräftige Vogel bleibt gewöhnlich acht bis neun Monate, zuweilen wol 1¼ Jahr im Prachtgefieder, bevor er grau wird. Je nach dem Striche Afrikas, aus welchem die Stahlfinken gekommen, treten ſie auch in der Gefangenſchaft vom Juli zum September in die Verfärbung zum Hochzeitskleide.

Nur einmal konnte ich ein lebendes Exemplar der ſtahlgrünen Spielart erhalten, nachdem ich jahrelang die zahlreichen Atlasvögel aller Handlungen von Berlin ſorgfältig durchmuſtert. Der Vogel ging leider im grauen Gefieder zugrunde.

Alljährlich werden, beſonders von der Küſte von Guinea aus und vorzugsweiſe über Bordeaux, Marſeille u. a. viele Hunderte von Atlasvögeln in den Handel gebracht und ihres hübſchen, immer ſchmucken Ausſehens, lebhaften Weſens, ihrer Anſpruchsloſigkeit und Ausdauer halber finden ſie immer willige Käufer. Sie halten ſich bei Stubenwärme viele Jahre vortrefflich und man hat ſie ſogar mehrfach im ungeheizten Raume gut überwintert. In den meiſten Fällen, namentlich in kleineren Geſellſchaftskäfigen, wird man ihrer jedoch bald überdrüſſig; mindeſtens dann, wenn ſie das Prachtkleid verlieren und unanſehnlich grau werden. Von einem wirklichen Geſange kann keine Rede ſein. Der Preis im Großhandel beträgt zuweilen nur 3½ bis 5 Francs. Obwol nicht ganz ſo weichlich als die zarteſten Aſtrilde, erliegen doch auch von ihnen nicht ſelten die meiſten friſchangekommenen vor der Eingewöhnung. Tadelloſe Pärchen koſten zwiſchen 7,5 bis 12 Mark (2½—4 Thlr.).

Der ſtahlblaue Widafink wird auch Stahlfink, Stahlwida, Ultramarinfink und am meiſten Atlasvogel benannt; blauſchimmernder Stahlfink (Rchb.).

Le Combassou (Bekemans und Bzn. d. Thiere des Akkl.-Grt. v. Paris); le Combasso (franzöſiſche Händler; fälſchlich Combasson oder Combassot); Ultramarine-Finch (Jamrach); in dem Bzn. d. zool. Grt. v. London nicht vorhanden; Zwarte Musch, auch Combassou oder fälſchlich Compassou (holländiſch).

Nomenclatur: Fringilla nitens, *Gml., Lth., Vll., Hgl.*; Fringilla ultramarina, *Gml., Lth., Bchst.*; Loxigilla nitens, *Lss.*; Amadina nitens, *Swns., Rpp., Gr.*; Hypochera nitens, *Hrtl. et Fnsch., Cab., Bp., Sclt., Krk., Rchb., Hgl., Antn.*; Hypochera ultramarina, *Bp., Cb., Hrsf. et Mr., Hrtl., Rchb., Hgl., Hrtm.*; Fringilla funerea, *de Trrg.*; Tiaris funerea, *Gr.* [Hypochera aenea, *Hrtl.*; Passer niger erythrorhynchos, *Brss.*]. — Moineau du Brésil, *Buff.*; Glossy-finch, *Lath.*; Outre-mer, *Buff.*; Ultra-marine Finch, *Lath.*; le Père noir à bec rouge, *Buff.*; le Comba-Sou, *Vieill.*; le Comba-Sou brillant, *Chenu.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Männchen ſchwarz, durchaus tief ſtahlblau glänzend; Schwingen dunkelbraun, an der Außenfahne ſehr ſchmal fahl bräunlich geſäumt; untere Flügeldecken blaßbräunlich; an den Bürzelſeiten über den Schenkeln ein verdeckter Büſchel weißer, ſeidenweicher Federn; Schwanzfedern dunkelbraun mit ſchmalem, fahlem Endſaum. Schnabel weiß; Auge dunkelbraun; Füße roſenroth. — Weibchen oberhalb blaßbraun, jede Feder mit röthlich fahlem Rande, daher längsgefleckt; Augenbrauen und ein breiterer Streif längs der Scheitelmitte roſtfahl; Schwanz graubraun, unterhalb blaß roſtfahl; Bauch und untere Schwanzdecken weiß. — Männchen im Winterkleide dem Weibchen ähnlich, aber oberhalb mehr hirſchfahl,

Steuerfedern braunschwarz, schmal und verwaschen weißlich gerandet; Unterschwanzdecken reinweiß. (Das Weibchen ist dem des Paradies-Widafink sehr ähnlich; Br. behauptet dem des Dominikaner-Widafink.)

Vidua nitens: ♂ niger nitore chalybico; pogonio remigum fuscorum luride sublimbatis; tectricibus subalaribus pallide fuscantibus; fasciculo occulto albo plumarum subsericarum ex uropygio prodiente; rectricibus fuscis, luride submarginatis; rostro albido; iride fusca; pedibus roseis. — ♀: supra subfusca; plumis singulis rubente marginatis striaturam exhibentibus; superciliis striaque lata supra verticem medium ferruginosa; cauda cinereo-fusca, subtus luride ferruginea; abdomine et infracaudalibus albis. — ♂ vesti hiemali cum femella conveniens, at supra magis brunnescens; rectricibus fusco-nigris, albente sublimbatis; infracaudalibus albis.

Länge 11,8 cm. (4½ Z.); Flügel 6,1—7,2 cm. (2⅓—2¾ Z.); Schwanz 3,3—3,5 cm. (1¼—1⅓ Z.).

Jugendkleid s. S. 200.

Juvenis: supra luride fusca, plumis singulis rubente marginatis; striis ternis et supra verticem et secundum capitis latera sordide rubentibus; cauda nigrescente fusca; subtus pectore, hypochondriis, subalaribus et infracaudalibus luride flaventibus; abdomine crissoque albis.

Beschreibung des Eies: Farbe reinweiß, stumpf eigestaltig.

Ovum albissimum, obbuse ovatum. Länge 16 mm. (7½ L.); Breite 1,1 mm. (½ L.).

Der Paradies-Widafink [Vidua paradísea].

Tafel VII. Vogel 36.

Mit größerem Entzücken, als bei irgend einer andern Vogelfamilie schildern die Reisenden den wundervollen Eindruck, welchen die Widafinken in ihrer Heimat gewähren, wenn dieselben inmitten des Urwaldes oder auch in freieren Gegenden mit ihren langen, wallenden Schwänzen von Baum zu Baum dahinschießen oder in der Luft die hüpfenden Liebesspiele ausführen.

Auch in der Vogelstube und selbst im Käfige ist der Anblick ein herrlicher und deshalb ist der Paradies-Widafink, die allbekannte sogenannte Paradieswitwe, ungemein beliebt und geschätzt. Er gehört auch zu den Schmuckvögeln, welche von den Portugiesen sogleich nach der Entdeckung Guineas nach Europa eingeführt wurden, wie dies bis zur Gegenwart gleicherweise geschieht.

Bei den alten Schriftstellern spielt die ‚Witwe mit dem goldenen Halsbande' eine große Rolle und die Literatur über diesen Vogel ist ebenso alt als reichhaltig; doch bietet sie über das Freileben nur geringe Auskunft.

Schon Vieillot hatte es erfahren, daß die Paradieswida sich schwierig züchten läßt; nur allenfalls bis zum Eierlegen gelangten die Weibchen in seiner Pflege. Dann beschreibt er die stürmischen Liebesbewerbungen des Männchens, welche dasselbe auch den Weibchen fremder Arten zu erweisen sucht. Für die Züchtung schlägt er vor, ein warmes Gewächshaus zu benutzen. Unmittelbar nach der Ankunft, sagt er, sind diese Vögel weichlich, während sie eingewöhnt,

bei mäßiger Temperatur und ohne besondere Sorgfalt zu beanspruchen, wol zwölf Jahre ausdauern.

Man unterscheidet auch bei diesem Widafink zwei Rassen, welche jedoch nach Hartlaub und Finsch als eine Art zusammenfallen dürften. Fast das einzige sichere Kennzeichen ist die allerdings beträchtlichere Größe des aus dem Osten kommenden Vogels.*) Betrachten wir beide als eine Art, so erstreckt sich die Heimat weit über den Westen und Süden, sowie auch über den Nordosten und Osten des ganzen Welttheils. Auch ist er auf der Insel St. Helena eingebürgert — wahrscheinlich, wie in fast allen solchen Fällen, nur durch einen Zufall — und wird dort in beträchtlicher Anzahl gefangen, um in den Handel gebracht zu werden.

„Ob der Paradies-Widafink", sagt Th. v. Heuglin, „Standvogel in meinem Betrachtungsgebiet ist, kann ich nicht sicher behaupten, indem ich nur zwischen den Monaten Mai bis Dezember die Gelegenheit hatte, ihn zu sehen. Zur Fortpflanzungszeit traf ich ihn par- und familienweise; im Herbste oft in ziemlich großen Gesellschaften vereinigt. Er überschreitet den 17. Grad nördlicher Breite wol nicht; in Abessynien geht er zu 1900 bis 2200 Mtr. über Meereshöhe hinauf. Man begegnet ihm vornehmlich in der Waldregion und im Buschwald der Steppe, hier zuweilen weit von Gewässern entfernt. Er ist eine der häufigeren Erscheinungen im Bogosland, Habesch, Sennar, Kordofan und im ganzen Gebiet des weißen Nil. Meist treibt er sich auf dornigen Bäumen und höheren Büschen herum, bevorzugt hier kahle Gipfel, ist wenig beweglich, fliegt selbst bei gelindem Luftzuge nur kurz und mit offenbarer Anstrengung, den schweren Schweif mühsam nachschleppend und nicht ausbreitend; letzterer hängt in ruhiger Stellung ziemlich senkrecht herab. Der Gesang zeichnet sich durch seine Einfachheit aus, der Lockton ist ein wenig lautes, etwas flötendes Zirpen, das auch im Fluge gehört wird. Alte Männchen im Prachtkleide kommen selten auf den Boden herab, die Weibchen benehmen sich hier aber ganz wie die Stahl-Widas. Ueber die Fortpflanzung habe ich keine Erfahrungen machen können. Im Herbst begegnet man oft Flügen, welche ausschließlich halb vermauserte Männchen sind." R. Hartmann sah sie auf Hochbäumen, anmuthig den Schwanz wiegend. Näheres ist nicht bekannt. Um so eingehender ist der Vogel in der Gefangenschaft beobachtet worden.

*) Herr Wiener in London schrieb mir: Vor einigen Jahren kaufte ich drei Paradieswitwen von überaus großer Schönheit. Sie zeichnen sich durch eine sehr lebhafte Färbung des ganzen Körpers und durch ein goldgelbes Nackenband aus. Das Braun an der Brust ist viel tiefer und satter als bei anderen. Seltsamerweise zeigen sie aber die langen, haarartigen Fäden nicht, welche die Schwanzfedern im Prachtgefieder sonst schmücken. Leider konnte ich nicht ermitteln, aus welchem Theile Afrikas diese Vögel eingeführt wurden.

Ein Pärchen Paradies-Widafinken im grauen Gefieder zeigt sich als auffallend ruhige und gegen ungünstige Einflüsse empfindliche Vögel. Wenn der Schnabel des Männchens an der Spitze dunkel wird und am Kopfe, an Hals und Brust farbige Fleckchen hervortreten, so erscheint der Widafink allmälig lebhafter und beginnt immer emsiger seinen Gesang, welcher freilich nur ein wenig harmonisches Gezwitscher aus einsilbigen, theils gellenden, theils wohllautenden, langgezogenen Tönen ist. Jetzt fliegt er stundenlang einen Strich in der Vogelstube, wobei er sich stets auf denselben Zweig niederläßt. Mit der weiteren Entwickelung des Prachtkleides werden die Bewegungen immer lebendiger, bis er sodann den hüpfenden Liebestanz alltäglich vielmal aufführt.

Je nach dem Fütterungszustande schreitet die Verfärbung des Gefieders mehr oder weniger schnell fort, sodaß sie in etwa 4—6 Wochen vollendet ist. Wer den früher sperlingsgrauen Widafink nicht im Auge behalten, wird ihn jetzt schwerlich wiedererkennen. Der Oberkopf, das Gesicht und die Kehle, Rücken, Flügel und Schwanz sind tiefschwarz gefärbt; dazwischen zieht sich vom Genick bis zur Brust herab über die letztere und den halben Bauch schönes goldglänzendes Kastanienbraun; der Unterleib ist reinweiß. Die bemerkenswertheste Veränderung aber hat der Schwanz erlitten; die beiden mittelsten Federn sind so lang hervorgewachsen, daß sie die Länge des Vogels mehr als doppelt übertreffen, dabei haben sie sich dachförmig gewölbt und eine gebogene, hahnenfederige Gestalt angenommen. Sie verschmälern sich vom breiten Grunde allmälig bis zur Spitze. Neben ihnen die beiden nächsten sind ebenfalls verlängert, haben aber eine breite, schwertförmige Gestalt. Von verschiedenen Punkten dieser Federn gehen borstenartige, lange Fäden aus. Die schwarze Farbe des Schwanzes erscheint prachtvoll marmorirt. In der Größe ist der Vogel übrigens etwa dem Haussperling gleich.

Nach v. Heuglin's Angaben färbt sich der Vogel zum Prachtkleide im Juni und Juli und im Oktober zum Winterkleide; nach Edwards geschieht letzteres erst im November; nach Kirk aber hat der Vogel das Prachtkleid im Januar und Februar. Hartmann fand im innern Sennar im Mai langschwänzige Männchen und erzählt, daß von Harnier solche am Dindirflusse im März gesehen. Es ist erklärlich, daß der Eintritt der Verfärbung je nach den fern von einander liegenden Gegenden des großen Welttheils, sodann aber auch nach dem Alter und Ernährungszustande des einzelnen Vogels wechselt und zwar sowol im Zeitpunkt des Beginns als auch in der Dauer.

In der Gefangenschaft ist der Farbenwechsel ebenso vielfachen Veränderlichkeiten unterworfen, welche auf dieselben Ursachen zurückzuführen sind. Reichenbach behauptet auch, daß die Widafinken in ihrer Verfärbung sich an unsere warme Jahreszeit gewöhnen. Ich habe dies nicht bestätigt gefunden, sondern

alljährlich beobachtet, daß jeder dieser Vögel ziemlich genau an seiner Frist festhielt, während dann späterhin allerdings mancherlei Unregelmäßigkeiten sich äußerten. Die überwiegende Anzahl der lebend eingeführten Paradies-Widafinken stammt aus dem Westen Afrikas und nur selten kommen einige Pärchen der größeren Lokalrasse in den Handel. Wenn die ersteren Vögel von Bordeaux und Antwerpen aus im Spätsommer in die Vogelhandlungen gelangen, so sind sie regelmäßig im Prachtgefieder und färben sich gegen den Spätherbst bis Winter hin grau. Sehr wechselnd aber, in der Frist vom Mai bis Ende Juli, tritt dann wieder die Verfärbung zum Prachtkleide ein und je nach der Fütterung bleibt der Vogel 3—6 Monate, zuweilen wol bis $1^1/_2$ Jahr in demselben. Manche recht kräftige Männchen werden garnicht völlig grau, sondern behalten immer einige schwarze und braune Federn bei; auch bleibt wol eines mehrere Jahre dauernd im Prachtgefieder. Manchmal legt ein Vogel, den man für ein Weibchen gehalten, in der zweiten oder erst zur dritten Liebeszeit das Prachtkleid an.

Obwol ich eine lange Reihe von Jahren hindurch und in der mannigfaltigsten Weise den Paradieswidafink zu züchten versuchte, wollte es mir doch durchaus nicht gelingen, ein befriedigendes Ergebniß zu erlangen. Selbst als ich einen Gärtnerei-Besitzer dazu bewegen konnte, einige Pärchen in einem großen Gewächshause frei fliegen zu lassen, zeigte sich kein Erfolg. Einen doch wenigstens einigermaßen günstigen Fall kann ich in folgender Weise schildern.

Bei allen Vögeln, welche an die bestimmte Frist des Prachtgefieders mit dem Nisten gebunden sind, liegt eine sehr große Schwierigkeit darin, ihnen Weibchen zu geben, welche aus derselben Gegend herstammen und zur gleichen Zeit brütlustig sind. Ich ließ daher mit einem Männchen drei Weibchen in der Vogelstube frei. Im ersten Jahre machten dieselben auch nicht im geringsten Miene zum nisten. Erst gegen den Herbst des zweiten Jahres hin schleppten sie sich alle drei hier und da mit Halmen und im November, während das Männchen noch im vollen Schmuckgefieder prangte, trugen sie Halmen, Bastfäden Baumwollflöckchen u. dgl. auf dem Drahtboden eines hochhängenden Bauers zum anscheinend wirren Haufen zusammen. Eine Annäherung zwischen Männchen und Weibchen konnte ich aber niemals wahrnehmen. Als ich endlich nach geraumer Zeit einmal nachsah, fand ich ein wunderliches Doppelnest inmitten des großen, aus allen möglichen Stoffen angehäuften Thurmes. Die eine Nisthöhle war backofenförmig überdacht und mit Fasern und langen Pferdehaaren sauber gerundet, die andere war eine flache, liederlich ausgelegte Mulde, deren hinterer Rand kaum etwas überstand. In dem erstern Neste waren drei, leider todte Junge, in dem andern ein lebendes. Ich hatte nun Ursache es zu bedauern, daß ich nicht früher untersucht, denn ich hatte ja versäumt, die Gestalt und Farbe der Eier, die Brutdauer und Entwickelung der Jungen kennen zu lernen;

dies ist mir umsomehr leid, da bis jetzt auch kein andrer Züchter einer glücklichen Brut dieser Vögel sich erfreut hat. Das lebende Junge wurde von zwei Weibchen gefüttert, niemals habe ich aber bemerkt, daß das alte Männchen sich um das Nest oder das Junge bekümmert hätte. Im Jugendkleide war das letztere dem alten Weibchen sehr ähnlich, nur viel heller weißlichgrau. Es zeigte sich nach dem Ausfliegen als ein träger, überaus gefräßiger Vogel, der nach etwa einem Jahre eine wunderliche, gleichsam gespensterhafte Erscheinung bot, welche zu erzählen ich garnicht den Muth haben würde, wenn nicht die Herren Leuckfeld, C. Hendschel und mehrere andere Beobachter dieselbe Erfahrung an eingeführten jungen Paradieswidas gemacht hätten.

Damals hielt ich noch nicht viele größere Finkenvögel und Papageien freifliegend in der Vogelstube, sondern ausschließlich Prachtfinken, Widafinken, kleinere Webervögel und andere Finken. Es ging außerordentlich ruhig und friedlich in der gefiederten Gesellschaft zu und ich hatte mich freilich auch der trefflichsten Erfolge zu erfreuen. Zu meiner großen Verwunderung gab es dennoch von Zeit zu Zeit einen gewaltigen Lärm. Ich sah bald einen eigenthümlichen Vorgang. Sobald die kleinen Prachtfinken in ihrer gemüthlichsten Beschäftigung waren und in bunter Gesellschaft auf dem Futterplatze sich umhertummelten, schwebte plötzlich der junge Widafink hinzu und die ganze Schar flüchtete unter Zeichen des höchsten Entsetzens aus einander. Trotz aufmerksamster Beobachtung konnte ich durchaus keine Ursache für diese auffallende Erscheinung ermitteln; nur das bemerkte ich, daß der Vogel beim Herabfliegen von einem hohen Aste sein Gefieder sonderbar aufblähte, dann viel größer und fast ganz weiß aussah. Als ich für denselben ein altes Weibchen eingetauscht, bekümmerte sich um dieses kein andrer Vogel.

Im zoologischen Garten von Berlin und ebenso in Herrn Linden's Vogelhause hat der Paradies-Widafink ebenfalls genistet, und wenn in beiden Fällen auch leider nichts näheres beobachtet werden konnte, so darf man trotz aller Zweifel doch wol annehmen, daß auch diese Vogelfamilie über kurz oder lang der erfolgreichen Züchtung zugänglich sein werde.

Wie bereits Buffon beobachtet, werden manche Weibchen an Kopf und Brust immer mehr schwärzlich, sodaß das Männchen daneben nur an dem braunen Ton der grauen Farbe und den schwärzlichen Federsäumen sicher zu erkennen ist. In der Jugend sind die Weibchen denen des Stahlwida sehr ähnlich und können von Unkundigen leicht mit demselben verwechselt werden. Bedeutendere Größe, schlankerer Bau und ein längerer Schwanz lassen sie jedoch sogleich unterscheiden.

Sehr selten und stets nur in wenigen Köpfen führt Fräulein Hagenbeck noch eine dritte Rasse des Paradieswida ein, welche beträchtlich kleiner und

fahler weißgrau ist. Das Vögelchen dürfte aber ungemein zart sein, denn alle, welche ich erhalten, starben vor der Verfärbung.

Die Rathschläge, welche ich zur Behandlung der neu angekommenen Widafinken zu geben habe, finden die Leser weiterhin in dem Abschnitte über die Verpflegung und Fütterung. Vorläufig sei nur bemerkt, daß man sie nicht sogleich frei in die Vogelstube oder in einen Gesellschaftskäfig fliegen lassen darf, sondern sie recht ruhig, in mäßiger Wärme halten, allmälig von der afrikanischen an die weiße Hirse gewöhnen und vor Weichfutter und Ameisenpuppen hüten muß.

Früher und selbst bis zur neueren Zeit wurden von den Witwen — wie von vielen anderen Vögeln — nur die Männchen allein in den Handel gebracht. Zu Bechstein's Zeit stand ein solches im Preise von 12 Louisd'or, etwas später von 30 bis 40 Thalern. Erst seitdem die Züchtung fremdländischer Vögel in regsamer Weise begonnen, werden die Weibchen regelmäßig mit eingeführt. Ein Pärchen im grauen Gefieder kostet jetzt 9—12 Mark und im Prachtkleide 15—18 Mark. Im Großhandel schwankt der Preis zwischen 5—7 Francs.

Der Paradies-Widafink oder die Paradieswitwe ist auch Paradiesvogel-Witwe (Rchb.) und Witwe mit dem goldenen oder goldgelben Halsband genannt worden; Paradiesammer (Bchst.). In den herumziehenden Menagerien galt er als Paradiesvogel.

La Veuve à collier d'or (Bekemans und französische Händler); Paradise Whydah-bird (Jamrach und Brzn. d. zool. Grt. v. London); Roodbruin zwarte of Paradijs weduwe oder Wectitje (holländisch).

Nomenclatur: Emberiza paradisea, *L.*, *Scp.*, *Lth.*, *Bchst.*; Vidua, *Brss.*; Fringilla africana macroura, *Slgm.*; Fringilla paradisea, *Vll.*, *Lchtst.*; Vidua paradisea, *Lss.*, *Swns.*, *Gr.*, *Hrtl.*, *Krk.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Steganura paradisea, *Cab.*, *Bp.*, *Rchb.* — Vidua paradisea, *Rpp.*, *Hgl.*, *Strckl.*; Vidua Verreauxi, *Css.*; Steganura sphenura, *Vrr.*, *Bp.*; St. sphenura, *Cab.*, *Rchb.*; St. paradisea, *Hrtl.*; St. Verreauxi, *Sclt.*, *Fnsch* et *Hrtl.*; V. sphenura, *Hgl.*, *Hrtm.* — Grande veuve d'Angola, *Buff.*; Veuve à collier d'or, *Vieill.*; Widah-bunting, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Der ganze Kopf bis zum Kropf tiefschwarz mit bräunlichem Schein; die übrige Oberseite nebst den oberen und unteren Schwanzdecken bräunlichschwarz, Flügel und Schwanz reinschwarz, Schwingen braunschwarz, außen fahlbraun gesäumt, die vier mittelsten Schwanzfedern mit dunklen schwarzen Querlinien (marmorirt); ein breites Band um Nacken, Halsseiten und Oberbrust orangezimmtroth; untere Flügeldecken blaßrostfarben; Unterbrust und Bauch gelbbräunlichweiß. Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Füße röthlichhorngrau. — Wbch. oberhalb rostbräunlich, jede Feder mit schwarzem Schaftstrich; Oberkopf und Kopfseiten blaß isabellbräunlich, jederseits vom Nasenloch über das Auge ein breiter, schwärzlicher Streif bis zum Nacken, sodaß also ein breiter, isabellfarbener Mittelstreif und an jeder Seite ein gleicher schmaler Augenbrauenstreif bleibt; Schwingen und Schwanzfedern schwärzlichbraun, Deckfedern braun, außen breit rostbraun gerandet; obere Flügeldecken dunkelbraun mit schmalen, fahlen Endsäumen; Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelbraun, jede Feder mit breitem, blaßbräunlichen Endrande; unterhalb weiß, untere Flügeldecken und Brustseiten blaßrostbräunlich. — Mnch. im Winterkleide gleicht dem Weibchen, nur sind die Federn

an den schwarz gewesenen Körpertheilen mehr oder minder breit schwarz gerandet; die Kopfstreifen treten ebenfalls hervor. — Jugendkleid s. S. 206.

Vidua paradisea: capite toto colloque usque ad jugulum atris subfusco-micantibus; notaeo reliquo et supra- et infracaudalibus e fusco-nigris; alis caudaque atris; remigibus fusco-nigris, exterius luride fusco-limbatis; torque lato, colli lateribus pectoreque laete cinnamomeis; tectricibus al. inferioribus pallide ferrugineis; abdomine fulvente albo; rectricibus 4 intermediis transverse nigro-lineolatis; iisdem lateralibus utrinque binis gradatis, ambabus sequentibus perlongis verticaliter positis, ambabus intermediis brevioribus dilatatis in setam tenuissimam excurrentibus; rostro nigro; iride fusca; pedibus subfulvo-corneis.

♀ supra ferruginea, scapo cujusque plumae nigro-lineato; pileo capitisque lateribus dilute isabellinis; stria lata nigrescente utrinque a naribus supra oculum usque ad cervicem extensa, vittam mediam latam isabellinam includente et utrinsecus striae concolori angustae superciliari adjacente; remigibus et rectricibus nigricante fuscis; tectricibus al. majoribus et mediis fuscis, extérius late ferrugineo-marginatis; tectricibus al. minoribus fuscis, anguste luride terminatis; uropygio et supracaudalibus fuscis, late dilutius terminatis; subtus alba, tectricibus subalaribus pectorisque lateribus dilute ferrugineis. — ♂ vesti hiemali cum femella conveniens, at marginibus plumarum nigris angustioribus vittisque capitis distinctioribus.

Länge $14,_4$ cm. ($5\frac{1}{2}$ Z.); längste Schwanzfedern 26—$31,_3$ cm. (10—12 Z.); Flügel $7,_2$ cm. ($2\frac{3}{4}$ Z.); unverlängerter Schwanz $4,_8$ cm. ($1\frac{5}{6}$ Z.).

Juvenis femellae adultae simillima, sed dilutius canescens. — Ei unbekannt.

Der Dominikaner-Widafink [Vidua principalis].

Tafel VII. Vogel 35.

Allgemein bekannt unter dem Namen Dominikanerwitwe gehört auch dieser rothschnäbelige Widafink zu den gewöhnlichsten Erscheinungen des Vogelmarktes. Sein hübsches Gefieder, seine Munterkeit und kräftige Ausdauer im Käfige würden ihm das Bürgerrecht in jeder Vogelsammlung erwerben, wenn nicht seine Unverträglichkeit es nothwendig machte, daß er von den Gesellschaftskäfigen und Vogelstuben, in denen man kleine Vögel hält, ausgeschlossen wird. In der Gefangenschaft hat man ihn bis jetzt noch nicht gezüchtet und dies ist umsomehr zu bedauern, da auch über sein Nisten in der Freiheit noch keine zuverlässigen Mittheilungen vorhanden sind.

Er ist am Oberkopf und Oberrücken schwarz, an Wangen, Hals, Brust und Bauch reinweiß, ebenso ein breites Nackenband und eine Schulterbinde; Flügel und Schwanz sind wiederum schwarz und aus dem letztern verlängern sich vier schmale, schwarze Federn. Das Schnäbelchen ist roth. Größe etwas geringer als die des vorigen, etwa dem Zeisig gleich.

Vieillot erwähnt den Vogel nur kurz und berichtigt hauptsächlich Buffon's Irrthum, der ihn mit nur zwei und blos schwach verlängerten Schwanzfedern dargestellt hat. Die alten Ornithologen von Linné her kannten diesen Widafink sehr wohl, verfielen jedoch in mancherlei Irrthümer, welche namentlich durch das

wechselnde Federkleid hervorgerufen wurden. Ganz neuerdings hat eine eingehende Untersuchung gelehrt, daß alle aufgestellten verschiedenen Arten zusammenfallen und nur ein Dominikaner-Widafink in zwei Lokalrassen, mit weißem und mit schwarzem Kinn, beizubehalten, von denen der erstere mehr im Nordosten und der letztere im Westen und Süden Afrikas heimisch ist. Im übrigen sind beide durchaus übereinstimmend und die Heimat erstreckt sich so ziemlich über ganz Afrika. Als Nordgrenze der Verbreitung giebt v. Heuglin den 17° n. Br. an und zwar bis zu einer Höhe von etwa 2,000 bis 2,333 Meter hinauf.

„Ob dieser Widafink Standvogel in Nordostafrika ist, kann ich nicht angeben, vermuthe aber, daß er nicht wirklich wandert. Obgleich nirgends gerade häufig, erscheint er doch an geeigneten Orten überall, meist nur einzeln und parweise, im Herbst in kleinen Familien. Er bevorzugt Regenstrombetten mit höherem Baumschlag, Lichtungen im Hoch- und Buschwald; auch kommt er in die Nähe menschlicher Niederlassungen, in Viehgehege, Baumwoll- und Eibischpflanzungen. Während der Regenzeit, in welche die Brut fällt, hält er sich an bestimmten Oertlichkeiten auf und das Männchen ist dann in den Kronen von Dornbäumen u. dgl. zu sehen, von wo es seinen schwätzenden Gesang hören läßt. Die Nahrung besteht in Sämereien und Insekten. Es ist ziemlich still, wenig lebhaft, fliegt nicht gerade schwerfällig, doch niemals weit und hüpft und schlüpft durch das Dickicht." Mit diesen Angaben Heuglin's sind die von Kirk gleichlautend. Nach Ayres und Layard liebt der Vogel besonders offene Oertlichkeiten, da er sich der Gräsersamen wegen vorzugsweise gern auf dem Erdboden herumtreibt. Auch Edwards sagt, daß er ihn ammerartig auf der Erde gesehen und zwar zwischen großen Scharen von Schmetterlings- und kleinen, rothen Astrilden. H. T. Ussher sah ihn sehr zahlreich an der Küste von Guinea und sagt, daß er viel weniger gesellig mit seinesgleichen als mit anderen kleinen Finken (den sog. Senegalisten, also Astrilden) sei, deren großen Schwärmen er sich zu gewissen Jahreszeiten in den Maniok- und Maisfeldern anschließe. Seine langen Schwanzfedern verleihen ihm im Fluge ein ganz absonderliches Aussehen. Reichenow, der ihn häufig an der Goldküste und am Kamerun fand, schildert mit Entzücken den hüpfenden Flug oder Liebestanz, bei welchem der Oberkörper sehr steil gehalten wird. Nähere Mittheilungen fehlen oder sie sind nicht stichhaltig. Das kunstvolle Nest, welches Heuglin beschreibt, gehört entschieden einem ganz andern Vogel. Nach Verreaux tragen die Männchen das Prachtkleid vom September bis Januar; nach Heuglin beginnen sie im Juli sich zu färben und in der Gefangenschaft geschieht dies gewöhnlich zwischen diesem Monat und dem September. Die Abweichungen und deren Ursachen sind ganz dieselben, als die bei dem Paradies-Widafink angegebenen. Auch beruht Kirk's Behauptung, daß der lange Federschmuck das ganze Jahr hindurch bleibe, keines-

wegs auf einem Irrthum, denn dies kommt zuweilen ganz ebenso bei dieser, wie bei jener erstbeschriebenen Art vor.

In der Gefangenschaft entwickelt der Dominikaner-Widafink eine noch viel größere Lebhaftigkeit, welche sogar zur Bösartigkeit und zur Tyrannei für die ganze Bewohnerschaft der Vogelstube ausartet. Kaum sitzen die kleinen Astrilde und andere Finken bunt durch einander auf dem Futterplatze oder liegen behaglich im Sande, um sich zu sonnen oder sie fangen plätschernd an sich zu baden, so fährt die Dominikanerwitwe urplötzlich dazwischen und, theils durch das stürmische Daherschießen, theils durch das Wehen und Schnellen des langen Schwanzes wird alle Welt in blinde Angst und tolles Entsetzen gejagt. Dies Erschrecken und Auseinanderjagen treibt der Vogel gleichsam zu seinem Vergnügen tage- und wochenlang und es bleibt daher nichts weiter übrig, als ihn herauszufangen und abzusondern. Wennschon dies die Ursache sein mag, aus welcher man ihn von den meisten kleineren Vogelstuben fernhält, so ist es andrerseits doch ebenso verwunderlich als zu bedauern, daß auch mit ihm noch Niemand in geeigneten Anlagen ausdauernde Versuche zur Züchtung gemacht und Erfolge erreicht hat. Im übrigen gehört er zu den um ihrer Schönheit, Anspruchslosigkeit und Ausdauer willen beliebten Stubenvögeln. Unter meinen Vögeln, schreibt Herr Dr. Luchs, befinden sich einige besonders interessante Erscheinungen. Es sind jetzt über zehn Jahre her, als ich in Hamburg bei Lintz mir einige Vögel aussuchte. Darunter waren ein Orangeweber und ein rothschnäbeliger Widafink. Beide nach meinem Ermessen im ersten Jugendkleide. Die Witwe hielt ich solange für ein Weibchen, bis sie im Juli des folgenden Jahres ihr Prachtgewand mit den langen Schwanzfedern anlegte. Noch jetzt ist der Vogel kerngesund. Nachdem er aber bisher immer ganz regelmäßig seine halbjährige Verwandlung innegehalten, zeigt er in diesem Jahr eine Ausnahme. Wol hat er auch diesmal das schwarzweiße Prachtkleid bekommen, aber die vier langen, schwarzen Schwanzfedern fehlen, indem sie garnicht herausgewachsen sind. Die Fütterung war und ist die gleiche wie früher und der Vogel erscheint durchaus gesund. Daher bin ich geneigt, diese auffallende Abweichung dem Einfluß des Alters zuzuschreiben, umsomehr, da auch der Feuerfink eine ähnliche Unregelmäßigkeit wahrnehmen läßt.

Auch dieser Vogel ist das ganze Jahr hindurch in allen Handlungen zum Preise von 9 bis 18 Mark für das Pärchen zu haben. Im Großhandel hundertparweise mit Prachtfinken zusammen kostet er gewöhnlich nur 5 bis 6 Francs

Der Dominikaner-Widafink wird auch rothschnäbelige Witwe, rothschnäbeliger Widafink (Hgl.), Dominikanerwitwe und von Rchb. heitere Witwe genannt. Bechstein, zu dessen Zeit ein solcher Vogel 25 Louisd'or kostete, hieß ihn Dominikanerammer.

La Veuve dominicaine, Vida dominicaine (Vekemans und franzöſiſche Händler); Dominican Widow-bird, Wida-bird (Jamrach u. Verz. d. zool. Grt. v. London); Witzwarte Weduwe (holländiſch).

Nomenclatur: Emberiza principalis, *L.*, *Edw.*, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*; Fringilla principalis, *Vll.*; Emberiza serena, *L.*, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*; Vidua minor, *Brss.*; Fringilla serena, *Vll.*, *Lchtst.*; Vidua principalis, *Gray*, *Bp.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.* [V. angolensis, *Brss.*; Passer cauda longissima, *Slgm.*; Emberiza vidua, *L.*, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*; V. major, *Brss.*; V. fuliginosa, *Lchtst.*; V. decora, *Hrtl.*] — Vidua erythrorhyncha, *Sws.* etc.; V. principalis, *Strckl.*, *Hrtl.*, *Cab.*, *Hgl.*, *Hrtm.*, *Plzln.* etc.; V. serena, *Cab.* — Variegated Bunting, Long-tailed B., Dominican-B., *Lath.*; Grande Veuve, Veuve dominicaine, *Buffon.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Oberkopf, Nacken, Mantel und Schultern tiefſchwarz, ſchwach grünlich ſcheinend, ebenſo jederſeits ein breiter Fleck, an den Kropfſeiten, auf der Kropfmitte durch Weiß getrennt; Zügel, Rand des Unterſchnabels und Kinnwinkels ebenfalls ſchwarz (letzterer zuweilen weiß); über den Nacken ein undeutliches weißes Band, Kopf- und Halsſeiten reinweiß; Schwingen und Deckfedern ſchwarz, außen ſchmal fahlbräunlich geſäumt, Schwingen an der unteren Hälfte der Innenfahne weiß gerandet; obere Flügel- und kleine Schulterdecken weiß, wodurch ein langes, weißes Feld auf dem Oberflügel; Bürzel und obere Schwanzdecken weiß, die längſten der letzteren aber ſchwarz mit bräunlichweißen Seitenrändern; Schwanzfedern ſchwarz, an der Innenfahne breit weiß und außen ſchmal bräunlich geſäumt, die vier mittelſten, ſehr verlängerten Federn ſchwarz; die unteren Flügeldecken, ſowie der ganze Unterkörper reinweiß; Auge dunkelbraun; Schnabel korallroth; Füße braun. — Weibchen oberhalb roſtbraun, jede Feder mit ſchwarzbraunem Schaftſtrich, daher die ganze Oberſeite, am breiteſten der Mantel und die Schultern, längsgefleckt; ein breiter Streif in der Mitte des Oberkopfs roſtbraun, jederſeits vom Naſenloch bis zum Hinterkopf ein breiter ſchwarzer Streif, Zügel und Augenbrauenſtreif bis auf die Schläfe roſtbräunlich, Kopfſeiten ebenſo mit zwei ſchwarzen Längsſtrichen vom Auge bis zur Schläfe und vom Mundwinkel ſchief über die Backe; Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz roſtfahl außen geſäumt; obere Flügeldecken braunſchwarz mit roſtbräunlichen Endſäumen; Kinn und übrige Unterſeite weiß; Bruſt und Seiten roſtbräunlich, letztere mit einzelnen dunklen Schaftſtrichen. — Mnch. im Winterkleide mit dem Wbch. übereinſtimmend. — Jugendkleid düſter braun ohne dunklere Streifen und Flecke; unterſeits blaſſer, Kehle faſt weiß; Schnabel horngelb (nach Caſſin).

Vidua principalis: supra nitide nigra, subviride micans; torque, uropygio, macula magna alari, capitis lateribus et gastraeo toto albis; supracaudalibus albis, intermediis nigris, angustissime luride limbatis; rectricibus nigris, pogonio externo late albo-marginato, interno anguste subfusco-limbato; quatuor intermediis perlongis, duabus convexis, duabus concavis nigris; mento nigro; iride fusca; rostro rubro; pedibus subfuscis. — ♀ supra ferruginoso-fusca, scapo plumae cujusque nigrescente; notaeo igitur toto, praesertim interscapilio humerisque longitudinaliter maculatis; stria lata verticis medii ferruginea, utrinque stria a naribus usque ad occiput lata nigra; stria faciei utraque nigra, una ab oculo usque ad tempora, altera ab oris angulo oblique supra genam decurrente; remigibus et rectricibus nigris, exterius subfulvo-limbatis; tectricibus al. superioribus fusco-nigris, ferrugineo-terminatis; mento et gastraeo reliquo albo; pectore et hypochondriis ferruginosis, hisce sparsim obscurius striolatis. — ♂ vest. hiem. cum femella conveniens. — Juvenis obscure fuscescens striis maculisque nullis; subtus pallidior; gula albescente; rostro flavente corneo.

Länge etwa 23,4—26 cm. (9—10 Z.); Flügel 6,5 cm. (2½ Z.); mittelſte Schwanzfedern 17—19,6 cm. (6½—7½ Z.); unverlängerte Schwanzfedern 3,9 cm. (1½ Z.). Nach Rchn. Länge 29—30 cm.; Flügel 6,5 cm.; mittlere Schwanzfedern 23 cm., unverlängerte Schwanzfedern 5 cm. — ♀ Länge 12,5—13 cm.

Der Königs-Widafink [Vidua regia].

Es ist zu bedauern, daß der schönste unter diesen Prachtvögeln gegenwärtig kaum noch in unsere Käfige gelangt, während er doch in Vieillot's Sammlung und noch zu Bechstein's Zeit, wenn auch selten, so doch im Handel vorhanden war. Dr. Bolle zählt ihn in seinem Verzeichniß nicht mit und seitdem dürfte er überhaupt nicht mehr vorgekommen sein. In Paris fand ich ihn bei keinem Händler, obwol er in den Preisverzeichnissen hier und da aufgeführt war. Dies geschieht ja aber bekanntlich ebenso dort wie bei uns aus alter Gewohnheit, sodaß also eine ganze Anzahl solcher Vögel immer noch in den Preislisten glänzen, welche niemals mehr oder doch nur selten in Wirklichkeit eingeführt werden; ich erinnere nur an die Rothkopf-Amandine, den Granataftrild, Buntastrild u. a. Die Listen von Bekemans, Jamrach und des Londoner zoologischen Gartens, des Pariser Jardin d'acclimatation und der niederländischen Gärten enthalten ihn nicht und ich glaube auch kaum, daß er im Laufe der Jahrzehnte jemals in den Vogelhandlungen oder zoologischen Anstalten lebend vorhanden gewesen.

Er ist etwas größer als die Dominikanerwitwe, schön braun mit schwarzem Käppchen und desgleichen Flügeln und Schwanz, rothem Schnäbelchen und rothen Füßen und mit vier einzeln stehenden, sehr verlängerten und ährenartigen Schwanzfedern.

Von Zeit zu Zeit entnehme ich besonders von der Hagenbeck'schen Großhandlung, aber auch von Ch. Jamrach in London, Frau Poisson in Bordeaux, und neuerdings von Gaetano Alpi in Triest graue, nicht im Prachtgefieder befindliche Vögel, von denen jene Händler dann noch nicht wissen, was sie vor sich haben, um dieselben nach der Verfärbung festzustellen und in ihrer Lebensweise kennen zu lernen. So empfing ich von Herrn Karl Hagenbeck im Jahre 1870 eine große Anzahl von Witwenvögeln im grauen Gefieder. Viele von denselben sind ja auch vor der Verfärbung zum Prachtgefieder mit Sicherheit zu erkennen, wenn sie eben nur nicht in einem zu erbärmlichen, nackten Zustande ankommen. Dies letztere war aber bei mehreren der Fall und gerade unter den zerlumptesten erkannte ich einen Königswidafink. Natürlich gab ich mir alle erdenkliche Mühe, um den ebenso schönen als seltenen Vogel am Leben zu erhalten. Dies glückte mir auch und er befiederte sich zunächst im grauen Kleide. Während ich nun aber besonders begierig darauf war, ihn im Prachtgefieder kennen zu lernen, war er in der Schar der grauen Witwen, welche sich zusammen in einem geräumigen Käfige befanden, trotz sorgfältigster Pflege leider doch eingegangen, bevor er sich verfärbte.

Vieillot schwärmt von der Schönheit und Liebenswürdigkeit der Veuve à quatre brins außerordentlich und lobt auch ihren hübschen Gesang. So lebhaft und

munter aber, wie sie im Prachtkleide erscheine, so trübselig und stumm zeige sie sich im grauen Gefieder. Man solle ihr einen möglichst großen Käfig und oft Badewasser geben und wenn sie erst eingewöhnt sei und sorgfältig verpflegt werde, so erhalte sie sich 8 bis 10 Jahre in der Gefangenschaft. Um sie zu züchten, müsse man ihr 25 bis 30° R. Wärme gewähren und ihren Käfig mit immergrünen Gebüschen ausstatten. Es sei schwer, doch gelinge es wol, sie zum Nisten zu bringen. — Ob der Vogel aber wirklich in der Gefangenschaft geheckt habe, ist nicht gesagt. Er wurde vornehmlich von den Portugiesen nach Europa eingeführt. Buffon sagt, daß dieser Widafink in Paris damals häufig zu finden war und nach Bechstein's Behauptung wurde er zuweilen auch nach England, Holland und Deutschland gebracht. Wo der letztere ihn aber gesehen, hat er nicht, wie sonst gewöhnlich, hinzugefügt.

Die Verbreitung erstreckt sich nur über einen Theil des südlichen und westlichen Afrika und auch dort dürfte er nirgends häufig vorkommen.

Der Königs-Widafink oder die Königswitwe, Königswida, wurde früher auch schaftschwänzige Witwe, Witwe mit vier Fäden oder Königsammer genannt.

La Veuve à quatre brins (Buffon); la Veuve reine; the Queen-widow; Konings-Weduve (holländisch).

Nomenclatur: Vidua regia, *L., Hrtl.;* Vidua riparia africana, *Brss.;* Emberiza regia, *L., Vll., Bp.;* Tetraenura regia, *Rchb.* — Veuve de la côte d'Afrique, *Briss.*; Shaft-tailed Bunting, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberkopf, Rücken, Flügel und Schwanz tiefschwarz; Nacken, Hinterhals, Kopf- und Halsseiten, sowie die ganze Unterseite hell rothgelb, Hinterleib und untere Schwanzdecken reinweiß. Auge braun; Schnabel roth; Füße roth. Winterkleid braun, alle Federn breit fahl gesäumt. Das Männchen dunkler als das Weibchen (Rchb.).

Länge 31,4 — 34 cm. (12 — 13 Z.); Flügel 8,2 cm. (3 1/6 Z.); verlängerte Schwanzfedern 23,4 — 26 cm. (9 — 10 Z.).

Vidua regia: supra nitide nigra, torque et gastraeo dilute fulvescentibus; crisso et subcaudalibus albis; rectricum quatuor intermediarum rhachidibus valde elongatis, apicem versus tantum dilatato-plumosis; iride fusca; rostro pedibusque rubris. Vestimentum hiemale fuscum plumis late luride limbatis. — ♂ femella obscurior.

Der Hahnschweif-Widafink [Vidua caffra].

Tafel VII. Vogel 37.

Die größte und zugleich schönste Witwe gehört zu den Schmuckvögeln, welche zwar seit den ältesten Zeiten her eingeführt werden, aber bis zur Gegenwart im Handel am seltensten vorkommen. Sie ist ein stattlicher Vogel, nahezu von der Größe des Stars, von schwarzem Gefieder, mit roth und weißen Schultern und mit einem überaus langen Hahnenschwanz, welcher sehr stark und voll ist und aus schief dachförmig gebogenen Federn besteht.

Die Heimat beschränkt sich auf Südafrika und namentlich im Osten des Vorgebirges der guten Hoffnung und im Kaffernlande ist sie zu finden. Der Engländer Barrow hatte bemerkt, daß 20 bis 30 Weibchen gesellig leben und in einem solchen Schwarm nur zwei bis drei ausgefärbte Männchen zu sehen sind; auch ihre Nester, sagt er, stehen nebeneinander. Le Vaillant bestätigte dies und behauptete zugleich, daß die alten, unfruchtbaren Weibchen hahnfedrig werden und dann das Prachtgefieder des Männchens anlegen. Der Aufenthalt dieses Widafinken sind besonders Sümpfe und hier soll er das aus Gras und Kraut beutel- und kugelförmig gewebte und mit einer Schlupfröhre versehene Nest an Schilfhalmen hängend erbauen. Layard beobachtete ihn in Maisfeldern, wo er in der Weise der Webervögel nistete. Vieillot, der sich auf die genannten Schriftsteller bezieht, weiß nichts bemerkenswerthes hinzuzufügen; er nennt ihn la Veuve à épaulettes. Bechstein giebt über seinen Mohren-Kernbeißer auch weiter nichts an und so ist in der gesammten Literatur näheres nicht zu finden. Bolle zählt ihn in dem Verzeichniß mit. In der Annahme, daß diese Widafinken und wie man behauptet auch andere Arten in Vielehe leben, dürfte man sich, wie schon erwähnt, nicht täuschen. Von vornherein kann ich nämlich kaum glauben, daß sie gesellig zu mehreren Pärchen beisammen nisten, weil die Männchen im Prachtgefieder einander überaus heftig bekämpfen, sodaß sie wirbelnd zur Erde herabstürzen und dabei nicht selten von flinken Kaffernknaben ergriffen werden sollen; es wird also immer ein Männchen mit mehreren Weibchen sein. Im übrigen scharen sie sich gleich anderen Finken zu gewissen Zeiten in Schwärme zusammen, um zu wandern oder umherzustreichen, und daß dann die diesjährigen Jungen und die vielleicht erst im dritten Jahre zum Prachtgefieder sich verfärbenden vorjährigen die größte Mehrzahl bilden, ist wol erklärlich. Bedauerlicherweise ist das Freileben bis jetzt leider nur zu wenig erforscht und über die Brut noch garnichts weiter bekannt. Die Angabe, daß sie künstliche Webernester erbauen, wage ich stark anzuzweifeln, denn bei allen Webervögeln ist das Männchen der eigentliche Baumeister (gleiches müßte dann doch auch bei den Widafinken der Fall sein), und da alle Reisenden, trotz ihres Entzückens über den herrlichen Flug behaupten, daß der Vogel in seinen Bewegungen vom Winde nur zu sehr gehemmt werde, so meine ich, daß die Entfaltung einer solchen Kunstfertigkeit ihm kaum möglich sein dürfte. Man wird sich in den Vögeln wol irren, von welchen jene künstlichen Nester herrühren. Die Zeit wird hierüber sichere Auskunft bringen; — wer aber dies nicht abwarten mag, sei dazu gemahnt, in der weiterhin angegebenen Weise Züchtungsversuche mit den prächtigen Widafinken anzustellen.

In den Vogelhandel gelangt die Hahnschweif-Witwe regelmäßig nur in einzelnen Männchen und dies dürfte in Folgendem seine Erklärung haben. Die Leser erinnern sich wol, daß in früheren Jahren, bevor in Deutschland die Lieb-

haberei für die fremdländiſchen Vögel ſich allgemein verbreitete und man ſie eifrig züchtete, von manchen Arten nur die Männchen eingeführt wurden. Man hielt damals dies liebliche Gefieder nur zum Schmuck, die keineswegs ſchöngefärbten Weibchen wurden nicht mitgekauft und daher von den Vogelfängern ſogleich wieder freigelaſſen. In jenen fernen Gegenden nun, aus welchen der Hahnſchweif-Widafink hergebracht wird, mag es noch nicht bekannt ſein, daß gegenwärtig auch die Weibchen einen bedeutenden Werth haben.

Im zoologiſchen Garten von Berlin befindet ſich ſeit mehreren Jahren ein prachtvolles Männchen, welches immer acht bis neun Monate im Schmuckgefieder bleibt. Obwol es dann auch wie ſeine Verwandten ungleich erregter und lebhafter als ſonſt iſt, ſo hat es doch beiweitem nicht die ſtürmiſchen Bewegungen der kleineren Witwen. Es fliegt von einem hohen Zweige aus mit etwas ſchwerem Flügelſchlag und wallendem Schwanze ſeinen Strich, um auf denſelben Sitz zurückzukehren. Gegen die kleinen Vögel zeigt es ſich muthwillig, aber nicht bösartig, dagegen verfolgt es die Feuer- und Oryxweber anſcheinend mit großer Wuth, doch nicht anhaltend. Eine Anzahl ſolcher Widafinken in einem großen Gewächshauſe, z. B. im Palmenſaal der Charlottenburger „Flora“ gehalten, müßte eine entzückende Schönheit entfalten. Herr Karl Hagenbeck führte von Zeit zu Zeit eine Anzahl Hahnſchweifwidas ein. Jetzt ſind ſie aber ſeit Jahren nicht auf dem Vogelmarkt vorhanden geweſen. — Der Preis beträgt im Durchſchnitt 45 Mark für das einzelne Männchen.

Der Hahnſchweif-Widafink, die Hahnſchweifwida oder Hahnſchweifwitwe wird auch Epaulettenwitwe (bei den Händlern) oder Schleppwitwe und Witwe mit Achſelbändern genannt.

La Veuve à épaulettes; Long-tailed Whydah-bird (Jamrach und Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Langstaart (holländiſch).

Nomenclatur: Fringilla caffra, *Lchtst.;* Chera caffra, *Cab;* Chera Progne, *Bodd., Gray;* Loxia caffra, Emberiza longicauda, *Gml., Vll.;* Vidua phoenicoptera, *Sws.* — Orange-shouldered Bunting, *Lath.* — Kap'ſcher Sperling (Kolbe).

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Tiefſchwarz mit Einſchluß der langen Schwanzfedern, Schultern ſcharlachroth, darunter eine breite gelblichweiße Binde; die ſchwarzen Flügeldeckfedern breit fahl geſäumt. Auge braun; Schnabel weiß, an der Spitze blaugrau; Fuß röthlichbraun. — Weibchen oberhalb dunkelbraun, jede Feder breit fahlbraun geſäumt; Augenbrauenſtreif fahl röthlich; unterhalb fahl bräunlich mit dunklen Schaftſtrichen, Hinterleib faſt weiß. — Männchen im Winterkleide faſt ebenſo, nur dunkler, weil jede Feder einen ſehr breiten ſchwarzen Schaftſtreif hat.

Vidua caffra: sericeo-nigra, scapularibus scarlatinis, insequente fascia lata flavente alba; tectricibus al. nigris, late luride marginatis; iride fusca; apice rostri albidi subcoerulea; pedibus brunneis. — ♀ supra fusca; plumis singulis late luride limbatis; stria superciliari rufescente; subtus sordide fuscata, obscurius striolata; abdomine albido. — ♂ vestim. hiem. fere concolor nonnisi propter medium plumae cujusque nigrum obscurior.

Länge 53,5 cm. (20 1/2 Z.); Flügel 15,5 cm. (5 11/12 Z.); Schwanzfedern 41 cm. (15 3/4 Z.).

Der Halbmond-Widafink [Vidua ardens].

Als Herr Ch. Jamrach in London mir im Jahre 1874 eine Anzahl von Widafinken und Webervögeln aus verschiedenen Gegenden Afrikas sandte, befanden sich darunter zwei sehr verkümmerte Exemplare der schönen Schild- oder Halbmondwitwe. Deshalb zähle ich dieselbe hier als vollberechtigt mit, in der Hoffnung zugleich, daß sie demnächst wol wenigstens hin und wieder in einigen Pärchen eingeführt werde.

Sie ist etwa von Sperlingsgröße, am ganzen Körper tiefschwarz und an der Oberbrust mit einem brennendrothen Halbmond geziert. Als ihre Heimat ist bis jetzt nur der Süden und Osten von Afrika bekannt. Nach Ayres' Angaben flechten diese Vögel die Blätter eines Grasbüschels zusammen, sodaß das daraus gefertigte Nest während der Brut grün bleibt. Die Halbmondwida sammelt sich zeitweise zu großen Schwärmen an, welche in den Getreidefeldern Schaden verursachen. Weiter ist über das Freileben bis jetzt nichts bekannt.

Die älteren Schriftsteller erwähnen den Vogel, geben jedoch auch nichts näheres über ihn an. Er mag wol bereits mehrfach eingeführt sein, doch kennen ihn die Liebhaber und Händler nirgends und er ist in keinem Preisverzeichniß zu finden. Die meinigen gingen, leider im schlechten Gefieder, bald nach der Ankunft zugrunde, doch habe ich einen an das Berliner zoologische Museum gegeben.

Der Halbmond-Widafink oder die Halbmondwitwe ist auch Schildwida, Schildwitwe und Witwe Niobe (Rchb.) genannt.

La veuve en feu; la veuve Niobe; the Niobe-Widow.

Nomenclatur: Emberiza ardens, *Bodd.;* E. signata, *Scop.;* E. panayensis, *Gml., Lth., Bchst.;* Fringilla panayensis, *Vll.;* Vidua rubritorques, *Sws., Grn., Krk.;* Penthetria ardens, *Cab., Hrtl.* et *Fnsch.;* Vidua ardens, *Jrd., Hrtl., Lyrd., Gray;* Niobe ardens, *Rchb.* — Veuve en feu, *Buff.;* la veuve de l'Isle Panay, *Sonn.;* Panayan Bunting, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Einfarbig tiefschwarz mit bräunlichem Schein; auf dem Kropfe ein halbmondförmiges brennend mennigrothes Schild; die Deckfedern der zweiten Schwingen an der Außenfahne mit sehr schmalen bräunlichen Säumen; die Schenkelfedern und unteren Schwanzdecken am Ende mit breiteren blaßbräunlichen Endsäumen. Auge hellbraun; Schnabel schwarz; Füße dunkel graubraun. — Das Winterkleid ist einfarbig bräunlichgrau, jede Feder mit schwarzem Schaftstrich; unterhalb grauweiß; Schnabel horngrau. Nach Kirk ist der Vogel im Dezember und Januar im Prachtgefieder.

Vidua ardens: unicolor atra subfusco-micans; subucula ardente miniata; tectricibus al. mediis extrorsum angustissime subfusco-marginatis; plumis femoralibus et infracaudalibus latius fuscescente terminatis; iride badia; rostro nigro; pedibus obscure cinereo-fuscis. — Vestim. hiem. unicolor subfusco-cinereum scapo cujusque plumae nigro; subtus griseum; rostro corneo-cinereo.

Länge 26 cm. (10 Z.); Flügel 7,2 cm. (2¾ Z.); Schwanz 7,8 cm. (3 Z.); längste Schwanzfeder etwa 20,8 cm. (8 Z.).

* * *

Die folgenden Widafinken haben nicht den sehr verlängerten, wallenden Schwanz der vorigen. Obwol sie sonst noch in jeder Hinsicht ihnen gleichen, so stehen sie doch den Feuerwebern schon nahe. Sie sind für die Liebhaberei sämmtlich von keiner großen Bedeutung, einerseits weil sie mit Ausnahme eines einzigen nur selten in den Handel gelangen und andrerseits, weil doch an ihre Züchtung vorläufig noch garnicht zu denken ist. Wo man hier und da einen einzelnen oder ein Pärchen erhalten kann, werden sie als Schmuckvögel für Käfig oder Vogelstube immerhin willkommen sein; in diesem Sinne seien sie geschildert. Man nennt sie alle gewöhnlich Trauerwitwen [Penthetria, *Cab.*].

Der gelbschulterige Widafink [Vidua flaviscapulata].

Unter den Witwenvögeln im grauen Gefieder, welche ich von Hagenbeck oder Jamrach erhielt, befand sich mehrmals diese Art. Auch bei den Händlern zweiter Hand ist sie zuweilen vorhanden und wird gewöhnlich ausschließlich als Trauerwitwe bezeichnet. Sie ist etwas größer als ein Sperling, einfarbig tiefschwarz mit gelben Schultern. Das Weibchen wird höchst selten eingeführt und darin mag es liegen, daß sie nicht die Beachtung findet, welche sie wol verdient.

Erfreulich ist es, daß v. Heuglin einige Mittheilungen über das Freileben dieses Vogels gemacht hat: „Die gelbschulterige Trauerwida dürfte nach unseren Beobachtungen Standvogel in Abessinien sein. Dort hatten wir Gelegenheit, diese geselligen Vögel häufig zu beobachten, namentlich in Tigrié, in der Gegend von Adowa; zwischen 1255—2200 Meter Meereshöhe und in Flügen von vielen Hunderten, manchmal gemeinschaftlich mit der breitschwänzigen Wida. Die Verfärbung zum Prachtgefieder erfolgt während der Sommerregenzeit, die Rückfärbung zum grauen Kleide schon im November. Ueber die Brut vermag ich keinen Aufschluß zu geben, da ich in der Nistzeit jene Bezirke nicht besuchen konnte. Sie soll Beutelnester im Rohr bauen. An feuchten Wiesen, Sümpfen und an Bächen, wo viel Schilf und hohe Gräser wachsen, treiben sich diese Vögel beständig umher. Sie sind von lebhaftem, geschwätzigem Wesen, flattern von einem Rohrstengel zum andern, klettern äußerst gewandt an denselben hinauf, wiegen und schaukeln sich auf den Samenbüscheln, die sie nach allen Seiten durchsuchen, in den verschiedensten Stellungen. Beim ruhigen Sitzen hängt der sonst viel bewegte Schwanz senkrecht herab. Der Flug ist nicht sehr gewandt, flatternd und schwimmend; die Flugbahn ist horizontal oder etwas abwärts geneigt. Der Lockton erklingt melancholisch pfeifend. Die Schwärme sind ziemlich mißtrauisch; mit donnerähnlichem Lärm fliegen sie auf und flüchten in das Innere der Moräste. Nur wenn anhaltende Trockenheit eintritt oder das Schilf abgebrannt wird, verlassen sie ihre Wohnorte, indem sich jede Gesellschaft in kleinere Abtheilungen von 10 bis 20 Köpfen auflöst, um an den Ufern fließender Gewässer, namentlich aber in Gärten und Gehegen, wo viel Schilfrohr wächst, sich zu zeigen. So fanden wir sie vom November bis März in Schirié bei Gondar und in der Provinz Dembea."

In der Vogelstube des Herrn Graf York von Wartenburg schleppte sich ein Pärchen dieser Widafinken emsig mit Halmen und Fasern umher, doch zum wirklichen Nestbau kam es nicht und später stellte sich heraus, daß beide Männchen waren. Auch ich habe niemals ein richtiges Pärchen erhalten können.

Der gelbschulterige Widafink ist auch Gelbschulterwida, gelbschulterige und Gelbschulterwitwe und gelbschulterige Trauerwitwe (Rchb.) genannt worden.

La Veuve à épaulettes jaunes; the yellow-shouldered Widow (fälschlich Orange-shouldered Weaver-bird). — Elet (tigrisch nach Th. v. Heuglin).

Nomenclatur: Fringilla macrocerca, *Lchtst.*; Vidua macrocerca, *Gr.*; Penthetria macrocerca, *Cab., Hgl.*; Penthetria flaviscapulata, *Rpp., Bp., Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Tiefschwarz, Schultern lebhaft hochgelb, die übrigen Flügeldecken und Schwingen hell bräunlichgelb gesäumt; Unterflügel fahlbräunlich. Auge röthlichbraun; Schnabel schwarz; Füße schwarzbraun. — Weibchen oberhalb schwach gelblichbraun, jede Feder mit fahlbraunem Außensaum, Schulterfedern gelb gesäumt; Flügel und Schwanzfedern schwach gelblichbraun mit fahlbraunen Außensäumen; Augenbrauenstreifen und Backen fahl bräunlichgelb; Kehle, Brust und Bauch bräunlichweiß, Seiten schwach gestrichelt. Auge braun; Schnabel graubraun; Füße braun. — Männchen im Winterkleide ebenso, nur an der viel kräftigeren gelben Färbung der Schultern und dem röthlichbraunen Auge zu erkennen.

Vidua flaviscapulata: holosericeo-nigra, scapularibus alarumque marginibus laete flavis; remigum primorum apice sordide fumosa; subalaribus fulvis; tectricibus al. et cubitalibus dilute cervino-marginatis; iride fusca; apice rostri nigri mandibulaeque tomiis pallide coerulescente corneis; pedibus rufescentibus. — ♀ supra fusca plumis singulis exterius luride cervino-marginatis; scapularibus flavido-limbatis; remigibus et rectricibus pallide fulvis, exterius luride marginatis; stria superciliari genisque sordide flavidis; gula, pectore, abdomineque subfusco-albis; hypochondriis obsolete striolatis; iride fusca; rostro cinerascente fusco; pedibus fuscis. — ♂ vesti hiemali a femella vix discrepans, nonnisi scapularibus multo laetius flavis irideque subrufa distinctus.

Länge $24{,}7^{cm.}$ ($9\frac{1}{2}$ Z.); Flügel $9{,}1^{cm.}$ ($3\frac{1}{2}$ Z.); Schwanz $14{,}4^{cm.}$ ($5\frac{1}{2}$ Z.).

Der gelbrückige Widafink [Vidua macroura].

Tafel VII. Vogel 38.

In der vorhin angegebenen Weise gelangte auch diese Witwe in meine Vogelstube, doch ist sie im Handel fast noch seltener als jene. Sie gleicht der vorigen in Größe und Färbung, nur zieht sich das Gelb zugleich über den Oberrücken.

Heuglin fand sie parweise während der Sommerregenzeit auf feuchten Niederungen in Bongo, im Gebiet des Gazellenflusses. Sie verfärbt sich zu Mitte des Monats Juli und scheint im August und September ihre Wohnsitze mit den Jungen zu verlassen; im Dezember beobachtete der Reisende wieder einige dieser Widafinken unfern des Kosange-Flusses im trockenen Hochgras. Reichenow sah ihn als häufigen Vogel in der Ebene bei Akkra und sagt: „er treibt sich einzeln oder zu Paren im hohen Grase und auf Büschen umher. Gern setzt er sich auf

hervorragende Zweige und erhebt sich von hier aus spielend gerade in die Luft, wobei der Körper ganz senkrecht gehalten wird und die Nackenfedern aufgebläht erscheinen. Der Bau des Nestes ist dem des Oryxwebers sehr ähnlich; es hat einen dachartigen Ueberbau. Das Ganze ist indessen etwas fester, da ein aus grobem Grase lose hergestellter Außenbau und ein dichter Innenbau aus feinem, sprödem Grase vorhanden ist, welcher letztere dem Neste die nöthige Festigkeit giebt. Ein Kunstbau, wie Kirk schreibt, ist es keinenfalls. Es steht einzeln im hohen Grase. Das Männchen baut noch, wenn das zwei, höchstens drei Eier zählende Gelege bereits vollständig ist. Während das Weibchen brütet, sitzt das Männchen auf einem erhabenen Punkt in der Nähe mit gesträubten Nackenfedern und stürzt auf jeden Vogel los, der sich dem Nestort nähert. Wo dieser Widafink zahlreich vorkommt, findet man die Nester in geringer Entfernung von einander; jedes Männchen aber bewacht eifersüchtig sein kleines Gebiet. An der Goldküste fand ich im August, in Kamerun im November Eier in den Nestern." In allem übrigen stimmt die Lebensweise dieses mit der des gelbschulterigen Widafink überein; nur scheint er, wenigstens zur Brutzeit, nicht gesellig zu leben. Im September und Oktober entfärben sich die alten Männchen. Kirk sah ihn in großen Flügen und sagt, daß das künstlich geflochtene Nest zwischen Grasstengeln angebracht ist. Die Heimat dürfte sich über den größten Theil West- und Ostafrikas erstrecken.

Die älteren Schriftsteller Buffon, Vieillot erwähnen diesen Widafink nur kurz. — Voraussichtlich wird er demnächst wol häufiger eingeführt werden und dann könnte er ein werthvoller Bewohner der Vogelstuben sein, doch ist er, wie auch der vorige gegen Prachtfinken und andres kleines Gefieder bösartig.

Der gelbrückige Widafink wird auch blos Trauerwitwe, Trauerwida und langschweifige Trauerwitwe (Rchb.) genannt.

La Veuve à dos d'or (Vrzn. d. Akkl.-Grt. v. Paris); Yellow-backed Widow-bird (Jamrach und Liste d. zool. Grt. v. London).

Nomenclatur: Loxia macroura, *Gml.*, *Bchst.*; Loxia longicauda, *Lth.*; Fringilla chrysoptera, F. flavoptera, *Vll.*; Vidua macroura, *Gray*, *Hrtl.*, *Sclt.*, *Krk.*, *Hgl.*; Penthetria macroura, *Cab.*, *Bp*, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Rchb.*, *Rchn.* [Penthetria flaviscapulata, *Antn.*]. — Père noir à queue longue, *Buff.*; Gros-bec noir, *Salerne*; Long-tailed Gros-beak, *Lath.*; la Veuve chrysoptère, *Vieill.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Ober- und unterhalb sammtschwarz; Mantel, Schultern und die kleinsten oberen Flügeldecken hochzitrongelb; untere Flügeldecken weißlich; Flügeldecken und die letzten Schwingen an der Außenfahne schmal bräunlichweiß gesäumt. Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz mit grauer Spitze des Unterschnabels; Füße dunkelgraubraun. — Weibchen oberhalb matt aschbraun, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich; Flügel und Schwanz dunkelbraun; an Schultern und Oberrücken jede Feder schmal gelb gesäumt; unterhalb düster weiß, an der Brust bräunlich überlaufen und hier und an den Seiten einige Federn mit Schaftstrichen. Schnabel röthlichbraun.

Vidua macroura: holosericeo-nigra, interscapilio et scapularibus et tectricibus superioribus antecubitalibus laete citrinis; tectricibus subalaribus albentibus; remigibus secundariis et tertiariis earumque tectricibus exterius albido-marginatis; cauda longa, lata, flabelliformi, nigra; iride fusca; rostro nigro, mandibulae apice pallida; pedibus fuscis.

Länge 20,2 cm. (7¾ Z.); Flügel 7,6 cm. (2¹¹/₁₂ Z.); Schwanz 6,5 cm. (2½ Z.); mittelste Schwanzfeder 10,5 cm. (4 Z.). — Wbch. (nach Rchn.) Länge 14,5—15,5 cm.; Flügel 6,5 cm.; Schwanz 5 cm.

Beschreibung des Eies (nach Rchn.): auf grünem Grunde mit grauen Flecken bedeckt. Länge 20 mm.; Breite 13,5 mm. — Ovum viride, griseo-maculatum.

Der **breitschwänzige Widafink** [Vidua laticauda]. Diese vorzüglich schöne Witwe, welche ebenfalls tiefschwarz ist, mit scharlachrothem Oberkopf, Nacken und breitem Brustband, dürfte wol noch nicht lebend eingeführt sein. Ich habe sie trotz aller Bemühungen nicht erhalten können und dies wird wol darin begründet sein, daß sie selbst in ihrer Heimat nur selten vorkommt.

„Die rothbindige Trauerwida", sagt v. Heuglin, „wurde von uns gemeinschaftlich mit der gelbschulterigen Wida in der Gegend von Adowa und Aksum in Abessinien auf Morästen im Hochgras angetroffen, auch besucht sie Gärten und Gehöfte." Rüppell fand sie auf Buschwerk in den Thälern von Sémien. Bisjetzt ist sie nur in Abessinien und Habesch gefunden. Sie scheint sich etwas später zu verfärben, indem man im Dezember noch Männchen mit rothem Halsband sieht. — Näheres ist nicht bekannt.

Der breitschwänzige Widafink wird auch Breitschwanzwida, Breitschwanzwitwe, Halsband-Trauerwitwe (Rchb.) und rothbindige Trauerwitwe (Hgl.) genannt. — La Veuve à large queue; The broad-tailed Widow.

Nomenclatur: Fringilla laticauda, *Lchtst.;* Coliuspasser torquatus, *Rpp., Hgl., Lfbr.;* Vidua laticauda, *Gray;* Penthetria laticauda, *Cab., Bp., Hgl.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Ober- und unterhalb tiefschwarz; Ober- und Hinterkopf, Nacken und ein breites Band um Halsseiten, und Oberbrust hochroth; Rückenmitte, Flügeldecken, Schwingen und Schwanzdecken mit schmalen fahlbraunen Außensäumen. Auge rothbraun; Schnabel schwarz; Füße dunkelbraun. Weibchen kaum bekannt.

Vidua laticauda: nitide nigra interscapilii uropygiique plumis, tectricibus al. superioribus et inferioribus, tibialibus, crisso et subcaudalibus pallide cervino-marginatis; vertice, occipite, cervice, cinguloque lato circa colli pectorisque latera puniceis; iride badia; rostro nigro; pedibus brunneis. ♀ vix cognita.

Länge 20,8—23,4 cm. (8—9 Z.); Flügel 8,2 cm. (3⅙ Z.); Schwanz 11,8—13 cm. (4½—5 Z.).

Der **weißgezeichnete Widafink** [Vidua albonotata]. Nur kurz erwähnen darf ich diesen Witwenvogel, von dem ich überzeugt bin, daß er trotz gegentheiliger Behauptungen noch nicht lebend nach Europa gekommen. Soviel ich mich auch bei den Großhändlern und Direktoren der zoologischen Gärten bemüht, nirgends

habe ich Auskunft über ihn erhalten können. Er ist tiefschwarz; Flügelschwingen und obere Flügeldecken an den Außenfahnen sind schmal bräunlich gesäumt, die kleineren Deckfedern weiß, sodaß sie auf dem Flügel zwei große, weiße Flecke bilden. Die Verbreitung erstreckt sich über den Süden und Westen Afrikas. Sollte der Vogel bis zur Vollendung dieses Werkes noch eingeführt werden, was sich erwarten läßt, sobald Abessinien zugänglicher wird, so bringe ich im Nachtrage eine ausführliche Beschreibung nebst Abbildung.

Der kurzschwänzige Widafink [Vidua axillaris].

In ihrem ganzen Wesen bildet diese Witwe zweifellos einen Uebergang zu den Webervögeln, deren erste Gruppe, die Feuerweber, ihr sehr nahe stehen. Sie wird jedoch von den Vogelkundigen übereinstimmend, ungeachtet des im Prachtgefieder nicht auffallend verlängerten Schwanzes, zu den Widafinken gezählt.

Der Vogel gleicht auf den ersten Blick dem Hahnschweif-Widafink, doch ist er bedeutend kleiner, nur so groß als ein Haussperling und wie erwähnt ohne den langen Schwanz. Im Laufe der Zeit bekam ich ihn zweimal von Ch. Jamrach aus London, ohne daß es mir jedoch gelungen wäre, ihn in dem erbärmlichen Zustande am Leben zu erhalten. Dann sah ich ihn im Berliner Aquarium, in den zoologischen Gärten von Köln und Berlin, doch jedesmal nur als ein nicht völlig ausgefärbtes und nicht lange lebensfähiges Männchen. Die Heimat soll sich über den Süden und das tropische Afrika überhaupt erstrecken und daher erscheint es ebenso verwunderlich als bedauerlich, daß dieser prachtvolle Vogel gleich vielen anderen nur höchst selten lebend nach Europa gebracht wird.

Ueber die Lebensweise theilen Ayres und v. Heuglin Einiges mit. Nach ersterm Forscher erscheint die Art im Frühlinge in großen Schwärmen in Natal. In denselben befinden sich beiweitem mehr Weibchen als Männchen. Er schließt deshalb darauf, daß auch diese Vögel in Vielehe leben. Wahrscheinlich sind sie bei ihrer Ankunft noch nicht ausgefärbt. Das Nest wird im Hochgrase angelegt. Nach vollendeter Brütezeit verschwinden sie wieder. Heuglin beobachtete sie in kleinen Flügen von 6 bis 10 Köpfen in den sumpfigen, mit Hochgras und Cypergräsern bestandenen Gegenden am Sobat. Sie lassen eine nicht unangenehme, melancholisch klagende Stimme hören und ernähren sich hauptsächlich von kleinen Sämereien. Die Verfärbung zum Prachtgefieder geschieht im Monat Juni und die Entfärbung im November. Ayres sagt, daß sie den Körnerfrüchten außerordentlich schaden. (Nach v. d. Decken's Reisewerk IV.)

Der kurzschwänzige Widafink wird auch Stummelwida oder Stummelwitwe (Br.), besser Stummelschwanzwitwe und kurzschwänzige Epaulettenwitwe genannt.

La Veuve à courte queue; Short-tailed Widow.

Nomenclatur: Vidua axillaris, *Smth.*, *Gr.*, *Jrd.*, *Antn.*, *Grn.*, *Lyrd.*; Penthetria axillaris, *Lchtst.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Urobrachya axillaris, *Bp.*, *Rchb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Sammtſchwarz; die kleinſten oberen Flügeldecken am Unterarme brennend mennigroth mit gelbem Grunde, die größte Reihe der oberen Flügeldecken kaſtanienbraun; die Schwingen zweiter Ordnung und deren Deckfedern an der Außenfahne ſchmal kaſtanienbraun geſäumt; untere Flügeldecken kaſtanienbraun; Auge braun; Schnabel hellbleifarben mit ſchwärzlichem Grunde; Füße graubraun. — Männchen im Winterkleide: oberhalb braunſchwarz, jede Feder mit fahlbraunem Seitenrande, daher längsgeſtrichelt; Bürzel einfarbig iſabellbräunlich; obere Schwanzdecken dunkelbraun mit graubraunen Endrändern; breiter Streif vom Naſenloch über den Zügel und das Auge bis zu den Schläfen roſtbräunlich, ebenſo die Kopfſeiten; vom Mundwinkel bis zur Ohrgegend dunkelbräunlich; Schwingen ſchwarz; Deckfedern der Schwingen, größte Reihe der oberen Deckfedern und untere Flügeldecken ſchön kaſtanienbraun; die kleinſten oberen Deckfedern am Unterarm hoch orange; Schwanzfedern dunkelbraun mit fahlen Endſäumen; unterhalb roſtbräunlich; Kinn, Bauch und Hinterleib weißlich; Schnabel horngrau mit dunklem Grunde; Füße hornbräunlich. — Das Weibchen hat im weſentlichen dieſelbe Färbung, nur ſind die Federn überall mehr roſtbräunlich gerandet; die unteren Flügeldecken ſind zimmtroſtbraun; Schnabel röthlichfahlbraun, der untere heller; Füße röthlichbraun. Es hat eine auffallende Aehnlichkeit mit dem des gelbſchulterigen Widafink, unterſcheidet ſich aber leicht durch die zimmtroſtbraunen, unteren Flügeldecken und die ſcharf hervortretenden roſtbraunen Außenſäume der Schwingen und Deckfedern.

Vidua axillaris: holosericeo-nigra, humeris laete miniatis; remigibus secundariis eorumque tectricibus exterius fulvo-sublimbatis; tectricibus al. minoribus alaeque flexura et subalaribus badiis; subcaudalibus nigris; iride fusca; basi rostri plumbei nigricante; pedibus dilute fuscis. — ♂ vesti hiemali notaeo fuscescente nigro propter plumas singulas luride marginatas longitudinaliter striolato; uropygio unicolore isabellino; supracaudalibus fuscis cinerascente terminatis; stria lata a naribus supra lora oculosque usque ad regionem temporalem ferruginosa; capitis lateribus ab oris angulo usque ad regionem paroticam fuscatis; tectricibus et remigum et minoribus deuteris et subalaribus laete badiis; tectricibus antecubitalibus rubro-aurantiis; rectricibus fuscis luride terminatis, subtus ferrugineis; mento, abdomine crissoque albidis; basi rostri cinereo-cornei obscuriore; pedibus subfuscis. ♀ parum discreta, nonnisi plumis omnibus magis ferruginoso-limbatis; tectricibus subalaribus cinnamomeis; mandibula rostri luride badii pallidiore; simillima etiam femellae Viduae flaviscapulatae, distincta vero tectricibus subalaribus cinnamomeis et marginibus externis remigum eorumque tectricum magis conspicuis.

Länge 16,4 cm. (6¼ Z.); Flügel 8,5 cm. (3¼ Z.); Schwanz 6,7 cm. (2⁷/₁₂ Z.).

Die Webervögel [Ploceidae].

Aus den Berichten der Reisenden kennt jeder Naturfreund jene Finken, welche zu den größten Künstlern in der Thierwelt zu zählen sind, die Webervögel. Ihre Nester schildern die Schriftsteller förmlich mit Begeisterung; ihre Brutansiedelungen gehören zu den bezeichnendsten Erscheinungen tropischer Landschaften, indem sie einerseits weithin in die Augen fallen und andrerseits ebenso mannigfaltig verschieden, als im einzelnen bewundernswürdig kunstfertig sind.

Das eine Nest stellt einen einfachen, kugelrunden Ball dar, mit einem seitlichen oder von oben hinabführenden Flugloch; ein zweites hat von diesem Bau eine mehr oder minder tief hinunterhängende Röhre, in welcher der Vogel nach oben klettert, es hat also die Form einer Retorte; ein drittes bildet eine Kugel mit überstehendem Dache, während ein viertes an einem zusammengedrehten Bande freischwebend hängt, mit dem geräumigen Schlupfloch von unten hinauf; ein fünftes in Gestalt eines Doppelballs hat hinterwärts als eigentliches Nest eine gesonderte Ausbuchtung und vorn eine tief von unten senkrecht hinaufreichende Röhre. Fast bei allen zeigt sich gleicherweise das Dach sehr dicht und dick ausgeführt, wahrscheinlich zum Schutz gegen die gewaltigen Platzregen, wie gegen die Sonnenstrahlen der Tropen. Die Mulde dagegen, in welcher die Eier liegen, ist nur in seltenen Fällen ausgepolstert, oft so wenig dicht, so luftig, daß die Eier von unten hinauf zu sehen sind. Die Nester anderer Webervögel sind unter einem Dache, meistens in großer Anzahl beisammen erbaut, jedes einzelne jedoch für sich und mit besonderm Schlupfloch. Schließlich findet man auch noch nesterartige Gebilde, welche oben ein ebenso starkes Dach haben, denen unterhalb aber die Nisthöhlung fehlt, an deren Stelle blos quer in der Mitte ein fester gedrehter Strang angebracht ist. Manche Reisenden bezeichnen diese Bauten als „Vergnügungsnester". Eine solche Benennung ist aber unrichtig, denn die Nester haben einen ganz bestimmten Zweck. Auf dem Strang in der Mitte sitzt nämlich während der Nacht das Männchen und auch wol bei Tage, wenn es Schutz gegen Regen und Sonnenstrahlen suchen will. Meistens bauen die Männchen allein und das Weibchen macht sich nur an einem Neste zu schaffen, wenn es dasselbe für seine Brut ausgewählt hat; es bessert dann innen aus, glättet und ordnet, ohne jedoch, wie manchmal behauptet worden, mit dem Männchen gemeinsam zu arbeiten. Da nun fast jedes Männchen rastlos weiter baut,

immer mehrere Nester und da es weder mit dem Weibchen zärtlich zusammenhält noch dasselbe während des Brütens oder die Jungen füttert, sondern nur das Nest gegen die Annäherung eines andern Männchens oder jedes andern Vogels überhaupt sorgfältig bewacht, so hat man daraus folgern wollen, daß alle Webervögel oder doch wenigstens die meisten in Vielehe leben. Dies ist freilich eine Annahme, welche bis jetzt ebensowenig durch die Forschungen der Reisenden als durch die Beobachtungen in der Vogelstube *sicher* festgestellt worden. Nach meinen Erfahrungen, die ich weiterhin bei den einzelnen Arten mittheilen werde, dürfte es allerdings richtig sein, daß die meisten Weber Vielweiberei treiben. Ruhe- und Rastlosigkeit, eifriges Herstellen immer neuer Nester, Einreißen der nahezu vollendeten und Wiederaufbauen — das ist ein bezeichnendes Thun und Treiben sämmtlicher Webervögel. Uebrigens ist ihr Nestbau streng genommen nicht ausschließlich als Weberei zu betrachten; er kann ebensogut als Strickerei oder als Flechterei erachtet werden. So verschiedenartig als die Formen der Nester sind auch die Baustoffe, aus denen sie hergestellt werden; die mannigfaltigsten Gräser, Halme, Fasern, Bast, Würzelchen, Fäden u. dgl. werden dazu verwendet und einunddieselbe Webervogelart kann, je nach der Gegend, in welcher sie nistet, vornehmlich aber dem Baumaterial entsprechend, von einander überaus abweichende Nester errichten; ein Nest aus Fasern und Bastfäden hat mit dem aus Gräsern desselben Vogels kaum eine Aehnlichkeit. Die meisten Weberneſter hängen an dünnen, schwanken Zweigen über Gewässern, Regenschluchten oder Abhängen und hier sind sie, wie man annimmt aus Vorsicht, der Affen, Schlangen u. a. Räuber wegen, angebracht.

Die Webervögel kommen nur in den beiden Welttheilen Afrika und Asien vor. Es sind Finken etwa von der Größe des Zeisigs, bis zu der einer Drossel. Im Winterkleide einfach sperlingsgrau, legen sie mit dem Beginn ihrer Nistzeit, welche dem Frühlinge ihrer Heimat entspricht, das Prachtgefieder an. Ihre Lebensweise gleicht im übrigen der anderer Finken. Ob sie Stand-, Zug- oder Strichvögel sind, ist noch nicht sicher festgestellt; obwol man behauptet, daß die meisten Arten wandern, so dürfte sich dies doch im wesentlichen nur auf umherstreichen zu bestimmten Zeiten beschränken. Während die meisten Weber zu jeder Zeit, also auch beim Nisten gesellig zusammenleben, so herrscht doch keineswegs Friede und Eintracht unter ihnen. Alle Männchen sind immerfort in Zank und Streit begriffen und selbst mit den Weibchen sind sie nicht friedlich, geschweige denn, daß sie ein zärtliches und inniges Familienleben führen, wie die Prachtfinken. Die Nahrung besteht in Sämereien, doch auch in Kerbthieren. Diesen allgemeinen Angaben sei eine lebensvolle Schilderung der Webervögel in ihrer Heimat — jedenfalls die treueste, welche bis jetzt geschrieben ist — von dem jungen Afrikareisenden Dr. A. *Reichenow* angefügt:

„Wie einem Gemälde der hoch dünenden See die Sturmschwalben, der ländlichen Skizze unserer Dörfer Storch, Schwalbe und Sperling, den Bildern gewaltiger Klippen des hohen Nordens Steißfüße und Lummen nicht fehlen dürfen, so sind die Webervögel mit der Vorstellung westafrikanischer Landschaften eng verbunden. Diese Vögel sind es, welche dem ankommenden Reisenden zuerst in die Augen fallen und die ihn begleiten von Ort zu Ort. Betritt man die schmalen Gassen zwischen eng zusammengebauten Lehmhütten oder die breiten, von üppigen Pisangbäumen umgebenen Plätze vor freundlichen Bambuhäusern, so hört man das Geschwirr und Gezänk der ewig lustigen, arbeitenden, scheltenden und singenden Weber. Verfolgt man schmale Pfade durch weite, mit mannshohem Grase bedeckte Flächen oder mit kleinem Gebüsch bewachsene Ebenen, so schimmern überall die rothen Farben der Feuerweber (Pyromelaena) und die gelben der Edelweber (Hyphantornis) hervor. Fährt man im kleinen Bot durch die Kanäle, welche das Delta eines größeren Flusses durchschneiden, so erschallen aus den Mangrove und Pandanus die heiseren Stimmen der feuerköpfigen Hordenweber (Sycobius) und von den mächtigen Blättern der Weinpalmen hängen deren künstliche Nester herab. Auch im dichten Urwald schaukeln sich diese prächtigen Weber in den Schlingpflanzen und steigen hoch hinauf in die Gebirge. Ja, die Weber sind so recht eigentlich die Charaktervögel Guineas.

Während meines jetzt neunmonatlichen Reisens und Jagens in Afrika habe ich 14 Weberarten*) beobachten können. Man findet diese Webergattungen nicht neben einander in wechselnden Terrainverhältnissen, im Gegentheil vertreten sich dieselben an den verschiedenen Oertlichkeiten und man kann die Vidua und Pyromelaena als Steppen-, die Hyphantornis als Dorf- und Haide-, die Sycobius als Waldbewohner bezeichnen.

Eine weite Grasebene bei Akkra an der Goldküste bot mir zuerst Gelegenheit, Webervögel kennen zu lernen. Mannshoch schießt hier das Gras empor, wenn die tropischen Regen niederströmen und in den Monaten April bis August das Land überschwemmen. Viele Vögel aus zahlreichen, einander fernstehenden Familien haben dann hier zusagende Brutstätten, bis im Oktober die glühende Sonne sich der Schöpfungen des Wassers bemächtigt und die üppige Fläche in eine öde Brandstätte verwandelt. Der vernichtenden Wirkung der Sonnenstralen kommen jetzt noch die Menschen zu Hülfe, indem sie die trockenen Reste niederbrennen, aus deren Asche dann mit Beginn der Regenzeit von neuem die üppige Pflanzenentwickelung in ihren Kreislauf tritt. Hier also leben und lieben die schönen Feuerweber und Widafinken.“ —

*) Der Begriff Weber ist hier im Gray'schen Sinne gefaßt, indem zur Familie Webervögel auch die Widafinken mitgezählt werden.

Die erwähnte Verfärbung zum Prachtgefieder zeigen die Webervögel, mehr oder weniger auffallend, regelmäßig alljährlich. Dieselbe besteht in einem Vorgange, der ja, obwol beiweitem nicht so bemerkbar, auch bei europäischen Finkenvögeln sich äußert. Sie ist fast immer aber mit mehr oder minder großen Irrthümern geschildert. Um eine solche Erscheinung im Vogelleben recht kennen zu lernen und dann sach- und wahrheitsgemäß beschreiben zu können, bedarf es jahrelanger Beobachtungen. Ich glaube nun, in dem folgenden mich keiner irrthümlichen Angaben schuldig zu machen. Wenn in der Heimat einer Webervogelart der Frühling naht und damit die Nistzeit, beginnt eine Anzahl der Federn des Männchens aus der grauen Farbe sich zu verfärben, indem sie theils an der Spitze der Bärte und Fahnen, theils auch in der Mitte derselben farbige Flecke bekommen, welche mehr und mehr sich vergrößern, bis sie zuletzt die ganze Feder überziehen. Währenddessen aber schießen überall junge, bereits völlig gefärbte Federn hervor, durch welche namentlich das ganze Kleingefieder mehr oder weniger vollständig erneuert wird. Diese vorzugsweise in glänzenden, prächtigen Farben prangenden Federn haben größtentheils eine ganz andere Beschaffenheit als die alten, in weichen, längeren, fein zerschlissenen und selbst wellenförmig gestalteten Bärten nämlich. Sobald dann die Entfärbung eintritt, fallen diese neuen Federn wieder aus und die ersterwähnten verfärben sich wieder ins Graue zurück. Dann erst späterhin findet die eigentliche Mauser in der Erneuerung auch des Großgefieders statt. Die Weibchen bleiben stets im grauen Kleide. Der Vorgang der Verfärbung ist bei den verschiedenen Verwandtschaften wesentlich von einander abweichend und ich werde daher bei den einzelnen Arten noch näher darauf eingehen. Bemerkt sei zugleich, daß außer Anderen auch der tüchtigste Kenner, ein langjähriger Züchter und Erforscher aller Webervögel, Herr Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. in Wittstock, mir mit seinen Erfahrungen zurseite steht, welche ich weiterhin am betreffenden Orte einschalten werde.

Wenn alle Webervögel nun auch zunächst in der Errichtung künstlicher Nester, dann in der Verfärbung, in der Lebensweise und in mancher andern Hinsicht übereinstimmen, so zeigen sie andrerseits doch solche Verschiedenheiten, daß man sie nothwendigerweise in mehrere Hauptgruppen theilen muß. Dies geschieht in sehr abweichender Weise und ich werde mich bemühen, eine Uebersicht zu geben, wie sie der allverständlichen Darstellung am meisten entspricht, ohne jedoch unwissenschaftlich zu sein.

Für die Liebhaberei sind die Webervögel von nicht geringer Bedeutung. Sie vereinigen mit mehr oder minder herrlichem Farbenschmuck geringe Bedürfnisse, nehmen also mit einer sehr einfachen Verpflegung vorlieb und sie erfreuen ihren Besitzer dadurch, daß sie selbst unter minder günstigen Verhältnissen in eifrigster Weise ihre künstlichen Bauten errichten. Einige Arten begnügen sich

freilich damit und gelangen nur selten zur erfolgreichen Brut; andere aber sind als tüchtige Zuchtvögel zu erachten. Selbstverständlich werde ich alle diese Eigenthümlichkeiten bei jedem einzelnen Vogel bemerken und dann weiterhin in den bezüglichen Abschnitten Anleitungen für die Verpflegung und Züchtung geben. Die Fütterung in der Gefangenschaft besteht in Hirse und Spitzsamen, bei den größeren Arten mit Zugabe von Hanf u. a. Sämereien. Alle aber bedürfen auch nothwendigerweise der Fleischnahrung, denn andernfalls machen sich sehr übele Erscheinungen geltend. Bereits im „Handbuch für Vogelliebhaber" habe ich darauf hingewiesen, daß alle diese Vögel, namentlich aber die Feuerweber, in der Verfärbung ganz auffallend zurückbleiben, wenn sie, wie in den Läden der Händler, nur mit Körnern ohne Mehlwürmer, Ameisenpuppen, Eierbrot u. dgl. gefüttert werden. Freilich äußert nicht die Fütterung allein ihren Einfluß bei dieser Färbung, sondern es kommen auch Licht- und Luftverhältnisse zur Geltung, und ich werde in den Abschnitten, welche die Verpflegung der Vögel behandeln, auch in dieser Hinsicht Erfahrungen und Rathschläge mittheilen.

Während die kleineren Webervögel im Gesellschaftskäfige unter Prachtfinken u. a. selbst im Hochzeitskleide verträglich sind, so können sie in der Vogelstube doch dadurch, daß sie in stürmischer Lebhaftigkeit alle anderen Vögel aus der Umgebung ihres Nestes vertreiben, viele Störung verursachen. Eigentlich bösartig sind sie jedoch nicht. Auch die großen Arten sind nicht wirklich bissig. Wenn sie selber aber nisten, so rauben sie aus den Nestern ihrer Mitbewohner gern die Brut, um ihre Jungen damit zu füttern.

Von einem Gesange kann bei ihnen allen überhaupt keine Rede sein. Zischen, Zirpen, Schnarren, Gackern, das sind ihre Laute, aus denen ein gar wunderliches Liebeslied angestimmt wird, das, dem Weibchen immerhin süßer als Philomelengesang ertönend, für ein verwöhntes Ohr doch manchmal unleidlich erschallt. Um so unterhaltender ist ihr Liebesspiel, welches ich bei jeder einzelnen Art schildern werde.

Die Preise schwanken von $4{,}_{50}$ Mark bis 36 Mark und darüber für das Paar, und abgesehen davon, daß manche seltenen Arten noch übermäßig theuer sind, darf man sie im allgemeinen zu dem am meisten preiswerthen kleinen Gefieder zählen; denn außer den schon erwähnten Vorzügen haben sie auch noch die, daß sie zu den ausdauerndsten aller Stubenvögel gehören und daß wenigstens im Prachtkleide, vom Beginn der Verfärbung an die Geschlechter leicht zu unterscheiden sind, sodaß man dann mit Sicherheit richtige Pärchen erhalten kann. Ein Uebelstand tritt freilich darin ein, daß die Jungen der Arten, welche im Käfige oder in der Vogelstube nisten, sich erst im zweiten oder dritten Jahre zum Schmuckkleide färben und daß daher die Verwerthung der Nachzucht für lange Zeit Schwierigkeiten hat.

* * *

Die **Feuerweber** [Euplectes, *Sws.*; Pyromelaena, *Bnp.*; Xanthomelaena, *Bnp.*], gewöhnlich Feuerfinken genannt, stehen den vorangegangenen kurzschwänzigen Widafinken überaus nahe und obwol sie von den Systematikern einstimmig zu den Webervögeln gezählt werden, so sind sie doch von den übrigen sehr bedeutsam verschieden. Ihnen sind besonders glänzende, brennende Farben eigenthümlich; gewöhnlich neben einem tiefen Schwarz, prächtiges Roth in verschiedenen Schattirungen oder auch Gelb. Im Prachtgefieder leicht zu unterscheiden, gehört doch ein Kennerblick dazu, wenn man sie im grauen Kleide oder ihre Weibchen erkennen will.

Während sie die von den europäischen Reisenden am meisten besuchten Gegenden Afrikas bewohnen, ist trotzdem ihre Entwickelungsgeschichte noch keineswegs sicher erforscht. Es steht noch nicht fest, ob sie Stand- oder Zugvögel sind; zwar hat man das letztere angenommen, doch kann darin wol eine Täuschung liegen, daß sie im grauen Kleide viel weniger auffallen und dann dort nicht bemerkt werden, wo man sie im Prachtgefieder gesehen hat.

Gar überschwenglich schildert ein Schriftsteller den Eindruck, welchen ein von Feuerwebern bewohntes Durrafeld gewährt. Als Flämmchen, welche aufschießen, verschwinden und wieder aufblitzen und durch solch' wunderbares Spiel das Auge entzücken, beschreibt er die Vögel, wenn sie auf den Spitzen der Büschelmaishalme sich wiegend und, das Gefieder sträubend und flügelschlagend, ihren Liebesgesang zischen. Freilich hat er sie viel mehr mit der Fantasie als mit klaren Blicken geschaut, denn er behauptet auch, daß der Orangeweber, welcher etwa die Größe des Feldsperlings und einen verhältnißmäßig schwachen Schnabel hat, die harten Maiskörner knacke.

Die Nahrung der Feuerweber besteht in Hirse- und Gräsersämereien, daneben aber vornämlich auch in Kerbthieren und namentlich deren Bruten. Ihre Nester stehen im Gebüsch, welches mit Hochgras durchwachsen ist (nicht aber hängen sie, wie fälschlich angegeben worden, an den Durrastengeln), zuweilen dicht über dem Boden, bei einigen Arten im Schilf und Rohr über Gewässern; auch findet man dieselben nicht in eigentlicher Geselligkeit beisammen, sondern nur unfern von einander und jedes Männchen hat und vertheidigt wacker sein kleines, abgegrenztes Nistgebiet. Das Nest ist viel weniger kunstvoll, als das anderer, besonders der ostindischen Weber; es ist aus Grashalmen oder gespaltenen Rohrblättern geflochten und bildet einen überwölbten Beutel mit einem oder zwei Schlupflöchern von oben hinab. Jedes Gelege besteht aus drei bis acht grünlichblauen, mehr oder weniger hellen, selten gesprenkelten oder bespritzten Eiern und es erfolgen in einem Jahre mehrere Bruten. Nach beendeter Nistzeit sammeln sich die Feuerweber gleich anderen Finken zu großen Schwärmen an und dann sollen sie umherstreichend erheblichen Schaden am Getreide, Hirse u. dgl. verursachen.

Bei dieser Weberfamilie tritt die Verfärbung zum Prachtgefieder vorzugsweise durch sehr üppiges Hervorschießen des farbigen Kleingefieders ein, und man kann sich daher — wie es mir und anderen Beobachtern anfangs ergangen — gar leicht täuschen. Ich hatte verschiedene Feuerweber und Widafinken während des Farbenwechsels in geschlossene Käfige gesperrt, und da ich garkeine ausgefallenen grauen Federn bemerkte, sondern hier und da eine ausgezupfte größere Feder in voller Farbenveränderung fand, so glaubte ich, daß dieser Vorgang über das ganze Gefieder sich erstrecke. Herr Gymnasiallehrer Fr. Schneider II. in Wittstock hat dann aber durch anhaltende Beobachtung und gründliche Untersuchung festgestellt, daß eine bedeutsame Erneuerung des Gefieders stattfindet.

Er theilt Folgendes über die Verfärbung der Feuerweber mit: „Am längsten und sorgfältigsten habe ich einen seit fünf Jahren in meinem Besitz befindlichen Oryxweber beobachtet. Dieser Vogel mausert, sowol Männchen als auch Weibchen, sicher zweimal im Jahre; die meinigen gewöhnlich im März und November. Bei der Frühjahrsmauser, also der Verfärbung zum Prachtgefieder, erstreckt sich der Federwechsel nur auf das Kleingefieder, bei der im Herbst eintretenden eigent-



Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

lichen Mauſer auf das ganze Federkleid. Eine Verfärbung des grauen Gefieders vor der beginnenden Mauſer findet nicht ſtatt. Die grauen Federn fallen vielmehr ohne vorherigen Farbenwechſel aus, verdrängt durch die hervorſprießenden ſchwarzen und rothen, und der Verlauf iſt folgender. Das erſte Anzeichen der eintretenden Veränderung iſt die Umfärbung des hornbraunen Schnabels, der allmälig ein glänzendes Schwarz annimmt. Zuerſt fallen die Federn des Zügels, dann die ums Auge und die an der Kehle aus; es treten alſo die ſchwarzen Federn des Geſichts hervor. Darauf wechſeln die Federn des Vorder- und Hinterhalſes mit orangerothen, die der Bruſt und des Bauches mit ſchwarzen und die weißen der Unterſchwanzdecken mit orangefarbenen. Jetzt erſt fallen die grauen Federn des Scheitels und Hinterkopfes aus und die ſchwarzen wachſen hervor. Es ſieht komiſch aus, wenn einzelne graue ſich verſpäten und aus den dunklen, noch kurzen, weit hervorragen; dann folgen die der Seiten, des Ober- und Unterrückens, des Bürzels und zuletzt die Flügeldeckfedern erſter und zweiter Ordnung. Der Vogel, welcher auch im grauen Kleide ſich aufbläht und Kopf- und Nackenfedern ſträubt, ſodaß letztere förmlich wie eine Halskrauſe ſtehen, ſieht anfangs in dem kurzen rothen und ſchwarzen Gefieder viel kleiner aus als im grauen, namentlich erſcheint der Kopf weniger groß. Sobald jedoch die neuen Federn ausgewachſen ſind, iſt er merklich größer als vorher. Wenn ſchon die grauen Federn ſehr zerſchliſſen ſind, ſo iſt dies in einem noch viel höheren Grade bei den ſchwarzen der Fall; auch hat ſich die Geſtalt dieſer Federn verändert. Die graue Feder iſt lanzettförmig, endet alſo gleichmäßig verlaufend in eine Spitze; die ſchwarze hingegen iſt ſtumpf, die Spitze fehlt oder ſie erſcheint abgerundet. Die Herbſtverfärbung geht ganz in derſelben Reihenfolge vor ſich. Die Schnabelwurzel wird weißlich, das glänzende Schwarz des ganzen Schnabels verbleicht und geht nach und nach in Braun über; ebenſo machen die prunkenden Federn den grauen Platz. Abſonderlich ſieht der Vogel aus durch die neu hervorbrechenden grauen Federn um das Auge. Die Zeitdauer der Mauſer beträgt bei meinen Oryxwebern ungefähr vier Wochen. Das Männchen webt dabei ununterbrochen ſeine künſtlichen Beutelneſter, auch findet ſchon in dieſer Zeit die erſte Begattung ſtatt und eins der Weibchen hatte ſchon Ende März bei 4 Gr. R. Wärme Eier gelegt.

Ein Orangewebermännchen, ſeit drei Jahren in meinem Beſitz, mauſert nur wenig, aber regelmäßig zweimal im Jahre, im März und November, und zu beſtimmter Zeit trägt der Vogel ſein graues Kleid wieder. — Im vergangenen Herbſt erhielt ich auch ein Pärchen Sammtweber. Das Männchen war faſt nackt und die wenigen Federn, welche es hatte, waren ſchwarz. Bald wuchſen andere Federn nach und zwar graue im Kleingefieder, ſchwarze im Schwanz und in den Flügeln. Zur Weihnachtszeit erſchien der Vogel ſonderbar, ſchwarz- und graugefleckt. Schon im Februar begannen die grauen Federn jedoch auszufallen und im März

prangte er bereits im sammtschwarzen Kleide; seltsamerweise sind bei ihm auch die Schwung- und Schwanzfedern schwarz, so dunkel wie das übrige Gefieder. Die Rücken- und Schulterfedern, welche bei einem zweiten Männchen rein schwefelgelb sind, nähern sich bei ihm ebenfalls der schwarzen Färbung, d. h. sie sind schwarz mit ganz schwachen gelben Streifen. Das vermeintliche Weibchen verwandelte sich in ein prachtvolles Männchen und ebenso ein zweiter, im März mir zugesandter Vogel; die Verfärbung geschah durch den Wechsel des Kleingefieders. Bei dem letztern Männchen sind die Flügel und Flügeldeckfedern schwarzbraun mit fahlbraunen Außensäumen.

An einem Napoleonsweber, welcher sonderbarerweise nur drei Monate hindurch im Prachtgefieder verblieb, habe auch ich die von anderen Züchtern beobachtete Verfärbung des grauen Gefieders vor der Mauser in ein gelbliches bemerkt. Namentlich sind Rücken, Seiten und Bürzel deutlich gelb, während die schwarze Farbe noch nicht vorhanden ist.

Der Verlauf der Verfärbung bei dem Madagaskarweber ist ein ähnlicher. Ich besitze vier Männchen und drei Weibchen, deren erstere jetzt sämmtlich mehr oder weniger im Prachtgefieder sind oder sich doch anschicken, dasselbe anzulegen. Von denselben war das eine sechs Monate im Winterkleide, ein zweites nur drei Monate und die Zeit der Verfärbung währte acht bis zehn Wochen. Bei der Herbstmauser des einen fiel nur das Kleingefieder aus. Einen wirklichen Farbenwechsel konnte ich jedoch bei diesen Vögeln nicht feststellen.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen bin ich nun geneigt, anzunehmen, daß eine Mauser des Kleingefieders und eine gleichzeitige Verfärbung der Flügel-, Schwanz- und vielleicht auch der Flügeldeckfedern stattfindet."

In dieser letztern Annahme hat mein geschätzter Herr Mitarbeiter in der That den richtigen Sachverhalt getroffen. Die Unregelmäßigkeiten aber, welche bei diesem Vorgange sich allenthalben zeigen, tragen eben die Schuld an den unglaublich weit auseinandergehenden Behauptungen und vielen Irrthümern, welche in Hinsicht der Verfärbung aufgetaucht sind. Festzuhalten dürfte sein, daß die Mauser und Verfärbung der meisten Webervögel in der Gefangenschaft außerordentlich vielen Wechselfällen unterworfen sind, indem sie vor allem durch den Ernährungszustand, sodann durch die Beschaffenheit des Futters und schließlich auch durch die Licht-, Luft- und Wärmeverhältnisse beeinflußt werden. Während bei dem freifliegenden, im hellen, luftigen Raume gehaltenen, naturgemäß mit Körner- und reichlicher Fleischnahrung versorgten und in mäßiger Stubentemperatur gehaltenen Weber eine Verfärbung und theilweise Erneuerung des Gefieders zugleich eintritt, so wird der nur mit Sämereien gefütterte und vielleicht auch ungünstig beherbergte gleiche Vogel durch die Erregung der Liebes-

zeit doch nur bis zum Farbenerglühen, also bis zur Verfärbung ohne Nachschießen der Federn, gelangen können*), und in den Abstufungen zwischen diesen beiden Vorgängen beruhen eben alle Unregelmäßigkeiten, welche zu so vielen einander entgegenstehenden Angaben geführt haben.

In der Heimat soll die Liebeszeit, während welcher der Vogel im Prachtgefieder sich befindet, etwa vier Monate währen; in der Gefangenschaft ist die Dauer des Prachtkleides aber außerordentlich verschieden. Auch sie hängt nicht allein von dem Alter, sondern auch durchaus von dem Ernährungszustande des Vogels, sowie von Licht- und Wärmeverhältnissen ab. Feuerweber, welche schlecht gepflegt werden, gelangen viel langsamer zur Verfärbung und werden früher wieder grau. Gut gefüttert dagegen und besonders reichlich mit Fleischnahrung versorgt, erhält sich ein Männchen wol sechs bis acht Monate, ja zuweilen Jahr und Tag in voller Pracht. — Auch an ihnen tritt die bei den Prachtfinken S. 34 und 72 geschilderte Schwarzfärbung des Gefieders ein und zwar in der Weise, daß in den Käfigen der Händler manche Napoleons- und Orangeweber vorhanden sind, welche bis auf den weißen Schnabel ganz düster und kohlschwarz aussehen.

Ihr Liebesspiel besteht in wunderlichem Tänzeln und Hin- und Herfliegen mit aufgeblähtem Gefieder, unter fortwährendem Flügelklappen, Nicken und Bücken; man kann es wol mit dem Balzen mancher Hühnervögel vergleichen. Der gleichzeitig erschallende Liebesgang besteht nur in heiserm Zischen.

Gerade die Feuerweber gehören zu den beliebtesten fremdländischen Stubenvögeln; freilich erscheinen sie im grauen Gefieder nichts weniger als schön, und ihr stürmisches, ruheloses Wesen vermag ihnen auch wol nicht leicht Freunde zu erwerben. Ihre brennenden Farben aber fesseln von vornherein den Blick des Liebhabers, auch liegt doch ein ganz besondrer Reiz in dem Vorgange der Verfärbung, nicht minder in dem sonderbaren Liebesspiel, und wer sie kennt, weiß sie zugleich als sehr ausdauernde und anspruchslose Stubenvögel zu schätzen. Mit alleiniger Ausnahme des Madagaskarwebers sind sie dagegen schlechte Zuchtvögel, obwol alle eingeführten Arten in Vogelstuben und auch in Käfigen bereits vielfach genistet haben. Näheres über solche Züchtungserfolge theile ich weiterhin bei jedem einzelnen mit. Ebenso werde ich dort die Preise angeben. Beiläufig sei auch bemerkt, daß diese Weber bei uns sehr gut im ungeheizten Raum überwintert werden können. Die Herren A. Hesler, dann Dr. Schmidt, Direktor des zoologischen Gartens von Frankfurt a. M., und neuerdings auch Fr. Schneider II. in Wittstock haben dahin bezügliche Erfahrungen gemacht. Der erstere sagt: „Die wol oft für sehr schwächlich gehaltenen Fremdlinge können sogar eine bedeutende Kälte ertragen. Namentlich ist es zum erstaunen, welche niedrigen Grade z. B. der Feuerfink, dessen Vaterland doch das heiße Afrika ist, überdauert. Er scheint sozusagen eisenfest zu sein; denn er behielt seine Munterkeit und Lebhaftigkeit selbst bei 6—8 Grad Kälte und bei nur mäßigem Schutze gegen Wind. Er schien die dann oft schon traurig dasitzenden Europäer gleichsam beschämen zu wollen."

Der Napoleons-Webervogel [Ploceus melanogaster].

Tafel IX. Vogel 43.

Auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 hatte man auch einen geschmackvollen Käfig mit kleinem Schmuckgefieder aufgestellt und unter diesem machten vorzugsweise zwei Arten der gewöhnlichsten Weber auf Tausende von Beschauern einen wirkungsvollen Eindruck. Dies waren der Napoleons- und der

*) Webervögel, die bei 8—10° Wärme in drei Wochen ausmauserten, blieben nach der Beobachtung des Herrn Schneider bei 8—10° Kälte viele Wochen im Federwechsel.

Orangevogel. Dieser prachtvoll schwefel- oder jonquillengelb und tief sammtschwarz, jener feurig orangeroth und ebenfalls sammtschwarz. Beide gehören im Hochzeitskleide allerdings zu den auffallendsten Erscheinungen in der lieblichen Welt der fremdländischen Stubenvögel; namentlich jeder Nichtkenner bleibt voller Entzücken und Bewunderung bei ihrem Anblicke stehen.

Seit Alters her und noch jetzt ist der erstere Weber in Frankreich und anderen Ländern unter dem Namen Worabe allgemein bekannt. Der vorhin erwähnte deutsche Vogelhändlername schreibt sich jedenfalls daher, daß er im Prachtgefieder gerade in der Zeit zahlreich bei uns eingeführt und verbreitet wurde, als der dritte Napoleon den Gipfel seiner Macht und seines Glanzes erklommen hatte und mancherlei nach ihm geheißen und ihm nachgeahmt ward.

Buffon hat ihn zuerst beschrieben und zwar nach einem Bilde, welches der Ritter Bruce aus Abessinien mitgebracht. Der große Vogelkundige hat ihn aber niemals selbst gesehen. Vieillot bildete ihn dann gut ab und schilderte ihn eingehend. Er erhielt ihn, das erste und einzige Exemplar, welches damals nach Frankreich lebend gebracht worden, von Becoeur und gab eine Darstellung des Männchens im Schmuckgefieder. Der Vogel hatte sich vortrefflich eingewöhnt, wurde mit Hirse und Sorgograssamen gefüttert und blieb mehrere Jahre am Leben. Der genannte Forscher behauptete bereits, daß man ihn ohne Schwierigkeit im Käfige züchten könne, wenn man ihn pärchenweise halte und ihm Schilfstengel biete, an welchen er sein beutelförmiges, aus feinen Gräsern gewebtes Nest erbaue. Den Gesang bezeichnete er als ein unmelodisches Zwitschern.

Die Heimat des etwa feldsperlinggroßen Vogels erstreckt sich über den Westen und einen Theil des Nordostens von Afrika; sehr häufig ist er in Abessinien. Ueber sein Freileben ist leider wenig bekannt, obwol er doch zu den gemeinsten Finken des Welttheils zählt. Th. v. Heuglin weist darauf hin, daß er auch in der Freiheit in Hinsicht der Größe und Färbung des Hochzeitskleides sehr veränderlich erscheint: „Ein Männchen aus Abessinien hat Gesicht, Vorderhals, Brust und die vordere Hälfte des Unterleibes schwarz, ohne alle Beimischung von Gelb. Das Nackenband fehlt oft gänzlich. Mantel und kleine Flügeldeckfedern sind hin und wieder schwarz mit gelben Federsäumen. Der Unterschnabel bei einem Männchen vom Gebiet des weißen Nil ist auch schwarz. (Vrgl. die wissenschaftliche Beschreibung). Wir sahen ihn um den Tana-See in Abessinien und auf den Gebirgen in Semien im Winter und unmittelbar vor der Regenzeit. Hier scheint er Standvogel zu sein und lebt in Gesellschaften von drei bis acht Köpfen, welche oft dicht zusammenhalten und sich gern auf niedrigem Gebüsch, in Hecken und Büschelmaisfeldern und um Tennen herumtreiben, vorzugsweise in der Nähe von Viehweiden. Auch am Sobat und weißen Nil ist er bemerkt worden. Die Angabe im Berliner Museum, daß er auch in Nubien heimisch sei, ist dagegen

falsch. Die Verfärbung zum Prachtgefieder dürfte im August zu erfolgen." Auch er soll nach der Nistzeit zu großen Schwärmen sich ansammeln und dann an Hirse und anderen Nutzsämereien erheblichen Schaden verursachen. In der Gefangenschaft sind die Napoleonsweber gegen große und kleine Genossen durchaus harmlos und verträglich, allein sobald sie zum Schmuckgefieder sich verfärben, werden sie ungemein lebhaft und stürmisch und dann sind sie üble Gäste, indem sie, nicht etwa bissig und zänkisch gegen schwächere Vögel sich zeigen, sondern dieselben nur durch ihre Unruhe fortwährend stören und beängstigen. Deshalb gelangen diese Webervögel selber auch kaum jemals zur glücklichen Brut, da sie zu ruhelos zum Nestbau sind und im grauen Gefieder wiederum zu scheu, sodaß sie gar zu leicht von anderen Vögeln sich verjagen lassen. Dennoch gelingt es wol sie zu züchten, wenn man auf ihre Eigenthümlichkeiten achtet und ihren natürlichen Bedürfnissen Genüge zu leisten sucht. In dem Abschnitt über Pflege und Zucht werde ich die einschlägigen Erfahrungen mittheilen und Anleitungen geben.

Wie bei allen übrigen Webervögeln geht die Verfärbung zum Prachtgefieder in der Gefangenschaft zu der Zeit vor sich, wann in der Heimat die Nistzeit naht, und diese wechselt je nach dem Theile Afrikas, aus welchem der Vogel herstammt, vom Juni oder Juli bis zum August. Herr Schneider beobachtete, daß die Männchen bei kräftiger Fütterung mit frischen Ameisenpuppen sich garnicht völlig entfärbten, sondern immer mehr oder weniger schwarz- und gelbfleckig blieben. Im Durchschnitt dauert das Prachtkleid volle neun Monate.

Das Liebesspiel dieses Webers, sowie die hitzigen und doch nicht gefährlichen Kämpfe der Männchen sind sehr interessant. Ein Napoleonsvogel im Prachtkleide bläht sein Gefieder zum runden Federball auf und schwirrt hummelartig hin und her, indem er die Federn fortwährend abwechselnd sträubt und glatt anzieht, jeden Genossen der eigenen oder auch verwandter Arten verfolgt, vor jenem flüchtet, ihn wiederum jagt und dann seinen wunderlichen, zischenden Liebessang erschallen läßt, welchen Alexander von Homeyer mit dem Lockton der Braunelle vergleicht.

Gleichviel, ob in der Vogelstube oder in einem geräumigen, zweckentsprechend ausgestatteten Käfige, flechtet das Männchen zwischen Birken- oder anderen Ruten oder auch in einer schlanken Astgabel zunächst einen zirkelrunden, meistens aufrechtstehenden, seltener schief, fast wagerecht liegenden Kranz und diesen umwölbt es dann, sodaß ein länglichrunder Beutel mit einem halb von der Seite einmündenden Schlupfloch gebildet wird. Viele Männchen beginnen aber garnicht einmal den Nestbau, weil sie zu unruhig sind, andere weben sehr eifrig, bringen jedoch nichts weiter, als höchstens den Kranz zustande; nur einzelne vollenden wirklich das Nest und ein solcher Baukünstler ist für die Züchtung sehr werthvoll, weil er rastlos mehrere Brutstätten hintereinander errichtet.

Das Gelege besteht fast regelmäßig in vier Eiern. Der Nestflaum der Jungen ist gelblichweiß mit weißer Schnabelwachshaut und das Jugendkleid gleicht fast dem des alten Weibchens, nur ist es heller, weißlichgrau. Die erste Verfärbung tritt schon im nächsten Jahre mit der des alten Männchens zugleich ein; auch ist sie eine vollständige, nur erscheint das Gelb nicht so schön dunkel und kräftig.

Männchen und Weibchen sind im grauen Kleide schwierig zu unterscheiden, denn das Merkmal der beträchtlicheren Größe des erstern ist nicht immer zutreffend. Die Händler pflegen gegen die Zeit der Verfärbung hin an der Brust einige Federn auszurupfen, um an den schnell hervorwachsenden farbigen die Männchen zu erkennen. Im übrigen behält hier und da das Männchen wol eine gelbe Feder und die Färbung der Rückenfedern und großen Flügeldecken ist kräftiger. Neben den Orangewebern sind beide Geschlechter des Napoleonswebers unschwer an dem gelben Ton des grauen Gefieders zu erkennen; bei jenen herrscht ein bräunlicher Ton vor. Nur Unkundige können sie verwechseln.

Dieser gelbe Weber leidet in den Käfigen der Händler weniger an matter Verfärbung, als die rothfarbigen Arten. Unter mangelhaften Luft- und Lichtverhältnissen färbt er sich aber vorzugsweise leicht schwarz.

Man kauft ein Pärchen Napoleonsweber im grauen Gefieder für 9 bis 12 Mark, im Prachtkleide 15 bis 18 Mark. Bei der Ankunft im Spätsommer sind sie im Großeinkauf zwischen 4 bis 6 Francs das Pärchen zu erhalten. Man findet sie das ganze Jahr hindurch in den Vogelhandlungen aller Länder.

Seit Vieillot's Zeit war der Vogel in der Liebhaberei und im Handel beinahe völlig verschwunden und nur selten ist bei den Schriftstellern eine kurze Notiz über ihn zu finden. Bechstein kennt ihn garnicht, Bolle aber führt ihn schon unter dem deutschen Händlernamen auf.

Der Napoleonsweber oder Napoleonsvogel, auch im Deutschen Worabe genannt, heißt bei Rchb. fälschlich Abessinischer Taha.

Le Worabée (Bekemans); le Worabey (Liste d. Akkl.-Grt. v. Paris); Blackbellied Weaverbird (Jamrach u. Brzn. d. zool. Grt. von London); Worabee (holländisch); Worabee (heimatlicher Namen).

Nomenclatur: Loxia melanogastra, *Lth.*; Loxia abyssina, Fringilla abyssina, *Vll.*; Fringilla ranunculacea, *Lchtst.*; Euplectes ranunculaceus, *Mus. Brl.*; Euplectes melanogaster, *Swns., All., Bp., Hrtl.*; Ploceus abyssinicus et afer, *Gr.*; Euplectes abyssinicus, *Cab.*; Euplectes habessinicus, *Hgl.*; Taha abyssinica, *Rchb., Br.* — Le Worabée, *Vieill.*; Black-bellied Grosbeak, *Brown*; Black-collared Finch, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung: oberhalb mit Einschluß von Stirn, Ober- und Hinterkopf glänzend gelb, über den Nacken ein tief sammtschwarzes Band und in derselben Farbe das Gesicht vom Nasenloch oberhalb des Auges bis zum Ohr und um die Kehle, ferner Unterbrust und Bauch. Oberbrust, Seiten, Hinterrücken, Ober- und Unterschwanzdecken wieder gelb, Flügel und Schwanz dunkelbraun, jede Feder breit fahl gesäumt. Auge bernsteinbraun;

Schnabel schwarz; Füße fleischfarben. — Weibchen und Männchen im Winterkleide oberhalb gelblichfahlbraun, Flügelfedern gelblich gesäumt und alle übrigen Federn mit braunen Schaftstreifen; unterhalb mit Einschluß der Unterflügel reinweiß. — Jugendkleid s. S. 234.

Ploceus melanogaster: laetissime flavus; regione parotica, capitis lateribus, mento, gula abdomineque medio holosericeo-nigris; alis et cauda fuscis; interscapilio fuscescente; subalaribus albidis; iride badia; rostro nigro; pedibus rubellis. — ♂ hieme et ♀: supra pallide subfulva, plumis mediis conspicue e fusco-nigricante striatis; stria conspicua superciliari, margine alari et subalaribus albidis, flavido-lavatis; gastraeo albido plurimorum laete fulvescente-adumbrato; colli lateribus, pectore et hypochondriis fusco-striatis, tibialibus umbrino-cinerascentibus, sordide albido-marginatis; tertiariis late fulvescente marginatis; iride umbrina; rostro nigro; pedibus fuscatis.

Länge $11{,}8^{cm.}$ ($4^1/_2$ Z.); Flügel $5{,}7^{cm.}$ ($2^1/_6$ Z.); Schwanz $2{,}2^{cm.}$—$2{,}6^{cm.}$ ($^5/_6$ bis 1 Z.).

Neon. lanugine flavente alba, cera rostri alba. — Juvenis ab ♀ adulta vix discedens nonnisi dilutior, incanus.

Beschreibung des Eies: veränderlich, von bläulichweiß bis zu blaugrün; Gestalt rund; glänzend, glattschalig. Länge $20^{mm.}$; Breite $16^{mm.}$

Ovum: variabile, a coerulescente albo usque ad aeruginosum; rotundum, nitidum, laeve.

Der abessinische gelbe Feuerweber [Ploceus abyssinicus],

auch Taha genannt, wird von Hartlaub entschieden als Art von dem vorigen getrennt. Er unterscheidet sich nur durch ein breites, schwarzes Nackenband, welches bis zur Kehle herumläuft, und durch die ganz schwarze Unterseite, während bei dem Napoleonsweber der gelbe Hinterkopf durch ein gleiches Band mit der gelben Oberbrust und den Seiten verbunden ist. Auch erscheint er etwas größer, dem Haussperlinge gleich. Seine Heimat ist Südafrika. Wenn man recht aufmerksam die Käfige der Händler durchmustert, so findet man wol, allerdings überaus selten, diesen größern Napoleonsvogel in wenigen Köpfen. Für die Liebhaberei hat er keine Bedeutung, weil er schwerlich jemals in namhafter Anzahl eingeführt werden kann. Er soll freilich auch im Nordosten Afrikas vorkommen, ob dort häufiger, ist jedoch fraglich.

Pyromelaena abyssinica, *Gml., Br.*; Taha dubia, *Rchb.*; Euplectes Taha, *Smth., Hrtl.;* Ploceus dubius, *Smth.*; Ploceus Taha, *Gr.*

Der Sammt-Webervogel [Ploceus capensis].

Tafel IX. Vogel 45.

Von den Händlern auch großer oder doppelter Napoleonsvogel genannt, ist dieser Feuerweber viel seltener zu haben und beiweitem nicht so schön, als der kleinere. Sein Grundgefieder ist tief sammtschwarz; die Schultern und der Mittelrücken sind lebhaft gelb, die Flügel grau; Größe des Gimpels.

Auf den ersten Blick gleicht er dem S. 218 geschilderten gelbrückigen, wie auch dem gelbschulterigen Widafink und da alle drei Arten keineswegs häufig im Handel vorkommen, so werden sie selbst von unkundigen Kleinhändlern manchmal

verwechselt. Im Prachtgefieder aber sind die Witwen an den längeren Schwänzen zu erkennen.

Der Sammtfink hat eine sehr weite Verbreitung; er wird fast im ganzen tropischen Afrika gefunden und je nachdem, von woher die Bälge in den zoologischen Museen stammen, unterscheidet man mehrere Lokalrassen, welche nur in der Größe wesentlich von einander abweichen.

Th. v. Heuglin beobachtete die kleinere Lokalrasse in großen Scharen in den Provinzen Tembién und Semién in Abessinien, wo sie durch Gefräßigkeit vielen Schaden verursachen. Im Hochland von Wogara sah er sie in der Höhe von 2500—3100 Meter auf Viehweiden und im hohen Grase. Die Verfärbung zum Hochzeitskleide erfolgt im Spätsommer und dann sondern sich die einzelnen Pärchen von den Flügen ab. „Er ist ein Standvogel, der in seinem Wesen mehr den Trauerwidas als den Feuerfinken gleicht. Antinori erhielt ein Exemplar aus dem Bezirk der Kidj-Neger am obern weißen Nil, wo ich ihn niemals angetroffen habe.“ Im übrigen ist nur bekannt, daß der Sammtweber par- oder familienweise lebt und ein kunstvolles Nest zwischen drei- bis vier Schilf- oder Rohrstengeln anlegt. Layard beschreibt das Nest als aus Grashalmen erbaut, kugelförmig überwölbt und mit einem in der Mitte einer Seite befindlichen Schlupfloch.

Wenn man das Glück hat, ein richtiges Pärchen zu erlangen, so schreiten sie ungleich leichter zur Brut, als die anderen Feuerweber, und das liegt wol daran, daß dieser Vogel ruhiger, keineswegs so stürmisch erregt ist, als seine Verwandten. Das Nest wird ohne weiteres irgendwo im dichten Gebüsch errichtet und bildet einen ziemlich tiefen, umfangreichen, ovalrunden Beutel. Eier grünlichblau; Brutdauer 15 Tage.

Bechstein giebt über den Kap'schen Kernbeißer nichts näheres an, sagt aber auch nicht, daß er damals überaus selten gewesen sei. In Bolle's Verzeichniß fehlt er.

Der Sammt-Webervogel ist auch Sammtvogel, Sammtweber, Sammtwida, großer gelber Feuerfink, Sammtfink, doppelter Napoleonsvogel, Kapweber, Kap-Oryny (Rchb.) genannt worden. — Kap'scher Kernbeißer (Bchst.).

Le grand Orynx (Vekemans u. Vrzn. d. Akkl.-Grt. v. Paris); Yellow-shouldered Weaver-bird (Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London).

Nomenclatur: Loxia capensis, *L.*, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*; Coccothraustes capensis, *Vll.*; Loxia phalerata, *Lchtst.*; Ploceus capensis, *Gr.*, *Bp.*; Orynx capensis, *Cb.*, *Rchb.*; Euplectes capensis, *Grll.*, *Mllr.*, *Swns.*, *Sclt.*, *Plzln.*, *Lrd.*, *Hgl.*; Pyromelaena capensis, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Rchn.* [Euplectes xanthomelas, *Rpp.* etc.; Orynx xanthomelas, *Cb.*, *Rchb.*; O. approximans, *Cb.*, *Rchb.*]. — Grosbec du Coromandel, le Pinçon noir et jaune, Grosbec tacheté du Cap d. b. Esp., *Buff.*; Cape Gros-beak, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung: glänzend sammtschwarz; obere Flügeldecken, Schulterrand und Bürzel hoch gummiguttgelb, Achselfedern unterseits heller; Schwingendeckfedern und Schultern schwarzbraun, jede Feder an der Außenfahne fahlbraun gesäumt, am breitesten die

Deckfedern der zweiten Schwingen und der Schultern, die ersten Schwingen am Saume der Außenfahne gelb scheinend; Schwingen an der Basishälfte der Innenfahne breit isabellgelblich gerandet; Unterflügeldecken rostfahl. Schnabel schwärzlichblaugrau; Auge braun; Füße gelblichbraun. — Männchen im Winterkleide: oberhalb dunkelbraun, jede Feder breit fahlbraun gesäumt; Zügel- und schmaler Schläfenstreif gelblichweiß; Kopfseiten blaß bräunlichgrau und wie die ganze schwach graubraune Unterseite mit dunkeln Schaftstrichen, welche an Hals, Brust und Seiten am deutlichsten hervortreten; obere Flügeldecken dunkelbraun mit breiten, schwachgrünlichgelben Enden; Achsel reingelb; Bürzel gelblichbraun, untere Schwanzdecken fahlbraun mit feinen dunklen Schaftstrichen; Bauch und Hinterleib bräunlichweiß; Schnabel fahlbraun mit hellerem Unterschnabel; Füße gelblichfleischfarben. — Weibchen bemerkbar kleiner; durchweg grau; die gelben Schultern und der gelbe Bürzel des Männchens (die zu jeder Jahreszeit gleichgefärbt sind) fehlen; beides ist ebenfalls grau.

Jugendkleid dem Wintergefieder des Männchens gleich, doch daran zu erkennen, daß die Schaftstriche garnicht oder sehr schwach hervortreten. Verfärbt sich erst im zweiten Jahre, dann aber gewöhnlich schon vollständig.

Ploceus capensis: holosericeo-niger, tectricibus al. minoribus, camptorio et uropygio laete luteis, axillaribus inferioribus dilutioribus; tectricibus remigum humerisque nigro-fuscis, plumis eorum singulis exterius luride limbatis; tectricibus remigum secundariorum et humerorum latius pallidius marginatis; remigibus primoribus exterius flavente limbatis; basi pogonii remigum interni dimidia late gilva; tectricibus al. inferioribus ferruginosis; iride fusca; rostro obscure plumbeo; pedibus subfulvis. — ♂ vest. hiem. supra fuscus, plumis singulis luride limbatis; loris striaque temporali lata flavido-albis; capitis lateribus fumosis; gastraeo sordide albo; hac utraque regione obscure striolata, praesertim collo, pectore et hypochondriis scapos offerentibus distincte obscuriores; tectricibus al. fuscis, late virente flavido-terminatis; axilla flava; uropygio subferrugineo, subcaudalibus fuscatis, tenuissime striolatis; abdomine crissoque sordide albis; mandibula rostri subfusci pallidiore; pedibus flavente carneis. — ♀ distincte minor; prorsus cinerea.

Länge $14{,}4^{cm}$. ($5^1/_2$ Z.); Flügel $7{,}4^{cm}$. ($2^5/_6$ Z.); Schwanz $4{,}8^{cm}$. ($1^5/_6$ Z.).

Juvenis: mari hiemali concolor nonnisi striolis scaporum vel nullis, vel obsoletissimis.

Beschreibung des Eies: Farbe grünlichblau, glatt und glänzend, Gestalt rund.

Ovum: subaeruginosum, laeve, nitidum et rotundum.

Der Orange-Webervogel [Ploceus franciscanus].

Tafel IX. Vogel 44.

Gegenwärtig eine der gewöhnlichsten Erscheinungen des Vogelmarkts, in jeder Vogelstube und Schmuck-Voliere zu finden, gehört der Feuerfink oder Orangevogel zugleich zu denen, über welche die Reisenden die eingehendsten Nachrichten gegeben. Seit Vieillot ist la Loxie ignicolore immer lebend eingeführt und sie wird daher in allen Naturgeschichten erwähnt. Freilich waren die älteren Schriftsteller inbetreff ihrer und der nächsten Verwandten in mancherlei Irrthümern befangen.

Die Verbreitung dieser Art erstreckt sich wol über ganz Afrika, wenngleich sie im Süden bis jetzt noch nicht beobachtet ist. „Ueber die Lebensweise und das Brutgeschäft liegen mancherlei werthvolle Mittheilungen vor. Das in

Durrafeldern aus abgebrochenen Grashalmen zwischen zwei bis drei Stengeln hängende, rohrsängerartige Nest mit den in Nubien im August brütenden Vögeln ist von Hemprich und Ehrenberg beschrieben. Brehm fand aber auch im September und sogar Ende Oktobers frisch belegte Nester. Vierthaler dagegen sagt, daß der Feuerfink schon im Mai bei Chartum erscheine und das Nest in dem über Wasser emporragenden Buschwerk erbaue. Die Verfärbung zum Hochzeitskleide beginnt im Juli. Im Oktober bis Dezember legen diese Vögel nach v. Heuglin bereits wieder das Winterkleid an und streifen dann in großen Scharen, die den Getreidefeldern sehr verderblich werden, im Lande umher. Schon Isert bemerkte den Wandertrieb des Vogels, den er nur im Juni bis August bei Akkra sah."

Diese Angaben in dem v. d. Decken'schen Reisewerk, Band IV., ergänzt Heuglin in folgendem: „Der Feuerfink ist ohne Zweifel wirklicher Zugvogel in unserm Beobachtungsgebiet. Er wandert übrigens nicht in großen, geschlossenen Zügen und erscheint aus dem Innern kommend im Juni und Juli. Namentlich häufig ist er dann im abessinischen Tiefland bis gegen 2200 Meter hochgehend, in Takah, Senar, Kordofan und Nubien. Seine nördliche Grenze am Nil erstreckt sich bis zum 22. Gr. n. Br. Die Verfärbung der Männchen erfolgt ohne eigentliche Mauser im August und September; dann sammeln sich zahlreiche Pärchen in den Büschelmaisfeldern, um hier zu nisten. Die Nester bestehen in einem ziemlich leichten, dünnen und lockern Gewebe von grünen Halmen, welche bis zu $1_{,3}$ Meter Höhe zwischen mehreren, nahe beisammen stehenden Durrastengeln aufgehängt werden. Sie sind verhältnißmäßig klein, nicht tief und enthalten gewöhnlich drei feinschalige hellblaugrünliche, wenig glänzende Eier, die hin und wieder mit leberbraunen Punkten leicht bespritzt sind; diese Zeichnung verbleicht jedoch bald. Ob nur die Weibchen brüten, kann ich nicht bestimmt angeben. — Im Ostsudan bewohnt der Feuerfink vorzugsweise die Büschelmaisfelder, in Abessinien fanden wir ihn dagegen häufig längs der Ufer von Wildbächen und zwar meistens im Feigengebüsch, hin und wieder auf dem mit Cypergräsern bewachsenen Moorland und im Gebiet des Gazellenflusses einzeln im Hochgras. Zwischen Januar und Mai habe ich ihn im oberen Nilgebiet nicht bemerkt, doch hat ihn Hartmann schon im März in der Provinz Dongola, jedoch ohne eine Spur von rothem Gefieder, gesehen. — Niemals erblickte ich ihn auf Hochbäumen; im Herbst hält er sich fast ausschließlich in den Fruchtfeldern und Gräserdickichten auf. Eine Gesellschaft dieser unruhigen, geschwätzigen und zänkischen bunten Vögel in den üppig grünenden und von schweren Aehren strotzenden Durrafluren gehört in das Landschaftsbild einer Nilgegend als bezeichnendste Eigenthümlichkeit. Von früh bis spät sind sie in Thätigkeit, klettern an den Halmen und Fruchtbüscheln, richten sich schrill zirpend und das Gefieder sträubend hoch

auf u. s. w. Selten kommen sie auf die Erde herab. Der Gesang ist unbedeutend, der Lockton ein schrilles, rätschendes Zirpen. Zur Zeit der Reife verschiedener Sämereien (Angoleb, Durra und Dochen) erbauen die Eingeborenen Strohhütten auf hohen Gerüsten mitten in ihren Pflanzungen, ziehen von hier aus lange, oft mit bunten Lappen versehene Schnüre nach allen Seiten hin und suchen theils durch Rütteln an diesen Vogelscheuchen, theils vermittelst der Schleuder die gefräßigen Gäste fernzuhalten."

Professor Dr. Robert Hartmann fügt noch hinzu: „In Dattelhainen bei Ferêq in Nubien sah ich ihn im Hochzeitskleide. Der Eindruck dieses anmuthig-beweglichen, so prächtig feuerfarbenen Vogels ist kaum genügend zu schildern, besonders wenn er im Sonnengkanze und zwischen grünem Laube sich zeigt. Schon Ehrenberg und Rußegger haben seiner Erscheinung mit Begeisterung gedacht."

In der Gefangenschaft gleicht der Orangeweber fast in jeder Hinsicht dem Napoleonsweber. Seiner brennenden Farbe, sowie seiner Ausdauer im Käfige wegen ist er gleicherweise beliebt, doch nur als Schmuckvogel, denn er gewährt ebensowenig die Vorzüge des Gesanges als des leichten Nistens. Beginnt man den Züchtungsversuch, während das Männchen im Prachtgefieder ist, so darf man an einen Erfolg garnicht denken, denn der Vogel ist so sehr erregt, daß er zur Herstellung eines Nestes nicht gelangen kann. Wenn man dagegen eine Anzahl im grauen Gefieder zusammenbringt, so bauen und nisten sie wie beim Napoleonsvogel angegeben. Am ehesten aber erzielt man gute Ergebnisse, wenn man alte, gut eingewöhnte Feuerweber in nur einem Pärchen einer Art in einer blos mit Prachtfinken u. a. kleinen Vögeln besetzten Vogelstube fliegen läßt. Sie sind nicht eigentlich gesellig und bedürfen daher die Gesellschaft ihrer Art nicht. Gleichviel aber, ob das Männchen sich dann als Herr und Meister der ganzen Bewohnerschaft oder nur, in Abwesenheit größerer Vögel, besonders sicher fühlt — kurz und gut es erbaut dann fast regelmäßig Nester und bringt mit einem, ja selbst mit zwei bis drei Weibchen glückliche Bruten auf. In der Vogelstube des Herrn Färbereibesitzer G. Barnewitz in Berlin errichtete ein kräftiges Männchen in rastlosem Eifer wol einige zwanzig Nester und das eine der vorhandenen Weibchen nistete mehrmals mit Erfolg, trotzdem es flügellahm war und nur im Gesträuch emporhüpfen konnte. Späterhin habe ich in ähnlicher Weise von allen Feuerwebern Junge gezogen und ihre Züchtung ist in der That nicht so schwer, wenn man folgende Regeln beachtet. Erstens setze man das Männchen mit mehreren Weibchen im grauen Gefieder zusammen; zweitens halte man die Störung durch die Befehdungen der Männchen von der gleichen oder von nahverwandten Arten fern; drittens vermeide man auch, andere größere Vögel in demselben Raum zu halten; viertens gebe man reichlich die Seite 227 mitgetheilte Fütterung. Zu Baustoffen werden Agavefasern nebst Baumwoll- und Bastfäden ebenso gern

benutzt, als frische Grashalme. Das Nest in der Vogelstube ist fast immer kugelrund mit oberhalb seitwärts befindlichem Schlupfloch und besonders aus Agavefasern sehr zierlich gewebt. Die Eier sind glänzend grünblau und sehr rund; v. Heuglin's Angabe, daß sie gezeichnet seien, dürfte in einem Irrthum beruhen. Im allgemeinen wird der Orangeweber bis jetzt wenig gezüchtet.

Herr Dr. Luchs erzählt von seinem S. 210 erwähnten Feuerfink: „Im November 1865 in meine Sammlung gekommen, legte er im Juli 1866 das Prachtgefieder an. Seitdem hat er ganz regelmäßig seine halbjährliche Verwandlung innegehalten; nur in diesem Jahre (1876) ist es anders. Sonst in den ersten Monaten des Jahres immer grau und schmucklos, prangt er jetzt zu Ende Mai noch im orangerothen Kleide. Diese Abweichung von dem gewöhnlichen Verlauf bin ich geneigt, dem Einfluß des Alters zuzuschreiben."

Auch er gehört zu den Vögeln, welche in den Käfigen der Händler unansehnlich schwarz werden und ebenso tritt bei mangelnder Fleischnahrung, wie schon S. 231 bemerkt, eine so matte Färbung des Prachtgefieders ein, daß der im Händlerkäfig gehaltene Feuerfink kaum fahlgelb ist, während der frisch eingeführte fast hochroth und der in der Vogelstube gut verpflegte rothgelb erscheint, sodaß der Unkundige wol glaubt, drei verschiedene Arten vor sich zu haben.

Im Gesellschaftskäfige wie in der Vogelstube ist der Orangeweber gegen kleinere Vögel verträglich; sobald er das Prachtgefieder angelegt hat, vertreibt er freilich aus der Umgebung seines Wohnbezirks alle übrigen und geräth dann mit den Männchen seiner oder verwandter Arten in sehr heftige Fehde. Ein kräftiges Männchen in meiner Vogelstube schlug durch sein Ungestüm sogar den Oryx in die Flucht. — In jeder andern Hinsicht stimmt er mit dem Napoleonsweber überein und auch im Preise steht er diesem gleich.

Der Orange-Webervogel wird auch Orangeweber, Orangevogel, Feuerfink, blos Feuerweber, Ignikolor, Franziskanerfink und Kardinalin, Franziskaner-Feuerfink (Rchb.) genannt.

L'Ignicolore (Bekemans u. Vrzn. d. Akkl.-Grt. v. Paris); Crimson-crowned Weaverbird (Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Oranjevogel (holländisch). — Sersur akonar (arabisch), Maskal oder Jamaskal (amharisch), beides nach Th. v. Heuglin.

Nomenclatur: Loxia franciscana, *Jsrt., Bchst.;* Fringilla ignicolor, *Vll., Lchtst., Hmpr.* et *Ehrb., Lss.*; Euplectes ignicolor, *Swns., Grd., Rpp., Bp., Vrtht., Cab., Hrtm., Br., Hgl., Antn., Kng.-Wrth.;* Ploceus franciscanus, *Gr.;* Euplectes franciscana [us], *Hrtl., Scl., Fnsch., Rchb., Hgl., Br., Shrp.* [Loxia orix, *Gml.;* Fringilla oryx, *Dbs.;* Euplectes Petiti, *Krk.*]. — Grenadier Gros-beak, *Lath.;* le Cardinalin, *Temm.*; the short-tailed Crimson-weaver, *Swains.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberkopf, Zügel unter dem Auge, Ohrgegend und Schläfe sammtschwarz; Hinterkopf, Nacken, Hals, Halsseiten, Kehle, Kropf, Bürzel, Hinterleib, obere und untere Schwanzdecken (die verlängert sind und den Schwanz überragen) brennend

scharlachzinnoberroth; Mantel und Schultern zimmtzinnoberroth; Bruft, Bauch und Seiten glänzend sammtschwarz; Schwingendeck- und Schwanzfedern dunkelbraun, an der Außenfahne schmal bräunlichfahl gesäumt; untere Flügeldecken roftgelbfahl wie die Tibienbefiederung, diese etwas röthlich angehaucht. Auge braun; Schnabel schwarz; Beine fahlhorngelb. Winterkleid: oberhalb fahlbraun, jede Feder längs der Schaftmitte breit dunkelbraun geftreift, am deutlichften auf dem Mantel; Schwingendeck- und Schwanzfedern dunkelbraun, an den Außenfahnen breit fahlbraun gesäumt; Zügel und schmaler Augenftreif bis zum Schlaf hellbräunlichgelb; Kopf- und Halsseiten fahlbräunlich; Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig fahlbraun; unterhalb hellbräunlichgelb, untere Flügeldecken schwach gelblichweiß, an den Bruftseiten einzelne Federn mit schwachen dunkeln Schaftftrichen; Hals, Bauchmitte und Hinterleib faft reinweiß. Oberschnabel bräunlichhorngrau, Unterschnabel heller; Füße hornfarben. Neben dem grauen Napoleonsweber ift er am braunen Ton der Färbung und an dem ebenfalls bräunlichen Augenbrauenftreif zu erkennen. — Weibchen: gleicht dem Männchen im Winterkleide zum verwechseln; nur kaum bemerkbar kleiner und einen Ton heller. — Das Jugendkleid ift heller fahlbraun, weil die dunkeln Schaftftriche sehr fein find oder ganz fehlen; Schnabel und Füße find bräunlichgrau.

Ploceus franciscanus: pileo, genis, regione parotica temporibusque holosericeo-nigris; occipite, cervice, collo, gula, jugulo, uropygio, crisso, supra- et infracaudalibus (elongatis, caudamque superantibus) ardente scarlatinis; interscapilio humerisque cinnamomeo-rubris; pectore, abdomine et hypochondriis nitente aterrimis; tectricibus remigum et rectricibus fuscis, exterius anguste luride limbatis; tectricibus al. inferioribus et tibialibus subferrugineis, his rubente lavatis; iride fusca; rostro nigro; pedibus luride corneis. — ♂ vest. hiem. supra luride fuscus, pluma quaque secundum scapum dimidium late fusco-striata, distinctius interscapilii; tectricibus remigum et rectricibus fuscis exterius late luride marginatis; loris striaque superciliari angusta usque ad tempora subfulvis; lateribus capitis collique subfumeis; uropygio et supracaudalibus subfuscis, subtus ochraceis; tectricibus al. inferioribus lacteis, pectoris lateribus sparsim obscurius striolatis; collo, abdomine medio crissoque albidis; maxilla fuscatocornea, mandibula pallidiore; pedibus corneis. Differens a Pl. melanogastro tam afflatu fusco, quam stria superciliari fuscescente. — ♀ a mare hiemali vix discrepans nonnisi paullulum minor et dilutior.

Länge $11_{,8}$ cm. ($4^1/_2$ Z.); Flügel $6_{,1}$ cm. ($2^1/_3$ Z.); Schwanz $3_{,3}$ cm. ($1^1/_4$ Z.).

Juvenis: dilutius luride fuscatus propter striolis scaporum vel subtilissimis, vel plane nullis; rostro pedibusque fumigatis.

Beschreibung des Eies: glänzend einfarbig blaugrün, Geftalt sehr rund. Länge 16 mm.; Breite 11 mm.

Ovum: nitidum, unicolor aeruginosum, valde rotundatum.

Der Flammen-Webervogel [Ploceus flammiceps].

Nur selten erhalten die Vogelhandlungen den Flammenfink, welchen Liebhaber und Händler von dem Orangevogel gewöhnlich garnicht sicher zu unterscheiden vermögen. Dem aufmerksamen Blicke erscheint er allerdings ein wenig größer, schlanker und die glänzenden Farben Roth und Schwarz sind anders vertheilt. In der Vogelstube zeigt sich der Flammenfink etwas ruhiger, nicht ganz so stürmisch, sonst aber in jeder Hinsicht mit den anderen Feuerwebern übereinstimmend.

Heuglin berichtet: „Ich fand diesen stattlichen Feuerfink im August und September auf dem Buschwerk und Hochgras im Gebiet des Djur und Kosanga-Flusses; dann lebt er ziemlich vereinzelt. Die Nester sind denen des P. ignicolor (Orangeweber) ähnlich und enthalten drei spangrüne Eier, welche gewöhnlich gegen das stumpfe Ende hin mit äußerst feinen, violettschwarzen Pünktchen bespritzt sind. Nach der Brutzeit verschwand er aus den gedachten Gegenden. In Abessinien scheint er auch blos während der Regenzeit vorzukommen, namentlich in der Nähe von Adowa und im Tiefland des Takazié. Speke sah ihn in Meninga in großen Flügen auf Kornfeldern und nachts im Schilf der Moräste; Herzog Paul von Würtemberg bemerkte ihn im südlichen Senar. Das Benehmen und die Stimme des Vogels gleichen denen des erwähnten Verwandten."

Die Verbreitung erstreckt sich fast über ganz Afrika; auch im Osten ist er von Speke in großen Flügen beobachtet worden. Umsomehr ist es verwunderlich, daß er viel weniger eingeführt wird, als Orange- und Napoleonsweber.

Die eifrigen Liebhaber seien darauf hingewiesen, daß Männchen und Weibchen dieser Art sowol im Pracht- als auch im grauen Gefieder von vornherein an der schwarzen Färbung der unteren Flügelseiten sicher zu erkennen sind.

Auch diesen Weber habe ich im Laufe der Jahre in meiner Vogelstube mehrmals beherbergt. Sein Nest ist von dem des Verwandten darin verschieden, daß es etwas größer und wie es scheint vorzugsweise gern aus Gräserrispen, Rohrfahnen u. dgl. gewebt wird. Das Gelege bestand jedesmal in fünf Eiern und die Brutentwickelung ist übereinstimmend.

Bei den Händlern wird diese Art nur zu oft übersehen; so hatte Herr W. Mieth in Berlin jahrelang mehrere Pärchen und einzelne Männchen, ohne daß außer mir Jemand dieselben kaufen wollte, bis er sie endlich für den Preis der gewöhnlichen Orangevögel fortgeben mußte. Die Kenner und Liebhaber bezahlen allerdings das Pärchen wol mit 24 bis 30 Mark — doch hat man den selteneren Feuerwebern bis jetzt noch keineswegs die gebührende Beachtung geschenkt.

Der Flammen-Webervogel, für gewöhnlich Flammenfink genannt, heißt bei Rbch. Swainson's flammenköpfiger Feuerfink.

Crimson-crowned Weaverbird (Jamrach u. Brzn. d. zool. Grt. v. London). In den Preisverzeichnissen der meisten Groß- und Klein-Händler ist er nicht aufgeführt, weil er bis dahin immer mit dem Orangevogel zusammengeworfen worden.

Nomenclatur: Euplectes flammiceps, *Swns.*, *Rpp.*, *Grd.*, *Hrtl.*, *Sclt.*, *Mntr.*, *Rchb.*, *Cab.*, *Prz. v. Wrtmbg.*, *Hgl.*; Ploceus flammiceps, *Gr.*; Euplectes flammiceps et craspedopterus, *Schff.*, *Bp.*, *Rchb.*, *Hgl.*; E. flaviceps, *Hrtl.*; E. pyrrhozona, *Hgl.*; Hyphantornis flammiceps, *Shrp.*; Pyromelaena*) flammiceps, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Kng.- Wrth.*

*) In den betrf. Werken ist gewöhnlich Pyromelana gesagt, jedoch unrichtigerweise, denn πυρομελαινα latinisirt = pyromelaena.

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn, Kopf, Hals, Kehle, Nacken, Oberbrust, Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken brennend scharlachzinnoberroth; Mantel und Schultern ockerzimmtbraun; Flügel nebst oberen und unteren Deckfedern und Schwanz schwarz, die letzten Schwingen zweiter Ordnung und die Deckfedern der zweiten Schwingen an der Außenfahne schmal bräunlich gesäumt; Backen nebst schmalem Zügelstreif am oberen Augenrande, Ohrgegend, Kinn und Oberkehle, ferner Brust und Bauch tief sammtschwarz. Auge bernsteinbraun; Schnabel glänzend schwarz; Füße röthlichbraun. Bei manchen säumt das Schwarz des Zügelrandes sehr schmal die Stirn (Exemplare aus Abessinien und Gabon nach Finsch und Hartlaub). — Winterkleid und Weibchen stimmen im wesentlichen mit denen des Orangewebers überein, doch ist der Flammenweber an etwas bedeutenderer Größe und namentlich an den unterseits schwarzen Flügeln leicht zu erkennen. — Das Jugendkleid gleicht dem des Verwandten ebenfalls, nur erscheint der Vogel düsterer fahlbräunlich und die Unterflügel sind graubraun.

Wir haben hier, nebenbei bemerkt, wiederum einen Beweis von der Wichtigkeit, welche die Vogelzüchtung der Wissenschaft Ornithologie gegenüber beanspruchen darf; denn, trotzdem der Flammenfink zu den gemeinsten Vögeln Afrikas gehört, hat bis jetzt noch Niemand die Brutentwickelung und das Jugendkleid im Freileben ausreichend beschrieben.

Ploceus flammiceps: scarlatino-ruber; dorso, subcaudalibus et crisso pallidiore ochraceis, illis elongatis, apice albis; regione parotica, mento, genis, gula, alis et abdomine nigris; cauda nigra, tectricibus brevissimis. Jride fusca; rostro nigro; pedibus pallidis. ♂ vest. hiem. et ♀ potissimum Pl. franciscano paene concoloria, nonnisi multo majora et praesertim subalaribus nigris facile distincta.

Länge 13 cm. (5 Z.); Flügel 7,2 cm. (2¾ Z.); Schwanz 4,6 cm. (1¾ Z.).

Juvenis: itidem a priori vix discedens, nonnisi obscurius subfuscus subalaribus cinereo-brunneis.

Das Ei gleicht dem des Orangewebers, doch ist es etwas dunkler blaugrün und kaum bemerkbar größer.

Ovum: ovo Pl. franciscani simillimum, vix majus sed paululum obscurius aeruginosum.

Der Oryx-Webervogel [Ploceus oryx].

Tafel IX. Vogel 46.

Zu dem seit altersher lebend eingeführten kleinen Schmuckgefieder gehörend, ist der Oryx, auch großer oder doppelter Feuerfink genannt, bis zur Gegenwart immer einer der seltensten geblieben und man findet ihn kaum alljährlich einmal in wenigen Pärchen, meistens sogar nur in einzelnen Männchen bei den Großhändlern. Im Aeußern wie im ganzen Wesen erscheint er als das größere Ebenbild des Orangevogels.

Vieillot schätzte la Loxie orix [le Foudi à ventre noir] als einen prächtigen Stubenvogel und bedauerte, daß sein zirpender und zischender Gesang, den er mit dem Geräusch vergleicht, welches das Aufziehen einer Uhr verursacht, nicht mit der Schönheit seines Gefieders im Einklang steht. Um ihn zu züchten, solle man einen großen Käfig mit Schilfgräsern ausstatten und hohe Wärme gewähren. Bechstein beschreibt seinen Grenadier-Kernbeißer (Goldfink, rother Fink, Feuervogel) sehr ausführlich und schildert seine Schädlichkeit in der Heimat,

welche von den neueren Naturforschern bestätigt worden. Im übrigen giebt B. aber manches Irrige über ihn an. Da auch Bolle ihn in seinem Verzeichniß mitzählt, so ist dies ein Beweis dafür, daß er zu allen Zeiten, wenn auch immerhin selten, im Handel vorhanden gewesen.

Diese Art ist fast über das ganze tropische Afrika verbreitet, vorzugsweise häufig aber in Südafrika, während Heuglin behauptet, daß sie im Osten nur selten vorkomme. Layard, Verreaux, Kolbe, Kirk und Ayres haben Schilderungen ihrer Lebensweise und Brutentwickelung gegeben. In beiden stimmt sie wesentlich mit dem Orangeweber überein. Nur hängen die Nester mehr kolonienweise im Röhricht oder an Zweigen, welche übers Wasser hinausstehen. Reichenow und Dr. Lühder fanden in der Ebene von Akkra die Nester einzeln im hohen Grase aus feinem, sprödem Gras erbaut, kugelförmig mit seitlich oben befindlichem Schlupfloch, welches durch hervorragende Halme der obern Decke dachartig geschützt wird. Das Nest ist 12 cm. hoch, 8 cm. breit und tief mit Schlupfloch von 5 cm. Durchmesser. Nach Verreaux tritt die Verfärbung zum Prachtkleide im September oder Oktober ein und währt bis zum Januar.

In der Vogelstube gehört der Oryx zu den am leichtesten und auch zuverlässigsten nistenden Webervögeln. Zugleich trägt er ein Merkmal derselben in der auffallendsten Weise zur Schau. Das Liebesspiel nämlich, welches man, wie schon erwähnt, oft mit dem Balzen der Hühnervögel verglichen hat und das in der Uebersicht dieser Gruppe bereits beschrieben ist, zeigen die Feuerweber besonders lebhaft und komisch. Unter ihnen wiederum thut sich der Oryx ganz besonders hervor. Sein Benehmen in der Nistzeit ist wirklich so, daß es jeder Beschreibung spottet. Ich mußte daher — obwol sehr ungern — Herrn Emil Schmidt die Darstellung dieses wunderlichen Tänzers so überlassen, wie sich derselbe zu unzähligen Malen in der Vogelstube seinen Künstlerblicken gezeigt hat. Zur Erläuterung füge ich auch eine darauf bezügliche Bemerkung von Dr. Reichenow an: „Beständig sieht man die Männchen sich blähen und tänzeln, um den schlichten, in bescheidenes Grau gekleideten Weibchen die volle Schönheit ihres prächtigen Gefieders zu zeigen. Ich glaube, es giebt wol nicht andere so kokette Vögel als die Arten dieser Weber. Das Kokettiren ist bei ihnen zur Gewohnheit, man kann sagen zur Narrheit geworden; sie balzen auch, wenn sie garnicht von den Weibchen beobachtet werden und scheinen sich über sich selbst am meisten zu freuen. — Der Flug der Feuerweber ist schwirrend, wobei sie den Oberkörper sehr steil tragen und dies unterscheidet sie von allen anderen Webervögeln. Uebrigens sind sie sehr schlechte Flieger und nur selten legen sie weitere Strecken zurück."

Der erste Oryxweber in meiner Vogelstube war noch so jung, daß er nicht vollständig zur Verfärbung gelangte. Er trat demgemäß noch nicht

mit der vollen, kecken Sicherheit auf, welche ihm sonst eigen ist, sondern ließ sich vielmehr von einem kräftigen Orangevogel, welcher auch den Napoleonsweber und selbst den Sammtfink besiegte, ebenfalls in die Flucht schlagen. Im nächsten Jahre aber warf er sich zum Tyrannen auf und bekämpfte alle übrigen. Während er emsig mehrere ovalrunde Nester blos aus Agavefasern, etwa in 1 bis $1{,}_{50}$ Meter Höhe im Gebüsch erbaute, verfolgte er zwei Weibchen seiner Art, sowie auch die aller verwandten Weber mit seinem schnurrigen Liebestanz und befehdete ihre Männchen sehr eifrig. Aber auch alle anderen Vögel verjagte er aus der Nähe seiner Nester und sogar ein Par Grauköpfchen ließ er nicht zu dem gerade oberhalb an der Decke hängenden Nistkasten kommen, sodaß das Weibchen an Legenot zugrunde ging. Diese kleinen Papageien, welche doch sonst sehr tapfer sind, vermochten sich gegen sein stürmisches Andrängen nicht zu vertheidigen. Da ich die Oryxweber gewähren ließ, so erzog ich von beiden Weibchen mehrmals zwei bis drei Bruten jährlich. Manches Männchen ist aber so erregt und ruhelos, daß es nicht zum Nestbau kommen kann.

Wenn diese Webervogelart einmal vorhanden ist, so wird das Pärchen in den Großhandlungen nicht unter 30 Mark verkauft und in den Handlungen zweiter Hand gern mit 45 Mark bezahlt.

Der Oryx-Webervogel, auch blos Oryx, doppelter Orangevogel, Grenadier-Weber, Grenadier-Kernbeißer, Rothkafferfink, heißt bei Rchb. rothschwänziger Feuerfink, echter Oryx oder Kardinal vom Kap der guten Hoffnung.

Le Grand Oryx (Bekemans u. Vrzn. d. Akklim.-Grt. v. Paris); Grenadier Weaver-bird (Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Oryx wever (holländisch).

Nomenclatur: Emberiza oryx, *L.*, *Slgm.*; Loxia oryx, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*, *Vll.*, *Shw.*, *Hhn.*; Coccothraustes oryx, *Vll.*; Oryx oryx, *Lss.*; Ploceus oryx, *Gr.*; Euplectes oryx, *Swns.*, *Hrtl.*, *Cab.*, *Rchb.*; Pyromelaena oryx, *Hrsfld.* et *Mr.*, *Hrtl.* et *Fnsch.* [Euplectes Edwardsi, E. pseudoryx, E. Sundevalli, *Rchb.*; E. Sundevalli, *Krk.*, *Grn.*, *Brhz.*]. — Le Grenadier, *Edw.*; Grenadier Grosbeak, *Lath.*; Rouge-noir, *Buff.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn und Vorderkopf bis zur Scheitelmitte, bis hinter das Auge nebst Kopfseiten, Kinn und Oberkehle sammtschwarz; Hinterkopf, Hals, Unterkehle, Kropf, Bürzel, Hinterleib, untere und obere Schwanzdecken brennend scharlachzinnoberroth; Mantel und Schultern zimmtbraunroth, die Federn mit schmalen dunklen Schaftstrichen und zinnoberrothen Seitensäumen; Brust und Bauch nebst den Seiten sammtschwarz; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, an der Außenfahne schmal fahlbräunlich gesäumt wie die braunen oberen Flügeldecken; untere Flügeldecken blaß rostfarben wie die Tibienbefiederung. Auge dunkel bernsteinbraun; Schnabel glänzend schwarz mit helleren Schneidensäumen; Füße fahlbraun. — Winterkleid: oberhalb fahlbraun, jede Feder längs der Schaftmitte breit dunkelbraun, wodurch das Gefieder auf hellerem Grunde dunkel längsgestreift erscheint; Schwingendeck- und Schwanzfedern dunkelbraun, jede Feder an der Außenfahne fahlbraun gesäumt; ein schmaler Augenbrauenstreif bis zur Schläfe rothgelb, Kinn gelbbräunlich; Kopfseiten und ganze Unterseite fahlbraun, doch heller als oberseits, ebenfalls aber jede

Feder mit dunklem Schaftstrich, am Bauch am feinsten gestrichelt; untere Flügeldecken fahl röthlichbraun; Hinterleib und untere Schwanzdecken fahl bräunlichgelb. Schnabel röthlichhornbraun, unterer heller. — Das Weibchen ist kaum merklich kleiner und einen Ton heller, während das Männchen oft einen tieferen schwärzlichen Farbenton behält, dadurch, daß das Großgefieder sich nicht völlig entfärbt. — Jugendkleid unterscheidet sich von dem Winterkleide durch den Mangel der braunen Streifen längs der Schaftmitte der Federn und erscheint daher einfarbig fahlbraun und unterhalb düster weiß; nur auf dem Mantel sind feine Schaftstreifen zu bemerken; der Augenbrauenstreif ist fahlgelb und viel breiter. Erst im zweiten Jahre treten die Schaftstreifen deutlich hervor und dann gleicht der junge Vogel dem Weibchen. Im dritten Sommer färben sich die jungen Männchen zum Prachtgefieder.

Ploceus oryx: major; scarlatino ruber; facie, genis, regione parotica et abdomine holosericeo-nigris; alis et cauda brunneis; hujus tectricibus superioribus brevibus; remigibus et rectricibus pallide marginatis; iride fusca; rostro nigro; pedibus pallidis. — ♂ vestim. hiem. supra luride fuscus plumis secundum scapum medium late fuscis (ptilosi diluta idcirco striata); tectricibus remigum rectricibusque fuscis, singulis exterius luride limbatis; stria angusta superciliari usque ad regionem temporalem fulva; mento ochraceo; capitis lateribus et gastraeo toto luride brunneis, etiam striatis; abdomine subtilissime striolato; tectricibus subalaribus sordide subbadiis; crisso et subcaudalibus luride ochraceis; rostro rubente corneo, mandibula dilutiore. — ♀ vix minor, paululum pallidior. — Juvenis: a vestimento hiem. differens striolis obscuris nullis, itaque unicolor luride brunneus; subtus sordide albicans; interscapilio excepto subtiliter striolato; stria superciliari sordide flava, multo latiore. Annum unum natus striis scaporum magis conspicuis, cum ♀ conveniens; annos duos ♂ vestim. induens magnificam.

Länge $13{,}6^{cm.}$ ($5^1/_4$ Z.); Flügel $7{,}4^{cm.}$ ($2^5/_6$ Z.); Schwanz $3{,}9^{cm.}$ ($1^1/_2$ Z.).

Beschreibung des Eies: blaugrün, glänzend; Gestalt rund. Länge $20^{mm.}$, Breite $10^{mm.}$

Ovum: aeruginosum, nitidum, rotundum.

Der kleine schwarzbäuchige Webervogel [Ploceus nigriventris] ist der nächste Verwandte des Flammenwebers, von dem er sich jedoch durch die einfarbig schwarze Unterseite, sowie durch viel geringere Größe unterscheidet; er ist etwa dem Zeisig gleich. Bis jetzt ist er nur von Professor Peters und dann von v. d. Decken in Ostafrika aufgefunden. Einer nähern Beschreibung bedarf es hier wol nicht, da der Vogel ja lebend noch nicht eingeführt worden, obwol er auf Sansibar häufig sein soll. Hoffentlich wird er demnächst auch in unsere Vogelstuben gelangen und dann kann man den hübschen, kleinen Weber nach seinem größern Ebenbilde leicht erkennen.

Man hat ihn Brandweber benannt, doch ist diese Bezeichnung wol wenig zutreffend. Kommt er erst lebend zu uns, so wird ein passender Namen unschwer zu geben sein.

Euplectes nigroventris, *Css.*; Ploceus nigroventris, *Gr.*; Euplectes nigriventris, *Bp.*, *Cab.*, *Hgl.*; Pyromelaena nigriventris, *Fusch.* et *Hrtl.*

* * *

Unter der Bezeichnung **Schönweber** [Calyphantria, *Heine jun.*] sind einige herrliche Vögel hier anzureihen, welche auf den Inseln, weniger auf dem Festlande von Ostafrika leben. Einer von ihnen, der allbekannte Madagaskarweber, gehört zu den dankbarsten und beliebtesten

Bewohnern der Vogelstube und verdient deshalb eine eingehende Schilderung. Die übrigen sind bis jetzt im Handel leider noch so selten, daß sie kaum als Stubenvögel mitgezählt werden dürfen. Es steht aber zu hoffen, daß sie demnächst, wenn auch nicht oft und zahlreich, doch zeitweise eingeführt werden.

Der Madagaskar-Webervogel [Ploceus madagascariensis].

Tafel IX. Vogel 47.

Schon Vieillot wußte es, daß le Foudi zu den fremdländischen Vögeln gehört, welche am besten im Käfige ausdauern, und daß die jungen Männchen erst im zweiten Jahre zum Prachtkleide sich verfärben. Er berichtigt Irrthümer der älteren Schriftsteller, giebt jedoch sonst nichts bemerkenswerthes an. Gezüchtet hat er diesen Vogel nicht und ein solcher Erfolg ist auch zweifellos erst in der neuesten Zeit erreicht worden. Der Name „Foudi" ist von der vaterländischen Benennung abgeleitet.*) Seit Brisson her war dieser Weber auch als „Kardinal von Madagaskar" bekannt. Man belegte damals eine große Anzahl rother Vögel mit dem Namen Kardinal, welchen einige bekanntlich noch gegenwärtig tragen.

Er ist ein besonders prächtiger Vogel, der im Schmuckgefieder an Kopf, Oberrücken und Brust feurig scharlachroth erscheint, mit röthlichschwarzbraunen Schultern und Unterrücken, grünlichgrauen Flügeln und weißem Unterkörper. In der Größe übertrifft er kaum bemerkbar den Orangeweber.

Seine Heimat erstreckt sich über die Inseln Madagaskar und Reunion; auf St. Helena ist er durch Zufall eingeschleppt und hat sich dort überaus stark vermehrt. Ueber sein Freileben ist nur wenig mitgetheilt. Im allgemeinen gleicht dasselbe dem der Feuerweber. In der Nistzeit par-, dann familienweise zusammenhaltend, scharen sie sich späterhin zu großen Schwärmen und verursachen an mancherlei Getreidesämereien erheblichen Schaden. Deshalb werden sie auch verfolgt und unseren Sperlingen gleich zum Verspeisen geschossen. Im Prachtgefieder, zu welchem die Männchen sich auf Madagaskar im Oktober und auf Reunion im November und Dezember verfärben, kämpfen sie erbittert mit einander. Der Naturforscher Pollen beschreibt das Nest als birnförmig, mit seitlichem Schlupfloch und aus feinen Gräsern zwischen zwei bis vier Zweigen der Akazien, Mimosen, Tamarisken u. a. geflochten, zuweilen auch im Rohrdickicht. Lafresnayes dagegen bildet das Nest in länglichrunder Gestalt und zwischen dünnen Aestchen hängend ab. Näheres ist nicht angegeben.

---

*) Der Name Foudi, mit welchem Sakalaven und Malegassen einige hierhergehörige Vögel bezeichnen und der auch Soudi (*Verr.*), Fouli (*Grandidier*) und Fody (*Newton*) geschrieben wird, hat kein Anrecht auf wissenschaftliche Anwendung. Finsch und Hartlaub in v. d. Decken's Reisen IV.

Seit Vieillot's Zeit scheint der Vogel nur selten lebend eingeführt zu sein, denn in den Naturgeschichten ist er kaum erwähnt oder garnicht vorhanden. Bechstein kennt ihn nicht und ebensowenig hat ihn Bolle in seinem Verzeichniß mit aufgeführt. Auch gegenwärtig kommt er unregelmäßig, zuweilen jedoch in ziemlich großer Anzahl in den Handel. In Paris fand ich im Jahre 1867, obwol ich zahlreiche Vogelhandlungen besuchte, nur ein einziges Pärchen. Der Vogelhändler Mieth in Berlin hat den Vogel erst i. J. 1868 zum erstenmal gesehen. Karl Hagenbeck kannte ihn damals auch noch nicht. Die erste größere Sendung, welche nach Deutschland gelangte, erhielt Mieth von einem Schiffskapitän, der sie soeben nach Hamburg mitgebracht. Es waren zwölf Pärchen, von denen ich drei entnahm und zu deren Ankauf ich die Herren Leuckfeld, Dr. Baldamus und Graf York von Wartenburg ebenfalls bewog. Die Vögel waren sämmtlich im grauen Gefieder und es gehörte bei Nichtkennern Muth dazu, für zwei derselben den Preis von acht Thalern zu zahlen. Herr Emil Linden hatte übrigens schon vorher ein Pärchen angeschafft.

Da die Räumlichkeit meiner Vogelstube damals nur eine sehr bescheidene war, so ließ ich vorläufig nur vier Par Webervögel, und zwar Orange-, Napoleons-, Blutschnabel- und Madagaskarweber frei fliegen. Diese theilten sich nun die Vogelstube in eigenthümlich abgegrenzter Weise ein. Die Napoleonsweber hausten in einem hoch auf dem Ofen angebrachten, nachgeahmten Durrafelde aus Strandhafer und die Orangevögel in einem lichten Gehölz aus Birkenstrauch. Letzteren gegenüber bewohnten einen dichten Busch tief herniederhängender Birkenzweige die Madagaskarweber und in einer Ecke neben dem Fenster ein wirres, jedoch entnadeltes Tannengebüsch die Roth- oder Blutschnabelweber. Alle vier Webermännchen kamen fast zu gleicher Zeit in das Prachtgefieder und es entfaltete sich nun ein gar regsames Leben. Während sie alle übrigen Vögel ziemlich ungestört ließen, lebten sie miteinander in eifrigster Fehde. Von vornherein wurden bestimmte Grenzen eifersüchtig bewahrt und der Eindringling ward jedesmal von dem rechtmäßigen Bewohner unwiderstehlich davongejagt. Der Rothschnabel sowol als auch der Napoleonsweber wurden jedoch bald mehr und mehr unterdrückt; die beiden stärkeren dagegen vermochten sich gegenseitig nicht völlig zu besiegen. Schon hatte der erstere ein hübsches Nest nahezu fertig und auch der andere flocht sehr eifrig, nicht in dem Strandhafer, sondern in einem dicht daneben befindlichen Strauche seinen Kranz, aber sie wurden beide in die Flucht geschlagen und unerbittlich solange verfolgt, bis sie sich zu entfärben begannen und damit ihrerseits die Lust zu weiterem Widerstande und Kampf verloren, worauf sie dann unbehelligt blieben.

Die Kämpfe zwischen diesen Webermännchen sind sehr komisch. Der Madagaskarweber sträubt die Halsfedern, bückt den Kopf herunter, hält den Schnabel

wagerecht, gleichsam wie eine eingelegte Lanze, dabei läßt er die Flügel hängen und beugt den Schwanz ebenfalls herab. Der Feuerfink sträubt die Nackenfedern, wie die Mähne eines Löwen, und ebenso die kurzen Federchen des Oberkopfs; zugleich erhebt er straff den ganzen Körper und nimmt eine höchst wunderliche Stellung an. So stehen sie einander gegenüber; jetzt drängt der Feuerfink den Madagaskarweber, sodaß derselbe hurtig seitwärts hüpft, doch plötzlich nimmt jener einen Anlauf und treibt diesen wiederum in die Flucht. Dann schwingt sich der eine rechts, der andere links, jeder auf einen möglichst erhöhten Sitz, von welchem aus sie einander ihre heiseren Töne entgegenzischen, welche Kampf-, Sieges- und Liebeslied sein sollen.

Bevor ich die Eigenthümlichkeiten aller dieser Webervögel näher kannte, bot ich ihnen immer eine möglichst große Mannigfaltigkeit der verschiedensten Stoffe zum Nestbau an. So glaubte ich, daß einerseits frische Grashalme und andrerseits Kokosfasern ihnen willkommen sein würden. Jeder Züchter kann sich indessen sehr bald davon überzeugen, daß die meisten Weber, welche in unsere Vogelstuben gelangen, doch die Agave- oder Aloëfasern vorzugsweise lieben. Der Madagaskarweber brachte zuerst im grauen Gefieder ein Nest zustande, doch riß er dasselbe wieder ein und trieb so das Spiel des Herstellens und Wiederzerstörens geraume Zeit. Endlich, in der Mitte des Monats Juni, als er bereits wieder im vollen Prachtgefieder prangte und ein neues Nest in allgemeinen Umrissen fertig gebaut hatte, bemerkte ich, daß auch das bis dahin ganz unthätige Weibchen emsig nach passenden Baustoffen umhersuchte und diese in das Nest eintrug. Während das Männchen bis jetzt sein Weibchen immer verfolgt und vom Futter, Wasser u. dgl. fortgejagt hatte, begann jetzt ein ganz eigenthümliches Liebesspiel. Fledermausartig schwirrend, mit zitternden Flügeln umflatterte der prachtvolle Weber das sperlingsgraue Weibchen, folgte ihm auf Schritt und Tritt, nicht aber wie früher jagend, sondern werbend, indem er mit wunderlichen Geberden, ähnlich wie beim Kampfesspiel, mit herabhängenden Flügeln es umschwirrte, dann vor ihm auf einen Zweig hüpfend, den Körper rücklings hinüberbiegend, es gleich darauf im Fluge wieder hurtig verfolgend, dann eine Spitze erklimmend, ihm seinen komischen Sang vorzischte.

Schon sogleich, als diese Brut begann, machte sich das Männchen an den Bau eines neuen Nestes und als die beiden fast flüggen Jungen durch einen Unglücksfall umgekommen waren, trug nach zwei Tagen das Weibchen ebenfalls in dasselbe fleißig ein. Das letztere sammelte besonders lange Fasern von Flachsseide und Pflanzenwolle, um, wie ich dachte, die Nestmulde damit auszupolstern. Diese Annahme war jedoch nicht richtig. Noch zwei Tage später befand sich das erste Ei im Nest und in Zwischenräumen von je einem Tage um den andern wurde ein Ei gelegt. Das Weibchen brütete vortrefflich; es wurde vom Männchen

nicht gefüttert, sondern nur bewacht. Dieses letztere entfaltete jetzt eine kaum glaubliche Lebhaftigkeit und Thätigkeit; kein Bewohner der Vogelstube blieb ungeschoren und mit Ausnahme der größeren Papageien und Tauben wurden sie sämmtlich gejagt und tyrannisirt, sodaß selbst der standhafte Bandfink sein Nest mit vier Eiern im Stiche lassen mußte. In dieser Zeit kam also garkeine andre Brut zum Gedeihen.

Das Nest hat die Form einer Retorte mit abgeschnittener Röhre, doch steht das obere Dach etwas darüber, während die vordere Unterwand tief herabhängt, sodaß also der Eingang von unten herauf führt. In der Hauptsache ist der Bau aus Agavefasern gewoben, zwischen denen dann Sackfäden, Pferdehare, ganz dünne Papier- und Baststreifen und auch frische Grashalme eingeflochten sind, ebenso auch hier und da Flöckchen von Flachsseide und Baumwolle; die Mulde aber, in welcher die Eier liegen, ist nur aus Agavefasern hergestellt und enthält keine weichere Ausfütterung. So bildet das Nest einen luftigen, fast überall durchsichtigen, doch sehr fest gewebten Beutel von etwa 10 cm. Höhe und 6 cm. Durchmesser, mit ganz kurzer, seitlich niederhängender Flugröhre. Das Gelege besteht in 3 bis 6 Eiern. Brutdauer durchschnittlich 15 Tage. Nestflaum dunkelbräunlich. (Jugendkleid s. wissenschaftliche Beschreibung.)

Sobald die Jungen heranwachsen, fängt auch das Männchen an zu füttern und die beiden alten Vögel lassen jetzt fortwährend ein lautes Zirpen erschallen, welches mit dem des Zaunkönigs große Aehnlichkeit hat. Die Jungen zirpen beim Futterempfangen nur leise. Am dritten Tage nach dem Ausfliegen flattern sie schon ziemlich selbstständig umher und verfolgen die Alten, um Nahrung bettelnd, indem sie in der Weise junger Sperlinge die Flügel rütteln. In der Regel erfolgen drei Bruten alljährlich, manchmal sogar vier und wenigstens immer zwei, wenn das Pärchen nicht gestört wird.

Im Gesellschaftskäfige oder in der Vogelstube gehört der im Prachtgefieder befindliche Madagaskarweber zu den herrlichsten Erscheinungen. Gegen kleinere Vögel ziemlich friedlich, darf er dann mit Seinesgleichen oder anderen Webern nicht zusammen gehalten werden. Der Lockton klingt wie ein scharfes, hartes zit, zit. Der Gesang beginnt mit einem wunderlichen, nicht unangenehmen, mehrmals wiederholten Ton, wie lü, lü, geht dann in das langgezogene Zischen über und endet trillerartig, nicht übel erklingend. Die Verfärbung zum Prachtkleide tritt zu verschiedenen Zeiten ein und richtet sich nach der Gegend, aus welcher der Vogel gekommen. Die über London eingeführten (wahrscheinlich von St. Helena herstammenden) werden in der Regel erst im Januar roth; aus Bordeaux und Antwerpen in den Handel gebrachte langen im September gewöhnlich schon im vollen Prachtgefieder an. Die Dauer des Prachtkleides ist in gleicher Weise, wie bei den Feuerwebern je nach Alter, Fütterungszustand u. s. w. verschieden. Ohne

Anmaßung darf ich wol behaupten, daß die jungen Madagaskarweber, welche am 25. Juli 1869 in meiner Vogelstube flügge geworden, als der erste Züchtungserfolg mit diesem Vogel dastehen. Seitdem hat man auch in vielen anderen Fällen glückliche Bruten von ihm erzielt und die schon im „Handbuch für Vogelliebhaber" ausgesprochene Meinung, daß dieser Weber einen hohen Rang unter den Stubenvögeln einnehmen müsse, hat sich wol bewahrheitet. Trotz der eifrigen und erfolgreichen Zucht ist aber der Preis keineswegs heruntergegangen, sondern im Gegentheil gestiegen. Mieth verkaufte damals das Pärchen für 24 Mark und jetzt ist dasselbe kaum unter 30 Mark zu haben. Ein großer Uebelstand bei der Zucht dieses Webers ist freilich der, daß die jungen Männchen sich erst im dritten Jahre zum Prachtgefieder verfärben und also nicht früher zur Hecke oder zum Verkauf zu benutzen sind. Bei den Großhändlern steht der Preis gewöhnlich auf 12 Mark im grauen Gefieder und schlechtesten Zustande und auf 18 Mark im Prachtkleide.

Der Madagaskar-Webervogel wird meistens schlichtweg Madagaskarweber oder auch Madagaskar-Kardinal (Rchb.) und Foudi genannt, welche letztere Bezeichnung sich übrigens in allen Sprachen wiederholt.

Le Foudi (Bekemans, französische Händler und Vrzn. des Akkl.-Grt. v. Paris); Red-headed Weaver-bird (Jamrach und Vrzn. des zool. Grt. von London); Foedi (holländisch).

Nomenclatur: Loxia madagascariensis, *L.;* Cardinalis madagascar., *Brss.;* Ploceus madagascar., *Gr.*; Euplectes ruber, *Swns.;* Foudia madagascar., *Bp., Hrtl., Rchb.;* Calyphantria madagascar., *Hn.* — Le Foudi, *Buff.* et *Vieill.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Hals, Oberrücken, Bürzel, Brust und Bauch bis nahe an die Beine feurig scharlachroth; vom Schnabel durch das Auge ein tiefschwarzer Streif; Rücken- und Schulterfedern schwarzbraun, breit roth gesäumt. Flügeldeckfedern, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun mit olivengrünlichgelben Außensäumen, über jeden Flügel eine weißliche Querbinde; Unterflügel grauweiß; unterer Bauch und Unterkörper fast reinweiß. Auge bernsteinbraun; Schnabel glänzend schwarz; Füße röthlichgrau. — Winterkleid: Kopf und ganze obere Seite bräunlichgrau, jede Feder lebhaft gelb gesäumt und mit breitem dunklen Schaftstreif; Augenbrauenstreif fahlgelb; Bürzel olivengrünlichbraun; unterhalb schwach olivengrünlichgelbgrau; Unterflügel und untere Schwanzdecken fahlgelblich. Schnabel horngrau mit schwärzlicher Spitze. — Weibchen ebenso, nur etwas düsterer olivengrünlichgrau und die gelben Federsäume viel weniger lebhaft. — Jugendkleid: Kopf olivenbräunlich dunkelgrau, Rücken und Flügeldeckfedern rein dunkelgrau, jede einzelne Feder fahlgelb gesäumt Schwanz grau mit einer fahlgelben Querbinde; unterhalb fahlgrau. Auge dunkel; Schnabel hell hornbraun; Füße fleischfarben. Das Schwänzchen ist auffallend kurz.

Ploceus madagascariensis: rubro-scarlatinus, dorso nigro-maculato; stria per oculum nigra; alis et cauda nigro-fuscis; remigibus et rectricibus pallide virescente-flavido-limbatis; tectricibus alarum flavido-limbatis; iride fusca; rostro nigerrimo; pedibus carneis. — ♂ vestim. hiem. capite totoque notaeo subfusco-cinereis, pluma quaque laete flavo-limbata cum stria scapi lata obscura; stria superciliari gilva; uropygio olivaceo-fusco; subtus dilute olivaceo-cinerascens; subalaribus et subcaudalibus luride flavidis; apice rostri cornei nigricante. — ♀ concolor, nonnisi obscurior limbis plumarum flavis pallidioribus. — Juvenis: capite subolivaceo-cinereo; dorso alarumque tectricibus obscure cinereis, pluma quaque luride limbata; fascia transversa caudae

brevissimae supra pure, subtus sordide cinereae luride flavida; iride obscura; rostro dilute corneo; pedibus carneis.

Länge 13,6 cm. (5¼ Z.); Flügel 6,5 cm. (2½ Z.); Schwanz 4,6 cm. (1¾ Z.).

Beschreibung des Eies: Gestalt eiförmig, Farbe bläulichgrün, fettglänzend und glattschalig. Länge 18 mm.; Breite 12 mm.

Ovum: ovatum, glaucum, innunctum et laeve.

Der Sansibar-Webervogel [Ploceus eminentissimus].

Kaum würde ich es wagen, diese Art unter den lebend eingeführten mitzuzählen, wenn ich nicht in dem folgenden guten Grund dazu hätte. Durch den alten Bahnbeamten Baumgarte, der allen Vogelfreunden von Berlin wol bekannt ist, beziehe ich hin und wieder Vögel, welche er von den kleineren Händlern in Hamburg für mich aufkauft. Da habe ich denn schon gar mancherlei Seltenheiten erhalten. Von dem Händler Fockelmann brachte er mir einst einen einzelnen Vogel, welcher dem Madagaskarweber sehr ähnlich, doch ungleich schöner und feuriger scharlachroth, dabei aber dunkler olivengrünlichbraun im übrigen Gefieder war und an Mantel und Schultern nicht roth gesäumte Federn, wol aber zwei weißliche Querbinden über den Flügel und einen viel kräftigern, geraden Schnabel hatte. Leider war derselbe jedoch schon in der Entfärbung begriffen und auch von der Reise her in schlechtem Gefieder, weshalb ich die Feststellung bis zur nächsten Färbung zum Prachtkleide aufschob. Der Weber flog lange Zeit in meiner Vogelstube, doch war er kränklich und färbte sich im ersten Jahre garnicht mehr. Späterhin wurde er von einem Papagei todtgebissen.

Es war die obengenannte Art, von welcher ich nicht habe ermitteln können, ob sie jemals vor- oder nachher in den Vogelhandlungen oder zoologischen Gärten vorhanden gewesen.

Der gesammten Literatur ist außer der Beschreibung des Sansibarwebers nicht viel näheres zu entnehmen. „Er vertritt", sagen Finsch und Hartlaub, „auf dem Kontinente die Madagaskar, den Komoren, Maskarenen und Seschellen eigenthümliche Gattung und ist bis jetzt auf Sansibar (von Louis Rousseau und v. d. Decken) im Sambesi-Gebiete (von Livingstone) und auf Mozambique (von Professor Peters) gefunden."

Der Sansibar-Webervogel ist auch Zanzibar-Foudi (Rchb.) und Kardinalweber (Br.) benannt worden.

Nomenclatur: Foudia eminentissima, *Bp.*, *Hrtl.*, *Rchb.*; Calyphantria eminentissima, *Hne.*, *Cab.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Hals, Kinn, Kehle, Kropf und Oberbrust brennend scharlachroth, ebenso Bürzel und obere Schwanzdecken; Mantel und Schultern olivenbraun, jede Feder mit breitem, dunklerem Schaftstrich; Schwingen und Schwanzfedern dunkel olivenbraun, mit schmalen heller olivenbraunen Säumen an der Außenfahne; Deckfedern dunkel olivenbraun mit zwei weißlichen Querbinden über den Oberflügel; Unterbrust und übrige

Unterseite nebst den unteren Flügeldecken isabellbräunlich, etwas roth verwaschen. Auge röthlichbraun; Schnabel schwarz; Füße fleischfarben. — Dem Weibchen fehlt die rothe Farbe des Kopfes und der Brust; es ist sperlingsartig und dem Weibchen des Madagaskar-Webervogels ähnlich gefärbt.

Ploceus eminentissimus: fusco-virens, dorso striolato; subtus albo-olivaceus, rubro tinctus; capite, collo, pectore uropygioque rubris; orbitis concoloribus; iride fusca; rostro nigro; pedibus carneis. — ♀ rubore capitis pectorisque carens, omnino cum ♀ Ploceo madagascariensis fere conveniens.

Länge 13 cm. (5 Z.); Flügel 7,8 cm. (3 Z.); Schwanz 4,6 cm. (1¾ Z.).

Einige sehr nahestehende Arten dürften bis jetzt noch kaum mit Sicherheit zu unterscheiden sein. Den **Komoren-Webervogel** [Ploceus comorensis] beschreibt Cabanis: „Kopf, Hals und Unterseite bis zur Bauchmitte, Bürzel und obere Schwanzdecken schön und lebhaft roth; Zügel und ein Fleck hinter dem Auge schwarz; Oberseite dunkelbraun, überall grün gerandet; die mittleren und die großen Flügeldecken weiß gerandet; Bauch, Weichen und untere Schwanzdecken graugrün. Der Umstand, daß die unteren Schwanzdecken einzelne rothe Federn zeigen, läßt vermuthen, daß der von Dr. Kersten aus Mayotte erlangte Vogel noch nicht ganz ausgefärbt ist und daß im vollendeten Kleide das Roth noch eine weitere Verbreitung über die Unterseite erreichen dürfte." Er ist nach Finsch und Hartlaub hauptsächlich durch den schwarzen Strich über die Zügel und durch das Auge von dem vorigen verschieden. — Calyphantria comorensis, *Cab.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Ploceus comorensis, *Rss.*

Der Algonda-Webervogel [Ploceus algondensis] unterscheidet sich nach Finsch und Hartlaub nur dadurch von dem vorigen, daß er blos schwarze Augenwimpern, blos eine helle Flügelquerbinde hat und ansehnlich kleiner ist. Th. v. Heuglin ergänzt dies noch dahin, daß das Roth nur bis zur Brust herabgeht, der Bürzel nicht roth, wie die oberen Schwanzdecken, sondern wie die Rückenfarbe und daß die kleinen Flügeldeckfedern nicht breitweiß gerandet sind, daß kein rothes Band über den hinteren Unterleib läuft und die Rücken- und Unterleibsfärbung etwas verschieden erscheinen. „Das Vorkommen von zwei so nahestehenden Arten", fügen die ersteren hinzu, „auf einer unbedeutenden Inselgruppe ist höchst merkwürdig. Ueberhaupt herrscht noch viel Unsicherheit in der Bestimmung der hierher gehörigen Vögel." — Ploceus Algondae, *Schlg.* et *Pll.*, *Hgl.*; Calyphantria Algondae, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Cab.*

Der Mauritius-Webervogel [Ploceus erythrocephalus].

Im Berliner Aquarium waren noch zur Zeit der ersten Direktion zwei Vögel vorhanden, welche nach meinem Urtheil, d. h. soweit ich sie vor mir im Flugkäfige feststellen konnte, zu dieser Art gehörten. Nach mehreren Jahren zeigte mir dann ein Liebhaber, Herr W. Böttger in Berlin, welcher soeben aus Hamburg zurückgekehrt war, ein Männchen in vollem Prachtgefieder, und ich gelangte dadurch zu der Ueberzeugung, daß ich mich nicht getäuscht, sondern daß

Chrom. Lith. Th. Fischer Cassel

dieſer rothköpfige Weber wirklich, wenn auch nur höchſt ſelten, doch lebend eingeführt werde.

Er wurde als the red-headed Finch zuerſt von Brown beſchrieben und abgebildet. Buffon hielt ihn für das Weibchen des Madagaskarwebers. Vieillot hatte la Fringille Cardeline nicht lebend geſehen und giebt auch nichts näheres an. Da von den älteren Schriftſtellern bis zu den neueren herab, wie ſchon erwähnt, gerade über die Schönweber mancherlei Irrthümer herrſchen und namentlich Verwechſelungen vorkommen, ſo iſt nicht mit Sicherheit zu ſagen, ob dieſe Art nur auf Mauritius oder auch auf Madagaskar heimiſch ſei. In Lebensweiſe, Neſtbau u. a. m. dürfte ſie mit den vorher geſchilderten Verwandten völlig übereinſtimmen. Sie iſt dem Sanſibarweber am ähnlichſten, doch bedeutend kleiner.

Der Mauritius-Webervogel iſt auch rothköpfiger Foudi oder Kardeline (Rchb.) und Erzweber (Br.) benannt.

Nomenclatur: Fringilla erythrocephala, *Gml.;* Emberiza rubra, *Gml., Brwn., Vll., Lfr.;* Ploceus erythrocephalus, *Swns.;* Hyphantornis erythrocephala, *Blth.;* Foudia Martineti, *Gr., v. Mll.;* Foudia erythrocephala, *Bp., Hrtl., Rchb.* — The red-headed Finch, *Brown;* la Fringille cardeline, *Vieill.;* la Cardinaline, *Lafresnayes.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf, Hals, Oberbruſt und Oberſchwanzdecken blutroth; Rücken, Flügel und Unterleib dunkelgrün, jede Feder mit ſchwarzem Schaftſtreif; Flügeldeckfedern weiß geſpitzt, daher zwei weiße Binden bildend; Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz, blaßgrünlich geſäumt. Auge braun; Schnabel und das längliche, hinten abgerundete Augenfeld ſchwarz; Beine hell röthlichgrau. — Weibchen dunkelgrün; unterſeits weißlich; Flügel mit zwei weißen Binden und fahlen Schwingenſäumen. Schnabel und Beine braun (Rchb.).

Ploceus erythrocephalus: olivaceo-virens, dorso striolato; subtus pallidior albescens; capite, collo, pectore et uropygio pulchre scarlatinis; abdomine medio flavido; alis albide bifasciatis; orbitis nigris. Iride fusca; rostro nigro; pedibus dilute brunneis. — ♀ fusco-virens, subtus pallidior; alis bifasciatis. Rostro et pedibus fuscis.

Länge $11_{/8}$ cm. ($4^1/_2$ Z.); Flügel $6_{,5}$ cm. ($2^1/_2$ Z.); Schwanz $3_{,9}$ cm. ($1^1/_2$ Z.).

Der **Rodrigez-Webervogel** [Ploceus flavicans]. Nur ganz beiläufig darf ich dieſen Schönweber hier erwähnen, weil er bis jetzt noch nicht lebend eingeführt worden und dazu auch wol keine Ausſicht bietet, obwol er in ſeiner Heimat, der Inſel Rodrigez, nicht ſelten ſein und auch als Stubenvogel gehalten werden ſoll. Er zeichnet ſich vor den Verwandten dadurch aus, daß er hochgelb, anſtatt roth iſt. — Foudia flavicans, *Nwt.;* Calyphantria flavicans, *Br.;* Ploceus flavicans, *Rss.*

* * *

Als Sperlingsweber faſſe ich Vögel zuſammen, welche, obwol in verſchiedenen Welttheilen heimiſch, doch einander ſo verwandt ſich zeigen, daß es ein Unrecht gegen meine Leſer ſein würde, wollte ich ſie noch in mehrere kleine Sippen zerſplittern. Die oſtindiſchen Arten, als Ammerweber oder eigentliche Webervögel [Ploceus, *Cuvier*] bezeichnet, werden neuerdings auch von den Syſtematikern, namentlich von Finſch und Hartlaub, mit den afrikaniſchen und zwar den Dickſchnabelwebern [Hyphantica, *Cab.*] zuſammengeſtellt. Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich auch den Mahaliweber [Philagrus, *Cab.*] und den Kolonieweber [Philetaerus, *Smth.*] hierher zähle.

Chrom. Lith. Th. Fischer Cassel.

Der rothschnäbelige Webervogel [Ploceus sanguinirostris].

Tafel VIII. Vögel 39 und 40.

Nach seinem vaterländischen Namen Dioch oder auch Blutschnabelweber genannt, gehört er zu den fremdländischen Vögeln, welche, seit frühester Zeit her lebend eingeführt, bis zur Gegenwart immerfort im Handel vorhanden und zugleich am billigsten sind.

Das Gefieder des Blutschnabels ist an Oberkopf, Nacken und ganzem Unterkörper fuchs- bis lichtrosenroth; Gesicht, Stirn, Wangen und Kehle sind schwarz; Rücken, Flügel- und Schwanzfedern sind fahlgelb, in der Mitte schwarz und mit zitronengelbem Außensaum. Der Schnabel ist blutroth. Das Weibchen erscheint einfarbig sperlingsgrau, zur Brutzeit mit wachsgelbem und sonst blutrothem Schnabel. In der Größe kommt er etwa dem Feldsperlinge gleich.

Die älteren Schriftsteller haben auch über ihn mancherlei Irrthümliches angegeben. Buffon hielt ihn, den damaligen Anschauungen entsprechend, für eine Abart unsres Sperlings. Vieillot schildert ihn in folgender Weise: „Der Dioch ist ein bösartiger, zänkischer und störrischer Vogel, deshalb darf man ihn nicht mit kleinen, zarten und sanften Genossen zusammen halten. Er quält sie unablässig, packt sie besonders am Schwanz, hebt sie in die Höhe und läßt sie eine Weile zappeln, indem er häßlich schreit, solange er sich derartig vergnügt. Die kleinen Gequälten wehren sich gewöhnlich garnicht, sondern stellen sich lieber todt, damit er sie nur in Ruhe lasse; flattern sie aber lange, so pflegt er sie auch noch zu rupfen. Mit ihresgleichen leben die Diochs gesellig, wobei sie jedoch fortwährend zanken und einander schelten; selbst das eigene Weibchen entgeht nicht den rohen Späßen des Männchens.“ Weiter beschreibt er dann den Nestbau: „Männchen und Weibchen weben gemeinschaftlich, ersteres mehr von außen, letzteres von innen, wobei sie die Halme sich gegenseitig zureichen, aber unter stetem Zank und Streit. Sie halten den Halm mit den Fußzehen fest, glätten ihn mit dem Schnabel und drehen und flechten ihn nach allen Seiten im Zickzack oder in die Runde. So befestigen sie drei bis vier Halme an schwache Zweige, flechten andere dazwischen, um ihnen Haltbarkeit zu geben und die kleinen Aeste, welche das Zimmerwerk des Nestes ausmachen, mit einander zu verbinden. Das sehr geschickte Gewebe ist einem Weidenkörbchen nicht unähnlich, fast vollkommen kugelig, mit dem Eingange vorn in der Mitte. Sie arbeiten in der Regel nur früh morgens, etwa drei bis vier Stunden täglich, aber so thätig, daß das Gewebe oft früher, als in acht Tagen fertig ist. Legt das Weibchen während dieser Frist noch keine Eier, so zerstört das Männchen das Nest, um späterhin den Bau eines neuen zu beginnen.“

In den Museen tritt uns dieser Vogel in mannigfaltigem Gefieder entgegen; nicht allein die verschiedenen Stufen der Verfärbung, die Alters- und Jugendkleider, sondern auch noch andere Unterschiede machen sich geltend und man hat daher mehrere Arten oder doch Lokalrassen aufgestellt. Sundevall versuchte drei solche zu begründen, Finsch und Hartlaub, sowie Heuglin halten jedoch nur zwei aufrecht, deren zweite sie als **Aethiopischer Webervogel** [Ploceus aethiopicus, *Sndvll.*] bezeichnen: „Nach Vergleichung zahlreicher Exemplare halten wir diese Form für artlich verschieden. Das Männchen unterscheidet sich durch den Mangel des schwarzen Stirnrandes; Stirn wie Ober- und Hinterkopf und die ganze Unterseite sind rostisabellgelb; der rothe Anflug fehlt auf dem Kopfe und am Nacken, ist dagegen zuweilen sehr kräftig auf der Brust und dem Bauche. Männchen im Winterkleide, Weibchen und junge Vögel scheinen nur durch deutlich weiß gefärbten Bauch, After und untere Schwanzdecken vom Blutschnabel abzuweichen, dürften sich aber unter Umständen kaum mit Sicherheit feststellen lassen. Die Verbreitung erstreckt sich südlich vom 18° n. Br. über Sennar, Kordofan, das Gebiet des weißen Flusses, Abessinien, Bogosland und Mozambik."

Nun aber besitze ich seit vier Jahren einen Dioch, welcher sich ganz regelmäßig in der Weise zum Prachtkleide verfärbt, daß er garkein Schwarz erhält. Die Wangen sind wie abgezirkelt röthlichgelb, von einem feinen schwärzlichen Streif umrandet, ebenso, aber ohne den Streif, ist die Kehle gefärbt; das Auge ist mit einem schönen rothen Ring umgeben; Stirn, Hinterkopf, Nacken und der ganze Vorderkörper sind sehr lebhaft rosenroth. In allem übrigen stimmt er mit dem schwarzstirnigen und schwarzbäckigen Rothschnabelweber überein. Da auch gleiche Vögel seit Jahren in der Handlung des Herrn Mieth und in der Vogelstube des Herrn W. Elsner in Berlin sich befinden, so zweifle ich nicht daran, daß es mindestens eine feststehende Lokalrasse und zwar der Dioch rose Vieillot's, also der **rosenrothe, rothschnäbelige Webervogel** [Ploceus Lathami, *Rchb.*] ist; freilich mit der irrthümlichen Annahme, daß er auch ein schwarzes Gesicht gezeigt haben soll. Sundevall hat in der Beschreibung seiner drei Rassen keinen Vogel ohne schwarzes Gesicht und Kehle und daher dürfte, falls ich mich täuschen und der P. Lathami mit dem P. sanguinirostris zusammenfallen sollte, der meinige wol eine andre feststehende Lokalrasse sein.

Zu der Zeit, als ich das „Handbuch für Vogelliebhaber" schrieb, stimmte ich der schon von Vieillot ausgesprochenen Meinung zu, daß nämlich alle jene Verschiedenheiten nur in Alters- und allenfalls in Fütterungsunterschieden begründet seien. Unter vielen Hunderten von rothschnäbeligen Webern habe ich sodann aber im Laufe der Zeit immer dieselben Abweichungen gefunden, und namentlich konnte ich beobachten, daß die Vögel bei entsprechender Verpflegung sich stets in gleicher Weise verfärben und zwar, erstens als der Blutschnabel-

weber oder Dioch mit schwarzem Gesicht und Stirn, sowie im Alter mit schön rosenrothem Anflug an Kopf und Oberbrust (Tafel VIII, Vogel 39); zweitens als der rothschnäbelige Weber ohne schwarzen Stirnrand, der zugleich niemals rosenroth angehaucht erscheint; drittens als der rothschnäbelige Weber, welcher garkein schwarzes Gesicht hat, dagegen an Stirn, Hinterkopf, Halsseiten und Brust, sowie je nach dem Alter mehr oder weniger am ganzen Unterkörper lebhaft rosenroth ist" (Tafel VIII, Vogel 40).

Fassen wir alle diese Lokalrassen nur als eine Art zusammen, so erstreckt sich die Heimat des Vogels wol über den größten Theil Afrikas. Leider konnte ich nicht ermitteln, von wo die Weber ohne schwarzes Gesicht eingeführt worden.

Es ist mindestens sonderbar, daß man über das Freileben des rothschnäbligen Dioch, über den Nestbau und die Brutentwickelung bis jetzt überaus wenig angegeben findet, trotzdem er doch einer der gemeinsten Vögel Mittelafrikas ist und also jedem Reisenden dort auf Schritt und Tritt begegnet. Th. v. Heuglin berichtet über die äthiopische Lokalrasse folgendes: „Die Parungszeit fällt in die Monate Juni und Juli und die in derselben weinbis rosenrothe Färbung des Gefieders verbleicht schon nach wenigen Wochen. Dieser Weber kommt als Zugvogel in Kordofan, Senar, Südnubien und Takah mit dem ersten Sommerregen in ganz unglaublich großer Zahl an. Sich vorzüglich von Gräsersämereien ernährend, durchschweifen seine wolkenartigen Flüge die weiten Steppenregionen, theilen sich im Juli in kleinere Gesellschaften, welche sich dann mehr nach den Gewässern ins Kulturland und um Niederlassungen hinziehen, doch fanden wir sie zur genannten Jahreszeit auch im Gebirge bis auf ungefähr 2000 Meter Höhe, ostwärts bis ins Bogosland hinüber, seltener in der eigentlichen Waldregion. Dann kehren sie auch in Dörfern und Städten ein, in Höfen und Viehgehegen, auf Hecken, Mauern und Dächern, wo sie sich oft sperlingsartig dicht an einander gedrängt niederlassen. Wasser scheint diesen Vögelchen, besonders während der Brutzeit, mehr als vielen anderen Finkenarten Bedürfniß zu sein; sie besuchen in den Vormittags- und Abendstunden regelmäßig familien- und flugweise die Tränke und baden da recht fleißig. In den Gärten Chartums bauen sie dann einzeln oder in drei bis vier Pärchen gemeinschaftlich ihre niedlichen, leichten und ziemlich flachen Beutelnester, aus grünen Grashalmen künstlich geflochten, besonders auf Parkinsonien; dieselben werden hier aber selten wirklich zur Brut benutzt. Es ist mir niemals gelungen, Eier zu finden, obgleich ich Dutzende frischer Nester untersuchte. — Der Blutschnabel ist ein munterer, geschwätziger Vogel, um Wohnungen zutraulich, in der Steppe aber meist argwöhnisch und scheu. Den Gesang möchte ich mit einem sperlingsartigen Zwitschern vergleichen. Nach vollendetem Brutgeschäft sammeln sich diese Weber wieder und wandern im September und Oktober mit eintretender Dürre

südwärts. • Im Gebiet des weißen Nil, unterhalb der Sobatmündung, begegneten wir im Januar noch Scharen von Blutschnäbeln, welche mit der Abenddämmerung in den Schilfwäldern einfielen. Der Lärm, den diese Vögel hervorbringen, wenn sie aufgescheucht werden, ist donnerähnlich, betäubend und ebenso lebhaft erschallt ihr Geschrei, ehe sie zur Nachtruhe gelangen." Dr. Bierthaler fand sie im Gebiet des blauen Flusses in so großen Flügen, daß er 29 Köpfe auf einen Schuß erlegte. Auch Baron Müller, Prof. Robert Hartmann u. A. sahen solche Schwärme. Die Lebensweise wird also der verwandter Finkenvögel gleichen, welche nach beendeter Brutzeit sich mehr oder minder zahlreich zusammenschlagen und streichend der Dürre weichen, um zur Regenzeit wieder zurückzukehren. —

Die Liebhaber des rothschnäbligen Webers bei uns, insbesondre aber in Paris, vergnügen sich damit, daß sie ihm, meistens in ganz kleinen Käfigen, allerlei Baumaterial, namentlich aber bunte Wollfäden bieten und ihn dann seine Künste üben lassen. Diese bestehen freilich nur darin, daß er allmälig den größten Theil des Drahtgitters mit den Fäden, Halmen, Fasern und dergleichen durchwebt. Man will dabei beobachtet haben, daß er bunten und hellen, namentlich rothen Fäden den Vorzug geben und daraus sogar ‚prächtige Muster' herstellen soll. Das thun die Männchen, selbst wenn sie einsam im Käfig sich befinden, und ihrer Unermüdlichkeit und Emsigkeit wegen nennt man sie in Frankreich Travailleurs oder Arbeiter, anstatt der bei uns üblichen Bezeichnung Weber.

Da ich kein Freund von derartigen Spielereien bin und da mir viel mehr daran lag, das Wesen und die Eigenthümlichkeiten auch dieses Vogels zu erforschen, so schaffte ich zwei Pärchen an, von denen ich ein sehr altes in einen mittelgroßen Käfig und ein jüngeres frei in die Vogelstube fliegen ließ. Das erstere vergnügte sich anfangs mit jenen Flechtereien, mit denen es die eine Seite des Gitters dicht überzog. Einen besondern Farbensinn oder Geschmack in der Anordnung der Fäden konnte ich dabei nicht entdecken, wol aber bemerkte ich, daß der Dioch vorzugsweise die helleren Fäden wählte. Obwol das Männchen im Prachtkleide war, brachte es ein wirkliches Nest nicht zustande; ich vermuthete daher in ihm einen ‚Travailleur', den Jemand bereits längere Zeit im Käfige gehabt, um sich an seinen Baukünsten zu ergötzen. Umsomehr erfreute mich die Thätigkeit des Pärchens in der Vogelstube. Diese beiden, wie auch alle anderen, welche ich später gehalten, widerlegten durch ihr Benehmen zunächst die Behauptung, daß der rothschnäblige Weber unverträglich und überaus bösartig sei. Er ist allerdings ein lebhafter, kräftiger Vogel, welcher in der Gefangenschaft, ebenso wie viele andere, üble Eigenschaften entwickeln mag, die er aber von Natur keineswegs besitzt. Futterneid z. B. ist eine der verbreitetsten und häßlichsten Seiten des Vogelcharakters — wie Nahrungs- oder Brotneid des menschlichen

— die sich sogleich in jeder gefiederten Gesellschaft zu entwickeln pflegt und entweder zu harten Kämpfen oder dazu führt, daß die Kleinen und Schwachen unterdrückt und gemißhandelt werden; wenn aber in einer Vogelstube, wie in der meinigen, für die Befriedigung aller Bedürfnisse reichlich gesorgt wird, so kommen solche Bösartigkeiten garnicht zum Ausbruch. Die gesammte Bewohnerschaft — vorausgesetzt natürlich, daß sie im übrigen zusammengehörig gewählt worden — ist vielmehr verträglich und geht mit Eifer ihren Brutgeschäften nach. Die jüngeren Blutschnäbel waren anderen Vögeln gegenüber sogar schüchtern und ließen sich in dem Streitpunkt, welcher der hauptsächliche und auch fast der einzige in meiner Vogelstube ist: in der Wahl des Brutorts, von allen übrigen Webern meistens in die Flucht schlagen. Alte Diochs dagegen stehen tapfer ihren Mann und weichen selbst viel größeren Vögeln nicht immer aus, doch habe ich nie bemerkt, daß sie die Angreifenden sind. Wenn man nur recht aufmerksam schaut, so ergiebt sich unschwer die Erklärung für mancherlei Vorkommnisse. So ersah ich bald die Ursache der Angabe, daß der Dioch seine kleinen Genossen am Schwanze packen und zappeln lassen soll. Sein Drang nach Beschäftigung findet nämlich in den Käfigen der Händler oder in den Gesellschaftsbauern mancher Liebhaber keine ausreichende Befriedigung, weil es an Baustoffen fehlt und in Ermangelung anderer Dinge greift er einfach nach dem, was sich ihm gerade bietet — nach den Federn seiner Mitgefangenen. Diese Annahme fand ich darin bestätigt, daß Herr Mieth mir ein Geflecht zeigte, welches ein solcher Weber aus den Federn kleinerer Vögel am Gitter hergestellt hatte. In meiner Vogelstube hat niemals ein Dioch den übrigen Bewohnern Federn ausgerissen.

Das Männchen des jüngeren Pares übte sogleich in den ersten Tagen seine Webekünste. Es wählte nicht schwanke, dünne Zweige, sondern eine starke Astgabel. Hier flocht es aus langen, trockenen Grashalmen, nebst Baumwoll- und Bastfäden zunächst einen aufrecht stehenden, zirkelrunden Kranz und diesen füllte es in der Weise aus, daß es eine kugelrunde Wölbung mit einem verhältnißmäßig kleinen, runden Schlupfloch formte. Anfangs saß das Weibchen anscheinend ganz theilnahmlos dabei. Sie waren beide überhaupt sehr schüchtern, und um sich nicht nach unten zu wagen, wo die Baustoffe aufgeschichtet lagen, paßte das Männchen lieber, auf einem hervorragenden Aste sitzend, auf, bis einer der anderen Vögel, gleichviel ob ein großer oder kleiner, mit einem Halm vorüberkam, welchen es dann hurtig dem Träger entriß und damit zu seinem Bau flog. Das ist aber auch die einzige Gewaltthat, welche ich von ihm zu berichten weiß. Als das Nest nahezu fertig war, fing das Weibchen an, eifrig mitzuarbeiten. Die Beobachtung jedoch, daß beide dies gemeinsam thun und einander die Halme zureichen sollen, kann ich nicht bestätigen; jeder holte vielmehr seinen Halm selber herbei und flocht ihn abwechselnd von außen und innen hinein, wobei er hurtig

hin- und herschlüpfte. Auch dürfte die Bezeichnung Weben (und damit Webervogel) nicht ganz richtig sein. Denn das Nest besteht in einem Körbchen, welches mit bewundernswürdiger Kunstfertigkeit, Sorgfalt und Ebenmäßigkeit geflochten ist. Die Halme, Fäden, Baststreifen und Agavefasern sind in staunenswerther Regelmäßigkeit so gelegt und gewunden, daß sie neben und zwischen einander durchlaufen, die Zweige der Astgabel umgeben und das eigentliche kugelrunde Nest frei schwebend bilden. Auch die Blutschnabelweber benutzen am liebsten Agavefasern, doch verschmähen sie allerhand Fäden und Halme nicht, frische Grasblätter aber nehmen sie nur selten. Wollfäden lassen sie jedoch unberührt, wenn sie etwas anderes haben. Beim Nestbau sind die beiden Gatten des Pärchens durchaus nicht zänkisch, freilich auch keineswegs so zärtlich als die Prachtfinken. Das Männchen läßt häufig sein sperlingsartiges, rauhes schäk, schäk, schäk oft erschallen und verfolgt das Weibchen flügelrüttelnd, gleichsam um Gegenliebe bettelnd. Bei Furcht und Erschrecken haben sie einen andern, ebenfalls einsilbigen und sperlingsähnlichen Ruf und der Lockton klingt etwas sanfter, wie täk. Das Nest wird in etwa sieben bis acht Tagen fertig, indem das Männchen früh etwa zwei Stunden und nachmittags eine Stunde daran arbeitet. Zuweilen geht's schneller, manchmal aber auch langsamer vonstatten. Sehr oft aber läßt der Dioch ein Nest unvollendet oder reißt es wieder ein, um ein neues anzufangen und ehe eine Brut wirklich vor sich geht, baut er gewöhnlich eine ganze Anzahl von Nestern mehr oder weniger fertig, bis endlich das Weibchen ein zusagendes wählt. Eine ähnliche Erscheinung finden wir ja, wie schon erwähnt, auch bei fast allen übrigen Webervögeln und dieselbe bedarf wol keiner weitern Erklärung. Das fertige Nest ist kugelrund, mit seitlichem Einflugloch und verhältnißmäßig klein, nur etwa vom Umfange einer starken Mannesfaust. Am schönsten erscheint es blos aus Agavefasern, sehr fest und in allen Theilen gleichmäßig stark, aber so luftig geflochten, daß man die Eier von unten herauf sehen kann. Das Gelege besteht in 3—7 Eiern. Brutdauer 14 Tage.

Als kräftiger, ausdauernder Vogel, welcher sich in der Gefangenschaft gut und lange erhält und selbst die Kälte unsers Winters im ungeheizten Raum ohne Gefahr zu überstehen vermag, ist der Blutschnabel, namentlich allen Anfängern in der Liebhaberei für das kleine fremdländische Prachtgeflügel, zu empfehlen. Wer jedoch Werth auf erfolgreiche Züchtung legt, wird sich meistens getäuscht sehen. Im ganzen ist gerade er bisher wenig gezüchtet worden. Dr. Bodinus schreibt im Jahre 1863 (damals noch in Köln) von einer Brut im dortigen zoologischen Garten. Ebenso hat eine solche Dr. Max Schmidt, Direktor des Frankfurter Gartens geschildert; Dr. Rey giebt an, daß ein Pärchen vorzugsweise Heuhalme verbrauchte und daß jeder Vogel an einem besondern Nest arbeitete. Auch in unzähligen anderen Vogelsammlungen hat der Dioch auf das eifrigste

gebaut, doch bringt er nur ſelten die Jungen wirklich zum Flüggewerden; in den meiſten Fällen kommt es garnicht einmal zum Eierlegen und nur dann, wenn man ein oder beſſer mehrere Pärchen beiſammen ſo hält, daß ſie von größeren Webervögeln, Papageien u. a. ſich nicht behelligt fühlen, darf man auf Erfolge hoffen. Von großer Wichtigkeit für die Züchtung iſt es, darauf zu achten, daß Männchen und Weibchen zu gleicher Zeit brutfähig ſind. Die Verfärbung wechſelt erklärlicherweiſe je nach der Gegend Afrikas, aus welcher der Vogel herſtammt und ſo findet man in den Vogelhandlungen das ganze Jahr hindurch Diochs im Prachtgefieder. Man muß zu einem ſolchen dann immer ein Weibchen mit glänzend wachsgelbem Schnabel wählen. In dem Abſchnitt über Züchtung werde ich in dieſer Hinſicht weitere Erfahrungen und Rathſchläge mittheilen.

Trotz ſeines anſcheinend plumpen und ungeſchlachten Weſens iſt er doch in jeder Bewegung gewandt und zugleich geiſtig begabt. Die Reiſenden berichten, daß die Rothſchnäbel, auf dem Gebüſch ſitzend, ſich plötzlich zum Waſſer ſtürzen, hurtig einen Schluck nehmen, ſchleunigſt davoneilen und dies ſo oft wiederholen, bis der Durſt geſtillt iſt. Dies thun ſie jedoch nur dort, wo ſie vor Raubvögeln immer auf ihrer Hut ſein müſſen. Gleiches kann man in der Vogelſtube beobachten. Während der Dioch anfangs zu dem harmlos-dreiſten Völkchen gehört, wird er, ſobald das Fangbauer im Gange iſt, liſtig und verſchlagen und man kann ſehen, wie er dann mit einemmal daſſelbe Benehmen am Trinknapfe zeigt.

Gut ausgemuſterte Rothſchnäbel ſind in allen Vogelhandlungen, je nach der Jahreszeit, das Pärchen für 4 Mark 50 Pf. bis 7 Mark 50 Pf. zu erhalten. Im Großverkauf, hundertparweiſe preiſen ſie 3, 4½ bis 5 Francs und ſie gehören zu den Vögeln, welche eine Plage der Händler zweiter Hand bilden, indem ſie unter den 100 Pärchen immer die beiweitem größte Mehrzahl ausmachen, ſodaß alſo die koſtbareren Aſtrilde deſto weniger vorhanden ſind.

Der rothſchnäbelige Webervogel heißt auch Dioch, Blutſchnabelweber, Blutſchnabel, Rothſchnabel, blos Webervogel, rothbäuchiger Dioch (Rchb.). — Roſenrother Webervogel, roſenrother Dioch, Roſa-Dioch (Rchb.). — Die Lokalraſſe ohne ſchwarzes Stirnband, alſo der Aethiopiſche Blutſchnabelweber iſt auch Truppweber (Br.) genannt.

Le Travailleur (Vekemans und franzöſiſche Händler); le Travailleur ou Bec de Corail (Vrzn. d. Akkl.-Grt. v. Paris); Red-beaked Weaver-bird (Jamrach u. Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Roodkop-wever (holländiſch). — Quelea (bei den Yolofen und Malegaſſen, nach Fnſch. u. Hrtl.).

Nomenclatur: Loxia sanguinirostris, *L., Gml., Hhn., Lss.;* Emberiza quelea, *L., Gm., Lth., Bchst.;* Passer senegalensis erythrorrhynchus, *Brss.;* Fringilla quelea et Ploceus quelea, *Vll., Lchtst;* Ploceus Lathami, *Smth., Hrtl.;* Ploceus sang., *Gr., Sndvll., Strckl.* et *Sclt., Fnsch.* et *Hrtl.;* Euplectes sang., *Swns.;* Quelea sang., *Bp., Rchb.;* Quelea occidentalis, *Hrtl.;* Hyphantica sang., *Cb.;* Quelea Lathami, *Rchb.* — Ploceus sang., var. aethiopicus, *Sndvll.;* Coccothraustes sang., Quelea orientalis, Q. san-

guinirostris orientalis et Hyphantica aethiopica, *Hgl.;* Euplectes gregarius, Loxia africana et Quelea socia, *Pr. P. v. Wrtmbrg.;* Quelea sang., *Antn.;* Emberiza Quelea, *Lfbr.;* Ploceus sang., *Strckl., Antn., Bnc., Br.;* Ploceus aethiopicus, *Fnsch.* et *Hrtl.* — Moineau à bec rouge du Sénegal et Moineau du Sénegal, *Buff.;* Black-faced Bunting and Red-billed Grosbeak, *Lath.;* le Dioch, le Dioch rose et le Cardinal rose du Sénegal, *Vieill.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb graubraun, jede Feder mit breitem fahlbraunen Seitenſaum; Stirnrand und Zügel, letzterer das Auge oberſeits ſchmal umſäumend, ſowie Kopfſeiten, Kinn und Kehle ſchwarz; Hinterkopf und Hinterhals graubraun; Schwingen tiefbraun, die der erſten Ordnung an der Außenfahne ſchmal orangegelb, die der zweiten Ordnung, ſowie deren Deckfedern, an der Außenfahne ebenfalls ſchmal fahlbraun geſäumt; Schwanzfedern tiefbraun, an der Außenfahne ſchmal orangegelb, an der Innenfahne breiter weißlich gerandet; Vorderkopf blaß roſaroth verwaſchen, ebenſo die Unterkehle; die übrigen unteren Theile fahlweiß, an den Bruſtſeiten graubraun verwaſchen. Auge braun; Schnabel glänzend blutroth; Füße röthlichbraun. Der roſafarbne Anflug, welchen das Männchen natürlich nur im Prachtkleide zeigt, erſtreckt ſich zuweilen viel weiter über die Bruſt und den unteren Körper. — Winterkleid und Weibchen: Oberkopf, Hinterkopf und Hinterhals graulichbraun, übrige Oberſeite roſtbräunlich, jede Feder mit breiter ſchwarzbrauner Schaftmitte, beſonders deutlich auf dem Mantel und auf den Schultern; ein verwaſchener Zügel- und Augenbrauenſtreif fahlroſtweißlich wie Kopfſeiten, Kinn und Oberkehle; vom hintern Augenrande an ein verwaſchener dunkler Strich über die Schläfe herab, ein zweiter, noch mehr verwaſchener, vom Grunde des Unterſchnabels bis zur Ohrgegend; Unterſeite von der Kehle an blaßockerbräunlich bis nahezu reinweiß, dunkel dagegen an den unteren Flügeldecken; an den Bruſt- und Schenkelſeiten einige ſehr verwaſchene dunklere Längsſtriche; Schwingen und Schwanzfedern wie beim Mnch. im Prachtkleide. Schnabel des Männchens roth, des Weibchens zur Niſtzeit glänzend wachsgelb, nachher ebenfalls roth (ſodaß die Geſchlechter im Winterkleide nicht zu unterſcheiden ſind). — Jugendkleid ebenſo, nur iſt die Schaftmitte der Federn an der Oberſeite viel weniger breit und auch heller graubraun, ſodaß das ganze Gefieder fahler erſcheint. Unterſeite dagegen düſterer grau. Zügel-, Augenbrauen- und Schläfenſtreif fehlen; Schnabel röthlichweiß, mit bräunlicher Spitze und Dillenkante des Oberſchnabels; Füße weißlich.

Ploceus sanguinirostris: supra cinereo-fuscus, pluma quaque late luride limbata; margine frontali loris cum stria supra oculum angusta, facie, mento gulaque nigris; occipite et cervice cinereo-fuscis; remigibus fuscis; primoribus exterius anguste aurantio-flavis, secundariis eorumque tectricibus exterius anguste luride limbatis; rectricibus fuscis, exterius anguste aurantiis, interius latius albido-marginatis; sincipite juguloque subroseo indutis; gastraeo reliquo sordide albo; hypochondriis cinereo-fusco-lavatis; iride fusca; rostro nitide sanguineo; pedibus fulvis. — ♂ vest. hiem. et ♀: pileo, occipite et cervice cinerascente fuscis; notaeo reliquo ferrugineo; scapo plumae cujusque medio late nigro, praesertim interscapilii et humerorum; loris striaque superciliari diffusa nec non facie, mento gulaque sordide ochraceis; stria ab oculo usque ad regionem paroticam obscura, stria insequente altera a mandibulae basi usque ad regionem paroticam dilute ochracea; gastraeo ochraceo-albido; tectricibus al. inferioribus obscurioribus; hypochondriis diffuse obscurius striatis; remigibus et rectricibus vesti masculinae magnificae concoloribus; rostro ♂ rubro, ♀ inter nidulandum nitente cereo, dein etiam rubro.

Länge $11_{/8}$ cm. ($4^1/_2$ Z.); Flügel $6{,}5$ cm. ($2^1/_2$ Z.); Schwanz $3{,}5$ cm. ($1^1/_3$ Z.).

Juvenis: itidem pictus, at scapo plumarum superiorum medio multo angustiore cinereo-subfusco; ptilosi tota igitur luridiore; subtus vero obscurior; stria trans lora et supercilia ad tempora currente nulla; rostro rubente albo; maxillae apice gonatoque fuscatis; pedibus albicantibus.

Beschreibung des Eies: Farbe bläulichgrün, fettglänzend; Gestalt ziemlich rund. Länge 18 mm.; Breite 12 mm.

Ovum: sub aeruginosum inunctum, subrotundum.

Der rothköpfige Webervogel [Ploceus érythrops].

Tafel VIII. Vogel 41.

Der allbekannte Rothkopf oder rothköpfige Dioch hat als Stubenvogel eine ebenso interessante als kurze Geschichte. In der wissenschaftlichen Literatur ist äußerst wenig über ihn vorhanden. Eine stichhaltige Beschreibung gab zuerst de Bus im „Bulletin der Akademie von Brüssel" (1855), und Reichenbach, nach ihm Finsch, Hartlaub, v. Heuglin stellten den Vogel als nächsten Verwandten neben den rothschnäbeligen Dioch.

Im Prachtgefieder hat das Männchen einen blutrothen Kopf mit schwärzlichrother Kehle, während der übrige Körper sperlingsgrau ist. In der Größe, wie im ganzen Wesen, Brutgeschäft und selbst in dem rauhen Ruf schäk gleicht es völlig jenem Rothschnabel. Seine Heimat soll sich über den ganzen Westen Afrikas erstrecken.

Im Jahre 1869 erhielt W. Mieth in Berlin zum erstenmal eine Anzahl dieser Weber durch einen Hamburger Zwischenhändler, welcher sie unmittelbar von einem aus Afrika kommenden Schiffe gekauft hatte. Die Vögel waren im grauen Gefieder und wurden trotzdem als neu eingeführte Art mit 24 Mark für das Paar bezahlt. Karl Hagenbeck kannte sie nicht und dasselbe war bei den anderen Großhändlern der Fall. Die Verzeichnisse von Jamrach, Bekemans und des Pariser Akklimatisationsgartens enthielten den rothköpfigen Webervogel noch nicht und im zoologischen Garten von London ist er auch erst seit dem Jahre 1871 vorhanden. Da ihn alle älteren Schriftsteller, welche sich mit dem Leben der Vögel in der Gefangenschaft beschäftigen, von Vieillot bis Bechstein und Bolle nicht erwähnen, so ist die von Mieth erhaltene Gesellschaft wol die erste größere Sendung gewesen, welche nach Europa gelangte. Jedenfalls war er jedoch auch schon früher hin und wieder vorhanden, denn Reichenbach hat ihn nach einem lebenden Exemplar abgebildet und ich erinnere mich auch, ein einzelnes Männchen schon vor mehreren Jahren im zoologischen Garten von Hamburg gesehen zu haben. Nach und nach sind die Rothköpfe nun aber in immer größerer Anzahl auf den Vogelmarkt gekommen, sodaß sie die Handlungen fast beständig aufzuweisen haben und daß sie zu den gemeinsten fremdländischen Stubenvögeln gehören. Der Preis ist dem entsprechend bis auf 6 Mark, ja auf $4{,}_{50}$ Mark für das Par heruntergegangen.

Vorzugsweise interessante Eigenthümlichkeiten hat der Rothkopfweber gerade nicht. Im allgemeinen gelangt er noch weit schwieriger zur erfolgreichen Brut,

als der Blutschnabel und sonderbarerweise sind auch die meisten Männchen keineswegs so fleißige Nesterbauer, als jene. Deshalb hat der Vogel nirgends besondern Beifall gefunden und darin ist auch wol die seltsame Verringerung seines Preises zu erklären, während doch manche andere Arten, trotzdem sie noch viel zahlreicher herübergebracht werden, immerhin, abgesehen von zeitweisem Schwanken, einen gleichen Werth behalten. — Es liegt jedenfalls in einer gewissen persönlichen Feigheit, wenn der Rothkopf in der Regel nicht einmal mit der Errichtung eines Nestes beginnt; er läßt sich eben von jedem andern Vogel, selbst von viel kleineren in die Flucht schlagen. In meiner Vogelstube habe ich im Laufe der Jahre nur zweimal Bruten flügge werden sehen und beobachten können. Bei anderen Züchtern hat der Rothkopf meines Wissens garnicht genistet; er ist vielmehr allenthalben kaum zum Nestbau geschritten. In allen übrigen Eigenschaften stimmt er mit dem rothschnäbeligen Dioch, wie schon gesagt, völlig überein; nur zeigt er sich noch verträglicher und wenn man ihn züchten will, so darf man ihn nur mit kleinen und zarten Prachtfinken u. a. Vögeln zusammen in der Vogelstube beherbergen. Noch eher dürfte man zum Ziel kommen, wenn man ein Männchen mit mehreren Weibchen abgesondert für sich in einem geräumigen Käfige hält.

Der rothköpfige Webervogel heißt auch Rothkopfweber oder blos Rothkopf und Rothkopf-Dioch (Rchb.).

Le Dioch à tète rouge; the Red-headed Weaverbird (fälschlich Red-faced Weaverbird, Vrzn. d. zool. Grt. v. London); Roodkop-wever (holländisch).

Nomenclatur: Ploceus erythrops, Euplectes erythrops, *Hrtl.;* Foudia erythrops, *Bp., Hrtl.*; Quelea capitata, *du Bus;* Quelea erythrops, *Rchb.;* Calyphantria erythrops, *Hne.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Kopf, Gesicht und Hals dunkel blutroth, Kinn und Kehle schwärzlichroth; ganze Oberseite dunkel olivengrünlich braun, jede Feder mit fahlgelbem, breitem Außensaum, welcher an den großen Flügeldeck- und Schwanzfedern am breitesten, an denen des Nackens und Oberrückens am schmalsten ist; ganze Unterseite fahl gelbbräunlichweiß, Bauch und Hinterleib fast reinweiß. Auge dunkelbraun von einem gelblichen Rande umgeben; Schnabel schwarz, an der Wurzel gelblich; Füße fahlröthlich. — Winterkleid: oberhalb fahlbraun, jede Feder gelblich gerandet und mit schwärzlichem Schaftstreif; Augenbrauen- und Backenstreif fahl röthlichorangegelb; unterhalb vom Kinn bis Hinterleib fast reinweiß. Schnabel dunkel horngrau. — Weibchen nicht sicher zu unterscheiden. — Jugendkleid oberhalb dem Winterkleide gleich, doch der Schaftstrich jeder Feder beiweitem schmaler und matter, nur graubraun; unterhalb fahl grauweiß; die röthlichen Augenbrauen- und Backenstreifen fehlen und kommen erst im nächsten Sommer zum Vorschein, während den rothen Kopf das junge Männchen erst im dritten Jahre erhält.

Ploceus erythrops: capite, facie colloque obscure sanguineis, mento gulaque nigricante rubris; notaeo toto subolivaceo-fusco, limbo plumae cujusque exteriore lato, luride flavido, eoque tectricum alar. majorum et rectricum latiore, cervicis dorsique angustiore; gastraeo toto sordide albido, ventre crissoque albo. Iride fusca, subflavo circumcincto; radice rostri nigri flavente; pedibus sordide rubentibus. — ♂ vest. hiem. supra luride fuscus, scapo plumae cujusque flavido-marginatae nigricante, stria superciliari et malari rubido-aurantiis; subtus a mento usque ad ventrem fere albissimus. Rostro obscure corneo. — ♀ vix distincta.

Länge $12,_2$cm. ($4^2/_3$ Z.); Flügel $6,_1$cm. ($2^1/_3$ Z.); Schwanz $3,_3$cm. ($1^1/_4$ Z.).

Juvenis: supra cum vest. hiemali conveniens, sed scapis plumarum multo angustioribus et obsoletioribus, tantum cinereo-fuscis; subtus sordide albidus striis supercilaribus et malaribus rubidis nullis.

Beſchreibung des Eies: Geſtalt rundlich; Farbe grünlichweiß, düſter braun gewölkt. Länge 19mm.; Breite 13mm. (Nach Nehrkorn's Angaben: Geſtalt eiförmig; olivenfarbig; einzelne Eier mit dunkeln Schattirungen. Einige ſehr kleinen Blaukehlcheneiern ähnlich).

Ovum: subrotundum, virente album, fusco-nubilosum.

Der blutköpfige Webervogel [Ploceus haematocéphalus]. Theodor v. Heuglin hat einen naheverwandten Vogel entdeckt, über welchen er folgendes ſagt: „Wir haben nur ein einziges altes Männchen geſehen und eingeſammelt und zwar auf der Tränke an einem Sumpf in Bongo in Zentralafrika, im September des Jahres 1863. Es befand ſich in Geſellſchaft mehrerer anderen Finkenvögel und hatte Gräſerſämereien im Magen. Mit dem weſtafrikaniſchen konnte ich dieſen Bongovogel nicht vergleichen und über die Lebensweiſe des letztern weiß ich auch keine Angaben zu machen. Er muß wol in Zentralafrika ſehr ſelten ſein und nicht geſellſchaftlich leben." Die treffliche Abbildung in dem Reiſewerk des genannten Forſchers zeigt einen Vogel, der von dem vorhin beſchriebenen Rothkopf durchaus verſchieden und ungleich ſchöner iſt. Sein Kopf iſt viel heller roſen- und an der Kehle dunkelroth; der Körper oberhalb heller grau, unterhalb an der Oberbruſt grauweiß, an Unterbruſt und übriger Unterſeite reinweiß, untere Schwanzdecken roſenroth.

(Da übrigens drei Weber mit rothen Köpfen und zwar der Mauritius-Webervogel [P. erythrocephalus], der rothköpfige Webervogel [P. erythrops] und der blutköpfige Webervogel [P. haematocephalus] vorhanden ſind, ſo würden dieſelben bei den weniger bewanderten Liebhabern leicht Irrthümer und Verwechſelungen hervorrufen; allein die letztere Art iſt bisher noch garnicht lebend eingeführt worden, die erſtere Art iſt überaus ſelten und auch leicht zu unterſcheiden; ſomit kommt nur der S. 263 beſchriebene Rothkopf zur Geltung).

Nomenclatur: Hyphantica, Calyphantria et Foudia haematocephala, *Hgl.*; Ploceus haematocephalus, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Der Baya-Webervogel [Ploceus baya],
Tafel VIII. Vogel 42,

Der Manyar-Webervogel [Ploceus manyar],

Der Bengalen-Webervogel [Ploceus bengalensis],

Der gelbbrüſtige Webervogel [Ploceus hypoxanthus].

Wenn man nur den Neſtbau in Betracht zieht, ſo ſtehen dieſe indiſchen Weber unter den übrigen, ja unter allen Stubenvögeln überhaupt hoch obenan. Wol erfreut den Liebhaber das zierlich gerundete Neſt eines Prachtfinkenpärchens, das hübſche Beutelgeflecht eines Feuerwebers, die niedliche offene Mulde eines Sonnenvogels u. a. m.; allein den ſtaunenswerthen, überaus kunſtvollen Schmuck einer Vogelſtube bieten doch erſt die Neſter dieſer Vögel, welche man ſämmtlich

als Bayaweber zu bezeichnen pflegt. Eine Gesellschaft von ihnen kann im Laufe von einigen Monaten dem Flugraum oder einem sehr geräumigen Käfige nicht blos eine dauernde Ausschmückung verleihen, sondern auch eine solche, welche zugleich große praktische Vortheile gewährt, indem diese Webernester für die Prachtfinken u. a. kleine Genossen vortreffliche Nistorte sind.

Die Verbreitung der hierher gehörenden Vogelarten erstreckt sich auf den Kontinent und die Inseln von Ostindien. Nur eine Art kommt auch auf Madagaskar vor. Es sind Zug- oder Strichvögel. In Hinsicht der Lebensweise, Ernährung u. s. w. gleichen sie im allgemeinen den afrikanischen Arten, besonders dem ausführlich besprochenen Blutschnabelweber. Sie nisten gesellschaftsweise, hängen ihre Nester gern an Bäume, welche weithin übers Wasser reichende Zweige haben oder in der Nähe menschlicher Wohnungen stehen. Zuweilen sieht man dieselben auch an den Hütten der Eingeborenen. Als Baustoffe verwenden sie frische Grashalme, Blattrippen, mancherlei Fasern u. drgl. und je nach der Beschaffenheit des Baumaterials sind die Nester von ein und derselben Art sehr verschieden. Nur die Männchen sind die Baumeister, doch betheiligen sie sich an der Brut und Aufzucht der Jungen nicht. Jedes Männchen erbaut wahrscheinlich nur ein Nest, da die Herstellung eines solchen künstlichen und nicht selten auch ziemlich umfangreichen Gebäudes viel Zeit erfordert.

Das Freileben dieser Weber ist von treuen und gewissenhaften Beobachtern ziemlich genau erforscht; mindestens wissen wir über dasselbe viel mehr als über das der meisten afrikanischen Verwandten.

Bevor wir nun auf die Schilderung der Bayaweber näher eingehen, wollen wir die einzelnen Arten wenigstens in einer kurzen Beschreibung den Lesern vor Augen führen. Von vornherein sind sie sämmtlich daran zu erkennen, daß sie im Prachtgefieder eine gelbe Kopfplatte haben, während sie in der Gestalt und Größe so ziemlich mit dem rothschnäbeligen Weber übereinstimmen.

Der eigentliche Baya-Webervogel ist an Ober- und Hinterkopf reingelb, Mantel und Schultern dunkelbraun, jede Feder mit breitem rostfahlen Außensaum; Bürzel und obere Schwanzdecken fahl rostgelb mit schwärzlichen Schaftstrichen; Flügelschwingen und Schwanzfedern dunkel gelblichbraun mit schmalen hellgelben Außensäumen; das ganze Gesicht vom Zügel bis zur Kehle, Hals- und Kopfseiten schwarzbraun; Oberbrust und Seiten fahlbraun, jede Feder mit breitem schwarzen Schaftstrich; Bauchmitte bis Hinterleib graulichweiß. Unterflügel fahl röthlichgelb, untere Schwanzseite aschgrau. Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Füße dunkel fleischfarben.

Der Manyar-Webervogel ist an Ober- und Hinterkopf dottergelb. Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn und Kehle braunschwarz; Ober- und Unter-

seite braun mit dunkleren Schaftstrichen. Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Füße dunkel fleischfarben.

Der Bengalen-Webervogel ist am Oberkopf hochgelb; Backen, Kinn und Oberkehle weiß; ganze Oberseite dunkelbraun, Unterseite grauweiß mit breiter dunkelbrauner Binde über Kropf und Oberbrust. Auge gelbbraun; Schnabel grauweiß; Füße fleischfarben. — Diese beiden letzteren sind ein weniger kleiner als der erste.

Der gelbbrüstige Baya-Webervogel ist an Oberkopf, Hinterkopf und Brust tiefgelb; Kehle hellbraun, Zügel, Kopfseiten, Kinn und Oberkehle braunschwarz; ganze Oberseite olivenbräunlich mit dunkleren Schaftstrichen; Unterbrust und Bauch hochgelb, hintrer Unterleib reinweiß. Auge dunkelbraun; Schnabel schwarzbraun; Füße dunkel fleischfarben. — Dieser letztere hat wiederum die Größe des eigentlichen Bayawebers und beide übertreffen etwas den rothschnäbeligen Weber, auch erscheinen sie dickköpfiger und gedrungener.

Dr. H. A. Bernstein beobachtete den eigentlichen und den gelbbrüstigen Bayaweber auf Java und schreibt über den erstern folgendes: „In der durchschnittlich etwa 502 Meter hoch gelegenen, beiweitem zum größten Theile aus Kulturland bestehenden, hügelreichen Umgegend von Gadok kommt dieser Vogel nur sehr vereinzelt vor, und ich habe daher garkeine Gelegenheit gehabt, ihn im Freien kennen zu lernen. Die einige Meilen von hier entfernten, ausgedehnten Alang-Alang-Wildnisse am nordwestlichen Abhange des Gedéegebirges scheint er dagegen ziemlich häufig zu bewohnen, da ich von dort wiederholt Nester und Eier durch ihn erhalten habe. Auch Junghuhn erwähnt in seinem Werke über Java das öftere Vorkommen des Vogels in den Graswildnissen der etwa 628 Meter hoch liegenden Hochebene von Badong. Mithin scheinen die von zahlreich verschiedenen hohen Gräsern gebildeten, weiten Wildnisse von diesen Vögeln vorzugsweise gern bewohnt zu werden, während die hiesige Kulturgegend ihnen wenig zusagt. Das Nest hat eine birnförmige Gestalt und ist mit seinem schmalen, kaum $2,_6$ cm. dicken, stielförmigen obern Ende an der äußersten Spitze eines Bambuszweiges oder Palmblattes hängend befestigt und zwar so fest, daß selbst ein starker Wind nur selten im Stande ist, es herunterzuwerfen; etwa $15,_7$ cm. unterhalb der Anheftungsstelle wird das Nest breiter und erreicht seinen größten Umfang am untern, gleichsam von zwei Seiten etwas zusammengedrückten Ende, wo sein Durchmesser $15,_7$ cm., bzl. $10,_4$ cm. beträgt. Hier befindet sich der für die Eier und Jungen bestimmte Raum und unmittelbar neben diesem, jedoch durch eine etwa $2,_6$ cm. breite Querwand getrennt, der Eingang, welcher sich in einer ungefähr $5,_2$ cm. bis $10,_5$ cm. langen und $5,_2$ cm. dicken, abwärts gerichteten Röhre fortsetzt. Die ganze Länge des Nestes, von der Anheftungsstelle bis zum Anfange des soeben erwähnten, röhrenförmigen Eingangs, d. h. ohne diesen, beträgt $46,_8$ cm.

Zur Herstellung dieses großen, kunstvollen Nestes benutzen die Vögel ausschließlich feine, schmale Grashalme und deren Blätter, welche so genau und sorgfältig unter einander verflochten werden, daß dadurch das Ganze ein sehr regelmäßiges, glattes, gefälliges Aeußere erhält. Dieser feste Bau hat Veranlassung gegeben zu der malayischen Sage, daß derjenige, welcher so glücklich ist, eins dieser Nester so aus einander zu nehmen, daß dabei keiner der dasselbe zusammensetzenden Halme bricht, in seinem Innern eine goldne Kugel findet. Es ist natürlich noch Niemandem geglückt, diese Aufgabe zu lösen und sich den Preis zu verdienen. Die meisten der in meinen Besitz gekommenen Nester enthielten drei bis vier, bisweilen auch nur zwei reinweiße, etwas längliche Eier. — Von verschiedenen Seiten ist mir versichert worden, daß das Männchen ein besondres Nest hat, welches sich von dem soeben beschriebenen, für das Weibchen und die Jungen bestimmten dadurch unterscheidet, daß es unten offen ist und nur einen Quersitz hat, auf dem das Männchen bei Nacht oder auch bei Tage, um auszuruhen, sich niederläßt. Ich habe indessen bis jetzt noch kein solches Nest erhalten und kann daher aus eigener Anschauung ebensowenig etwas darüber mittheilen, als über die von anderen Beobachtern gemachte Angabe, daß der Vogel das Nest bei Nacht durch einen auf ein Stückchen Lehm geklebten Leuchtkäfer erhellen soll."

In dem „Katalog des Museum der ostindischen Kompagnie" (herausgegeben von Th. Horsfield und Fr. Moore) sind die Angaben der hervorragendsten Schriftsteller über den Nestbau dieses Vogels zusammengefaßt, und ich entlehne aus denselben noch das Nachstehende: Sundevall hat ihn bei Kalkutta vor dem April nicht gesehen und hält ihn daher für einen Wandervogel. In diesem Monat erscheinen dort ganze Scharen und beginnen ihre Nester zu bauen. Dieselben hängen sehr geschickt an den großen Palmenblättern und sind gewöhnlich aus groben Gräsern in der Gestalt eines Geldbeutels hergestellt, 33,9 bis 36,5 cm. lang und am untern Theile 18,3 cm. breit, nach oben zu immer schmäler werdend bis zu einer Dicke von 5,2 cm.; äußerlich glatt, sind sie fest und dicht. Am untersten Theile befindet sich eine kreisförmige Höhlung von 13 cm. Durchmesser mit einer gleichen cylinderförmigen Röhre zum Einschlüpfen. Der Bau des Nestes beginnt von oben herab, sodaß also die Höhlung zuletzt fertig wird. Wenn es halb fertig ist und nur noch der Boden fehlt, wird eine Wand quer hindurch gezogen; folglich hat das Nest zwei ausgeweitete Räume am untern Theile, den einen als die Nestmulde für die Eier und den andern als Eingang. Man nimmt an, daß nur die Männchen mit der Erbauung der Nester sich beschäftigen und dies scheint auch wirklich der Fall zu sein, denn ich schoß von einem halb vollendeten Nest ein solches herunter, während ich geglaubt hatte, es sei ein Weibchen. Oft sind zwei bis drei Nester an ein Blatt gehängt und an einer Palme befinden sich dann wol zwanzig bis dreißig derselben. Zu Anfang des Monats

Mai erlangte ich soeben ausgebrütete Junge und aus einem andern Nest drei ganz weiße Eier, obgleich viele Nester erst halb fertig waren. Die Locktöne dieser Weber gleichen denen anderer Finken und einen Gesang habe ich nicht gehört. Im Magen der erlegten Vögel fand ich Reis, an welchem sie vielen Schaden verursachen. Sie umschwärmen, wie bei uns die Sperlinge, die Hütten der Eingeborenen.

Der Missionär Phillips sagt, daß die Bayaweber, wenn sie mit dem Beginn der Regenzeit in der Umgegend von Muttra nisten, vorzugsweise die arabischen Mimosen (Babul), welche ihrer furchtbaren Dornen wegen für jeden Nesträuber unnahbar sind, für ihre Bauten wählen; nur wo Palmen vorhanden sind, geben sie diesen stets den Vorzug. Das Nest wird dann an den äußersten, natürlich unerreichbaren Spitzen der Blätter befestigt. Die Herstellung des Nestes beschreibt er in ähnlicher Weise als Sundewall, nur bemerkt er ausdrücklich, daß auch dieser Weber (also ganz ebenso wie der Blutschnabel) mit einem Ringe oder Reif beginnt. In der Regel wird von oben herab zu bauen angefangen, doch giebt es auch Ausnahmefälle. Die Arbeit geht nicht schnell von statten, und die ganze Sorgfalt des Vogels scheint sich einerseits auf die richtige Gestalt des Nestes und andrerseits darauf zu erstrecken, daß es wasserdicht ist. In der That kann es aber auch kaum eine bessere Nestform für einen in der Regenzeit nistenden Vogel geben, als die dieser Webervögel. Uebrigens warten sie mit dem Nestbau zuweilen einen Monat nach den ersten Regenschauern, bis der stärkste Regen vorüber ist. Oft hüpft einer auf das Nest des andern und beschaut dasselbe; niemals aber wird er Baustoffe rauben. Manchmal wirft sehr heftiger Wind wol ein Nest herunter, weil es nicht genug befestigt worden. Der Baya ist so dreist, daß man unter dem Baume stehen darf, ohne daß er sich bei der eifrigen Arbeit stören läßt.

Auch Blyth berichtet, daß die Bayas Fächerpalmen und zwar besonders in der Nähe menschlicher Wohnungen lieben, doch solche Bäume vermeiden, an deren Blättern die Palmensegler (Cypselus palmarum) wohnen; nur selten findet man auf einem Baume die Nester dieser und jener zugleich. Sykes fügt hinzu, daß es nur wenige von Bäumen überragte Brunnen giebt, über denen die Nester der Bayaweber nicht zu finden sind. Die Vögel leben hier in kleinen Gesellschaften und lärmen bei ihren Arbeiten viel. In der Zeit, wenn die Grassämereien reifen, gesellen sie sich zu großen Scharen, auch mit anderen Finken, oder mit Sperlingen zusammen. Im Magen erlegter Bayas fand er außer den Gräsersämereien auch Theile von Feigen. Ebenso beobachtete sie Jerdon in Schwärmen, besonders in den Waldgegenden, nistend aber fast immer in der Nähe des Wassers.

„Auf der Insel Ceylon", schreibt Layard, „ist dieser Weber überall verbreitet und hier lebt er als Zugvogel. Er brütet im Juni und baut hängende

Nester. Das Männchen errichtet auch ein Nest für sich, welches sich von dem eigentlichen Brutnest des Weibchens dadurch unterscheidet, daß es keine lange Einflugröhre und keine Nistmulde hat, sondern unten ganz offen ist, sodaß die Entleerungen des Vogels zur Erde fallen." (Der letztere Bau bildet also nur eine Kuppel oder Glocke, welche querdurch in der Mitte einen wagerechten, geflochtenen oder gedrehten Strang hat, auf welchem das Männchen während der Nacht oder vor starkem Regen oder glühenden Sonnenstrahlen, Zuflucht suchend, sitzt).

Der letztgenannte Forscher, sowie andere Reisende geben an, daß in jedem Webervogelnest ein Klumpen von Lehm- oder Thonmasse sich befinde, welcher, nach der Meinung der Eingeborenen, den Zweck hat, daß das Männchen Feuerfliegen oder Leuchtkäfer daran befestige, um zur Nacht das Nest zu erhellen. „Ich habe", sagt er, „dies niemals beobachtet, aber auch nicht ein einziges Nest der Männchen untersucht, an welchem nicht zu beiden Seiten der Sitzstelle ein Klümpchen Lehm angebracht gewesen. Wozu dient dasselbe? Sicherlich nicht zur Befestigung des Baues." Jerdon fand in einem solchen Neste an mehreren Stellen vertheilt gegen 3 Unzen Lehm; Bernstein dagegen bemerkt über diese Erscheinung nichts. Man hat sich vielfach den Kopf darüber zerbrochen, welches Bewenden es mit derselben haben könne. Die verschiedensten Erklärungen, welche man zu geben sich bemüht, klingen sämmtlich nicht stichhaltig, namentlich aber nicht die, daß die Lehmmasse den Zweck haben solle, das Nest im Gleichgewicht zu erhalten.

Ueber den gelbbrüstigen Bayaweber berichtet Bernstein ebenfalls: „Von den Eingeborenen des westlichen Java wird dieser von dem eigentlichen Bayaweber nicht bestimmt unterschieden. Er hält sich besonders in den niedrigen, sumpfigen Küstengegenden auf und kommt im Innern des Landes oder in hochgelegenen trockenen Gegenden nie vor. Hierin weicht seine Lebensweise von der des andern durchaus ab. Das $10{,}_5$ bis $13^{cm.}$ hohe und $5{,}_2$ bis $7_{/8}^{cm.}$ breite, mit einem seitlichen Eingange versehene Nest ist viel kleiner, als das des Bayawebers, auch nicht hängend, sondern ähnlich denen mancher Rohrsänger, an welche es auch in der Bauart erinnert, zwischen einigen Schilf- und Binsenstengeln und Zweigen der Sumpfpflanzen befestigt. Die aus den Morästen der Umgegend von Batavia erhaltenen sind ausschließlich aus den schmalen Blättern verschiedener Sumpfgewächse, besonders aber aus mancherlei Gräsern, hergestellt und enthalten 2 bis 3 Eier." Auch Blyth beschreibt das Nest dieses Webers als nicht hängend oder schwebend ohne den röhrenartigen Eingang, dem des Bayawebers ähnlich und im Schilf stehend. — Nach Jerdon's Angaben ist das Nest des Bengalenwebers ganz ähnlich gebaut.

Das sind, übersichtlich zusammengefaßt, alle Mittheilungen, welche die reisenden Naturforscher inbetreff des Freilebens dieser vier Webervogelarten gemacht

haben. Auch ihre Männchen verfärben sich mit dem Beginn der Brutzeit zum Prachtgefieder, indem sie gelbe Kopfplatten und die verschiedenen Abzeichen ihrer Art erhalten, während sie im Winterkleide ebenso wie die Weibchen schlicht sperlingsgrau sind. Nach Blyth tritt die Färbung zum Hochzeitskleide im Monat März ein. Die Heimat des Bayawebers erstreckt sich über ganz Indien nebst den Inseln Java, Ceylon und Malakka. Etwas weniger verbreitet dürfte der Manyarweber sein, indem er im ganzen nördlichen Indien, besonders in Kochinchina und auf Java gefunden ist. Der Bengalenweber ist auf den Südosten Indiens beschränkt. Der gelbbrüstige Bayaweber ist bis jetzt nur auf den Inseln Java und Sumatra beobachtet worden.

Diese vier Arten, welche unter dem Namen Bayaweber in den Handel kommen und dann gewöhnlich garnicht unterschieden werden, gehören zweifellos zu den interessantesten Gästen der Vogelstube, einerseits sind sie nämlich nicht unschön, wenigstens hübscher als ihre nächsten Verwandten, andrerseits zeigen sie sich durchaus friedlich und dritterseits errichten sie auch in der Gefangenschaft wahre Pracht- und Wunderbauten. Umsomehr ist es zu bedauern, daß sie im Handel doch recht selten sind und daher in so hohen Preisen stehen, wie dies in Anbetracht ihrer doch nicht gerade hervorragenden Farbenschönheit sonst nicht der Fall sein würde. Herr Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. in Wittstock schrieb in der „Gefiederten Welt" über eine im November 1873 stattgehabte Einführung dieser Webervögel in größrer Anzahl folgendes: „Fräulein Christiane Hagenbeck, die jetzt einem Zweige des allbekannten Weltgeschäfts in Hamburg, dem An- und Verkauf fremdländischer Vögel, selbstständig vorsteht, hat es endlich ermöglicht, nach langem, eifrigem Bemühen indische Weber, welche sogar den meisten europäischen Museen fehlen, zu erhalten. Ich habe die Vögel, welche theils im Prachtgefieder, theils im Winterkleide sich befinden, in Augenschein genommen und einige Pare zur Beobachtung empfangen. Unter Vergleichung mit den betreffenden ausgestopften Exemplaren des zoologischen Museums von Berlin und unter Zuhilfenahme der besten Hand- und Lehrbücher habe ich sie festgestellt als Manyar-, Bengalen- und gelbbrüstige Bayaweber. Mir ist kein Fall früherer Einführung dieser Webervögel bekannt, und mit Sicherheit glaube ich behaupten zu dürfen, daß sie in der Gefangenschaft in Europa noch nicht erforscht sind." Hieran will ich nun die Darlegung meiner persönlichen Erfahrungen reihen. Herr Schneider hatte darin recht, daß der weißbäckige Bengalen- und der gelbbrüstige Bayaweber bis dahin wol kaum lebend eingeführt worden, während der eigentliche Bayaweber und der Manyarweber, wenn auch nur selten, so doch von Zeit zu Zeit und in einzelnen Pärchen vorhanden gewesen. Das Verzeichniß des zoologischen Gartens von London führt nur den Manyarweber auf, Jamrach's Liste enthält nur den eigentlichen Bayaweber,

das Verzeichniß des Akklimatisationsgartens von Paris nur den Manyar- und Bekemans' Liste zeigt garkeinen dieser Webervögel; das Verzeichniß des Rotterdam'schen Gartens dagegen hat drei Arten aufzuweisen. Schon hieraus erhellt, wie überaus selten sie zu haben sind. Im Laufe der Jahre erhielt ich den Baya- und den Manyarweber wol hin und wieder, jedoch meistens nur in einzelnen Exemplaren und fast regelmäßig todtkrank von den Anstrengungen der Reise her. Während nun aber Manyar-, Bengalen- und gelbbrüstiger Baya neuerdings bei den Großhändlern alljährlich verkäuflich gewesen, gehört der eigentliche Baya noch immer zu den allerseltensten Erscheinungen des Vogelmarktes. Ein Pärchen wurde mir im Jahre 1874 von Herrn Direktor Bekemans gesandt; seitdem hat sie Fräulein Hagenbeck nur hin und wieder einzeln erhalten. Eine Reihe von Jahren hindurch habe ich alle vier Arten in der Vogelstube beherbergt und gleichviel, ob sie in Pärchen oder nur in einzelnen Männchen vorhanden waren, immer haben sie mit großem Eifer ihre kunstvollen Nester gebaut. Im allgemeinen dürfte feststehen, daß bei allen diesen Webern die Weibchen ungleich weichlicher sind, als die Männchen; erstere sind durch alle Vogelhandlungen kaum zu erhalten, die letzteren hingegen werden doch wenigstens zeitweise angeboten und, wenn man einige Pärchen kauft, die soeben angekommen und von den Reisebeschwerden noch krankhaft sind, so sterben fast immer die Weibchen; die Männchen dagegen, die sich viel eher erholen, zeigen sich dann nach der Eingewöhnung auch ungemein ausdauernd. Man kann sie wie die Blutschnäbel viele Jahre hindurch ebensowol im Käfige als auch in der Vogelstube halten und sie verlieren weder ihre Munterkeit, noch ihre Arbeitslust; nur muß man sie zuweilen herausfangen, um ihnen die zu lang werdenden Krallen an den Füßen zu verstutzen. Sie gehören zu den verträglichsten, harmlosen Vögeln, und ihr rauhes, fortwährend erschallendes schäk, schäk, schäk dürfte die einzige üble Eigenschaft sein, welche sie dem Vogelfreunde verleiden könnte. Ihr Liebesspiel gleicht dem des Blutschnabels ebenfalls und besteht also nur darin, daß sie flügelrüttelnd das Weibchen verfolgen und langgezogene, heisere und zischende Laute ertönen lassen.

Die in der Vogelstube erbauten Nester weichen im allgemeinen von den in der Freiheit hergestellten nur insofern ab, als die fremden Baustoffe und die veränderten Verhältnisse solches bedingen. Während sie regelmäßig die Umrisse derselben erkennen lassen, hängen sie doch nur selten an einem sehr langen, gedrehten Bande herab und gewöhnlich haben sie keine Flugröhre. Von allen Baustoffen wählen auch diese Weber am liebsten Aloë- oder Agavefasern, und einerseits dies kräftigere, härtere Material, und andrerseits der Umstand, daß in der Vogelstube ein rauschender Fluß oder ein wassergefüllter Abgrund nicht vorhanden ist, begründen es wol, daß die Weber die in jener Nestgestalt sich zeigende

Vorsichtsmaßregel hier meistens als überflüssig erachten. Andere sehr mannigfaltig dargebotene Neststoffe nehmen sie garnicht, obwol auch frische, sowie trockene Gräser, Kokos- und Bastfasern u. drgl. gegeben werden. Dagegen habe ich beobachtet, daß die Männchen einunddersselben Art blos aus den Agavefasern abwechselnd verschiedenartige Nester erbauen.

Eine Anzahl der von diesen Webern in der Vogelstube hergestellten Nester werde ich in dem Theile dieses Werkes, welcher von der Vogelzucht handelt, beschreiben und in Abbildungen bringen. Hier sei nur bemerkt, daß diese von den Vögeln in der Gefangenschaft gefertigten Nester*) wirklich großes Interesse erregen und daß es sich daher wol verlohnt, derartige Künstler zu beherbergen. Zugleich sei ausdrücklich hervorgehoben, daß dieselben ihre Kunstbauten sehr emsig anfertigen, auch wenn man nur die Männchen allein halten kann. Der Versuch, den vielen ledigen Männchen in meiner Vogelstube Weibchen des Blutschnabelwebers zum Ersatz für die fehlenden eigenen zu bieten, hat bis jetzt zu keinem Ergebniß geführt. Dagegen glaube ich doch behaupten zu dürfen, daß die Anwesenheit dieser verwandten Weibchen jene Künstler zu bedeutenderem Eifer anspornt.

Die Brutentwickelung geht in der beim Blutschnabelweber beschriebnen Weise vor sich. Das Jugendkleid des Bayawebers gleicht dem des alten Weibchens, nur sind die Schaftstriche kaum bemerkbar, sodaß also der junge Vogel fahler braun mit grauem Ton des Gefieders erscheint. — Außer diesen wurden in meiner Vogelstube zunächst junge Bengalenweber flügge, doch konnte ich keinen Unterschied zwischen ihnen und den alten Weibchen erkennen. Dann brachten auch die Manyarweber drei Junge zum Ausfliegen. Die Beobachtung aller dieser Bruten ist aber recht schwierig. Ich hatte eine Gesellschaft von 18 Köpfen aller vier Arten beisammen, unter ihnen nur Weibchen vom Baya- und Bengalenweber, sowie dabei einige Weibchen des Blutschnabelwebers. Während nun die Männchen überall in der Vogelstube, namentlich in einer Fensterecke, überaus eifrig ihre Nester bauten, konnte ich wol bemerken, daß alle Weibchen und übrigens auch andere Vögel, insbesondre Prachtfinken, in den Nestern aus- und einschlüpften; selbst die Vergnügungsnester blieben nicht unbewohnt; der Maskenweber baute vorzugsweise gern seine retortenförmigen Gebilde in dieselben hinein und selbst manche Prachtfinken benutzten sie zur Anlage ihrer Brutstätten. Wenn ich aber von Zeit zu Zeit in den eigentlichen Webernestern nachsah, so fand ich doch meistens nur die kleinen weißen Eier der Prachtfinken, hier und da ein grünlichblaues vom

*) Die aus meiner Vogelstube entnommenen Webervogelnester fanden auf den Ausstellungen der Geflügel- und Vogelliebhaber-Vereine von Wien, Düsseldorf, Halle, Berlin, London u. a. nicht allein die lebhafteste Theilnahme der Beschauer, sondern sie wurden auch durch Prämien vonseiten der Preisrichter ausgezeichnet.

Blutschnabel, ein blaues vom dottergelben Weber und nur ganz selten ein größres reinweißes oder zart bespritztes von den Bayawebern. Auch die größte Aufmerksamkeit führte mich im letztern Fall kaum zum guten Ergebniß, denn anstatt der gehofften Brutentwicklung sah ich nichts, da das Ei fast regelmäßig wieder verschwand oder im Kampf und Streit herausgeworfen am Boden lag. Erst dann, als ich die Gesellschaft bedeutend verringert hatte, sodaß für die vielen vorhandenen Nester nur verhältnißmäßig wenige Bewohner zurückblieben, kam es zu einigen Bruten, die jedoch so versteckt vonstatten gingen, daß sie kaum der Beobachtung zugänglich waren.

Bei eingehender Untersuchung der zahlreichen Nester in der Vogelstube zeigte sich zunächst jene sonst an den Seiten angeklebte Masse garnicht. Ich hatte, um der Sache auf den Grund zu kommen, diesen Webern feuchten Lehm, sowie auch Moorerde geboten, ohne daß sie, trotz der sehr eifrigen Arbeit an den Nestern, davon Gebrauch machten. Nachdem ich sodann die lange vorhanden gewesene, mehrmals ersetzte und allmälig schmutzig gewordene Lehmmasse hinausgeworfen, fand ich schließlich zu meiner Ueberraschung doch, daß ein alter kräftiger Bayaweber, welcher ein kolossales Brutnest und daneben ein ebenfalls sehr großes Vergnügungsnest errichtet, in diesem letztern zu beiden Seiten jene Klümpchen angebracht hatte; in Ermangelung von Lehm, Thon oder Moorerde hat er dazu theils aufgeweichtes Eierbrot, wie es zur Fütterung verabreicht wird, theils die Entleerungen größerer Vögel benutzt. Dies geschah späterhin mehrmals, und in der Sendung von Webernestern, welche ich zur Londoner Ausstellung schickte, befand sich ebenfalls eins vom Baya mit jenen Klumpen. Dasselbe ist nebst vielen anderen in meiner Sammlung vorhanden.

In der Fütterung und Verpflegung, sowie in allem übrigen wolle man für die Bayaweber das beim Dioch Gesagte als maßgebend erachten, doch fressen sie auch sehr gern allerlei Früchte und namentlich Weintrauben, und eine Zugabe derselben dürfte zur Erhaltung ihrer Gesundheit daher wol nöthig sein. Beim Eierbrot sind sie unliebsame Gäste, denn sie verzehren dasselbe nicht allein, sondern verbrauchen es auch, wie erwähnt, für ihre Nester. Der Preis ist, wie schon erwähnt, verhältnißmäßig hoch; man kann selten ein Pärchen unter 24 Mark kaufen und gewöhnlich kostet es 30 Mark.

Der Baya-Webervogel oder eigentliche Bayaweber wird auch blos Baya, sowie Baya-Relikurvi oder Ammerweber (Rchb.) genannt. — Le Tisserin Baya; Baya Weaver-Bird; Common Weaver-Bird (Jamrach); Gewone Wever (holländisch).

Nomenclatur: Ploceus Baya, *Blth., Jerd., Bp., Cl.;* Pl. atrigula, *Hdgs., Gr.;* Pl. philippinus, *Sks., Jerd., Blth., Strckl., Tckll., Bp., Lrd., Tltr., Brg.;* Loxia philippina, *Hmlt;* Euplectes flaviceps, *Hdgs.;* Fringilla bengalensis, *Sndvll.* — Baya in Hindostan *(Hamilton, Jerdon, Blyth);* Chindora und Tal Babie *(Blth.)* und Bawi *(Hmlt., Sundevall)* in Bengalen; Tsa-bo-toung *(Blth.)* in Arrakan; Tokanam Cooroola *(Layard)* Cingalese; Manuk manjar *(Bernstein)* auf Java.

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 266. — Jugendkleid ſ. S. 273.

Ploceus baya: pileo et occipite flavis, interscapilio humerisque fuscis, plumis singulis late ferrugineo-limbatis; uropygio et supracaudalibus luride ferrugineis, nigro-striolatis; remigibus rectricibusque obscure ferrugineis, exterius flavido-submarginatis; facie a loris usque ad gulam, lateribusque colli capitisque nigro-fuscis; pectore et hypochondriis luride fuscis, late nigro-striolatis; abdomine sordide albo, subalaribus luride fulvis; infracaudalibus cinereis; iride fusca; rostro nigro; pedibus obscure carneis.

Juvenis: femellae adultae simillimus, at scapis plumarum vix obscurioribus, quare omnino luride subfusco-cinereus.

Beſchreibung des Eies: Farbe reinweiß, Geſtalt ſehr rund, Schale ſehr glatt, mit tiefen, nicht dicht ſtehenden Poren, ohne allen Glanz; Länge 20 bis 21 mm., Breite 14 mm. (nach Nehrkorn's Angaben Länge 20 mm., Breite 15 mm.).

Ovum: albissimum, rotundum, laevissimum, parce at profunde porosum, pacum.

Der Manyar-Webervogel, Manyarweber oder blos Manyar, heißt bei Rchb. gelbköpfiger oder geſtrichelter Ammerweber oder Nelikurvi — Le Tisserin Manyar (Vrzchn. d. Akkl.-Grt. v. Paris); Manyar Weaver-Bird (Vrzchn. d. zool. Grt. v. London); Tamboer (holländiſch).

Nomenclatur: Fringilla Manyar, *Hrsf., Lth.;* Ploceus Manyar, *Hrsf., Mc. Cl., Strckl., Blth., Gr., Jerd., Lrd., Ttlr.;* Pl. flaviceps, *Cv., Bp.;* Pl. striatus, *Blth.;* Euplectes flaviceps, *Sws.;* Eupl. bengalensis, *Jerd.* — Manyar auf Java (*Horsfield);* Telia Baya in Bengalen *(Blth.)*; Brahminee Baya *(Jerd.)*; Bamani Baya in Hindoſtan.

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 266.

Ploceus manyar: supra subtusque fuscus striis scaporum obscurioribus; pileo et occipite vitellinis; loris, capitis collique lateribus, mento gulaque fusco-nigris; iride fusca; rostro nigro; pedibus obscure carneis.

Der Bengalen-Webervogel, Bengalenweber, auch bengaliſcher Bayaweber, indiſcher Gelbkopfweber (Hagenbeck), wird von Rchb. bengaliſcher Nelikurvi oder Ammerweber und Bengaliſt genannt. — Le Tisserin de Bengale; Bengal Weaver-Bird.

Nomenclatur: Loxia bengalensis, *L., Lth., Hmlt.;* Ploceus bengalensis, *Blth., Gr., Ttlr., Bp.;* Pl. aureus, *Lss.*; Loxia regina, *Bddrt.;* Coccothraustes chrysocephala, *Lss.*; Euplectes albirostris, *Sws.;* Eupl. flavigula, *Hdgs.* — [Le Grosbec des Indes, *Buff.;* the Bengal Sparrow, *Albin;* Yellow Indian Sparrow, *Edw.*]. — Sarbo Baya in Hindoſtan *(Hmlt.* und *Blth.)*; Shore Baya und Kantawala in Bengalen (*Blth.).*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 267.

Ploceus bengalensis: supra fuscus; pileo luteo; genis, mento gulaque albis; subtus canus fascia lata juguli pectorisque fusca; iride ferruginea; rostro sordide albo; pedibus carneis.

Der gelbbrüſtige Baya-Webervogel oder braunhalſiger Bayaweber, wird von Rchb. gelbbäuchiger Kernbeißerweber genannt. — Le Tisserin Baya à cou brun; Brown-necked Baya Weaver-Bird; Javaansche Wever (holländiſch).

Nomenclatur: Loxia hypoxantha, *Ddn., Sprrm.;* Ploceus hypoxanthus, *Blth., Bp., Cb.;* Pl. philippinus, *Strckl.;* Fringilla philippina, *Hrsf.;* Loxia philippina, *Rffl.* — Manyar Kembang auf Java *(Hrsf.);* Tampooa bei den Malayen und Pintau auf Sumatra (beides nach *Raffles*); Manuk manjar auf Java *(Bernstein).*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 267.

Ploceus hypoxanthus: supra olivaceo-fuscatus striis scaporum obscurioribus; pileo occipiteque luteis, gula brunnea; loris, capitis lateribus, mento gulaque fusco-nigris; pectore abdomineque luteis; crisso albo; iride fusca; rostro e nigro fusco; pedibus obscure carneis.

Beschreibung des Eies: auf schmutzigweißem, bisweilen ins Graulichte übergehendem Grunde mit einer größern oder geringern Anzahl grauer oder bräunlichgrauer kleiner Flecken gesprenkelt. (Diese sind manchmal wenig deutlich und sehen dann wie ausgebleicht oder verwaschen aus. Je mehr dies der Fall ist, d. h. je undeutlicher die Flecken sind, umsomehr verschwimmt die Grundfarbe in Grau und umgekehrt ist sie desto weißer, je deutlicher und schärfer begrenzt die Flecke erscheinen. Brnst.) Länge 18 bis 20 mm., Breite 14 mm.

Ovum: sordide album, interdum in cineraceum vergens maculis parvulis plus minus numerosis cinereis vel subfuscis, nonnumquam obsoletissimis, quadere ovum mox canius, mox albius pictum.

Der olivengrüne Paya-Webervogel [Ploceus pensilis]. Auf der Insel Madagaskar giebt es eine nahverwandte Art, welche jedoch bis jetzt noch nicht lebend eingeführt ist, trotzdem in den letzteren Jahren gerade die Vögel jener Insel in unseren Sammlungen häufiger und zahlreicher als jemals erscheinen; so z. B. der grauköpfige Zwergpapagei, welcher, bis dahin zu den seltensten Stubenvögeln gehörend, gegenwärtig einer der gewöhnlichsten ist. Der olivengrüne Weber muß wol in seiner Heimat in überaus geringer Anzahl vorkommen, denn er fehlt den meisten zoologischen Museen. Er ist ein schlicht olivengrün gefärbter Vogel mit schwarzem Oberkopf und Hals, der also keine besondre Schönheit zeigt, sich aber durch ein vorzugsweise kunstfertiges, retortenförmiges Nest auszeichnet. Die Nester werden gesellig zu 5 bis 100 Stück an einem Baume hängend erbaut. Sollte dieser Weber vor der Beendigung meines Werkes noch lebend eingeführt werden, so lasse ich im Anhange seine eingehende Beschreibung nebst Abbildung folgen, andernfalls genügt wol die Erwähnung. — Loxia pensilis, *Gml.*; L. nelicurvi, *Scp.*; Ploceus nelicurvi, *Gr.*; Nelicurvius pensilis, *Bp.*, *Hrtl.*, *Rchb.* — Le Nelicourvi de Madagascar, *Snn.*

Die eigentlichen Sperlings-Webervögel.

(**Der Mahali-Sperlingsweber** [Ploceus mahali], **der Augenbrauen-Sperlingsweber** [P. superciliosus], **der schwarzschnäbelige Sperlingsweber** [P. melanorrhynchus], **der bärtige Sperlingsweber** [P. pectoralis], sämmtlich auch Mahaliweber genannt).

Diese schlicht gefärbten, wenig ansehnlichen Vögel, von etwas beträchtlicherer Größe als der Haussperling, kommen zeitweise in den Handel, ohne daß sie eine besondre Beachtung finden. Auch sind sie fast immer nur in einzelnen Exemplaren vorhanden, sodaß man Versuche mit ihrer wahrscheinlich überaus interessanten Züchtung nicht anstellen kann. Ich sah die erste und zweite Art im Laufe der Jahre hin und wieder im Berliner Aquarium und ein Männchen der dritten Art lebt noch gegenwärtig dort. In gleicher Weise mögen diese Vögel bisher mehrfach eingeführt sein, ohne daß die Händler sie gekannt und recht beachtet haben, wie dies bei unansehnlichen Vögeln nicht selten der Fall ist, indem man sie fortgiebt, ohne sich um ihre Eigenthümlichkeiten zu bekümmern. Ob man ein Recht dazu hat, sie zu den Webern mitzuzählen, erscheint mir fraglich, da es jedoch von allen Systematikern geschieht, so muß auch ich es thun. Jedenfalls bilden sie

aber ein Mittelglied zwischen den zuletzt beschriebenen eigentlichen Webervögeln und den Sperlingen.

Der Mahali-Sperlingsweber, als der bekannteste, sei zunächst geschildert. Er ist an der ganzen Oberseite hellbraun; Oberkopf dunkelbraun, an jeder Seite der Stirn, vom braunen Zügel bis zu den Schläfen ein breiter, weißer Streif; Kopfseiten braun, am hellbraunen Halse von einem schwärzlichen Streifen begrenzt; Flügeldecken, Schwingen und obere Schwanzseite dunkel grünlichbraun, jede Feder mit fahlem Außensaum, über jedem Flügel zwei breite, weiße Querbinden. Seine Verbreitung soll sich vom Süden aus über einen Theil des Westens von Afrika erstrecken. Inbetreff seines Freilebens ist wenig bekannt. Smith fand die Nester kolonienweise zu zwanzig bis dreißig beisammen auf einem Baum, von außen aus Gräsern geflochten, deren Halmenenden mehr als daumenbreit hervorragten, sodaß ein solcher Bau mit einem Stachelschwein Aehnlichkeit hat, dessen Stacheln aufrecht gesträubt sind. In Hinsicht der Lebensweise erscheinen die Vögel als Weber, während sie in Färbung und Zeichnung Sperlingen gleichen. Ayres bestätigt im allgemeinen diese Angaben und ergänzt sie noch in folgendem: „Die auf unserm Ausfluge nach Limpopo gefundenen Nester, welche sehr roh aus Grashalmen mit herausstehenden Spitzen geformt waren, von retortenartiger Gestalt und mit zwei kurzen, von unten heraufführenden Eingangsröhren, zeigen zwischen diesen eine so flache Nistmulde, daß die Eier zweifellos herausgeworfen werden müssen, wenn der Wind die oft an den äußersten Zweigspitzen befindlichen Nester hin- und herschaukelt. Der Vogel ist in waldigen Gegenden überaus häufig, während ich ihn im offenen Lande nicht gefunden habe."

Der Augenbrauen-Sperlingsweber ist oberhalb röthlichbraungrau, unterhalb weißlichgrau; Augenbrauen, Streifchen unter dem Auge und Kehle weiß, Schnurrbart parallel absteigend, unterwärts breiter und buchtig, Oberkopf und Wangen kastanienbraun. Flügeldecken-Unterwand weiß, Außenwand der Schwingen gelblich, Schwanz unten bläulichgrau. Schnabel graulich; Beine blaß bräunlich. (Reichenbach). „Er ist", sagt Heuglin, „Standvogel in Abessinien, den Bogosländern, am südlichen Takah, Ostsenar und am blauen und weißen Nil. Dort lebt er in der Steppe, wo viel Baumschlag ist, wie auf Blößen in der eigentlichen Waldregion, wol nicht über 2000 Meter hoch gehend, meistens in Pärchen oder in kleinen Gesellschaften von 3 bis 6 Stück, die sich auf Bäumen, Gesträuch, Hecken und auf Stoppelfeldern aufhalten. Der Lockton ist ein scharfes Zirpen, ähnlich dem der meisten Webervögel. Die ziemlich kunstreichen Nester stehen oder hängen zwischen dornigen Akazienästen in ungefähr 5 bis 8 Meter Höhe und sind sehr groß, backofenförmig aus dürrem Gras gebaut und innen mit Federn und anderen weichen Stoffen ausgekleidet; das Schlupfloch ist seitwärts nach unten geneigt und meistens noch besonders überdacht. Manche Nester haben zwei Eingänge und dienen wol den Männchen als Aufenthaltsort. Am 24. September 1861 fand ich ein Gelege mit zwei

ſtark bebrüteten, feinſchaligen Eiern, welche röthlichweiß mit kleinen, ſehr verwaſchenen, gegen das ſtumpfe Ende mehr zuſammengedrängten, hell roſenroſtfarbigen Strichelchen und Fleckchen gezeichnet ſind. Gewöhnlich trägt ein Baum mehrere Neſter, welche ſich jedoch bezüglich ihrer Lage von denen der eigentlichen Webervögel unterſcheiden, indem ſie mehr im Innern der Baumkrone oder mehr am Gipfel, nicht aber an den Enden ſchwanker Zweige, angebracht ſind. Manche dieſer Baue ſcheinen nicht zum Brüten beſtimmt zu ſein."

Der ſchwarzſchnäbelige Sperlingsweber „iſt kleiner und ſchlanker als der Mahali, lebhafter gefärbt mit ſchwächerm, dunklerm Schnabel, längeren, dunkleren Backenſtreifen, reinweißem Unterleib und graubraunen, nicht weißlichen Unterflügeldeckfedern. Rüppell erhielt ihn aus Schoa; ich fand ihn am obern weißen Nil, in der Gegend von Amob und Gaba-Schembil und am Sobat im Dezember und Januar. Hier lebt er parweiſe und in Familien auf Lichtungen und in der Waldregion, auf Bäumen und im Gebüſch. Ob er wandert, kann ich nicht angeben". (Heuglin). — Ploceus melanorrhynchus: similis Pl. mahali, sed minor et gracilior, latius pictus; stria malari longiore et obscuriore; gastraeo albissimo; tectricibus subalaribus cinereo-fuscis, hand albidis; rostro obscuriore.

Der bärtige Sperlingsweber unterſcheidet ſich von dem vorigen durch graubraune Strichelung des Kropfes, durch hell roſtbraune Kopfſeiten, die nach unten zu ſchwarz eingefaßt ſind. Profeſſor Peters hatte aus Moſambik ein Exemplar mitgebracht, welches im Berliner Muſeum ſteht und nach welchem Finſch und Hartlaub die Beſchreibung gegeben. Die Verbreitung iſt vermuthlich eine weiter ausgedehnte, ſagen die letztgenannten Forſcher. Näheres iſt nicht bekannt und hiermit dürfte alles Wiſſenswerthe über dieſe Vögel auch erſchöpft ſein, mindeſtens bis zu der Zeit, in welcher ſie häufiger eingeführt werden und in der Gefangenſchaft beobachtet, bzl. gezüchtet ſind.

In den Verzeichniſſen der Händler ſind ſie nicht vorhanden. Ebenſo fehlen ſie aber auch in den Liſten der zoologiſchen Gärten.

Der Mahali-Sperlingsweber wird auch blos Mahali und Mahali-Philagrus (Rchb.) genannt. — Nomenclatur: Plocepasser mahali, *Smth., Gr., Bp., Lyrd., Antn.;* Leucophrys pileatus, *Sws.;* Ploceus haematocephalus, *Lchtst.;* Agrophilus haematocephalus, *Nomencl. Mus. Berol.;* Plocepasser pileatus, *Gr.;* Philagrus mahali, *Cb., Hgl.* — Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 277. — Ploceus mahali: notaeo, genis, regione parotica subbadio-cineraceis; pileo lorisque fusco-nigricantibus; stria malari subcano-umbrina, altera superciliari lata, uropygio, supracaudalibus guttureque albis; gastraeo reliquo et subalaribus sordide subfulvo-albidis; alis fumosis, pogonio scapularium externo latius, remigum strictius albo-marginato, alar. tectricibus late albo-terminatis; apice parteque pogonio externo rectricum umbrino-fuscarum latius magisque conspicue albo-marginatis. Iride rubro-aurantia; rostro et pedibus luride corneis. — Länge $16{,}4^{cm.}$ ($6^1/_2$ Zoll); Flügel $9{,}8^{cm.}$ ($3^3/_4$ Z.); Schwanz $6{,}1^{cm.}$ ($2^1/_3$ Z.).

Der Augenbrauen-Sperlingsweber heißt bei Rchb. Augenbrauen-Philagrus. — Nomenclatur: Ploceus superciliosus, *Rpp., Lss.;* Plocepasser superciliosus, *Rpp., Hgl., Lfbr., Hrtl.;* Philagrus superciliosus, *Cb., Hg.-Wrth., Antn.;* Agrophilus superciliosus, *Sws., Alln.;* Pyrgita Rueppellii, *Bp.* — Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 277. — Ploceus superciliosus: supra pallide umbrinus, pileo et cervice laete cinnamomeo-rufis; stria superciliari conspicua alteraque mystacali albis; gula albida, lateraliter

conspicue e fusco nigricante-cincta; tectricibus alar. minoribus fumosis, late et circumscripte albido-terminatis; rectricibus supra dorso concoloribus, subtus subfumoso-canis; gastraeo sordide canescente-albo, hypochondriis et pectoris lateribus magis e fuscescente cano-lavatis; subalaribus et subcaudalibus sordide albis. Iride rufo-fusca; rostro et pedibus rufescente-corneis. — Länge 16,4—18,3 cm. ($6^1/_4$—7 Zoll); Flügel 8,7—9,1 cm. ($3^1/_3$—$3^1/_2$ Z.); Schwanz 6,3 cm. ($2^5/_{12}$ Z.).

Der schwarzschnäbelige Sperlingsweber hat diesen Namen von Th. v. Heuglin erhalten. — Nomenclatur: Plocepasser melanorrhynchus, *Rpp.*, *Bp.*, *Hgl.* [nec *Lchtst.*]; Philagrus melanorrhynchus, *Cb.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.* [Plocepasser superciliosus, *Lfbr.*, nec *Rpp.*, nec *Sws.*]. — Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 278.

Der bärtige Sperlingsweber hat keinen weiteren deutschen Namen. — Nomenclatur: Philagrus pectoralis, *Ptrs.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Hgl.* [Agrophilus melanorrhynchus, *Lchtst.*]. — Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 278.

Der Kolonie-Webervogel [Ploceus socius]. Auch er muß, obwol noch auffallender als Sperling erscheinend, wenigstens vorläufig zu den Webern gezählt werden, weil die Afrikareisenden ihn unter dieselben einreihen. Für die Liebhaberei hat er noch keine Bedeutung, da er bis jetzt wol noch nicht lebend eingeführt worden. Sobald aber seine Heimat, das Innere Afrikas, dem europäischen Verkehr mehr erschlossen ist, wird auch er hoffentlich in unseren Vogelstuben erscheinen und dann zweifellos großes Interesse durch seine Nesteransiedelungen erwecken. Deshalb sei er hier berücksichtigt. In Hinsicht seiner äußerlichen Schönheit kann dies allerdings nicht der Fall sein, denn er gehört wiederum zu den schlicht gefärbten Vögeln. Er ist am Oberkopf, Halsseiten nebst Vorderhals und Brust einfarbig erdgrau, nur der Oberkopf ist verloschen und fein dunkel gefleckt; ein kleines Fleckchen vor jedem Auge und die Umgebung des Unterschnabels schwarz; Genick und Rücken erdgrau und schwarz gewellt; Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun und blaß erdgrau gesäumt; Bauchseitenfedern schwärzlich, blaß gesäumt. Schnabel und Füße blaßgrau hornfarbig — Weibchen am Rücken heller. — Junge haben einen braungestrichelten Kopf und das Schwarz an den Bauchseiten wie um den Unterschnabel fehlt. (Reichenbach). Das Alterskleid erleidet keinen Farbenwechsel mehr. Größe etwa des Haussperlings. Die Nahrung besteht in Sämereien und Insekten. Diese Vögel erbauen ihre Nester gesellig, zu vielen unter einem gemeinschaftlichen Dache beisammen. Zunächst errichten sie das letztre aus festen Gräsern und zwar in der Weise, daß von diesem Dachbau einige starke Zweige, zuweilen sogar ein Theil eines großen Astes, umgeben und eingearbeitet sind. Dann stellt jedes Pärchen ebenfalls aus Gras sein eignes Nest so her, daß eins neben dem andern steht. Wenn sie alle fertig sind, so erscheinen sie von unten als eine Fläche mit den kreisrunden Oeffnungen zum Einschlüpfen. Jedes Nest wird nur einmal benutzt, denn zu jeder Brütezeit erbaut jedes Paar ein neues unterhalb des alten. In dieser Weise wächst die Zahl der Nester alljährlich an, bis ihre Masse so schwer wird, daß sie sämmtlich herabfallen, worauf die Vögel dann einen neuen Brutplatz aufsuchen. Die Ansiedelungen werden immer auf großen, hohen Bäumen errichtet, nur wo diese nicht vorhanden sind, benutzen die Vögel auch die baumartige Aloë. Das Weibchen legt drei bis vier bläulich-

weiße, am dickern Ende fein braun getüpfelte Eier. (Nach A. Smith, welcher die erste Beschreibung gegeben). Ein andrer Reisender, Ayres, giebt Aehnliches an. „Unter dem vollkommen wasserdichten Dache befindet sich eine überaus unregelmäßige Nestansiedelung, deren Gesammtmasse von einer Schubkarren- bis zu einer Wagenladung schwankt; auf einzelnen Bäumen findet man auch wol drei bis vier Nestkolonien, jede von mehr als 1 Meter Durchmesser. Die einzelnen Kämmerchen haben untereinander keine Verbindung, und die Schlupflöcher sind so eng, daß man mit der Hand kaum hineingelangen kann. Das eigentliche Nest ist mit Federn dick ausgepolstert. Es wird nicht allein für die Brut, sondern auch nach derselben zum Schlafen des Nachts benutzt. Denn in einer Ansiedelung am Waalfluße, wo die Nester auf Kameeldornbäumen standen, sah ich die Vögel in denselben im Juli, zu welcher Zeit die Bruten längst vorüber waren. Im Februar schnitt ich einige Nester ab und sah, daß die Jungen schon größtentheils ausgeflogen waren. In einer Zelle fand ich noch zwei unbefiederte Junge und ein nicht bebrütetes Ei, welches grauweiß und mit sepiabraunen Flecken gezeichnet war." Nähere Angaben sind bis jetzt nicht vorhanden und ich kann auch bei diesem Vogel nur das Versprechen wiederholen, daß ich ihn im Nachtrage schildern will, wenn er noch zeitig genug eingeführt wird.

Der Kolonie-Webervogel, auch Siedelweber, Gesellschaftsweber und geselliger Nestfink (Rchb.) genannt, hat folgende Nomenklatur: Loxia socia, *Lth.*; Ploceus Patersoni, *Lss.*; Euplectes lepidus, *Sws.*; Philetaerus lepidus, *Smth., Ptrsn.*; Philetaerus socius, *Strckl.*

* * *

Zu den **Gelb-Webervögeln** [Hyphantornis, *Gr.*], auch Edelweber genannt, müssen wir einige der größten und zugleich die kleinsten der lebend eingeführten Webervögel zählen. Abgesehen von dem Körperbau, zeichnen sie sich dadurch aus, daß sie fast sämmtlich am umfangreichsten Theile des Gefieders grünlich-, hoch- bis goldgelb gefärbt sind, im Prachtkleide in der Regel mit schwarzem oder braunem Kopf. Sie leben zu jeder Zeit gesellig beisammen und nisten ebenso kolonienweise, sodaß man einzelne Nester kaum findet; auch lieben sie die Nähe der Menschen und sie bewohnen dem Haussperlinge gleich sehr häufig die Ortschaften. „Eine Oertlichkeit," sagt Dr. Reichenow, „in welcher Gebüsch mit freien Stellen abwechselt, hin und wieder mit einem höhern, Umschau gestattenden Baume besetzt, bildet ihren bevorzugten Aufenthaltsort." Dagegen traf er aber auch in den Walddörfern des Kamerungebirgs bis zu einer Höhe von 1255 M. einige Arten als regelmäßige Ansiedler, welche ihre Bauten an die Kokuspalmen und sogar an die Spitzen der Pisangblätter hängen. Die Nester unterscheiden sich im allgemeinen sowol von den beutelartigen Gebilden der Feuerweber, als auch von den retortenartigen oder langröhrigen der Bayaweber. Ob sie als Zug- oder nur als Strichvögel leben, ist bis jetzt noch nicht festgestellt. Gleich den meisten der anderen Weber und vielen Sperlingsvögeln überhaupt, sammeln sie sich zeitweise wandernd zu ungeheuren Schwärmen an und verursachen dann nicht selten beträchtlichen Schaden in Getreidefeldern, von denen sie durch besondere Vorrichtungen verscheucht werden. Mit dem Beginn der Regenzeit kehren sie nach ihren Nistbäumen zurück, bewohnen die alten Nester oder erbauen neue und erziehen zwei oder drei Bruten. Die verschiedenartigen Nester werde ich bei jeder einzelnen Art oder späterhin bei der Züchtung beschreiben. Es sind überaus lebhafte, kräftige und starke Vögel. Ihr Liebesspiel ist seltsam, indem sie mit

Chrom. Lith. Th. Fischer, Cassel.

zitternden Flügeln allerlei wunderliche Stellungen annehmen und, das Weibchen jagend, flügelschlagend und das Gefieder sträubend, ihren zirpenden, schnarrenden, zischenden und gackernden Sang eifrig erschallen lassen. Einen bemerkbaren melodischen Gesang haben sie nicht. Nur das Männchen allein webt ein Nest oder auch mehrere hintereinander; besondere sog. Vergnügungsbauten errichtet es aber nicht immer. Das Weibchen brütet allein und füttert ebenso ohne die Hülfe des erstern die Jungen auf. Man darf wol mit ziemlicher Bestimmtheit glauben, daß die größeren Arten in Vielehe leben. Die Gestalt der Nester ist bei der Mehrzahl oval, mit kreisrundem Einflugloch von unten hinauf an einer Seite und mit einem ganz erstaunlich dichten und festen Dache, während das Lager für die Eier so leicht und luftig ist, daß man dieselben von unten herauf sehen kann. Die Art und Weise des Bauens kann man ebensowol Flechten als Weben nennen; immer hat das Nest Aehnlichkeit mit einem Korbe. Näheres über das Freileben werde ich bei jeder einzelnen Art berichten.

In der Vogelstube leben die verschiedenen Arten mindestens duldsam beisammen; wenn auch immerwährend Zank und Streit unter ihnen herrscht, so erbauen sie doch neben einander ihre Nester und ziehen ihre Jungen auf. Zu den großen Gelbwebern darf man keine kleinen Vögel, insbesondere keine Prachtfinken bringen, denn sie fressen aus deren Nestern mit Vorliebe die Jungen und tödten auch die Alten selber, sobald letztere schwächlich und kränklich sind. Mehrmals nisteten Männchen des Textor-, Fuchs- und goldstirnigen Webers in der Vogelstube mit zwei oder drei Weibchen zugleich. Zur Herstellung des Nestes wird fast immer zuerst ein wagerecht stehender Ring geflochten und um denselben herum das Nest geformt. Auch die von meinen Gelbwebern im Laufe der Zeit sehr zahlreich und mannigfaltig erbauten Nester sollen in dem Theile dieses Werkes, welcher die Züchtung der Vögel behandelt, abgebildet und eingehend beschrieben werden. Im allgemeinen sei nur noch bemerkt, daß in der Vogelstube alle Arten dieser Weber vorzugsweise leicht und sicher nisten und zwar erbauen sie ihre Nester zu jeder Jahreszeit mit gleichem Eifer, ob sie im Prachtgefieder sich befinden oder nicht. Man hat behauptet, daß sie besonders gern mit langen, frischen oder wol gar mit aufgeweichten Grashalmen arbeiten. Ich kann jedoch versichern, daß alle, mit wenigen Ausnahmen, sobald sie Agave- oder auch nur Kokosfasern haben, Grasblätter ganz unberührt lassen und nur Grasrispen zur Verdichtung des Daches nehmen. Die Textorweber errichteten das gewaltig dicke Dach am liebsten aus selbst abgerissenen Streifen von Rohr- oder Schilfblättern. Die Fütterung stimmt mit der aller anderen Webervögel überein, nur versäume man nicht, vom Beginn der Färbung an auch Mischfutter aus Ameisenpuppen und Eierbrot, sowie möglichst viele Mehlwürmer und in Ermangelung derer Maikäfer, allerlei Raupen, kleine Schnecken, Gewürm u. drgl. zu geben. Als angenehme Käfigvögel vermag ich die größeren Arten dieser Weber wahrlich nicht zu bezeichnen. Ihr Zischen und Gackern kann selbst den abgehärteten Liebhaber zur Verzweiflung bringen. In einer entsprechend eingerichteten Vogelstube dagegen oder noch besser in einem sehr großen Flugkäfige oder in einem Vogelhause, beide letzteren am besten draußen stehend, können sie wol Interesse erregen und viele Freude bereiten. Die Preise sind je nach der Seltenheit sehr verschieden; von den gewöhnlicheren Arten bezahlt man das Pärchen mit 18 bis 24 Mark, während die selteneren wol 60 Mark und darüber kosten.

Der schwarzköpfige oder Textor-Webervogel [Ploceus melanocephalus].

Tafel X. Vogel 49.

In früherer Zeit bezeichnete man diesen, einen der größeren unter den zu uns gelangenden, als den eigentlichen oder gemeinen Webervogel, Benennungen, die freilich auch für den Blutschnabel, als den im Handel am häufigsten, und für die Bayaweber, als die bekanntesten Künstler unter allen, Geltung haben. Der Textor möge also seinen von den Fasern, welche er verarbeitet, abgeleiteten Namen beibehalten.

Er ist kein regelmäßiger Gast des Vogelmarkts, doch auch keineswegs selten, indem er alljährlich und manchmal sogar in erheblicher Anzahl eingeführt wird und sich zugleich vortrefflich erhält, sodaß man einzelne Pärchen fast immer in den Handlungen vorräthig finden kann. Als Stubenvogel hat er eigentlich nur eine geringe Bedeutung, denn sein S. 281 bereits erwähntes Liebesspiel ist im Zimmer kaum zu ertragen; außerdem kann er auch seiner Räubereien wegen, wie weiterhin ausgeführt, in allen Züchtungsanstalten nicht geduldet werden. Ueberaus interessant aber zeigt sich eine Gesellschaft dieser und der nächstfolgenden Arten zusammen in einem möglichst weiten Raume, wo sie eifrig ihre künstlichen Nester erbauen und dann, namentlich in der Nistzeit, ein bezeichnendes, wechselvolles Bild des Webervogel-Lebens entfalten. In umfangreichen Volièren, welche im Freien stehen, dürfen sie umsomehr als die willkommensten Bewohner angesehen werden, da sie einerseits durch ihre zahlreichen Nester denselben einen dauernden Schmuck geben und da sie andrerseits durch ihre ansprechenden Farben, ihre Lebendigkeit und rastlose Geschäftigkeit zu den beliebtesten Erscheinungen gehören. Vorzugsweise werthvoll aber sind sie durch ihre lebenskräftige Ausdauer, welche sie sogar unsern harten Winter in einem nur gegen die ärgsten Unbilden der Witterung geschützten Flugkäfige draußen gut überstehen läßt, während sie im Zimmer geradezu unverwüstlich sich zeigen.

Im Prachtgefieder ist der Oberkopf nebst Gesicht und Kehle tiefschwarz und diese Färbung erstreckt sich in einer scharfen Spitze bis auf die Oberbrust. Der Nacken und Vorderhals sind dunkelbraun; der ganze Oberkörper ist schwarz und erscheint gelb gestreift durch breite Säumung der dunkelen Federn; die Unterbrust ist bräunlichgelb und der ganze Unterkörper einschließlich der inneren Flügelseiten ist schön hellgelb. Das grelle gelbe Auge ist sehr auffallend. Das Weibchen ist oberhalb gelblichgrün, unterhalb heller, fast reingelb; Auge dunkel. Das Männchen im Winterkleide ist fast ganz übereinstimmend, im wesentlichen nur durch das hellere Auge verschieden. Etwa so groß als ein Edelfink, doch schlanker.

Seine Heimat ist Westafrika und die Verbreitung erstreckt sich über die mittleren Länder desselben, besonders Senegambien und Guinea, Joruba, Fernando-Po, Angola, Kamerun, Ogobai, Mundo; von hier aus durchs Innere von Mittelafrika bis nach dem Nordosten, wo er allerdings weniger häufig vorkommt. Er ist somit nach Hartlaub die am weitesten verbreitete Art unter den Webervögeln von Westafrika. Prinz v. Würtemberg und Hedenborg erlegten ihn in Bertat, Senar und am untern weißen Nil; Antinori will — wie Heuglin bemerkt — zwei Junge im Ostsenar gesammelt haben. Der letztre Forscher selbst hatte niemals Gelegenheit, ihn zu beobachten; er glaubt aber, daß der Textor als Zugvogel zur Regenzeit vom Süden her in Fazoql, Senar und vielleicht auch

im warmen Abessinien einwandert. Diese dürftigen Angaben waren bisher Alles, was über ihn vorlag, und die Züchtung in der Gefangenschaft hat daher wie bei vielen anderen, so auch bei diesem Vogel früher die Entwicklungsgeschichte erforscht, als dies den Reisenden in seiner Heimat gelungen. Neuerdings erst hat Dr. Reichenow folgende Schilderung gegeben: „Die gemeinste Art, der häufigste Weber in Westafrika überhaupt, ist er. Ich habe kein Negerdorf betreten, in welchem er gefehlt hätte, wo nicht die Kokuspalmen behängt waren mit den Nestern dieses schönen Vogels, der ebenso durch sein Gefieder, wie durch sein muntres Wesen ergötzt. Wie kein andrer versteht er es, an den verschiedensten Oertlichkeiten sich einzurichten und die Verhältnisse zu benutzen. Obwol er die Ortschaften vorzugsweise aufsucht und in ihnen am liebsten sich anzusiedeln scheint, fehlt er doch auch an den oben erwähnten, allen Gelbweber-Arten besonders zusagenden Stellen nicht. (Vrgl. S. 280). Höchst mannigfach ist die Wahl des Nistorts. So fand ich bei Akkra auch kleine Kolonien an niedrigen Dornbüschen, mit denen des dottergelben Webers zusammen. Nicht minder bemerkenswerth war das Nisten am obern Kamerunfluß. Der Urwald ist hier von den Ufern verschwunden; üppige Pisangplantagen sind an seine Stelle getreten. Nur einzelne der kolossalen Bäume, aus denen die Eingeborenen ihre Kanoes machen, haben dem verheerenden Feuer Widerstand geleistet, und obwol des Lebens beraubt, erheben sie noch majestätisch, Wind und Wetter trotzend, ihre kahlen Häupter. Hohe Bäume am Ufer eines großen fischreichen Flusses — wo können Raubvögel bessere Brutplätze finden? Jeder derselben enthält denn auch einen Horst des Schmarotzer-Milans oder des Angola-Adlers; um diese herum aber hängen zahlreich die Nester der Webervögel. Unter den Klauen der Räuber treiben die klugen Vögel ihr Wesen, wol wissend, daß jene zu unbeholfen sind, um ihnen gefährlich zu werden; auch fühlen sie wol die Sicherheit, welche die Nähe der großen Wegelagerer gegen kleines, schnelleres Raubgesindel gewährt. . . . Wieder in andrer Weise traf ich unsern Vogel am Buri nistend. Hier hingen seine Nester unter großen Kolonien des schwarzen Webers in geringer Höhe über dem Wasser an überragenden Zweigen niederer Gebüsche des Ufers. . . . So verschieden aber auch der Standort oder vielmehr Hängeort der Nester ist, diese selbst bleiben in Gestalt und Bau immer gleich. Die erstre ist kugelig, etwas länger als breit und hoch mit seitlich unten befindlichem Schlupfloch, an dem ein kurzer Röhrenansatz sich befindet. Oben ist das Nest in eine Spitze ausgezogen und mit derselben an einem Zweige oder sonstigen Aufhängepunkte befestigt. Zum Bau wird sehr grobes, flaches Gras verwendet und zwar, wie von mehreren Gelbweberarten, frisches Gras. Letztres scheint mir bisher noch nicht beobachtet zu sein. Ueber die Lebensweise des bekannten, auch in Nordostafrika häufigen Vogels habe ich nichts weiter hinzuzufügen; nur möchte die Beobachtung vielleicht

neu sein, daß die Eier mit dem Alter abändern (s. wissenschaftliche Beschreibung). Zwei, selten drei Eier bilden das Gelege. Bei Akkra und Obokobi sah ich im August ausgeflogene Junge und frisch begonnene Nester einer neuen Brut. — In den Kamarunbergen fand ich ihn bis zu 1255 Meter Höhe."

Mit Sicherheit vermag ich nicht anzugeben, ob die Brut des Textorwebers im Berliner Aquarium oder in meiner Vogelstube zuerst mit glücklichem Erfolge vor sich gegangen. Im erstern wurden in einem geräumigen Käfige beisammen eine große Anzahl Webervögel von drei Arten (Textor-, Larven- und Fuchsweber) gehalten, welche nach meiner Ueberzeugung sämmtlich Männchen waren und die trotzdem in förmlichem Wetteifer Nester erbauten. Als man nach geraumer Frist Weibchen hinzubrachte, entstand ungeheure Aufregung, es wurden harte Kämpfe ausgefochten und nur selten gelangte eine Brut von einem Jungen zum Flüggewerden. Auch späterhin, als man noch mehrere Weibchen angeschafft, konnte wol von immer regerm Nestbau, doch keinenfalls von ergiebigerm Nisten die Rede sein. So hübsch die vielen stattlichen Webervogelnester sodann aussahen, und so sehr sie dem ganzen Aquarium zum Schmuck gereichten — gerade dieser Käfig mußte jedem einsichtsvollen Züchter trotzdem doch zweifellos als ein abschreckendes Beispiel erscheinen, für eine völlig verfehlte Vogelzucht. Hier traten die schlimmsten Fehler zutage: Selbst bei gesellig nistenden Vögeln darf man nicht, wie es hier geschehen, den Zuchtraum übervölkern. Ueberzählige Exemplare sollten niemals vorhanden sein, am allerwenigsten aber überzählige Männchen bei den in Vielweiberei lebenden Arten. Schließlich verringert sich der Ertrag der Bruten in jeder Zuchtanstalt bedeutsam, wenn die Vögel jahraus und -ein immer in demselben Raume verbleiben; naturgemäßerweise soll man, namentlich Zugvögel, zeitweise in eine andre Oertlichkeit bringen und dann auch die Fütterung zweckentsprechend einrichten. Als im Laufe der Zeit viele von den Webervögeln eingegangen waren und dann unter der Direktion des Herrn Dr. Hermes eine Anzahl Weibchen neu beschafft wurden, konnte man beobachten, daß in jenem, aller Welt bekannten Käfige, seit Jahren zum erstenmale zahlreiche Nester ergiebige Bruten von vier bis sechs Jungen enthielten, die auch wirklich flügge wurden.

In meiner Vogelstube erbaute das erste Pärchen zwei Nester und zwar übereinanderstehend, das untere als Brut- und das obere als sog. Vergnügungsnest, in welchem letztern das Männchen die Nacht zubrachte. Während dieselben im Berliner Aquarium in der ersten Zeit vorzugsweise aus Kokusfasern hergestellt worden, geschah dies bei mir besonders aus den Rispen verschiedener für die Prachtfinken dargebotenen Gräser, und daraus wurde ein ungemein dichtes, förmlich gefilztes Dach gefertigt, welches in schöner Rundung und innen sauber geglättet eine länglichrunde Gestalt und nach unten etwa zu zwei Dritteln eine Höhlung hat, das letzte Drittel dagegen für den Eingang von unten herauf freiläßt. Oberhalb

und rings um das Schlupfloch ist das Dach vornämlich mit Bastfäden und Agavefasern befestigt. Die Höhlung oder das flache Lager, auf welchem die Eier ausgebrütet werden, erscheint als ein ziemlich weitmaschiges, aus festen Grasstengeln und Agavefasern zusammengeflochtnes Gewebe. Das zweite Nest ist viel kleiner, hat ein ebenso stark gefilztes Dach aus denselben Gräsern, deren Rispen aber so gestellt sind, daß sie dicht gedrängt eine förmliche Decke oberhalb des Schlupfloches bilden. Die Mulde ist noch weit loser und großmaschiger; ein starker, vielfach umwundener Zweig der Gabel, in der das Nest hängt, dient dem Vogel zum Sitz, welcher letztre bei dem Brutneste fehlt. Alle auch späterhin bei mir und ebenso die in der Vogelstube des Herrn Graf Yorck von Wartenburg, sowie die im Berliner Aquarium gebauten Nester dieser Weberart zeigten übereinstimmend dieselbe vorhin beschriebne Gestalt; abweichend von einander waren sie nur darin, daß sie zuweilen den mehr oder minder beträchtlichen Ansatz einer Flugröhre von unten herauf hatten. Immer aber standen sie zwischen Ruten und dünneren oder stärkeren Aesten eingeflochten, mit einem gewölbten, runden Dache; niemals jedoch hingen sie an einer Spitze oder einem selbst gedrehten Seile. Diese Verschiedenheit von der Gestalt des Nestes im Freien, welche nicht als Ausnahmsfall, sondern als die Regel sich ergiebt, dürfte also ebenfalls für die oben erwähnte Intelligenz des Vogels sprechen. Nur einen Fall weiß ich mitzutheilen, in welchem der Textorweber auch in der Gefangenschaft den Nestbau des Freilebens beibehalten. Herr Gymnasiallehrer Fr. Schneider schildert seine dahin gehenden Erfahrungen in folgender Weise:

„Die Nester wurden fast regelmäßig in Mannshöhe und nur wenn die Vögel sehr scheu waren in den höchsten Zweigen des Gesträuchs der Vogelstube angelegt. Das Männchen baute allein, wählte am liebsten Grasrispen und nur wenn ihm diese fehlten, benutzte es Agavefasern, Manilabast u. drgl. In meinen beiden Vogelstuben errichteten sie die Nester mit wenigen Ausnahmen so, daß das Schlupfloch der Wand zugekehrt war. (Dies stimmt freilich mit der Anlage der Nester im Freien wiederum nicht überein). Auch hier erbaute das Männchen stets zwei Nester, eins zur Brut und ein kleineres, loser gewebtes zur Schlafstätte für sich selber. Das erstre wurde von dem Weibchen mit Würzelchen, Fäden, Wolle und Baumwolle dicht ausgefüttert. Eins dieser Nester war dicht am Drahtgitter des Fensters angelegt und der Witterung, namentlich den in jenem Sommer (des Jahres 1873) so häufigen und heftigen Gewitterregen ausgesetzt; dennoch blieb es im Innern trocken und die Jungen kamen trotz Wind und Wetter glücklich zum Ausfliegen. Meines Erachtens ist das Nest keines andern Webervogels so künstlich vollendet als das des Textors, obgleich ihnen allen hier in der Vogelstube doch die gleichen Niststoffe zu Gebote stehen. Das Männchen webt gewöhnlich zuerst eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren

Zweigen, gleichviel ob dieselben steif und aufrecht stehen oder schlaff und schwankend herabhängen. Findet es einen passenden horizontalen Zweig, so umwickelt es diesen und benutzt ihn, so hergerichtet, für die Anlage des ersten, stets aufrecht, also vertikal stehenden und später als Eingangsschwelle dienenden Kranzes. Nach der einen Seite flechtet der Baumeister die Flugröhre, nach der andern das eigentliche, kugelförmig gestaltete Nest an diesen Kranz. Die Form der Kugel wird erst lose hergestellt aus unregelmäßig kreuz und quer liegenden Rispen, dann erst wird das Gewölbe regelrecht durch Bast, Fasern und starke Grashalme, am liebsten jedoch aus gebogenen, dünnen, frischen Birkenreisern gefertigt. Das Männchen beißt die Reiserchen ab (sie haben fast alle die Länge von etwa 12 Zentimeter), trägt sie in das Nest und wölbt damit die Decke. Die Reiser laufen unter einander parallel und liegen ganz regelrecht wie die Bogen eines Tonnengewölbes. Die Wandung des Nestes ist zolldick und darüber; die Länge beträgt 16 cm. und die Breite durchschnittlich 10 cm. Der Bau eines solchen Nestes dauert ein bis zwei Tage und der Ausbau vonseiten des Weibchens ebensolange. Drei bis vier Eier bilden das Gelege. Brutdauer 14 Tage. Das Weibchen brütet allein und das Männchen bewacht das Nest und hält in größtem Eifer jeden Störenfried von der Brut fern. An der Fütterung der Jungen betheiligt es sich nur gelegentlich. Dagegen erbaut es nicht selten noch während dieser Brut ein zweites, drittes, viertes Nest und nistet dann auch in Vielehe, also mit mehreren Weibchen zugleich. Die Jungen werden mit frischen und getrockneten Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Käfern u. a. Kerbthieren, welche man ihnen bietet, auch mit Drosselfutter und etwas Eierbrot ernährt. Je größer sie werden, desto eifriger und stürmischer beschützt sie das alte Männchen gegen jeden Feind, selbst gegen Papageien, Kardinäle u. a. Es entwickelt dabei außerordentlichen Muth; mit hängenden Flügeln, den Schwanz gespreizt, den Kopf kampffertig herniedergebogen, den Schnabel geöffnet, stürzt es sich auf jeden Vogel, der seinem Nestbezirk nahe kommt, nachdem es zuvor meistens vergeblich versucht, den Feind durch Zischen, Schnarren und Geschrei zu vertreiben. Selbst vor den Gebirgsloris und großen Sittichen weicht es nicht, sondern greift sie unerschrocken an. Dabei hat es eine eigenthümliche Taktik. Unter den Störenfried fliegt es und stößt nach ihm, wie die Krähe nach einem Raubvogel. Geschickt weiß es den drohenden Schnabelhieben zu entgehen und des Gegners Füße oder Bauch zu verletzen. So erreicht es stets seinen Zweck, selbst wenn es den Angriff zwanzigmal wiederholen muß. Wie klug und überlegend der Vogel ist, erhellt aus folgendem: in den ersten Jahren seines Aufenthalts in meiner Vogelstube wählte er als Baustoffe Grasrispen, Halme und Birkenzweige und durch einige Agavefasern oder Manilabastfäden gab er dem Bau die genügende Festigkeit. Die genannten Stoffe, namentlich die Grasrispen, lockten aber sicherlich die Papageien herbei und nur zu bald war

das Geflecht jedesmal zerstört. In diesem Jahre nahm er ausschließlich Aloëfasern, Manila- und Lindenbast nebst Birkenreisern und die Nester blieben unangefochten. Es muß aber ausdrücklich hervorgehoben werden, daß ihm frische und getrocknete Grasrispen in Fülle zu Gebote standen." Das Weibchen versorgt die Jungen noch sehr lange nach dem Ausfliegen und läßt sie nicht aus den Augen. „Das eine Paar nistete in diesem Jahre dreimal und brachte die Jungen (3, 1, 2) glücklich zum Flüggewerden. Diese wachsen in drei Wochen aus, sehen dem alten Weibchen ähnlich, sind jedoch dunkler." (Fr Schneider). Nähere Beschreibung s. Jugendkleid. Frau Agnes Kierstein in Frankfurt a. O. theilt inbetreff der Reinigung des Nestes eine interessante Beobachtung mit. „Das alte Weibchen wurde so zahm und dreist, daß es in das neben der Vogelstube befindliche Wohnzimmer kam, um sich hier Mehlwürmer u. a. Fütterung zu holen. Hierher brachte es sodann kleine gallertartige weiße Stückchen mit schwarzer Spitze im Schnabel mit — die Entleerungen der Jungen, durch welche deren Vorhandensein überhaupt erst bemerkt wurde."

Schneider berichtet sodann im weitern, daß ein Männchen mit drei Weibchen zusammen nistete. Das erste Weibchen hatte sein Nest nur drei Fuß über der Erde mit einem Gelege von drei Eiern und über diesem befand sich ein zweites Nest, in welchem ein Fuchsweber-Weibchen mit dem Textorweber heckte, trotzdem noch ein Paar und ein lediges Männchen der erstern Art in der Vogelstube vorhanden waren. Das Männchen warf aus beiden Nestern die etwa sechs Tage alten Jungen heraus. Das dritte Nest stand noch höher in Birkenzweigen, hatte eine Flugröhre und war von einem Weibchen bewohnt, welches er nicht mit Sicherheit feststellen konnte. (Es war zweifellos das Weibchen des Larvenwebers). Späterhin brachten das letztre und das Textorweber-Weibchen ihre Jungen glücklich zum Flüggewerden. Inbetreff der Verfärbung sagt er: „Ich besitze ein altes Männchen seit drei Jahren und konnte den Vorgang in folgender Weise beobachten. Die Ränder der Schwung- und Steuerfedern färben sich höher. Trotz der zweimaligen Mauser im Jahre ist das Winterkleid vom Sommerkleid wenig verschieden. Das Gelb des erstern ist nur dunkler, fällt mehr ins Olivengrüne und das Schwarz des Kopfes ist unrein. Die Weibchen mauserten im Frühjahr ebenfalls, verloren jedoch nur die Brust- und Bauchfedern. Eine Umfärbung der Iris des Auges, die gleichzeitig mit der Verfärbung des Schnabels eintreten soll, konnte ich niemals bemerken." Der Schnabel färbt sich entschieden heller, horngrau; über das Auge kann ich mit Sicherheit keine Behauptung aufstellen.

Graf Yorck von Wartenburg hatte ein Pärchen Textorweber, die in meiner Vogelstube geraume Frist hindurch friedlich gelebt und genistet, unter seine zahlreiche gefiederte Gesellschaft fliegen lassen. Allmälig bemerkte er nun aber, daß die Jungen aus den Nestern der Kubafinken, kleinen Elsterchen,

Amarantvögel u. a. verschwanden, und dann beobachtete er auch bald, daß das Männchen solche mit einem Schnabelhiebe tödtete und zum Neste trug, wo sie ihm vom Weibchen abgenommen wurden. Auch ich habe sodann die Erfahrung gemacht, daß fast alle jüngeren Webervögel harmlos sind, die älteren dagegen in immer höherm Grade bösartig werden.

Die alten Schriftsteller sagen fast garnichts über diesen Vogel oder sie sind im ungewissen, und ich finde in der gesammten betreffenden Literatur auch nichts weiter, als kurze Erwähnungen, trotzdem der Vogel bereits sehr frühe lebend eingeführt sein soll. In der letztern Zeit muß er dann wiederum seltner geworden sein, denn weder Bechstein noch Bolle führen ihn auf.

In Hinsicht der Verpflegung ist das bei diesen Webern im allgemeinen Gesagte zu beachten. Anleitungen zur Züchtung werde ich weiterhin geben. Der Preis wechselt zwischen 15 bis 24 Mark für das Paar.

Der schwarzköpfige oder Textor-Webervogel, gemeine oder eigentliche Webervogel, großer oder Doppelweber ist auch Goldweber genannt.

Le Tisserin Cape-Moore; Rufous-necked Weaver-bird or Large Weaver-bird; Roodneck Wever (holländisch).

Nomenclatur: Coccothraustes gambiensis, *Brss.*; Fringilla senegalensis, *Drs.*; Loxia melanocepha et Oriolus textor, *Gml.*; Fringilla velata, *Lchtst.*; Fringilla longirostris, *Vll.*; Ploceus senegalensis, *Stph.*, *Sws.*, *Sndvll.*; Ploceus modestus, *Hrtl.*; Textor melanocephalus, *Bp.*; Hyphantornis textor et modesta, *Gr.*; Ploceus textor, *Cv.*; P. textor, magnirostris et modestus, *Rchb.*; Ploceus solitarius, *Pr. Wrtbg.* (♀); Hyphantornis textor, *Cb.*, *Cssn.*, *Hne.*, *Hgl.*; Hyphantornis gambiensis, *Hgl.*; [Oriolus melanocephalus, *Bff.*] — Cap-more, *Buff.*; Weaver-Oriole, *Lath.*; Pinson du Senegal, P. à bec long, *Buff.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf und Kehle tiefschwarz, von der letztern bis zur Oberbrust ein dreieckig spitzes Band ebenso; Nacken, Halsseiten und ein Band über die Oberbrust kastanienbraun; Oberseite gelb, durch breite Säume der Federn schwarz gestreift; Flügel olivengrünlichbraun, jede Feder außen schmal grüngelb, innen breit schwefelgelb gesäumt; kleine und große Flügeldecken fast schwarz, breit gelb gerandet, über jede Schulter bis zur Rückenmitte ein schwarzer Streifen; Schwanz grünlichgelbbraun, jede Feder mit breitem gelben Innenrand; unterhalb und untere Flügelseite lebhaft gelb. Schnabel schwarz; Auge feuergelb bis karminroth; Füße hell röthlichbraun. — Weibchen oberhalb dunkel gelblichgrün; Oberkopf, Schultern und Rücken mehr bräunlich; Flügel dunkel grünlichbraun, jede Feder heller grüngelb gesäumt, über jeden Flügel eine breite fahlgelbe Querbinde; Augenbrauenstreif und Kopfseiten hellgelb; ganze Unterseite lebhaft gelb. Schnabel schwarzbraun; Auge braun. — Das Winterkleid des Männchens ist fast ganz ebenso, nur oberhalb beträchtlich dunkler und unterhalb kräftiger gelb; immer bleibt aber das Auge als das sicherste Kennzeichen zu beachten.

Ploceus melanocephalus: capite toto, gula striaque ab ea usque ad pectus trigona acuminata atris; cervice, colli lateribus cinguloque pectoris castaneis; supra flavus, nigro-striatus, alias olivaceo-virescentibus, pogonio remigum exteriore anguste viride flavo-, interiore late sulfureo-limbato; tectricibus al. subnigris, late flavo-marginatis; stria scapulari usque ad dorsum medium nigra; rectricibus olivaceo-fuscis, intus late flavo-marginatis; gastraeo alisque inferioribus flavissimus; rostro nigro; iride coccinea; pedibus dilute rubidis. — ♀ supra obscure flavente viridis; pileo, scapulis dorsoque fuscescentibus; plumis alarum olivaceo-fuscarum virente flavo-limbatis; fascia lata supra alam utramque

transversa luride flavida; stria superciliari capitisque lateribus dilute sulfureis; gastraeo toto laete flavo; rostro nigro-fusco; iride fusca. — ♂ vestim. hiem. fere concolor, tantum supra multo obscurior, subtus flavior; iride vero coccinea signo certissimo.

Länge 15,7—16,4 cm. (6—6¼ Zoll); Flügel 8,5—8,7 cm. (3¼—3⅓ Zoll); Schwanz 5,2 cm. (2 Zoll).

Jugendkleid oberhalb hell grünlichgrau, jede Feder zart bräunlichgelb gesäumt; Augenbrauenstreif fahl graugelb; Schwingen dunkelbraun, schwach gelbbraun außen gesäumt und mit breiten weißgelben Innenfahnen; Flügeldeckfedern braun, heller gerandet, wodurch zwei Querbinden über jeden Flügel gebildet werden; untere Flügeldecken und Flügelrand weißlich graugelb; Schwanzfedern braun, mit hellen gelbbraunen Außensäumen; Kehle und Unterbrust gelblichweiß; Oberbrust bräunlichweiß; Bauch reinweiß; Seiten hell bräunlichgelb; Auge dunkelbraun; Schnabel und Füße röthlichbraun. Das Männchen färbt sich erst im dritten Jahre zum vollen Prachtkleide. (Verfärbung des jungen Männchens im zweiten Jahre: an der Oberseite dem Weibchen ähnlich, an der ganzen Unterseite rein zitrongelb; die schwarz und braune Zeichnung fehlt ihm noch ganz. Friedrich Schneider).

Juvenis: supra dilute olivaceo-canus, plumis quibusque subtilius luride limbatis; stria superciliari sordide flavida; pogonio remigum fuscorum exteriore subochraceo-limbato, interiore lato, flavente albo; tectricibus al. fuscis, dilutius submarginatis, qua pictura fascias duas ostendentibus transversas; tectricibus subalaribus et campterio luride albidis; rectricibus fuscis exterius subochraceis limbatis; gula et epigestrio flavido-albis; pectore fuscato-albo; ventre albissimo; hypochondriis fulvescentibus; rostro pedibusque badiis; iride fusca.

Beschreibung des Eies: Farbe hellgrün, zart braun gewölkt und am dickern Ende rothbraun gefleckt; Gestalt stark abgerundet. Länge 20 mm., Breite 14 mm. Nach Rchn. veränderlich nach dem Alter; beim jungen Weibchen auf hellblaugrünem Grunde mit hellrothbraunen Flecken bedeckt. Länge 21 mm.; Breite 15 mm. Später wird der Grund weiß und beim ganz alten Weibchen sind die Eier reinweiß ohne Flecke; Länge 24,5 mm.; Breite 16,5 mm.

Ovum: dilute viride, subfusco-nubilosum, apice crassiore badio-maculato; valde rotundatum. — Pro cetate variabile; femellae junioris laete glaucum, subrufo-maculatum; senioris fundo pure albo; pergrandis albissimum, immaculatum.

Der Larven-Webervogel [Ploceus larvatus*)].

Tafel X. Vogel 50.

Im Handel mit dem vorigen meistens verwechselt und auch viel seltner, gelangt er nur ausnahmsweise in die Vogelstuben oder Käfige der Liebhaber; in den zoologischen Gärten sieht man ihn hingegen zuweilen. Er ist dem Textorweber überaus ähnlich, doch „unterscheidet sich jener auf den ersten Blick durch den ganz schwarzen Kopf und den kastanienbraunen Nacken und Hinterhals. Dagegen ist es uns nicht gelungen, für die Weibchen und Winterkleider beider Arten das geringste sichre Unterscheidungskennzeichen aufzufinden. Die Bestimmung derselben wird also in allen Fällen umsomehr unsicher bleiben müssen, als die

*) Da S. 235 bereits ein Ploceus abyssinicus (abessinischer gelber Feuerweber) vorhanden ist, so muß ich hier auf eine jüngere Benennung zurückgreifen.

Maßverhältnisse ganz gleich sind." (Finsch und Hartlaub). Wenn die Leser jedoch die weiterhin gegebne wissenschaftliche Beschreibung des hierhergehörenden Weibchens vergleichen, so wird sich ein bemerkenswerther Unterschied zeigen.

Die Verbreitung erstreckt sich über das wärmere Abessinien, die Küstengebiete des rothen Meeres, die Nilquellenländer, und durch Speke und Kirk ist er auch in Ostafrika nachgewiesen; der erstre Forscher fand ihn bei Usaramo im Innern und der letztre im Sambesigebiete, hier im Februar nistend. Ueber das Freileben berichtet Heuglin: „In den meisten Theilen Abessiniens ist diese größte nordöstliche Weberart nicht selten; und zweifellos lebt sie hier als Standvogel, indem ich sie sowol in der Winterzeit (November bis März), als auch während der Regenzeit angetroffen habe. Sie ist dort von der Sancharküste westwärts bis zum Tana-See an geeigneten Orten häufig; doch lernte ich sie hier nur als Bewohner des Tieflandes kennen; ihre höchsten Standorte schätzte ich auf etwa 7000 Fuß Meereshöhe. In Habesch besuchte ich ihre Wohnbezirke zwischen den Monaten November und März und dann während der Regenzeit. Ihre Verbreitung wird hier den 16. Gr. nördl. Br. nicht überschreiten. Im Gebiet des weißen Nil dürfte sie vom Januar bis Juni anzutreffen sein; in den Urwäldern westlich vom Gazellenflusse beobachtete ich sie nur vom Beginn der eigentlichen Sommerregenzeit. Nach Vierthaler käme sie im Mai als Zugvogel bei Chartum vor, welcher Angabe ich aufs entschiedenste widersprechen muß. Auch sah ich von A. E. Brehm als hierher gehörig bezeichnete Eier vom Bar el azraq, welche aber sicherlich vom dottergelben Weber (Ploceus vitellinus) herstammten.*) Am untern blauen Fluß, sowie am weißen Nil, nördlich vom 10. Gr. nördl. Br., kommt dieser Weber bestimmt nicht vor; schwerlich im südlichen Senar und Fazoql. (Die von Brehm in seiner Reiseschilderung im Habesch S. 336 mitgetheilte Beschreibung nebst Angabe der Maße ist irrthümlich auf diese Art bezogen). Der Larvenweber lebt in größeren oder kleineren Gesellschaften, ist ein beweglicher, geschwätziger Vogel, garnicht scheu und selbst durch wiederholtes Schießen nicht von seinen Standorten zu vertreiben. Zur Winterzeit schweifen Schwärme oft weit im Lande umher, aber auch diese dürften allabendlich in ihre Heimat zurückkehren und die Nacht in den Beutelnestern zubringen. In Tigrié und Dembea bauen sie mit Eintritt der Regenzeit auf schwanken, oft überhängenden Aesten längs der Ufer von Wildbächen schöne, dichte und große Beutelnester aus dürren Grashalmen, fast ausschließlich auf dornigen Akazien, gewöhnlich etwa 2 bis 4,7 Meter hoch; zuweilen stehen deren sehr viele, immer aber wenigstens mehrere auf einem Baum. Das Innere ist mit zarten Würzelchen, Haaren u. drgl. ausgekleidet. Einmal fand ich zwei, dann drei Eier."

*) Die Leser wollen die Bemerkung auf S. 199 vergleichen.

Herr Gymnaſiallehrer Friedrich Schneider hatte, wie S. 286 erwähnt, in ſeiner Vogelſtube ein Weberweibchen, welches er nicht kannte und das nach meiner Ueberzeugung zu dieſer Art gehörte. Die Abweichungen, welche die wiſſenſchaftlichen Beſchreibungen deſſelben aus v. d. Decken's Reiſewerk III. und brieflich mitgetheilt von Herrn S. nebeneinander aufweiſen, dürften darin begründet ſein, daß die erſtre nach ausgeſtopften und die letztre nach dem lebenden Vogel gegeben iſt.

Der Larven-Webervogel oder Larvenweber iſt auch fälſchlich Maskenweber und von Rchb. gelblichgrüner Webervogel benannt.

Le Tisserin masqué; Great masked Weaver-bird; der holländiſche Name fehlt noch. — Ombala (wie die verwandten Arten; tigriſch).

Nomenclatur: Loxia abyssinica, *Gm.*; Ploceus larvatus, *Rpp.*, *Krk.*, *Sclt.*, *Kng.-Wth.*, *Lfbr.*; Ploceus flavo-viridis, *Rpp.*; Hyphantornis larvata et flavoviridis, *Gr.*; H. flavoviridis, *Br.*; Textor larvatus, *Bp.*; Ploceus larvatus et flavoviridis, *Hgl.*, *Rchb.*; Hyphantornis larvata et habessinica *Hgl.*; H. abyssinicus, *Fnsch.* et *Hrtl.*; H. habessinica, *Br.* — Gros-bec d'Abyssinie, *Buff.*; Abyssinian Grosbeack, *Lath.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberkopf bis Hinterkopf, Kopfſeiten, ganzes Geſicht und Kehle ſchwarz; Hinterkopf orangebraun; Schwingen dunkel olivenbraun, an der Außenfahne olivengelb geſäumt, an der Innenfahne breiter ſchwefelgelb gerandet; zwei breite gelbe Querbinden über den Oberflügel; auf jeder Schulter breite ſchwarze Längsbinden, die auf der Mantelmitte durch einen ſchmalen gelben Streif getrennt ſind; obere Schwanzdecken olivengrünlichgelb; Schwanzfedern olivengrünlichbraun, Außenfahnen grüngelb geſäumt, Innenfahnen breit ſchwefelgelb gerandet; Nacken, Rücken und Unterſeite nebſt unteren Flügeldecken hochgelb; Oberhals, unter der ſchwarzen Kehle orangebräunlich verwaſchen. Auge kaſtanienrothbraun; Schnabel ſchwarz; Füße röthlichfleiſchfarben. Weibchen: Kopf olivengrün, jede Feder mit bräunlichem Schaftſtrich; Kopfſeiten, Kinn und Kehle blaßſchwefelgelb; ein verwaſchner Zügelſtreif bis über's Auge; Nacken und übrige Oberſeite graulicholivenbraun, die Federn mit ſehr verwaſchenen helleren Säumen; Schwingen olivenbraun, an der Außenfahne olivengrüngelb geſäumt, innen ſchmal blaßgelb; Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne und am Ende fahlweiß geſäumt, ebenſo die größten oberen Flügeldecken, daher zwei weiße fahle Querbinden über den Oberflügel; untere Flügeldecken und Handrand gelb; Schwanzfeder olivengrünlichbraun mit olivengrünen Außenſäumen; Unterſeite von der Kehle an ſchmutzigweiß, auf Bauchmitte und den unteren Schwanzdecken reinweiß, an den Seiten bräunlich verwaſchen. Schnabel dunkel hornbraun; Auge ſchwarzbraun; Füße hornfarben. Männchen im Winterkleide übereinſtimmend, nur an der Oberſeite dunkler und an der Unterſeite mehr gelbweiß. Finſch und Hartlaub. (Oberhalb olivengrün, jede Feder gelb geſäumt; Augenbrauenſtreif, Saum der Innen- und Außenfahnen, der Schwung- und Steuerfedern, Flügelbug, zwei ſchmale Flügelbinden und ganze Unterſeite gummiguttigelb; Auge hell zinnoberroth; Schnabel ſchwarz, Unterſchnabel heller. Friedrich Schneider.)

Ploceus larvatus: pileo, regione ophthalmica et parotica, genis gulaque nigris; occipite rubido; pogonio remigum olivaceo-fuscorum exteriore luride flavo-limbato, interiore latius sulfureo-marginato; fasciis duabus latis supra alam superiorem flavis; vittis latis humeri utriusque nigris usque ad striam angustam flavam interscapilii medii interjectam; supracaudalibus olivaceo-virentibus; pogonio rectricum olivaceo-fuscarum exteriore virente flavido-limbato, interiore late sulfureo-marginato; cervice, dorso, gastraeo et tectricibus subalaribus luteis; gutture subfulvo lavato; cride castanea; rostro nigro; pedibus rubido-carneis. — ♀ capite olivaceo-viridi, subfusco-striolato; capitis lateribus, mento gulaque dilute sulfureis; stria lavata a loris usque ad regionem supeciliarem sulfurea; plumis cervicis et notaei

reliqui olivaceo-fuscatorum dilutius sublimbatis; pogonio remigum olivaceo-fuscorum exteriore ex olivaceo viride flavo-limbato, interiore anguste gilvo-marginato; pogonio exteriore apiceque tectricum al. mediarum et minorum denterarum sordide albo-limbatis, itaque fascias duas alae superioris transversas formentibus albidas; tectricibus subalaribus margineque manuale flavis; rectricibus olivaceo virente fuscis, exterius ex olivaceo viride limbatis; gastraeo sordide albo, ventre et subcaudalibus pure albis, latera versus subfusco-lavatis; rostro corneo-fusco; iride nigro-fusca; pedibus corneis. — ♂ vestim. hiem. simillimus sed supra obscurior subtusque magis flavido-albus (F. u. H.). Supra olivaceo-viridis, pluma quaque flavo-limbata; stria superciliari, pogonio remigum et rectricum utroque, flexura, fasciis duabus alarum angustis et gastraeo toto luteis; iride dilute cinnabarina; rostro nigro, mandibula pallidiore.

Länge: 15,7—17 cm. (6—6½ Zoll); Flügel 8,9—9,4 cm. (3⁵/₁₂—3⁷/₁₂ Z.); Schwanz 5,2 cm. (2 Z.).

Das Jugendkleid der S. 287 erwähnten Baſtarde von Textor- und Larvenweber ſtimmt im allgemeinen mit dem der jungen Textorweber überein; nur ſind die Schwungfedern an der Grundhälfte weißgelb, Außenſäume ebenſo. Hierdurch entſteht ein breiter heller Spiegel. Das eine Junge hatte faſt reinweiße Flügelfedern, nur die Schäfte und Spitzen derſelben waren braun, die Außenfahnen hellgelb. Die Flügelfedern der anderen waren braun mit gelben Rändern, wodurch zwei helle Binden über den Flügel gebildet wurden. (Fr. Schneider.)

Beſchreibung des Eies: Hellblaugrün; im übrigen den vorigen gleich.

Ovum: dilute aeruginosum, ceteroquin prioris aequale.

In der Familie der Gelbweber giebt es eine beträchtliche Anzahl von Arten, welche bisher noch nicht oder vielleicht nur ganz vereinzelt eingeführt worden, ſodaß ſie mir — während ich doch den geſammten Vogelhandel und Verkehr der Liebhaber unter einander, wie auch die Bevölkerung der zoologiſchen Gärten immer vor Augen habe — nur in den ſeltenſten Fällen entgangen ſein könnten. Dieſelben werde ich, ſoweit verläßliche Angaben vorliegen, wenigſtens kurz und überſichtlich ſchildern, vorbehaltlich einer eingehenden Beſchreibung und Abbildung derer, welche bis zum Schluß des Werks noch in den Handel gelangen.

Der Rieſen-Webervogel [Ploceus grandis] iſt der größte in dieſer Gruppe; an Kopf und Kehle ſchwarz, Nacken und Oberbruſt kaſtanienbraun; ganze Oberſeite gelblich-olivengrün, jede Feder mit zartem, dunklem Schaftſtrich; Flügel- und Schwanzfedern ſchwarz, blaßgelb geſäumt; Bürzel olivengrünlichgelb; ganze Unterſeite und untere Flügeldecken zitrongelb, Bruſt- und Bauchſeiten bräunlich; Schnabel glänzend ſchwarz; Auge kaſtanienbraun; Füße fleiſchfarben. Weibchen oberhalb olivengrünlichbraun, jede Feder fahl geſäumt; Augenbrauenſtreif und Geſicht bräunlichweiß; Kehle gelblichweiß; ganze Unterſeite ſchwach bräunlichweiß; Schnabel ſchwarzbraun, Unterſchnabel heller. — Länge 20,8 cm. (8 Z.); Flügel 10,9 cm. (4¹/₆ Z.); Schwanz 6,5 cm. (2½ Z.). — Heimat nur die Inſel St. Thomé. Ueber das Freileben iſt nichts bekannt und lebend eingeführt iſt er ſicherlich noch nicht. — Der Rieſen-Webervogel oder großer Weber (Rchb.). (Ploceus grandis, *Gr.*; P. collaris, *Frs.*, *All.*; Hyphantornis grandis, *Hrtl.* — St. Thomae-Weaverbird, *Fras.*).

Der Gürtel-Webervogel [Ploceus cinctus]. Dem Textorweber ähnlich, doch kleiner mit breitem, kaſtanienbraunem Querbande über Nacken, Schultern und

Brust. Auch etwa um ein Drittel kleiner. Weibchen ebenfalls nur durch geringere Größe verschieden. Die Heimat ist Westafrika (Gabun); du Chaillu entdeckte ihn am Kamerunflusse; weiter ist nichts über ihn bekannt. Er ist auch Halsbandweber (Br.) genannt. (Ploceus cinctus, *Css.*, *Hrtl.*; Hyphantornis cinctus, *Rchb.*).

Der schwarzstirnige Webervogel [Ploceus velatus]. Ueber einige entweder wirklich verschiedenartige und dann allerdings nahverwandte oder vielleicht nur als Lokalrassen zu unterscheidende Weber gehen die Ansichten der Forscher weit auseinander. Für die Liebhaber haben dergleichen kleine Verschiedenheiten selbstverständlich garkeine Bedeutung und ich darf daher nur soweit darauf Bezug nehmen, als es für die Leser nöthig ist, welche Hinweise zur weitern Belehrung verlangen. — Einen Vogel nach der folgenden Beschreibung stellt Heuglin als besondre Art hin und benennt ihn äthiopischer Gelbweber (Hyphantornis aethiops, *Hgl.*). Er gleicht in der Farbenvertheilung dem etwas größern Larvenweber; die schwarze Zeichnung auf der Stirn ist jedoch nicht soweit ausgedehnt, auf der Brust aber noch mehr herabgezogen; die Rückenmitte ist nicht so rein goldgelb und an ihrer Seite fehlen die großen schwarzen Flecke; Mantel lebhaft olivengelb, mit dunkleren Schaftstrichen; das satte Gelb von Oberkopf, Nacken, Halsseiten und Unterleib spielt etwas ins Grünliche und ist nach Kopf und Brust hin nur leicht orangebräunlich überlaufen. Weibchen oberhalb dunkel bräunlichgrün, unterhalb grünlichgelb, ohne schwarzes Gesicht. Finsch und Hartlaub dagegen erklären ihn als übereinstimmend mit dem schwarzstirnigen Weber und ziehen dann auch noch einen dritten (Hyphantornis mariquensis, *Grn.*) hinzu, während Heuglin meint, daß derselbe stets kleiner sei, einen schmalern Stirnrand und abweichenden Schnabel habe. Fallen alle drei zusammen, so erstreckt sich die Heimat über das westliche und südliche Afrika (Senegal, Kaffernland, Kapgebiet und Nonnaqua-Land). Ueber die Lebensweise ist nichts angegeben; dieselbe wird sicherlich der aller vorhin geschilderten Verwandten gleichen. Der schwarzstirnige Webervogel heißt bei Rchb. schwarzstirniger Kernbeißerweber und Schleierweber bei Br. (Ploceus velatus, *Vll.*, *Lchtst.*; Pl. aureicapillus, *Sws.*; Ploceolus nigrifrons, *Rchb.*; Hyphantornis nigrifrons, *Cb.*; H. nigrifrons, aureïcapillus et capitalis, *Lrd.*; H. aethiops, *Hgl.*; H. velatus, *Fnsch.*). — Als nahestehend sei auch eine neuerdings erst beschriebne Art, **Cabanis' Webervogel** [Ploceus Cabanisi] erwähnt, dessen Verbreitung sich über den Osten und Südwesten Afrikas erstreckt und der daher vielleicht auch bald lebend eingeführt wird. Er hat einen ganz schwarzen Kopf und ist etwas kleiner als die Verwandten. Von Rchb. wurde er schwarzköpfiger Kernbeißerweber genannt. (Hyphantornis Cabanisi, *Ptrs.*; H. mariquensis et capitalis, *Lchtst.*; Ploceolus capitalis, *Rchb.*). — Der **schwarzkehlige Webervogel** [Ploceus atrogularis] Heuglin's, welchen er als Zug- oder Strichvogel im Gebiet des Gazellen-Flusses beobachtete und zwar auch während der Brutzeit immer in einzelnen Pärchen mit großen, etwas hohen Beutelnestern aus frischen Grashalmen auf höheren Bäumen, wird von ihm als dadurch besonders auffallend bezeichnet, daß er bei schwarzem Gesicht und gleicher Kehle einen weißlichen Augen-

ſtern hat. Die Abbildung in dem Werke des Forſchers iſt vortrefflich. (Textor atrogularis, *Hgl.*; Hyphantornis atrogularis, *Hgl.*, *Kg.-Wrth.* [H. taeniopterus, *Rchb.*]).

— **Speke's Webervogel** [Ploceus Spekei]. „Dieſe offenbar meinem ſchwarzkehligen Webervogel am nächſten verwandte Art, wurde vom Kapitän Speke auf den Hochebenen des nördlichen Somali-Landes häufig angetroffen, wo ſie geſellig im Hochgras leben ſoll. Der von Speke erlegte und mitgebrachte Vogel befindet ſich in der Sammlung der aſiatiſchen Geſellſchaft von Bengalen zu Kalkutta" (Hgl.). Finſch und Hartlaub vereinigen übrigens die beiden letzteren zu einer Art. (Hyphantornis baglafecht, *Blth.* [nec *Vll.*], *Hrtl.*, *Scl.*, *Fnsch.*; H. somalensis, *Hgl.*; H. Spekei, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*).

Der **Prinzen-Webervogel** [Ploceus princeps]. Bisher nur auf den Prinzeninſeln, in Lagos, am Gabun und in Angola (Weſtafrika) beobachtet und geſammelt. Er dürfte in allen Eigenthümlichkeiten mit den Verwandten übereinſtimmen und auch in der Färbung iſt er nicht viel abweichend, außer daß der Oberkopf lebhaft rothgelb (hell zimmtbraun) iſt. Oberhalb olivengrünlichgelb, Flügel ſchwarzbraun, jede Feder heller geſäumt und mit gelber Querbinde; Kopf bis zum Nacken hell zimmtbraun, Zügelſtreif und Kopfſeiten zitrongelb; unterhalb hochgelb; Auge gelb, Schnabel braun. Größe des Textorwebers. Weibchen oberhalb olivengrünlichgelb, Kopfſeiten, Kehle und Bruſt reingelb; unterhalb reinweiß.. Rchb. benannte ihn Prinz-Feinweber. (Symplectes princeps, *Bp.*, *Css.* *Hrtl.*; Hyphantornis princeps, *Rchb.*).

Der Brillen-Webervogel [Ploceus ocularius].

Es würde ſich kaum verlohnen, dieſe im Handel überaus ſeltne Art hier mit aufzuführen; da dieſelbe jedoch im Berliner Aquarium und dann auch im zoologiſchen Garten von Berlin mehrmals vorhanden geweſen, ſo läßt ſich annehmen, daß ſie demnächſt auch in die Vogelſtuben gelangen werde, und ich will wenigſtens die geringen Angaben mittheilen, welche über ſie zu finden ſind.

In der Geſtalt und Größe gleicht ſie dem Textorweber und den Verwandten, auch die Färbung iſt im allgemeinen übereinſtimmend, aber Oberkopf und Kopfſeiten ſind nur bräunlich und der ſchwarze Zügelſtreif und ein ebenſolcher Strich durchs Auge geben ihr ein abſonderliches Ausſehen.

Die Verbreitung erſtreckt ſich über einen großen Theil Afrikas, denn der Vogel wurde ſowol im Weſten (Senegambien, Goldküſte, Sierra Leone, Gabun), als auch im Süden und Südoſten (Kapkolonie, Natal und Mozambique) beobachtet und geſammelt. Reichenow ſah ihn häufig in der Kamerungegend und lernte ihn dort als einen Vogel kennen, welcher nur zeitweiſe in die Ortſchaften kommt, um die Piſang-Pflanzungen zu beſuchen, wo er die einzelnen Gebüſche durchſchlüpft, ſich ſonſt von dem Menſchengetümmel fernhält und auf den mit Dornbüſchen überwucherten Brachfeldern, an freien Berglehnen oder in Haidegegenden ein

einsames, stilles Dasein führt. „Ich habe ihn niemals in großen Gesellschaften erblickt, in der Regel nur das Pärchen allein oder in Begleitung der schon flüggen Jungen. Sie scheinen die Geselligkeit nicht besonders zu lieben und zeigen ein scheues Wesen, welches sehr von dem allgemeinen Charakter der Gelbweber abweicht. Selten sieht man den Vogel frei auf Bäumen, gewöhnlich nur im dichten Gebüsch. Uebrigens ist er nicht weniger schön, als seine Verwandten. Den Jams- und Kokusfeldern folgend, streicht er bis zu beträchtlicher Höhe; im Kamerungebirge fand ich ihn 470 Meter hoch. Die Nester hängen, seiner Lebensweise entsprechend, einzeln in geringer Höhe über dem Boden an Oelpalmen oder im Gebüsch. Es sind hübsche, feste Bauten von Retortenform. Die ovale Nisthöhle hat einen Höhendurchmesser von 12 cm. und einen Querdurchmesser von 18 cm. Die Länge der Schlupfröhre beträgt 19 cm. von der obern Nestwandung an; ihr Durchmesser ist 5 cm. Die Schlupfröhre zeigt einen vollständig abgeschlossenen Rand, was ich hervorhebe, da das bei ähnlichen Bauten der Gesellschaftsweber nicht der Fall ist. Der Baustoff besteht in rundem, trocknem, nicht sehr geschmeidigem Grase. Der tragende Zweig ist in die obere Nestwand eingewebt. Gelege zwei Eier."

Eingeführt wird dieser Weber nur äußerst selten und in wenigen Köpfen von Hagenbeck, Gudera und Jamrach und da man bisher nicht besondres Gewicht auf solche einzelnen Vögel zu legen pflegte, so steht der Preis gewöhnlich nicht höher, als der des Textor- und goldstirnigen Webers. Hinsichts seines ganzen Wesens, in der Verpflegung u. s. w. darf das beim dottergelben Weber Gesagte gelten.

Der Brillen-Webervogel oder Brillenweber wurde von Rchb. augenstreifiger Feinweber und Kurzflügelweber benannt.

Le Tisserin à lunettes; Spectacled Weaver-bird.

Nomenclatur: Ploceus ocularius, *Sn.*; P. brachypterus, *Swns., Frs.*; P. flavigula, *Hrtl.*; Hyphantornis ocularius et brachypterus, *Gr., Hrtl., Bp., Rchb.*; H. brachypterus, *Rchn.*; Hyphanturgus ocularius et brachypterus, *Cb.*; H. ocularius, *Grn., Lrd., Fnsch.* et *Hrtl.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberkopf und Kopfseiten bräunlichorange; schmaler Zügelstreif vom Nasenloch bis zum Auge, ein Strich durch das letztre bis auf die Schläfe, Kinn und Kehle schwarz; Kopfseiten bräunlichorange, Kropf blasser; Flügel und Schwanz olivengelbgrün, Schwingen dunkel olivenbraun, Außenfahnen olivengelbgrün, Grundhälfte der Innenfahnen blaß schwefelgelb gerandet; Schwanzfedern olivengelbgrün, unterseits glänzender olivengelb; Unterseite nebst den unteren Flügeldecken lebhaft gummiguttgelb. Schnabel glänzend schwarz; Auge gelbroth; Füße bräunlich. — Weibchen wie das Männchen, aber am Oberkopf olivengelbgrün wie die übrige Oberseite; ein Längsstrich über die Zügel und das Auge bis zu den Schläfen hochgelb wie die Kopfseiten und die übrige Unterseite; Strich auf den Zügeln und durch das Auge schwarz; das Schwarz an Kinn und Kehle fehlt; Schnabel schwärzlich; Auge dunkelbraun.

Ploceus ocularius: pileo capitisque lateribus e fusco aurantiis; stria angusta a loris per oculum usque ad tempora, mento gulaque nigris; gutture

subfusco-aurantio, latera versus obscuriore; alis caudaque ex olivaceo flavo-viridibus; pogonio remigum olivaceo-fuscorum exteriore luride flavo-viridi; basi poginii interioris usque ad dimidium pallide subfureo-marginata; cauda ex olivaceo flavo-viridi, subtus nitidius lurida; gastraeo cum tectricibus subalaribus laete luteis; rostro nitido-nigro; iride aurantia; pedibus fuscatis. — ♀ mari simillima, sed pileo ex olivaceo flavo-viridi ab notaeo reliquo haud discrepante; stria supra lora oculumque usque ad tempora, capitis lateribus et gastraeo reliquo luteis; stria altera secundum lora per oculum nigra; mento gulaque nigro vacuis; rostro nigricante; iride fusca.

Länge etwa $15_{,7}$ cm. (6 Z.); Flügel $7_{,8}$ cm. (3 Z.); Schwanz $5_{,7}$ cm. ($2^1/_6$ Z.).

Beschreibung des Eies: Auf blaß blaugrünem oder weißem Grunde (ändert auch wol nach dem Alter ab) mit feinen hellrothbraunen Flecken. Länge $21_{,5}$ mm.; Breite 14 mm.

Ovum: subaeruginosum vel albidum maculis subrufis.

Der gelbscheitelige Webervogel [Ploceus spilonótus].

Herr Friedrich Schneider schrieb mir im Jahre 1874, daß er von Fräulein Hagenbeck auch diese Art erhalten habe. Die auffallend scheuen und stillen Vögel zeigten jedoch nicht einmal ihre Baukünste; sie sind vielleicht von der Reise her krankhaft gewesen und bald zugrunde gegangen. Ich habe sie niemals erlangen können und glaube auch, daß sie weder vor- noch nachher eingeführt worden. Die Verbreitung ist eine sehr bedeutende und erstreckt sich nach Finsch und Hartlaub über die südöstlichen Theile der Kapkolonie (Smith), Kuruman (Layard), Kaffernland (Berliner Museum), Windvogelberg (Wulger), Natal (Ayres), Mozambique (Biankoni und Berliner Museum); nach Swainson findet dieser Weber sich auch im Westen Afrikas am Senegal. Es läßt sich daher wol mit Bestimmtheit annehmen, daß er demnächst auch in größerer Anzahl in den Handel kommen wird.

In der Färbung gleicht er den Verwandten mit schwarzem Gesicht, doch ist er besonders an kreisrunden gelben Flecken auf dem schwarzen Rücken zu erkennen. Reichenbach hat ihn zweimal abgebildet und beschrieben und zwar als P. spilonotus und P. cyclospilus, welche Finsch und Hartlaub als nicht verschieden erklären. Ueber seine Lebensweise sind von den genannten Forschern und namentlich von Biankoni ausführliche Mittheilungen gemacht; sie stimmt im wesentlichen mit der des Textorwebers u. a. überein. Das Nest ist ebenfalls aus Grasblättern erbaut, fast von nierenförmiger Gestalt und sehr dicht geflochten; es hängt an Baumzweigen überm Wasser. Die Eier sollen einfarbig blaugrün sein. Näheres ist nicht bekannt.

Der gelbscheitelige Webervogel oder gelbscheitelige Weber ist auch Goldscheitelweber (Br.), rückenmondfleckiger Weber und rundfleckiger Weber (Rchb.) benannt.

Le Tisserin a taches rondes; Circle-spotted Weaver-bird.

Nomenclatur: Ploceus spilonotus, *Vgrs.*, *Lrd.*, *Sclt.*, *Bncn.*; Pl. stictonotus, *Smth*; Pl. flaviceps, *Swns.*; Pl. spilonotus et cyclospilus, *Rchb.*; Textor spilonotus, *Bp.*; Hyphantornis spilonotus, *Lchtst.*, *Gr.*, *Hrtl.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn, Ober- und Hinterkopf, sowie Halsseiten dunkel gummiguttgelb; Zügel, Backen und Oberkehle schwarz, an der letztern im spitzen Winkel nach der Brust zu; Hinterhals, Mantel und Schultern schwarz, jede Feder mit olivengelbem, rundem Fleck am Ende, Schulterdecken hochgelb umsäumt und daher der ganze Oberrücken vorherrschend gelb mit Schwarz gefleckt, der Mittelrücken und Bürzel dagegen mehr einfarbig hochgelb erscheinend, Deckfedern und Schwingen grünlichschwarzbraun mit gelben Außensäumen, eine gelbe Querbinde über den Oberflügel, Schwingen an der Innenfahne breit olivengrünlichgelb gerandet; Schwanzfedern olivengrünlichbraun, außen grünlich, innen gelblich gesäumt, mit zarten dunklen Querlinien; ganze Unterseite dunkel gummiguttgelb, untere Flügel- und Schwanzdecken heller gelb. Schnabel schwarz; Auge scharlachroth; Füße röthlichbraun. — Weibchen (nach Bianconi): Oberhalb braun; obere Flügeldecken fast schwarz mit weißgelben Säumen; Brust grau; Seiten braun; unterhalb weißlich; Kehle rostfarben angeflogen.

Ploceus spilonotus: fronte, pileo, occipite, colli lateribus obscure luteis; loris, genis gulaque cum taenia acutangula ad pectus vergente nigris; pluma quaque cervicis, interscapitalii et scapularium nigrorum luteo-limbata, quare dorso superiore imprimis flavo, nigro-maculato; tergo et uropygio magis unicoloribus luteis; pogonio tectricum al. et remigum exteriore virente nigro-fuscorum flavo-limbato; fascia transversa alae superioris flava; pogonio remigum interiore late ex olivaceo viride flavo-marginato; rectricibus olivaceo-fuscis, exterius viride, interius flavido-limbatis, subtiliter obscurius undulatis; subtus obscure luteus, tectricibus subalaribus et infracaudalibus dilutius flavis; rostro nigro; iride pemicea; pedibus rufescentibus. — ♀ supra brunnea, tectricibus al. subnigris, gilvo-limbatis; pectore cinereo, latera versus brunneo; subtus albicans; gula ferruginoso-affiata.

Länge $18{,}3^{cm.}$ (7 Z.); Flügel $9{,}1^{cm.}$ (3½ Z.); Schwanz $6{,}7^{cm.}$ ($2^{7}/_{12}$ Z.).

Der schwarzhäuptige Webervogel [Ploceus nigriceps] unterscheidet sich von dem vorhin beschriebnen nahverwandten gelbscheiteligen Weber durch die Kopffärbung, welche eben ganz schwarz ist. Oberhalb hochgelb, schwarz gefleckt; Flügel dunkel grünlichbraun, jede Feder heller gesäumt und mit fahler Querbinde; ganzer Kopf, Nacken und Kehle schwarz. Unterseite reingelb. Das Weibchen ähnelt außerordentlich dem des Larvenwebers, ist jedoch besonders an der geringern Größe zu erkennen und hat einen lebhafter zitrongelben Augenbrauenstreif. Oberhalb olivengrünlichbraun, unterhalb gelb, mit breiter, heller Querbinde über dem Flügel. Größe des Textorwebers. — Heimat Südosten Afrikas (Kuruman, nördlich vom Gariepfluß und Mozambik); neuerdings erhielten Finsch und Hartlaub durch Barbozu du Bocage in Lissabon auch ein Pärchen aus Südwestafrika und zwar vom Rio Chimba in Benguela. Das Weibchen zeigte kaum eine Spur des hellen Augenstreifs. (Hyphantornis nigriceps, *Lrd.*, *Sprlng.*, *Sndvll.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*).

Der goldstirnige oder olivengrüne Webervogel [Ploceus olivaceus].

Von den beiden vorigen im Prachtgefieder auf den ersten Blick dadurch zu unterscheiden, daß er keinen schwarzen, sondern einen hellgoldbronzefarbnen Vorderkopf hat, zählte er bis vor kurzem zu den seltensten Erscheinungen des Vogelmarktes und seine erste Einführung gehört sicherlich der neuesten Zeit an, obwol nicht mit Bestimmtheit angegeben werden kann, wann und von wem er zuerst in den Handel gebracht worden.

Er ist bemerkbar größer als der Textor, zugleich gedrungner und kräftiger; der Schnabel ist länger und spitzer.

Seine Heimat erstreckt sich über Senegambien und Südafrika, doch kommt er auch in Ostafrika vor. Rüppell machte zuerst darauf aufmerksam, daß er auch in Senar und Ostabessinien zu finden sei und Lefebvre beobachtete ihn in Adowa in Tigrien. Heuglin sah nur einzelne Exemplare nach der Regenzeit an Bachufern und er behauptet, daß der im Osten lebende Vogel von dem im Süden heimischen kaum abweicht. Gegen Mitte des Monats Juni wird das Nest an überhängenden Zweigen an den Ufern der Wildbäche erbaut. Es besteht äußerlich aus Halmen von Halb- oder Cypergräsern, innerlich aus solchen von Liebesgras (Tiéf; Eragrostis) und hat die Größe von etwa zwei Mannesfäusten. Reichenbach fügt noch einige Bemerkungen hinzu, von denen er freilich nicht angiebt, woher sie entnommen sind: „Der Vogel ist über Afrika sehr verbreitet; man sieht Trupps von 10 bis 40 Köpfen an Zäunen, Sümpfen und Flüssen. An den Aesten der Büsche und Bäume hängen sie ihre Nester auf, oft fünf bis sechs an einem Zweige beisammen. Dieselben bestehen aus steifem Grase und sind so mühsam geflochten, daß der Bau oft mehrere Wochen erfordert. Sie sind birnförmig, ihr Flugloch nach oben (?) aber abwärts gerichtet. In der Regel hängen sie über dem Wasser. Während der Brutzeit und noch Monate nachher halten sich die flüggen Jungen auf den Zweigen der Nistbäume auf, auch verjagt kehren sie zu denselben wieder zurück. Außer dieser Zeit verbreiten sie sich weiter." Hiermit sind alle Angaben über das Freileben erschöpft.

Im Jahre 1873 hatte Fräulein Chr. Hagenbeck einige Pärchen nebst anderen seltenen Vögeln vom Kap erhalten und dieselben wanderten nun in mehrere Vogelstuben. Vor- und bis jetzt auch nachher wird wol keine größre Anzahl von diesen Webern herübergebracht sein. Herr Aug. F. Wiener theilte sodann zuerst seine Beobachtungen in der „Gefiederten Welt" mit. Das eine Männchen erbaute fleißig zahlreiche Nester, doch waren dieselben sämmtlich gleich und es zeigte sich kein sog. Vergnügungsnest darunter. Zwei Weibchen nisteten in denselben erbrüteten und zogen ihre Jungen auf, während ein andres Männchen bekämpft und in die Flucht geschlagen wurde. Auch bei dieser Art dürften daher die Männchen in Vielweiberei leben. Herr Friedrich Schneider hält ihn für den schnellsten und gewandtesten Flieger unter allen Webervögeln und schildert ihn weiter in folgendem: „er weiß mit seinem spitzen Schnabel, welcher dünn und scharf wie der eines Stars ist, sehr gewandt Gewürm aufzulesen, erschnappt auch Fliegen im Fluge und nimmt sogar anderen Vögeln derartiges vor oder aus dem Schnabel fort. Bei solcher Räuberei wendet er eine besondre List an; er packt nämlich einen kleinen, schwächern Vogel an einem Flügel und läßt ihn solange zappeln, bis derselbe den erhaschten Mehlwurm fallen läßt, welcher dann

ihm zur Beute wird. In meiner Vogelstube erbaute er an einem dicken, selbst geflochtnen Seile schöne freihängende Nester. Bei dieser Arbeit umwickelte er zunächst einen Zweig bis zur Spitze und darüber hinaus, wenn derselbe lothrecht herabhing, aber nur einen Theil desselben, wenn er horizontal stand. Darauf wurden lang herabhängende Fäden in die Umwicklung geflochten und zu einem Seile verarbeitet. Das Ende desselben wurde trichterförmig erweitert und schließlich zu dem eigentlichen Nistraum ausgebaut. Soweit stellte das Männchen den Bau her; die Ausführung und Ausfütterung des Nestes dagegen fiel dem Weibchen zu. Dieses schleppte tagelang große Massen von Federn, Gras- und Rohrrispen, Watte, Wolle, Scharpie u. drgl. zusammen und filzte damit die Nestwandung zolldick, indem es sowol innen als auch außen arbeitete. Das Gelege bestand jedesmal aus 2 Eiern. Die Brut ging zugrunde, weil Papageien das Nest zerstörten."

Sonderbarerweise stimmen die Angaben vieler anderen Züchter, welche diesen Weber in der Vogelstube gehabt, hinsichtlich des Nestbaues mit denen Schneider's sämmtlich nicht überein. Wie bei ihnen allen — Wiener in London, Elsner in Berlin, Scheller in Hamburg und Karl Masius in Schwerin — hat dieser Vogel auch bei mir stets ein ganz andres Nest gebaut. Dasselbe gleicht im wesentlichen dem S. 284 beschriebnen des Textorwebers und besteht aus denselben Baustoffen; nur ist es beträchtlich größer. Der Vogel nistet noch zuverlässiger als alle Verwandten und er ist daher auch bereits mehrfach gezüchtet. Leider sind keine eingehenden Beobachtungen über die Brut veröffentlicht worden und ich kann dieselbe ebenfalls nicht schildern, da ich durch Krankheit behindert war, Aufzeichnungen zu machen. Im ganzen Wesen stimmt er mit dem Textorweber überein, doch ist er nicht so sehr bösartig, denn während ein altes Pärchen in meiner Vogelstube seine Brut erzog, wurden trotzdem die Jungen in mehreren Prachtfinkennestern glücklich flügge. An kräftiger Ausdauer in der Gefangenschaft dürfte er noch alle Verwandten übertreffen. Preis 45 bis 60 Mark für das Paar.

Der goldstirnige oder olivengrüne Webervogel ist auch Kaffern- und Kapweber benannt und heißt bei Rchb. Kap- und goldstirniger Oriolin.

Tisserin à front d'or; Olive Weaver-bird.

Nomenclatur: Icterus olivaceus, *Hhn.*; Icterus cafer, *Lchtst.*; Ploceus aurifrons, *Tmm.*, *Lss.*, *Rpp.*, *Grll.*; Ploceus icterocephalus, *Swns.*; Oriolus capensis, *Gm.*; Ploceus capensis, *A. Smth.*; Ploceus abyssinicus, *Cv.*, *Lss.*; Ploceus aureus, *Lfbr.*; Oriolinus capensis et aurifrons, *Rchb.*; Hyphantornis capensis et aurifrons, *Bp.*, *Layard*; Hyphantornis aurifrons, *Fnsch.*, *Hrtl.*, *Hgl.*; Hyphantornis olivacea, *Hgl.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberkopf bis zum Zügel lebhaft röthlichbraungelb; Hinterkopf mehr olivengrünlich, Zügel und Kopfseiten olivenbräunlich, am dunkelsten am Mundwinkel; Oberseite vom Hinterkopf bis zu den Oberschwanzdecken dunkel olivengrün, jede Feder in der Mitte bräunlich; Schwingen und deren obere Deckfedern braunschwarz mit olivengelbgrünen Außen- und bräunlichen Innensäumen; die Ränder bilden eine schmale grüngelbe Binde; Schulterrand zitronengelb; untere Flügeldeckfedern grüngelb mit zitronengelben Rändern; Schwanz-

federn olivengrün mit zitronengelben verwaschenen Rändern; Halsseiten und Kehle sowie die Oberbrust rothbräunlichorange; die übrige Unterseite bis zu den Unterschwanzdecken zitrongelb. Auge blaßgelb, fast weißlich. Schnabel braun mit hellen Schneiden, nach der Spitze zu dunkler; Füße röthlichbraun. Weibchen: schmaler Augenbrauenstreif hell olivengrün; ganze Oberseite dunkelolivengrün; Flügelrand gelb; Kopfseiten, Kehle und Oberbrust, sowie ganze Unterseite hell gelblicholivengrün; Auge blaßgelb, schwach ins Bräunliche übergehend; Schnabel und Füße röthlichbraun. Männchen im Winterkleide übereinstimmend, doch etwas dunkler und bemerkbar größer.

Ploceus olivaceus: pileo usque ad lora laete fulvo; occipite magis olivaceo-viridi; loris capitisque lateribus olivaceo-fuscatis, angulos oris versus obscurioribus; supra obscure olivaceo-viridis, pluma quaque media subfusca; pogonio remigum eorumque tectricum fusco-nigrorum exteriore luride viride, interiore fuscoscente limbatis, itaque fasciam angustam formantibus viride flavam; margine humerali citrino; infracaudalibus virente flavis citrino-marginatis; rectricibus olivaceo-viridibus subcitrino-marginatis; colli lateribus, gula pectoreque e fulvo aurantiis; gastraeo reliquo citrino; iride gilva, fere albida; apice rostri fusci obscuriore, tomiis dilutioribus; pedibus castaneis. — ♀ supra obscure olivaceo-viridis, capitis lateribus, gula, pectore totoque gastraeo luride virentibus; iride gilvo-fuscescente; rostro pedibusque subbadiis. — ♂ vest. hiem. simillimus, at paululum obscurior et major.

Länge 18,3 cm. (7 Zoll); Flügel 9,4 cm. ($3^7/_{12}$ Z.); Schwanz 5,9—6,5 cm. ($2^1/_4$—$2^1/_2$ Z.). (L. 17,6 cm.; F. 11,4 cm.; Schwanz 5,7 cm. F. Schneider).

Jugendkleid: Unbekannt. Juvenis ignotus.

Beschreibung des Eies: Gestalt länglich, auf grünlichem oder weißlichem Grunde mit rostbraunen, am stumpfen Ende zusammengedrängten Flecken (Rüppell). Die südafrikanischen Eier sind einfarbig spangrün (in F. Schneider's Vogelstube waren die Eier dunkelblaugrün); Länge 22 mm.; Breite 14 mm.

Ovum: longiusculum, viridulum vel albidum maculis ferrugineis, apicem obtusum versus crebrioribus (*Rüpp.*). Ova ex Africa meridionali unicoloria ceruginosa; talia ex fetura cubiculari obscure coerulescente viridia (*Ahn.*).

Der **goldgelbe Webervogel** [Ploceus aureoflavus]. In den Färbungsverhältnissen dem goldstirnigen Weber ähnlich, doch nach Heuglin beiweitem kleiner, kaum der Größe des dottergelben Webers gleich, mit kräftigerm Schnabel und vor dem Auge mit einem kaum bemerkbaren schwärzlichen Fleck. Finsch und Hartlaub lassen mehrere von verschiedenen Schriftstellern aufgestellte Arten: Gold-Webervogel, P. aureus [*Natt.*], Einfarbiger Webervogel, P. concolor [*Heugl.*], als völlig übereinstimmend zusammenfallen. Der Vogel ist an Kopf, Kopfseiten, Kinn und Kehle dottergelb; oberseits olivengelb; Bürzel lebhafter gelb; Schwingen und Deckfedern blaß olivenbräunlich, mit gelben Außenrändern, sodaß der zusammengelegte Flügel einfarbig gelb erscheint; Schwanzfedern olivengelb mit blaßgelben Innenfahnen; ganze Unterseite gummiguttgelb; Schnabel schwarz; Auge rothbraun; Füße röthlichhornbraun. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite olivengrünlichgelb, Rücken und Flügel sind dunkler; Kopf und ganze Unterseite sind gelb. Als Heimat ist bis jetzt nur Ostafrika bekannt; Bojer, Kirk und v. d. Decken erlegten ihn auf Sansibar und Peters auf Mozambik. Der erstre Forscher fand das Nest unter den Blättern einer Kokuspalme an einem langen Strick von Cypergras be-

festigt. Er wird auch Goldgilbweber (Br.), goldgelber Gilbling und fast goldgelber Pirolin (Rchb.) genannt. (Ploceus aureoflavus, *Smth.*; Textor aureiflavus, *Bp.*; Hyphantornis aureoflava, *Gr.*; H. aurea, *Ntt.*, *Hrtl.*, *Cb.*; H. aureoflavus et subaureus, *Hrtl.*; concolor, *Hgl.*, *Fnsh.*; H. aureoflava, *Hgl.*; Mnama auf Sansibar). — Naheſtehend, aber keineswegs übereinſtimmend iſt nach Finſch und Hartlaub der an Kinn und Oberkehle kräftig röthlichkaſtanienbraun gefärbte **Pommeranzengelbe Webervogel** [Pl. aurantius, *Vll.*; P. Royrei, *Vrr.*], der ſich auf den erſten Blick durch die dunkel olivenbraungelbe Färbung des Mantels und der Schultern unterſcheidet. Heimat Kongo. Weiter iſt nichts über ihn bekannt. Rchb. nannte ihn orangefarbiger Feinweber. — **Bojer's Webervogel** [Ploceus Bojeri]. „Dem goldgelben Weber nahe verwandt, iſt er jedoch durch die viel dunklere Färbung des Kopfs, Kinns und der Kehle, die eigenthümliche Federſtruktur an dieſen Theilen, welche kurz, wie bei manchen Feuerfinkenarten, dabei aber ſtarr iſt, und den ſchwächern, kürzern Schnabel durchaus verſchieden. Er wurde im Jahre 1824 durch den verdienſtvollen Forſcher W. Bojer auf Sanſibar entdeckt und Baron v. d. Decken erlegte ihn dort ebenfalls, ſowie auf der gegenüberliegenden oſtafrikaniſchen Küſte" (Finſch und Hartlaub). Es läßt ſich erwarten, daß auch dieſer Weber demnächſt lebend eingeführt wird. (Zitronvogel (v. d. Decken); (Xanthophilus aureoflavus, *Rchb.*; Hyphantornis Bojeri, *Cb.*, *Hrtl.* et *Fnsch.*)

Der kaſtanienbraune Webervogel [Ploceus castáneo-fuscus].

Tafel X. Vogel 51.

Bis vor kurzem gehörte der Fuchsweber zu den äußerſt ſeltenen Erſcheinungen im Handel; jetzt wird er hin und wieder eingeführt, doch darf man ihn keineswegs zu den häufigeren Vögeln zählen. Die Weibchen ſind nur gelegentlich vorhanden und richtige Pärchen von dieſer Art findet man daher in wenigen Sammlungen.

Es iſt ein hübſcher Vogel, der ſich von allen Verwandten dadurch unterſcheidet, daß er am Rumpf ſchön kaſtanienbraun gefärbt erſcheint, während Kopf, Hals, Oberbruſt, Flügel und Schwanz tiefſchwarz ſind und das grelle, hellgelbe Auge ihm ein abſonderliches Ausſehen giebt. Größe ein wenig geringer als die des Textorwebers.

Die Heimat beſchränkt ſich auf Weſtafrika. Heuglin hat ihn in Nordoſtafrika nicht geſehen und erachtet daher die Angaben, daß er dort vorkomme, z. B. von Graf Reyneval, welcher ihn auch in Nubien bemerkt haben will, als irrthümlich und in Verwechſelung mit dem rothbraunen Weber (P. rubiginosus) beruhend. Mit Sicherheit ſind nur folgende Bezirke anzugeben, in denen er lebt: St. Pauls-Fluß im Sierra-Leone-Gebiete, Rio Bontry, Gabun, Aſchanti, Goldküſte, Fanti-Land. Reichenow traf ihn an der Goldküſte als Brutvogel bei Abokobi. „Die Neſter in Kolonien an Büſchen oder Bambus in der Höhe von 1,6 bis

6,3 Meter hängend, glichen in der Gestalt ungefähr denen des dottergelben Webers (siehe den nächsten), doch sind sie länger im Verhältniß zur Höhe. Der Bau ist bedeutend loser und lockrer. Nur zwei Eier scheinen das Gelege auszumachen. Buschige Ebenen bilden ausschließlich den Aufenthaltsort." Nähere und eingehendere Mittheilungen sind über diesen Vogel weder in der älteren noch neueren Literatur zu finden. In seiner Lebensweise stimmt er zweifellos mit den vorigen überein, wie dies die Beobachtung in der Gefangenschaft bereits ergeben hat. Er ist nicht ganz so stürmisch als der Textorweber und sein Liebesgesang erschallt nicht so ohrenzerreißend. Ich habe ihn in der Vogelstube leider nicht gezüchtet, dagegen ist dies von Herrn Fr. Schneider geschehen, welcher aber auch nur wenig sagt: „über das Nest und die Nistweise kann ich nichts Besondres berichten. Das erstre ist etwas kleiner als das des Textorwebers, mit etwas längerer Flugröhre." Nach Reichenow's Beschreibung ist das Nest in der Freiheit ohne Flugröhre und ein solches, welches ein lediges Männchen in meiner Vogelstube gebaut hatte, zeigte davon ebenfalls keine Spur. Bei den vorhergehenden Arten habe ich indessen schon darauf hingewiesen, daß dieselben, so namentlich der Textor, beim Nestbau in der Gefangenschaft von dem in der Freiheit zuweilen ganz auffallend abweichen, indem sie niemals einen Strang anfertigen, an welchem das Nest hängt und fast regelmäßig auch mit Vorliebe Agavefasern als Baustoff wählen; in der Beschaffenheit der letzteren dürfte dann wol am meisten die absonderliche Gestalt der Nester begründet liegen. Schneider giebt noch an, daß sein Fuchswebermännchen das Prachtkleid länger als zwei Jahre trug, indem es im April schwach mauserte und wieder schwarze und braune Federn erhielt; auch blieb der Schnabel unverändert schwarz. In allem übrigen gleicht der Vogel seinen Verwandten. Preis 24 bis 30 Mark für das Pärchen.

Der kastanienbraune Webervogel wird auch Fuchsweber und braunrother Weber genannt. (Die letztre Bezeichnung ist hier aber falsch, weil sie dem nächstfolgenden mit größerm Recht gebührt).

Le Tisserin brun-noir; Chestnut-backed Weaver-bird; Kastanjebruin Wever (holländisch).

Nomenclatur: Ploceus castaneo-fuscus, *Lss.*, *Cv.*, *Rchb.*, *Hrtl.*; Textor castaneo-fuscus, *Bp.*; Hyphantornis castaneo-fusca, *Gr.*, *Shrp.*, *Hgl.*, *Rchn.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Nacken, Hals, Kehle und Oberbrust, Flügel und Schwanz schwarz, Schwingen und Schwanzfedern jedoch mehr bräunlichschwarz; Schultern, Rücken, Bürzel, Unterbrust, Bauch, Hinterleib und Unterschwanzdecken kastanienbraun, die Schultern schwarz gezackt. Schnabel schwarz; Auge schwefelgelb; Füße röthlichbraun. — Weibchen an Oberkopf und Nacken dunkelbraun, jede Feder olivengrün gesäumt, Rücken- und Flügeldeckfedern ebenso, gelbbraun gesäumt; Bürzel und Oberschwanzdecken rostbraun; Hals und Brust gelblichisabellfarben; Mitte des Bauchs reingelb, Seiten und Unterschwanzdecken isabellfarben, erstere unten rothbräunlich schimmernd; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, erstere mit schmalen, hellen Außensäumen; Unterflügeldecken grau, gelblich gesäumt; Schnabel schwarz; Auge hellgelb;

Füße hornbraun. (Rchn). — Männchen im Winterkleide ebenso, nur an dem feuriger gelben Auge zu erkennen.

Ploceus castaneo-fuscus: castáneo-fuscus; capite, cervice, collo gula, alis caudaque nigris; remigibus et rectricibus paululum fuscátis; scapularibus nigro-dentatis; rostro nigro; iride sulfurea; pedibus rufis. — ♀ et ♂ vest. hiem. supra luride fuscescentes; fuscia lata alarum obscure virente fuscarum lurida; stria superciliari gilva; iride ♀ flavida, ♂ obscuriore; rostro fusco-nigro.

Länge kaum 15,7 cm. (etwa 6 Z.); Flügel 7,8 cm. (3 Z.); Schwanz 5,7 cm. (2 1/6 Z.).

Jugendkleid: Nach Fr. Schneider dem Weibchen des Textorwebers sehr ähnlich, jedoch ein wenig dunkler.

Juvenis: Pl. melanocephalo ♀ simillimus, sed paululum obscurior.

Beschreibung des Eies: Reinblau; Länge 23—24,5 mm.; Breite 15,5—16 mm. (Rchn.); blaugrün, doch das Blau mehr vorherrschend (Schn.).

Ovum: coeruleum, aeruginosum.

Der **rothbraune Webervogel** [Ploceus rubiginosus] ähnelt dem vorigen in Färbung und Größe, ist aber heller rothbraun, nur mit schwarzem Kopf; er wurde von Rüppell in Abessinien entdeckt, wo er nach Heuglin nur auf die wärmeren Thäler in wenigen Bezirken beschränkt sein dürfte. „Wahrscheinlich ist er auch Zugvogel, der dort nur zur Regenzeit anzutreffen ist. Ich habe niemals Gelegenheit gefunden, ihn zu beobachten. Sein Hochzeitskleid hat keine Spur von gelbem Anflug; sein Aussehen zeigt viel sperlingsartiges." (Ploceus rubiginosus, *Rpp.*; Textor rubiginosus, *Bp.*, *Hgl.*; Hyphantornis rubiginosa, *Hgl.*).

Der **schulterfleckige Webervogel** [Ploceus badius]. Dem vorigen wiederum sehr ähnlich, ebenfalls mit schwarzem Kopfe, aber noch heller. „Von Antinori im Oktober des Jahres 1859 bei Woled Medineh am Blauen Fluß eingesammelt. Ein vollständig ausgefärbtes Männchen im Hochzeitskleide steht in der Sammlung des Herzogs Paul von Würtemberg und ein andres erlegten wir im Sommer des Jahres 1861 im Barka. Eigenthümlich ist der auf den kleinen Flügeldeckfedern befindliche Schulterfleck; der Grund ist hier rauchbraun, ins Olivenfarbige gehend, aber vollkommen verdeckt von den breiten, zeisiggrüngelben Federrändern. Der Vogel erscheint in großen Flügen im Gebiet des obern Weißen Nil im März und April, in Senar, Takah und am Atbara zu Ende des Mai und Anfang Junis. Gleich nach der Ankunft beginnt die Verfärbung. Tagsüber sieht man ihn parweise und in kleineren Gesellschaften im Hochgras der Steppe und an Regenbetten, wo sie sich gegen Sonnenuntergang auf Tamarinden und anderen hohen und dichtbelaubten Bäumen unter vielem Lärm und Gezwitscher zu versammeln pflegen." Die obigen Angaben Heuglin's entlehne ich in der Voraussicht, daß auch diese Art eingeführt und unsere Käfige häufig bevölkern wird, sobald erst jene Gegenden mehr aufgeschlossen und auch dem Vogelhandel zugänglich sind. Kastanienrother Weber, nach Rchb. (Hyphantornis badius, *Css.*; H. axillaris, *Hgl.*; Ploceus modereus, *Lss.*, *Bp.*; P. badius, *Rchb.*; P. rufocitrinus, *v. Mll.*; P. ca-

staneo-auratus, *Antn.*; P. melanocephalus, *Pr. Wrtbg.*, *Hgl.* [P. sp.? et P. rubiginosus?] P. affinis, *Hgl.*).

Der schwarze Webervogel [Ploceus nigerrimus]. Ganz schwarz, Flügel und Schwanz kaum bemerkbar bräunlich; Schnabel schwarz; Füße etwas heller. Größe etwas bedeutender als die des Textorwebers. Das Weibchen ist dem des kastanienbraunen Webers äußerst ähnlich und hauptsächlich nur durch den grünlichen, nicht gelbbraunen Ton der Oberseite verschieden; Bürzel gelbbraun. Bisher wurde dieser Vogel von den Schriftstellern immer zu den Prachtwebern [Sycobius, *Vll.*] gezählt, allein Reichenow spricht sich — und zwar wol mit Recht — in folgender Weise aus: „Mir ist es unbegreiflich, daß dieser Vogel bisher dorthin gestellt worden. Nicht allein sein Leben ist von dem der Prachtweber durchaus verschieden und gleicht vollständig dem der Gelbweber, sondern auch seine Erscheinung hat nichts mit der jener ersteren Vögel gemein. Dazu kommt noch, daß das Weibchen ein gleiches unscheinbares braunes Kleid trägt, als die mehrerer Gelbweber, während dies doch bei den Prachtweberarten niemals der Fall ist. Seine Lebensweise ist völlig übereinstimmend mit der des schwarzköpfigen Webers: dasselbe muntre Wesen, auch derselbe Aufenthalt. Hier theilt er mit seinem Genossen die Kokuspalmen, die Nester beider Vögel hängen unter einander und man bemerkt nicht die geringste Eifersucht zwischen ihnen. Am Wuri fand ich an den über's Wasser hinausragenden Zweigen ungemein zahlreiche Kolonien, wie ich solche niemals wieder gesehen. Das Nest hat auch dieselbe Gestalt, wie das des Nachbarn: oben geht es ebenfalls in eine Spitze aus, mit der es an dem Aufhängepunkte befestigt ist, doch hat es keinen Röhrenansatz. Die Höhe und Breite beträgt 12 cm., die Länge 15 cm., wovon 6 cm. auf das Schlupfloch kommen. In der Regel hängen die Nester ganz frei an einzelnen Zweigen, doch ist auch zuweilen ein naheſtehendes Reis in die Seitenwandung hineingeflochten. In großen Ansiedelungen befinden sich oft zwei oder drei Nester dicht übereinander, an demselben Zweige, an welchem dann gleichfalls die Nestwandung gewebt ist. Der sehr dichte, dicke Bau wird wie bei dem genannten Genossen ebenfalls aus frischem, breitem Grase hergestellt und die Nestmulde ist nicht selten mit Mais-Blütenfäden ausgelegt. Zwei, häufig auch drei Eier bilden das Gelege; Farbe hellblau, Länge 22—25 mm., Breite 15—16,5 mm. — Da wir am Ufer des Wuri, ermüdet vom Rudern und Jagen, einen ganzen Nachmittag in der Nähe jener Kolonien lagerten, so konnte ich mich recht an dem Ab- und Zufliegen, dem Geschwirr, Gezänk, Gesang und dem Nestbau der Lebenslust und Freude athmenden Vögel ergötzen — ein prächtiges Schauspiel. Das Balzen oder Liebesspiel der Männchen besteht darin, daß sie mit niedergedrücktem Körper mit den Flügeln zittern, wobei alle Federn leicht gesträubt werden. — Ich muß noch bemerken, daß ich diese Art an der Goldküste nirgends getroffen habe; auch weiter nördlich in der Sierra Leone ist sie wol nicht beobachtet;

sie scheint also nur dem südlichen Westafrika anzugehören und die Kamerungegend dürfte der nördlichste Punkt ihres Verbreitungskreises sein." — Es ist wirklich auffallend, daß dieser in seiner Heimat überaus zahlreich vorhandene Vogel bisher noch garnicht lebend eingeführt wurde. Sobald aber die Großhändler darauf aufmerksam geworden, daß wir in ihm ein interessantes Mitglied seiner Zunft vor uns haben würden, namentlich insofern, als er in seiner tiefschwarzen Farbe neben den gelben Arten in einem großen, draußen stehenden Flugkäfige angenehme Abwechselnng bieten kann, dürfen wir wol davon überzeugt sein, daß er im Handel erscheinen werde — und darum habe ich die obige Schilderung hier angefügt.

Schwarzer oder tiefschwarzer Webervogel. (Ploceus nigerrimus, *Vll.*; P. niger, *Swns.*, *Bp.*; Sycobius nigerrimus, *Prr.*, *Vrr.*, *Hrtl.*; Hyphantornis nigerrimus, *Rchn.*).

Der dottergelbe Webervogel [Ploceus vitéllinus].

Tafel VIII. Vogel 48.

Bedeutend kleiner als die vorhergehenden, ist er mit Recht beliebter, weil er einerseits als ein harmloser und verträglicher Gast in der Vogelstube sich zeigt und andrerseits zu den schönsten aller Weber gehört. Prächtig gelb, mit schwarzem Gesicht und gelbbraunem Kopf ist er an Flügeln und Schwanz dunkler gelblichbraun, mit feuerrothem Auge und schwarzem Schnabel. Größe des Feldsperlings.

Er ist sehr weit verbreitet, denn seine Heimat erstreckt sich durch ganz Mittelafrika, von der West- bis zur Ostküste. Nach Heuglin's Mittheilungen erscheint er zu Ende des Monats Mai und im Juni in den Gegenden des untern weißen und blauen Flusses, am eigentlichen Nil nordwärts bis Berber und zwar noch im Winterkleide und in Flügen, welche sich bald in kleinere Gesellschaften und Kolonien vertheilen. „Der Lieblingsaufenthalt dieser munteren Vögel sind Akaziengruppen oder auch andere Dornbäume in der Nähe von feuchten Plätzen, an Stromufern längs der Regenteiche, auf Inseln und in Büschelmaisfeldern. Ihre Nahrung besteht in Gräsersämereien und Insekten. Die Verfärbung zum Hochzeitskleide beginnt im Juni und gleichzeitig die Brut. Dann singen, schwätzen und streiten die Männchen viel und verlassen den zum Nestbau ausersehenen Platz höchst selten. Der Lockton ist ein schrilles, etwas gedehntes Zirpen. An schwanke, überhängende Zweige in 1—$6_{,3}$ Meter Höhe befestigt dieser Weber sein kunstvolles Nest, welches dicht und schwer aus frischgrünen Grashalmen erbaut wird. Es ist beutelförmig und zunächst mit seinem obern, sehr schlank ausgezognen Ende nur an einen einzigen dünnen Zweig angeheftet, sodaß der geringste Lufthauch dasselbe in eine schaukelnde Bewegung versetzt. Häufig stehen diese Bauten so, daß sie an einem großen Theile des Tages Schatten haben. Sehr

viele frische Nester fanden wir unbelegt; diese werden wol bei Nacht und Unwetter von den Männchen benutzt, die übrigens offenbar das Weben nicht nur aus Bedürfniß, sondern auch aus Liebhaberei betreiben. Antinori behauptet, daß beide Gatten des Pärchens sich beim Bau betheiligen. Ich sah jedoch blos die Männchen arbeiten. Zuerst wird ein durchsichtiges, leichtes Gerüst geflochten und dies dann mit feineren Grashalmen durch Einweben mehr und mehr verdichtet. Das Schlupfloch ist meistens seitwärts und unten angebracht, zuweilen noch mit einer kleinen Röhre. Bei der Herstellung des Nestes kann man neben der Geschicklichkeit im Verflechten des Baustoffs auch die Gewandtheit der kleinen Künstler im Klettern nicht genug bewundern. In allen Stellungen, oft den Kopf und Körper abwärts gerichtet, laufen sie um den ganzen Bau herum und an demselben auf und ab. Die Zahl der Eier eines Geleges giebt Antinori auf 5 bis 7 Stück an. Ich fand deren nie mehr als fünf und bei der zweiten Brut gewöhnlich nur drei. Ob die Vögel regelmäßig mehrere Bruten machen oder nur dann, wenn die erste zerstört wird, kann ich nicht angeben. Sind die Jungen ausgeflogen, so schwärmen sie familienweise oder in kleinen Flügen eine zeitlang in der Steppe und in den Maisfeldern umher und verschwinden südwärts ziehend im November wieder; um diese Jahreszeit und theils schon etwas früher beginnt die Mauser."

Diese Angaben werden dann von Reichenow aus Westafrika noch ergänzt: „Der dottergelbe Weber ist an denselben Orten häufig, wo man den Textor sieht. Die Nester, in welchen wir in der Mitte des August frische Eier fanden, hängen an dünnen Zweigen niederer Büsche in der Höhe von $1{,}_6$ bis $2{,}_5$ Meter über der Erde, einzeln oder mehrere an demselben Strauch, niemals aber in großen Kolonien beisammen; sie sind kugelförmig, nach oben zum Aufhängepunkt in eine Spitze auslaufend mit einem schön gearbeiteten Flugloch an der Unterseite und überhaupt sehr fest gebaut. Drei Eier bilden in der Regel das Gelege."

Wenn er bis jetzt auch noch keineswegs zu den im Handel häufigen Vögeln gehört, so ist ein Pärchen doch bereits in jeder größern Vogelstube zu finden. Bei Herrn Friedrich Schneider erbaute er ein Nest, welches sich der Kugelgestalt näherte und dessen schön gerundetes, kreisförmiges Flugloch keinen Röhrenansatz hatte. Zur Brut gelangte das Pärchen nicht. In meiner Vogelstube sind zahlreiche Bruten flügge geworden. Die Nester wurden von den alten und jungen Männchen stets in derselben Weise gebaut und zwar nicht wie die der anderen Webervögel ganz oder zum größten Theile aus Agavefasern, sondern vorzugsweise aus frischen oder trockenen Gräsern und besonders auch aus Streifen von Lindenbast. In der Gestalt stimmen sie mit den von Heuglin beschriebenen wesentlich überein; sie hängen an einem, meistens jedoch nur kurzen, nach unten zu dicker werdenden Bande, sind kaum länglichrund, immer mit dem Schlupfloch von unten

herauf und ohne Röhrenansatz. Drei bis vier Eier bilden das Gelege, von denen bei mir jedoch jedesmal nur ein bis zwei Junge erbrütet und flügge wurden. Brutdauer 12 Tage. Nestflaum reinweiß, mit ganz kleinen dunklen Schnabelwarzen. Das Jugendkleid gleicht dem des alten Weibchens (siehe wissenschaftliche Beschreibung). Erst im dritten Jahre erlangt das junge Männchen das volle Prachtkleid. Dagegen bleibt ein alter Vogel bei guter Fütterung und entsprechender Verpflegung dann auch wol mehrere Jahre in demselben; meistens zeigen sich die Farben nur wenig abgeblaßt und eine völlige Entfärbung tritt selten ein.

Im übrigen hat er alle guten Eigenschaften der Webervögel im hohen Maße, während die üblen bei ihm nicht vorhanden sind; er ist kräftig und sehr ausdauernd, anspruchslos und nistet freifliegend in der Vogelstube leicht und gewöhnlich in mehreren Bruten hinter einander; im Käfige jedoch wahrscheinlich viel schwieriger. Friedlich und harmlos, beraubt er keine Nester und sein Liebesgesang, bestehend in Zischen und Schnurren, unter Flügelschlagen und Spreizen des Schwanzes vorgetragen, erklingt mehr komisch, als unangenehm. Er sollte in keiner Vogelsammlung fehlen. Der Preis beträgt zwischen 18 bis 30 Mark für das Pärchen.

Der dottergelbe Webervogel oder dottergelbe Weber ist auch gelber Webervogel (Hgl.), dottergelber Kernbeißerweber (Rchb.) und Feinweber (Br.) benannt.

Le Tisserin jaune d'oeuf; Half-masked Weaver-bird; Roodbruinnek Wever (holländisch).

Nomenclatur: Fringilla vitellina, *Lchtst.;* Ploceus ruficeps, *Swns.;* Textor vitellinus, *Bp.;* Hyphantornis vitellina, *Gr.;* Ploceolus vitellinus et Xanthophilus sulfureus, *Rchb.;* Hyphantornis vitellinus, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Rchn.;* Ploceus flavomarginatus, *Pr. Wrtbg., Hgl.;* Pl. aurantiiceps, Textor chrysopygus (als zweifelhafte Art) et Hyphantornis vitellina, *Hgl.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirnrand, Augengegend, Backen, Kinn und Kehle schwarz, rings umgeben auf dem Scheitel, an den Halsseiten und am Kropfe von dunkelbräunlichoranger Färbung, welche nach hinten und unten zu allmälig heller wird und in hohes Dottergelb übergeht; Nacken, Mantel und Schultern gelb, schwach olivengrün verwaschen, mit schmalen dunkleren Schaftstrichen; Schwingen schwarzbraun, an der Außenfahne schmal gelb gesäumt, an der Grundhälfte der Innenfahne breiter blaßgelb gerandet; die letzten Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne breit gelb gerandet, wie die längsten Schulterdecken; Deckfedern braunschwarz, die der zweiten Schwingen außen gelb gesäumt; die größte Reihe der oberen Deckfedern mit breitem, gelbem Endrande, wodurch eine deutliche gelbe Querbinde über den Flügel gebildet wird; die übrigen Deckfedern mit gelben Endsäumen; Schwanz bräunlicholivengelb, jede Feder mit schmalem, gelbem Innensaum; Bürzel und obere Schwanzdecken hochgelb, ebenso die ganze Unterseite; Schnabel glänzend schwarz; Auge feurig karminroth; Füße bräunlichfleischfarben. — Weibchen: oberhalb olivengrünlichgelb, Mantel und Schultern mit breiten olivenbraunen Schaftstrichen: Zügel, Backen, obere Schwanzdecken und Unterseite hochgelb, doch heller als beim Männchen; Bauch, Hinterleib und untere Schwanzdecken fast reinweiß. Schnabel dunkelbraun, Unterschnabel heller; Auge gelbroth. — Männchen im Winterkleide mit dem Weibchen übereinstimmend, nur oberhalb kräftiger gelbgrün, mit schmaleren Schaftstrichen, unterhalb kräftiger gelb und fast regelmäßig an Kopf und Hals mehr oder minder schwarz und orangegelb gefleckt; ein wenig größer und am feurigrothen Auge stets zu erkennen.

Ploceus vitellinus: margine frontali, regione ophthalmica, genis, mento gulaque nigris; pileo, colli lateribus guttureque obscure aurantiis, postice sensim dilutioribus et in vitellinum transientibus; cervice interscapilio et scapularibus flavis, subolivaceo-lavatis, obscurius striolatis; pogonio remigum nigro-fuscorum exteriore anguste flavo-limbato, interiore a basi usque ad dimidium latius flavo-marginato; pogonio remigum secundariorum ultimorum et scapularium longissimarum exteriore late flavo-marginato; tectricibus al. fusco-nigris, pogonio tectricum mediarum exteriore flavo-limbato; tectricibus minoribus denteris late flavo terminatis, itaque fasciam distinctam alarum ostendentibus flavam; tectricibus al. reliquis flavo-terminato; pogonio rectricum e fusco olivaceo-flavidarum interiore anguste flavo-terminatis; uropygio et supracaudalibus et gastraeo toto luteis; rostro nitide nigro; iride ardenter coccinea; pedibus e fusco carneis. — ♀ supra ex olivaceo virente flava, interscapilio et scapularibus olivaceo-fusco-striatis; loris, genis, supracaudalibus et gastraeo luteis, dilutius quam maris; abdomine, crisso et infracaudalibus albis; rostro fusco, mandibula dilutiore; iride aurantia. — ♂ vest. hiem. cum femella conveniens, at supra laetius flavo-viridis, angustius striolatis; infra flavior ac plerumque capite colloque plus minus nigro- et aurantio-maculatis; etiam paululum major semperque iride igneo-rubra distinctus.

Länge 12,4—13 cm. (4 3/4—5 Z.); Flügel 7,2 cm. (2 3/4 Z.); Schwanz 4,6 cm. (1 3/4 Z.).

Jugendkleid: Dem alten Weibchen sehr ähnlich, oberhalb aber durch breite graue Säume der Federn und Mangel der dunklen Schaftstriche fahler graugrüngelb; Zügel und Backen matter gelb, ganze Unterseite gelblichweiß.

Juvenis: femellae adultae simillimus, supra vero ob limbos plumarum latos cinereos nullasque obscuras scaporum strias luridius virente flavidus; loris genisque pallidius flavis; gastraeo toto gilvo-albente.

Beschreibung des Eies: „Die Eier sind so sehr veränderlich, daß man sie ganz verschiedenen Arten zuschreiben möchte. Ihre Grundfarbe ist weißlich, hell lehmfarben, hell fleischröthlich, bläulich bis hell spahngrün; darauf zeigen sich oft nur einzelne dunkelblaugraue Punkte und Fleckchen, andere sind dichter rostbraun gefleckt, wieder andere zeigen rostbräunliche und graubliche Flecke, die am stumpfen Ende oft dichter stehen. Länge 17,5—18 mm.; Breite fast 13 mm." (Hgl.) „Die Eier, welche auf bläulichweißem Grunde mit blaßrothblauen und violetten Flecken bedeckt sind, haben eine Länge von 19,75—20,5 mm. und Breite von 13,25—14 mm." (Rchn.) In der Vogelstube weniger veränderlich: dunkler und heller bläulichweiß, röthlich bis violett gefleckt.

Ova: perquam varie picta, albicantia testacea, subcarnea coerulescentia in aeruginosum vergentia, punctulis maculisque vel parcis coeruleo-cinereis, vel crebris ferrugineis et subcinereis apicem obtusum versus saepe largius disseminatis (Hgl.). — Ovum: subcoeruleo-album lilacino- et violaceo-maculatum (Rchn.). — Talia ex fetura cubiculari minus variabilia; tam obscurius, quam pallidius coerulescente albida, rubido-, ipsa violaceo-maculata.

Heuglin trennt von dieser Art noch eine andre, welche er Ploceus [Hyphantornis] taeniopterus (nach Rchb. **Flügelbindiger Webervogel**) benennt und die er als ganz bestimmt abweichend erklärt. Er sagt: „Längre Zeit habe ich beide nebeneinander im Käfige erhalten und so Gelegenheit gehabt, mich von ihrer Verschiedenheit, die sich auch in der Lebensweise ausspricht, genügend zu überzeugen. Er zeigt außer anderen Aufenthaltsorten und Gewohnheiten auch merkliche Abweichungen im Körperbau; ferner ist die schwarze Färbung des

Gesichts nicht über die Wangen ausgedehnt, aber am Vorderhals bis auf die Brustmitte in einer Schneppe herabgezogen und am Vorderkopf ist weit weniger gelbbrauner Anflug, während beim dottergelben Weber nur das Kinn und der obere Theil der Kehle, dagegen der ganze Stirnrand, Wangen, Augen- und Ohrengegend abgegrenzt schwarz sind. Verbreitung am Weißen Nil zwischen dem 10. und 5. Grad nördl. Breite. Er kommt mit Anfang der Regenzeit in zahlreichen Schwärmen in die Gräserfelder um den obern Bahr el abiad und man kann sich kaum einen Begriff von der Kopfzahl eines Fluges dieser Vögel machen. Wir sahen sie dicht gedrängt, wolkenartig in ununterbrochenen Zügen, deren Vorbeiflug wol länger als eine Viertelstunde währte, über den Fluß ziehen." Die Annahme dürfte also nicht fern liegen, daß dieser Weber über kurz oder lang unsere Vogelstuben und Käfige reich bevölkern wird und dann wollen wir ihn willkommen heißen, gleichviel, ob er eine selbständige Art oder nur eine Lokalrasse des mit Recht geschätzten dottergelben Webers bildet. (Hyphantornis intermedia, *Hgl.*; H. atrogularis, *Fnsch.* et *Hrtl.*; H. taenioptera, *Rchb.*, *Hgl.*).

Der Pirol-Webervogel [Ploceus gálbulus].

Dem dottergelben Weber nahestehend, ist er kaum bemerkbar kleiner, aber die dunkle Färbung seines Gesichts erscheint beiweitem nicht so kräftig, sondern vielmehr nur kastanienbraun. In den Vogelhandlungen wird er fast regelmäßig mit jenem verwechselt oder zusammengeworfen, wol gar als dessen Weibchen ausgegeben.

Seine Heimat erstreckt sich über den Nordosten und einen Theil des Ostens von Afrika. Nach Heuglin's Angaben ist er ein häufiger Bewohner des Küstenlandes und der benachbarten Gebirge, vom 19. Grade nördlicher Breite südwärts längs der afrikanischen Küste des rothen Meeres bis in die Somali-Länder und im Hochland wenigstens bis zu 1800 Meter Höhe. Im Innern Abessiniens und in den Nilländern war er nicht zu finden, dagegen nordwärts bis in den Bergen von Sauakin als der am weitesten nach Norden hin verbreitete Webervogel. Die Behauptung Brehm's und anderer Reisenden, daß er bei Chartum und in Senar (wie auch im „Museum Heineanum" angegeben), in Kordofan und am weißen Nil vorkomme, ist eine irrthümliche und bezieht sich auf den dottergelben Weber. Ueber das Freileben berichtet Heuglin folgendes: „mit Eintritt der Sommerregen beginnt die Verfärbung und das Brutgeschäft. Im Juli fand ich in den Bogosländern belegte Nester; bei Sauakin erschienen die Männchen im September, am Golf von Tedjenra erst im Oktober im Hochzeitskleide. Er lebt im allgemeinen vereinzelter als die Verwandten, doch traf ich Nistkolonien von etwa zehn Pärchen. Haushalt, Nestbau und Eier sind denen des dottergelben Webers ganz ähnlich. Ob er Zugvogel ist, kann ich mit

Sicherheit nicht ſagen, doch möchte ich ihn für einen Standvogel halten. Man ſieht ihn auch in Gehöften, Gärten und Viehparken, namentlich aber auf einzeln ſtehenden Bäumen in Gerſtenfeldern. Dieſelben ſind oft mit älteren und friſchen Neſtern ganz behängt. Der Bauſtoff beſteht zumeiſt in Grasblättern, nicht aber in den Schaften oder Halmen."

Näheres iſt nicht bekannt. In der Gefangenſchaft ſtimmt er in jeder Hinſicht mit dem erwähnten nächſten Verwandten überein. Er wird faſt alljährlich gegen den Herbſt hin, immer aber nur in wenigen einzelnen Männchen, von Gudera in Leipzig eingeführt. Ich erhielt ihn ebenſo von Poiſſon in Bordeaux.

Der Pirol-Webervogel oder Pirolweber iſt auch gelblicher Webervogel (Hgl.) und Gilbweber (Br.) benannt.

Le Tisserin Oriole; Oriol Weaver-bird.

Nomenclatur: Ploceus galbula, *Rpp.*, *Lfbr.*, *Rchb.*; Textor galbula, *Bp.*, *Hgl.*; Hyphantornis galbula, *Gr.*, *Hrsf.* et *Mr.*, *Cb.*, *Br.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Stirn, Vorderkopf, Zügel und Backen kaſtanienbraun, Kinn ſchwärzlich, der übrige Kopf, Hals und die ganze Unterſeite nebſt den unteren Flügeldecken gummiguttgelb; Oberſeite dunkelolivengelb, mit verwaſchenen, blaßolivenbräunlichen Schaftſtrichen auf dem Mantel und den Schultern; Bürzel und obere Schwanzdecken reiner gelb; Schwingen und Deckfedern dunkelolivenbraun, erſtere gelb gerandet, letztere mit breiten, gelben Endſäumen, wodurch eine ſchiefe gelbe Querbinde über den Oberflügel entſteht; Schwanzfedern bräunlicholivengelb, mit ſchmalem, gelbem Außenſaum. Schnabel ſchwarz; Auge kaſtanienbraunroth; Füße blaßhorngelb. — Weibchen: Oberkopf und ganze Oberſeite olivengrünlichgrau, Mantel und Schultern mit breiten olivenbraunen Schaftflecken; Zügel und Augenſtreif, Kopfſeiten und alle unteren Theile blaßgelb; Bauch und Hinterleib ziemlich reinweiß; untere Flügeldecken iſabellgelb; Schwingen dunkelbraun, außen ſchmal olivengelb, innen breiter blaßgelb geſäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken matt olivengelb mit reinen gelben Außenrändern. Auge dunkelbraun; Schnabel und Beine hornbraun.

Ploceus gálbulus: fronte, sincipite, loris genisque castaneis, mento nigricante; capite reliquo, collo totoque gastraeo cum tectricibus infracaudalibus luteis; supra olivaceo-fuscus striis scaporum interscapilii et scapularium luride olivaceo-lavatis; uropygio et supracaudalibus flavioribus; remigibus alarumque tectricibus olivaceo-fuscis, illis flavo-marginatis, his late flavo-terminatis, quamobrem fasciam alarum obliquam ostendentibus flavam; rectricibus e fusco olivaceis anguste flavo-terminatis; rostro nigro; iride badia; pedibus gilvo-corneis. — ♀: pileo totoque notaeo ex olivaceo cinereis; interscapilio et scapularibus olivascente fusco-striatis; loris, stria superciliari, capitis lateribus totoque gastraeo gilvis; abdomine crissoque albidis; tectricibus subalaribus isabellinis; remigibus fuscis exterius angustius olivaceo-flavido-, interius latius gilvo-marginatis; uropygio et supracaudalibus luride flaventibus, exterius flavo-marginatis; iride fusca; rostro pedibusque corneo-fuscis.

Länge 12,4 cm. (4 3/4 Z.); Flügel 7,2 cm. (2 3/4 Z.); Schwanz 3,5 cm. (1 1/3 Z.)

Beſchreibung des Eies (nach Hgl.): Dem des dottergelben Webers gleich, doch durchſchnittlich etwas größer, bis zu 21,7 mm. lang.

Ovum: ovo Plocei vitellini aequale, at paululum majus usque ad longit.

Als **olivengrauer Webervogel** [Ploceus erythrophthalmus] führt Heuglin eine ſelbſtändige Art an, welche Finſch und Hartlaub für übereinſtimmend

mit dem Pirolweber erachten. Erstrer hält ihn für durchaus verschieden von allen anderen in Nordostafrika vorkommenden Arten. Leider hat er ihn aber nur im Winterkleide gesehen, in welchem er dem Weibchen und den Jungen des Maskenwebers ähnlich, jedoch etwas größer ist. „Wir beobachteten ihn im östlichen Senar, in den Provinzen Galabát und Gedáref, wo er einzeln im April und Mai ankommen dürfte und auf Hochbäumen längs der Regenbetten lebt." Am richtigsten wol **rothäugiger Webervogel** benannt; da aber viele Arten der Gelbweber rothe Augen haben, so möge er den vorstehenden Namen behalten. (Ploceus erythrophthalmus, *Hgl.*; P. mariquensis, *Fnsch.* [Hyphantornis galbula, *Fnsch.* et *Hrtl.*]; H. erythrophthalma, *Hgl.*).

Der **zitrongelbe Webervogel** [P. xanthópterus], eine von **Kirk** im Jahre 1864 im Schiréthale des Sambesi aufgefundne Art sei hier beiläufig erwähnt, obwol nur ein solcher Vogel im Britischen Museum vorhanden, weil er nach **Finsch** und **Hartlaub** einer der prachtvollsten in der ganzen Gruppe der Gelbweber ist. Er steht dem Pirolweber sehr nahe. (Ploceus spec. nov., *Krk.*; Hyphantornis xanthopterus, *Hrtl.* et *Fnsch.*).

Der **schwarzohrige Webervogel** [Ploceus Guerini] sei wiederum nur beiläufig mitgezählt, da sich wol schwerlich die Aussicht zeigt, daß er lebend eingeführt werde. Er ist den vorigen ähnlich, doch viel heller grüngelb und nur mit schwarzer Färbung vom Nasenloch übers Auge bis ums Ohr und zum Unterschnabel, während Stirn, Kinn und Kehle reingelb sind. **Heuglin** fand ihn in den Bogosländern, in Mensa, um Adowa u. s. w. bis zur Höhe von 3766 Meter über Meeresspiegel, gewöhnlich einzeln und parweise als Standvogel, im Winter familienweise auf Hochbäumen, in Hecken und an buschigen Ufern. Mit Ende der Sommerregen im September verfärbt er sich und baut, meistens nicht gesellschaftlich, seine großen, etwas rohen Beutelnester aus rauhen, grünen Grashalmen auf Hochbäume, an Bachufern oder wenigstens nicht fern von Gewässern. (Ploceus melanotis et P. Guérini, *Lfbr.*; P. auricularis et P. melanops, *Lfbr.*; P. aurantius et leucophthalmus, *Hgl.*; P. melanogenis, *v. Mll.*; Textor melanotis, *Bp.*; Hyphantornis Guerini, *Gr.*, *Frr.* et *Gl.*, *Kg.-Wrth.*, *Hgl.*).

Der Masken-Webervogel [Ploceus lutéolus].

Der kleinste Weber, welcher bis jetzt lebend eingeführt wird, ist ein im Handel leider noch ebenso seltnes als in der Gefangenschaft liebenswürdiges Vögelchen. In der Gestalt gleicht er dem Textorweber, in der Größe aber nur etwa einem Hänfling, doch ist er schlanker und ungleich lebhafter. Auch die Färbung ist der des größern Verwandten ähnlich, doch ist sie vielmehr ein lebhaftes, hell olivengrünliches Gelb. Die dem Vogel auch beigelegte Benennung Safranweber ist daher keinenfalls zutreffend. Da der Kopf bis zur Scheitel-

mitte, an den Seiten bis kaum zu den Augen und am Kinn tiefschwarz ist, so darf man der Bezeichnung Maskenweber hier jedenfalls eine mehr berechtigte Geltung zusprechen, als bei dem Larvenweber (Ploceus larvatus), bei welchem die schwarze Farbe des Gesichts sich am Hinterkopf in die dunkelorange verläuft, sodaß eine Maske in den doch nothwendigen scharfen Umrissen keineswegs hervortritt.

Die Heimat erstreckt sich vom Westen bis zum Nordosten Afrikas. Heuglin fand ihn im Bogosland, in Ost- und Südsenar, Kordofan und am obern weißen Nil und dessen Zuflüssen. Reichenow beobachtete ihn als ausschließlichen Bewohner buschiger Ebenen, doch nicht in der Nähe von Ortschaften, am Wuri, dem Quellflusse des Kamerun, wo die Nester einzeln längs der Ufer über dem Wasser an Buschzweigen oder an starken Gräsern herabhingen: „sie haben eine unregelmäßige Gestalt; der Nistraum ist kugelförmig, 7—8 cm. weit und an demselben ist seitlich ein die Schlupfröhre bildender Vorbau angebracht von 4—5 cm. Länge. Das Ganze ist aus dünnem Grase höchst liederlich und lose gebaut, außen rauh und struppig; besonders die angesetzte Schlupfröhre ist sehr locker und unordentlich. Aufgehängt ist der Anbau nicht mit einer Scheitelspitze, sondern die obere Wölbung des Nistraums ist dem tragenden Zweige angewebt. Das Gelege besteht aus zwei oder drei Eiern."

Der erstere Forscher bemerkt sodann folgendes: „er scheint im Mai an seinen Nistorten anzukommen, verfärbt sich bis Mitte des Monats Juli und verschwindet mit seinen Jungen im Oktober und November. Immer parweise sieht man ihn gewöhnlich längs der Regenbetten in der Waldregion, seltner in der Steppe. Sein sehr künstliches, schmales und langes Beutelnest webt und verstrickt er ausschließlich aus Wurzelfasern, nicht sehr dicht und im Innern nur mit wenigen feinen Haren oder etwas Baumwolle ausgekleidet. Das überwölbte Schlupfloch befindet sich gewöhnlich am obersten Theile und der ganze Bau hängt $5_{,6}$—$7_{,8}$ Meter hoch an schwanken Zweigspitzen von Akazien und an den Dornbäumen. Ich fand jedesmal 2—3 Eier. Brehm's Beschreibung der Fortpflanzung ist fälschlich auf diesen bezogen, während sie den dottergelben Weber betrifft."

Wenn die Reisenden schon nach der Beobachtung in der Freiheit angeben, daß dieser kleine Weber in Lebensart, Nestbau und Farbe der Eier von den meisten seiner Verwandten abweiche, so tritt dies noch viel mehr in der Vogelstube hervor.

Heißa, das ist ein lustiges Leben! In jeder Bewegung gewährt das Pärchen einen Anblick, welcher uns die Ueberzeugung geben muß, daß es überaus heitere Vögelchen sind, die sich hier umhertummeln. Ich kann das lebhafte, zierliche und anmuthige Wesen nur mit dem eines Pärchens der bekannten

Hartlaubzeisige vergleichen, und schon daraus werden die Liebhaber ersehen, daß dieser Weber im Benehmen von allen übrigen verschieden sich zeigt.

Er ist in der Gefangenschaft bis jetzt noch recht selten. Im Laufe vieler Jahre habe ich ihn bei den Händlern immer nur einzeln gefunden. Auch im Berliner Aquarium war zur Zeit der ersten Direktion nur ein Männchen vorhanden und ebenso erhielt sich ein solches in meiner Vogelstube jahrelang vortrefflich. Eine Anzahl von neun Köpfen hatte sodann eine der bedeutenderen Vogelhandlungen zweiter Hand, Herr F. Schmidt in Berlin, empfangen und zwar jedenfalls unmittelbar von einem aus Afrika ankommenden Schiffe. Es war zweifellos die erste größere Einführung dieser Webervögel nach Europa. Sie erschienen leider von der Reise sehr angegriffen und recht krank, dennoch entnahm ich sie sämmtlich, um wenn möglich wenigstens einige zu retten.

Im Sommer des Jahres 1875 fing ein in meiner Vogelstube befindliches Männchen in fabelhaftem Eifer an, seine Nester zu bauen. Binnen wenigen Wochen stellte es gegen ein Dutzend mehr oder minder vollendeter Nester her, welche alle genau dieselbe Gestalt zeigten und zwar die einer Retorte mit sehr langer, gerade herabhängender Röhre, anscheinend locker und daher ganz durchsichtig, jedoch sehr fest gewebt. Die lange Röhre fehlt zuweilen, immer aber ist das etwa thalergroße Flugloch von unten hinauf bis zum obern Theile des Nestes führend, ganz in derselben Weise, wie es Heuglin beschrieben, angebracht und die Nisthöhle ist auch mit Baumwollflöckchen ausgepolstert; bei manchen Bruten liegen die Eier jedoch auf dem bloßen Geflecht, sodaß man sie von unten deutlich sehen kann. Das Pärchen erzog in drei Gehecken hintereinander acht Junge und ich hatte Gelegenheit, die ganze Entwickelung eingehend zu beobachten. Das Gelege besteht fast jedesmal in vier verhältnißmäßig sehr kleinen Eiern. Brutdauer 11 Tage. Das Männchen wird während der Brut sehr lebhaft und jagt dann sogar den dottergelben Weber in die Flucht; eigentlich bösartig ist es jedoch nicht. Es füttert das Weibchen während des Brütens und dann mit demselben gemeinsam auch die Jungen. Junge Männchen verfärben sich bereits im nächsten Jahre zum Prachtgefieder.

Das zärtliche Beisammenleben des Pärchens auch außerhalb der Brutzeit, die reinweißen Eier im ausgepolsterten Nest und anstatt des weberartigen Zischens ein klingender Lockruf (im eigentlichen Liebesspiel vermochte ich den Vogel, aller Geduldproben ungeachtet, nicht zu belauschen) — dies alles weicht von der uns bekannten Lebensweise der Webervögel in jeder Hinsicht bedeutsam ab und stellt diese Art den Prachtfinken nahe, während die Gestalt, Farbe und Verfärbung, namentlich aber der eigenthümliche Nestbau, doch den eigentlichen Webervogel erkennen lassen. Es liegt daher die Annahme nicht fern, daß wir sie als

ein Bindeglied zwischen diesen beiden großen Gruppen im allgemeinen und zwischen den Gelbwebern und Prachtfinken im besondern betrachten dürfen.

Es giebt kaum einen andern Bewohner der Vogelstube, der hier in solchem Maße als willkommener Gast gelten kann, als der Maskenweber. Harmlos und durchaus verträglich, keineswegs weichlich, sondern recht ausdauernd, anspruchslos, keck und munter und ein hervorragender Künstler, welcher den Raum mit zahlreichen kunstvollen und schönen Nestern in überraschend kurzer Zeit ausstattet, ist er zugleich im Prachtgefieder eine liebliche Erscheinung. Leider kann man ihn im Handel nur durch Zufall erhalten. Preis 30 Mark für das Pärchen und 18—24 Mark für das einzelne Männchen.

Der Masken-Webervogel oder Maskenweber ist auch gelblicher oder Masken-Kernbeißerweber (Rchb.) und Safranweber (Br.) benannt.

Le petit Tisserin masqué; Little masked Weaver-bird; Kleine gele zwartkop Wever (holländisch).

Nomenclatur: Fringilla luteola, *Lchtst., Lss.;* Ploceus personatus, *Vll., Pr. Wrtbg.;* P. luteolus, *Gr.;* P. melanotis, *Swns., Jard.;* Ploceolus luteolus et personatus, *Rchb.;* Hyphanturgus personatus, *Css., Bp.;* Sitagra luteola, *Cb.;* Fringilla Muelleri, *Bld.;* F. chrysomelas, Hyphantornis chrysomelas, H. personata et H. luteola, *Hgl.;* H. personata, *Hn., Kng.-Wrth.;* H. luteola, *Fnsch.;* H. personatus et luteolus, *Hrtl., Rchn.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Gesicht und Vorderkopf bis zur Kopfmitte, Seiten und Kehlfleck tiefschwarz; Hinterkopf, Nacken und Hals schwefelgelb; übrige Oberseite gelblich-olivengrün; Schwingen und Flügeldecken olivengrünlichbraun mit gelbgrünen Außen- und Endsäumen und blaßgelben Innensäumen; Schwanzfedern ebenso, nur schwach heller; ganze Unterseite rein und hell schwefelgelb. Schnabel schwarz; Auge roth; Füße dunkelfleischfarben. — Weibchen an Gesicht und Vorderkopf düster gelbgrün, ganz ohne Schwarz; Auge braun; Schnabel horngrau; im übrigen dem Männchen gleich. — Männchen im Winterkleide wie das Weibchen, doch zuweilen mit einzelnen schwarzen Flecken am Vorderkopf.

Ploceus lutéolus: facie, sincipite usque ad verticem, capitis lateribus gulaque aterrimis; occipite, cervice colloque sulfureis; notaeo reliquo flavente olivaceo-viridi; limbis remigum et alar. tectricum olivaceo-virentium exterioribus et terminalibus flavo-viridibus, interioribus gilvis; rectricibus itidem pictis, paululum vero dilutius; gastraeo toto laete sulfureo; rostro nigro; iride rubra; pedibus obscure carneis. — ♀: facie et sincipite sordide flavente viridulis, ab nigro plane vacua; iride brunnea; rostro corneo, ceteroquin mari aequalis. — ♂ vest. hiem. femellae simillimus, interdum vero maculis singulio sincipitis nigris.

Länge 10,5 cm. (4 Z.); Flügel 5,9 cm. (2¼ Z.); Schwanz 3,7 cm. (1⁵/₁₂ Z.)

Jugendkleid: Ganze Oberseite düster gelbgrün, Unterseite weißlichgelb; Schnabel hornweiß; Auge schwarz; Füße hellfleischfarben. (Die Verfärbung zur schwarzen Maske tritt mit der Brutzeit des zweiten Jahres ein).

Juvenis: supra sordide flavido viridis, subtus albido-flavus; rostro albente corneo; iride nigra; pedibus dilute carneis.

Beschreibung des Eies: Gestalt länglich; Schale sehr feinkörnig und zart, Farbe reinweiß; Länge 16,5—19 mm.; Breite 12,5—13 mm. (Maß nach Rchn.).

Ovum: album, longiusculum, subtiliter granulosum testa tenerrima.

* * *

Die Gruppe der größten Webervögel, welche man unter der Bezeichnung **Büffelweber** [Alecto, *Lss.*; Textor, *Tmm.*] zusammenzufassen pflegt, bietet eigentlich für die Liebhaberei nur geringes Interesse. Trotzdem müssen sie hier mitgezählt werden und zwar von dem Gesichtspunkte aus, daß sie für große Flugkäfige, namentlich im Freien, doch immerhin von Werth sein können. Es sind überaus kräftige Vögel von Drosselgröße mit starkem Schnabel und derben Füßen. Bisher ist nur eine Art zeitweise, meistens jedoch nur in wenigen Köpfen eingeführt und dann vorzugsweise von den zoologischen Gärten angekauft. Liebhaber halten sie meines Wissens nicht. Die Fütterung stimmt mit der, welche ich für die vorhin geschilderten Gelbweber angegeben habe, im wesentlichen überein, nur dürfte für sie eine reichliche Zugabe von Fleischnahrung noch nothwendiger als für alle anderen Weber sein; auch Beeren u. a. Früchte müssen sie erhalten. Den eingeführten Alektoweber schildere ich im Frei- und Gefangenleben so ausführlich als möglich, in der Ueberzeugung, daß die übrigen mit ihm in jeder Hinsicht übereinstimmen.

Der weißschnäbelige oder Alekto-Webervogel [Ploceus alecto].

Tafel X. Vogel 52.

Ein einfarbig matt bräunlichschwarzer Vogel, nur mit dem Abzeichen, daß die Flügelschwingen in der Mitte schmale, reinweiße Außensäume haben, wodurch auf dem Flügel eine weiße Zeichnung gebildet ist. Schnabel düster gelblichweiß; Auge dunkelbraun; Füße düster grau. Das Weibchen soll ebenso gefärbt, nur wenig kleiner sein, und nach Brehm bildet sich in der Nistzeit noch ein andres Erkennungsmerkmal. Das Männchen bekommt dann nämlich auf der First des schmutzigweiß werdenden Schnabels eine kielartige Erhöhung, während beim Weibchen die Gestalt des Schnabels sich nicht verändert und die Farbe bis auf eine kleine weißliche Stelle an der Wurzel bläulich bleibt. Diese Beobachtung kann ich weder nach den Erfahrungen Anderer, noch nach eigenen bestätigen. Die Heimat dürfte sich über ganz Mittelafrika erstrecken.

Ueber das Freileben dieser ersten und bereits mehrfach eingeführten Art hat Heuglin eingehend berichtet: „Ich halte ihn nicht für einen Standvogel in Nordostafrika. Er kommt mit dem Sommerregen an, verrichtet sein Brutgeschäft, schweift dann in größeren Gesellschaften auf Viehtriften, um Regenbetten und in der Steppe umher und verschwindet wieder im Dezember. Im Gebirge habe ich ihn nicht auf beträchtlichen Höhen gesehen; im abessinischen Küstenlande, Anseba-Gebiet, in Barka, am Mareb bis nach Serawi herauf, in Senar und Kordofan, ebenso am Weißen Nil und am Sobat kommt er vor. Ich fand ihn in Sanchar im August und September, in Ostsenar und Kordofan im Juli und September brütend. Jede Ansiedlung hat einen abgesonderten Nistbezirk und oft stehen mehrere derselben auf einer großen Andansonie, Sykomore, einem Seifen- oder Akazienbaum. Nach Brehm soll er in Sanchar im April nisten und bis zu 18 Nester auf einer Mimose (?) erbauen. Die Nistplätze werden einige Jahre hindurch benutzt; der Bau selbst besteht in einer unregelmäßigen Anhäufung von grobem, dürrem Reisig und Baumzweigen, welche in $4{,}7-9{,}4$ Meter Höhe in

Aſtgabeln und auf wagerecht ſtehenden Aeſten aufgeſchichtet werden bis zu einer Maſſe von $1_{,6}-2_{,5}$ Meter Länge und $1-1_{,6}$ Meter Breite und Höhe. In ſolcher Anſiedlung niſtet je eine Geſellſchaft von drei bis acht Pärchen für ſich und jedes derſelben erbaut ſich darin, wie die Sperlinge im Storchneſt, ſeine eigentliche, beſondre Wohnung und zwar ziemlich tief im Innern. Solch' einzelnes Neſt iſt kunſtreich mit feinem Gras, Riſpen, Würzelchen und Wolle ausgekleidet und enthält 3 bis 4 Eier. Die Jungen mit ihren dicken Köpfen und großen, hängenden Bäuchen ſind von widerlichem Ausſehen, halbnackt und ſehr gefräßig. Auch die Alten haben meiſtens viel Unreinlichkeit im Gefieder und daher einen unangenehmen Geruch. Sie ſind ſtreitſüchtig, lärmen wie die Sperlinge und miſchen ſich öfter unter die Schwärme der Glanzdroſſeln, mit denen ſie auf Viehweiden umherſtreifen. Die Nahrung beſteht in Früchten, Körnern, Käfern, Heuſchrecken und allerlei anderen Kerbthieren, ſowie in Schmarotzerinſekten, welche ſie vom Vieh ableſen. In den Entleerungen des letztern ſieht man ſie ebenfalls oft nach Käfern umherſuchen. Der Geſang iſt nicht ſehr laut, ein ſperlingsartiges Gezwitſcher, und namentlich des Morgens hört man oft die Vögel in den ganzen Kolonien zuſammen ſchwatzen und quieken. Den Jungen wird viel Futter zugetragen. Angeſchoſſen vertheidigen ſie ſich muthig mit dem kräftigen Schnabel und beißen bis auf's Blut."

Im Berliner Aquarium gelangten dieſe Weber zur Brut, jedoch erſt, nachdem ſie etwa zwei Jahre hindurch ſich vergeblich abgemüht und nicht einmal mit dem Neſtbau begonnen hatten. Der damalige Direktor ſprach vielmals ſeine Verwunderung darüber aus, daß ſie nicht früher zum Niſten gebracht werden konnten. Dies lag aber einfach in der Unkenntniß und der daraus entſpringenden unzweckmäßigen Behandlung. Man hatte ihnen mancherlei Bauſtoffe geboten, doch nicht die rechten und erſt ganz zufällig gab ein Wärter, welcher ſah, daß ſie nicht mit Faſern, Stroh und Aeſten, ſondern mit dünnen Zweigen ſich umherſchleppten, ihnen friſche, biegſame Birkenreiſer und damit bauten ſie dann ſo eifrig, daß die vier Vögel das Reiſig von etwa fünfzehn Strauchbeſen zu einem ungeheuren Thurm aufhäuften. Aber auch dann kam es noch lange nicht zu der Herſtellung des eigentlichen Neſtes. Die Weber ſuchten vergeblich nach den geeigneten Stoffen und plötzlich begannen ſie den ganzen Aufbau wieder zu zerſtören. Dies Spiel wiederholte ſich mehrmals und nachdem ſie, wie man ſagt, ein Viertelhundert Beſen verbraucht hatten, kam der aufmerkſame Wärter endlich darauf, ihnen außer den anderen mehr oder minder weichen Bauſtoffen auch Agavefaſern zu reichen und aus dieſen wurden dann mehrere eigentliche Neſter in dem wirren Haufen geſtaltet. In einem Bericht über die Verhandlungen der Allgemeinen deutſchen ornithologiſchen Geſellſchaft im Journal für Ornithologie iſt dann folgendes erzählt: „Das eine Weibchen verſchwand in einem der

zuletzt angelegten Fluglöcher, während die drei übrigen Weber Reis auf Reis weiter thürmten, bis die ansehnliche Höhe von nahezu 2 Meter erreicht war. Auch das zweite Weibchen schlüpfte in ein über dem ersten gelegnes Flugloch und bald zeigten sie durch das Sammeln von Ameiseneiern den glücklichen Erfolg des Brutgeschäfts an. Vom fünften oder sechsten Tage bis etwa zum zwanzigsten fütterten sie die Jungen mit Mehlwürmern, ohne daß die Männchen jemals diese Mühe mit ihnen getheilt hätten. Manchmal schienen jene es zwar auch versuchen zu wollen, dabei benahmen sie sich aber stets so ungeschickt, daß das Weibchen immer zu Hilfe kommen und den Wurm nehmen mußte, um ihn einem der Jungen in den Schnabel zu stecken. Dann kamen am untern Flugloch drei, später am obern ein Junges zum Vorschein und alle vier wurden glücklich aufgezogen. Die Jungen hatten anfangs ein rauchbräunliches Kleid, welches auf der Brust von der durchschimmernden, weißen Wurzelfärbung der Federn leicht gestreift erschien. In wenigen Wochen erlangten sie die dunklere Färbung bis zum Schwarzbraun und wahrscheinlich erhalten sie das Kleid der Alten ohne Mauser."

In dieser hübschen Schilderung möchte ich nur auf eine etwas zu fantasiereiche Stelle hinweisen. Ebenso wie die Männchen der meisten Gelbweberarten werden auch wol die der Büffelweber sich kaum an der Brut und Auffütterung der Jungen betheiligen, und wenn die Meinung ausgesprochen ist, daß sie es ‚versuchen zu wollen schienen', so hat der berichtende Wärter sich eben getäuscht. Immerhin müssen wir zugeben, daß diese Webervögel, trotz der von Heuglin erwähnten übelen Eigenschaften, in einem sehr geräumigen Käfige im Freien gehalten, in der Herstellung ihrer wunderlichen Nestthürme mit den sorgfältig geformten einzelnen Nisthöhlen und langen Flugröhren, für die Liebhaber wol einen gewissen Reiz haben können. Große und allgemeine Bedeutung werden sie für dieselben niemals erlangen. Ein Preis ist nicht anzugeben, weil sie nur selten und zufällig eingeführt werden.

Der Alekto-Webervogel ist hellschnäbeliger Büffel-Webervogel (Hgl.), Weißschnabel-Alektovogel (Rchb.) und Alektovogel (Br.) benannt.

Le Tisserin alecto; Ox-Weaver-bird. — Wudscherck (tigrisch, nach Hgl.).

Nomenclatur: Textor alecto, *Tmm.*, *Hrtl.*, *Rpp.*, *Antn.*, *Br.*, *Kng.-Wrth.*, *Cb.*, *Hgl.*, *Lss.*; Dertroides albirostris, *Swns.*; Alecto albirostris, *Bp.*, *Hrtl.*; Alectornis albirostris, *Rchb.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 315.

Ploceus alecto: ater; hypochondriorum plumis nonnullis primariarumque marginibus externis strictis hartim albis; rostro incarnato-albido, tomiis et apice coerulescentibus; iride fusca; pedibus pallide corneo-fuscis. — ♀: vix minor. —

Länge 24,7 cm. ($9\frac{1}{2}$ Z.); Flügel 10,5—11,6 cm. (4—$4\frac{5}{12}$ Z.); Schwanz 9,6—9,8 cm. ($3\frac{2}{3}$—$3\frac{3}{4}$).

Jugendkleid siehe oben.

Juvenis: sordide fulginosus; abdomine magis schistaceo, albido-vario; rostro sordidius albido, angulo oris pallide sulphureo (Hgl.).

Beschreibung des Eies: Aehnlich denen des Haussperlings, dünn- und etwas rauhschalig, stumpf, eigestaltig; Grundfarbe schmutzigweiß, zuweilen grünlich oder olivenbräunlich angehaucht, und darauf zeigen sich größere olivengraue und olivenbraune unregelmäßige Flecken und Punkte, welche gewöhnlich am stumpfen Ende etwas dichter stehen. Länge 24—28 mm.; Breite 18—19 mm. (Hgl.).

Der Büffel-Webervogel [Ploceus erythrorhynchus]. Dem vorigen sehr ähnlich, aber zunächst etwas kleiner und mit breiterer, weißer Zeichnung an den Flügeln. Der Schnabel ist mennigroth, das Auge dunkelbraun und die Füße sind röthlichbraun. Das Weibchen soll sich durch orangefarbnen Schnabel und braune Füße unterscheiden. Ueber den Büffelweber, welcher den Alektoweber in Südafrika vertritt, ist inbetreff des Freilebens wenig bekannt. Eine kurze Mittheilung von A. Smith sagt, daß man immer ihrer zwei bis drei oder auch mehrere auf den Rücken der Büffel sehe, deren Schmarotzer, die Zecken, ihre Lieblingsnahrung bilden mögen; doch kommt der Vogel nach Anderson's Mittheilungen auch in Gegenden vor, in denen es keine Büffelheerden giebt, so z. B. sehr zahlreich im Damaralande. Er gewährt für die Liebhaberei um so weniger Interesse, da er bis jetzt wol kaum lebend eingeführt worden; auch im Verzeichniß des zoologischen Gartens von London ist er nicht vorhanden. Er ist von Rchb. rosaschnäbliger Büffelweber genannt. (Textor erythrorhynchus et Bubalornis niger, *Smth.*; Textor erythrorhynchus, *Rchb., Fnsch., Hrtl., Hgl.*; Alecto erythrorhynchus, *Bp., v. Mllr.*).

Der Vieh-Webervogel [Ploceus intermedius]. Tiefschwarz, schwarz glänzend, dem vorigen fast gleich und nur dadurch verschieden, daß die Schwingen an der Innenfahne bis auf einen sehr beschränkten bräunlichweißen Theil am Grunde schwarzbraun sind. Seine Heimat ist das tropische Ostafrika. Ueber das Freileben ist eigentlich noch garnichts bekannt und er ist eben eine neue von Cabanis im Jahre 1868 aufgestellte Art. Heuglin erwähnt ihn nur beiläufig. Er wird auch Mittelweber genannt. In den Verzeichnissen der Händler ist er natürlich nicht zu finden. (Textor intermedius, *Fnsch.* et *Hrtl., Hgl.*).

Der weißköpfige Büffel-Webervogel [Ploceus Dinemelli]. An Kopf, Hals, Brust und Bauch reinweiß; Hinterhals, Mantel und ganze übrige Oberseite dunkel umbrabraun; Schwingen und Schwanz dunkler, schwarzbraun, ein kleiner Fleck am Flügelbug, sowie der Bürzel nebst den oberen und unteren Schwanzdecken feuerroth mit orangegelbem Federgrunde; die Schwingen erster Ordnung sind vom Grunde bis beinahe zur Mitte weiß; Schnabel bräunlichbleifarben; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen dürfte nur durch geringere Größe verschieden sein. Inbetreff der Verbreitung bemerken Finsch und Hartlaub Folgendes: „Diese ausgezeichnete Art wurde fast zu gleicher Zeit durch Rüppell und den Major Harris aus Schoa in Abessinien gesandt und bekannt gemacht. Kapitän Speke erlangte sie auf seiner berühmten Nilquellen-Erforschungsreise im Innern

Oſtafrikas in Uniameſi.“ Heuglin berichtet ſodann: „Wir erhielten ſie vom obern weißen Nil im Winter und im Frühjahr aus den Gebieten der Kitſchneger, von Oliwo und vom Belinian; Antinori von Janbara; nach Lefebvre im nordöſtlichen Habeſch (?). Der Vogel lebt, wie der Alektoweber, geſellſchaftlich auf Viehweiden mit einzelnſtehenden Bäumen und Gebüſch, namentlich in der Nähe von Regenbetten und iſt nicht weniger lebhaft und geſchwätzig als ſeine Gattungsverwandten. Ob Standvogel, kann ich nicht mit Sicherheit angeben.“ Dieſe ausführlicheren Mittheilungen über einen noch nicht eingeführten Vogel füge ich in der Ueberzeugung an, daß derſelbe über kurz oder lang im Vogelhandel erſcheinen wird und daß er dann als ein ſchöner und intereſſanter Gaſt begrüßt werden kann, von den Liebhabern nämlich, welche ſich der entſprechenden Räumlichkeiten zur Beherbergung dieſer großen Arten erfreuen. Er iſt auch Viehweber und von Rchb. weißköpfige Dinemellia benannt. (Textor Dinemelli, *Hrsf.*, *Rpp.*, *Gr.*, *Hrsf.* et *Mr.*, *Hgl.*, *Antn.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Alexto Dinemelli, *Bp.*, *Scl.*, *Spk.*, *Lfbr.*; Dinemellia leucocephala, *Rchb.*).

* * *

Die **Prachtweber** [Sycobius, *Vll.*]. Als die ſchönſten und vielleicht auch intereſſanteſten unter allen Webervögeln müſſen wir die Angehörigen einer Gattung erachten, aus welcher bis jetzt leider noch kein einziges Mitglied lebend eingeführt worden, während ſie in ihrem Vaterlande, Afrika, doch keineswegs zu den ſeltenſten Vögeln gehören. Man hat ſie Prachtweber (Br.) benannt, und da ſie in der That herrlich gefiedert erſcheinen, ſo mögen ſie immerhin dieſe Bezeichnung behalten. Vieillot ſchildert ſie mit Entzücken und giebt bereits Rathſchläge für ihre Verpflegung. Ueber ihr Freileben ſind von den älteren Schriftſtellern nur geringe Mittheilungen gemacht und erſt in neueſter Zeit ſind Berichte veröffentlicht worden, welche ein überſichtliches Bild ihrer Lebensweiſe gewähren. Da ſich wol mit Sicherheit annehmen läßt, daß wenigſtens einige Arten über kurz oder lang eingeführt werden, ſo muß ich doch mindeſtens eine allgemeine überſichtliche Schilderung bringen.

Nach Reichenow's Angaben ſind ſie nur im Hochwalde, hier jedoch immer, zu finden: „In dem dichten Laubwerk, welches ſoviele Thiere dem Auge des ſpähenden Jägers verbirgt, können ſie ſich nicht verſtecken, denn ihre rothen Farben ſchimmern auch durch das undurchdringliche Dickicht und verrathen die ſcheuen Vögel. Indeſſen erſchwert der Aufenthalt zu ſehr das eingehende Beobachten ihres Treibens, und ſo kann ich nur Dürftiges berichten. Sie leben parweiſe oder in kleinen Geſellſchaften beiſammen. Niemals ſieht man ſie in ſo großen Schwärmen oder zu ſo zahlreichen Kolonien vereinigt, wie die Gelbweber. Im Hochwalde ſind ſie ohne Beſchränkung anzutreffen, mag er die Niederungen eines Fluſſes oder hohe Berglehnen bedecken. Hier treiben ſie faſt immer in den Baumkronen ihr Weſen, nur ſelten im niedern Gebüſch. Nach beendeter Brut ſcheint das Pärchen mit ſeinen Jungen umherzuſtreichen. Letztere finden ſich ſpäter, wenn die Alten zur neuen Brut ſchreiten, wieder bei ihrem Neſte ein, welches, ſoviel ich beobachtet, nur einmal benutzt wird. Die Stimme iſt heiſer und kreiſchend; einen Geſang habe ich niemals vernommen.“

Es ſind etwa ſperlingsgroße Vögel von ſchwarzer Grundfarbe, mit glänzendem Roth gezeichnet. Ihre Nahrung dürfte in Sämereien und Kerbthieren zugleich, wol auch Früchten, beſtehen; ſicher iſt jedoch die Ernährung noch nicht feſtgeſtellt. Vielleicht liegt in derſelben eine Schwierigkeit für ihre Einführung, denn es iſt auffallend, daß ſie niemals im Handel vor-

kommen, während wir doch aus ihrer Heimat her andere Vögel zahlreich erhalten. Ein unüberwindliches Hinderniß kann die Fütterung freilich ihrer Gefangenhaltung keineswegs entgegensetzen.

Der Hauben-Prachtwebervogel [Ploceus cristatus]. Oberkopf nebst einer zierlichen Haube, Backen und Vorderhals scharlachroth; Stirnrand, Umgebung der Augen und Kinnfleck, wie der ganze übrige Körper tiefschwarz; Schnabel und Füße ebenfalls schwarz; Auge dunkelbraun. Weibchen kleiner, bräunlichschwarz, oberhalb rußschwarz; Kopf und Oberbrust roth, erstrer ohne Haube; Schnabel fleischroth. Jugendkleid aschgrau, Kopf und Hals fahlröthlich, Stirn schwärzlich (Hrtl.). Vieillot meint, daß es schwer sein werde, ihn in der Gefangenschaft bei uns zu erhalten; man müsse ihm außer Körnern auch Insekten und süße Früchte reichen, Wärme von 28—30 Grad gewähren, und wenn möglich einen Feigenbaum in den Käfig geben. In der Freiheit stehe das Nest auf niedrigen Bäumen, sei aus zarteren Gräsern gebaut, mit seitlichem Schlupfloch und innen mit Baumwolle ausgefüttert. Bei der Brut werde das Weibchen einige Stunden täglich vom Männchen abgelöst. — Die Heimat dieser Art ist Westafrika, die Verbreitung ist aber noch nicht festgestellt. In allem übrigen wird er wol mit den folgenden übereinstimmen, und ich habe ihn nur vorangestellt, weil er seit Vieillot her bekannt ist. Er wurde auch blos Haubenweber und von Rchb. Hauben-Malimbus benannt. (Sycobius cristatus, *Vll., Swns., Bp., Hrtl., Hgl., Rchn.;* Tanagra malembica, *Dd., Shw., Lth.;* Malimbus cristatus, Ploceus cristatus, *Vll.;* Sycobius nigrifons, *Hrtl.*).

Der Schild-Prachtwebervogel [Ploceus scutatus]. Glänzend schwarz; Oberkopf, Genick, Halsseiten, breite Brustbinde und Unterschwanzdecken scharlachroth; Kehle bis Augengegend schwarz; Schnabel schwärzlich; Auge braun; Füße bleifarben. Weibchen an Oberkopf und Genick schwarz; sonst wie das Männchen (Rchb.). „Bei allen von mir gesammelten weiblichen Vögeln ist das rothe Brustschild durch eine schwarze Mittellinie getheilt, gebildet durch schwarze Spitzen der betreffenden Federn. Durch Abreiben der schwarzen Federspitzen verschwindet jener Mittelstrich später und das Brustschild ist dann ungetheilt. Das schöne, aus dünnen, elastischen Halmen fest gewebte Nest hat die Gestalt einer Retorte, die melonenförmige Nestkammer hat eine Höhe von 17 cm., eine Breite von 10 cm., und die senkrecht herablaufende Schlupfröhre ist 63 cm. lang. Letztre erweitert sich nach unten und ist loser gewebt, als die erstre, sodaß der Vogel beim Hinausschlüpfen bequem durch die Maschen greifen und sich festhalten kann. Die Schlupfröhre hat keinen scharf abgegrenzten Rand, sondern die Gewebefäden ragen unordentlich am Ende hervor, und man möchte glauben, der Bau sei noch nicht vollendet. Aufgehängt sind die Nester (wir fanden fünf an einer Palme etwa $6{,}_3$ Meter hoch über dem Boden) an zwei einander gegenüberstehenden Blattwedeln, und zwar jederseits dort, wo die Röhre an die Nistkammer gesetzt ist, angewebt. An einem begonnenen Nest lernte ich auch die Weise der Herstellung kennen. Zuerst

wird ein Ring zwischen zwei Palmwedeln, die als Träger dienen sollen, gewebt, sodann die Nestkammer geflochten und zuletzt die Schlupfröhre gemacht. Allerliebst sieht es aus, mit welcher Beweglichkeit und Geschicklichkeit die rothköpfigen Vögel in der langen Röhre hinaufklettern. Ein solcher Bau sichert sie in der That gegen jede Nachstellung vonseiten anderer Thiere. Leider waren in den Nestern keine Eier vorhanden, aber in einem alten herabgefallenen fand ich ein faules Ei, welches merkwürdigerweise weiß von Farbe war." (Reichenow). — Die Verbreitung dürfte sich auf Westafrika beschränken. Rchb. benennt ihn Schild-Malimbus. (Sycobius cristatus, *Css.*, *Bp.*, *Hrtl.*, *Rchn.*).

Der schwarzohrige Prachtwebervogel [Ploceus melanótis]. Es würde sich kaum verlohnen, diese Art hier mitzuzählen, da Heuglin bemerkt, daß sie zu den sehr seltenen Vögeln Nordostafrikas gehört und also an eine Einführung lebender Exemplare schwerlich zu denken ist. Der genannte Forscher giebt indessen einige Mittheilungen über die Lebensweise und in anbetracht dessen, daß man wol sicherlich von der des einen Gattungsverwandten auf die der übrigen schließen kann, füge ich folgende Schilderung hier an: „Major Harris fand den schwarzohrigen Feigenfresser (so nennt ihn Hgl.) in Schoa, Herzog Paul von Würtemberg in Fazoql; ich erhielt ihn vom Berge Belenian aus dem südlichen Senar, sowie auch von Wau und Bongo im Gebiet des Gazellenflusses. Er dürfte nicht eigentlich wandern, da ich ihn im März, April, Juli, November und Dezember beobachtet habe. Alte Männchen scheinen kein abweichendes Winterkleid zu tragen; die Verfärbung aus dem Jugendkleide, welches dem des Weibchens ähnlich erscheint, erfolgt in den beiden erstgenannten Monaten. Die Mauser fällt in den November. Mehrere, welche ich in der letzterwähnten Zeit erlegte, hatten ganz mit Baumwanzen angefüllte Magen. Beim alten Männchen sind die rothen Scheitelfedern hornartig glänzend; die rothen Federn an Brust und Vorderhals zeigen oft noch weißliche Ränder. Das beutelförmige Nest ist dem anderer Webervögel ähnlich, hängt aber in den äußersten, fast unerreichbaren Gipfeln der höchsten Bäume und wird ungefähr im August belegt. Ueber das Benehmen kann ich wenig Auskunft geben. Im Frühjahr lebt er in kleinen Familien, im Herbst mehr einzeln; immer nur auf Hochbäumen im Urwalde. Die Männchen zirpen webervogelartig. Er ist ziemlich schüchtern und versteckt sich gern im Laubdach; auf der Tränke habe ich ihn hin und wieder sperlingsartig einfallen gesehen." (Ploceus melanotis, *Lfrsn.*, *Lss.*, *Bp.*; P. erythrocephalus, *Mus. Brit.*, *Rpp.*, *Hgl.*; P. haematocephalus, *Pr. v. Wrtbg.*, *Hgl.*; P. leuconotis, *v. Müll.*; Sycobius melanotis, *Bp.*, *Hrtl.*, *Hgl.*).

Es giebt noch eine recht bedeutende Anzahl hierher gehörender Arten, von denen ich jedoch nur zwei kurz anführen darf, da alle übrigen, wenigstens vorläufig, noch kein Interesse für die Vogelliebhaberei gewähren: **Der glänzende**

Prachtwebervogel [Ploceus nitens, *Gr.*]; dem vorigen ähnlich, doch nach Hartlaub darin verschieden, daß die rothe Färbung dunkel karmin ist, während sie bei jenem die Mitte zwischen Karmin und Zinnober hält. Seine Heimat ist Westafrika und Angaben über die Lebensweise u. s. w. sind bis jetzt nicht vorhanden. Rchb. nennt ihn glänzender Malimbus. (Sycobius nitens, *Gr.*). — **Der Malimbus-Prachtwebervogel** [Ploceus malimbus, *Tmm.*] ist ebenfalls heimisch in Westafrika und bis jetzt dürfte über ihn weiter nichts zu sagen sein, als daß ihn Temminck Republikaner mit scharlachrother Kapuze (Républicain à capuchon écarlate) benannt hat, während ihn Rchb. auch als rothhalsigen Malimbus aufführt. (Sycobius malimbus, *Tmm.*).

* * *

Die **Schwärzlinge** oder **Schwarzweber** [Nigrita, *Strckl.*] sind kleine Vögel etwa von Zeisiggröße, sämmtlich in Afrika heimisch, welche man in der Regel noch zu den Webern zählt, während sie wol als Mittelglieder zwischen diesen und den Prachtfinken anzusehen sein dürften. Sie sind alle schwarz oder doch düster gefärbt und entbehren daher besondrer Farbenschönheit; trotzdem erscheinen sie wenigstens hübsch und vielleicht ersetzen sie durch anmuthiges und liebenswürdiges Wesen jenen Mangel. Bis jetzt ist noch keine Art lebend eingeführt und deshalb brauche ich sie hier nur kurz zu erwähnen. Doch läßt es sich erwarten, daß sie in den Vogelhandel gelangen, sobald Westafrika mehr erschlossen wird und daher möchte ich sie in diesem Werke keinenfalls übergehen. Ihre Ernährung und Verpflegung dürfte am besten mit der für die Prachtfinken angegebnen übereinstimmend zu besorgen sein.

Arnaud's Schwarzwebervogel [Ploceus Arnaudi]. Der Vorderkopf und die Augenbrauen sind röthlichbraun; die ganze Oberseite nebst den Flügeln und dem Schwanze ist dunkelbraungrau; die Unterseite ist fahlbraun; Schnabel schwarz; Auge braun; Füße schwarz. Heuglin schildert den Vogel in folgendem: „Mir sind nur zwei Gegenden im Bezirk des obern weißen Nils und des Gazellenflusses bekannt, wo er vorkommt, nämlich die trockenen Niederungen im Gebiete der Kitsch- und die Ebene in dem der Reqneger. Hier lebt diese ausgezeichnete Art in großen Gesellschaften auf Akazien, Balanites-Bäumen und -Hecken, seltner auf Sykomoren. Die Stimme ist nicht angenehm, piepend und pfeifend, sperlingsartig. Im Februar und März bauen sie große Beutelnester, deren oft Dutzende auf einem Baume hängen. Viele dieser Nester haben zwei Eingänge von unten, welche nur durch einen schmalen Damm getrennt sind; dieselben werden wol ausschließlich von Männchen bewohnt, wie das ja auch bei (anderen) Webervögeln vorkommt. Es ist mir nie gelungen, die Eier selbst zu finden, doch erhielt ich solche, welche dieser Art zugeschrieben werden; sie sind stumpf, eigestaltig und reinweiß, etwas gelb durchscheinend. Ob er Standvogel ist, weiß ich nicht mit Bestimmtheit anzugeben, da meine Jäger und ich die Orte, an denen er zu finden ist, nur zwischen den Monaten Februar und April besuchen konnten. Ich habe ziemlich viele Vögel dieser Art eingesammelt und an die Museen von Wien, Berlin, Stuttgart, Leiden, Bremen, Lissabon u. a. abgegeben." (Nigrita Arnaudi, *Pchrn.*, *Hrtl.*, *Hgl.*, *Kg.-Wrth.*; Fringilla molybdocephala, *Hgl.*).

Hierher gehören noch die folgenden weſtafrikaniſchen Arten, welche Heuglin ſämmtlich als reizende Vögel bezeichnet: **Der grauköpfige Schwarzwebervogel** [Ploceus canicapillus] von Fernando-Po, Gabun, Aguapim und Lagos. (Nigrita canicapilla, *Strckl.*; grauköpfiger Schwärzling, Rchb.). — **Der gelbſtirnige Schwarzwebervogel** [Ploceus luteifrons] vom Gabun. (Nigrita luteifrons, *Vrr.*; gelbſtirniger Schwärzling, Rchb.). — **Der braunrückige Schwarzwebervogel** [Ploceus phaenotus] von Fernando-Po und Gabun. (Nigrita fusconota[!], *Frs.*; auch braunrückiger Schwärzling, Rchb., und Mantelſchwärzling, Br., genannt). — **Der zweifarbige Schwarzwebervogel** [Ploceus bicolor] von Weſtafrika und den Prinzeninſeln. (Nigrita bicolor, *Hrtl.*; auch zweifarbiger Schwärzling, Rchb., und Zweifarben-Schwärzling, Br., genannt). — **Emilien's Schwarzwebervogel** [Ploceus Emiliae] vom Gebirgslande Aguapim und von der Goldküſte. (Nigrita Emiliae, *Shrp.*).

Die Finken [Fringillinae].

In unsrer Heimat werden die Finken mit Recht zu den kunstfertigsten oder doch immer gern gehörten Sängern gezählt, während sie zugleich durch ihr hübsch gefärbtes und gezeichnetes Gefieder angenehm ins Auge fallen und uns nicht minder durch liebenswürdiges Wesen erfreuen. Von denen, welche weder als Sänger, noch als Schmuckvögel Bedeutung haben, sind viele ihrer Anmuth und Zutraulichkeit halber beliebt. Im gleichen oder ähnlichen Verhältniß stehen auch die Finken anderer Zonen; man schätzt sie allenthalben und stellt ihrer manche unter den gefiederten Lieblingen hoch obenan.

Ihre besonderen Kennzeichen sind: ein gestreckter, mehr oder weniger schlanker Körper mit glatt anliegendem Gefieder; die Flügel haben zehn Schwingen und sind schmaler und spitzer, als bei den vorher geschilderten Verwandten; der Schwanz ist mittellang und in der Regel ausgeschnitten; der etwas gewölbte und ziemlich stumpfspitze Schnabel ist kegelförmig und hat keine Borsten; der Fuß ist mittelhoch. Fast immer sind die Geschlechter verschieden gefärbt, die Männchen lebhafter, oft sehr farbenbunt, die Weibchen schlichter, düsterer, doch an gewissen übereinstimmenden Merkmalen erkennbar; die Jungen gleichen gewöhnlich dem alten Weibchen. Die Größe ist ziemlich abweichend; sie erstreckt sich von der eines kleinen Prachtfink oder des einheimischen Zaunkönigs bis zu der eines Kernbeißers und darüber.

Während die Nahrung vorzugsweise in Sämereien besteht, fressen die meisten auch reichlich Kerbthiere. Sie sind in der Mehrzahl Zug- oder Strichvögel. Ihr Aufenthalt erstreckt sich über Baumgärten, Haine und Feldgehölze; viele wohnen in der Nähe, einige an und in den menschlichen Wohnstätten. Ueber das Freileben der fremdländischen Finken haben wir im allgemeinen nur geringe Nachrichten; mit Sicherheit kann man aber annehmen, daß es dem unserer einheimischen gleicht. Sie leben also zur Frühlingszeit pärchenweise, nur wenige wohnen und nisten während derselben in Gesellschaft; bei den meisten hat vielmehr jedes Par seinen bestimmten Bezirk, in welchem es kein andres duldet. Im Spätsommer und Herbst schlagen sie sich in große Scharen, die nicht selten aus verschiedenen Arten bestehen, zusammen und schwärmen Nahrung suchend umher, streichen oder wandern dann auch gesellig, bei einigen wenigen sogar in getrennten Geschlechtern. An reifendem Getreide und dergleichen verursachen manche bedeutsamen Schaden. Ihre Feinde sind die aller anderen Finkenvögel; ich habe dieselben S. 25 geschildert.

Die Gatten eines Pärchens füttern einander aus Zärtlichkeit und ebenso die Jungen aus dem Kropfe. Zur Liebeszeit führen die Männchen wunderliche Flugkünste aus. Im übrigen ist die Ehe aber beiweitem nicht so innig als die der Prachtfinken; selbst während der Brut giebt es beim Futter nicht selten Zank und Streit und nach vollendetem Nisten kümmern sich bei vielen Arten Männchen und Weibchen garnicht mehr um einander. Das Nest ist in der Regel sehr künstlich erbaut und bildet einen offnen Napf; ich werde dasselbe bei den einzelnen Arten und namentlich bei den wenigen, welche von dieser Gestaltung abweichen, näher beschreiben. Fast immer baut das Weibchen das Nest allein, brütet ebenso, wird vom Männchen gefüttert oder auch nur bewacht und durch eifrigen Gesang ergötzt. Vier bis sechs, nicht einfarbige, sondern auf grünem, blauem oder weißem Grunde bespritzte oder gefleckte Eier bilden das Gelege und werden in 11 bis 15 Tagen erbrütet. Die Jungen haben manchmal hellen, spärlichen Flaum. Sie empfangen das Futter unter gewaltigem Gezirp und verfolgen die Alten, sobald sie das Nest verlassen, mit jämmerlichen Geberden beim Futtererbetteln die Flügel rüttelnd. Noch lange Zeit hindurch werden sie vom alten Männchen gefüttert, während das Weibchen bereits die nächste Brut vorbereitet, legt oder schon wieder brütet.

Für die Stubenvögel-Liebhaberei sind sie in ihrer Gesammtheit bis jetzt leider viel weniger zugänglich, als die vorher geschilderten Prachtfinken, Widafinken und Webervögel. Nur einige Arten sind so allverbreitet als jene; die meisten werden einzeln als Sänger in Käfigen gehalten, und gezüchtet ist bis jetzt von ihnen erst eine überaus geringe Artenzahl. Während es sich allerdings nicht leugnen läßt, daß ihre Fortpflanzung in der Gefangenschaft im Durchschnitt wirklich viel schwieriger zu erzielen ist, als die vieler Prachtfinken u. a., so müssen wir es umsomehr bedauern, daß ihnen gegenüber die Liebhaberei auch recht lässig sich zeigt. Freilich treten dem begeisterten Liebhaber bei den Versuchen mit ihnen nur zu viele Schwierigkeiten entgegen. Wenige Arten erscheinen als regelmäßige Gäste alljährlich im Vogelhandel; so namentlich die amerikanischen, wie Papst-, Indigo- und Safranfink, auch einige afrikanische, wie Graugirlitz, Hartlaubszeisig u. a. Die meisten Arten aber sind sehr schwierig, gewöhnlich nur durch Zufall zu beschaffen. Manche der edelsten, der Pflege und Züchtung vornämlich werthen Finken, führen die Großhändler Chr. Hagenbeck, Chs. Jamrach, Lintz, Möller, Gudera u. A. nur selten und einzeln ein. Dazu kommt noch der Uebelstand, daß sie sich im allgemeinen nicht so leicht eingewöhnen und auch nicht so gut halten, als die Prachtfinken. Sie werden selbst nach der Eingewöhnung auch ungleich häufiger als die meisten anderen Stubenvögel von mancherlei Krankheiten heimgesucht. Unter den Vogelfreunden, welche es sich besonders eifrig angelegen sein lassen, eine Sammlung der schönsten und interessantesten fremd-

ländischen Finken zusammenzubringen und in ihrer Beobachtung und Züchtung günstige Ergebnisse zu erlangen, steht Herr Dr. F. Franken in Baden-Baden hoch obenan. Bei ihm sind sicherlich die zahlreichsten und seltensten derselben zu finden, welche bis jetzt eingeführt worden. Inbetreff der bisher erreichten Verpflegungs-, bzl. Züchtungsergebnisse muß ich mich größtentheils auf die Erfahrungen des genannten, aufmerksam und verständnißvoll beobachtenden Vogelkundigen stützen.

In Hinsicht der Fütterung und Verpflegung aller fremdländischen Finken gilt im wesentlichen das bei den Prachtfinken und Webervögeln gesagte und mit Berücksichtigung des Freilebens sich von selber ergebende. Zur Brutzeit reicht man die gleichen Zugaben und gewährt im ganzen mindestens die Verpflegung, welche die Züchtung des Kanarienvogels erfordert. Will man im Käfige züchten, so bietet man ihnen die bekannten Kanarien-Nistkörbchen; freifliegend in der Vogelstube erbauen sie ihre Nester am liebsten frei im Gebüsch, doch muß man ihnen ebenfalls Nestkörbchen, Nistkasten und verschiedene andere Gelegenheiten bieten.

Die einzelnen Sippen, Unterfamilien und Gattungen der Finken sind überaus schwierig zu scheiden und an einander zu reihen. So viele Naturgeschichten man auch zur Hand nehmen mag, immer wird man finden, daß die abweichende Anschauung des Verfassers eine anderweitige Anordnung der einzelnen Arten gewählt hat. Es giebt Schriftsteller, welche sie sogar in jedem ihrer aufeinander folgenden Bücher nicht allein neu benennen, sondern auch anderweitig eintheilen; ja sogar die neue Auflage eines alten Buchs zeigt die Aneinanderreihung und Benennung völlig verändert. Um solche Unklarheit, Verwirrung oder künstliche Zersplitterung zu vermeiden, halte ich mich an die Eintheilung, welche ich auf S. 13 angegeben habe. Die jetzt folgenden bilden die gattungen- und artenreichste Familie unter allen körnerfressenden Vögeln, während sie allerdings in Hinsicht der einzelnen Köpfe keineswegs die Mehrzahl der eingeführten Exemplare ausmachen. Alles Nähere wollen die Leser bei den einzelnen Arten und späterhin in den Abschnitten über die Verpflegung, Zucht u. s. w. nachlesen.

* * *

Als Girlitze fasse ich die Geschlechter Girlitz [Serinus, *Koch.*], Feldgimpel [Crithagra, *Swns.*] und Rothgirlitz [Chrithologus, *Cb.*] zusammen. Ihre besonderen Eigenthümlichkeiten weichen von den vorstehend im allgemeinen geschilderten aller Verwandten nicht so sehr ab, daß ich sie hier, wo ich doch jede Zersplitterung vermeiden muß, im einzelnen beschreiben dürfte. Sie gehören zu den kleinsten unter diesen Finken, zeigen, soweit bekannt ist, eine ziemlich übereinstimmende Lebensweise und bergen in ihren Reihen eine Anzahl der werthvollsten Stubenvögel. Alles nähere ergiebt sich in der Darstellung der einzelnen Arten.

Der Girlitz von den kanarischen Inseln oder Kanarienvogel [Fringilla canaria].

Zu den fremdländischen Stubenvögeln kann selbstverständlich nicht mehr der allverbreitete und seit 300 Jahren schon eingebürgerte gelbe Kanarienvogel, sondern

Chrom: Lith. Th. Fischer. Cassel.

nur der freilebende grüne Wildling, der Stammvater jenes erstern, gezählt werden. Er gelangt freilich gegenwärtig nur höchst selten noch in den Handel, trotzdem darf man ihn sicherlich als ein Ziel der Wünsche vieler Vogelliebhaber und als den Stolz der wenigen Besitzer, welche ihn jemals erhalten haben, erachten.

Der vielen Uebergänge und Schattirungen wegen ist es schwer, seine Färbung genau zu beschreiben. Sie erscheint in ihrer Prunklosigkeit doch als eine sehr gefällige. Im allgemeinen stimmt sie mit der des zahmen Kanarienvogels, welchen man den grünen oder grauen nennt, überein: Stirn, Augengegend, Kehle und Brust sind schön mattglänzend goldgrün und diese Farbe geht nach dem Rücken zu durch aschgraue Zeichnungen in Graugrün über, welches sich über den ganzen Mantel erstreckt. Schwingen und Schwanzfedern sind mattschwarz, die Seiten schwach bläulichgrün mit dunkleren Schaftstrichen, und der Bürzel ist grüngelb; die gelbe Farbe der Unterseite verliert sich am Bauch in Reinweiß. An der starken Beimischung von Aschgraublau ist der Wildling von dem zahmen Vogel, welcher durchweg mehr eine grüngelbe und meistens auch eine bräunliche Schattirung zeigt, sicher zu unterscheiden, und als besondres Kennzeichen dürfte es auch gelten, daß sein Fuß dunkelbräunlich ist mit schwärzlicher Sohle; beides letztre verliert sich jedoch mit der Zeit in der Gefangenschaft. Das Weibchen ist an der Oberseite ungleich düsterer graugrün und an der Unterseite matter gelb. Die Größe ist ein wenig geringer als die des Kulturvogels.

Dr. Karl Bolle, der allen Vogelkundigen und Liebhabern rühmlichst bekannte Naturforscher und Reisende, hat nach persönlicher Erforschung des Heimatlandes, der kanarischen Inseln, zuerst ein vollständiges Lebensbild gegeben. Im nachfolgenden will ich dasselbe hier entlehnen, soweit es eben für eine Uebersicht der Geschichte des Vogels nothwendig ist: „Dreihundert Jahre sind verflossen, seitdem der Kanarienvogel durch Zähmung über die Grenzen seiner eigentlichen Heimat hinausgeführt und Weltbürger geworden ist. Der zivilisirte Mensch hat die Hand nach ihm ausgestreckt, ihn verpflanzt, vermehrt, an sein eignes Schicksal gefesselt und durch Wartung und Pflege zahlreich auf einander folgender Generationen so durchgreifende Veränderungen an ihm bewirkt; daß wir jetzt fast geneigt sind, mit Linné und Brisson zu irren, indem wir in dem goldgelben Vögelchen den Typus der Art erkennen möchten und darüber die wilde grünliche Stammrasse, die unverändert geblieben ist, was sie von Anbeginn her war, beinahe vergessen haben. Wenn es nun für den Freund der Natur überhaupt von Wichtigkeit ist, das Lebensbild jedes beliebigen Thieres in möglichst klaren Zügen vor sich entrollt zu sehen, so wird in diesem Falle die Theilnahme dadurch noch erhöht, daß wir es mit dem Urzustande eines Wesens zu thun haben, welches eine Geschichte besitzt und Vergleiche mannigfacher Entwickelungsstufen gestattet,

welches, als ein faſt nothwendiger Beſtandtheil häuslicher Behaglichkeit, ſich mit unſeren früheſten Erinnerungen verknüpft, faſt möchten wir ſagen, als Echo des Familienglücks, ein wahrhaftes Intereſſe des Herzens in Anſpruch nimmt und zuletzt noch, abgeſehen von ſeiner Schönheit und ſeinen übrigen feſſelnden Eigenſchaften, aus weiter Ferne in unſer Vaterland eingebürgert, ſeit lange ſchon für mehrere ſonſt arme Gegenden deſſelben eine nicht unbedeutende Erwerbsquelle geworden iſt.*)

Das helle Licht, in dem der zahme Kanarienvogel vor uns ſteht, die genaue und erſchöpfende Kenntniß, die wir von ſeinen Sitten und Eigenthümlichkeiten beſitzen, ſcheint neben der Entfernung von uns, in welcher der wilde lebt, die Haupturſache der ziemlich geringen Auskunft zu ſein, die wir über ihn bisher beſaßen. Im Lande ſeiner Geburt hat man die naturhiſtoriſche Betrachtung der Erzeugniſſe des heimatlichen Bodens bisher faſt gänzlich vernachläſſigt und die Männer der Wiſſenſchaft, die dort verweilten, waren theils von weit wichtigeren und großartigeren Studien in Anſpruch genommen, theils betrachteten ſie den Aufenthalt in jenen Gegenden nur wie eine Station, an welcher ihre Ungeduld, die neue Welt der Tropenländer zu ſchauen, den Aufenthalt nicht genug abkürzen konnte. Die Leſer werden ſpäter die etwas dürftigen Aufzeichnungen finden, welche von Reiſenden und anderen Schriftſtellern über den Vogel gegeben ſind. Obwol dieſelben nun aber, wenn auch meiſt nur in gedrängter Kürze und ohne nähere Angaben, das Vorhandenſein der wilden Art und zwar in einem Kleide, welches von dem des zahmen Vogels verſchieden iſt, feſtſtellen, ſo ſcheint doch neuerdings, genährt durch die Zweifelluſt und Vorliebe für das Ungewöhnliche in unſrer Zeit, die Anſicht Raum gewonnen zu haben, es ſei keineswegs unzweifelhaft, daß der zahme Kanarienvogel von einer noch auf den Inſeln gleichen Namens lebenden Art abſtamme; er könne vielmehr garwol ſeinen Urſprung der fortgeſetzten Vermiſchung einiger grüngelben, leicht zähmbaren Finken unſres Welttheils verdanken. Wol irre geführt durch eine mißverſtandne Stelle Bechſtein's, der in ſeiner Naturgeſchichte der Stubenvögel ſagt, ihm ſeien Baſtarde vom Zeiſig und Girlitz vorgekommen, die dem grünen Kanarienvogel täuſchend ähnlich ſahen, hat man die Behauptung aufgeſtellt, die genannten beiden Finkenarten ſeien die Stammeltern unſres zahmen Sängers. Andere erklärten den wilden Kanarienvogel für übereinſtimmend mit dem Zitronzeiſig (Fringilla citrinella, *L.*). Selbſt dem Hartlaubs- oder Mozambikzeiſig (Fringilla butyracea, *var.* Hartlaubi, *Bll.*) hat man eine Stelle in dieſem aufſteigenden Geſchlechtsregiſter anweiſen wollen, während wieder Andere nicht abgeneigt

*) Eine Schilderung der Kanarienvogelzucht in Deutſchland, insbeſondre der des Harzer Sängers, nebſt ihrem Ertrage finden die Leſer in dem Buche: „Der Kanarienvogel", ſeine Naturgeſchichte, Pflege und Zucht, von Dr. Karl Ruß (Hannover, Karl Rümpler), zweite Auflage, 1876.

schienen, an den gelbstirnigen Girlitz (Fringilla flaviventris, *Gml.*) vom Kap als Stammvater des Kanarienvogels zu denken. Wenigstens hörte Albers, der den letztern in Madeira beobachtete, dieser Anschauung von hervorragenden englischen Vogelkundigen Worte leihen, und Vernon Harcourt stellt in seiner Liste von Madeira-Vögeln Kanarienvogel und gelbstirnigen Girlitz als übereinstimmend hin, ohne zu bedenken, daß Linné schon diese beiden, zwar derselben Gruppe angehörigen und ähnlich gefärbten, sonst aber völlig verschiedenen Vögel in sehr verständlichen Beschreibungen von einander gesondert hat. Alle diese Irrthümer finden Verbreitung und werden hin und wieder selbst von Gelehrten vertheidigt und doch hatte Bechstein so klar in dieser Sache gesehen!

In Erwägung dieser Unsicherheit und der vielen Lücken, welche die Naturgeschichte des wilden Kanarienvogels noch bietet, möge es vergönnt sein, nachstehend das Ergebniß zweijähriger auf jenen Inseln gesammelter Erfahrungen der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Der wilde Kanarienvogel wird von Spaniern und Portugiesen in seiner Heimat „Canario" genannt. Ein eigenthümlicher Schmelz, ein ungemein sanftes Verschwimmen der Farbentöne zeichnet sein Gefieder aus. Auf den ersten Blick erkennt man an ihm den durch keinen Zwang entweihten Hauch des Freigeborenseins. Die beiden Geschlechter sind, wenn auch erst vom dritten Frühlinge an, wesentlich von einander verschieden. Das Herbstkleid des alten Vogels weicht von dem im Frühjahr getragnen nur unbedeutend ab.

Das Vaterland ist auf die Inselgruppen des atlantischen Meeres zwischen dem 27. und 40. Grade nördlicher Breite beschränkt. Schon Linné wußte indeß, daß er nicht den Kanaren ausschließlich angehört. Man hat ihn bisher an keiner Stelle des nahegelegnen Festlandes angetroffen und er ist mit um so größerer Wahrscheinlichkeit in den Faunen desselben ein Fremdling, als der daselbst häufige Girlitz (Serinus meridionalis, *Br.*) die Inseln, auf welchen weit nördlichere Finken, wie Stiglitz und Hänfling, vorkommen, entschieden meidet. Die Gegenden, welche er bewohnt, fallen ihrer ganzen Ausdehnung nach in die südlich gemäßigte Zone und erfreuen sich, vom Uebermaß der Hitze und Kälte unberührt, einer milden, lauen, jahraus jahrein fast gleichmäßigen Natur. Auf den Eilanden, nach denen er den Namen erhalten hat, lebt er vorzugsweise im westlichen gebirgigen Theil, wo ein größerer Reichthum des Baumwuchses seinen Aufenthalt begünstigt und die von den vorherrschenden Seewinden herbeigeführte bedeutendere Feuchtigkeit der Atmosphäre, sowie die kühlere Luft, das Inselklima zu einem ausgeprägtern als in der östlichen Hälfte des Archipels machen. Auf Teneriffa, Palma, Gomera und Ferro ist er in großer Anzahl vorhanden und zwar vorzugsweise dort, wo nicht allzudicht wachsende Bäume mit Gestrüpp abwechseln.

Eigentliche Flüsse giebt es auf den Kanaren nicht, aber durch ihre tiefen schluchtenartigen Thäler winden sich in vielen Krümmungen Gebirgsbäche, die in der wasserreichen Jahreszeit bald breit und flutend über den Kies des Thalwegs hinströmen, bald eingeengt in ihrem Laufe an den Basaltwänden aufschäumen und von Terrasse zu Terrasse, mitunter in prächtigen Wasserfällen niedersteigend, ihren Weg zum Meere suchen. So im Winter und Frühlinge. Die späteren Monate des Jahres bieten ein weniger frisches Bild dar. Derselbe Bach, dessen Länge von der waldbestandnen Höhe, auf der seine Quelle liegt, bis zur Mündung selten mehr als zwei oder drei Meilen beträgt, ist im untern Theile seines Laufs versiegt; nur ein weißlicher Anflug, den das Wasser an Steinen und Felsblöcken zurückließ, sowie an naßgründigen Stellen hin und wieder eine Gruppe von Binsen und hohem Rohr, bezeichnen noch seine Bahn. Mehr aufwärts aber beginnen erst Tümpel und kleine Lachen, dann Reihen tieferer, felsumhegter Kessel, die selbst im hohen Sommer bis zum Rande mit klarem Wasser gefüllt bleiben. So gelangt man aufsteigend in die oberen Gegenden des Barranko und findet hier den lustig von Stein zu Stein tanzenden Gießbach, mit einzelnen immergrünen Waldbäumen und Farrnkraut umkränzt, unversehrt wieder. Der Grund dieses regelmäßigen Versiegens liegt zum Theil in dem durch das Klima bedingten Regenmangel in der größern Hälfte des Jahres; zum Theil aber sind die unzähligen Aderlässe, welche jedes durch bebaute Striche fließende Gewässer unaufhörlich erleidet, die Ursache. Nicht nur ganze Quellen der Waldregion werden, um Trinkwasser zu liefern, den tiefer gelegenen Ortschaften zugeführt, sondern ein fortgesetztes, höchst komplizirtes und oft wirklich bewundernswürdiges Netz von Wasserleitungen führt durch unendlich kleine in Fels gehauene Kanäle das befruchtende Naß vom Bache auf Felder und Pflanzungen, die nur durch Ueberrieselung im Sommer ertragsfähig erhalten werden können, dann aber drei bis vier Ernten in einem Jahre liefern.

Wie lieblich sind fast ohne Ausnahme die Landschaften, welche diese Thäler vor dem Blicke des Beschauers entrollen! Eng und schmal, selten mehr als fünf Minuten breit und von schroffen Höhen eingefaßt, an deren der Kultur unzugänglichen Abhängen die wilde Flora der glücklichen Inseln ihre wunderbare Pracht entfaltet, bietet fast jeder Schritt in ihnen neue Ueberraschung dar. Die Thalsole ist gewöhnlich sich selbst überlassen und erzeugt üppigen Buschwald von tropischen Gewächsen. Stufenweise gruppiren sich die Kulturen am Fuße der Berge; in schmalen Beeten wächst Korn und Mais; daneben breiten weitästige Feigenbäume ihre Kronen aus und nette weiße Häuser mit Balkon und flachem Dach schließen sich an Haine von Orangenbäumen, die, in Europa ein königlicher Luxus, hier die alltägliche Umgebung selbst dürftiger Hütten sind. Da fällt wol vom überhängenden Aste die Apfelsine ins Wasser und rollt, ein Spiel der Strömung,

dem Wanderer entgegen. Neben den Meierhöfen leuchten weithin sichtbar die reinlich gestampften Tennen, auf denen der Weizen gedroschen wird oder rothgelbe Maiskolben und blaue Feigen massenweise an der Sonne dörren. Bald fassen Brombeerhecken den Pfad ein, bald Kaktus oder blaugrüne Agaven mit ihren dornigen Schwertblättern, aus deren Mitte der Blütenschaft wie ein riesenhafter Kandelaber emporsteigt. Purpurn schimmert zu allen Zeiten der Granatbaum, er mag Blüte oder Frucht tragen, und ihm zur Seite ragt der dunkelgrün belaubte Johannisbrotbaum empor. Hier und da erhebt sich die Dattelpalme oder ein einsamer Drachenbaum, oder lichtgrüne Bananengruppen lassen ihre Blätter in dem leisen Luftzuge wallen, der unten im geschützten Thale kaum fühlbar weht, während über den Berggipfeln die Passatwinde des Weltmeers hinbrausen. Wieder einmal verengen einander fast berührende Felsmassen den Barranko zu einem finstern Schlund. Der Weg macht eine Biegung, das Hinderniß zu umgehen, und plötzlich stehen wir vor einer mehrere hundert Fuß hohen, senkrecht aufsteigenden Wand. Wir hören Menschenstimmen, das Gebrüll von Kühen und große zottige Hunde stürzen uns bellend entgegen. Wo aber, so fragen wir uns, sind die Häuser ihrer Herren? Betrachtet die Felswand! Man hat die Höhlen ihrer rothen Tuffschichten erweitert und vorn mit Mauerwerk, welches Fenster und eine Thür freiläßt, versehen; so sind Wohnungen entstanden, deren im Sommer kühle und im Winter warme Räume ganz wohnliche Heimstätten gewähren. Dicht dabei steht in offner, von Pfeilern gestützter Grotte das Vieh an der Krippe. Andere Nischen füllen Bienenkörbe, aus gehöhlten Baumstämmen gebildet, von seltsam pilzähnlicher Gestalt. Die Glöckchen der Ziegenherden klingen vom Berge herab; wir sehen den Hirten auf seinen langen Bergstock gestützt, eine weite grobe Wollendecke um die Schultern geschlagen, seine Thiere durch Zuruf und gellen Pfiff, gelegentlich auch wol durch einen Steinwurf in Ordnung halten. Unten treibt ein Arriero das beladne Maulthier über eine Brücke, die in kühnem Bogen den Abgrund überwölbt. Auf einem kleinen Acker schreitet, vor den Pflug gespannt, das Kameel friedlich neben dem Esel. Anderwärts fischen Knaben, bis an den Gürtel im Wasser stehend, wohlschmeckende Aale, den einzigen Süßwasserfisch der Inseln. Vom Walde her, dessen schwarze Laubmassen landeinwärts den Horizont begrenzen, schreiten Mädchen und Frauen schwer belastet, aber heiter plaudernd und lachend zu Thal. Sie tragen Holz- und Reisigbündel auf dem Kopfe über den gelben Mantillen, die ihre Gesichter madonnenartig umschließen, der Stadt zum Verkauf zu. Auf alle diese lebensfrischen Bilder aber schauen ringsum von den kahlen Kämmen des Gebirgs groteskzackige Felsgestalten über Land und Meer bis zu den schneeigen Bergspitzen hin und es legt sich über das Alles der weiche, sonnige Duft des tiefsten Südens. Dies ist das ungefähre Bild eines Thals auf Teneriffa, und so sehen die Ufer der kleinen

Flüsse aus, an denen nach Bechstein u. a. Schriftstellern der Kanarienvogel brüten soll.

Er nistet auch wirklich an ihnen, aber nicht ausschließlich. Ich habe ihn ebensowol in Gegenden sich fortpflanzen sehen, in denen er ziemlich weit von fließendem Wasser entfernt war und die Natur einen ganz andern Charakter als den oben geschilderten trug; nur dürfen einzelne Bäume und hohes, wenn auch lichtes Buschholz nicht fehlen. Von der Meeresküste erstreckt sich seine Verbreitung bis zu der nicht unbedeutenden Höhe von etwa 1570—1880 Mtr. im Gebirge hinauf, während er freilich an vielen dazwischen liegenden Punkten vergeblich gesucht wird. Die Gärten volkreicher Städte beherbergen ihn zur Fortpflanzungszeit ebensowol, als auch die abgelegensten, stillsten Winkel der Insel. Man kann wol sagen, daß er in viel höherm Grade als seine Vettern, der Hänfling und Stiglitz, welche ebenso häufig wie er in seinem Vaterlande zu finden sind, ein Baumvogel sei. Im dichten, schattigen und feuchten Hochwalde, der dort vorzugsweise aus Lorbeerbäumen und Stechpalmen besteht, habe ich ihn niemals beobachtet; höchstens bewohnt er dessen äußere lichte Ränder, wie ich ihn z. B. am Saume der immergrünen Waldschlucht Barranco de Badajoz bei Guimar mehrfach beobachtet habe. Da die Weingärten, welche vor dem Auftreten des verderblichen Kerbthiers in noch weit ausgedehnterm Maße als jetzt vorhanden waren, fast immer mit einzeln stehenden Obstbäumen untermischt sind, so ist der Kanarienvogel gewöhnlich in ihnen auch häufig zu finden, umsomehr, da sie sich ohne Ausnahme einer sonnigen Lage, wie er solche vorzugsweise liebt, erfreuen. Warm sind, im Sommer wenigstens, auch die weiten Forsten der kanarischen Fichte, in denen ich ihm im April d. J. 1856, wider Vermuthen, bei dem Flecken Chasna und weit über diesen hinauf in großer Kopfzahl begegnete. Man hatte bisher nicht gewußt, daß er sich zur Brutzeit in so hochgelegenen Bezirken aufhalte, vielmehr war er beständig als Bewohner der Ufergegenden angesehen. Mit Bestimmtheit kann ich jedoch versichern, daß er an den Abhängen des Teyde, sowie an anderen Orten bis zur angegebnen Höhe vorkommt und dort meistens auf jungen Nadelholzbäumen sein Nest erbaut. Man entfernt sich also weniger von der Natur als man wol denkt, wenn man bei uns dem zahmen Kanarienvogel in sogen. fliegenden Hecken abgehauene kleine Kiefern hinsetzt, damit er in deren Zweigen niste, was er so gern thut. Ob der wilde Kanarienvogel die Hochregion von Teneriffa und Palma, in welcher die kanarische Fichte fast allein mit mannigfachem Unterholz die Waldbestände bildet, auch im Winter bewohne, ist mir unbekannt. Allerdings fällt dort noch wenig Schnee, doch ist die Temperatur die Wintermonate hindurch im Vergleich mit dem ewigen Frühlinge des untern Landes schon eine sehr niedre. Es scheint jedoch, daß der Kanarienvogel auch in seiner Heimat einen gewissen Grad von Kälte zu ertragen hat und denselben

nicht sehr scheue; sonst wäre es doch wol schwer zu erklären, wie er im gezähmten Zustande dem strengen Winter des nördlichen Deutschland im ungeheizten Zimmer, wo binnen wenigen Stunden das Wasser bis auf den Grund der Gefäße friert, trotzen kann, ja, daß er bei einer solchen Behandlung sich ausdauernder zeigt, als wenn man ihn am warmen Ofen überwintert. Im Spätherbst hat Berthelot ihn in den Bandas von Chasna 1255 Mtr. über dem Meere angetroffen, jedoch nicht geglaubt, daß er hier und höher hinauf noch brüte; er war erstaunt, als ich ihm meine hierauf bezüglichen Erfahrungen mittheilte. Ich hatte bereits im September d. J. 1852 ganze Scharen von Kanarien dicht unter der Kumbre der Insel Palma, wo die Fichte aufhört und die Kodeso-Dickichte mit einzelnen Zedern untermischt vorherrschend werden, in nahezu 1880 Mtr. Höhe beobachtet.

Der Fortpflanzung des Kanarienvogels habe ich im Thale von Orotava auf Teneriffa mehrfach meine Aufmerksamkeit zugewendet und ich kann daher genauere Mittheilungen über dieselbe machen. Parung und Nestbau erfolgen im März, meistens erst in der zweiten Hälfte. Niemals baute der Vogel in den von mir beobachteten Fällen niedriger als $2,_5$ Mtr. über dem Boden, oft in viel bedeutenderer Höhe. Für junge, noch schlanke Bäumchen scheint er eine besondre Vorliebe zu hegen und unter diesen wiederum die immergrünen oder sehr früh sich belaubenden vorzüglich gern zu wählen. Der Birn- und der Granatbaum werden ihrer vielfachen und doch lichten Verästelung halber häufig, der Orangenbaum seiner allzu dunklen Krone wegen schon seltner, der Feigenbaum, wie man versichert, niemals zur Brutstätte ausersehen. Das Nest wird sehr versteckt angebracht, doch ist es, namentlich in Gärten, durch das viele Hin- und Herfliegen des Pärchens in seinem nicht großen Nistbezirk unschwer zu entdecken. Ich fand das erste mir zu Gesicht gekommene Nest in den letzten Tagen des Monats März i. J. 1856 inmitten eines verwilderten Gartens der Villa Orotava auf einem gegen 4 Mtr. hohen Buchsbaum, der sich über eine Mirtenhecke erhob. Es stand, nur mit dem Boden auf den Aesten ruhend, in der Gabel einiger Zweige, unten breit, oben sehr eng mit ungemein zierlicher Rundung nett und regelmäßig gebaut. Es war durchweg aus schneeweißer Pflanzenwolle zusammengesetzt und nur mit wenigen dürren Hälmchen durchwebt. Das erste Ei wurde am 30. März und dann täglich eins hinzugelegt, bis mit der Anzahl von fünf Eiern das Gelege vollzählig war; während ich in manchen Nestern nur drei bis vier Eier fand, habe ich nie mehr als fünf in einem solchen gesehen. Dieselben sind blaß meergrün, mit röthlichbraunen Flecken besät, selten beinahe oder ganz einfarbig. Sie gleichen denen des zahmen Vogels durchaus. Ebenso hat die Brutzeit durch die Züchtung keine Veränderung erlitten; sie dauert beim Wildling gleichfalls ungefähr 13 Tage. Die Jungen bleiben im Nest, bis sie

völlig befiedert sind und dann werden sie noch eine Zeitlang nach den Ausfliegen von beiden Alten, namentlich aber vom Männchen sorgsam aus dem Kropfe gefüttert. In der Regel werden in einem Sommer vier, mitunter aber auch nur drei Bruten gemacht. Zu Ende d. M. Juli beginnt die Mauser, mit welcher natürlich für das laufende Jahr die Fortpflanzungszeit schließt. Sämmtliche Nester, deren ich sechs bis sieben im Frühlinge des genannten Jahres beobachtete, waren in übereinstimmend saubrer Weise aus Pflanzenwolle geformt; in einigen unterbrach kaum ein Grashalm oder Reisigstückchen das glänzende Weiß des Baues. Wahrscheinlich hatte bei ihnen allen der die Samen der kanarischen Weide umhüllende zarte Flaum nebst den Federkronen von Pflanzen aus der Familie der Zichoriengewächse den Stoff geliefert, von welchem die Vögelchen das Nest so kunstreich gewebt. Einer äußern Umkleidung durch Flechten u. drgl. scheint dasselbe wol seines versteckten Standorts halber nicht zu bedürfen. Im Sommer liefern den Vögeln mehrere Gewächse ungemein feine Pflanzenseide zum Nestbau; an Orten aber, wo sie nur gröbere Stoffe finden, sollen die mehr aus Moos und Halmen gebauten Nester stets eine innere weiche Ausfütterung haben.

Das Männchen sitzt, während das Weibchen brütet, in der Nähe, am liebsten hoch auf noch unbelaubten Bäumen, im ersten Frühlinge gern auf Akazien, Platanen oder echten Kastanien, Baumarten, deren Blattknospen sich erst spät öffnen oder auch auf dürren Zweigspitzen, wie sie die Wipfel der in Gärten und in der Nähe der Wohnungen so allgemein verbreiteten Orangen nicht selten aufzuweisen haben. Von solchem Standpunkt aus läßt es am liebsten und längsten seinen Gesang hören. Es ist eine Freude, dann dem kleinen Virtuosen zu lauschen, zumal wenn dies, wie es uns häufig vergönnt war, von dem Balkon oder der Gallerie eines Isleño-Hauses aus geschehen kann, wo man sich in gleicher Höhe mit dem singenden Vogel befindet, der in ganz geringer Entfernung vor uns sitzt. Wie bläht er dann seine kleine gesangsreiche Kehle auf, wie wendet er die goldgrün schimmernde Brust bald rechts bald links, sich im Strahl seiner heimatlichen Sonne badend, bis auf einmal der leise Ruf des im Neste verborgnen Weibchens sein Ohr trifft und er mit angezogenen Flügeln sich in das Blättermeer der Baumkrone stürzt, welche über ihm gleichsam zusammenschlagend die süßen Mysterien seines Gattenglücks verhüllt. Umgeben von der duftenden Blütenpracht seines Vaterlands erscheint das unscheinbar grüne Vöglein herrlicher als die schönsten seiner Brüder, welche in Europa den Rock der Sklaverei tragen. Es ist ja an seiner Stelle, hier, wo des Schöpfers Wort es ins Dasein gerufen, und die Melodie seines Liedes verfehlt um so weniger auf uns einen unwiderstehlichen Zauber auszuüben, als durch alle Sinne zugleich wohlthuende Empfindungen auf den Zuhörer einwirken und mit dem Reiz des Fremdartigen sich

gerade durch diese Vogelstimmen träumerische Erinnerungen der Kindheit in die gegenwärtigen Eindrücke mischen. Unzweifelhaft hat mich nichts so angeheimelt und mir das Gefühl des Fremdseins auf den kanarischen Inseln verscheucht, als der überall mich freundlich grüßende Gesang des wilden Kanarienvogels, der dort etwa in derselben Häufigkeit wie der Finkenschlag in Deutschland erschallt.

Es ist viel über den Werth dieses Gesangs geschrieben; von Einigen überschätzt und zu sehr gepriesen, ist er von Anderen, die vielleicht nach einem oder nur wenigen nach Europa gebrachten Männchen, deren Organ die vollkommene Ausbildung nicht erlangt hatte, ihr Urtheil bemessen, einer zu scharfen, absprechenden Beurtheilung unterzogen. Man bleibt ziemlich sicher bei der Wahrheit, wenn man die Meinung ausspricht, daß die wilden Kanarienvögel so singen, wie in Europa die zahmen. Der Schlag dieser letzteren ist durchaus kein Kunsterzeugniß, sondern, wenn auch hin und wieder durch die Einwirkungen fremder Vogelgesänge beeinflußt, doch im großen ganzen das geblieben, was er ursprünglich war. Einzelne Passagen hat die Erziehung umgestalten und zu glänzender Entwickelung bringen, andere der Naturzustand in größerer Frische und Reinheit bewahren können. Der Charakter beider Gesänge jedoch ist noch jetzt völlig übereinstimmend. Dies aber beweist, daß, mag ein Volk auch seine Sprache verlieren, eine Vogelart dieselbe doch durch alle Wandlungen äußerer Verhältnisse unversehrt hindurchtragen kann. Soweit geht die sachliche Beurtheilung; das persönliche Urtheil aber wird bestochen durch die tausend Reize der Landschaft, durch die Eindrücke des Ungewöhnlichen. Der Gesang, den wir vernehmen, erklingt uns herrlich, aber er dünkt uns noch ungleich klangreicher dadurch, daß er nicht im staubigen Zimmer, sondern unter freiem Himmel erschallt, wo Rosen und Jasmin um die Cypresse ranken und die im Raum verschwimmenden Klangwellen alle Härten abstreifen, welche bei dem meistens in zu großer Nähe vernommenen Gesange des zahmen Vogels unangenehm, wol gar unausstehlich erschallen. Hier begnügen wir uns nicht, mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt man auch durch die Einbildungskraft und so bilden sich Urtheile, wie ‚dem Gesange eines Vogels von den Kanarischen Inseln kommt nichts gleich' u. s. w. (Heineken), welche später bei Anderen Enttäuschung hervorrufen. Ebensowenig wie alle Hänflinge und Nachtigalen oder alle zahmen Kanarienvögel gleichgute Schläger sind, darf man dies von den Wildlingen fordern. Auch unter ihnen giebt es mehr und minder tüchtige Sänger; das aber ist meine entschiedne Ansicht, die sogen. Rollen, jene zur Seele dringenden, tiefen Brusttöne, habe ich nie schöner vortragen gehört, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werde ich die Leistungen eines wundervoll hochgelben Männchens von Gran-Canaria, welches ich als Geschenk von einem Freunde erhielt, vergessen. Am meisten möge man sich hüten,

den Naturgesang nach dem oft stümperhaften sehr jung gefangener Wildlinge, die im Käfige ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurtheilen.

Der Flug des Kanarienvogels gleicht dem des Hänflings; er ist etwas wellenförmig und geht meistens in mäßiger Höhe von Baum zu Baum, wobei, wenn die Vögel schwarmweise fliegen, die Glieder der Gesellschaft sich nicht dicht aneinander drängen, sondern jedes sich in einer kleinen Entfernung von seinem Nachbar hält und dabei einen abgebrochnen, oft wiederholten Lockruf hören läßt. Die Scharen, in welche sie sich außer der Fortpflanzungszeit zusammenthun, sind zahlreich, lösen sich aber den größten Theil des Tages hindurch in kleinere Flüge auf, welche an geeigneten Orten ihrer Nahrung nachgehen und häufig längere Zeit auf der Erde verweilen, vor Sonnenuntergang jedoch sich gern wieder sammeln und einen geeigneten Ort zur gemeinschaftlichen Nachtruhe aufsuchen. Auf dem dazu gewählten Baume stimmen sie dann ein lautes und wirres Konzert an; man würde aber Unrecht daran thun, dieses mit ihrem eigentlichen Gesange zu verwechseln.

Die Nahrung des Kanarienvogels besteht größtentheils, wenn nicht ausschließlich, in Pflanzenstoffen, kleinem Gesäme, theils mehliger, theils öliger Beschaffenheit, zartem Grün und saftigen Früchten, namentlich Feigen, welche letzteren er, wie fast alle Singvögel der Kanarischen Inseln und selbst die in den Tropen heimischen Finken, auch in der Gefangenschaft mit großer Vorliebe zu verzehren pflegt. Eine durchgebrochne reife Feige bietet ihnen in ihrem Fleisch, süßen Saft und sehr zahlreichen Kernen einen ersichtlichen Leckerbissen dar, den sie gleichsam ausschlürfen, zu welchem sie im Freien nur dann gelangen können, wenn die Frucht vor Ueberreife ihren violettblauen oder gelbgrünen Mantel sprengt. Vorher ist es ihnen unmöglich, mit dem zarten Schnabel durch die feste von etwas scharfem Milchsaft strotzende Hülle zu dringen. Ein solcher Feigenbaum mit geplatzten Früchten bietet einen wahrhaft interessanten Anblick dar, denn er bildet den Sammelplatz für eine große Anzahl von Singvögeln; Amseln, Plattmönche, Weidenlaubvögel, Stiglitze, Steinsperlinge, Blaumeisen u. a. m. finden auf seinen Zweigen einen gedeckten Tisch, an dem Insekten- und Körnerfresser bunte Reihe machen. Unter den Pflanzenfamilien, welche dem Kanarienvogel Nahrung bieten, scheinen die Kreuzblütler und Vereinsblütler vorzugsweise gern von ihm aufgesucht zu werden. Die Kröpfe aller im Frühlinge erlegten fand ich fast ausschließlich mit Kreuzblütersamen von verschiedenen Arten angefüllt. Dieselben waren noch beiweitem nicht reif, daher um so zarter und sie dürften also das Hauptfutter für die noch kleinen Jungen sein. Dem Kohl- und Salatsamen gehen sie den Sommer hindurch auf Feldern und in Gärten nach. Auch von mancherlei anderen Sträuchern und Kräutern fressen sie junge grüne und zarte Pflanzenstoffe, auf Disteln dagegen habe ich sie nie erblickt. Noch verdient bemerkt zu werden,

daß die Straßen von Santa Cruz, um wieviel mehr also abgelegene Orte, voller Kreuzkraut und Vogelmiere stehen und daß an feuchten Stellen unser Wegebreit, sowie an Quellen und Bächen Brunnenkresse, und auch der Mohn im wilden Zustande auf Hügeln und zwischen dem Getreide sprießt. So findet der Kanarienvogel also bereits in seinem Vaterlande, mit Ausnahme des Hanfs, fast alle Leckerbissen reichlich vor, durch welche wir ihm die Gefangenschaft versüßen. Eines Hauptnahrungsmittels muß ich jedoch noch erwähnen. Es ist dasjenige, welches in Europa am meisten Ruf erlangt hat und so allgemein zur Fütterung der Stubenvögel verwendet wird, nämlich das Kanariengras (Phalaris canariensis), das auf den Inseln sowie in allen Ländern des Mittelmeerbeckens einheimisch, in Deutschland namentlich bei Erfurt im großen gebaut wird und früher lange als die ausschließliche Kost des Kanarienvogels galt. In Holland baute man es bereits in der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts an. Es dient noch jetzt auf den Kanarischen Inseln unter dem Namen Alpiste zum alleingebräuchlichen Vogelfutter, wird daselbst aber gegenwärtig nicht mehr gewonnen, sondern als Handelsartikel von Spanien hinübergebracht. Wildwachsend trifft man es in etwa 0,5 Mtr. hohen dünnen Halmen, die an der Spitze eine rundliche, kopfförmige Aehre tragen, an Feldrainen und unter der Saat, sowie hin und wieder auch auf steinigen Hügeln an, wo es von den Kanarienvögeln allerdings, jedoch nicht mehr als andere verwandte Arten und Hirsegräser, aufgesucht wird.

Wasser ist für den Kanarienvogel ein gebieterisches Bedürfniß. Er fliegt oft, meist gesellig zur Tränke und liebt das Baden, bei dem er sich sehr naß macht, im wilden Zustande ebenso sehr als im zahmen.

Die geographische Verbreitung des Kanarienvogels erstreckt sich außerhalb der ihm gleichnamigen Inseln noch über Madera und die Azoren. Ueber diese sämmtlichen Archipele ist er jedoch unregelmäßig vertheilt. Er lebt auf den Kanaren als beständiger Brutvogel nur soweit, als etwa der Teyde oder Pik von Teneriffa seinen gigantischen Schatten wirft. Schon die östliche Hälfte Gran-Canaria's besitzt ihn als solchen nicht mehr und von Fuerteventura und Lanzarote verbannen ihn Baumlosigkeit und Wassermangel. Wol aber streifen in diese letztgenannten Gegenden zahlreich, zumal nach Gran-Canaria, im Herbst und Winter seine wandernden Schwärme; denn er ist, wie soviele Finkenarten, weder Stand- noch Zug-, sondern ein entschiedner Strichvogel, der überall erscheint, wohin ihn innerhalb der Grenzen des Inselland Laune oder der Ueberfluß irgendwelcher Lieblingsnahrung rufen. Im Westen der großen und fruchtbaren Insel Gran-Canaria ist er vorhanden und gilt dort besonders für einen Bewohner des Pinal- oder Fichtenwaldes, welcher, wenn auch durch die Axt gelichtet, hier und im Innern noch immer bedeutende Flächen einnimmt. Auch wurde uns berichtet, daß der

Vogel in der Umgebung des nach Norden zu gelegnen Städtchens Teror häufig sei und Herr Baron v. Minutoli spricht bei Erwähnung der jener Gegend angehörigen Montaña de Doramas von Konzerten Hunderter von Kanarienvögeln, die er dort schmettern hörte. Jedenfalls tritt der Vogel jedoch in Canaria in geringerer Anzahl als in Teneriffa auf und dringt nur in vereinzelten Pärchen bis zum östlichen Fuß des Gebirgsstocks vor, welcher die Wasserscheide des Eilands bildet. Hier, z. B. in den Obsthainen von Tenteniguada, einer scheinbar wie für ihn geschaffnen Gegend, hörte ich im Juni während eines längern Aufenthalts nur ein Männchen schlagen, dies aber täglich. Vier Wochen früher hatte ich ihn ebenfalls sehr zerstreut im bergigen Mittelpunkt Canaria's und zwar in etwa 1100 Mtr. Höhe bei Hoya de la Vieja, sowie in dem der Mittagsseite der Insel zugewandten Barranco de Chamorican, wo der Nadelwald mit einigen gewaltigen Stämmen beginnt, angesiedelt gefunden.

Es ist eine durch A. v. Humboldt's Schriften auch in Deutschland zu allgemeiner Kenntniß gelangte Thatsache, daß früher einmal die kleine Insel Montaña Clara von Kanarienvögeln bewohnt war, deren außerordentlich herrlicher Gesang sie zum Gegenstande besondrer Aufmerksamkeit machte und höchlichst gerühmt wurde. Auch Ledru erwähnt in seinem Katalog diese Oertlichkeit. Nun ist Montaña Clara, nebst einigen anderen, ihr ähnlichen, wüsten Inselchen, in der Nähe von Lanzarote gelegen, ein unbewohnter, baumloser Fels im Meere, der in überaus kühnen Umrissen sich aus den Fluten erhebt und der sehr östlichen Lage, sowie seiner Bodenbeschaffenheit nach gleichwenig zum Wohnplatz von Kanarien geeignet erscheint. Dennoch liegt kein Grund vor, an der durch Auoritäten gestützten, noch heute im Munde des Volkes lebenden Ueberlieferung zu zweifeln. An einer Quelle jenes Felseneilands soll hohes Buschwerk gestanden haben und dies der Aufenthalt jener wunderbar schön singenden Lokalrasse gewesen sein, bis Hirten oder Fischer es in Brand gesteckt und so die Vögelchen vertrieben haben. Dies Ereigniß hat sich nach einer handschriftlichen Aufzeichnung meines Freundes Berthelot in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts zugetragen. Es ist sehr wol denkbar, daß die tiefe Abgeschiedenheit und Oede der Stelle vor Alters eine Kolonie von Kanarienvögeln angelockt und daß gerade die weite Entfernung von ihresgleichen, hier, wo nur Sturmtaucher und Möven ihre Nachbarn waren, zuerst innerhalb weniger Familien die Ausbildung einer Gesangsfertigkeit begünstigen konnte, welche sich später, je enger der Kreis, um so leichter, als Erbtheil fortgepflanzt. Ich selbst habe nicht Gelegenheit gehabt, Montaña Clara zu besuchen; es wäre jedoch interessant, sich von seinem gegenwärtigen Zustande zu überzeugen und es dürfte doch nicht unmöglich sein, daß man in dem daselbst vielleicht aufs neue emporgeschossenen Gesträuche auch die zu ihrem einstigen Lieblingsaufenthalte zurückgekehrten Vögel wiederfände.

Der Verfasser dieser Zeilen hat die ersten wilden Kanarienvögel in Madeira gesehen, obwol alle seine späteren Beobachtungen auf den Kanarischen Inseln angestellt wurden. In den überaus reizenden, weltberühmten Gärten um Funchal trifft man diese Vögel häufig an, und hier war es, wo Heineken, der in den Jahren 1820—29 auf Madeira weilte, die ersten guten, ausführlicheren Studien über ihre Lebensweise gemacht hat. Man kann seinen Bericht, dem eine sehr naturwahre Beschreibung beigegeben ist, im „Zoological Journal" Nr. 17, Art. 17, und in der „Isis" von 1831 nachlesen, aus welcher letztern er unter anderen seinen Weg in Lenz' treffliche Naturgeschichte gefunden hat. Man nennt den wilden Vogel in Madeira Canario de terra, während er in Teneriffa Canario de campo heißt. Die gezähmte Rasse trägt auf erstrer Insel den Namen Canario de fora (fremder Kanarienvogel), obwol man ihn jetzt auch dort und zwar vom schönsten Gelb in großen Hecken zieht. Vernon Harcourt hat dem Vogel ebenfalls in Madeira Aufmerksamkeit gewidmet, und J. Yate Johnson, der talentvolle Verfasser des Buchs „Madeira, its climate and scenery", bemerkt über denselben folgendes: ‚Während der Brutzeit ist er sehr zutraulich und besucht furchtlos die Gärten mitten in der Stadt. Ist diese vorbei, so schart er sich mit Hänflingen und anderen Vögeln zusammen und treibt sich dann vorzugsweise auf Feldern und an weniger besuchten Orten umher. Er läßt den größten Theil des Jahres hindurch seinen Gesang hören. Gelbe Kanarienvögel werden in bedeutender Anzahl aus Lissabon nach Funchal zum Verkauf gebracht. Die Kreuzung zwischen wilden und zahmen scheint eine Rasse hervorzubringen, die körperlich kräftiger und mit stärkerer Stimme als die gelbe begabt ist.'

Weder Johnson noch irgend ein andrer Schriftsteller belehrt uns darüber, ob auf der in geringer Entfernung von Madeira nach Nordost zu gelegnen Insel Porto Santo wilde Kanarienvögel anzutreffen seien. Der großen Kahlheit und der Wasserarmuth halber, an welcher sie leidet, möchten wir fast daran zweifeln. Nicht minder schweigen die Nachrichten über das etwaige Vorkommen der Art auf den drei Desertas von Madeira. Ueber die zwischen letztrer und den Kanaren mitteninne liegenden Salvages, die ebenfalls unbewohnt sind und höchstens von Jägern regelmäßig besucht werden, findet man nur die fabelhaft klingende Angabe La Caille's, die Kanarienvögel seien auf ihnen so gemein, daß man zu einer gewissen Jahreszeit nicht einige Schritte thun könne, ohne ihre Eier zu zertreten (!).

Auf den Azoren endlich sind über das Vorkommen des Kanarienvogels noch durchaus keine genaueren wissenschaftlichen Beobachtungen angestellt worden. Wir erfahren nur, daß die grüne Rasse daselbst im wilden Zustande vorhanden sei. Es scheint jedoch auch hier in dem nördlichen Bezirk ihres Gebiets eine nicht ganz gleichmäßige Vertheilung der Art über die langgedehnte Inselkette

ſtattzufinden. Der Pater Cordeyro ſchreibt, ſie ſeien in St. Miguel ſelten, während ſie auf dem waldigen St. Jorge unter den häufigeren Vögeln angeführt werden. Es geht aus ſeinem Vorkommen auf den Azoren übrigens hervor, daß dieſer große tonbegabte Girlitz der atlantiſchen Inſeln, den wir Kanarienvogel nennen, der Vogelwelt unſres Erdtheils, was bisher noch nirgends geſchehen iſt, als berechtigtes Glied zugezählt werden muß.

Der Fang dieſer Vögel iſt ſehr leicht, zumal die Jungen gehen faſt in jede Falle, ſobald nur ein Lockvogel ihrer Art daneben ſteht; ein Beweis mehr für die große Geſelligkeit der Art. Ich habe ſie in Canaria einzeln ſogar in den Schlagen, deren Locker nur Hänflinge oder Stiglitze waren, ſich fangen ſehen. Gewöhnlich bedient man ſich, um ihrer habhaft zu werden, auf den Kanaren eines Schlagbauers (Falſete), das aus zwei ſeitlichen Abtheilungen, den eigentlichen Fallen mit aufſtellbarem Tritthol, getrennt durch den mitteninne befindlichen Käfig, in welchem der Lockvogel (Reclamo) ſitzt, beſteht. Dieſer Fang wird in baumreichen Gegenden, wo Waſſer in der Nähe iſt, betrieben und iſt in den frühen Morgenſtunden am ergiebigſten. Er iſt, wie ich aus eigner Anſchauung weiß, ungemein anziehend, da er dem im Gebüſch verſteckten Vogelſteller Gelegenheit giebt, die Kanarienvögel in größter Nähe zu beobachten und ſich ihrer zierlichen Bewegungen und ihres anmuthigen Weſens ungeſehen zu erfreuen. Auf dieſe Weiſe habe ich binnen wenigen Stunden 16—20 Köpfe einen nach dem andern fangen geſehen. Die Mehrzahl davon waren indeß noch unvermauſerte Junge. Beſäße man, was nicht der Fall iſt, auf den Inſeln ordentlich eingerichtete Vogelherde, ſo würde der Ertrag natürlich noch ein weit mehr lohnender ſein.

Ich habe Kanarienwildlinge genug in der Gefangenſchaft beobachtet und mitunter ihrer ein bis anderthalb Dutzend auf einmal beſeſſen. Der Preis junger, bereits ausgeflogener Vögel pflegt in Santa Cruz, wenn man mehrere auf einmal kauft, 1 Fiska (etwa 25 Pfennige) für den Kopf zu betragen. Friſch gefangene alte Männchen werden mit 1 Toston (1 Mark) bezahlt. In Canaria ſind, trotz der daſelbſt herrſchenden größern Billigkeit, die Preiſe um vieles höher, was allein ſchon hinreichen würde, ihre größere Seltenheit daſelbſt darzuthun.

Es ſind unruhige Vögel, die längere Zeit brauchen, ehe ſie ihre angeborne Wildheit ablegen und ſich, beſonders in engen Käfigen zu mehreren zuſammengeſperrt, das Gefieder leicht zerſtoßen. Sie ſchnäbeln ſich ſehr gern unter einander und die jungen Männchen geben ſich binnen kurzem durch ein fortgeſetztes lautes Zwitſchern zu erkennen. Meine jungen Vögel fingen in der zweiten Hälfte des Auguſt zu mauſern an; einige unter ihnen hatten indeß noch im Dezember den Federwechſel nicht vollſtändig bewerkſtelligt. Wahrſcheinlich ſind dies die am ſpäteſten ausgeflogenen geweſen. Das helle Gelbgrün zeigt ſich zuerſt an der Bruſt.

Kaum giebt es einen weichlichern Körnerfresser. Man verliert die meisten an Krämpfen, deren zweiter oder dritter Anfall mit dem Tode zu endigen pflegt. Wer diese Vögel über See mit sich nehmen will, wird wohl daran thun, sich längere Zeit vor der Abreise wenigstens mit der doppelten Anzahl von denen, die er zu erhalten wünscht, zu versorgen und dieselben in einem jener flachen, hölzernen, nur vorn mit einem schrägen Gitter versehenen Käfige, wie sie zwischen Frankreich und der Westküste Afrikas im Gebrauch sind, fortzuschaffen. Trotz aller Vorsichtsmaßregeln muß man darauf gefaßt sein, während der Seereise und unmittelbar nach derselben die Hälfte der Vögel einzubüßen. Von elf glücklich heimgebrachten, bereits vermauserten, vollkommen eingewöhnten und zum Theil schon schlagenden Kanarienvögeln habe ich im Laufe des ersten Winters noch mehrere ganz unerwartet epileptisch zugrunde gehen gesehen. Vor allem vermeide man es, sie in die Hand zu nehmen, denn viele von ihnen ertragen das durchaus nicht. Später scheinen sie kräftiger zu werden. Die meinigen manserten im zweiten Sommer ihres Lebens schon im Juli, also einen vollen Monat früher als die zahmen. Das eine Weibchen, welches ich während der Heckzeit des Jahres 1857 in einer Volière mit wilden und zahmen Männchen zusammen umherfliegen ließ, hat sich zu keiner Parung verstanden, wol aber gehen die wilden Hähnchen mit großer Leichtigkeit Verbindungen mit der gezähmten Rasse ein und werden äußerst treue liebevolle Gatten, die nicht aufhören, ihr Weibchen aufs zärtlichste zu füttern und die meistens sogar die Nacht auf dem Neste desselben sitzend zubringen. Sie bieten jedem andern Vogel, der ihnen zu nahe kommt, die Spitze; ja, ein älteres Männchen, dem beim Kampfe mit einem grünen Hänfling von diesem doppelt stärkern Gegner der Beinknochen durchgebissen worden, hörte in diesem beklagenswerthen Zustande nicht auf, durch schmetternden Gesang seinem Widersacher aufs neue den Fehdehandschuh vor die Füße zu schleudern; es konnte nur durch rasche Entfernung aus der Volière gerettet werden.

Die Mischlinge beider Rassen heißen in Teneriffa Verdegais und werden besonders hoch geschätzt. Ich habe von einem hochgelben gezüchtete gesehen, die Schönheit und eine ganz durch große ungewöhnliche Zeichnung auffielen. Sie waren am Oberleib dunkelgrün, unten von der Kehle an rein goldgelb gefärbt und erinnerten lebhaft an den Hartlaubszeisig und den gelbstirnigen Girlitz, zwei afrikanische Arten, welche dauernd ein ähnliches Kleid tragen. Diese Vögel galten aber auch für etwas außerordentliches und sehr seltnes. In den Hecken (Crias), die man auf den Kanaren von zahmen und wilden Vögeln anlegt, befolgt man den Grundsatz, einem Männchen letztrer Rasse seiner großen Kraft und Lebhaftigkeit wegen stets zwei Weibchen zuzugesellen.

(Mein Freund, Herr Alfred Hansmann, fügt dem Obigen folgende Bemerkung aus dem Schatze seiner eignen Erfahrung hinzu: ‚Der wilde Kanarien-

vogel lernt wahrscheinlich ziemlich spät in seinem ersten Lebensjahre den vollständigen Gesang des alten Männchens. Exemplare, welche schon früher einmal von dem verstorbnen Geh.-Medizinalrath Dr. Albers von Madeira mitgebracht waren und welche ich zu hören Gelegenheit hatte, zwitscherten nur ziemlich laut, zuweilen stärkere flötende oder rollende Passagen einflechtend. Mit dem eigentlichen, so charakteristischen Gesange des Kanarienvogels hatte dieser nur geringe Aehnlichkeit, ebenso wie derjenige eines jungen Anfängers, dessen Liede denn auch, wiewol in erhöhtem Maßstabe, jenes Zwitschern entsprach. Leider konnte ich nicht erfahren, zu welcher Jahreszeit die jungen Sänger eingefangen worden. Bei meinem wilden Kanarienvogel war mir dies jedoch genau bekannt. Im Herbste eingefangen, hatte sich bis kurz vor Weihnachten durchaus noch nicht der bereits verständlich angedeutete Schlag aus dem Gezwitscher sicher herausbilden wollen. Aus Furcht, dies könne zuletzt ganz unterbleiben, brachte ich meinen Vogel zu einem seiner wilden Genossen, dessen Sängertalent bereits vollkommen entwickelt war. Hier lernte er denn in der Zeit von etwa drei Wochen einen erträglichen Schlag, in welchem jedoch außer der den wilden Kanarienvögeln eigenthümlichen Weichheit und Tiefe einzelner Töne besonders schöne Leistungen nicht wahrzunehmen waren. Das den zahmen Vögeln eigne ängstliche piep, piep! ließ auch mein wilder hören, sobald sich eine ihm fremde Person seinem Käfige zu sehr näherte. Mich unterschied er deutlich und angeredet oder wenn ich dicht zu ihm herangetreten war, antwortete oder grüßte er mich mit einem freundlichen Girren, das auch, nur lauter, zum Lockruf für vorüberfliegende Sperlinge dienen mußte. Bei plötzlichem Schreck ließ er ein zwei- oder dreisilbiges schnell ausgestoßnes leises Zwitschern vernehmen.')

In einer ungedruckten Mittheilung über den Canario im wilden Zustande, welche uns Sabin Berthelot, Direktor des botanischen Gartens auf Teneriffa, dieser gründliche und berühmte Forscher, der den Archipel der sieben Inseln wie kein Andrer kennt, mit gewohnter Güte zur Verfügung stellte, heißt es unter anderm: ‚Diese Vögel sind auf den Kanarischen Inseln sehr verbreitet. Sie bewohnen die Obstgärten der Küstenregion; am häufigsten trifft man sie in den Thälern und auf mäßig hohen Hügeln. Uebrigens wechseln sie ihren Aufenthalt je nach den Gegenden oder vielmehr nach ihren Lebensbedürfnissen. So werden sie bald von den schwarzen Maulbeeren, nach deren Kernen sie, wenn die Frucht vertrocknet ist, lüstern sind, vom Wegebreit und der Miere nach gewissen Oertlichkeiten, bald von den Gänsefußgewächsen und Fuchsschwanzarten anderwärts hin gelockt. In Teneriffa sieht man im Frühlinge in den Thälern von Guimar und Orotava, sowie auf den lachenden Fluren von Matanza und La Victoria große Scharen beisammen; später findet man sie im Herbste wol 1600 Meter über der Meeresfläche. Vor mehr als

zwanzig Jahren jagte ich einmal in der Gran-Huerta des Marquis von las Palmas und erlegte auf einen Schuß 17 Kanarienvögel. Noch heute wirft mir mein Gewissen dies Blutbad vor und nur die Erinnerung an die köstlichen kleinen Spießbraten, die das Ergebniß waren, läßt mich Beruhigung finden. — In den voller Orangenbäume stehenden Gärten wählen sie an stürmischen Tagen und bei gewitterschwüler Luft dieselben zum Zufluchtsort. Unter dem Laubdach versammelt, lassen sie dann, sobald die Ruhe wieder hergestellt ist und die Sonne aufs Neüe hervorbricht, ein betäubendes Gezwitscher hören.

Buffon hat gesagt: Wenn die Nachtigal der Sänger des Waldes ist, so giebt der Kanarienvogel dagegen den Musiker des Zimmers ab. — Im wilden Zustande ist sein Lied dann unharmonisch und zu gellend, wenn er es im Verein mit vielen anderen erschallen läßt. Jeder Kanarienvogel muß ganz einzeln gehalten sein, soll er uns durch seinen Gesang entzücken; dann bestreitet die Natur alle Kosten der Kunst, die Modulationen wechseln in unendlicher Mannigfaltigkeit, in allen Tönen, hell, brillant, in Kadenzen, kurz und schmetternd oder lang anhaltend. Es liegt ein besondrer Ausdruck darin, den man im gezähmten Zustande nur mit gewissen Modifikationen wiederfindet. Der Gesang des zahmen Kanarienvogels ist oft tönender und lauter, dafür aber mit weniger markirten Uebergängen ausgestattet.

Manche Autoren haben über den Sänger der Kanarischen Inseln falsche Angaben nieder- oder nachgeschrieben. Einer unter Anderen, Bory de St. Vincent, sagt in dem ihn auszeichnenden glänzenden Stile: Auf den Piks von Teneriffa feiert dieser Vogel unaufhörlich ein stets neues Liebesglück. Fern von menschlichen Wohnungen, wo keines andern Vogels Stimme ertönt, genügt es ihm, seine Gattin zu bezaubern. — Und an einer andern Stelle lesen wir: Hin und wieder rauscht von den in Schwärmen versammelten Kanarienvögeln das Laub der Lorbeeren oder Palmen und plötzlich hört man aus einem Baume ein hinreißendes Konzert hervorbrechen. — Wir haben unsre Meinung über den Werth der Melodie und über die Wirkung, welche sie, vielstimmig gesungen, hervorbringt, bereits abgegeben. Was den Aufenthalt von Kanarienvögeln in den Kronen der Lorbeerbäume anbetrifft, so können wir versichern, daß sie sich äußerst selten in den Lorbeerforsten blicken lassen. Das Klima dieser Region ist ihnen zu feucht. Der Schatten, den jene jungfräulichen Waldungen werfen, würde ihnen nicht zusagen; denn über alles lieben sie das helle Licht des Tages und die buschigen Hügel, an deren Abhängen der Sonnenstral das Reifen der Pflanzensamen beschleunigt. An diesen Orten aber lassen sie sich wiederum niemals auf Dattelpalmen nieder, weil deren vom Wind gepeitschte Wedel einen schlechten Sitz für sie abgeben würden'.

Der älteste Autor, welcher des Kanarienvogels und zwar schon mit dankenswerther Ausführlichkeit gedenkt, ist Konrad Geßner, der sein Buch „De avium natura“ in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts geschrieben, den Vogel indessen noch nicht selbst gesehen, sondern nach dem Bericht eines Freundes geschildert hat. Er nennt ihn Canariam aviculam, zu deutsch Zuckervögele. Ihm folgt Aldrovandi, dessen noch ziemlich unförmliche Abbildung daneben zugleich das Kanariengras, des Vogels Lieblingsnahrung, darstellt, der sonst aber Geßner's Angaben fast wörtlich wiederholt. Beide kennen nur den grünen, zu ihrer Zeit noch durch Kaufleute unmittelbar von den Inseln nach Europa gebrachten Vogel; doch weiß Aldrovandi schon das Männchen, dadurch daß es mehr Gelb hat, vom Weibchen zu unterscheiden. Ihres hohen Preises und ihrer Seltenheit halber waren sie damals nur in den Palästen der Großen anzutreffen.

Die frühesten Schriftsteller, welche von der Entdeckung und Geschichte der Fortunaten oder glücklichen Inseln berichten, schweigen über unsern Vogel. Von jenen frommen Brüdern, die das Kreuz Christi zu den in Felle gekleideten Guanchen trugen, von jenen Seefahrern, die lange vor Columbus das geheimnißvolle Weltmeer durchfurchten und mit den Knappen des Infanten Don Enrique nach unentdeckten Inseln suchten, dürfen wir dergleichen ins Einzelne gehende Beobachtungen nicht erwarten. Erst 1594 erwähnt der Mönch Alonso de Espinosa in seinem Werke vom Ursprunge und von den Wundern des Gnadenbildes unsrer lieben Frau von Candelaria im vorübergehen auch den Kanarienvogel. Er ahnt noch nicht, daß man das goldgelbe Vögelchen, welches der Jesusknabe jener, wie es heißt, wunderbar erschienenen Maria, der Schutzpatronin der Inseln, auf dem Finger trug, einst auf den Kanarienvogel werde deuten können; nur der wilde ist ihm bekannt. ‚Es giebt daselbst (auf Teneriffa) allerlei Geflügel und viele von den Singvögeln, die man in Spanien Canarios nennt. Sie sind klein und grün.‘ Wenig später spricht, ebenfalls beiläufig, der kanarische Dichter Viana von ihnen in einem die Eroberung des Archipels feiernden Epos, welches 1604 in Sevilla erschien. Im Jahre 1676 begnügt sich der Historiker Nunez de la Peña anzuführen, Teneriffa sei von Kanarienvögeln bewohnt, die mit ihrem Gesange das Jahr zu einem immerwährenden Frühlinge machten, so mild sei die Luft; bald darauf gedenkt er des Vogels flüchtig noch einmal, als er über die Etymologie des Namens Canaria grübelt.

Der Holländer Dapper sagt in seiner Beschreibung von Afrika und dessen Inseln (1668) von den Kanaren redend, es gebe daselbst ‚zekere kleine vogeltjes, hier te lande na deze eilanden Kanaryvogels genoemt, die zeer scheen angenaem zingen, en van daer herwaerts overgebracht worden; en telen deze ook hier te lande voort.‘

Olina hat in seiner Uccelliera (1622) auf Tafel 7 die Passera di Canaria nicht übel dargestellt. Er ist es, der die oft wiederholte Erzählung von dem zeitweiligen Verwildern des Kanarienvogels auf Elba infolge des Schiffbruchs eines nach Livorno bestimmten Fahrzeugs giebt.

Mit der Annäherung des achtzehnten Jahrhunderts und in diesem selbst wird die Literatur über den Gegenstand reicher. Sie beschäftigt sich aber, so Willoughby, Albin, Hervieux de Chanteloup, Fritsche u. a. m., fast ausschließlich mit der gezähmten Rasse, deren Zucht für Tirol schon in der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts einen Handelsartikel nach England lieferte. Brisson hat in seiner Ornithologie die hellfarbige Spielart fälschlich für die Urspezies genommen und beschrieben. Der große Linné, der sein Systema Naturae bald nach Brisson herausgab, war in einem ähnlichen Irrthum befangen. Er zieht bei dieser Gelegenheit auch den Mozambikzeisig als Varietät zum Kanarienvogel.

Bei Buffon wird die Ungewißheit hinsichtlich der Begrenzung der Art noch größer. Girlitz und Zitronfink müssen sich bequemen, zu Lokalrassen einer und derselben über einen großen Theil Europas und Afrikas, sowie über die Kanarischen Inseln verbreiteten Art herabzusteigen: ‚In dem glücklichen Himmelsstrich der Hesperiden scheint dieser Vogel entstanden zu sein oder daselbst wenigstens alle seine Vorzüge erlangt zu haben. Man kennt indeß auch in Italien eine Art, welche kleiner als die der Kanarien ist und in der Provence eine zweite fast ebensogroße als diese, beide mehr als wilde Vögel, die jedoch als Grundlage einer ziviliſirten Rasse zu betrachten sind. Diese drei paren sich in der Gefangenschaft mit einander, im Naturzustande aber scheinen sie sich jeder in seiner Zone selbständig fortzupflanzen. Sie bilden mithin drei konstante Varietäten.‘ Wir finden jedoch, daß Buffon trotz der Spezies-Konfusion, die er anrichtet, einen weitern Gesichtskreis als viele Andere beherrscht und mit dem wilden, dunkelfarbigen Stamme bekannt ist. Hébert, einer seiner Korrespondenten, drückt sich im Texte des Werks folgendermaßen aus: ‚Der graue Kanarienvogel ist vielleicht der echte, unverändert gebliebne. Die Varietät verdankt man der Zähmung.‘ Und weiter heißt es: ‚Die Kanarienvögel, die man nach England bringt, sind in den Barrancos oder Schluchten der Inseln geboren, welche das von den Bergen herabsteigende Wasser bildet.‘

Aus der schwer zu übersehenden großen Zahl der übrigen Schriftsteller, bei denen vom Kanarienvogel, bezüglich von seinem wilden Bruder die Rede ist, heben wir noch folgende hervor. Adanson (1749): ‚Der Kanarienvogel, welcher in Europa ganz weiß wird, ist auf Teneriffa von fast so dunklem Gefieder als der Hänfling. Seine Farbenänderung entstand wahrscheinlich durch

die Kälte unſres Klimas'. — Ledru (1796): ‚Nach Blumenbach hat man zu Anfang des ſechszehnten Jahrhunderts den Kanarienvogel zuerſt nach Europa gebracht. Seitdem iſt derſelbe in mehrere Spielarten degenerirt. (Hier folgt eine oberflächliche Beſchreibung und die ſchon erwähnte Angabe inbetreff der kleinen Inſel Montaña Clara). Dieſer Vogel fliegt mit großer Leichtigkeit. Er läßt ſich unſchwer zähmen. In Santa Cruz ſieht man wenige Kaufleute und Handwerker, die nicht ihren Kanarienvogel im Käfige hielten'.

Alexander v. Humboldt, deſſen denkwürdiger Aufenthalt auf Teneriffa in das Jahr 1799 fällt und der den Vogel beim Herabſteigen vom Pik beobachtete, ſchreibt: ‚Als wir uns Villa Orotava näherten, ſtießen wir auf große Scharen von Kanarienvögeln. Dieſe in Europa ſo bekannten Vögelchen ſind von ziemlich einförmigem Grün; bei einigen war der Rücken gelblich überflogen; ihr Geſang iſt vollkommen derſelbe wie der der gezähmten. Man bemerkt indeß, daß die auf Gran-Canaria und dem Inſelchen Montanna Clara gefangenen eine ſtärkere und wohlklingendere Stimme haben, als die anderen. Uebrigens hat unter allen Himmelsſtrichen bei Vögeln jeglicher Art auch jeder Flug ſeine Eigenthümlichkeiten in der Stimme. Die gelben Kanarienvögel ſind eine in Europa entſtandne Abart und diejenigen, welche wir in Orotava und Santa Cruz de Teneriffa im Käfige geſehen haben, waren in Cadiz oder irgend einem andern ſpaniſchen Hafenplatz gekauft'.

(Heutzutage iſt der zahme Kanarienvogel in den größeren Städten der Inſeln allgemein verbreitet. Man findet ihn in allen anderwärts vorkommenden Abſtufungen: brennend hochgelb, weißlichgelb, biskuitfarben oder elbern und vielfach geſcheckt, von welchen letzteren mir ſogar einige mit kaſtanienbraunem Rückem voll dunklerer Schaftſtriche zu Geſicht gekommen ſind. Da dieſe Sänger jedoch im ganzen mehr von Liebhabern als um des Gewinns willen gezogen werden, ſo ſind ihre Preiſe bedeutend höher als in Deutſchland. So ſah ich, daß für einen beſonders ſchön gefärbten Schläger mit Freuden vier ſpaniſche Piaſter gezahlt wurden. Dieſe gezähmten Vögel geben nächſt Stiglitzen und Amſeln einen kleinen Ausfuhrartikel nach Havanna ab. Auch von der großen Brabanter Raſſe der Kanarienvögel hat man in Canaria und Teneriffa bereits Kenntniß. Für noch koſtbarer aber als die ſchönſten Canarios werden gute Stiglitzbaſtarde (Mulos) gehalten, die man mitunter in wahrhaft blendender Farbenpracht ſieht. Einen ſolchen durch Gefieder und Schlag gleicherweiſe bewunderungswürdigen Vogel ſah ich bei einem Schuhmacher der Ciudad de las Palmas, für welchen dem nicht wohlhabenden Beſitzer ſchon mehrmals 14 Dollars vergeblich geboten worden. Dieſe Baſtarde, die einzigen, deren Zucht man Sorgfalt zu ſchenken pflegt, ſtehen außerdem noch in dem Rufe, ein beſonders hohes Lebensalter zu erreichen).

Lesson (Traité d'Ornithologie. 1831) kennt die grüne wilde Art von Teneriffa und führt den gezähmten gelben oder weißlichen Vogel nebenbei als Varietät an. — Zwei Werke, von denen man sich viel Aufschluß versprechen könnte, erfüllen die Erwartungen durchaus nicht. Dies ist zuerst Viera's Diccionario de historia natural de Canarias (1799). Ueber den wilden Kanarienvogel ist darin so gut wie nichts gesagt und nicht minder ist hier, sowie in den überaus anziehenden historischen Noticias desselben Autors die Geschichte der Zähmung und Einbürgerung, die von ihrem Ursprunge an zu verfolgen doch überaus interessant wäre, mit vollständigem Stillschweigen übergangen. Es wird im Artikel Canaria ganz einfach auf eine Abhandlung von Valmont de Bomare, dann inbetreff der gezähmten Rasse auf Wichede und Hervieux verwiesen. Das ist wirklich zu bedauern, denn von wem hätte man über dies letztre für ihn vaterländisch bedeutsame Kapitel wol bessern Aufschluß gehofft, als gerade von dem geistvollen, stets so wohlunterrichteten Viera! — Das zweite Buch, welches für unsere Fragen nur Schweigen hat, ist die Ornithologie canarienne von Webb und Berthelot. Das bändereiche kostbare Werk, von dem sie ein Theil ist und welches in vieler Hinsicht als eine unübertreffliche Monographie der Kanarischen Inseln betrachtet werden kann, hatte, periodisch erscheinend, einen Umfang erreicht, der im letzten Bande seinen Verfassern Raumersparniß zur gebieterischen Pflicht machte. So waren sie genöthigt, auf wenige Zeilen zu beschränken, was ihre Erfahrung zu einem Bande hätte ausdehnen können."

In anbetracht dessen, daß der wilde Kanarienvogel zweifellos zu den geschätztesten aller Finken gehört und daß er als Stammvater unsres wichtigsten gefiederten Stubengenossen doch von vornherein Theilnahme und Interesse in hohem Maße in Anspruch nehmen muß, konnte ich es mir nicht versagen, die herrliche Bolle'sche Schilderung aus dem „Journal für Ornithologie" fast vollständig und ungekürzt hier aufzunehmen; ich hielt mich dazu umsomehr für verpflichtet, da dieselbe im vollen Zusammenhange bis jetzt noch in kein ornithologisches Werk übergegangen ist. Sie bietet in Hinsicht der Geschichte, Naturgeschichte und Verpflegung soviele interessante, auch den nächstfolgenden verwandten Finken gegenüber zutreffende Hinweise, daß ich sie schon um deswillen nicht fortlassen zu dürfen glaubte; für alle diese Finkenvögel muß sie als Musterdarstellung gelten und daher werden auch die Leser gleich mir die eingestreuten hochpoetisch gefaßten und doch naturtreuen Heimatsschilderungen des Vogels nicht missen wollen. Im nachfolgenden seien noch einige Ergänzungen gegeben.

Nachdem die Spanier in den Jahren 1311 und 1473 die Kanarischen Inseln erobert, bildete der wildgefangne Kanarienvogel einen namhaften Handelsgegenstand und sie bewahrten denselben ein volles Jahrhundert hindurch als ihr

Monopol. Durch ein gestrandetes spanisches Schiff sollen die Vögel sodann nach der Insel Elba verpflanzt, hier etwa in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts verwildert, von den Italienern bald wieder ausgerottet, dann aber zuerst in Italien und nicht lange nachher, schon in der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, auch in Deutschland gezüchtet sein. Niemand weiß aber anzugeben, wann und wie der Uebergang vom grünen zum weißgelben Kleide stattgefunden; selbst die Zeit oder die Art und Weise der Bildung zahlreicher, namentlich in England mit Vorliebe gezüchteter Farbenrassen läßt sich nicht nachweisen.

Auf den Kanarischen Inseln werden auch wie überall in der gebildeten Welt viele zahme Kanarienvögel, insbesondre von Spanien aus dorthin eingeführte gehalten, und die grünen unter denselben verkauft man wol zuweilen an europäische Schiffskapitäne u. a. Reisende als wilde, eingefangene Vögel. Wirkliche Wildlinge sind aber heutzutage von den Kanarischen Inseln nur höchst selten noch zu erlangen. Es mag hauptsächlich daran liegen, daß sich dort niemand mehr mit dem Vogelfange beschäftigt; die Eingeborenen sind viel zu schlaff, als daß sie sich um solchen geringen Verdienst bemühen sollten und für Europäer mag derselbe auch nicht lohnend genug erscheinen. Immerhin aber ist es auffallend, daß die Großhändler sich der Einführung dieses Vogels nicht eifrig zuwenden, da derselbe ihnen doch sicherlich einen bedeutenden Ertrag gewähren würde. Freilich soll die Anzahl der wilden Kanarienvögel in ihrer Heimat allenthalben, theils durch frühern rücksichtslosen Fang, theils vielleicht auch durch klimatische Verhältnisse nur zu sehr verringert sein; hoffen wir indessen, daß bald thatkräftige Versuche gemacht werden, um uns den herrlichen Vogel wenigstens in beschränkter Anzahl gleich anderen alljährlich regelmäßig zuzuführen.

Wenn in den Fachblättern „Land and Water“ in London, „L'Acclimatation“ in Paris und „Die gefiederte Welt“ in Berlin wilde Kanarienvögel von St. Helena ausgeboten werden, so ist dies nach meinen langjährigen Erfahrungen niemals wirklich der Kanarienwildling, sondern stets der gelbstirnige Girlitz oder Butterfink (Fringilla butyracea, *Vll.*); ich habe es im Laufe der Jahre nicht allein bei Chs. Jamrach in London, sondern auch bei den anderen dortigen Händlern oft versucht, einen wilden Kanarienvogel auf jene Anzeige hin zu erhalten, doch stets nur den erwähnten allerdings nahe verwandten Girlitz bekommen. Derselbe wurde ja bekanntlich in früherer Zeit, wie S. 328 angegeben, selbst von Gelehrten mit dem Kanarienwildling verwechselt und Gleiches ist von den Liebhabern, die neuerdings über ihn geschrieben haben, z. B. in der Londoner Zeitschrift „The Live Stock Journal“, geschehen. Es ist übrigens kaum glaublich, wie viele verschiedenartige Finken noch jetzt von

den Händlern fälschlich für wilde Kanarienvögel gehalten und als solche zum Verkauf angeboten werden. Sobald einer der weiterhin beschriebenen, selten oder noch garnicht eingeführten gelben Girlitze im Handel auftaucht, gilt er sicherlich als der ersehnte Kanarienwildling; so sind kürzlich der graukehlige Girlitz oder Kapkanarienvogel, der südafrikanische gelbbäuchige Girlitz, Tottagirlitz u. a. m. außer den anderen schon längst bekannten immer zuerst für wilde Kanarienvögel gehalten worden. Im Gegensatz dazu giebt es sodann aber auch ungläubige Leute, welche mit voller Entschiedenheit wissen wollen, daß gegenwärtig garkein Wildling mehr von den Kanarischen Inseln eingeführt werde. Wenn man einen fraglichen Vogel vor sich hat und ihn mit der wissenschaftlichen Beschreibung von Dr. Bolle vergleicht, so wird man ihn trotz der mehr oder minder hervortretenden Abweichungen doch unschwer als die richtige Art feststellen können. Schwieriger ist sodann die Frage zu beantworten, ob es in der That ein in der Heimat eingefangner Wildling, ein bereits im Käfige gezüchteter oder wol gar ein vom wilden Männchen mit zahmen Weibchen abstammender sei. Als sichere Kennzeichen sind folgende angegeben. Zunächst von Dr. Bolle die starke Beimischung von Aschgraublau, welche ihn von dem dunkelfarbigen zahmen Vogel sogleich unterscheiden läßt. Von mehreren Seiten ist sodann darauf hingewiesen, daß der Wildling niemals Braun im Gefieder zeigt, welche Färbung beim zahmen Vogel fast immer vorhanden ist. Ferner hat man die Behauptung ausgesprochen, daß Schnabel und Füße schwarz sein müssen; einerseits aber bleichen beide bekanntlich bei vielen Vögeln in der Gefangenschaft im Laufe von einigen Jahren sehr aus und andrerseits sagt Dr. Bolle ausdrücklich, daß das in der Freiheit im Hochzeitskleide am 1. April 1856 bei Orotava geschossene alte Männchen, welches sich jetzt im zoologischen Museum zu Berlin befindet, bräunlichfleischfarbnen Schnabel und ebensolche Füße mit hornfarbigen Nägeln hatte. Man lasse sich also durch derartige in manchen Büchern vorkommende, wol recht selbstbewußt auftretende Angaben nicht beirren; sie sind ebensowenig zuverlässig, als mancherlei andere mit voller Unfehlbarkeit aufgestellte Aussprüche.

In Paris auf der Weltausstellung des Jahres 1867 sah ich zuerst wilde Kanarienvögel, welche der wissenschaftlichen Bolle'schen Beschreibung entsprachen. Es waren sechszehn Köpfe, Alte mit Jungen zusammen, deren letztere dort gezüchtet sein sollten. Dann habe ich selber im Laufe vieler Jahre nur viermal die Gelegenheit gefunden, immer einen einzelnen wilden Kanarienvogel von den Kanarischen Inseln zu erlangen und zwar einmal einen in einer Sendung afrikanischer Vögel von Chs. Jamrach in London und dreimal aus verschiedenen englischen und deutschen Hafenstädten, mitgebracht durch Schiffer oder Kaufleute. Jedesmal mußte ich das große Nachahmungstalent des Wildlings bewundern;

er eignete sich nicht allein den Gesang des gemeinen Kanarienvogels, sondern auch den anderer, nahverwandter Finken an. Mit dem kunstvollen Schlage des feinen Harzer Vogels dürfte sein Naturgesang indessen kaum eine Aehnlichkeit haben; jener in seiner hohen Entwicklung ist sicher ein Erzeugniß der Züchtung in der Gefangenschaft. Ich habe es nicht versucht, einen meiner Wildlinge mit einem Harzer Sänger in Berührung zu bringen, weil ich besorgt war, daß der letztre durch das natürliche oder von gemeinen Kanarien angelernte Schappen des erstern verdorben werden könnte; allein ich glaube auch nicht, daß ein solches Verfahren zum günstigen Ergebniß geführt haben würde, weil nämlich die hochentwickelte Kunstfertigkeit des Harzer Rollers für die Nachahmungsfähigkeit des Wildlings sicherlich doch zu schwierig sein würde.

Wer das Glück hat, einen einzelnen Kanarienwildling oder ein Pärchen zu erhalten, wird gut daran thun, ihnen recht mannigfaltiges Futter, also Kanariensamen, Hirse, Hanf, Mohn, Rübsen und mancherlei andere mehlige und ölige Sämereien, ferner auch Grünkraut und Eifutter oder Biskuit anzubieten. Da die Vogelzucht gegenwärtig doch schon auf einer recht hohen Stufe steht, so erscheint der Versuch hochinteressant und wichtig, den Kanarienwildling durch eine Reihe von Generationen sachgemäß zu züchten. Vielleicht würde es dann gelingen, mindestens in bedingter Weise Aufschluß über die Verwandlungsvorgänge der zahmen Rasse zu gewinnen. Die eingehende Beobachtung seiner Lebensweise und Eigenthümlichkeiten eben in der Gefangenschaft, seiner Lernfähigkeit und Begabung überhaupt muß für jeden Vogelliebhaber verlockend genug sein, um nach seinem Besitz zu streben. Hoffentlich läßt sich über kurz oder lang eine Einfuhr in größerer Anzahl erzielen. Der Preis betrug bisher gewöhnlich zwischen 15 bis 30 Mark für den Kopf sogleich nach der Einführung.

(Bis jetzt ist noch keine durchaus gute und naturtreue Abbildung des wilden Kanarienvogels vorhanden und daher soll die erste der Tafeln, welche nachgeliefert werden, falls die Theilnahme der Subskribenten dieses Werkes sich als eine dauernde erweist, auch ihn zur Darstellung bringen).

Der Girlitz von den Kanarischen Inseln wird auch wilder Kanarienvogel oder Kanarienwildling genannt (Kanarienfink, -Sperling und Zuckervogel nach Bechstein).

Le Canari ou le Serin des Canaries bei den Pariser Händlern; Canary-bird or Canary-finch bei Chr. Jamrach in London; Kanarie (holländisch).

Nomenclatur: Fringilla canaria, *L.*; Crithagra canaria, *Sws.*, *Wbb.* et *Brth.*; Serinus canarius, *Cb.*; Dryospiza canaria, *Gr.* [Passer canarius, *Aldr.*; Passera de Canaria, *Olin.*; Serin des Canaries, *Alb.*; Passer canariensis, *Frsch.*; Le Serin des isles Canaries, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung. Stirn und ein breiter Augenstreif, der nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, ohne oben scharf begrenzt zu sein, grünlichgoldgelb, die Stirn am gelbsten; Kopf und Nacken gelbgrün mit sehr schwachen aschgrauen Federrändern; Rücken gelbgrün mit sehr breiten hellaschgrauen Federrändern, welche ihn fast völlig als von dieser

Farbe erscheinen lassen, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich; Schultern schön zeisiggrün, darunter eine mattschwarze Binde, auf welche eine blaßgrünliche, durch die Spitzen der Deckfedern gebildete folgt; Schwungfedern schwärzlich, sehr schmal grünlich gesäumt, die kürzeren nach der Schulter zu weißlich eingefaßt, die Spitzen der großen Schwungfedern fast ganz mattschwarz; Seiten weißgrau mit schwärzlichen Schaftstrichen; Bürzel gelbgrün, mit einigen grünen, breit aschgrau eingefaßten Federn schließend; Schwanzfedern schwarzgrau, mit schmalen weißlichen Säumen; zwischen den Backen und dem Augenstreif, sowie an den Halsseiten aufwärts besonders an letztrer Stelle fast rein aschgrau; Kehle nebst Oberbrust grünlichgoldgelb; die Brust verläuft nach unten zu in helles Goldgelb; Bauch und untere Steißfedern weißlich. Schnabel bräunlichfleischfarben, am Grunde des Unterschnabels heller; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichfleischfarben mit hornfarbenen Nägeln. (Das Männchen muß, um diese vollendete Ausfärbung zu erlangen, wenigstens zwei Jahre alt sein. Ich glaube nicht, daß dies Prachtkleid sich in der Gefangenschaft ganz vollkommen entwickelt. Dr. Karl Bolle, der auch die übrigen nachfolgenden Beschreibungen aufgestellt hat).

Fringilla canaria: fronte striaque oculari lata, cervicem versus circulari sursum sublavata, virente aurata, fronte flavissima; plumis capitis et cervicis flavo-viridium cinereo-submarginatis, dorsi flavo-viridis late cano-marginatis, scapis cujusque plumae nigrescentibus (qua pictura avis apparens tota fere cana); humeris flavido-viridibus, de in fascia subnigra, huice altera substante dilute subviridi, apices tectricum complectente; remigibus nigricantibus, tenuissime virescente limbatis, brevioribus humeros versus albido-marginatis, apicibus primorum totis fere subnigris; scapis plumarum hypochondriorum canorum nigricantibus; plumis nonnullis uropygii flavo-viridis terminalibus late cinereo-limbatis; rectricibus nigro-cinereis, albido-submarginatis; regione inter striam ocularem genasque necnon lateribus colli, praesertim superioribus cineraceis; gula pectoreque virente auratis, hoc inferiore in laete auratum transiente; ventre crissoque albidis; rostro subfusco-carneo, mandibulae basi dilutiore; iride fusca, pedibus fuscato-carneis, unguibus corneis.

Länge 14—14,4 cm.; Flügelbreite 23,5—26,2 cm.; Schwanz 6—6,5 cm.

Weibchen: Oberkopf und Nacken auf gelbgrünem Grunde braungrau, erstre nach vorn immer mehr zunehmende Schattirung schimmert durch und wird allmälig zu dem zwar schmalen, aber reinen Grüngelb der Stirn, welches seinerseits wieder mit dem vollkommen gleichen Farbenton des nach dem Nacken zu verlaufenden Augenstreifs, der untern Augengegend und der Kehle verschmilzt; Zügel grau; Wangen theils grüngelb, theils aschgraublau, welche Farbe sich ringförmig mit der des Oberkopfes verbindet, während dahinter die Halsseiten ein gelbgrüner, weiter rückwärts aschgraublauer Halbring umrahmt, der wenig deutlich nach der Gegend zwischen Brust und Kehle hin verläuft, ohne beide anders, als durch einen schwachen Hauch von einander zu trennen, wie denn alle zuletzt genannten Schattirungen überhaupt sehr allmälig mit einander verschmelzen. Rücken braungrau mit breiten, schwarzen Schaftstrichen; Schultern und kleine Flügeldeckfedern licht gelbgrün; große Flügeldeckfedern schwärzlich mit schmalen, grünlichen Rändern; Schwungfedern ebenso gefärbt, am deutlichsten an der kürzern Fahne, nach der Spitze zu schwächer gesäumt, hinterste Schwungfedern mit mehr graubräunlichen breiteren, aber sehr verwaschenen Säumen; Bürzel gelbgrün; Schwanz schwärzlich, wie die Schwingen gesäumt; Kehle und Brust grünlichgoldgelb, durch weißgraue Federränder weniger schön als beim alten Männchen; Unterbrust allmälig in das Weiß des Bauches übergehend; Seiten bräunlich mit dunkleren Schaftstrichen; hinterer Unterleib und untere Schwanzseite weißlichgrau. Schnabel fleischfarben, mit etwas dunklerer Spitze des Oberkiefers; Auge dunkelbraun; Füße fleischfarben mit hornfarbenen Nägeln. (Dies ist die Beschreibung des zweijährigen Weibchens im März, von dessen Kleide das des einjährigen Männchens schlechterdings sich nicht unterscheiden läßt).

Fringilla canaria: ♀ pileo et cervice viride flavis supra saturius, ante sensim tennius fuscescente cinereo-inductis, margine frontali, stria oculari, regione hypophthalmica gulaque viride flavis; loris cinereis, genis parte viride flavis, parte cinereo-coerulescentibus, eoque colore ad pileum annuliformi pertinente; semiannulo circa colli latera flavido-viridi, retro cinereo-coerulescente, inter gulam pectusque fere evanido; dorsum fusco-cinereo, nigro-striato; humeris alarumque tectricibus minoribus dilute flavo-viridibus; tectricibus majoribus nigricantibus, anguste virente marginatis; remigibus concoloribus exterius distinctius, apicem versus elutius viridule limbatis; hisce postumis latius, sed dilutissime e fusco cinerascente marginatis; uropygio flavo-viridi; rectricibus nigricantibus modo remigum limbatis; gula pectoreque virente aureis, canescente undulatis; epigastrio sensim in ventrix album transeunte; hypochondriis subfuscis, obscurius striolatis; crisso caudaque subtus albido-canis; rostro carneo, apice maxillae obscuriore; iride fusca; pedibus carneis, unguibus corneis.

Jugendkleid: oberhalb braungrau mit undeutlichen schwärzlichen Schaftstrichen; Augenstreif nur angedeutet, ebenso Zügel; Halsseiten und Oberbrust schmutziggelbgrau, ins Ockergelbe spielend; um die Augen herum (mit Ausnahme des Federkranzes der Augenlider, der von der letztgenannten Färbung ist), an den Vorderwangen und der Kehle ein wenig mattes Zitrongelb; dieses herrscht auch, aber noch blasser, an der Unterbrust, namentlich in der Mitte derselben und verläuft gegen den Bauch hin in Weiß; Seiten und Steiß schmutziggelbgrau; Schwanzfedern schwärzlich, nach unten zu breit grüngelb, nach oben schmal gelbgrau gerandet; die Flügel tragen zwei durch die Spitzen der Deckfedern erster und zweiter Ordnung gebildete, hellgelbgraue Binden; die Schwungfedern sind schwärzlich, grünlichgrau gesäumt, diese Säume, wie die der Schwanzfedern nach oben zu mehr gelbgrau, ebenso auch die Randspitzen; Schultern und ein Theil der kleinen Deckfedern des Flügels schwachgelbgrün; ebenso, nur etwas gelber die Federn unter den Flügeln; Bauch weiß; untere Steißfedern hellgelbgrau. Schnabel hornfarben, am Grunde des Unterkiefers heller; Auge dunkelschwarzbraun; Füße schwarzbraun mit gleichfarbigen Nägeln. (Dies ist die Beschreibung eines jungen Vogels im Nestkleide, welcher bei Teror auf Gran-Kanaria im Juli gefangen worden. Im ganzen sind alle diese Farbenschattirungen desselben sehr unbestimmt, viel mehr noch als beim Jugendkleide des einheimischen Zeisigs verwaschen).

Fringilla canaria: Juvenis: supra fusco-cinerea, nigricante substriolata; stria superciliari vix conspicua, ut loris, colli lateribus, juguloque sordide ochraceo-cinereis; regione ophthalmica (ciliis lividis exceptis), genis posterioribus, gula, pectoreque, praesertim medio, subcitrinis; abdomine albicante; hypochondriis crissoque livide cinereis; rectricibus nigrescentibus, basin versus anguste livide, apicem versus late viride flavo-marginatis; apicibus tectricum al. majorum et mediarum fascias duas flavido-canas exhibentibus; limbis remigum subnigrorum virente cinereis ante apicemque versus lividioribus; humeris particulaque tectricum al. minorum flavido-virentibus; subalaribus parum flavioribus; rostro corneo, basi mandibulae dilutiore; iride nigro-fusca; pedibus una cum unguibus e nigro fuscis.

Beschreibung des Eies s. S. 333.

Ovum: dilute glaucum maculis badiis conspersum, rarius fere vel totum unicolor, iis avis cicuris prorsus aequans.

Der orangestirnige Girlitz [Fringilla pusilla].

Zu den Girlitzen gehörend, also einer der nächsten Verwandten des Kanarienvogels, läßt er es sehr bedauern, daß er nicht ebenso wie jener ein tüchtiger Sänger ist, auch erscheint er in weniger ansprechend gefärbtem Gefieder.

Er ist am Vorderkopf gelbroth, an Ober- und Hinterkopf, vom Gesicht bis zur Oberbrust schwarzbraun, Rücken ebenso, aber jede Feder gelb gerandet, über die gelbbraunen Flügel eine weiße Binde, Bürzel orange; unterhalb gelb, an Brust- und Bauchseiten bräunlichschwarz, jede Feder gelb gerandet. Das Weibchen hat kein Schwarz am Kopfe und seine Stirn ist röthlichgelb. Die Größe ist mit der des einheimischen Zeisigs übereinstimmend. Cabanis sagt, daß der Vogel mitteninne zwischen Leinzeisig und Girlitz stehe; im Schnabel gleiche er mehr diesem, im übrigen aber sammt der Färbung jenem. Damals waren dem Forscher nur drei ausgestopfte Exemplare bekannt, und zwar eins in der Sammlung des Hauptmanns Kirchhoff und je eins in den Museen von Berlin und Braunschweig. Gegenwärtig besitzt das erstre bereits mehrere, meistens durch Radde gelieferte, und ebenso einige die sibirische Sammlung des Herrn Dr. Finsch. Die Heimat des Vogels ist Asien und seine Verbreitung eine ziemlich bedeutende: vom Himalaya nach Norden bis Sibirien, nach Westen bis zum Kaukasus und Kleinasien, von wo aus er sich zuweilen bis nach dem europäischen Rußland verfliegt. Laut Pallas' Mittheilungen ist er gemein auf dem Kaukasus und am kaspischen Meere; im Sommer wird er bis zur Nähe der Schneelinie gefunden und im Winter streicht er in die subalpinen Gegenden Persiens hinab. Kapitän F. Hutton beobachtete ihn mehrmals in Masuri. Er erschien stets parweise und trieb sich auf den großen, groben Nesseln, welche dort reichlich vorhanden sind, umher. In dieser Gegend war er jedoch nur als Wintergast eingekehrt und scheint dieselbe zur Mitte d. M. Februar verlassen zu haben. Lieutenant Speke sah ihn im Sommer in Spiti und Ladakh in einer Höhe von 3140 bis 9415 Mtr., immer nur zu zwei bis drei Köpfen und wahrscheinlich auf eine bestimmte Oertlichkeit beschränkt. Nach Griffith's Aufzeichnungen wurden Scharen in der Nähe von Anpflanzungen bemerkt; sie waren ziemlich scheu und saßen auf den Disteln von deren Samen sie sich ernährten. Im übrigen dürfte seine Lebensweise sicherlich der unsres einheimischen Girlitz und des Leinzeisigs gleichen.

Er wurde von dem Moskauer Händler Stader früher hin und wieder in einigen Köpfen mitgebracht und gelangte so in das Berliner Aquarium. Seitdem fehlt er im Vogelhandel, doch wird er hoffentlich über kurz oder lang wol wieder eingeführt werden. In der Gefangenschaft soll er sich gut erhalten lassen und ein liebenswürdiger Vogel sein, wie der berühmte Sibirienreisende Radde an Brehm berichtet hat. Die Fütterung bestand bei Stader in Rübsen, Lein- und Mohnsamen und die ganze Verpflegung dürfte von der jener vorhin erwähnten Verwandten nicht abweichen. In anbetracht der bisherigen Seltenheit ist ein Preis noch nicht anzugeben. Im „Journal für Ornithologie" (1854) war eine schwarz lithographirte Abbildung nach Bädeker vorhanden; wir können hier jedoch keine bringen, weil dieser Girlitz eine zu geringe Bedeutung für die Liebhaberei

hat, zumal er weder schöner als der in der Färbung ähnliche Leinzeisig ist, noch einen beachtenswerthen Gesang hat.

Der orangestirnige Girlitz ist auch goldstirniger oder Goldstirngirlitz benannt.
Le Serin à front orange; Himalayan Siskin or Himalayan seed-eater.

Nomenclatur: Metroponia pusilla et Passer pusillus, *Pll.*; Pyrrhula pusilla, *Dgl.*; Serinus pusillus, *Brndt.*, *Bp.*, *Blth.*, *Br.*; Fringilla pusilla, *Gr.*; Fringilla rubrifrons, *Hay*; Emberiza auriceps et Serinus aurifrons, *Blth.*; Uraeginthus pusillus, *Cb.*; Fringilla aurifrons, *Rss.* [„Handbuch für Vogelliebhaber"].

Der graue weißbürzelige Girlitz [Fringilla musica].

Tafel IX. Vogel 53.

Gegen Mittag erhebt sich die Stimmenmannigfaltigkeit in der Vogelstube am lautesten. Dann ermuntern sich selbst diejenigen Papageien und anderen Bewohner, welche sonst wol stundenlang dasitzen, ohne einen Laut hören zu lassen, ohne eine Bewegung zu zeigen; dann singt, kreischt und schreit alle große und kleine gefiederte Welt aus Herzenslust um die Wette, und es hält nicht leicht, irgend einen bestimmten Sänger in seinen Leistungen zu verfolgen. Dennoch schmettert uns jetzt ein melodischer Gesang entgegen, so klar und lieblich — daß wir von dem Vorurtheil, die Vögel tropischer Gegenden seien nur Stümper im Gesange, völlig zurückkommen. Eine andre Beobachtung der alten Ornithologen bewahrheitet sich hier aber, die nämlich, daß die am schönsten singenden Vögel in der Regel die am schlichtesten gefärbten sind.

Der weißbürzelige Girlitz ist am ganzen obern Körper gesättigt aschgrau, rußschwarz gestrichelt, an Gesicht, Kehle und Brust heller grau, am untern Körper weißlichgrau und an Unterleib und Bürzel reinweiß. Die Größe ist der des allbekannten Atlasvogels gleich, doch erscheint er etwas schlanker.

Er gehört unter den fremdländischen Finken zweifellos zu den hervorragendsten Sängern und in hinsicht der Kraft der Stimme und des melodischen Gesangs dürfte er unter allen obenan stehen. Trotzdem hat er als Stubenvogel ein ganz eigenthümliches Schicksal gehabt, auf welches ich weiterhin zurückkommen werde.

Seine Heimat ist das mittlere Afrika und zwar verbreitet er sich von den westlichen Gebieten bis zur Ostküste des Erdtheils. „Ich begegnete", schreibt Heuglin, „diesem muntern kleinen Vögelchen während der Regenzeit im Bogoslande und im Gebiet des Gazellenflusses (Bongo), im April und Mai in Ostsenar und kann nicht mit Sicherheit angeben, ob es hier und am blauen Nil, wo es auch von Hedenborg und Vierthaler beobachtet wurde, Standvogel ist. Es lebt gesellig und treibt sich in kleinen Flügen auf Gebüsch, Hecken und niedrigen Bäumen umher; für steiniges Hügelland scheint es Vorliebe zu haben, auch dürfte ihm die Nähe eines Gewässers Bedürfniß sein. Nach meinen Aufzeichnungen haben Lockton, Gesang und Benehmen im allgemeinen viel Aehnlichkeit mit

denen des Girlitz. Vierthaler beschreibt sehr oberflächlich die Fortpflanzung; er fand am blauen Nil das Nest mit drei Eiern $1_{/6}$ Meter über der Erde". Hiermit sind die Mittheilungen über das Freileben dieses Vogels erschöpft, indem alle übrigen Afrikareisenden nichts weiter hinzufügen. Dies erscheint umsomehr verwunderlich, da der Graugirlitz einerseits in dem angegebnen weiten Verbreitungsgebiete keineswegs selten ist und da er andrerseits zu den schon seit alters her bekannten und lebend nach Europa eingeführten Vögeln zählt.

Vieillot hat den Sénégali Chanteur eingehend geschildert und sein Werk zeigt die Abbildung nach einem in der Gefangenschaft schon damals gezüchteten Exemplare. In seiner schwungvollen Darstellung geht er freilich über die Wirklichkeit hinaus, indem er den Vogel als Koryphäen der Wälder, welche der Niger bespült, bezeichnet, der wenige Nacheiferer unter den Vögeln Afrikas finde. Beim Anhören seines lieblichen Schlags vergesse man gern die Sänger der Hesperiden. Da der Vogel sehr zart ist, sagt er weiter, so gelingt es selten, ihn bei uns zu erhalten und einzugewöhnen. Man müsse ihn nach der Ankunft in Europa vor geringerer Wärme als 16 Grad bewahren und ihm wenn möglich bis zu 25 Grad gewähren, namentlich zur Brutzeit. Wenn man diese Vorsicht außer Augen setze, gelangen die Weibchen nicht zum Legen oder doch nicht zur glücklichen Aufzucht der Jungen; jedes Pärchen sei zur Nistzeit abzusondern, da die Männchen außerordentlich eifersüchtig sind, um die Weibchen heftig kämpfen und dann auch nur wenig singen. Außerhalb der Nistzeit dürfe man sie scharenweise zusammenhalten, auch mit anderen Vögeln, weil sie dann sehr verträglich sind. Bäumchen, Büsche und ein großes Vogelhaus, fährt er fort, sind nicht gerade nothwendig, um ihn zum Nisten zu bringen; das Pärchen begnügt sich mit einem mäßig großen Käfige und kleinen aus Binsen geflochtenen Nestkörbchen, wie man dergleichen auch den Zeisigen giebt. In einem solchen erbauen sie das Nest, welches nicht viel größer als das eines Kolibri ist, aus trocknem Gras, Moos, Baumwolle und Federn. Männchen und Weibchen arbeiten gemeinschaftlich; das erstere schafft die Stoffe herbei, das letztre ordnet sie. Die Brutzeit fällt in den Monat April; Liebeszeichen geben sie schon während des Januars. — Diese Angaben des großen Vogelkundigen kann ich nach vieljährigen Erfahrungen ergänzen und theilweise auch berichtigen.

In der neuern Zeit war dieser Vogel sowol bei den gelehrten Ornithologen, als auch bei den Liebhabern gewissermaßen spurlos verschwunden. Bolle führt ihn in seinem hier oft genannten Verzeichniß der lebend eingeführten fremdländischen Vögel an, allein nur mit lateinischem Namen. Alfred Edmund Brehm kennt ihn keineswegs, denn er erwähnt ihn in der ersten Auflage des „Thierlebens" (1866) garnicht. Erst i. J. 1868 wurden durch mich in der „Gartenlaube" weitere Kreise auf ihn aufmerksam gemacht. Die Händler verkauften ihn gewöhnlich,

wenn sie ihn unter den kleinen Senegalvögeln zufällig erhielten, als Weibchen des Atlasvogels und als solche gelangten einige auch zuerst in meine Vogelstube. Wie staunte ich aber, als nach dem Tode des einen zwei andere, durch Eifersucht erregt, ihre klangvollen und kräftigen Stimmen erhoben und also die vermeintlichen Weibchen plötzlich einen herrlichen Gesang erschallen ließen, von dem ich bis dahin keine Ahnung gehabt. Auch Professor Dr. Cabanis und Dr. Brehm kannten damals diesen Gesang noch nicht. Ich habe einen Brief des erstern vor mir, in welchem er sagt, daß es ihm höchst interessant sein würde, über den Vogel, den ich durch letztern ihm übersandt, näheres zu erfahren.

Als ich in Paris bei Gelegenheit der Weltausstellung i. J. 1867 weilte, fand ich den Vogel bei den meisten Händlern recht zahlreich und zu dem geringen Preise von 8 Frank für das Pärchen, obwol sie von seinem Gesange bereits Kenntniß hatten und ihn Chanteur d'Afrique hießen. Er ist dort jedoch, gerade wie bei uns, nur zeitweise häufig auf dem Vogelmarkt vorhanden und zwar vom Spätsommer bis zum Herbst, wenn die kleinen afrikanischen Vögel von Bordeaux, Marseille, dann von Antwerpen, London und Hamburg aus nach aller Welt eingeführt werden. Da mir die ersten Graugirlitze nach und nach sämmtlich eingegangen waren, so brachte ich mir außer anderm kleinen Gefieder auch von ihnen ein Pärchen aus Paris mit. Inzwischen war wieder eine Anzahl derselben mit Sendungen afrikanischer Prachtfinken nach Berlin gekommen und ein aufmerksamer Händler, Herr F. Schmidt, hatte ihre Gesangsfertigkeit ebenfalls entdeckt. Er verkaufte damals das Männchen nicht unter 18 Mark. Da mir das Weibchen des ersten Pärchens infolge der Reiseanstrengungen gestorben war, so brachte ich das Männchen mit einem Kanarienweibchen zusammen und erzielte schon im Frühjahr 1868 mehrere Bastardbruten, aus denen jedoch nur ein Hähnchen am Leben blieb. Ebenso unschwer nistete sodann im Herbst desselben Jahres ein Pärchen Graugirlitze in einem Kanarienheckkäfige. Ueber diese erste Brut machte ich Herrn Th. v. Heuglin eine Mittheilung, welche aus seinem vortrefflichen Werke „Ornithologie Nordost-Afrikas" hier wiedergegeben sei: Zur Wahl wurde ihnen ein offnes und ein überwölbtes Nest im Käfige geboten. Sie bauten in das erstre und trugen auf einen Grund von Hanffäden nur weiche, harige und baumwollene Stoffe ein, ohne trockene Grashalme, Bast, Agavefasern, Papierschnitzel oder dergleichen zu berühren; so formiten sie im Nestkörbchen eine fast zilinderförmige Mulde, deren offene Ränder sich ziemlich weit über die des Körbchens erhoben. Die Mulde war verhältnißmäßig klein, gleichmäßig rund und tief, innen mit Pferdehaaren, Pflanzenwolle und feinen, kurzen Leinenfäden glatt ausgepolstert. Seit acht Wochen war das Nest fertig, ohne daß es zur wirklichen Brut kam. Dann erkrankte das Weibchen an Legenoth und starb. Bei der Untersuchung des Nestes fand ich aber ein jedenfalls viel früher gelegtes

Ei, dessen Inhalt bereits in Fäulniß übergegangen war. Dieses Ei erhielt Herr Hofrath v. Heuglin für das oologische Werk des Herrn Baron v. König-Warthausen. Späterhin gelegte Eier dieser Art gelangten aus meiner Vogelstube in die Sammlungen der hervorragendsten deutschen Oologen, der Herren Dr. Baldamus in Koburg, Graf Rödern in Breslau u. A., und es werden in denselben sicherlich die ersten gewesen sein.

Das Eheleben dieser Vögel ist ein ungemein zärtliches; Zank und Verfolgung zwischen den Gatten eines Pärchens, wie bei den Verwandten, kommen niemals vor. Sie erscheinen vielmehr in ihren Zärtlichkeitsbezeigungen den Prachtfinken sehr ähnlich, nur mit dem Unterschiede, daß das Männchen sein Weibchen gleich allen diesen Finken aus dem Kropfe füttert. Die Gestaltung des Nestes in der Vogelstube ist von der des vorhin beschriebnen in der Regel verschieden; dasselbe wird ebenfalls immer in einem offnen Nestkörbchen angelegt und stellt ebenso eine sehr kleine, längliche oder runde Mulde dar, deren Ränder aber über das Nestkörbchen nicht hervorragen. Die Grundlage und die Wände werden aus gröberen Fasern, Würzelchen, dünnen Grashalmen u. drgl. aufgeschichtet und die innere Auspolsterung bildet eine dünne Lage von Wundfäden, Pflanzen- und Thierwolle mit einigen langen Pferdehaaren gefestigt. Aehnlich beschreibt übrigens auch Bierthaler das Nest des Vogels im Freien. Das Gelege besteht in drei bis vier, höchstens fünf Eiern. Die ersten Eier in den Nestern in der Vogelstube waren reinweiß, entweder weil dem Weibchen die den Farbstoff erzeugende Nahrung gefehlt hat oder, und das ist wahrscheinlicher, weil es noch zu jung und überaus schwächlich gewesen; später waren sie naturgemäß gefärbt, wie weiterhin angegeben. Das Weibchen baut allein sein Nest und wird vom Männchen nur auf den Hin- und Herflügen, gleich dem einheimischen Edelfink, zärtlich begleitet; allenfalls trägt das Männchen hin und wieder ein Flöckchen herbei, welches das Weibchen dann einordnet. Ebenso brütet letzteres allein, gefüttert vom Männchen, welches sich fast immer in der Nähe des Nestes aufhält und sehr fleißig singt. Zuweilen, gewöhnlich in der Mittagsstunde, setzt es sich auf einige Minuten zum Weibchen hinein; dann fliegen sie beide herunter, jenes frißt, badet sich auch wol und kehrt zurück, von diesem bis zum Rande geleitet. Die Brut dauert 13 Tage; schon am vierten Tage öffnen die mit bläulichweißem Flaum bedeckten Jungen die Augen und schlüpfen manchmal sehr früh, oft noch halbnackt, aus dem Neste.

Nur während der Mauser leben die Graugirlitze in Frieden beisammen; in der übrigen Zeit befehden die erwachsenen singenden Männchen alle anderen, alte und junge Weibchen und Männchen gleichermaßen stürmisch; besonders arg verfolgen aber die einzelnen Weibchen einander. Die Pärchen halten das ganze Jahr hindurch, gleichviel in und außerhalb der Nistzeit, innig zusammen.

Nicht allein in seiner Gestalt, sondern auch in seiner ganzen Lebensweise, ja, in jeder Bewegung ist dieser Vogel ein Bild der Anmuth und Liebenswürdigkeit; er ist niemals dummscheu, vielmehr zutraulich, dreist, keck und überaus zierlich. Kaum zu beschreiben ist der Eindruck, welchen sein plötzlich erwachender Gesang macht. Sei es inmitten des Lärms der Vogelstube oder sei es in der Stille der Morgen- und Abendstunden, fast zarter als das Lied der Haidelerche und doch beinahe ebenso kräftig als der Schlag des Kanarienvogels, läßt er Anklänge an beide erkennen.

Angeregt durch meine Schilderungen in der „Gartenlaube" hatten sich für den kleinen Sänger bei allen Händlern so sehr viele Liebhaber gemeldet, daß die ersteren große Anstrengungen machten, um ihn in bedeutender Anzahl herbeizuschaffen; allein einerseits das schlichte Aussehen, andrerseits der hoch erscheinende Preis von 15 bis 18 Mk. für das Pärchen, waren die Ursachen, daß die Händler im allgemeinen ihre Rechnung nicht fanden; denn die meisten der bis zum Beginn der siebenziger Jahre nach Deutschland eingeführten Graugirlitze sind in den Vogelhandlungen zugrunde gegangen. Bald aber änderte sich dies Verhältniß. Die Vogelliebhaber entdeckten unschwer, daß der, wenn auch unscheinbare, doch überaus anmuthige und herrlich singende kleine Afrikaner zugleich zu den besten Nistvögeln in der Vogelstube wie im Käfige gehörte. Jetzt wurde die Nachfrage groß und es gab wol kaum irgend eine Vogelstube, zu deren Bewohnern er nicht gehörte. Dann wurde er auch immer mehr gezüchtet. Der erste Liebhaber, welcher ihn anhaltend und durch mehrere Generationen gezogen hat, ist der Architekt Dorpmüller, früher in Elberfeld, jetzt in Gladbach. Er schreibt darüber wie folgt: „Obgleich ich viele Vogelarten in meinem Leben gezüchtet habe, so beabsichtigte ich es mit dieser doch eigentlich nicht. Ich nahm an, daß sie bei der Brut an ihrer afrikanischen Jahreszeit festhielte, und da erschien es mir zu umständlich, den Vögeln im Spätherbst und Winter immer gleichmäßige Wärme zu gewähren. Zu Ende des Monats April setzte ich das Pärchen in einen neuen, nicht geräumigen Käfig und nach Verlauf von acht Tagen bemerkte ich, daß das Weibchen, Stengel von getrockneter Vogelmiere im Schnabel haltend, sich fortwährend in einem Futterglase in die Runde drehte. Nun fertigte ich schnell eine Nestform, aus dickem Bindfaden zusammengenäht und befestigte dieselbe in einer obern Ecke auf dem Sprunghölzchen, gab Baustoffe hinein und in der Zeit von sechs Tagen war das Nest ausgebaut und das erste Ei gelegt. Jetzt aber war meine Sorge groß, um den Vögeln eine passende Nahrung zur Aufzucht der Jungen zu bieten. Nach vieler Mühe gelang es mir, die Alten an die kleinsten ausgesuchten frischen Ameisenpuppen zu gewöhnen. Eigelb ließen sie unberührt; dasselbe sollte jedoch im Fall der Noth aushelfen, wenn keine Ameisenpuppen zu haben wären. Viele Versuche führten mich schließlich auf den Ge-

danken, hartgekochtes geriebnes Eidotter mit geschälter, eingequellter und gut abgetrockneter Hirse zu mischen und darüber gestoßnen Zucker zu streuen. Dies Futter wurde lebhaft verzehrt und nebst guten, frischen Ameisenpuppen im besondern Napfe hatte ich nun die Nahrung vor mir, mit welcher die glücklich erbrüteten Jungen so kräftig heranwuchsen, daß sie schon am fünfzehnten Tage frisch und munter das Nest verließen. Zu meiner großen Freude begann das Weibchen sogleich mit der zweiten Brut, während die vier Jungen noch in demselben kleinen Käfige sich befanden. Viel Vergnügen machte es mir, mit anzusehen, wie das Männchen die vier Jungen und zugleich das brütende Weibchen auf dem Neste fütterte. Eine innigere und zärtlichere Ehe und mehr Eifer in der Ernährung ihrer Jungen können wol kaum andere Vögel zeigen." In dieser Weise züchtete Herr Dorpmüller in drei Bruten zehn Junge, welche vortrefflich gediehen, einen sehr heftigen und langwierigen Durchfall glücklich überstanden und sehr kräftige Vögel wurden. In den nächsten Jahren gelangte er sodann zu dem Ergebniß, daß die Aufzucht doch am sichersten ermöglicht wird, wenn man die Graugirlitze an frische, kleine Ameisenpuppen gewöhnt und ihnen solche immer regelmäßig bieten kann; für den Nothfall genügt aber auch hartgekochtes Eigelb oder eingeweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot und am besten in Milch getauchter Löffelbiskuit, letztrer muß jedoch täglich zweimal frisch gegeben werden. Ueber eine künstliche Auffütterung schreibt der Genannte noch folgendes: „Getrocknete und dann eingequellte Ameisenpuppen in den verschiedensten Gemischen behagten den Alten garnicht. Als ich bei einer Brut Vernachlässigung von ihrer Seite bemerkte, machte ich kurzes Ding und fütterte selber mit. Für diesen Zweck zerrieb ich hartgekochtes Eigelb in warmer Milch zu ganz dünnem Brei und reichte ihnen davon sechs- bis achtmal täglich kleine Gaben und dadurch gelang mir die Auffütterung recht gut. Man muß sich aber hüten, daß solch' feuchtes, schmieriges Futter durch Beschmutzen des Schnabels nicht in die Nasenöffnung hineingelangt, wodurch die Vögelchen leicht an Erstickung sterben. Das alte Pärchen ließ meine Mitfütterung ruhig geschehen und fütterte seinerseits mit Hirse und Vogelmiere. Am besten ist es jedoch, wenn man die Graugirlitze stets solange getrennt hält, bis man für eine bestimmte Zeit regelmäßig frische Ameisenpuppen beschaffen kann." — In ähnlicher Weise erreichte Herr Ingenieur Hendschel, damals in Dortmund, jetzt in Innleitenmühle bei Rosenheim, glückliche Zuchtergebnisse.

Herr Dr. F. Franken in Badenbaden züchtete den Vogel sodann in den Jahren 1871 bis 1874 in zahlreichen Bruten und zwar ließ er ein Männchen wechselnd mit zwei Weibchen nisten. Dann zog er auch Bastarde vom Graugirlitzmännchen mit Kanarienweibchen und dies glückte späterhin auch den Herren Hoflieferant Koch in Wiesbaden, Hinz in Silligsdorf bei Stettin und W. Stücklen

in Offenbach.. Ein solcher Mischling hat nahezu die Größe des Kanarienvogels, ist jedoch schlanker und zierlicher gebaut und gleicht in der Färbung des Gefieders dem Graugirlitz, nur tritt nach voller Ausfärbung ein gelber Farbenton am ganzen Körper ein, während Kehle und Bürzel mehr oder minder rein kanariengelb werden.

Ueber den Versuch einer Mischlingszucht zwischen Männchen Hartlaubszeisig und Weibchen Graugirlitz berichtet Herr Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg: „Das erstre befand sich mit zwei der letzteren in einem großen Käfige, den verschiedene kleine Pracht- und andere Finken bewohnten. Der Hartlaubszeisig begann gegen die beiden Weibchen zärtlich zu sein und ich brachte ihn daher mit einem derselben in einen besondern Käfig mit genügenden Nistgelegenheiten. Das Weibchen baute, legte und brütete, und eines Tages fand ich ein todtes Junges, dem noch ein Stückchen Eischale anklebte. Die Brut hatte weiter kein Ergebniß, doch hat sie den Beweis geliefert, daß die Bastardzucht zwischen diesen beiden Arten überhaupt möglich ist". Herr Dr. Franken in Badenbaden zog sodann auch glücklich Mischlinge vom Graugirlitzmännchen und Hartlaubs- oder Mozambikzeisig-Weibchen. Eine ähnliche Züchtung erzielte er auch zwischen Männchen vom weißbürzeligen Graugirlitz und Weibchen vom gelbbürzeligen Graugirlitz oder Angolahänfling, während die graukehligen Girlitze oder Kaplandkanarien, die er ebenfalls mit Graugirlitzen in die Hecke gesetzt, durchaus keine Neigung zur Brut zeigten.

In den letzteren Jahren (1875 bis 77) ist der Graugirlitz, nachdem er bereits ständiger Gast in allen Vogelstuben war und auch vielfach als einzelner Sänger gehalten wurde, überall wieder recht selten geworden, weil er nämlich seit dieser Zeit alljährlich nur in verhältnißmäßig geringer Anzahl in den Handel gekommen. Die Nachfrage nach dem beliebten Vogel ist nun sehr groß und man zahlt gern 18 bis 21 Mark für das Pärchen. Ein gutes Nistpar in der Vogelstube ist daher für manchen Züchter recht einträglich geworden.*)

Wenn Vieillot in den Angaben über die Weichlichkeit des kleinen Afrikaners auch übertreibt, so ist es doch richtig, daß derselbe zu den zartesten aller Finken im weitesten Sinne gehört. Namentlich unmittelbar nach der Einführung erscheinen die bedauernswerthen, mehr als halbnackten, auch beschmutzten und überaus abgezehrten Ankömmlinge so hinfällig, daß ihrer zahllose zugrunde gehen; man wundert sich, daß sie die lange und beschwerliche Reise überhaupt überstehen konnten. Obwol ich im letzten Bande dieses Werks unter anderm auch eingehende Anleitungen über zweckmäßige Verpflegung frisch angekommener Vögel geben werde, so will ich hier doch mindestens kurze Rathschläge, um möglichst viele aus

*) Soeben, während ich dies schreibe (im Hochsommer 1877), erhalte ich die Nachricht, daß die ersten Sendungen der kleinen Senegalvögel und unter ihnen diesmal überaus viele Graugirlitze in Marseille, Bordeaux und bzl. Antwerpen angekommen sind.

einer angekauften Schar von Graugirlitzen zu retten, nach steten, guten Ergebnissen anfügen. Die Vögelchen bleiben, gleichviel sei der Käfig, in welchem sie angekommen, auch noch so verunreinigt, vorläufig entschieden in demselben und werden mit ihm an einen möglichst warmen Ort gestellt, wo sie für die erste Zeit, wenn irgend thunlich, Tag und Nacht hindurch oder doch abends bis gegen Mitternacht und morgens wieder ganz früh fortwährend Licht haben müssen und zwar so, daß dasselbe den Käfig zu zwei Dritteln erhellt, während das letzte Drittel dunkel bleibt. Zugleich müssen sie sehr reichlich mit ihrer afrikanischen Hirse und falls man diese nicht beschaffen kann, wenigstens mit bester weißer Hirse versorgt werden. Gut ausgetrockneter, saubrer Stubensand wird massenhaft in den Käfig geschüttet, um Nässe und Schmutz wenigstens zu bedecken. Das Trinkwasser giebt man ihnen keineswegs frisch vom Brunnen, sondern nachdem es erst einige Stunden in der warmen Stube gestanden. Alle übrigen Zugaben, besonders Mohn und andere ölhaltige Sämereien, auch Ameisenpuppen und dergleichen, vorzugsweise aber Grünkraut, halte man für die ersten drei bis vier Wochen durchaus fern. Alle todten müssen natürlich sofort herausgenommen werden und auch jedes erkrankte sollte man schleunigst absondern und in einen kleinen Käfig für sich bringen, damit eine etwaige Ansteckung durchaus vermieden wird. Erst am zweiten oder dritten Tage reinigt man den Versandtkäfig sorgfältig und läßt die Gesellschaft vorläufig noch in demselben. In der Mittagszeit oder wenn das Zimmer sonst am wärmsten ist, giebt man in einem flachen Napfe ebenfalls abgestandnes Wasser zum Baden. Sobald die Girlitze sich neu zu befiedern beginnen, bringt man sie in einen großen, geräumigen Käfig, gewöhnt sie an Grünkraut, mannigfaltige mehl- und ölhaltige Sämereien, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, eingeweichtes Eierbrot und alle anderen Beigaben, welche die Vogelstube bietet. Dann läßt man sie in derselben fliegen oder setzt sie parweise in Heckkäfige.

Das anmuthige Vögelchen ist stets munter und im Gesellschaftskäfige wie in der Vogelstube friedfertig, doch hält es auch tapfer selbst einem größern Angreifer stand; seinesgleichen und die nächstverwandten Arten befehdet es in der Brutzeit sehr hitzig. Trotz seiner Streitbarkeit aber läßt es sich vom plumpen Bandvogel, vom Zebrafink u. a. nur zu leicht aus dem Neste vertreiben und deshalb ist eine glückliche Zucht in der Vogelstube nur selten zu erzielen, während sie im Einzelkäfige garkeine Schwierigkeit zeigt.

Der Preis beträgt im Durchschnitt 9 bis 12 Mark für das Pärchen, sonst wie S. 360 angegeben; im Großhandel kauft man auch diese Art hundertparweise mit für $3\frac{1}{2}$, 5 bis 7 Frank.

Der weißbürzelige graue Girlitz hatte, bevor ich ihn geschildert, noch keinen deutschen Namen, ich mußte ihm also einen solchen geben, doch war eine passende Benennung schwierig für ihn zu finden. Gern hätte ich Vieillot's Bezeichnung musica in geeigneter Weise

Rechnung getragen, allein das ist weder mir, noch anderen populären Schriftstellern gelungen; ich benannte ihn zunächst Grauer Edelfink und diese Bezeichnung, meist in Grauedelfink zusammengezogen, hat sich fast überall eingebürgert. Sie ist jedoch nicht zutreffend, weil der Vogel streng genommen nicht zur Gattung Edelfink gehört. Er wird daher wol am passendsten schlichtweg Graugirlitz zu nennen sein. Man hat ihn im Laufe der kurzen Zeit auch weißbürzeligen Girlitz (Hgl.), Sängerfink, Singgimpel, grauen Sänger, grauen afrikanischen Sänger, Sängerschuppenfink (Rchb.) und sonderbarerweise auch Edelschläger (Br.) geheißen.

Le Chanteur d'Afrique; Singing Finch, White-rumped Siskin or White-rumped seed-eater; Gryze zanger of Chanteur d'Afrique. — [Le Sénégali chanteur, *Vieill.*].

Nomenclatur: Fringilla et Loxia musica, *Vll.*; Fringilla musica, *Lss.*; Estrelda musica, *Gr.*; Hypochera musica, *Bp.*, *Hrtl.*; Fringilla leucopygos, *Lchtst*; Dryospiza leucopygos, *Nom. Mus. Berol.*; Serinus leucopygos, *Bp.*; Crithagra leucopygia, *Sndvll.*; Dryospiza leucopygia et Serinus leucopygius et Crithagra musica, *Hgl.*; Loxia?, *Vrth.* (Beschreibung des Nestes); Pholidocoma musica, *Rchb.*; Serinus musicus, *Cb.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf weißlichgrau, jede Feder mit zartem dunklen Schaftstrich; Nacken und Rücken reiner grau; Schwingen bräunlichgrau, außen schmal und innen breit weißlich gesäumt, obere Flügeldecken bräunlichgrau, mit zwei undeutlichen weißen Querbinden; Schwanzfedern fahl bräunlichgrau mit schmalen bläßeren, verwaschenen Querbinden; Bürzel reinweiß; Kehle, Hals und Oberbrust grauweiß, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich und weißer Kante; Unterbrust und Bauch reinweiß, kaum grau angeflogen, Seiten weiß mit dunkelgrauen Schaftstrichen; untere Flügeldecken und untere Schwanzseite weißlichgrau. Schnabel hornweiß; Auge dunkelbraun; Füße fleischfarben. Das Weibchen erscheint nicht verschieden gefärbt; nur fehlen ihm die scharfen dunkeln Schaftstriche an den Seiten.

Jugendkleid: lichtgrau, oberhalb dunkler, jedoch ohne die schwarzen Striche, nur düster verwaschen; unterhalb weißlichfahlgrau; Unterrücken und Bürzel zart reinweiß; Schnäbelchen weiß; Füße röthlichweiß. (Die Verfärbung tritt mit der Mauser ein, sodaß der junge Vogel im neuen Gefieder das Alterskleid zeigt. Die Mauser pflegt in unseren Frühlingsmonaten stattzufinden).

Fringilla musica: capite canescente obscurius substriolato; cervice dorsoque purius canis; remigibus fumidis, exterius anguste, interius late albido-limbatis; tectricibus al. fuscato-cinereis fascias duas elutas exhibentibus albidas; rectricibus livide fumigatis fascias angustas ostendentibus pallidiores; uropygio albissimo; gula, collo juguloque incanis, subnigro-striolatis, eorumque plumis albo-limbatis; pectore abdomineque albis, incano-afflatis; hypochondriis albis, obscure cinereo-striolatis; tectricibus al. inferioribus latereque caudæ inferiore cinerescentibus; rostro albevente corneo; iride fusca; pedibus carneis. — ♀ concolor, sed striis hypochondriorum obscuris carens.

Länge 10,5 cm.; Flügel 6,1—6,5 cm.; Schwanz 3,9—4,6 cm. (Nach Hartl.: Länge 4½ Zoll; Flügel 2 Zoll 3½ L.; Schwanz 13 L.).

Juvenis: incana, supra obscurior striolis nigris nullis, solum fumoso-lavata; subtus livide canescens; tergo uropygioque albis; rostro albido; pedibus rubido-albis.

Beschreibung des Eies: zart graugrünlichweiß, an einem Pol nicht gerade sparsam, aber sehr fein braunröthlich und dunkelbraun gepunktet; sehr dünn- und feinschalig; lang gestreckt, ellyptisch-eiförmig; Länge 16 mm., Breite 11 mm. — Grundfarbe bläulichweiß, am stumpfen Ende ganz kleine dunkelbraune Pünktchen. Gestalt eiförmig und gestreckt; matt. Länge 15 bis 17 mm.; Breite 11—12 mm. Nehrkorn. (Die Farbe wechselt zwischen blau- und graugrünlichweiß und die mehr oder minder dicht stehenden Punkte und Flecken sind ebenfalls veränderlich in verschiedenen Schattirungen von roth- bis schwarzbraun).

Ovum: subglauco-album apice uno alterove rubente fuscoque punctatum; longiusculum, elliptico-ovatum; testa subtilissima et tenerrima.

Der gelbbürzelige graue Girlitz [Fringilla angolensis].

Durch seine ungemein große Aehnlichkeit mit dem vorigen erregt dies sonst unscheinbare Vögelchen unsere Aufmerksamkeit. In der Größe und Gestalt stimmen beide nahezu überein. Die Schattirung des letztern ist jedoch um einen Ton heller und fahlbräunlich; das hauptsächlichste Unterscheidungsmerkzeichen liegt aber darin, daß der Bürzel nicht weiß, sondern lebhaft hellgelb ist.

Seine Heimat sind, soweit bis jetzt festgestellt worden, die Gegenden Südwestafrikas von Angola bis zum Kaffernlande. Ueber sein Freileben ist in der gesammten Literatur nichts bemerkenswerthes zu finden; nur ein Reisender, Ladislaus Magyar, rühmt den Gesang.

Dagegen gehört dieser Girlitz zu den seit altersher bekannten und lebend eingeführten Finken. Buffon sagt, daß la Vengoline im Königreich Angola heimisch ist und dort zu den angenehmsten Sängern gehört. Sein Gesang sei jedoch von dem unseres Hänflings sehr verschieden. Edwards hatte bereits eine Abbildung gegeben, hielt ihn jedoch für das Weibchen einer andern Art. Paul Martin brachte einige lebend aus Lissabon mit. Alle Schriftsteller preisen einstimmig seinen herrlichen Gesang, und D. Barrington, der ihm den französischen Namen beigelegt, behauptet sogar überschwenglicherweise, daß er vor allen Singvögeln in Asien, Afrika und Amerika, mit Ausnahme der Spottdrossel, Vorzug verdiene. Schon zu jener Zeit hatte man diese Art in einem Vogelhause gezüchtet. Bechstein wiederholt im wesentlichen Buffon's Angaben und fügt noch beiläufig hinzu, daß damals solche fremdländischen Vögel von drei Vogelhändlern in Waltershausen und dann namentlich von dem umherreisenden Händler Albi eingeführt und in ganz Deutschland verbreitet wurden. Dr. Bolle führt den Angolahänfling in seinem Verzeichniß, wenn auch als selten, doch noch an, und in den ältesten Preislisten der Händler fand man ihn immer mitgezählt, obwol er seitdem durch Jahrzehnte fast völlig wieder verschwunden war; denn keiner der jetzt lebenden Händler kannte und hatte ihn eingeführt. Erst im Jahre 1874 sandte mir Chs. Jamrach in London eine Anzahl und nach dieser ersten Einführung gelangte die Art sodann, freilich stets nur in einzelnen Köpfen, in die Vogelstuben; im Frühjahr 1877 erhielt ich noch ein Männchen von Herrn Lintz in Hamburg. Da mir im Laufe der Zeit alle, selbst die bereits eingewöhnten und neu befiederten gelbbürzeligen Graugirlitze durch sehr geringe Veranlassungen, wie Futterwechsel u. drgl., regelmäßig bald eingingen, so muß ich diesen Vogel für außerordentlich zart und weichlich halten. Im zweckmäßig eingerichteten kleinen Käfige, wo man seine Fütterung sorgfältig überwachen und ihn vor schädlichen Einflüssen bewahren kann, mag er recht ausdauernd sich zeigen; um ihn freifliegend in der Vogelstube zu erhalten, bedarf

es jedoch sicherlich vorher einer allmäligen sorgsamen Gewöhnung. Inhinsicht der Haltung und Verpflegung gilt übrigens alles beim vorigen gesagte.

Die Züchtung ist mir nicht gelungen, weil die Vögel sämmtlich zu früh starben. Herr Dr. Franken schreibt über die S. 360 erwähnte Mischlingszucht zwischen dem weißbürzeligen und gelbbürzeligen Graugirlitz folgendes: „Die beiden in meinem Besitz befindlichen Angolahänflinge zeigten sich als sehr friedliche und ruhige Vögel. Sie waren Weibchen und legten in der Brut mit Weißbürzelmännchen jedesmal drei und nur einmal vier Eier. In der ersten Hecke wurden drei Junge flügge, die aber nach etwa vier Wochen rasch starben, ohne daß ich die Todesursache ergründen konnte. In der Folge brachte das eine Weibchen regelmäßig die Jungen aus, fütterte sie aber nicht oder erdrückte sie, sodaß ich nur ein Junges dadurch rettete, daß ich es einem Kanarienweibchen unterschob, welches es dann auch glücklich groß brachte. Dies wurde ein kräftiger Vogel, dessen Gesang dem des weißbürzeligen Graugirlitzmännchens ähnlich ist, jedoch einige andere Laute enthält. Das zweite Weibchen brütete mit ebensolcher Ausdauer, doch hatte es die üble Eigenthümlichkeit, sein Männchen ununterbrochen zu befehden, weshalb auch seine Eier immer unbefruchtet waren. Gegen das Frühjahr hin starb es. Im September des Jahres 1875 begann das erste Weibchen wieder zu nisten und fütterte zwei Junge glücklich auf, von denen das eine jedoch leider zugrunde ging. Aus den folgenden Gelegen wurden fast jedesmal drei Junge erbrütet, jedoch niemals großgezogen, indem das Weibchen sie gewöhnlich schon nach acht Tagen verließ und eine neue Brut anfing. Da meine weißbürzeligen Graugirlitze es ähnlich trieben und ich nicht voraussetzen konnte, daß die Ernährung eine derartige sei, um die Vögel zu dem rastlosen unersprießlichen Nisten zu veranlassen, so versetzte ich die Gelbbürzel sowol als auch die Weißbürzel in ein Zimmer, in welchem des Nachts nur bis 8 Grad R. Wärme herrschte, und siehe da, hier brüteten beide Arten naturgemäß und zogen ihre Jungen jedesmal auf. Allem Anschein nach ist ihnen eben ein zu hoher Wärmegrad des Nachts nicht zuträglich." Weitere Erfahrungen sind bis jetzt nicht veröffentlicht worden. Der Gesang ist leise, girlitzartig und steht dem des Verwandten bei weitem nach. Ein Preis läßt sich der seltnen Einführung wegen noch nicht mit Bestimmtheit angeben; der einzelne pflegt 15—18 Mark zu kosten.

Der gelbbürzelige graue Girlitz, gelbbürzelige Graugirlitz oder Angolahänfling, ist auch Angolagimpel benannt. (Angolischer Hänfling oder Fink, nach Bechstein).

Le Chanteur d'Angola; Yellow-rumped Siskin or Yellow-rumped seed-eater; Gryze zanger of Chanteur d'Angola. [La Vengoline, *Buff.*; Angola Finch, *Lath.*].

Nomenclatur: Fringilla angolensis, *Gmlz.*; Fringilla tobaca, *Vll.*; Linaria angolensis, *Brss.*; Linaria atrogularis, *Smth*; Fringilla uropygialis, *Lchtst.*, *Bp.*; Poliospiza angolensis et atrigularis, *Hrtl.*; Crithagra angolensis, *Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung. Oberhalb fahlbräunlichgrau, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich; Flügelschwingen graubraun mit schmalem gelbgrünen Außensaum und weißem Innen- und Endrand; Schwanzfedern dunkelgraubraun mit röthlichgrauem Innen- und Endsaum; Bürzel und obere Schwanzdecken hell schwefelgelb; Kehle mattgrauschwarz; ganze Unterseite fahlgelblichgrauweiß. Schnabel dunkelhorngrau; Auge braun; Füße hellbraun. Weibchen kaum verschieden, oberhalb wenig düstrer bräunlichgrau, unterhalb mehr düster bräunlichgrauweiß.

Fringilla angolensis: supra luride cineracea, subnigro-striolata; pogonio remigum nigro-fuscorum exteriore flavo-viride, interiore et apicali albo-submarginato pogonio rectricum fumosarum exteriore et apicali rubente cinereo-limbato; uropygio et supracaudalibus dilute sulfureis; gula cineraceo-nigricante; gastræo toto luride albido; rostro obscure corneo; iride fusca; pedibus umbrinis. — ♀ vix differens, supra parum luridior, subtus obscurius fuscato-cana.

Länge 9,8 cm.; Flügel 6,1 cm.; Schwanz 3,9 cm. (Nach Hartl.: Länge $4\frac{1}{2}$ Zoll; Flügel $2\frac{1}{2}$ Zoll; Schwanz $1\frac{3}{4}$ Zoll).

Jugendkleid und Ei mir noch unbekannt. (In der Mischlingszucht mit dem weißbürzeligen Graugirlitz gleicht das Ei ganz der letztern Art, nur sind die Flecke meistens bedeutend größer. Dr. Franken).

Der graukehlige Girlitz [Fringilla canicollis].

Zu den schönsten unter den Girlitzen gehörend, läßt der sogenannte Kaplandkanarienvogel es umsomehr bedauern, daß er im Handel einer der seltensten ist. Auf den ersten Blick erscheint er schlicht gelblicholivengrün. Die lebhaft grüngelbe Stirn und der grüne Oberkopf heben sich vom aschgrauen Nacken und der gleichen Kehle angenehm ab, die übrige Oberseite ist grünlichschwarzbraun und die Unterseite gelblichgraugrün mit reinweißem Bauch. Größe nahezu die des Kanarienvogels.

Seine Heimat ist Südafrika, wo man ihn namentlich im Kaplande häufig findet; auf der Insel Mauritius soll er durch Zufall eingeschleppt und verwildert sein. Ueber das Freileben sind noch keine Angaben gemacht, außer einer kurzen Notiz des Naturforschers Layard, nach welcher der Vogel im niedern Gebüsch aus Moos, Haaren und Federn sein Nest erbaut und in dasselbe drei oder vier weiße, am dickeren Ende purpurbraun gepunktete und gestrichelte Eier legt.

Mehrere Reisende haben übereinstimmend berichtet, daß dieser Girlitz in den südafrikanischen Kolonien als trefflicher Sänger vielfach im Käfige gehalten wird. Kürzlich theilte Herr Georg Altona in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ (Jahrgang 1876) folgendes mit: „Der Vogel eignet sich vortrefflich für die Gefangenschaft. Er hat einen angenehmen, lerchenartigen Gesang, den er sehr fleißig vorträgt; außerdem empfiehlt ihn noch besonders seine Genügsamkeit und sein munteres Wesen. Das einfachste Körnerfutter ist ausreichend, um ihn jahrelang bei guter Gesundheit zu erhalten; er scheint in dieser Hinsicht wirklich noch den Kanarienvogel zu übertreffen. Wie schon Layard angegeben, wird er hier, jedoch nur sehr selten, zur Bastardzucht mit Kanarienweibchen benutzt. —

Es wäre doch jedenfalls für die Liebhaber der Stubenvögel sehr erwünscht, wenn die in Südafrika heimischen Finken zahlreicher nach Europa eingeführt würden, und es erregt eigentlich meine Verwunderung, daß dies nicht geschieht, zumal es in der Kapstadt ein leichtes sein dürfte, eine schöne Sammlung derselben anzukaufen. Während meines Aufenthalts daselbst wurden täglich Vögel in großer Anzahl und Auswahl und zu billigen Preisen im Markthause von Malayen feilgeboten".

Im Laufe der Jahre habe ich ihn nur immer in einzelnen Köpfen aus den Handlungen von Chr. Hagenbeck in Hamburg und Chs. Jamrach in London und kürzlich ein Paar von Herrn Altona erhalten. Die Zucht ist mir weder mit dem letztern, noch mit Kanarienweibchen geglückt. Herr Dr. Franken hat mit seinem Pärchen auch keinen Erfolg erzielt, wol aber einen Mischling vom Männchen mit einem gelbstirnigen Girlitzweibchen gezüchtet. Auch er lobt den Gesang des erstern. Bis jetzt hat derselbe trotzdem für die Liebhaberei erst eine geringe Bedeutung, während wir doch wünschen, daß er bald durch zahlreiches Erscheinen auf dem Vogelmarkt eine größere erlange. Der Preis steht hoch und beträgt gewöhnlich 24—30 Mark für das Pärchen und etwas mehr als die Hälfte solcher Summe für den einzelnen.

Der graukehlige Girlitz heißt auch Kapkanarienvogel oder Kaplandkanarienvogel.

Le Chanteur du Cap; Cape Canary-finch; Zanger of Chanteur du Cap.

Nomenclatur: Crithagra canicollis, *Sws.*; Serinus canicollis, *Bp.*, *Cb.*; Serinus flaviventris, *Mus. Snkbrg.*; Loxia flaviventris var β., *Gml.*; Fringilla cinereicollis, *Dbs.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn lebhaft grüngelb, Oberkopf grün; Nacken und Kehle aschgrau; ganze Oberseite gelblicholivengrün, jede Feder mit dunklem Schaftstrich. Flügelschwingen schwarzbraun mit schmalem grüngelben Außensaum; Schwanzfedern olivengrün, schwarz geschäftet; Hals, Brust und Bauchseite gelblichgraugrün; Bauch grauweiß; untre Flügelseite grau, jede Feder an der Wurzelhälfte innen weißgrau, untere Schwanzdecken gelblichgrün, untre Schwanzseite grüngelb. Schnabel bleigrau; Auge braun; Füße braun. Weibchen düstrer graugrün; Stirn und Oberkopf ebenfalls nur graugrün.

Fringilla canicollis: fronte læte viride flava; pileo viridi, cervice gulaque cinereis; notæo toto e flavente olivaceo-viridi, scapo plumæ cujusque nigricante; collo, pectore et hypochondriis flavicante cinereo-viridibus; ventre canescente albo; alis inferioribus cinereis, basi plumarum singularum dimidia interius cana; infracaudalibus flavido-viridibus; cauda subtus virente flava; rostro plumbeo, iride et pedibus fuscis. — ♀ sordide cinereo-viridis necnon fronte pileoque concoloribus.

Der weißkehlige Girlitz [Fringilla Selbyi].

Die tiefdunkle Mitternacht ist wol der einzige Zeitpunkt, in welchem völlige Stille in der Vogelstube herrscht. Bis zum späten Abend zankten sich die kleinsten und unruhigsten der Bewohner wispernd und scheltend um die besten Schlafplätze, dann hörte man in der Finsterniß geraume Frist das Zirpen und Krächzen der von treuer Elternsorge noch immer gefütterten Jungen; mit dem Morgen-

grauen aber, im Sommer also schon in der dritten oder vierten Stunde, beginnen bereits die ersten Laute sich wieder zu regen. In der kurzen Frist, welche unbedingte Ruhe bringt — erhebt sich dann plötzlich eine Stimme, die an Harmonie und wechselvoller Melodie uns beinahe wunderbar schön erklingt. In vollen Tönen schallt der Gesang durch den Raum, so kräftig, daß wir ihn noch weithin außerhalb des Gemachs vernehmen, während er uns doch auch innerhalb desselben keineswegs gellend oder sonstwie unangenehm dünkt. Wollten wir den Sänger, der unsre Bewunderung erregt, am nächsten Morgen in der Vogelstube suchen, so würden wir uns vergeblich nach ihm umsehen — wenn wir nämlich voraussetzen, daß er neben seinem herrlichen Liede ein buntes, farbenreiches Federkleid oder wenigstens wie der Graugirlitz eine anmuthige und zierliche Gestalt habe.

Es ist der graue weißkehlige Girlitz, der größte unter seinen Verwandten, der als ein anspruchslos gefärbter und zugleich dicker, ungeschlachter Vogel erscheint. Am ganzen Körper einfarbig düster aschgrau, ist er oberhalb dunkler, unterhalb etwas heller, an der Kehle grauweiß und auf dem Bürzel grünlichgrau.

Für die Liebhaberei hat er leider keine Bedeutung erlangt, da er bis jetzt erst ein einziges mal lebend eingeführt sein dürfte. Im Jahre 1868 fand ich bei Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg ein Pärchen, welches ich erwarb und dessen Männchen mich lange Zeit hindurch, namentlich an den Winterabenden in völliger Dunkelheit der Vogelstube, mit seinem wundervollen Gesange erfreute. Sie begannen dann auch zu nisten und erbauten in einem an einer Seite offnen Harzer Bauerchen aus Wurzeln und Fasern ein großes, nicht besonders künstliches Nest mit einer flachen aus feinen Kokusfasern und Pferdeharen gebildeten und sauber geglätteten Mulde. Zu einer erfolgreichen Brut gelangten sie aber nicht. Als ich später eine Reise antreten mußte, welche meine längere Abwesenheit von Berlin nothwendig machte, erhielt die beiden Vögel von mir Herr Graf Rödern in Breslau, aus dessen Vogelstube sie dann, wiederum nach geraumer Frist, in das Berliner Aquarium gelangten, wo sie aber bald zugrunde gegangen sind.

Die Heimat des Vogels erstreckt sich weit über Südafrika. Die Forscher Jardine und Selby hielten ihn fälschlich für das junge Männchen einer andern Art und zwar des weiterhin beschriebnen schwefelgelben Girlitz. Ueber sein Freileben ist nichts bekannt. Hoffentlich wird er demnächst, sobald Afrika sich der Forschung, sowie dem Handel und Verkehr mehr öffnet, zahlreich eingeführt, da er in seiner Heimat nicht selten sein dürfte.

Der weißkehlige Girlitz oder graue weißkehlige Girlitz ist auch Riesengirlitz und Weißkehle (Br.) benannt.

Le Serin à gorge blanche; White-throated Siskin or White-throated seed-eater; Groote grijze zanger of Chanteur d'Afrique.

Nomenclatur: Buserinus Selbyi, *Smth.*; Loxia cinerea, *Vll.*; Loxia albigularis, *Smth., Jard.* et *Slb., Fnsch.* et *Hrtl.*; Crithagra cinerea et Selbyi, *Swns.;* [Crithagra sulfurata, *Gr.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb dunkel bräunlichgrau, jede Feder mit ſchwärzlichem Schaftſtrich; Kopf wenig heller grau mit ſchwärzlichem Zügelſtreif, fahlweißem ſchmalen Augenſtreif und weißlichem undeutlichen Backenſtreif; Flügel und Schwanz dunkelbraun, jede Feder mit ſchmalem fahlen Außenſaum; Bürzel und obere Schwanzdecken rein hellgelb; Kehle reinweiß; Oberbruſt und Seiten fahl bräunlichgrau; Unterbruſt, Bauch und Unterſchwanzdecken reinweiß; untere Flügelſeite fahl braungrau. Schnabel hornfarben, der Unterſchnabel etwas heller; Auge dunkelbraun; Füße braungrau. Das Weibchen gleicht dem Männchen völlig, hat aber keinen gelben, ſondern einen düſtergrauweißen Bürzel.

Fringilla Selbyi: supra obscure fumida, nigricante striolata; capite parum dilutiore; loris subnigris; stria ophthalmica angusta, sordide albida; altera zygomatica elute albicante; pluma quaque alarum caudæque fuscarum exterius anguste luride limbata; uropygio et supracaudalibus pure flavis; gula albissima; jugulo et hypochondriis livide fumidis; pectore et infracaudalibus albissimis; latere alarum inferiore luride umbrino-cinereo; rostro corneo, mandibula dilutiore; iride fusca; pedibus fumigatis. — ♀ mari æqualis, uropygio autem haud flavo, sed sordide cano.

Der buttergelbe Girlitz oder Hartlaubszeiſig [Fringilla butyracea, *var.* Hartlaubi].

(Tafel XI, Vogel 54).

Schon von weitem hören wir einen hellen, melodiſchen Schlag. Mehrmals wiederholt, dünkt es uns faſt, als erſchalle er doppelt, d. h. als werde dieſelbe Strofe, aber ſchwächer und kürzer, ſtets zu gleicher Zeit oder unmittelbar hinterher noch einmal hervorgebracht. Sobald wir aufmerkſam lauſchen, nehmen wir wahr, daß das Weibchen den ſchmetternden Ruf des Männchens jedesmal beantwortet. Noch mehr wundern wir uns jedoch darüber, daß die beiden Vögel — augenſcheinlich ein richtiges Pärchen — einander in der hitzigſten Weiſe befehden. Von früh Morgens bis ſpät Abends macht das Männchen fortwährend auf das Weibchen Jagd und läßt es den ganzen Tag hindurch auch nicht einen Augenblick in Ruhe.

Als ich beim Beginn der Züchtung dieſe Art noch nicht ausreichend kannte, mußte ich glauben, daß ich kein Paar, ſondern ein altes und ein junges Männchen vor mir habe, zumal die Farben des letztern faſt ebenſo lebhaft waren, als die des erſtern und ſein Geſang laut und kräftig ertönte. Schon war ich im Begriff, ſie zu trennen, als ich glücklicherweiſe die erſten Vorbereitungen zur Brut bemerkte. Bevor ich nun auf meine Beobachtungen näher eingehe, will ich den Vogel zunächſt ſchildern.

In der Größe und Geſtalt ähnelt er dem Graugirlitz, nur iſt er kräftiger und gedrungener. Oberkopf und Nacken ſind ſchön aſchgrau, ſchwarz geſtrichelt; Stirn, Backen und Kehle lebhaft gelb; der ganze Oberkörper iſt olivengrünlichgelb mit ſchwärzlichen Flammen gezeichnet, die etwas dunkleren Flügeldecken

haben schwärzlichbraune Ränder und gelbgrüne Streifen; die ganze untere Seite ist gelb.

Der in diesen Darstellungen oft genannte Forscher, Dr. Karl Bolle, hatte darauf aufmerksam gemacht, daß zwei augenscheinlich doch durchaus verschiedenartige Vögel mit ein und demselben wissenschaftlichen Namen belegt seien; er schied daher den grauköpfigen von dem grünköpfigen, indem er den ersten unter dem Namen Hartlaubszeisig (Crithagra Hartlaubi) beschrieb. Während der grünköpfige hierhergehörende Vogel noch wol niemals lebend in den Handel gekommen, wird der grauköpfige alljährlich in ganz bedeutender Anzahl als einer der sogenannten kleinen Senegalvögel über Marseille, Bordeaux, Antwerpen u. s. w. eingeführt. Bis vor kurzem hielt auch ich an dieser Meinung des Genannten fest, indem ich glaubte, daß der weiterhin geschilderte südafrikanische Girlitz (Fringilla flaviventris, *Gml.*), welcher zuweilen in unsere Sammlungen gelangt und den ich gelbstirnigen Girlitz benannt hatte, der eigentliche buttergelbe Girlitz (Fringilla butyracea, *L.*) sei. Noch in der soeben bearbeiteten zweiten Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. habe ich an diesem Irrthum festgehalten und erst die sorgsamste Vergleichung der gesammten Literatur und der Bälge in mehreren Museen haben mich zu der Einsicht geführt, daß die Herren Dr. Finsch und Dr. Hartlaub durchaus im Recht sind, wenn sie beide Vögel als eine Art zusammenwerfen. Dieselben sagen: „Nach der Untersuchung von mehr als zwanzig Exemplaren aus allen Theilen Afrikas überzeugten wir uns davon, daß eine spezifische Unterscheidung nicht möglich ist, da sich von der grau- zur olivengrünköpfigen Form deutliche Uebergänge nachweisen lassen."

Wenn wir diese Behauptung als feststehende Wahrheit annehmen, so ist die Verbreitung der Art eine ganz außerordentlich weitreichende. Sie erstreckt sich vom Senegal an der westafrikanischen Küste herab bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung, weiter östlich hinauf bis Damara, Natal, Mozambik und über Habesch. Auf Madagaskar, Bourbon und Mauritius und angeblich auch auf St. Helena ist er eingebürgert und neuerdings auch durch Dr. G. A. Fischer auf Sansibar nachgewiesen. Trotzdem haben wir keine Nachrichten über sein Freileben. Heuglin erlegte nur ein einziges Exemplar auf einem Eisenholzbaume in Ostsenar im Monat Dezember. Im übrigen darf man wol annehmen, daß die Lebensweise von der nahverwandter Finken nicht verschieden sein wird.

Vieillot hat ihn in das große Bilderwerk zwar nicht aufgenommen, gibt aber anderweitig eine der besten Beschreibungen. Edwards, Brisson, Buffon und andere, ältere Schriftsteller sind in Irrthümern inbetreff seiner befangen; so namentlich auch über das Vaterland, und letztrer zählt ihn, wie bereits von Bolle angegeben, zu den Stammvätern des Kanarienvogels. In der Gefangenschaft ist er seit langer Zeit her bekannt. In dem Bolle'schen Verzeichniß ist er vorhanden und zwar

dürfen wir mit Bestimmtheit annehmen, daß er ebenso zu den am frühesten von Westafrika eingeführten Senegalisten gehört hat, wie er noch jetzt eine ständige Erscheinung unter denselben bildet. Seitdem der letztgenannte Forscher der grauköpfigen Rasse eine andre Benennung gegeben, führt sie auch die entsprechende deutsche Bezeichnung Hartlaubszeisig, und jenem hervorragenden Forscher zu Ehren glaubte ich ihr dieselbe belassen zu dürfen, zumal solche sich bereits überall bei den Liebhabern und in den Verzeichnissen der Händler eingebürgert hat. Man hat an ihrer Stelle wol den Namen Buttergimpel oder auch Goldgimpel (Br.) gesetzt, allein derselbe kann nur Irrthümer hervorrufen, da abgesehen von dem ein wenig gewölbten Schnabel doch sicherlich kein Liebhaber den Hartlaubszeisig einem Gimpel oder Dompfaff ähnlich finden wird.*)

Recht bemerkenswerthe Angaben hat kürzlich im „Journal für Ornithologie" Dr. Fischer über ihn gemacht: „Man findet ihn hier auf Sansibar überall in einer großen Anzahl von Negerhütten und auch in der Stadt sieht man ihn häufig vor den Häusern hängen. Er ist fast der einzige Vogel, der hier in Gefangenschaft gehalten wird, theils um seines Gesanges willen, theils weil er einen kleinen Handelsartikel für die Neger bildet, die ihn für 1 bis 2 Rupien an englische und amerikanische Kapitäne verkaufen. Andrerseits wird dieser immer muntre Girlitz von den Negern als Lockvogel beim Fangen kleiner Vögel verschiedener Arten benutzt. In der Freiheit habe ich noch keinen gesehen, wol aber weiß ich, daß die Neger aus dem Innern ihn vielfach zu Markte bringen, sodaß an seinem Vorkommen hier nicht gezweifelt werden darf. Die Neger erzählen, daß er vor dem Orkan des Jahres 1872 auch in der Nähe der Stadt vorhanden gewesen, nach demselben sich jedoch ins Innere der Insel zurückgezogen habe." In einer Nachschrift sagt der Reisende dann, daß er den buttergelben Girlitz dort auch freilebend gesehen habe.

Herr Dr. Bolle hat bereits im Jahre 1858 folgendes über das Gefangenleben berichtet: „Für die Volière ist er eine äußerst wünschenswerthe Erwerbung. Seine zierliche Gestalt und seine wahrhaft anmuthige Färbung werden durch ein ruhiges und gewandtes, obwol nicht gerade zutrauliches Wesen noch mehr hervorgehoben und gern vergißt man darüber das Fehlen eines eigentlichen Gesangs. Die Stimme des Vogels besteht in einem häufig ausgestoßenen leisen Zirpen. Selten hört man dazwischen einen kanarienvogelartigen, gedehnt flötenden Ton. Der Lockruf ist aus drei lauten und wohlklingenden absteigenden Noten, die schnell und unmittelbar auf einander folgen, zusammengesetzt. Mit diesem locken sich die Pärchen, wenn man sie trennt, unaufhörlich. Parweise gehalten,

*) Cabanis trennt zwar eine Gruppe als Feldgimpel (Crithagra, *Swns.*) von den Girlitzen (Serinus, *Koch.*), die Verwandtschaft ist indessen eine so nahe, daß ich glaube, hier die Scheidung unterlassen zu dürfen.

rücken die stets sauberen und schmucken Vögelchen gern eng zusammen, ohne sich jedoch so innig wie die Astrilde an einander zu schmiegen, und dabei zeigen sie untereinander die größte Zärtlichkeit. Fortwährend schnäbeln und füttern sie sich aus dem Kropfe und zwar in den zierlichsten Stellungen, die in den Juli fallende Mauserzeit allein ausgenommen. Trotzdem äußern sie garkeine Neigung, sich in der Gefangenschaft fortzupflanzen oder ein Nest zu bauen, wie hoch auch die Sommerwärme steigen möge und wie weit auch der Raum sei, den man ihnen anweist. Wahrscheinlich fällt die Zeit dazu in Senegambien in eine von unserm Sommer ganz verschiedne Jahreszeit. Zu Santa Cruz de Teneriffa war ich Zeuge eines vergeblichen Versuchs, ein Weibchen mit einem Kanarienvogel zu paren. — Zur Nachtruhe ziehen diese Vögel die höchsten ihnen erreichbaren Stellen vor, schlafen auch oft wie die Zeisige seitwärts an das Gitter ihres Bauers angeklammert, sonst gern neben einander auf einer Stange sitzend. Auf die Erde kommen sie gewöhnlich nur herab, um zu fressen oder das Wasser aufzusuchen, in welchem letztern sie sich beim Baden sehr durchnässen. Eine bemerkenswerthe Empfindlichkeit gegen kühlere Luft habe ich nicht an ihnen wahrgenommen, obwol sie im Winter natürlich eines gut geheizten Zimmers bedürfen. Ihre Nahrung besteht in mehlreichen Sämereien, unter denen Hirse und Kanariensamen ihnen besonders zuzusagen scheinen; doch verschmähen sie auch ölhaltiges Gesäme, wie Mohn und Hanf, nicht und genießen neben frischen Ameiseneiern und einem beiläufigen Bissen in Milch geweichten Weißbrots auch gern zartes junges Grün: eine Neigung, in welcher sie, wie in ihren Sitten überhaupt, mit den meisten anderen Girlitzen zusammentreffen." Diese Angaben des aufmerksamen und liebevollen Beobachters kann ich nach jahrelangen Erfahrungen ergänzen und theilweise berichtigen.

Es ist ein überaus lustiges Liebeleben, welches ein Pärchen dieser Vögel führt. Ihr fortwährender Zank und Streit, der mich anfangs so sehr gegen sie eingenommen, ist vielmehr nur schelmische und muthwillige Neckerei, die mit den Ergüssen anmuthigster Zärtlichkeit wechselt. Sehr verschieden zeigt sich letztre allerdings von der aller Prachtfinken; nicht so innig wie diese, nicht so gleichsam ganz in einander aufgehend äußert sie sich, sie entfaltet sich vielmehr in jenem anmuthigen Schäkern und gipfelt in dem taubenähnlichen Schnäbeln, bei welchem das Männchen sein Weibchen aus dem Kropfe füttert, gleich hinterher aber auch wieder jagt und verfolgt. Dabei eben wird dann der wohlklingende Lockruf zum schmetternden Schlage, wechselnd mit lautem melodischen Flötenton.

Zur Anlage des Nestes wählen sie stets ein Harzer Bauerchen, ein offnes Nestkörbchen, eine Schale oder irgend eine ähnliche Gelegenheit; niemals bauen sie ganz frei im Gebüsch. Das Nest wird aus feinen Gräsern, Bast- und Papierstreifen, Baumwoll- und anderen Fäden, Pferdehaaren, wenigen Federn und Hede

geformt und das Lager der Eier aus zarten Gräsern und Würzelchen glatt und sauber hergerichtet. Das Gelege besteht in der Regel aus vier Eiern, welche in dreizehn Tagen erbrütet werden. Die Jungen sind mit weißlichem Flaum bedeckt und fliegen etwa am zwanzigsten Tage aus. Nur das Weibchen allein baut, vom Männchen nach Finkenart auf jedem Fluge beim Eintragen der Stoffe geleitet, und brütet ebenso allein. Sobald der Nestbau beginnt, erstirbt der antwortende Ton des Weibchens, während das Männchen seinen Schlag solange hören läßt, bis es helfen muß, die aus den Eiern geschlüpften Jungen zu füttern. Von dem Zeitpunkte an, da die Jungen das Nest verlassen, kümmert sich das Weibchen nicht mehr um dieselben, dagegen werden sie vom Männchen auffallend lange verpflegt; bei der einen Brut beobachtete ich, daß sie noch fünf Wochen nach dem Ausfliegen, als sie längst vollkommen flügge waren, Nahrung erbettelten und empfingen. Die Nistzeit pflegt im September anzufangen und gegen Neujahr hin beendet zu sein; dann werden die Vögel ruhiger und still. Der Schlag, sowie das Jagen, die sich bei jeder Brut wiederholten, haben nun ganz aufgehört, und kaum kann man bemerken, daß einer der Gatten des Pärchens sich noch um den andern bekümmert.

Obwol der Hartlaubszeisig immerhin eine angenehme Erscheinung ist, so erfreut er sich, wenigstens bei uns in Deutschland, doch keineswegs besondrer Beliebtheit; er ist eben nicht absonderlich farbenprächtig, macht zu wenig den Eindruck eines Tropenbewohners, und Unkundige sehen ihn wol gar für einen gewöhnlichen, einheimischen Vogel an. Wer aber nicht gerade auf blendende Farbenschönheit zu großes Gewicht legt, sondern sich am schlichteren, doch immerhin lieblichen Gefieder genügen läßt und dabei vorzugsweise Anmuth und Munterkeit werthschätzt, wird ihn wol liebgewinnen können. Erst bei näherer Kenntniß aber lernt man ihn vollends würdigen und zwar seiner leichten Züchtbarkeit wegen, da er sowol freifliegend in der Vogelstube, als auch im Heckkäfige ungemein bald und sicher nistet. Zu beachten ist aber, daß man niemals zwei Pärchen von derselben oder von den naheverwandten Arten, Graugirlitz u. a., beisammen in der Vogelstube halten darf, weil sie einander heftig und anhaltend befehden. Zugleich gehört er zu den keineswegs weichlichen, sondern gut ausdauernden Stubenvögeln. Gegen Kälte ist er nicht empfindlich und man darf ihn im schwach oder auch im garnicht geheizten Raume ohne Bedenken überwintern.

Nachdem ich ihn im Laufe der Jahre mehrfach gezüchtet und die Ergebnisse veröffentlicht hatte, bürgerte er sich allmälig in den Vogelstuben ein und gelangte in zahlreichen Fällen zur erfolgreichen Brut. Bei einem eifrigen Liebhaber und Züchter, Herrn Böttcher in Berlin und später in Dresden, zog ein Pärchen mehrere Bruten im engen Prachtfinken-Heckkäfige, dessen Größenverhältnisse ich S. 40 angegeben, glücklich auf. Herr Dr. Franken erzog Bastarde mit Kanarien

und Herr Regierungsrath v. Schlechtendal beobachtete eine Mischlingsbrut vom Männchen Hartlaubszeisig mit Weibchen Graugirlitz, welche allerdings leider verunglückte, indem das einzige Junge von den Alten aus dem Nest geworfen wurde.

Man kauft das Pärchen, im Spätsommer frisch angekommen, für etwa 9 Mark und späterhin eingewöhnt für 12 Mark. Im Großhandel gehört er zu dem kleinen Gefieder, welches hundertparweise bunt durcheinander zu 3, $3^1/_2$ bis 5 Frank verkauft wird, doch halten ihn die Großhändler meistens etwas höher im Werth. Hoffentlich wird über kurz oder lang auch die grünköpfige Rasse im Handel und in den Vogelstuben erscheinen.

Der buttergelbe Girlitz oder Hartlaubszeisig wird auch Mozambikzeisig, blos Mozambik, Mosambik und Mozambek genannt; früher hießen ihn die kleinen Berliner Händler Haublättchen; nach seinem lateinischen Namen hat man ihn noch buttergelben Fink und, wie bereits erwähnt, neuerdings Buttergimpel und Goldgimpel (Br.) genannt.

Le Serin de Mozambique; Mozambique Siskin or Mozambique seed-eater (fälschlich Yellow-rumped seed-eater); Geele zanger of Chanteur de Mozambique (fälschlich St. Helena vink of Kaapsche Kanarie).

Nomenclatur: Fringilla butyracea, *L.*, *Gml.*, *Lth.*, *Bchst.*; Fringilla ictera et Fringilla butyracea, *Vll.*; Crithagra chrysopyga, *Sws.*, *Gr.*, *Hrtl.*, *Hgl.*, *Nwt.*, *Krk.*, *Lrd.*, *Sprl.*; Fringilla aurifrons et Serinus chrysopygus, *Hgl.*; Serinus ictera, *Bp.*; Crithagra Hartlaubii, *Bll.*; Fringilla flavifrons, *Pr. Wrtbg.*, *Hgl.*; Crithagra mossambica, *Ptrs.*; Crithagra butyracea, *Fnsch.* et *Hrtl.*, *Hgl.*, *Br.* — Von den Negern auf Sansibar Tscheriko genannt *(Fschr.)*.

[Chloris indica, *Edw.*, *Brss.*, *Slgm.* — Yellow finch, *Lath.*; Serin de Mozambique, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn, breiter Augenbrauenstreif und Backen zitrongelb; Vorder- und Oberkopf nebst Schläfen und der hintern Ohrgegend und ein Zügelstreif durch das Auge olivengrau, die Federn mit undeutlichen dunklen Schaftstrichelchen und olivengrünlichen Seitensäumen, daher das Grau nicht ganz rein, sondern etwas grünlich verwaschen; das Gelb der Backen wird unterseits von einem graulichschwarzen Bartstreif begrenzt, der vom Mundwinkel bis unter die Backe läuft; Hinterkopf allmälig olivengrün wie die übrige Oberseite, die Federn mit verloschenen, schmalen, dunkelen Schaftstrichen; Schwingen braunschwarz, die der ersten Ordnung an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze schmal olivengrüngelb gesäumt, von der vierten an mit gelblichweißem Spitzensaume, die Schwingen zweiter Ordnung breiter olivengrün gerandet, die Deckfedern schwarzbraun mit olivengrünem Endrande, wodurch zwei undeutliche Querbinden über den Flügel gebildet werden; Bürzel zitrongelb; Schwanzfedern braunschwarz, an der Außenfahne schmal olivengrüngelb gesäumt, an der Innenfahne weißlich, an den drei äußeren Federn ein breiterer gelblichweiß verwaschener Endrand; ganze Unterseite zitrongelb, die Seiten etwas olivengrünlich verwaschen, namentlich an der Brust; untere Flügeldecken weiß, gelblich gesäumt, daher gelblich verwaschen (Finsch und Hartlaub). Schnabel und Füße hell horngrau; Auge braun. (Diese Art ändert, wie erwähnt, außerordentlich ab. Nach denselben Autoren ist ein westafrikanisches Männchen [*var.* Hartlaubi, *Bll.*] am ganzen Oberkopf wie an der übrigen Oberseite schmutzig olivengrün, mit deutlicher hervortretenden dunkelen Schaftstrichen, nur die Ohrgegend ist graulich; das Gelb des Augenstreifs, der Backen und Unterseite ist bedeutend blasser; die Seiten sind deutlicher olivengrünlich verwaschen; das Kinn ist weißlich, der Bartstreif sehr schmal und wenig deutlich; Bürzel und obere Schwanzdecken sind gelb und sämmtliche Schwanzfedern haben einen olivenfahlweißen Endrand. Die Abbildung auf Tafel XI zeigt den Hartlaubszeisig, wie er regelmäßig im Vogelhandel erscheint

und zwar von Weſtafrika aus eingeführt. Ihm fehlt regelmäßig der gelbe Stirnrand; das Grau an Stirn, Ober- und Hinterkopf, am breiten Zügelſtreif und ſchmalen Bartſtreif iſt viel reiner, faſt garnicht olivengrünlich angehaucht, ſondern nur zart ſchwärzlich geſtrichelt, Hinterkopf und Nacken aber ſind reingrau; auch habe ich den gelblichen oder weißlichen Endrand der Schwanzfedern niemals finden können). Das Weibchen gleicht nach Fnſch. und Hrtl. dem zuerſt beſchriebnen Männchen; der Oberkopf und die übrige Oberſeite ſind mehr olivengraulichgrün mit deutlichen dunkeln Schaftſtrichen; es hat ein breiteres weißes Schwanzende. Die im Handel mit kommenden Weibchen unterſcheiden ſich von den Männchen anfangs dadurch, daß ihr Gelb viel matter fahlgraulich, während der Kopf fahlgrünlichgrau mit weißlichgelbem Augenbrauenſtreif und Backen iſt. Völlig ausgefärbt aber gleichen ſie den Männchen faſt vollſtändig, allenfalls iſt das Gelb kaum bemerkbar heller, weißlich.

Jugendkleid: Oberkopf und Backen grünlichbraungrau; Stirn und Augenſtreif weißlichgelbgrau, zart ſchwärzlich geſtrichelt, Bartſtreif zart dunkel angedeutet; ganze Oberſeite bräunlicholivengrün; Schwingen und Flügeldecken dunkler braun, jede Feder zart gelb geſäumt, Bürzel beim jungen Männchen ſchon lebhaft gelb, beim Weibchen fahlgrünlichgrau; Schwanz faſt einfarbig ſchwärzlichbraun, unterhalb heller graubraun; Oberkehle weißlichgelb; ganze Unterſeite beim Männchen ſchon lebhaft gelb, beim Weibchen blaßgelb, bei beiden in der Regel aber nicht immer mit zarten, bräunlichen oder grünlichgrauen Strichelchen oder Flecken an der Oberbruſt. Schnabel und Füße hornweiß mit deutlichem bläulichen Ton, erſterer mit lebhaft gelber Wachshaut; Auge ſchwarz.

Fringilla butyracea: fronte, stria superciliari lata genisque citrinis; sincipite, vertice, temporibus, loris, stria oculari, regioneque parotica olivaceo-cinereis; scapis plumarum singularum obscurioribus, limbis verum elute virentibus; stria mystacali ab oris angulo ad genam usque nigricante; occipite ut notæo reliquo olivaceo-viridibus elute obscurius striolatis; remigibus fusco-nigris; pogonio primorum 4 anteriorum exteriore usque fere ad apicem olivaceo-virente limbato, apice primorum reliquorum flavente albo-limbato; secundariis latius olivaceo-viride marginatis; marginibus tectricum fusco-nigrarum limitaribus ex olivaceo viridibus, fascias duas alarum elutas fingentibus transversas; uropygio citrino; rectricibus fusconigris, exterius anguste olivaceo-virente, interius albido-limbatis; margine terminali rectricum ternarum exteriorum latiore, elute flavido-albo; lateribus gastræi; totius citrini, imprimis pectoris olivaceo-virente imbutis; tectricibus al. inferioribus albis, flavente limbatis; rostro pedibusque dilute canis; iride fusca. — ♀ mari simillima nonnisi pileo notæoque reliquo magis olivaceo-canis, distinctius obscure striolatis, caudæque apice latius albo.

Länge ca. $10{,}5$ cm.; Flügel $6{,}1$ cm.; Schwanz $3{,}9$ cm.

Juvenis: pileo genisque luride virescente cinereis; fronte striaque oculari livide canis, subnigro-striolatis; stria mystacali vix conspicua; notæo luride olivaceo-viridi; remigibus alarumque tectricibus obscurius fuscis, flavente limbatis; uropygio ♂ jam læte flavo, ♀ subflavido; jugulo sexus utriusque subfusco-, vel luride virente striolato vel maculato; rostro pedibusque albido-plumbeis, cera rostri flavissima; iride nigra.

Beſchreibung des Eies: (Die zuerſt in der Vogelſtube gelegten Eier waren ſtets reinweiß, wahrſcheinlich weil es den Vögeln an einem Farbſtoff im Futter mangelte). Grundfarbe gelblichweiß mit fahlgelben Flecken, beſonders am ſtumpfen Ende; zuweilen auch ohne Fleckenzeichnung. Geſtalt mehr rund als eiförmig. Länge 15 — 16 mm.; Breite 12 mm.

Ovum: flavente album maculis apicis præsertim obtusi lividis, interdum immaculatum; forma sat rotunda.

Der gelbſtirnige Girlitz [Fringilla flaviventris].

Tafel XI. Vogel 55.

Den nächſten Verwandten des Hartlaubszeiſigs, der von vielen Autoren mit demſelben verwechſelt wird, laſſen doch die beträchtlichere Größe, der breite und lange gelbe Streif über der Stirn und dem Auge hinweg bis zum Hinterkopf und dann die olivengrüne Färbung an Wangen und Bürzel ſicher unterſcheiden. Aber auch im Weſen zeigt er ſich abweichend; er iſt ungleich ruhiger und wird nur in der Niſtzeit etwas, jedoch auch nicht bedeutend lebhaft. Zugleich gehört er zu den beſten Sängern unter dieſen Finken.

Obwol er nicht häufig und gewöhnlich nur einzeln oder parweiſe im Handel erſcheint, ſo iſt er doch den Liebhabern bereits ſeit langer Zeit her wohlbekannt. In dem Bolle'ſchen Verzeichniß wird er als ein ‚falſcher' wilder Kanarienvogel aufgeführt; und wenn auch der lateiniſche Name fälſchlich [Serinus butyraceus, *L.*] lautet, ſo ſpricht doch die Heimatsangabe, Vorgebirge der guten Hoffnung, dafür, daß dieſe Art gemeint iſt. Herr Dr. Bolle beſtätigte mir dies ſodann mündlich. Auch er hat ihn im Laufe der Jahre mehrmals beſeſſen und zählt ihn zu ſeinen Lieblingen.

Zu verſchiedenen Zeiten erhielt ich ihn in einem oder wenigen Köpfen von Hagenbeck oder Jamrach und in neueſter Zeit von Reiche in Alfeld. Sobald die Niſtzeit naht, beginnt das Männchen ſein Weibchen, um welches es ſich bis dahin garnicht gekümmert hat, aus dem Kropfe zu füttern und folgt ihm in Finkenweiſe während des Neſtbaus auf Schritt und Tritt, ohne jedoch ſelber an demſelben theilzunehmen. Das Neſt wurde jedesmal im dichten Gebüſch nicht hoch über der Erde erbaut und bildete eine große offne Mulde, außen von feinen Reiſern, innen aus Faſern, Würzelchen, Wolle geformt und mit Pferdehaaren zierlich ausgerundet. Das Gelege beſteht in vier bis fünf Eiern und die ganze Entwicklung gleicht völlig der des vorhin geſchilderten buttergelben Girlitz oder Hartlaubszeiſig.

Obgleich ich ihn nur freifliegend in der Vogelſtube gezogen und mir keine weiteren Zuchtergebniſſe in der Gefangenſchaft bekannt ſind, ſo bin ich doch davon überzeugt, daß er auch gleicherweiſe im Käfige gut niſtet und überhaupt einer der beſten Heckvögel in der Gefangenſchaft iſt. Freilich muß man es vermeiden, die nächſten Verwandten neben ihm in der Vogelſtube zu halten, denn ſelbſt die viel kleineren, wie Graugirlitz und Hartlaubszeiſig, befehden und verfolgen ihn ſo, daß er nicht zur Brut kommt. Da er aber als Sänger doch viel werthvoller als der letztgenannte iſt, ſo entfernt man denſelben ſicherlich gern, ſobald man in den Beſitz eines Pärchens dieſer Südafrikaner gelangt. Uebrigens iſt er friedlich mit allen anderen kleineren Vögeln und viel mehr harmlos, als die

meisten anderen Finken. Auch zeigt er sich, sobald er eingewöhnt ist, recht ausdauernd, nur kann er Kälte nicht gut ertragen.

Die Heimat erstreckt sich über Südafrika und namentlich ist er im Kaplande häufig, sodaß er zu den gemeinsten Vögeln gehört und nach den Mittheilungen des Herrn Georg Altona vielfach zu Markte gebracht und dort im Käfige gehalten wird. Sein Freileben gleicht dem verwandter Finken; zur Nistzeit parweise und nach derselben in mehr oder minder großen Schwärmen vereinigt, welche umherstreichen und zuweilen in den Getreidefeldern erheblichen Schaden verursachen. Das Nest steht immer niedrig über'm Boden in einem dichten Busch; es gleicht dem unsres Goldammers, nur ist es kleiner; in der Regel enthält es vier bis fünf Eier. Diese Angaben stimmen mit denen des Naturforschers Layard überein. Auf der Insel St. Helena ist er verwildert und von da aus gelangt er hauptsächlich in den Handel.

Es bleibt zu bedauern, daß der angenehme Stubenvogel nicht häufiger bei uns eingeführt wird und daher nur spärlich in unseren Vogelstuben und Käfigen zu finden ist. Der Preis ist verhältnißmäßig gering, 15, 18 bis 30 Mark für das Pärchen.

Der gelbstirnige Girlitz erhielt diesen Namen von mir, weil es bereits einen andern gelbbäuchigen Girlitz giebt, den ich weiterhin schildern werde. (In der zweiten Ausgabe des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist er als südafrikanischer Girlitz aufgeführt). Jamrach nennt ihn Helena-Kanarienvogel und Reiche Berg-Kanarienvogel. Im Handel hat er sich überall als gelbstirniger Girlitz eingebürgert; im übrigen hat man ihn auch Goldbauch (*Br.*) geheißen.

Le Serin à front jaune; Yellow-fronted Siskin or St. Helena seed-eater; St. Helena vink of Kaapsche Kanarie.

Nomenclatur: Loxia flaviventris, *Gml.*; Crithagra flava, *Sws.*; Crithagra flaviventris et flava, *Gr.*; Crithagra flaviventris, *Cb.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Ein breiter Stirnrand, welcher sich beiderseits über den Augen nach den Kopfseiten zieht, hochzitrongelb; Oberkopf, sehr breiter Backenstreif vom Schnabel durchs Auge bis zum Nacken und ein schmaler Bartstreif vom Unterschnabel um die gelbe Unterbacke ebenfalls bis zum Nacken olivengelblichgraugrün, fein schwärzlich schaftstreifig; ganz ebenso der Rücken; Schwingen bräunlichschwarz, an der Grundhälfte schmal gelblichgrün, an der Spitzenhälfte fahlgrau gesäumt, große und kleine Flügeldecken ebenfalls schwarzbraun, breit fahl gesäumt, wodurch zwei Querbinden über den Flügeln gebildet werden; Schwanzfedern grauschwarz mit schmalen grüngelben Außensäumen; ganze Unterseite hochzitrongelb; untere Flügel- und Schwanzseite schwärzlichgrau. Schnabel dunkelhorngrau, Unterschnabel heller, bleifarben; Auge dunkelbraun; Füße dunkelbräunlich hornfarben. Weibchen einfarbig dunkelgrünlichgrau, unterseits etwas heller graugrün, Flügel- und Schwanzfedern bräunlichschwarzgrün. Kanarienvogelgröße. — Das Jugendkleid gleicht, soviel ich mich erinnere, fast völlig dem des alten Weibchens, doch hatte ich es leider versäumt, genaue Aufzeichnungen zu machen.

Fringilla flaviventris: margine frontali lata, utrinsecus supra oculos ad capitis latera extensa, læte citrina; pileo, stria zygomatica amplissima a rostro per oculum usque ad cervicem, altera mystacali a mandibula circa genam inferiorem flavam itidem ad cervicem usque livide virentibus subnigro-striolatis; dorso omnino concolore; pogonio remigum fuscato-nigrorum exteriore anguste flavido-viride, interiore

livide cano-limbato; limbis tectricum al. majorum minorumque nigro-fuscarum latis, lividis, fascias alarum transversas fingentibus duas; rectricibus cineraceo-nigris, exterius anguste virente flavo-limbatis; gastræo toto læte citrino; latere alarum caudæque inferiore nigricante cinereo; rostro obscure corneo; mandibula dilutius plumbea; iride fusca; pedibus e fusco corneis. — ♀ unicolor obscure virente cinerea, subtus subcano-viridis; alis caudaque luride nigro-viridibus.

Juvenis: cum femella adulta fere conveniens.

Beſchreibung des Eies: Grünlichweiß, am ſtumpfen Ende zart roth und braun ringförmig gefleckt. (Sie ändern aber ab, denn in dem erſten Gelege in der Vogelſtube waren ſie weißlichblaugrün, am ſpitzen Ende ſparſam, am dicken reichlich mit dunkelbraunen Punkten und hellbraunen Flecken und Strichelchen gezeichnet). Länge 18 mm.; Breite 14 mm.

Ovum: virente albidum maculis subrubidis fuscisque circa apicem obtusum fingentibus annulum.

Der ſchwefelgelbe Girlitz [Fringilla sulfurata].

Als ein Ebenbild des gelbſtirnigen Girlitz, aber bedeutend größer und kräftiger, faſt einem Gimpel gleich, würde auch dieſe Art eine willkommene Erwerbung für die Vogelſtube ſein. Meines Wiſſens iſt ſie jedoch bis jetzt erſt ein einziges mal lebend eingeführt worden. Ich erhielt zwei Männchen und ein Weibchen von Herrn Chs. Jamrach in London, die noch gerade glücklich in Berlin ankamen, um dann in den nächſten Tagen doch den Reiſeanſtrengungen zu erliegen.

Die Heimat erſtreckt ſich über die Kapländer und in Natal gehört er keineswegs zu den Seltenheiten. Livingſtone ſammelte ihn auch im Oſten und zwar am Sambeſi. Nach Ayres und Layard lebt er in kleinen Flügen und ernährt ſich von allerlei Sämereien. Das Neſt findet man in der Regel im niedrigen Gebüſch, oft nur wenige Zoll über der Erde; es iſt ſehr feſt gebaut, eine offne Mulde und wird alſo mit dem des vorigen übereinſtimmen. Das Gelege bilden gewöhnlich vier Eier. Verreaux ſagt, daß der Geſang angenehm ſei. Ein Preis läßt ſich natürlich nicht feſtſtellen; hoffentlich iſt der Vogel aber gleich anderen Südafrikanern demnächſt mehr im Handel zu erwarten.

Der ſchwefelgelbe Girlitz iſt auch ſonderbarerweiſe Goldkehle (Br.) benannt.

Le Serin sulfureux; Sulphureous Siskin or Sulphureous seed-eater; Groote St. Helena vink.

Nomenclatur: Loxia sulphurata, *L., Gml., Lth., Bchst.*; Coccothraustes sulphuratus, *Vll.*; C. cap. bon. spei, *Brss.*; Crithagra sulphurata, *Sws., Jard.* et *Slb., Gr., Grn., Grll., Lrd.*; Buserinus sulphuratus, *Bp.*; Crithagra sulfurata, *Fnsch.* et *Hrtl.* — Brimstone Grosbeak, *Lath.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb olivengrünlichgelb, jede Feder mit bräunlichem Schaftſtreif; Zügel-, Kopf- und Halsſeiten und Rücken olivengrün; Augenbrauenſtreif bis zum Schlaf, Backenſtreif und Kehle zitrongelb; Flügel braunſchwarz mit zwei gelblicholivengrünen Binden; Bürzel und obere Schwanzdecken lebhaft grüngelb; Schwanzfedern braunſchwarz, ſchmal olivengrünlich geſäumt; Oberbruſt und Seiten olivengrünlichgelb, übrige Unterſeite zitrongelb; Schnabel hellhornbraun, Unterſchnabel noch heller gelblichweiß; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau. (Die Angabe Verreaux', daß beide Geſchlechter gleichgefärbt

seien, dürfte auf einem Irrthum beruhen, denn das Weibchen, welches ich erhalten, war oberhalb düster bräunlichgrün, unterhalb fahlgelblichgrün; Zügelstreif und Kopfseiten nur fahlgrünlichgrau. Der Vogel war leider so zerlumpt und schmutzig, daß ich ihn nicht näher beschreiben konnte, doch habe ich mit Sicherheit sein Geschlecht festgestellt).

Fringilla sulfurata: supra ex olivaceo virens, subfusco striolata; loris, capitis collique lateribus dorsoque olivaceo-viridibus; stria superciliari usque ad tempora, altera zygomatica gulaque citrinis; fasciis duabus alarum nigro-fuscarum ex olivaceo virescentibus; uropygio, supracaudalibus læte viride flavis; rectricibus fusco-nigris, anguste olivaceo-viride limbatis; pectore et hypochondriis subviride olivaceis; gastræo reliquo citrino; rostro dilute fuscato-corneo; mandibula flavido-alba; iride fusca; pedibus fumidis. — ♀ supra sordide fuscato-viridis, subtus luride virescens; stria lororum lateribusque capitis nonnisi virente cinereis.

Länge $15{,}7^{cm.}$; Flügel $8^{cm.}$; Schwanz $5{,}4^{cm.}$

Beschreibung des Eies: Weißlich, grünlich scheinend, am stumpfen Ende mit einem Ringe von dunklen und hellen Purpurflecken besäet. (Layard).

Ovum: virente albidum maculis purpureis obscurioribus et dilutioribus circa apicem obtusum fingentibus annulum.

Der Bartgirlitz [Fringilla barbata].

Dieser Girlitz wurde von Heuglin zahlreich in den Urwäldern und auf einzelnen Bäumen längs der Regenbetten westwärts vom Gazellenfluß bis zum Kosanga beobachtet: „Er lebt meist in Pärchen und Familien und scheint im März zu nisten, indem ich Ende April Junge sah, welche kaum flugfähig waren. Er ist dem buttergelben Girlitz sehr ähnlich, aber sein Scheitel ist gelbgrün, wie der Mantel und mit mehr oder weniger deutlichen schwärzlichen Schaftstrichen, ohne Beimischung von Grau; die Wangen sind gelb, aber die Ohrgegend ist deutlich gelbgrün und der Backenstreif sehr scharf begrenzt schwarz. Das Weibchen ist blasser, oberher mehr olivengelbgrünlich mit schmälerem gelben Stirnband, weißem Kinn und schwärzlicholivenfarbnem Augenbrauenstreif; unter dem Kinn und über den Kropf zieht sich eine aus schwärzlichen Flecken gebildete, theilweise doppelte Querbinde." Finsch und Hartlaub bemerken dazu, daß Heuglin's bärtiger Girlitz mit der grünköpfigen Varietät des Hartlaubsgirlitz übereinstimmt, daß sie jedoch nicht wagen, ihn für unbedingt gleichartig zu erklären, weil die Ohrgegend wie der Oberkopf deutlich olivengrün gefärbt ist, während sie bei dem letztern stets einen graulichen Anflug zeigt. Der Bartgirlitz ist daher noch mehr als ein Miniaturbild des gelbstirnigen Girlitz (F. flaviventris) anzusehen. Bisher ist er erst einmal lebend hergebracht und zwar befindet sich ein Paar im Besitz des Herrn A. F. Wiener in London.

Der Bartgirlitz oder schwarzbärtige Zeisig (Heuglin). — Le Serin à moustaches; Bearded gold-finch. — Crithagra barbata, Serinus sp.; Serinus barbatus, *Hgl.*; Crithagra chrysopyga, *Antn.*; Crithagra sp. nova, *de Flpp.*

Es ist noch eine Anzahl hierher gehörender Finken zu verzeichnen, deren Erscheinen im Handel wir wol über kurz oder lang erwarten dürfen. Sie werden sich wahrscheinlich in der Lebensweise und allen Eigenthümlichkeiten überhaupt von den bis hierher geschilderten nicht wesentlich unterscheiden, und da einerseits nachweislich noch keiner von ihnen eingeführt ist, andrerseits aber manche als selbstständige Arten noch angezweifelt werden, so muß ich es bei ihrer kurzen Beschreibung, bzl. Herzählung bewenden lassen. Hoffentlich wird die Liebhaberei dieselben nach und nach der Wissenschaft zur bestimmenden Vergleichung entgegenbringen, wie dies ja bereits in zahlreichen anderen Fällen geschehen ist.

Der gelbrückige Girlitz [Fringilla flavivertex] „ist eine dem graukehligen Girlitz zunächst stehende Art; sie wurde von Blanford in Tigrié endeckt. Leider fehlt bis jetzt aller Nachweis über die Lebensweise und auch die genaue Angabe der Oertlichkeit. Da mir der Vogel niemals vorgekommen ist, so muß ich schließen, daß er in Abessinien entweder sehr selten oder nur auf gewisse Bezirke des wärmern Ostens beschränkt ist." Heuglin. [Crithagra flavivertex, *Blnfrt.*, *Hgl.*].

Der grüngelbe Girlitz [Fringilla chloropsis]. „Diese neuentdeckte Art schließt sich zunächst dem gelbstirnigen Girlitz an, unterscheidet sich aber durch die mit der Unterseite und der Stirn gleichgefärbten hochgelben Kopfseiten, ohne dunkle Ohrgegend und Bartstreif." (Finsch und Hartlaub). Die Beschreibung ist nach dem einzigen, ziemlich beschädigten Exemplar der Berliner Sammlung, welches durch Baron v. d. Decken aus Ostafrika eingesandt worden und entweder von Mombas oder Sansibar herstammt, gegeben. [Crithagra chloropsis, *Cb.*].

Der schwarzhalfterige Girlitz [Fringilla capistrata] unterscheidet sich von allen Verwandten dadurch, daß der Stirnrand und die Gegend rings um den Schnabel (also die ganze Halfter: Capistrum) schwarz und der erstere gelbgesäumt ist. Nach den Aufzeichnungen der deutschen Expedition nach der Loangoküste fehlt dem Weibchen das Schwarz an den Augen und um den Schnabel, sowie die gelbe Säumung des Stirnbands; die Kopfseiten sind dunkelolivengrün. „Ein Exemplar wurde von Dr. Wellwitsch im Distrikt Golungo Alto (etwa 560 bis 630 Mtr. hoch) in Angola erlegt und dürfte sich jetzt im Besitze des Museum zu Lissabon befinden. Wir erhielten es unter den vom Genannten gesammelten Vögeln, welche uns durch Vermittelung Sclater's zur Bestimmung zugingen." (Finsch und Hartlaub). Die von Dr. Falkenstein mitgebrachten sind im Berliner Museum. [Grithagra capistrata, *Fnsch.*].

Der gestrichelte Girlitz [Fringilla striolata]. Ein Mitglied dieser Vogelfamilie, welches wol niemals besondern Werth für die Liebhaberei gewinnen wird, weil es unscheinbar olivengrünlichbraun, überall fein gestrichelt erscheint und nach

Heuglin's Mittheilungen nicht lebhaft sich zeigt und nur einen unbedeutenden, nicht kräftigen Gesang hören läßt: „Der Vogel bewohnt das östliche und zentrale Abessinien und ist keineswegs selten, von den Abfällen der Bogosländer bis in die Gallaländer; ich habe ihn zwischen 160 bis 3450 Meter über der Meeresfläche angetroffen. Er wandert nicht, hält sich gern an buschigen Höhen, in Hecken und um verlassene Wohnungen, in niedrigem Gesträuch längs der Betten der Waldbäche, seltner auf Felsen und Tennen auf; gegen das Frühjahr hin versammeln sie sich zuweilen in kleinen Flügen." [Pyrrhula striolata, *Rpp.*, *Hgl.*, *Lfbvr.*; Serinus striolatus et Crithagra striolata, *Hgl.*].

Der kurzschnäbelige Girlitz [Fringilla brevirostris]. In der Zeitschrift „Der zoologische Garten" berichtet C. L. Landbeck über Singvögel Chile's und schildert in folgendem diesen dort vorkommenden Girlitz: „Er ist der Vertreter des deutschen Verwandten, sowol hinsichtlich der Gestalt und Färbung, als auch des Gesangs und der Lebensweise. Größe ungefähr des Zeisigs. Oberseite olivenbräunlich und schwarz gestreift, Unterseite zitrongelb, am schönsten an der Kehle, an den Seiten graulich und graugrünlich. Dies liebliche Vögelchen lebt so ziemlich in ganz Chile und ist ungemein zahlreich. Am liebsten bewohnt es getreidereiche Ebenen und Weingärten und ernährt sich von den Körnern des reifenden Getreides, aber auch von den öligen Samen vieler Unkräuter. In großen Scharen kann es in den Feldern bedeutenden Schaden verursachen, wie ich in Valdivia selbst genugsam erfahren habe. Wo aber der Getreidebau großartig betrieben wird, wie in den Zentralprovinzen Chile's, ist der Schaden unbedeutend. Er ist Zugvogel, verläßt zeitig seine Brutplätze und erscheint erst spät wieder. Gewöhnlich wandert er in größeren Gesellschaften und wenn er im Frühjahr ankommt, belebt er eine ganze Gegend mit seinem pieperartigen Gesange. Er steigt singend in die Höhe, fliegt ebenso von einem Baumgipfel zum andern oder läßt sich langsam flatternd auf die Erde nieder. Im wesentlichen ist sein Gesang nur ein mehrfach modulirtes si, si, si und erinnert an den des deutschen Girlitz und die leisen Töne eines Kanarienvogels oder den des Wiesenpiepers; auch sein Lockton, den er beim Auffliegen hören läßt, erinnert an das scharfe hißt der Pieper. Sein ziemlich kunstvolles Nest findet man im Grase. Es enthält fünf bis sechs grünliche, vielfach braungefleckte Eier. Er ist nicht scheu, vielmehr zahm und zutraulich, gewöhnt sich leicht an die Gefangenschaft und singt auch im Käfige fleißig. Eine angenehme Musik entsteht, wenn bald nach ihrer Ankunft einige Hunderte dieser Vögelchen zugleich singen. Es gibt auch gelbe Varietäten und es ist wahrscheinlich, daß er bei völliger Einbürgerung in ähnlicher Weise sich verändern würde, als der Kanarienvogel." Da dieser Girlitz inanbetracht seines häufigen Vorkommens demnächst wol bald auf dem Vogelmarkt zu erwarten ist, so habe ich die obige eingehende Beschreibung hier

angefügt; auch gibt dieselbe den Beweis, daß die Lebensweise aller dieser Verwandten durchaus übereinstimmend ist. [Crithagra brevirostris, *Gld.*; Fringilla arvensis, *Kttl.*; Chirigue der Chilenen].

Der schwarzköpfige Rothgirlitz [Fringilla alario].

Es erscheint verwunderlich, daß von den Finken, welche ziemlich artenreich und in großen Schwärmen Südafrika bewohnen, ungeachtet des regen Verkehrs der Kapstadt mit London, doch immer nur wenige, meistens einzelne Exemplare eingeführt werden, während die dortigen Widafinken und Webervögel mindestens zeitweise zahlreicher anlangen. So haben wir wiederum einen Vogel vor uns, welcher sicherlich schon seit altersher lebend herübergekommen und der trotzdem bis zur Gegenwart stets nur vereinzelt bei den Händlern auftauchte.

Buffon giebt von dem Bouvreuil du Cap de Bonne Espérance weiter nichts als die Beschreibung und bei den übrigen alten Schriftstellern ist auch nicht mehr zu finden. Reichenbach hat den Vogel schon gesehen und sagt, daß er zuweilen lebend herübergebracht werde; Bolle dagegen führt ihn nicht mit auf. Seit der Zeit des erstern dürfte er dann eben gänzlich gefehlt haben, denn zuverlässige Nachrichten über sein Vorkommen im Handel und in der Liebhaberei sind nicht bekannt.

Er ist an Kopf, Kehle und Oberbrust schwarz, an Oberkörper, Flügeldecken und Schwanz braun und an der Unterseite reinweiß. Die Größe stimmt mit der des Graugirlitz überein, doch ist er gedrungner, kräftiger und dickköpfiger.

In seiner Heimat, Südafrika, soll er weitverbreitet und namentlich im Kaplande ziemlich häufig sein. Layard und nach ihm Altona geben an, daß er dort familienweise in den niedrigen dornigen Gebüschen lebe, sich von Gräsersämereien ernähre und mit Prachtfinken, gewellten und grauen Astrilden gemeinschaftlich in größeren Schwärmen sich umhertreibe. Der erstgenannte Forscher bezeichnet seinen Gesang als anhaltend und süß und Beide versichern, daß er dort vielfach gefangen und im Käfige gehalten werde.

Im Jahre 1873 erhielt Chs. Jamrach in London mit gelbbürzeligen Graugirlitzen, Kapkanarien und schwefelgelben Girlitzen zusammen acht Köpfe Rothgirlitze, und diese ganze Gesellschaft gelangte in meinen Besitz. Alle letztere waren jedoch Männchen, dazu auch die meisten von ihnen krank, sodaß sie mir wenig Freude brachten. Da Herr Dr. Franken die eingehendsten Beobachtungen inbetreff ihrer gemacht, so verzeichne ich dieselben hier zunächst.

„Nachdem ich einen solchen ruhigen, eines beschaulichen Daseins sich erfreuenden Vogel längere Zeit besessen, niemals aber einen Ton von ihm gehört hatte, glaubte ich endlich, er sei ein Weibchen und die Angaben der Forscher

über ein andres Kleid desselben seien falsch. Dann aber vernahm ich einige so sanfte, flötenartige Töne, daß ich erstaunt Umschau hielt, ob sich etwa ein Hänfling ins Zimmer verflogen hätte, aber es war mein Maskenfink, und nun begann derselbe einen fast unausgesetzten, d. h. das ganze Jahr hindurch anhaltenden, nicht sehr lauten, aber höchst melodischen Gesang, dessen Töne gleichsam in einem ununterbrochnen Gusse und beinahe sich überstürzend hervorsprudelten. Da ich ein Weibchen seiner Art nicht erlangen konnte, so gesellte ich ihm ein Kanarienweibchen bei, um welches er sich jedoch garnicht bekümmerte. Drei Gelege waren unbefruchtet und erst in der vierten Brut befand sich ein taugliches Ei, welches aber mit der Kralle oder sonstwie verletzt worden, sodaß das Junge nicht auskam. In der nächsten Brut war von drei Eiern wiederum eins tauglich und aus diesem wurde ein stattliches Hähnchen aufgezogen; die noch folgende sechste Brut war abermals erfolglos. Da der glücklich erzielte Mischling wol einzig in seiner Art ist, so gebe ich die genaue Beschreibung des Jugendkleides: Oberkopf, Schläfe und Nacken sind braun mit dunkelen, ins Graue gehenden Längsstrichen; Zügel, Backen, obere Halsseite und Hinterhals sind heller braun mit eben solchen Längsflecken; Mantel und Schultern sind beinahe schwarz, jede Feder mit breiten rostrothen Außensäumen; Schwingen dunkelgrau; Schwanzfedern beinahe schwarz mit rostfarbenen Säumen (die mittelsten am kürzesten, die zweite am längsten), untere Seite heller; obere Schwanzdecken und Bürzel sind hell rostfarbig; die Unterseite von der Kehle ab bis zum hintern Unterleib ebenfalls hell rostfarbig, beinahe weiß; die Unterschwanzdecken ganz hell rostfarben; die Unterflügeldecken rostfarbig ins Graue spielend; Schnabel hornfarben, Unterschnabel heller; Auge grau; Füße bräunlichhornfarben. Nach etwa Dreivierteljahren hat sich der Vogel ausgefärbt. Das Grau ist schwarz geworden; am wesentlichsten hat sich der Mantel verändert, welcher jetzt rostbraun gefärbt ist mit schwärzlichen Längsflecken; auch hat der Vogel ein schwärzliches Band über die Brust bekommen, welches dem des alten Männchens gleicht. Im Gesange war er dem letztern sehr ähnlich, nur im Tone stärker. Als ich aber einen Kanarienwildling erhielt, der den Schlag des gemeinen angenommen, hatte er den letztern ebenfalls sogleich gelernt und läßt ihn seitdem unermüdlich erschallen, abwechselnd mit einem kurzen, rätschenden Schlag, den er, wer weiß wem meiner vielen Vögel abgelauscht oder selber erfunden hat und nun wol zwanzig-, dreißigmal wiederholt. Als Sänger ist er ganz verdorben."

Neuerdings haben auch Fräulein Hagenbeck und C. Gudera den Rothgirlitz eingeführt, immer jedoch nur einzeln und das Weibchen ist bisher meines Wissens erst zweimal vorhanden gewesen und stets bald gestorben. Nach der Eingewöhnung zeigt sich der Vogel jedoch durchaus nicht weichlich. Er ist gegen Prachtfinken u. a. friedlich und harmlos, von den Verwandten aber, auch vom

Graugirlitz, wird er zur Brutzeit befehdet und verfolgt. Preis 15 bis 24 Mark für ein Männchen oder für das Pärchen.

Der schwarzköpfige Rothgirlitz, gewöhnlich Maskenfink genannt, heißt auch Alario, Bergkanarienvogel, Langflügler und Rost- oder Maskengimpel.

Le Pinson Alario; Alario-Finch or Alario Sparrow. (Brzn. d. zool. Grt. v. London).

Nomenclatur: Fringilla Alario, *L.*, *Gml.*, *Lth.*; Fringilla personata, *Lchtst.*; Crithagra bistrigata et ruficauda, *Sws.*; Alario personatus, *Rchb.*; Crithologus Alario, *Ch.*, *Br.*; Spermophila Daubentoni, *Gr.* [Passerculus cap. bon. sp., *Brss.*; Bouvreuil du Cap de Bonne Espérence, *Buff.*; Cape-Sparrow, *Albin*; Orange-Grosbeak, *Lath.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Kehle und Oberbrust schwarz; Oberkörper nebst Flügeldecken und Schwanz braun; Schwingen schwarzbraun mit schmalen, fahlen Spitzensäumen; Hals- und Brustseiten weiß, der ganze übrige Unterkörper bräunlichweiß. Auge schwarz; Schnabel horngrau; Füße wenig dunkler horngrau. Weibchen: oberhalb fahlgrau, sehr fein dunkel gestreift; Flügel bräunlichgrau mit zwei gelbbraunen Binden; Bürzel bräunlichgrau; Schwanz braun, schwarz gesäumt; ganzer Unterkörper fahl hellgelb. Auge, Schnabel und Füße wie beim Männchen.

Fringilla alario*): capite, gula pectoreque nigris; notæo cum alarum tectricibus caudaque fusco; apicibus remigum nigrofuscorum anguste luride limbatis; lateribus colli pectorisque albis; gastræo reliquo subfusco-albo; iride nigra; rostro corneo; pedibus obscure corneo. — ♀ supra luride cinerea, subtilissime obscure striolata; fasciis duabus alarum subfusco-cinerescentium fulvis; uropygio e fusco cinereo; cauda fusca, nigro-limbata; gastræo toto luride griseo; iride, rostro pedibusque utut ♂.

Länge $11{,}5^{cm.}$; Flügel $6{,}9^{cm.}$; Schwanz $4{,}3^{cm.}$

Der Totta-Girlitz [Fringilla totta].

Zu den Vögeln, welche die in letztrer Zeit überaus lebendig erwachte Liebhaberei und bezüglich der in gleichem Maße sich entwickelnde Handel uns zugeführt haben, gehört auch dieser Girlitz. Herr W. Mieth in Berlin ließ sich zur „Aegintha"-Ausstellung des Jahres 1876 von Chs. Jamrach aus London einige neu und selten eingeführte Vögel schicken. Unter denselben waren natürlich wie immer die unvermeidlichen ‚wilden Kanarienvögel' und zwar diesmal in zwei Arten: ein Paar graukehlige Girlitze und ein solches von einer bisher wol noch niemals lebend in den Handel gelangten Art. Von der letztern starb leider das Weibchen und das Männchen wurde als Totta-Girlitz festgestellt. Es erhielt auf der erwähnten Ausstellung einen ersten Preis. Von den bisher beschriebenen Girlitzen unterscheidet sich dieser sogleich dadurch, daß er an der ganzen oberen Seite bemerkbar braun erscheint, während er im übrigen den grüngefärbten unter ihnen sehr ähnlich ist; auch dürfte dies in hinsicht der Lebensweise durchaus der Fall sein. Seine Heimat ist Südafrika, und besonders soll er im Kaplande häufig vorkommen. Ueber sein Freileben ist garnichts bekannt, und Layard sagt von

*) Von alarius = Flügelmann gebildet. Sollte das Wort, von Linné Syst. nat. Nr. IX eingeführt, überhaupt nicht ein Druckfehler sein? statt —ia in —io verdorben?

ihm nur, ebenſo wie bei faſt allen anderen verwandten Finken, welche dort heimiſch ſind, daß man Miſchlinge von ihnen mit Kanarienweibchen ziehe. Hoffen wir, daß er demnächſt zahlreicher zu uns gelange.

Der Totta-Girlitz iſt auch kurzweg Totta benannt. — Le Serin Totta; Totta-Siskin; Pietje Kanarie (holländiſche Anſiedler).

Nomenclatur: Loxia totta, *Gml.*; Fringilla totta, *Sprm.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberkopf olivengrünlich fahlbraun; Kopf- und Halsſeiten olivengrünlichbraun; Rücken und übrige Oberſeite ſchwach dunkelgrünlichbraun; Schwingen ſchwarzbraun, fein weiß geſäumt und geſpitzt, innen breit weiß gerandet; obere Schwanzdecken hellgrünlichgelb; Schwanzfedern ſchwarzbraun, die beiden mittleren reinweiß, die anderen an der Innenfahne breit weiß geſpitzt; von der Kehle bis zur Oberbruſt fahl gelbgrünlichbraun, dunkelbraun geſtrichelt; Bruſt und Bauch hell olivengrünlichgelb; Seiten, untere Flügel- und Schwanzdecken fahl bräunlichgrau. Schnabel dunkelbraun, Unterſchnabel heller; Auge braun; Füße dunkelbraun. Weibchen oberhalb fahler graubraun und unterhalb düſterer graugrünlichgelb. Nahezu Kanarienvogelgröße.

Fringilla totta: pileo olivascente fusco; lateribus capitis collique magis virentibus dorso et notæo reliquo obscurius viride fuscis; remigibus nigro-fuscis, subtiliter albido-limbatis et terminatis, interius late albo-marginatis; supracaudalibus læte virente flavis; retricibus nigro-fuscis, mediis ambabus albissimis, pogonio reliquarum interno late albo-terminato; gula juguloque luride virente fuscis, obscure fusco-striolatis; pectore abdomineque læte olivaceo-virescentibus; hypochondriis, tectricibus al. inferioribus et infracaudalibus fuscato-cinereis; rostro fusco. — ♀ supra sordidius griseo-fusca; subtus e cinereo-virente flava.

* * *

Unter der deutſchen Bezeichnung **Zeiſige** reihe ich die Geſchlechter Zeiſig [Chrysomitris, *Boie*], Zitronfink [Citrinella, *Bp.*] und Grünfink [Ligurinus, *Kch.*] aneinander. In ihrem Freileben weichen ſie wenig von den Girlitzen ab, übertreffen ſie auch nicht in der Größe und dürfen ebenfalls als anmuthige Stubengenoſſen gelten. Sie ſind in Europa, Aſien und Amerika heimiſch und namentlich der letztere Welttheil hat überaus viele hierher gehörende Arten aufzuweiſen, die jedoch bis jetzt erſt in geringer Anzahl der Liebhaberei zugänglich ſind.

Der ſchwarzköpfige Zeiſig [Fringilla cucullata].

Unter den Erwerbungen, welche die Liebhaberei in der letztern Zeit gemacht, ſteht dies reizende Vögelchen hoch obenan, denn es zeichnet ſich ſowol durch Schönheit, Anmuth und Liebenswürdigkeit, als auch durch lieblichen Geſang und leichtes Niſten in der Gefangenſchaft vor allen ſeinen Verwandten rühmlich aus. Obwol erſt ſeit wenigen Jahren und leider auch nur ſelten eingeführt, hat es doch bereits in der Vogelſtube des Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau und dann auch in der meinigen geniſtet und ſeine Jungen glücklich aufgezogen. Es iſt ein ſchöner Zeiſig, nur von der Größe der Aſtrilde, mit ſchwarzem Kopf, dunkelrothem Mantel, breiter, rother und weißer Binde über dem ſchwarzen Flügel und feuerrothem Unterkörper. Sein Weibchen iſt ſchlicht aſchgrau, röthlich überflogen und mit röthlich-weißer Binde auf dem Flügel. Vor einigen Jahren wurde er zuerſt von Karl Hagenbeck unter der Bezeichnung ‚kleines weſtindiſches Kardinälchen‘

in den Handel gebracht und seitdem erscheint er bei Chr. Hagenbeck, Jamrach, Bekemans u. A. immer einzeln oder parweise.

Herr Heer berichtet über die Züchtung in folgender Weise: „Das Weibchen hatte nur zwei Eier gelegt, aber beide ausgebrütet und beide waren schon glücklich ausgeflogen, als das eine, bereits als Männchen zu erkennen, durch einen unglücklichen Zufall ums Leben kam. Das andre Junge, ein Weibchen, fliegt munter in der Vogelstube umher und ist fast ebenso groß und stark als die Alten. Die schwarzköpfigen Zeisige hatten ein Par Zebrafinken aus einem Nistkäfige getrieben, auf die in deren Nest befindlichen fünf Eier ein neues Nest gebaut und dann die beiden Jungen erbrütet. Ich fand dies, nachdem die Jungen ausgeflogen waren, bei Besichtigung des Nestes."

Das Pärchen lebt in gleicher Weise wie die Verwandten das ganze Jahr hindurch in einem erkennbaren ehelichen Verhältniß, sodaß die Gatten, sich anscheinend zwar nicht viel um einander bekümmernd, doch immer in der Nähe beisammen weilen. Gegen die Nistzeit hin, in meiner Vogelstube im Juli, begann das Männchen größere Zärtlichkeit zu zeigen, indem es das Weibchen aus dem Kropfe fütterte und ihm immer unmittelbar folgte. Letztres trug dann in ein offnes Nistkästchen, welches tief in der Krone, die in der Mitte der Vogelstube angebracht ist, hing, Gräserrispen, Fäden und Halme zusammen und formte hauptsächlich aus Baumwolle, Leinenfasern und Kuhhaaren eine runde, flache Mulde. Das Gelege bestand einmal in drei und das zweitemal in vier Eiern. In der ersten Brut brachten sie aber nur zwei Junge und in der zweiten nur ein solches auf. Diese Züchtungen dürften bis jetzt die einzigen sein, welche man erzielt hat, da der Vogel ja erst in wenigen Sammlungen vorhanden ist. Ein Pärchen, Männchen und Weibchen, der von mir gezüchteten schwarzköpfigen Zeisige im Jugendkleide befinden sich im zoologischen Museum in Berlin. Zu meiner großen Ueberraschung sah ich auf der Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht im Jahre 1877 einen Bastard vom Männchen des schwarzköpfigen Zeisigs und Kanarienvogelweibchen, welchen Herr G. A. H. Staude in Eimsbüttel zufällig gezüchtet hatte, indem in seiner Vogelstube ein Pärchen der erstern Art mit Kanarien zusammengehalten worden. Der überaus schöne Mischling, welcher mit dem ersten Preise ausgezeichnet wurde, liefert wiederum einen Beweis dafür, daß alle Finken dieser Gruppe zur Mischlingszucht mit Kanarien sich geeignet zeigen, wie dies ja die Reisenden, so namentlich Layard, von den südafrikanischen Arten auch regelmäßig angeben.

Die Heimat des schwarzköpfigen Zeisigs ist das nordwestliche Südamerika; sie dürfte sich auf Neugranada, Venezuela und einige Inseln Westindiens beschränken. Der Reisende Gundlach hat nachgewiesen, daß er auf Kuba nicht vorkommt, während dies andere Naturforscher früher behauptet. „Eine so auffallende schöne Vogelart", sagt er, „würde von den Einwohnern doch wol be-

merkt ſein, während ich keine Angabe gefunden, daß ſie beobachtet worden." Er erachtet daher die dort im Freien geſehenen für Exemplare, welche aus Käfigen entflogen ſind, da dieſer Zeiſig auf der Inſel als Singvogel gehalten und zur Züchtung von Kanarienbaſtarden benutzt wird. — Ueber das Freileben iſt ſonſt nichts bekannt.

Zu den rühmenswerthen Eigenſchaften dieſes Bewohners unſerer Käfige und Vogelſtuben gehört auch noch die, daß er harmlos und friedlich und obwol ſehr zart, dennoch nicht weichlich iſt, ſondern nach der Eingewöhnung vortrefflich ausdauernd ſich zeigt; Kälte kann er freilich nicht ertragen. Der Geſang iſt angenehm, dem unſres Zeiſigs ähnlich, doch beiweitem wechſelreicher und melodiſcher und ohne das ſog. Krähen. Der Preis ſchwankt bedeutend und beträgt 36, 45 bis 75 Mark für das Pärchen. Auf der erwähnten Ausſtellung in Hamburg hatte Fräulein Hagenbeck zum erſtenmal mehrere Pärchen beiſammen.

Der ſchwarzköpfige Zeiſig heißt bei Br. Kapuzenzeiſig; bei den Händlern wird er auch noch jetzt gewöhnlich weſtindiſches oder kleines rothes Kardinälchen genannt.

Le Serin à tête noire; Red black-headed Gold-finch; Zwartkop Sijsje.

Nomenclatur: Carduelis cucullatus, *Swns.;* Pyrrhomitris cucullata, *Bp., Gr.* [Fringilla Cubae, *Grv*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Kopf, Kehle, Hals bis zur Oberbruſt ſchwarz, ein breites Nackenband hellroth; Rücken, Schultern und Mantel bräunlichroth, jede Feder mit ſchwärzlicher Mitte; Schwingen und Flügeldecken ſchwarz mit breiter hellrother und vorn weißlicher Querbinde; Schwanz ſchwarz; Bürzel, Oberſchwanzdecken, Bruſt und ganze Unterſeite dunkelfeuerroth. Schnabel ſchwärzlichhorngrau; Auge bernſteinbraun; Füße braun. Weibchen: Kopf und Kehle ſchwärzlichgrau, braunroth überflogen; Rücken, Mantel und Schultern heller bräunlichgrau; Flügel bräunlichgrau mit ſchmaler weißlichorangerother Querbinde; Bürzel düſter gelbroth; ganzer Unterkörper aſchgrau, gelbroth überflogen, hier und da mit einzelnen feuerrothen Federchen. — Jugendkleid dem des alten Weibchens im weſentlichen gleich, doch iſt das junge Männchen an Bruſt, Flügeln und Oberſchwanzdecken bereits lebhaft feuerroth gefärbt. — (Junges Männchen aus meiner Vogelſtube; aufgeſtellt im Berliner zoologiſchen Muſeum: Oberkopf und Mantel dunkelaſchgrau, Rücken heller grau; Flügel ſchwarz, mit den lebhaft rothen Zeichnungen des alten Männchens; Bürzel weißlichgrau; Oberſchwanzdecken grau mit rothen Spitzen; Schwanz ſchwärzlich, unterſeits aſchgrau; Backen, Halsſeiten, Kehle fahl aſchgrau; Bruſt weißlichgrau; jede Feder breit roth geſpitzt; Bauch und untere Schwanzdecken reinweiß; Schnabel horngrau, Spitze heller; Auge ſchwarz; Füße grau. — Weibchen, ebenfalls im Muſeum: Ganze Oberſeite dunkelaſchgrau; Schwingen fein und Flügeldecken breit fahlgelblichweiß endgeſäumt; über die Flügel eine breite weißliche Zickzackbinde [ein recht kräftiges junges Weibchen in der Vogelſtube zeigte die großen Flügeldecken röthlich endgeſäumt]; Kehle weißlichgrau; ganze Unterſeite fahlbräunlichgrau; Schwanz ſchwärzlichgrau, unterſeits aſchgrau, ebenſo die untre Flügelſeite; in allem übrigen gleicht es dem jungen Männchen. — Bei der Verfärbung des Mnchs. überfliegt das Roth gleichſam den ganzen Körper in einzelnen zerſtreuten Flecken; ebenſo kommen einzelne ſchwarze Federn an Stirn und Kehle hervor).

Fringilla cucullata: capite, gula juguloquè nigris; fascia lata cervicali dilute rubra; dorso, humeris et interscapilio rubiginosis, nigricante striolatis; fascia lata remiges alarumque tectrices læte rubra transeunte, ante albida; cauda nigra; uropygio, supracaudalibus, pectore et gastræo toto obscure igneis; rostro nigrescente corneo; iride ferruginosa; pedibus fuscis. — ♀: capite gulaque nigricante cinereis, badio imbutis; dorso, humeris et interscapilio fuscato-canis; fascia

angusta alas subfusco-cinereas aurantio-rubra transeunte; uropygio sordide rufo; gastræo toto cinereo-rufescente afflato, passim igneo-maculato.

Juvenis: prorsus ♀ adultæ concolor; attamen ♂ juv. alis, uropygio pectoreque jam læte igneo-pictis.

Beschreibung des Eies: Gestalt eiförmig; Farbe zart bläulich- oder grünlichweiß, fein rothbraun gepunktet. Länge 14mm., Breite 11mm.

Ovum: oviforme, pallide coerulescente vel virente albidum, subtiliter rufo-punctatum.

Der Trauerzeisig [Fringilla tristis].

Tafel XI. Vogel 57.

In Hinsicht der Farbenschönheit, des Gesangs und anmuthigen Wesens zugleich dürfen wir die amerikanischen Zeisige als eine überaus werthvolle Bereicherung unserer Liebhaberei ansehen. Ein Vögelchen, wie der vorhin geschilderte schwarzköpfige Zeisig ist in allen seinen Eigenthümlichkeiten als ein wahres Juwel der Stubenvogelliebhaberei zu betrachten und es bleibt eben nur zu wünschen, daß er häufiger eingeführt werde. Im Gegensatz zu ihm gelangt der Trauerzeisig alljährlich regelmäßig in beträchtlicher Anzahl in den Handel, und während wir diesen letztern gleicherweise um seines Farbenschmucks und hübschen Gefieders willen schätzen, müssen wir wiederum bedauern, daß er, wenigstens anscheinend, zu den weichlichsten Stubenvögeln gehört, und daß es bis jetzt noch nicht gelungen ist, ihn mit Sicherheit für die Dauer im Käfige zu erhalten. Unter allen fremdländischen Zeisigen steht er sodann in einer Beziehung hoch obenan, darin nämlich, daß wir über sein Freileben nach allen Seiten hin unterrichtet sind, sodaß also eine Schilderung desselben uns einen Einblick in das der übrigen gewähren kann.

Er ist goldgelb mit schwarzer Stirn, schwarzen, weißgebänderten Flügeln und schwarzem Schwanze. Das Weibchen ist düster gelb, ohne schwarze Stirn; ein ebensolches Winterkleid trägt das Männchen. Die Größe ist der des Stieglitz oder Distelfinks gleich, welchem er auch in der Gestalt ähnelt. Seine Heimat erstreckt sich über den größten Theil Nordamerikas, besonders über die mittleren und westlichen Staaten. Als Zugvogel wandert er zum Winter bis ins heiße Amerika, bleibt aber auch scharenweise in Texas oder Mexiko; nach Dr. Richardson lebt er in den Pelzthiergegenden des Nordens nur drei Monate und verschwindet im September bereits wieder.

Den alten Schriftstellern war dieser Vogel sehr bekannt und sie gaben bereits zahlreiche Abbildungen von ihm; so Edwards, Seeligmann, Buffon, Vieillot u. A. Auch wußten sie schon, daß er zu denen gehört, welche im Sommer und Winter verschiedene Kleider tragen. Edwards hatte seinen Kupferstich nach einem Pärchen herstellen lassen, welches aus Newyork lebend herübergebracht worden und von dem das Weibchen in der Gefangenschaft ein Ei gelegt. Catesby, dessen Ab-

bildung freilich kaum erkennbar ist, bemerkt bereits, daß er in Newyork häufig im Käfige gehalten werde. Bechstein fügt nichts besonders bemerkenswerthes hinzu. Er sagt nur, daß er in seinem Vaterlande wie in Europa vielfach einzeln gehalten werde und dies ist in der That ganz richtig, denn früher wurden von vielen Vögeln nur die prächtigen Männchen allein eingeführt und die unscheinbaren Weibchen zurückgelassen — bis man nämlich dazu gelangte, Züchtungsversuche anzustellen; seitdem sind die letzteren ebenso gesucht als die ersteren. In Bolle's Verzeichniß ist er mit aufgeführt, doch klagt der Forscher darüber, daß er zu seiner Zeit kaum noch nach Deutschland komme, ebenso wie der Granatfink, die Königswitwe u. a., welche zu Bechstein's Zeit sämmtlich bekannt genug waren.

Audubon fand auch in den Lauten eine eigenthümliche Aehnlichkeit zwischen ihm und dem europäischen Stiglitz heraus. Als ich in England und Frankreich weilte, erzählt er, machte es mir oft Vergnügen, wenn ich den Stiglitz hörte, denn ich glaubte im ersten Augenblick immer, daß es unser Trauerzeisig sei; als ich dann aber nach Amerika zurückgekehrt war, erinnerte mich derselbe wiederum oft an Europa. Auch Wilson und Prinz Max v. Wied erachten ihn im Wesen wie in der Lebensweise als dem Distelfink nahestehend; letzterer nennt ihn gelber Stiglitz und sagt, daß er gleich jenem sich an die Disteln und ähnliche Gewächse hänge und denselben kleinen und bogigen Flug habe.

Herr H. Nehrling, in Oak Park in Illinois, schildert den Vogel sodann in folgender Weise: „Von allen unseren Finken fällt er durch seine vorherrschend gelbe Färbung und durch sein muntres, rastloses Wesen, sowie auch durch sein häufiges Vorkommen am meisten auf. Unsere Deutschen bezeichnen ihn stets als wilden Kanarienvogel. Aber nur die gelbe Farbe läßt ihn der gelben gezähmten Kanarienrasse als verwandt erscheinen; im Betragen und in der Lebensweise gleicht er vielmehr dem deutschen Stiglitz, weshalb man ihm auch eine Anzahl entsprechender Benennungen beigelegt hat. Den Amerikanern ist er unter dem nichtssagenden Namen Gelbvogel allgemein bekannt. Fast allerorts ist er ein sehr häufig zu findender Vogel. Ich wüßte außer dem Gesellschaftsfink (Fringilla socialis, *Bonap.*) nicht eine einzige hiesige Finkenart, die ebenso zahlreich wäre, als der Goldfink an geeigneten Oertlichkeiten. Da es bei seiner Verbreitung sehr viel auf die örtlichen Verhältnisse ankommt, so tritt er eben nicht allerwärts in gleicher Häufigkeit auf. Zu seinem Wohngebiete wählt er Gegenden, welche reich an Baumpflanzungen sind und in denen besonders seine Lieblingsnahrung, der Distelsamen reift. Das Innere der Wälder meidet er und höchstens am Saume derselben siedelt er sich an. In dem an Baumpflanzungen, Gebüsch und Disteln so reichen Wiskonsin kommt er in viel größerer Anzahl vor, als in dem holzarmen Prärieland von Nord-Illinois.

Das kleine Nest wird in der Regel in ein schlankes, junges Bäumchen zwischen eine Astgabel gebaut. Sehr gern legt er dasselbe auch in Gärten auf Pflaumen- und Apfelbäumen an. Es ist ein niedlicher, schön geformter und künstlicher Bau, außen von Bastfasern, feinen Hälmchen u. a. zarten Stoffen errichtet und innen mit Distelwolle glatt und weich ausgepolstert; in Ermangelung derer wird es auch mit feinen Bastfäden ausgelegt. Gewöhnlich ist es so versteckt angebracht, daß man es nur schwer aufzufinden vermag; von unten kann man es fast niemals sehen, da es ganz im Laubwerk verborgen steht und meistens wird es erst bemerkt, wenn sich der Baum entblättert hat. Vier bis fünf Eier bilden das Gelege.

Unser Vogel fesselt den Beobachter nicht allein durch seine schöne Färbung und hübsche Gestalt, sondern noch mehr durch sein anmuthiges, lebhaftes Wesen. Wenn er an einer Distel, oft den Kopf nach unten, die Füße nach oben gekehrt, herumklettert und sich bemüht, die Samenkörner aus den Distelköpfen herauszupicken oder wenn er an Hanf- und Salatstengeln in gleicher Weise thätig ist, so muß man seine Geschicklichkeit bewundern. Ebenso gewandt zeigt er sich im Gebüsch und auf Bäumen; keinen Augenblick ist er ruhig, immer in Bewegung. Zur Erde kommt er nur selten herab und benimmt sich dort ziemlich ungeschickt.

Sein Gesang gehört jedenfalls zu den besten unter allen hiesigen Finkenvögeln. Da ich den verwandter deutscher Sänger nicht kenne, so enthalte ich mich einer vergleichenden Beurtheilung desselben. Der Lockton ist ein wohlklingendes, langgezognes ziri, ziri; im übrigen vernimmt man auch Laute wie zivitt, zivitt und im Fluge ertönt in der Regel ein ziemlich laut schallendes zififfififf. Der Flug geschieht in hüpfenden Wellenlinien.

Im Spätherbst scharen sich die Trauerzeisige zu kleinen Flügen zusammen und wandern südlich oder wenn der Winter mild ist, verbleiben sie auch in der Gegend und streifen nur in geringen Entfernungen umher. Man hat sie hier sehr häufig im Käfige, den meisten Liebhabern aber gelingt es nicht, sie länger als höchstens ein halbes Jahr zu erhalten. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Der Fang ist sehr leicht und stets ergiebig. In der Regel wird er mit Fallkäfigen ausgeführt, in welchen sich ein Lockvogel befindet."

Zur Ergänzung füge ich aus den „Lebensbeschreibungen der Vögel Ostpennsylvaniens" von Thomas G. Gentry*) noch Folgendes hinzu: „Der Trauerzeisig ist im östlichen Theile jenes Staats während der Wintermonate ziemlich häufig; stellenweise lebt er jedoch auch als Standvogel. Gegen den Herbst hin sieht man ziemlich große Scharen und ebenso im zeitigen Frühjahr. Den Winter hindurch schweifen kleinere Flüge umher und bei Nahrungs-

*) „Life-Histories of the Birds of Eastern Pennsylvania" (Philadelphia 1876).

mangel suchen sie die Nähe menschlicher Wohnungen auf, wo sie sich unter die Schneevögel (Fringilla hiemalis, *L.*) und Sperlinge mischen, sehr zahm und zutraulich werden und gleich den Fichtenzeisigen ihr Leben mit Küchenabfällen fristen, nebenbei aber alle dürren Pflanzen nach den noch daran haftenden Samen emsig absuchen. Ihre Nahrung besteht in allerlei Baum-, Kräuter- und Gräsersämereien, auch in Kerbthieren; so lesen sie von den Blüten der rothen Akazien, Aepfel, Kirschen u. a. die darin hausenden kleinen Insekten eifrig ab und auf frisch bestellten Beeten sieht man sie nicht minder hinter allerlei kleinem Gewürm her. Dann bereiten sie dem Gärtner freilich auch großen Verdruß, denn sie verzehren ebenso massenweise seine Salat- und anderen Gemüsesamen, indem sie dieselben von den Beeten sammeln und sich nur schwierig verscheuchen lassen. Noch mehr als zum eignen Unterhalt bedürfen sie der Kerbthiere zum auffüttern der Jungen und durch die bedeutende Vertilgung derselben ersetzen sie den Schaden also reichlich.

Im Monat April vertheilen sich die Scharen in einzelne Pärchen und die Werbung und das Liebesspiel der Männchen gewährt ein reizendes Bild. Der dann am schönsten erschallende Gesang derselben ist laut, klar und wechselreich, dem des Kanarienvogels einigermaßen ähnlich. Im östlichen Pennsylvanien brüten sie nur einmal im Jahre. Die Zeit des Nistens fällt je nach der Witterung etwas unregelmäßig; manchmal beginnt sie in der Mitte des Monats Mai, gewöhnlich aber zwischen dem 10. bis 15. Juni; doch habe ich auch noch am 12. Juli ein Nest mit Eiern und in der letzten Woche des Monats August ein solches mit Jungen gefunden. Diese letzteren Verzögerungen sind immer nur Folgen der Zerstörung der ersten Brut. In der Regel steht das Nest auf einem Ahorn- oder Birnbaum, in der Höhe von nahezu fünf Metern. Es ist von regelmäßiger Gestalt, aus allerlei Pflanzenfasern, Rispen und Halmen geschickt und zierlich gewebt, und zwischen gabelförmigen Zweigen befestigt, bildet es eine offne Halbkugel von etwa 5 Centimeter Weite und Tiefe. Zum Bau desselben brauchen die Vögel ungefähr sechs Tage. Das Gelege besteht gewöhnlich in fünf Eiern, von denen täglich eins gelegt wird, und die Brutdauer währt 14 Tage. Wie bei den Verwandten erbaut das Weibchen fast allein das Nest und brütet ebenso, während das Männchen in der Nähe weilt und unermüdlich sein Lied erschallen läßt. Wenn ein Feind naht, so wird er von beiden Vögelchen in eifriger und tapfrer Weise mit Geschrei angegriffen und wenn möglich verscheucht. Die Jungen sind sehr frühe reif und werden auch nur kurze Zeit von den Alten gefüttert, doch bleibt die Familie beisammen und schwärmt so noch im September und Oktober nahrungsuchend umher.

In der Gefangenschaft zeigt sich der Trauerzeisig sehr zutraulich und gelehrig; er wetteifert an Gesangsfertigkeit mit dem Kanarienvogel. Einer meiner

Freunde besaß ein Männchen, welches er dem Nest entnommen, aufgefüttert und so abgerichtet hatte, daß es seinen Gesang nach den Bewegungen des Zeigefingers veränderte und modulirte; beim Erheben desselben also anschwellen, beim Senken sinken ließ und je nach den Seitenbewegungen ausdehnte oder abbrach."

Herr H. C. Hahn in Wiandotte (Michigan) rühmt den Gesang als angenehm, wenn auch leise vorgetragen, an den des europäischen Stiglitz und Zeisig erinnernd. Nach den Angaben der deutschen Händler, welche den Goldzeisig in seinem Vaterlande kennen gelernt haben, ist er dort als Stubenvogel recht beliebt; dasselbe würde noch in höherm Maße und auch bei uns der Fall sein, wenn seine Erhaltung nicht, wie schon Herr Nehrling bemerkt, bereits dort und erstrecht bei uns so große Schwierigkeit verursachte. Von den vielen Köpfen, namentlich Männchen, welche alljährlich zu uns in den Handel gelangen und die ihres hübschen Aussehens halber stets gern gekauft werden, stirbt beiweitem die Mehrzahl in überaus kurzer Zeit. Die Liebhaber stellten daher vielfache Versuche an, um seine Ausdauer zu ermöglichen; doch darf man leider bis jetzt nicht sagen, daß dieselbe mit Erfolg erreicht sei. In einer Vogelstube, welche von verschiedenartigem kleinen Gefieder bewohnt ist und deren Futterkästen naturgemäß große Mannigfaltigkeit bieten müssen, scheint er für die Dauer nicht am Leben zu bleiben. Man hat ihm also entsprechende Sämereien im einzelnen gegeben und da dürfte er bei bloßem blauen Mohn, abwechselnd mit geringer Zugabe von Distelsamen, weißer Hirse und wenig frischen Ameisenpuppen oder Fliegen, Mücken, Motten u. a. fliegenden Kerbthieren und deren Larven und Puppen noch am besten sich erhalten. Zu weiteren Versuchen sei hiermit dringend angeregt, denn dieser Zeisig kann sowol als Sänger, wie auch als Schmuckvogel einen hohen Werth erlangen, wenn wir seine Erhaltung sicher ermöglichen. Daß dies Ziel wahrscheinlich sogar nahe liegt, findet in der Thatsache Begründung, daß einzelne sich vortrefflich eingewöhnen und dann jahrelang frisch und munter am Leben bleiben. Noch mehr bewiesen wird es aber dadurch, daß Herr Hauptmann Bödicker in Stettin vom Trauerzeisigmännchen mit einem Kanarienweibchen Mischlinge erzielte. Er schildert dieselben in folgendem:

„Diese Bruten sind außerordentlich interessant, besonders durch den ungemeinen Liebreiz, welchen das herrliche Vögelchen während der Nistzeit entfaltet. Stundenlang sitzt es mit halb herabhängenden Flügeln vor dem Nest des brütenden Weibchens und unterhält dieses mit leisem Gezwitscher der zartesten und einschmeichelndsten Töne, dabei den blaßrothen Schnabel soweit vorstreckend, daß es den des Weibchens fast berührt. Mit dieser Unterhaltung glaubt es allerdings seine volle Schuldigkeit gethan zu haben, denn weder das Weibchen, noch die Brut versorgt es mit Nahrung. In zwei Gehecken wurden sieben Junge aufgezogen, während das Weibchen jetzt abermals auf vier Eiern brütet. Fast alle

dieſe Baſtarde gleichen in der Geſtalt dem Kanarienvogel, in der Farbe und Zeichnung dem Trauerzeiſig im Winterkleide, bei einigen nur mit geringen gelben Abzeichen auf der Platte. Sehr geſpannt bin ich, in welcher Weiſe ſie ſich weiterhin verfärben; arten ſie mehr nach dem Männchen, ſo dürften es prachtvolle Vögel werden."

Leider vermag ich näheres über dieſe höchſt intereſſanten Vögel nicht mitzutheilen. Ich erhielt ein Pärchen derſelben, doch ſtarben beide vor der Verfärbung. Herr Bödicker hat ſie ſpäterhin ſämmtlich fortgegeben, und ich habe nicht mehr erfahren können, was aus ihnen geworden iſt. Die Miſchlingszucht hat aber den Beweis geliefert, daß die Art ſicherlich für die Dauer in der Gefangenſchaft zu erhalten und züchtbar iſt. Weiterhin in den Abſchnitten über die Verpflegung und Zucht der Stubenvögel werde ich alle Erfahrungen inbetreff der Fütterung des Trauerzeiſigs überſichtlich zuſammenfaſſen. Vorläufig ſei nur noch die Aufforderung zu eifrigen und aufmerkſamen Verſuchen mit ihm wiederholt.

Herr Reiche in Alfeld führt ihn alljährlich in den Frühſommermonaten in beträchtlicher Anzahl ein und zwar zum Dutzendpreiſe von 84 Mark, das einzelne Par für 10 Mark, das Männchen für 6—7 Mark und das Weibchen für 3—4 Mark, je nach der Anzahl der vorhandenen. In den Vogelhandlungen koſtet das Prch. 15—18 Mark.

Der Trauerzeiſig heißt auch amerikaniſcher Zeiſig, amerikaniſche Stiglitz oder Diſtelfink, Golddiſtelfink, Goldfink, Goldzeiſig und Goldſtiglitz (Br.); gelber Stiglitz (Buff., Prz. Wd.).

Le Serin d'or, Chardonneret triste; American Goldfinch, Yellow Bird or Thistle-Bird; Amerikaansche Distelvink.

Nomenclatur: Fringilla tristis, *L.*, *Gml.*, *Wls.*, *Audb.*; Carduelis tristis, *Bp.*, *Osb.*, *Wls.*, *Audb.*; Chrysomitris tristis, *Bp.*, *Nwbr.*, *Brd.*, *Br.*; Astragalinus tristis, *Cb.*, *Gr.*; Carduelis americana, *Brss.*, *Sw.* et *Rich.* — [Golden Finch, *Penn.*; American Goldfinch, *Edw.*, *Lath.*; Chardonneret d'Amérique, *Cat.*; Chardonneret jaune, Ch. du Canada, Tarin de la Nouvelle York, *Buff.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Stirn und Oberkopf ſchwarz, nach hinten ſpitz zulaufend; Flügel ſchwarz, Armſchwingen mit ſchmalen, ſchmutzigweißen Spitzen, welche einen Querſtreif über den Flügel bilden, Handſchwingen an der äußern Seite ſchmal weiß geſäumt; Schwanzfedern ſchwarz mit weißen Innenfahnen; Bürzel, Ober- und Unterſchwanzdecken weiß; Kopf, Rücken, Bruſt zitron- oder dunkelkanariengelb; Bauch und Beine bis zum Knie weiß. Schnabel hell mahagonibraun; Auge dunkelbraun; Füße gelblichbraun. Größe des Zeiſigs (H. C. Hahn in Wiandotte). — Weibchen: Oberkopf und ganze Oberſeite olivengrünlich-roſtröthlichbraun; Stirnrand, Geſicht und Kehle fahlgelb; Flügel ſchwarz mit fahlröthlichgelber Querbinde; Schwanzfedern ſchwarz mit weißlichem Fleck an der Innenfahne; obere Schwanzdecken und ganze Unterſeite bräunlichweiß. Das Winterkleid des Männchens iſt dem des Weibchens gleich, nur etwas lebhafter in den Farben; Unterſeite heller, faſt reinweiß; Schwanzfedern mit weißen Innenfahnen.

Fringilla tristis: colore frontis pileique nigro, post acuminato; alis nigris; apicibus remigum secundariorum angustis sordide albis, fasciam trans alam fingentibus; pogonio remigum primorum externo anguste albido-limbato; pogonio rectricum nigrarum albo; uropygio, supra- et infracaudalibus albis; capite, dorso pectoreque citrinis vel flavissimis; ventre tibiisque albis; rostro dilute badio; iride fusca; pedibus ferrugineis. Magnit. Fringillae spini. —

♀ pileo totoque notaeo olivaceo-ferruginosis; margine frontali, facie gulaque lividis; fascia trans alas nigras subfulva; macula pogonii rectricum nigrarum interni alba; supracaudalibus totoque gastraeo sordide albidis. — ♂ vest. hiem. cum ♀ conveniens, at laetius pictus; infra dilutior, fere albissimus; pogonio rectricum externo albo.

Jugendkleid dem des alten Weibchens gleich (Nehrling, Hahn u. a.).

Juvenis: femellae adultae aequalis.

Beschreibung des Eies. Bläulichweiß, ohne Flecken, matt. Gestalt eiförmig; Länge 15mm., Breite 12mm. (Nehrkorn). Das Ei ist reinweiß, soll jedoch auch braungefleckt erscheinen (Nehrling). Ei milchweiß bis weißbläulich mit unregelmäßigen kleinen Flecken von hellgraubrauner Farbe, welche meistens am dickern Ende, jedoch auch an der Spitze vorhanden sind (Hahn).

Ovum: lacteum, immaculatum, opacum, ovatum (Nehrkorn). Ovum pure album, interdum fusco-maculatum (Nehrling). Ovum lacteum, ipsum e coerulescente album, maculis parvis apicis obtusi crebrioribus, acuminati parcioribus irregulariter obsitum fumigatis (Hahn).

Der Fichtenzeisig [Fringilla pinus].

Ein Zeisig, welcher über den größten Theil der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Kalifornien verbreitet ist, gelangt trotzdem nur selten und einzeln in den Handel. Ich erhielt im Sommer 1877 ein einzelnes Männchen von H. Möller in Hamburg. Der Vogel streicht im Winter südlich bis nach Mexiko und d'Orbigny hatte behauptet, daß er auch auf den Antillen, besonders auf Kuba vorkomme. Dies hat Gundlach widerlegt und nachgewiesen, daß die Angabe entweder auf einem Irrthum beruht oder daß jener Reisende ein aus dem Käfige entflognes Exemplar gesehen. Audubon beobachtete die Art an der Küste von Labrador in großer Anzahl familienweise, Alte mit Jungen zusammen und nach seiner, sowie auch nach den Mittheilungen anderer Schriftsteller, besonders der ausführlichen Schilderung von Thomas G. Gentry, stimmt das Freileben des Fichtenzeisigs mit dem der nächsten Verwandten, also unsres europäischen und des Trauerzeisigs im wesentlichen überein. Nach Gentry gleichen Flug und Bewegungen jedoch mehr denen des Purpurgimpels. Der Lockton ist ein scharfes durchdringendes swirr oder zirr, welches er namentlich im Fluge hören läßt. Nach Audubon ist der Gesang sanft, mannigfaltig und melodisch und ähnelt einigermaßen dem des Trauerzeisigs. Die Nahrung besteht in Gräser- und Krautsämereien, im Herbst aber auch in den Beeren des virginischen und gemeinen Wachholders, in Nadelholz- u. a. Sämereien und im Frühlinge zugleich in den Bruten von Blattläusen und anderen Kerbthieren, auch in allerlei Baumknospen und Zapfen der Nadelhölzer. Brutzeit nach Brewer im Mai. Das Nest ist aus Reisern, Würzelchen, Stengeln und Gräsern geschichtet und mit Haren und Wolle gefilzt, innen sauber ausgepolstert. Gelege vier Eier von länglich-eiförmiger Gestalt, lichtgrün und besonders am breiten Ende hellrostfarben gezeichnet. Näheres ist über den Vogel nicht bekannt.

Der Fichtenzeiſig hat keine weiteren Namen. — Le Serin pin; Pine Finch or Pine Siskin.

Nomenclatur: Fringilla pinus, *Wls.*, *Audb.*; Fringilla (Carduelis) pinus, *Bp.*, *Osb.*, *Wls.*; Linaria pinus, *Audb.*; Chrysomitris pinus, *Bp.*, *Gr.*, *Brd.*, *Br.*; Chrysomitris macroptera, *Dbs.*, *Bp.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf und ganze Oberſeite fahl erdbraun, jede Feder mit breitem ſchwarzbraunen Schaftſtrich, Flügel und Schwanz ſchwarzbraun, Schwingen an der Wurzel gelb und außen ſchmal gelb geſäumt; zwei helle Querbinden über den Flügel; Schwanzfedern mit ſchmalen, fahlen Außenſäumen; Bürzel hell graubraun mit dunklen Schaftſtrichen; Unterſeite weiß, ebenfalls mit breiten dunklen Schaftſtrichen; Bauchmitte, Hinterleib und untere Flügeldecken reinweiß; Hals-, Bruſt- und Bauchſeiten bräunlichweiß. Schnabel fahl horngrau; Auge braun; Füße bräunlichhorngrau. (Dieſe Beſchreibung habe ich nach einem lebend vor mir ſtehenden Männchen gegeben). Das Weibchen ſoll übereinſtimmend ſein.

Fringilla pinus: capite totoque notaeo luride umbrinis, late fusco-striatis; alis caudaque fuscis; remigum basi flava, pogonio externo anguste flavo-limbato; fasciis trans alas duabus dilutis; rectricum pogonio externo anguste luride limbato; uropygio subfumoso, obscure striato; subtus alba, late obscure striata; abdomine, crisso et tectricibus subalaribus pure albis; lateribus colli, pectoris et hypochondriis sordide albidis; rostro livide corneo; iride fusca; pedibus subfusco-corneis. — ♀ mari simillima.

Der Magellanzeiſig [Fringilla magellanica].

Im September 1877 erhielt ich von Herrn H. Möller in Hamburg ein Pärchen dieſer Art, welches jedoch ſo krank ankam, daß beide in den nächſten Tagen eingingen. Ihre Heimat erſtreckt ſich über Braſilien bis Ekuador. Burmeiſter fand ſie beſonders im Kamposgebiete, wo ſie in der Nähe der Anſiedlungen lebt, bis in die Gärten kommt, ſich leicht fangen läßt und in Käfigen gehalten wird. Die Lebensweiſe und Ernährung gleicht der aller Verwandten. Buffon erzählt, daß Herr Kommerſon einen ſolchen Vogel erlangt hat, welcher mit den Füßen zwiſchen die Schalen einer Muſchel gerathen, ſtecken geblieben und alſo gefangen war; er rühmt ihn als angenehmen Sänger, welcher alle Vögel Südamerikas übertreffe. Nach Burmeiſter's Angabe dagegen iſt der Geſang unbedeutend und ohne Mannigfaltigkeit. Prinz Wied wiederum lobt ihn und ſpätere Beobachter beſtätigen dies. Man unterſchied früher mehrere naheſtehende Arten, welche jedoch zuſammenfallen, und hiernach hat der Vogel eine ſehr weite Verbreitung. Vieillot hat ihn übrigens ſchon nach einem lebenden Exemplar abgebildet, und umſomehr iſt es daher zu bedauern, daß er nur höchſt ſelten eingeführt wird. In allen ſeinen Eigenthümlichkeiten dürfte er von den Verwandten nicht abweichen.

Der Magellanzeiſig wird auch Kappenzeiſig (Br.) benannt; olivenfarbner Zeiſig (Buff.). — Silgero (Heimatsname, nach Burmſt.). — Le Serin de Magellan; Black-headed Goldfinch (*Brd.*); Magellan Siskin.

Nomenclatur: Fringilla magellanica, *Vll.*, *Audb.*, *Pr. Wd.*; Fringilla campestris, *Spx.*; Carduelis magellanicus, *Audb.*; Carduelis magellanica, *Lfrsn.*, *d'Orb.*, *Drw.*; Chrysomitris magellanica, *Bp.*, *Cb.*, *v. Tschd.*, *Brmst.*; Chrysomitris magellanicus,

Brd.; Fringilla icterica, *Lchtst.*; Sporagra magellanica, *Gr.*; Chrysomitris icterica, *Br.*; Chrysomitris capitalis, *Cb.* [L'Olivarez, *Buff.*; Gafarron, *Azr.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Der ganze Kopf und die Kehle ſchwarz; oberſeits olivengrün; Flügel ſchwarz mit zwei gelben Längsflecken; Schwingen gelbgrün gerandet und fahlweiß geſpitzt; Schwanz ſchwarz; ganze Unterſeite, Bürzel und obere Schwanzdecken lebhaft gelb; ein ebenſolches ſchmales Halsband. Schnabel ſchwarzbraun; Auge braun. Füße dunkelbraun. Zeiſiggröße. Das Weibchen iſt übereinſtimmend, doch fehlt ihm der ſchwarze Kopf.

Fringilla magellanica: capite toto gulaque nigris; supra olivaceo-viridis; maculis oblongis alarum duabus flavis; remigibus flavo-viride marginatis, albide terminatis; cauda nigra; torque angusto, gastraeo toto, uropygio et supracaudalibus laete flavis; rostro nigro-fusco; iride umbrina; pedibus fuscis. Magnit. Fringillae spini. — ♀ cum ♂ conveniens sed capite haud nigro.

Alle nächſtfolgenden Zeiſige ſind bis jetzt kaum oder erſt in einzelnen Köpfen eingeführt. Da dem Vogelhandel in allen Welttheilen aber immer weitere Gebiete erſchloſſen werden, ſo dürfen wir von dieſer oder jener Art wol erwarten, daß ſie über kurz oder lang zahlreich erſcheinen werde. Ich gebe alſo eine möglichſt eingehende Beſchreibung und auch Angaben über das Freileben, ſoweit ſolche eben vorhanden ſind. Für den Fall aber, in welchem ſie fehlen, während man einen ſolchen Vogel erhalten hat, darf man davon überzeugt ſein, daß er in allen Eigenthümlichkeiten, beſonders in der Ernährung, den ausführlicher geſchilderten, wie Trauerzeiſig, ſchwarzköpfiger Zeiſig, und namentlich auch dem europäiſchen Zeiſig durchaus gleicht.

Der Zeiſig von Arkanſas [Fringilla psaltria]. Wie der Fichtenzeiſig, ähnelt auch der Arkanſaszeiſig in ſeiner Lebensweiſe und allem übrigen unſerm europäiſchen Zeiſig. Umherſtreichend hat man ihn in dem am Golf von Mexiko gelegnen Louiſiana als unregelmäßigen Wintergaſt beobachtet, während ſeine eigentliche Heimat ſich vom ſüdlichen Felſengebirge bis zur Küſte von Kalifornien erſtreckt. Nach Audubon iſt er ein unruhiger Wandrer, der in kleinen Flügen auf Baumgruppen ſich umhertreibt, nirgends lange verweilt und bei dem lebhaften Fluge eigenthümliche Schwenkungen ausführt. Lebend eingeführt iſt er meines Wiſſens nur einmal von Schöbel in drei Köpfen, welche jedoch nach der Ankunft ſogleich ſtarben. Bis jetzt gewährt er alſo für die Liebhaberei kein beſondres Intereſſe. Er iſt olivengrün, an Kopf, Flügeln und Schultern ſchwarz und an der ganzen Unterſeite lebhaft gelb; Flügel mit breitem weißen Fleck und ſchmaler heller Querbinde. — Le Serin d'Arcansas; Arcansas Finch *(Baird)*. — Fringilla psaltria, *Say, Audb.*; Fringilla [Carduelis] psaltria, *Bp.*; Carduelis psaltria, *Audb.*; Chrysomitris psaltria, *Bp., Gmbl., Brd., Br.*; Pseudomitris psaltria, *Gr.*

Der Kordillerenzeiſig [Fringilla uropygialis]. Obwol über die ſüdamerikaniſchen Länder Chile und Peru und zwar insbeſondre über alle die Kordillerenkette begrenzenden und umfaſſenden Gebiete verbreitet, gelangt er bis jetzt doch nur in einzelnen Exemplaren und höchſt ſelten in den Handel. Er iſt in Geſtalt und Größe dem europäiſchen Zeiſig ähnlich, an Kopf und Hals kohlſchwarz; oberſeits grün; unterſeits und ein Theil des Schwanzes ſchön gelb. Verbreitung von 1570 bis 3140 Meter Meereshöhe. Die Ernährung beſteht in öligen

Sämereien der Kordillerenpflanzen. Sein Wesen ist scheu und vorsichtig, daher soll er schwer zu fangen sein. Nach Landbeck überlebt er den Verlust der Freiheit nicht lange, was umsomehr zu bedauern ist, da er als vortrefflicher Sänger zu schätzen sein soll. — Der Kordillerenzeisig (Landbeck) ist auch Goldbürzelzeisig (Br.) benannt. — Le Serin des Cordilleres; Cordillerean Goldfinch. Jilgero de la Cordillera der Chilenen. — Chrysomitris uropygialis, *Scl., Lndbck., Br.;* Melanomitris uropygialis, *Gr.*

Stanleyzeisig [Fringilla Stanleyi]. Das Verbreitungsgebiet dieser Art soll sich über Kalifornien und Mexiko erstrecken. Nach Baird ist sie dem Magellanzeisig überaus ähnlich, jedoch dadurch verschieden, daß nur Oberkopf und Kehle schwarz, die Bauchmitte ziemlich reinweiß und die unteren Schwanzdecken braunschaftstreifig sind; auch ist sie beträchtlich größer. Audubon besaß ein Pärchen im Käfige und nach demselben ist Baird's Beschreibung gegeben. Bei uns lebend eingeführt dürfte der Vogel noch nicht sein. — Er ist auch Stanley's Goldfink (Brd.) benannt. — Stanley's Goldfinch, *Brd.* — Carduelis Stanleyi, *Audb.;* Chrysomitris Stanleyi, *Bp., Brd., Br.;* Hypacanthus Stanleyi, *Cb.*

Der Mönchszeisig [Fringilla Lichtensteini*)] gleicht wiederum dem Magellanzeisig, doch mit dem Unterschiede, daß nur der Oberkopf schwarz, Backen, Kinn und Kehle dagegen olivengrünlichgelb sind. Die Heimat beschränkt sich auf einen geringen Theil Südamerikas, auf Neu-Granada. Näheres ist über den Vogel nicht bekannt. — Le Serin épin; Spine Goldfinch. Fringilla spinescens, *Lchtst., Bp.*; Chrysomitris spinescens, *Cb., Gr., Br.*

Der schwarzbrüstige Zeisig [Fringilla notata]. Seine Heimat erstreckt sich über Mittelamerika und Mexiko. Baird erwähnt ihn nur gelegentlich bei der Beschreibung des Magellanzeisigs und sagt, daß bei ihm das Schwarz an der Kehle bis zur Brust sich herabziehe, die Flügeldecken außer einem gelblichen Bande auf den Spitzen der größeren schwarz, und die Schwingen zweiter Ordnung ohne irgend welchen gelben Saum seien. Eingeführt ist er noch nicht. — Chrysomitris notata, *Bp., Cb., Brd.;* Carduelis notata, *Dbs.;* Fringilla magellanica, *Audb.,* nec *Vieill.;* Chrysomitris magellanica, *Bp.;* Sporagra notata, *Gr.*.

---

*) Sollte es nicht möglich sein, das sinnlose, korrupte Wort spinescens abzuschaffen? Lichtenstein hat es erfunden, jedenfalls in Beziehung auf spinus. Unsre Fringilla spinus stammt aber dem Worte nach nicht aus dem Lateinischen, wo spinus Dornstrauch heißt, sondern ist von Linné echt aus dem Griechischen entnommen (σπινος = ein kleiner Vogel, wahrscheinlich unser Zeisig). Diese beiden gleichlautenden Wörter gehen einander sonst garnichts an; σπινοειδης (spinoides) für eine andre Species ist ganz korrekt, aber spinescens doppelter Unsinn. Einmal läßt es sich sprachlich mit dem griechischen σπινος absolut nicht in Verbindung bringen, und als lateinisches Verbum heißt es einfach: dornig werdend (von spinesco). Gegen ein solches Epitheton für einen Vogel muß doch protestirt werden. Leider existirt kein Synonym für diese Species, die mit neuer Bezeichnung vielleicht in — Fringilla Lichtensteini, *Luchs* — umgetauft werden könnte, um wenigstens die Manen des Autors zu versöhnen.

Den schwarzen Zeisig [Fringilla atrata] schildert v. Landbeck in folgendem: „Diese von d'Orbigny beschriebne und abgebildete Art wird in der beim Kordillerenzeisig angegebnen Höhe und keineswegs selten gefunden. Sie ist zwar einfach gefärbt, aber trotzdem sehr hübsch, nämlich kohlschwarz, an Bauch, Hinterleib und Schwanzhälfte hochgelb, mit ebensolchem Flügelspiegel. Das Weibchen ist lichtgrau, jede Feder mit dunklem Schaftstrich und grünlichem Rande; Schwingen und Schwanzfedern braungrau, die Handschwingen am Grunde und der Innenseite zitrongelb wie beim Männchen. Dasselbe soll einen angenehmen Gesang hören lassen. Ein Freund von mir, welcher als Mineningenieur längere Zeit in der Punaregion Bolivia's in einer Höhe von 4707 Meter gelebt hatte, erzählte mir, daß er den schwarzen Zeisig in dieser Höhe häufig gesehen und auch sein Nest in Felsenlöchern (Bäume oder Gebüsche giebt es dort nicht) gefunden habe, daß derselbe von den Eingeborenen (Indianern) seines herrlichen Gesangs wegen eingefangen und in Käfigen gehalten werde und auch dann, in die tiefer gelegenen Landschaften gebracht, sich ausdauernd zeige. Dieser schöne Vogel dürfte als eine schätzenswerthe Bereicherung der europäischen Vogelsammlungen gelten." Hoffen wir, daß er demnächst wenigstens zuweilen in einigen Pärchen eingeführt werde. Bis jetzt dürfte wol nur ein einziges Männchen lebend nach Europa gelangt sein, welches ich von Herrn C. Linz in Hamburg erhielt, das aber sehr schlecht im Gefieder war und bald einging. — Er ist auch Trauerzeisig (Br.) benannt. — Le Serin noir; Black Goldfinch or Black Siskin. — Carduelis atrata, *Lfrsn.* et *d'Orb.*; Chrysomitris atrata, *Bp.*, *Brmst.*, *Lndbck.*, *Br.*; Melanomitris atrata, *Gr.*

Der Zeisig von Kolumbien [Fringilla columbiana] ist an der Oberseite zeisiggrün, die einzelnen Federn in der Mitte dunkelbraun durchschimmernd; Flügel und Schwanz schwarzbraun; die kleinen Flügeldecken, Armschwingen und Steuerfedern grün gerandet, die dem Rücken am nächsten liegenden Armschwingen an der Außenfahne nach der Spitze zu weiß gerandet, auf dem Flügel ein kleiner weißer Fleck; Unterseite grünlichgelb, hin und wieder dunkler durchscheinend und heller gerandet; untere Schwanzdecken reingelb (Cb.). Heimat Kolumbien (Baird giebt Südamerika an). Nach Dr. A. v. Frantzius kommt er auf Kostarika vor und stimmt in der Lebensweise mit Morelett's Pfäffchen (Sporophila Moreletti, *Puch.*) überein. Er treibt sich also in der Trockenzeit häufig an den Rändern der Felder und an freien Plätzen umher, wo er die reifen Samen der hohen abgetrockneten Staudengewächse verzehrt. — Carduelis columbianus, *Lfrsn.*; Chrysomitris xanthogastra, *Dbs.*; Astragalinus columbianus, *Bp.*, *Cb.*; Chrysomitris columbiana, *Scl.*, *Frntz.*; Chrysomitris columbianus, *Brd.*; Pseudomitris columbiana, *Gr.*

Der mexikanische Zeisig [Fringilla mexicana] ist von Baird in folgender Weise beschrieben: Oberhalb einfarbig schwarz, hier und da eine gelblichgrüne Feder durchschimmernd; Bürzel weißlich durchscheinend; Schwanz schwarz, jeder-

seits die drei äußersten Federn nur an Außenfahne und Spitze schwarz, sonst weiß; ganze Unterseite blaßgelb. Weibchen am Kopf und Oberkörper nicht schwarz, sondern olivengrün; dem des Arkansaszeisigs ähnlich. Diese Art steht der vorigen sehr nahe, doch ist das Gelb des Unterkörpers viel tiefer und der Schwanz ebenso wie die Schwingen, außer am Grunde, zeigen kein Weiß. Auch Cabanis giebt letztere Unterscheidungsmerkmale an. Obwol schon von Buffon als Catalotl beschrieben, ist er bis zur Gegenwart doch fast garnicht bekannt. Heimat Mexiko und einige mittelamerikanische Striche, z. B. Kostarika, wo ihn Dr. v. Frantzius beobachtete und seine Lebensweise mit der des europ. Zeisigs übereinstimmend fand. Baird bezeichnet die mexikanische Seite des Thals vom Rio Grande südwärts als seine Heimat. — Zeisig von Mexiko („Handbuch für Vogelliebhaber"). — Black or Mexican Goldfinch *(Brd.)*; Mexican Siskin; Le Serin du Mexique. — Tarin noir du Mexique, *Brss.* — Carduelis mexicanus, *Swns., Wgl.*; Chrysomitris mexicanus, *Bp., Brd.;* Chrysomitris mexicana, *Scl., Frntz.;* Astragalinus mexicanus, *Cb.;* Fringilla melanoxantha, *Lchtst., Wgl.*; Fringilla texensis, *Gir.*; Pseudomitris mexicana, *Gr.*; Fringilla catalotl, *Gml.*

Yarrell's Zeisig [Fringilla Yarrelli]. Von allen Verwandten unterscheidet sich diese Art nach Baird durch einen auffallend großen Schnabel. Nach Cabanis ist sie von der vorigen im übrigen nur durch einfarbig schwarzen Schwanz verschieden. Baird sagt, daß die Zeichnung an Flügeln und Schwanz fast genau so, wie bei dem Magellanzeisig sei, und daß der Unterschied zwischen beiden bloß in der geringern Größe, dem helleren Nacken und darin begründet sei, daß nur die Krone anstatt des ganzen Kopfes schwarz ist. Er hat die Beschreibung nach einem Exemplar gegeben, welches Audubon wie es scheint, eine Zeit lang im Käfige gehalten. — Yarrell's Goldfinch. — Carduelis Yarrelli, *Audb.*; Fringilla mexicana, *Audb.*, nec *Swns.*; Chrysomitris Yarrelli, *Bp., Brd.*; Chrysomitris mexicana, *Bp.;* Astragalinus Yarrelli, *Cb.*

Der kalifornische Zeisig [Fringilla Lawrencei]. Vorder- und Oberkopf, Zügel, Kinn und Kehle schwarz; Hinterkopf, Nacken, Backen, Hals, Brust- und Bauchseiten fahl bräunlichgrau; Mantel grünlicholivengrau; Flügelschwingen schwarzbraun, schmal weiß innengesäumt, Flügeldecken olivengrünlichgelb mit schwarzer Querbinde; Schwanzfedern schwarz, grau außengesäumt, Innenfahne der drei äußersten mit großem weißen Fleck; Bürzel zitrongelb, obere Schwanzdecken graubraun; von der Kehle bis zum Bauch lebhaft zitrongelb, letztrer und der ganze untre Hinterleib graulichweiß. Schnabel und Füße bräunlichfleischfarben; Auge braun. Das Weibchen soll nur dadurch verschieden sein, daß der Kopf nicht schwarz, sondern aschgrau ist. Die Größe gleicht der des vorigen. Die Heimat ist nach Baird die Küste von Kalifornien. Ueber das Freileben ist nichts bekannt. — Citrinelle (Br.). — Carduelis Lawrencii, *Css.;* Chrysomitris Lawrencii, *Bp., Brd.;* Chrysomitris Lawrencei, *Gr.;* Citrinella Lawrenci, *Br.*

Der Gebirgszeisig [Fringilla spinoides] bewohnt die höher gelegenen Zonen des Himalaya und kommt im Winter in die Thäler herab, wo man ihn in der Nähe menschlicher Wohnungen und in Gärten sieht. Dr. Stoliczka sammelte ihn in Kotegurh u. a. im Winter. Ueber das Freileben ist nichts bekannt; auch Horsfield und Moore bringen keine Angaben. Oberkopf und Backen nebst Bartstreif schwärzlicholivengrün; Stirnstreif, Zügel, Streif vom Nasenloch bis zum Schlaf, Vorderbacken, Halsseiten und Bürzel lebhaft gelb; Schwingen schwarzbraun, an den Spitzen schmal hellgrau gesäumt und ihre Innenfahnen am Grunde breit gelb gerandet; über den Flügel eine breite gelbe Querbinde; Schwanzfedern schwarzbraun, am Grunde gelb; ganze Unterseite und untere Flügeldecken lebhaft gelb, Seiten fahl olivengrünlich; Unterleib düsterweiß. Schnabel und Füße röthlichhorngrau; Auge braun. Das Weibchen soll nur düstrer sein, ober- und unterhalb fast olivengrünlich längsgestrichelt. Einzeln eingeführt, mit anderen Vögeln zusammen von Jamrach und Hagenbeck; im Londoner zoologischen Garten seit 1867. — Bastardzeisig (Cb.), Zeisiggrünling (Br.). — Le Serin des montagnes indiens; Indian Mountain-Siskin or Indian Siskin. — Carduelis spinoides, *Vgrs.*, *Gld.*, *Blth.*, *Hdgs.*; Chrysomitris spinoides, *Blth.*, *Hdgs.*, *Bp.*, *Hrsfld.* et *Mr.*, v. *Plzln.*; Fringilla spinoides, *Gr.*; Hypacanthis spinoides, *Cb.*; Chlorospiza spinoides, *Br.* — [The Indian Siskin, *Lth.*; Saira (in Kaschmir), *Royle*].

Der bärtige Zeisig [Fringilla marginalis]. An Oberkopf und Kehle schwarz, oberseits düster bräunlicholivengrün und unterhalb grünlichgelb, in der übrigen Färbung sowol als auch in der Lebensweise und allen anderen Eigenthümlichkeiten dürfte er den vorher geschilderten grünen Verwandten gleichen. Seine Heimat erstreckt sich über Chile und Bolivia, doch ist er auch südlicher bis auf den Falklandsinseln beobachtet worden. Herr Landbeck berichtet über ihn: „Ein in Chile ungemein häufiger Vogel, der über das ganze Land verbreitet ist. Sowol sein Aeußeres, als auch sein Betragen, Lockstimme und Gesang stimmen mit denen des europäischen Zeisigs so sehr überein, daß er auf den ersten Anblick leicht mit ihm verwechselt werden kann (doch ist er bedeutend größer). Der Gesang ist bei den einzelnen Männchen sehr verschieden, indem es recht gute Sänger, aber auch viele Stümper giebt; im allgemeinen ist er jedoch abwechselungsreicher und voller, als der des europäischen Verwandten und ohne die unschöne Schlußstrofe. Er lebt und brütet in den Vorbergen der Anden, bei Valdivia auch in den oberen Wäldern und Obstgärten, wo er in 3 bis 6 Meter Höhe sein zierliches Nest baut und vier bis sechs hellbläuliche Eier legt. Im Sommer ernährt er sich wol theilweise von Insekten und reifenden Oelsämereien; im Winter kommt er z. B. in der Umgegend von Santiago in die Potreros und auf abgeerntete Weizenfelder, um die Samen verschiedener Unkräuter, wie Hederich, wilder Rübsen, schwarzer Raps, wilder Rettig u. a., zu verzehren, zu welcher Zeit er dann mit Lockvögeln auf Leimruten und in Schlagkäfigen in großer Anzahl gefangen wird. Die Lieb-

haberei der Chilenen für diesen hübschen muntern Vogel ist so groß, daß Mancher ein bis zwei Dutzend und noch mehrere in kleinen Käfigen aus gespaltnem Rohr hält, um sich an ihrem Gesange zu erfreuen. Es giebt auch Exemplare, welche weiß und gelb abändern." Nach allen diesen Eigenthümlichkeiten ist es umsomehr zu bedauern, daß er bis jetzt der Liebhaberei bei uns noch nicht zugänglich ist.*) Im zoologischen Garten von London ist er seit 1875 vorhanden. Bartzitronfink (Br.). — Jilgero der Chilenen. — Fringilla barbata *Mln.*; Chrysomitris marginalis, *Bp.*, *Hrtl.*, *Lndbck.*, *Cb.*; C. campestris, *Gay*; C. magellanica, *Scl.*; C. flavospecularis, *Hrtl.*; Sporagra barbata, *Gr.*; Citrinella barbata, *Br.* (Da ich S. 378 bereits einen Vogel als Fringilla barbata aufgeführt habe, so mußte ich mich bei diesem an eine neuere Benennung halten).

Der abessinische Gebirgszeisig [Fringilla nigriceps], **der Zitronzeisig** [Fringilla citrinellína] und **der Maskenzeisig** [Fringilla melanops], drei Arten, welche Th. v. Heuglin in Abessinien scharenweise beobachtete, die jedoch geringe Aussicht bieten, lebend eingeführt zu werden. Im Freileben dürften sie mit den Verwandten übereinstimmen, doch sind sie alle drei vorzugsweise Gebirgsbewohner. Der Reisende schildert sie als anmuthige Vögel und angenehme Sänger. Einer nähern Beschreibung bedarf es vorläufig nicht. — Serinus nigriceps, *Rpp.*, *Lfbvr.*, *Hgl.*; Citrinella nigriceps, *Bp.*, *Hgl.*; Crithagra nigriceps, *Blth.*; Dryospiza nigriceps, *Hrsf.* et *Mr.* — Serinus citrinelloides, *Rpp.*; Fringilla citrinelloides, *Lfbvr.*; Citrinella citrinelloides**), *Bp.*, *Hgl.* — Fringilla (Citrinella) melanops, *Hgl.*

Der chinesische Grünfink [Fringilla sinica]. William Heine, Zeichner bei der nach China und Japan unter der Führung von M. C. Perry unternommenen amerikanischen Expedition, giebt an, daß er diesen Vogel häufig in den Gärten der Umgegend von Makao (im südöstlichen China, am Ausfluß des Sikiang ins chinesische Meer) in den Gebüschen gesehen habe. F. H. v. Kittlitz beobachtete ihn auf Boninsima, einer Insel des stillen Ozeans, und Radde fand die größre Varietät im südöstlichen Sibirien. Die Heimat erstreckt sich also über Ostasien, China, Japan und einen Theil Sibiriens. Der Vogel ist an Kopf und Nacken olivenbräunlichgrau; ganze übrige Oberseite grünlichrothbraun; Schwingen schwarz, an der Grundhälfte gelb, Flügelrand und Achseln hochgelb; Schwanz schwarz, Grundhälfte gelb; Backen und Kehle gelblicholivengrün mit schwachem dunklen Bartstreif; Unterseite gelblicholivenbraun, von der Unterbrust an heller

*) Während des Drucks dieser Bogen findet die dritte überaus großartige Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin, statt, und auf derselben hat Fräulein Chr. Hagenbeck ein Männchen des bärtigen Zeisigs neben einem Männchen von Hagenbeck's gelbköpfigem Girlitz [Fringilla (Crithagra) imberbis, *Cab.*], welcher letztre in den Museen noch kaum vorhanden ist.

**) Das ist wieder ein entsetzliches Wort: citrinelloides! Wenn es noch wenigstens citrinellina hieße. So und nicht anders ist die korrupte vox hybrida umzuwandeln. In Beziehung auf das Subgenus Citrinella ist sie immer noch sinnlos genug = ein Zitronfink, der dem Zitronfink ähnlich ist. Dr. L.

Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

gelblich, Bauch und Hinterleib weißlich. Das Weibchen ſoll nur düſtrer und unterhalb mehr grau ſein. Der Vogel dürfte gelegentlich und einzeln in den Handel gelangen. Er iſt nach ſeinem heimatlichen Namen von Br. Kawarahiba benannt. — Le Verdier de la Chine; Chinese Greenfinch. — Fringilla sinica, *L.*, *v. Kttl.*; Fringilla kawariba, *Tmm.*; Ligurinus sinicus, *Blth.*, *Cb.*; Ligurinus kawariba, *Cb.*; Chlorospiza sinica, *Css.*, *W. Hn.*, *Br.*; Chloris sinica, *Gr.*; Chl. kawariba minor, *Schlg.*

Der algeriſche Grünfink [Fringilla aurantiiventris] dürfte blos eine lebhafter gefärbte Varietät unſres europäiſchen Grünfink ſein und bedarf daher nur der beiläufigen Erwähnung. Ich würde ihn ganz fortlaſſen, wenn nicht zuweilen von Ch. Jamrach in London dergleichen Vögel, ebenſowol als auch der vorige, eingeführt würden; im Londoner zoologiſchen Garten iſt ein Exemplar ſeit 1864 vorhanden. Er iſt kleiner als jener und am Unterleibe chromgelb. Heimat ſüdliches Frankreich und Algier. — Le Verdin algérien; Algerian Greenfinch. — Ligurinus aurantiiventris, *Cb.*; Chlorospiza aurantiiventris, *Br.*; Auripasser aurantiiventris, *Gr.*

* * *

Eine größere Gruppe, mehr oder minder nahe verwandter, hierher gehörender Vögel ſtelle ich als **Finken** zuſammen, obwol neuere Schriftſteller ſie in zahlreiche Sippen geſpalten haben. Es ſind die Geſchlechter: Edelfink [Fringilla, *L.*], Stieglitz [Carduelis, *Cv.*], Girlitzfink [Sycalis, *Boie*], Meiſenfink [Euethia, *Rchb.*], Scheitelfink [Coryphospingus, *Cb.*], Springfink [Volatinia, *Rchb.*] und Farbenfink [Cyanospiza, *Bp.*]. Sie zeigen vorzugsweiſe die Merkmale, welche ich in der Ueberſicht S. 324 angegeben. Die Heimat der beiweitem meiſten lebend eingeführten, welche in bedeutender Artenmannigfaltigkeit und manche auch in großer Kopfzahl in den Handel gelangen, iſt Amerika.

Der Kanarienfink [Fringilla tintillon], wie der Name beſagt, von den kanariſchen Inſeln, wo er nach Bolle's Angaben die höher gelegenen Striche der baumartigen Eriken- und Lorbeerwälder, namentlich der weſtlichen Inſeln, bewohnt; nach E. V. Harcourt iſt er auch auf Madeira heimiſch. Er iſt dem europäiſchen Edelfink ähnlich, wenig größer und beiweitem lebhafter gefärbt; das Roth der Bruſt ſpielt ins Orangefarbne. Zum Winter ſteigt er in die Thäler hinab. Sein Geſang iſt unbedeutend, durchaus abweichend von dem des Verwandten und lautet wie: hita, hita, hita, herrrrrrr, am Schluſſe nicht rein ausgeſchlagen. Nach Giebel (Thesaurus ornith.) ſoll dieſe Art mit der nächſtfolgenden zuſammenfallen. Als Stubenvogel hat er keine Bedeutung, da er nur in einzelnen Köpfen und höchſt ſelten von Ch. Jamrach eingeführt wird. — Er iſt auch Lorbeerfink (Br.) benannt; Tintillon (auf den Inſeln, nach Bll.); Tentilhao (auf Madeira, nach Hrcrt.). — Fringilla canariensis*), *Vll*, *Ldr.*, *Bll.*, *Gr.*, *Hgl.*, *Br.*; Fringilla Tintillon, *Wbb.* et *Brth.*, *Bll.*, *Hrcrt.*

*) Fringilla canaria und F. canariensis zeigen doch zu geringe Verſchiedenheit, während beide Arten einander keineswegs unmittelbar nahe ſtehen. Um Irrthümer zu vermeiden, gebe ich daher dem Namen von Webb und Berthelot den Vorzug.

Der Teydefink [Fringilla teydea]. Der Naturforscher Berthelot hatte auf der Insel Teneriffa einen Vogel entdeckt und abgebildet, welchen Bonaparte und Bolle für einen nahen Verwandten des europäischen Edelfink halten. Die Grundfarbe des Männchens ist ein mattes Blau, die des Weibchens rothbraun, bei beiden die Flügel mit weißer Binde; Größe bedeutender als die des Buchfink. Heimat die unwirthbaren Höhen des Teyde oder Pik von Teneriffa. Bolle beschreibt ihn oder vielmehr den Ausflug, um ihn zu sehen, in seiner poetisch schönen Weise, und ich bedauere nur, daß ich die herrliche Schilderung aus dem „Journal für Ornithologie" (1857) Raummangels wegen hier nicht aufnehmen darf. Einen Gesang haben beide Reisenden nicht vernommen und näheres über die Lebensweise ist nicht bekannt. Für die Liebhaberei wird der Vogel ebenfalls niemals Bedeutung erlangen, doch könnte er immerhin gelegentlich eingeführt werden. — Vogel Armida's (Berth.). — Pajaro de la Cumbre (Heimatsname). — Fringilla teydea, *Brth.* et *Wbb.*, *Bll.*

Der Edelfink von Algier [Fringilla spodiogenía]. Th. v. Heuglin betrachtet diesen in Nordafrika heimischen Vogel nur als eine Lokalrasse des europäischen Edelfink, während Alexander v. Homeyer, der ihn in Algier beobachtete, ebenso wie Bonaparte, Cabanis u. A. ihn für eine besondre Art halten; er sei größer, schlanker gebaut, trage sich im Sitzen wie im Gehen auf der Erde bachstelzenartig mit wenig gehobenem Schwanz. Der Lockton sei ganz verschieden, dem der gelben Bachstelze ähnlich und mit dem des verwandten nicht zu verwechseln; der Schlag sei jedoch ganz finkenartig. Nach Baron Koenig-Warthausen's Angabe stimmt das Ei bis auf geringere Größe und zartere Färbung mit dem des Buchfink überein. Taczanowski sah ihn in der Provinz Konstantine, ebenfalls in Algier, überall als gemein und bemerkt nur, daß er vorsichtiger sei, als jener. Er fand auch fertige Nester mit Eiern, welche nach Homeyer denen des Buchfink ebenfalls gleichen. Für die Liebhaberei wird der Vogel wol niemals von Bedeutung sein, deshalb zähle ich ihn nur beiläufig mit; im zoologischen Garten von London ist er seit 1864 in einem Exemplar vorhanden. — Maurenfink (Br.). — Le Pinson algérien; Algerian Chaffinch. — Fringilla spodiogenia, *Bp.*, *Scl.*, *Bll.*, *Boie.*, *Hmr.*, *Kg.-Wrth.*, *Cb.*, *Tczn.*, *Gr.*, *Br.*; Fringilla var., *Mlh.*; Fringilla africana, *Lvll.*

Der Himalaya-Stiglitz [Fringilla caniceps]. Im Innern Asiens, namentlich auf dem Himalaya, in Kaschmir u. a., lebt ein naher Verwandter unsres europäischen Stiglitz, welcher nach Jerdon in Lebensweise, Gesang u. a. dem erstern durchaus gleichen soll. Auch im Aeußern ist er ihm ähnlich, das Band um den Schnabel ist jedoch nicht karmin-, sondern scharlachroth, auch schmäler und durch kein schwarzes Band vom Schnabel getrennt, sondern erstreckt sich unmittelbar um denselben; die Kopfseiten sind nicht weiß, sondern hellbraun; der Rücken ist heller

weißlichbraun; über die schwarzen Flügel zieht sich ein gelbes Band. Die Größe ist etwas geringer. Dr. v. Stoliczka sammelte ihn in Kotegurh im Winter und in Kyelang im Juni; nach Hutton ist er zu Quetta und Kandahar im Winter und Sommer gemein. Näheres ist nicht bekannt. — Ich habe den Vogel im Laufe der Jahre zweimal von Gudera in Leipzig erhalten, jedoch stets in so zerlumptem Gefieder, daß ich keine nähere Beschreibung geben kann, während die Jerdon's nicht ganz genau zu stimmen scheint. Uebrigens dürfte er wol, da er in Kalkutta garnicht selten gefangen und zum Verkauf geboten werden soll, demnächst auch öfter bei uns eingeführt werden; er wird dann neben dem europäischen Verwandten sicherlich willkommen sein. — Shira bei den Hindustanern (Blyth); Saira in Kaschmir (Royle). — The Indian Goldfinch (Hrsf. et Mr.). — Carduelis caniceps, *Vgrs., Gld., Rl., Blth., Ct., Htt., Bp., Hrsf.* et *Mr., Br.*; Fringilla caniceps, *Gr.*

Der Safranfink [Fringilla brasiliensis].

Tafel XI. Vogel 56.

Unter der Bezeichnung brasilischer Kanarienvogel kommt ein Fink in den Handel, welcher überall als gemein gelten darf, wenn er auch immer nur in wenigen Köpfen vorhanden ist. Er gehört zu den bekanntesten und seines hübschen Gefieders wegen auch immerhin beliebten Stubenvögeln. Das Männchen ist lebhaft schwefelgelb mit schön safrangelber Stirn; das Weibchen zeigt ein düsteres, matteres Gelb, welches in Grau übergeht, auch hat es jenen Kopfschmuck nicht aufzuweisen. Die Größe stimmt mit der des gemeinen Kanarienvogels überein. Seine Heimat ist Süd- und Mittelamerika, doch vorzugsweise die östlichen Gegenden.

Die älteren Schriftsteller geben wenig über ihn an. Buffon erachtet ihn als dem europäischen Goldammer ungemein gleich und meint, daß beide Arten zur fruchtbaren Mischlingszucht geeignet sein müßten. Markgraf lobt den Gesang und vergleicht denselben mit dem Finkenschlag, während das Weibchen Sperlingsgeschrei hören lasse. Vieillot theilt nichts näheres über ihn mit.

Merkwürdig ist die Meinung der Eingeborenen von Jamaika. Nach Gosse („The Birds of Jamaica") glauben dieselben nämlich, daß der Safranfink ein Nachkomme des Kanarienvogels sei. Vor vielen Jahren sei dieser in mehreren Köpfen von Madeira hierher gebracht, und nachdem er sich bedeutend vermehrt, die Schar freigelassen worden, welche sich nun über die ganze Insel verbreitet und durch den Einfluß des Klimas oder der Nahrung ein ungleich lebhafter gefärbtes Gefieder erhalten habe.

Burmeister beobachtete ihn in Brasilien vielfach in der Nähe menschlicher Ansiedlungen, wo er sich in den Gärten gern auf den Palmenkronen zeigt, gleich den Sperlingen und Hänflingen seine Nahrung zwar am Boden, aber auch an

den Gewächsen selbst, besonders an Gräsern, in Gesellschaft der Pfäffchen sucht. Sein Gesang sei ziemlich einfach und weder so laut als der eines Kanarienvogels noch so melodisch als der des Zeisigs. Der Naturforscher Prinz von Wied fand ihn in Brasilien überall, wo Gebüsch mit offenen Gegenden abwechselt; das Innere der Urwälder vermeide er dagegen. Der Lockton bestehe in einem kurzen Laut; während der Parungszeit vernehme man einen leisen, ziemlich wechselreichen Gesang, und in der Brutzeit, welche in den dortigen Frühling, also zwischen September bis März fällt, komme er gern in die Nähe menschlicher Wohnungen und lasse hier, von einem Baum oder Strauche herab, nicht zu entfernt von dem Neste, seinen nun etwas lebendiger gewordnen Ruf erschallen. Den Verlauf der Brut beschreibt der schweizerische Konsul Karl Euler. Er nistete in hohlen Bäumen, Zaunpfählen u. a. Hölzern, auf Triften, in Gärten und Höfen u. s. w., auch sehr gern in den Nestern anderer Vögel, namentlich der Höhlenbrüter. So fand ihn der Genannte im Besitze der Nester des brasilischen weißköpfigen Fliegenschnäppers und noch mehr in denen eines kleinen Baumläufers (Synallaxis mentalis, *Lchtst.*), dessen geräumige, gut verschlossene Höhlung ihm besonders zu behagen scheint. Wenn er selbst ein Nest bauen muß, so begnügt er sich mit einer nachlässig zusammengetragnen Unterlage von Stroh und Federn auf dem Boden der Höhle. Die Nester enthalten in den Monaten Oktober bis März Eier oder Junge (er fand am 27. Oktober ein Nest mit 4 Eiern, am 13. Dezember ein solches mit gleichem Gelege, am 20. Dezember eins mit flüggen Jungen, am 25. Februar wiederum eins mit 4 Eiern und am 14. März eins mit 3 Eiern) und Euler schließt daraus, daß der Vogel dreimal in jedem Jahre nistete. Kurze Angaben von Chrysanthus Sternberg und H. v. Berlepsch stimmen mit denen des erstern Forschers überein. Sternberg beobachtete ihn bei Buenos-Ayres und Berlepsch in Südbrasilien. Nach Gundlach ist auch ein Par bei Matanzas auf Kuba gefangen, doch meint er, daß dies nur aus dem Käfige entflohene Vögel sein konnten.

Zu Bechstein's Zeit war dieser Fink noch nicht eingeführt; ebensowenig zählt ihn Bolle in seinem Verzeichniß mit. Gegenwärtig wird er ziemlich regelmäßig alljährlich in den Handel gebracht. Namentlich findet man ihn in den zoologischen Gärten, nur selten dagegen in den Vogelstuben; bei den Liebhabern, vorzugsweise aber bei Anfängern oft einzeln als Sing- oder Schmuckvogel. In den Handlungen zweiter Hand fehlt er zuweilen längere Zeit. Im Jahre 1868 erhielt Herr Mieth in Berlin zum erstenmal eine Anzahl von zwölf Köpfen, unter denen sich jedoch nur ein Weibchen befand. Obwol von Herrn Leuckfeld, der ihn schon früher gezüchtet hatte, inbetreff seiner Bösartigkeit gewarnt, mußte ich das Pärchen doch anschaffen und frei fliegen lassen, um auch diese Art nach ihrem ganzen Wesen kennen zu lernen. Beide zeigten sich anfangs ruhig und

harmlos. Das Weibchen war augenscheinlich schon recht alt und hatte unter den Verhältnissen der Gefangenschaft sehr gelitten; sein Kopf war fast ganz federlos und stark mit Abschuppung (Schinn) bedeckt. Wenige Wochen vergingen, da stellten sich aber Veränderungen ein, welche zunächst das Aeußere des Weibchens und dann das Benehmen beider betrafen. Schneller als bei vielen anderen Vögeln wuchsen die Federn des Kopfes hervor, nachdem die Haut sich vonselber gereinigt. Auch die fahle Farbe des Gefieders wurde lebhafter und dunkler. Jetzt entwickelten beide Vögel aber eine stürmische Lebendigkeit, die sich namentlich in fortwährendem gegenseitigen Jagen kundgab. Herr Leuckfeld schrieb mir von seinem Pärchen folgendes: „In der ersten Zeit hielt ich die Vögel in einem Käfige, welcher mit angehängtem Harzerbauerchen als Nistgelegenheit, sowie mit allerlei Baustoffen versehen war. Bald aber zeigte sich der Heckkäfig für die außerordentliche Lebhaftigkeit dieser Vögel als viel zu enge, sodaß ich sie nothgedrungen in die Vogelstube versetzen mußte. Hier konnte ich erst ihre wirklich merkwürdige Lebendigkeit bewundern. Das war ein fortwährendes Jagen, Fliegen, Schlüpfen durch alle Sträucher und alle Ecken der Stube mit quecksilberner Ruhelosigkeit, wobei Kopf, Schwanz, Flügel, kurz und gut der ganze Körper in emsigster Bewegung blieben. Dabei ließ das Männchen seinen Gesang erschallen, welcher dem der Feldlerche gleicht, nur weit schneller vorgetragen wird und den ich dem des Kanarienvogels keineswegs ähnlich finden kann. Beim Anfang einer jeden Brut beginnt stets das wechselnde Jagen, bei welchem bald das Weibchen, bald das Männchen der Verfolgte ist und währenddessen die Stoffe zum Nestbau eingetragen werden. Das Weibchen baut fast allein, wohingegen das Männchen nur wie zum Zeitvertreib einen Halm umherschleppt; dabei schlägt das letztre aber fortwährend mit den Flügeln, jagt das Weibchen, fordert es dann unter lautem Gesang und mit förmlich krampfartig zitterndem Körper zu ehelichen Liebkosungen auf; dabei hat es die Augen halb geschlossen, hält den Kopf zurückgebogen, die Flügel herabhängend und in zitternder Bewegung, wie ein soeben flügge gewordner junger Sperling, der die Alten um Futter anbettelt. Dann jagt es das Weibchen wieder, bis auch dieses mit zitternden Flügeln und fächerartig emporgerichtetem Schwanze zur Begattung sich hinsetzt. Erfolgt solche aber nicht, so fährt das Weibchen furienwild auf das Männchen los und im tobenden Kampfe drehen sie sich wirbelnd um einander, sodaß sie die Bewohnerschaft der ganzen Vogelstube in Schrecken versetzen. Noch tobender aber beginnt dann die Jagd des erzürnten Weibchens hinter dem Männchen, welches jetzt durch die ganze Vogelstube gejagt wird, bis es in tödtlichster Angst und Erschöpfung zugleich im dichtesten Gebüsch, in irgend einem Schlupfwinkel, selbst im Wasser des Badebeckens, eine Zuflucht sucht vor der Wuth der Xanthippe. Höchst sonderbar ist es dabei, daß das verfolgende Weib von Zeit zu Zeit sich immer wieder hinsetzt

und in beschriebner Weise den Gatten zur Liebe einladet. Jedesmal naht er denn auch, erhebt wieder schwippend den Schwanz und umhüpft es mit sperlingsähnlichem: ter, ter! Erklärlicherweise ist der arme Wicht aber viel zu erschöpft und verängstigt, um ihrer Einladung folgeleisten zu können; bald fährt sie auch wieder auf ihn los, sodaß ganze Ballen seines gelben Gefieders in die Luft stäuben, und die tolle Hetze beginnt abermals. Dies wiederholte sich vor jeder Brut. Da nun drei Bruten hintereinander nicht weiter als bis zum Bau des fertigen Nestes gelangten und da diese Vögel nicht allein durch die Unruhe ihres Jagens, sondern auch durch anderweitige Störungen alle übrigen behelligen, so ist leicht zu ermessen, welchen großen Schaden sie in der Vogelstube anrichten. Auch ohne Ursache machen sie sich in den Nestern anderer zu schaffen; denn obwol sie selber nicht zum Nestbau schritten, sondern nur beiläufig sich mit Baustoffen, namentlich dünnen Strohhalmen, umhertrugen, so störten sie doch durch ihr zudringliches Wesen viele Brutvögel und verscheuchten dieselben von ihren Nestern. Auch außerdem zeigten sie sich sehr bösartig gegen die kleineren Genossen, indem sie bald einen Tigerfink am Schwanze packten und zappeln ließen, bald ein Elsterchen am Flügel aus seinem Nistkasten hervorholten oder einen andern ahnungslos am Fenster sich sonnenden kleinen Prachtfink mit grausamen Schnabelhieben überfielen. Diese Neckereien mögen den Brasilianern viel Vergnügen gemacht haben, den kleinen Betroffenen aber kamen sie jedenfalls weniger spaßhaft vor, und ich mußte der Sache ein Ende machen dadurch, daß ich die Störenfriede herausfing und sie zu einem Par rother Kardinäle in eine Bodenkammer sperrte. Doch selbst diese jedenfalls sehr streitbaren und fast doppelt so großen Vögel, welche ich ebenfalls um ihrer Unverträglichkeit willen aus der Vogelstube entfernt hatte, wurden nicht selten vom Männchen am Futterkorbe angegriffen und mußten seinem Ungestüm das Feld räumen."

Das Nest wird auch in der Vogelstube jedesmal in einem Nistkasten oder in einem Webervogelnest angelegt, und wenn sie nicht das bereits fertige eines andern Vogelpärchens beziehen, so wird es nur nachlässig aus Bast- und Papierstreifen, Agavefasern und dünnen Reiserchen geformt und mit Thier- oder Pflanzenwolle dünn gepolstert. Beide Gatten des Pärchens brüten abwechselnd, zuweilen auch gemeinsam. Beim geringsten Geräusch schlüpfen sie sogleich aus dem Neste. Die Brutdauer währt 14 Tage und die Jungen zeigen einen dunkelgrünlichen Nestflaum. Sie werden mit Ameisenpuppengemisch und gequellten Sämereien gefüttert. Außerhalb der Nistzeit fressen die Alten übrigens fast nur Hirse, Kanariensamen, Grünkraut und kaum hin und wieder etwas von dem Eigemisch. Das Jugendkleid gleicht ziemlich ganz dem des alten Weibchens, doch ist es viel mehr schwach grünlichgrau ohne den gelben Anflug. Nach der ersten Mauser, welche im Spätsommer eintritt, erscheinen sie wenig verändert, nur etwas heller.

Erſt nach einem runden Jahre, in der Zeit, in welcher die Alten wieder zu niſten beginnen, verfärben ſich die jungen Männchen durch allmäliges Hervortreten der ſchönen gelben Farbe, namentlich an Bruſt, Hals und Schultern; doch erſt im dritten Jahre hat der Vogel ſeine volle Pracht erlangt.

In jedem Sommer machen ſie mindeſtens drei Bruten und beginnen mit der erſten, wenn die Vogelſtube geheizt wird, bereits im Februar. Herr Dr. Hansmann beobachtete, daß ein Pärchen auch bei nur 10 Grad R. Wärme eine Brut glücklich erzog. Bei Herrn Leuckfeld brachte ein Pärchen in einem Sommer 23 Junge zum Flüggewerden. Schon in den Jahren 1863—65 hatte Herr Dr. Max Schmidt im Thiergarten zu Frankfurt a. M. den Safranfink glücklich gezüchtet. Seitdem iſt dies ja auch von Anderen vielfach geſchehen, und die Zucht kann recht einträglich ſein, da das Pärchen bei den Händlern noch immer im Preiſe von 15 bis 18 Mark ſteht und man es alſo mindeſtens für die Hälfte bis Zweidrittel bei jenen und für den vollen Preis an Liebhaber zu verwerthen vermag. Wol zu beachten iſt es aber, daß man die Zucht entweder im geräumigen Käfige oder in einer nur von größeren Vögeln, Webern, mancherlei Papageien u. a. bevölkerten Vogelſtube betreiben darf.

Der Safranfink wird von den Händlern auch braſilianiſcher oder braſiliſcher Kanarienvogel genannt. — Canario der Braſilianer, Goldkanarienvogel auf Jamaika. — [Guirnegat oder braſilianiſcher Ammer nach Buffon; Braſilianiſcher Emmerlingsvogel und gelber Geſangsſperling, nach alten Autoren].

Le Chardonneret à front d'or ou Bouton d'or; Saffron Finch; Geele zanger of Chanteur du Brésil, Kanarie van Brazilië.

Nomenclatur: Emberiza brasiliensis, *Gml.*, *Bff.*, *Lth*; [Emberiza flaveola, *L.*]; Passerina flava, *Vll.*; Linaria aurifrons, *Lss.*; Sycalis brasiliensis, *Cb.*, *Tschd.*, *Schmb.*, *Brmst.*, *Eul.*, *Hltz.*, *Strnb.*, *Br.*; Fringilla brasiliensis, *Spx.*, *Pr. Wd.*, *Eul.*; Crithagra brasiliensis, *Bp.*, *Gndl.*; Sycalis flaveola, *v. Plzln.*, *Scl.*, *Brlpsch.* [Passer brasiliensis, *Wllghb.*; Bruant de Brésil, le Guirnegat, *Buff.*; Moineau paille, *Maud.*]. — Chuy, *Azr.*; Guiranheem gatú, *Markg.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Stirn und Oberkopf lebhaft orangegelb, Nacken und Rücken grünlichgelb; Schwingen ſchwarzbraun, grüngelb gerandet, unterſeits gelblich, innen breit gelb geſäumt; Schwanzfedern ſchwarzbraun, grüngelb gerandet, unterſeits gelblich; Kehle, Bruſtmitte, Bauch und Steiß dottergelb; Bruſtſeiten grünlich überlaufen. Schnabel bräunlichgrau, Unterſchnabel gelblich; Auge braun; Füße bräunlichfleiſchfarben. Weibchen lerchenfarben, jede Feder mit dunklerem Schaftfleck; Flügel- und Schwanzfedern blaß gelblichgrün gerandet; Kehle und Vorderhals weiß; Oberbruſt, Bauchſeiten und Steiß gelb mit graubraunen feinen Schaftſtrichen; Unterbruſt und Bauchmitte weißlich; Schnabel und Beine heller als beim Männchen gefärbt. — Jugendkleid: grünlichlerchengrau, Kehle und Oberbauch weißlich, Unterſeite gelblich; alle Federn mit dunklerm Schaftſtrich; Schwingen innen gelb geſäumt. (Nach Burmeiſter).

Fringilla brasiliensis: fronte pileoque laete aurantiis, cervice dorsoque virente flavis; remigibus fuscis viride flavo-marginatis, pogonio lateris inferioris flavidi interiore late flavo-marginato; rectricibus fuscis, viride flavo-marginatis, subtus flavidis; gula, pectore medio, ventre crissoque vitellinis; hypochondriis viridule afflatis; rostro fumido, mandibula flavida; iride fusca;

pedibus umbrino-carneis. — ♀ fumigato-umbrina, obscure striata; remigibus rectricibusque dilute flavido-viride marginatis; gula colloque albis; jugulo, hypochondriis crissoque flavis, fumido-striolatis; epigastrio ventreque medio albidis; rostro pedibusque quam maris dilutioribus.

Länge $16,_2$ cm.; Flügel $7,_8$ cm.; Schwanz $4,_6$ cm.

Juvenis: virente fumida; gula abdomineque albidis; subtus flavida, obscure striata; remigibus interius flavido-limbatis.

Beschreibung des Eies: Grundfarbe hellbraun mit zahlreichen sepiabraunen Flecken und Punkten, welche oft sehr groß werden und das ganze Ei ohne Ordnung bedecken. Am stumpfen Ende stehen sie mehr gedrängt; die ganze Zeichnung ist so dicht, daß die Grundfarbe kaum erscheint. Die Gestalt ist normal, große Axe 20 mm., kleine Axe $15,_5$ mm., Scheidepunkt $10,_5$ mm. (Gundl.). Grundfarbe bläulich, Zeichnung, bräunlichschwarze und verwaschene blaugraue Flecke, welche theils klein, theils groß, meistens länglich, vom Grunde, wo sie sich am größten und gehäuftesten zeigen, ausgehend, nach und nach kleiner werden und sparsamer strahlenförmig bis zur Spitze sich verbreiten. Länge 18—19 mm., Breite 13—14 mm. (L. Holtz). Grundfarbe weiß, Fleckung dem Sperlingsei gleich, über die ganze Oberfläche; einige Eier heller als andere. Gestalt eiförmig; matt; Länge 19 mm., Breite 15 mm. (Nehrkorn). Auch Sternberg sagt, daß die Eier denen des Sperlings ähnlich sind. In der Vogelstube gleichen die Eier der jüngeren Weibchen der Beschreibung Nehrkorn's und zuweilen waren sie fast weiß, nur spärlich gefleckt. Die der alten Weibchen dagegen gleichen regelmäßig der Beschreibung Gundlach's und daher erachte ich diese als die normale.

Ovum: badium punctis maculisque numerosis, saepe permagnis, in fundo arctioribus obsitum (Gundlach). — Ovum coerulescens maculis subfusco-nigris cluteque cinereis, parte minoribus, parte majoribus, plurimis longiusculis, a fundo ad apicem versus radiate dispersis sensimque minuentibus (Holtz). — Ovum album ovi passerini instar maculatum (Nehrkorn).

Der kleine Safranfink [Fringilla Hilairi]. „Beträchtlich kleiner als die vorige Art, mehr vom Ansehen des Hänflings, weil auch der Schnabel feiner, kürzer, zierlicher ist. Gefieder am ganzen Rücken lerchengrau, jede Feder mit dunklerer Mitte; Schwingen- und Schwanzfedern breiter braungrau, unten nicht gelblichgrau, sondern weißlichgrau, außen fein gelblichgrau gerandet, nur die Schwingen grünlicher am Rande; Innensaum der Schwingen weißlich. Ein Fleck am Zügel vor dem Auge, der obere Rand der Ohrdecken und die ganze Unterseite zitrongelb, die Seiten der Brust und des Bauches grau durchscheinend, Steiß blasser gelb. Lebt im Innern Brasiliens auf dem Kamposgebiet und ist hier, wie es scheint, weit verbreitet; wenigstens von Minas-geraes, wo A. de St. Hilaire ihn fand, bis Guinea, von wo Cabanis ihn beschreibt." (Burmeister).

Die Ornithologen hatten noch einige andere Arten unterschieden, welche jedoch nur so geringe besondere Merkmale zeigen, daß sie mit diesem oder dem vorigen als völlig übereinstimmend erachtet werden dürfen. So namentlich ein Safranfink von Kolumbien [Sycalis columbiana, *Cab.*] und der kleinste Safranfink [S. minor, *Cab.*], welcher erstre im Heine'schen Museum sich befindet, während der letztre in Schomburgk's Reise beschrieben ist. Im Handel kommen zuweilen bedeutend kleinere Safranfinken vor, doch habe ich an denselben so ver-

ſchiedene Merkmale, daß ſich ſelbſtändige Arten aufſtellen ließen, nicht auffinden können. In der Literatur iſt näheres über ſie nicht vorhanden. — Crithagra Hilarii, *Bp.*; Sycalis Hilarii, *Cb., Brmst.*

Der gelbbäuchige Girlitz [Fringilla luteiventris].

Der nächſte Verwandte des Safranfink erſcheint im Vogelhandel äußerſt ſelten. Er iſt oberhalb dunkelbraun, jede Feder fahl geſäumt; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fein weiß geſäumt; Bürzel olivengrünlichgelb; Zügel und Augenring hochgelb; Kopf- und Halsſeiten bräunlichgraugrün; Unterſeite lebhaft gelb; Auge braun; Schnabel hornfarben, Unterſchnabel heller; Füße gelblichbraun. Weibchen übereinſtimmend, nur düſterer, grünlichgraugelb an der Unterſeite. Größe des gelbſtirnigen Girlitz. Seine Heimat iſt der Weſten von Südamerika, Gray giebt Südpatagonien, Peru und Ekuador an; v. Bibra beobachtete ihn in Santjago und auf den Kordilleren; Burmeiſter traf ihn bei Parana und Tukuman häufig. Sternberg beobachtete ihn im November 1867 in der Umgebung von Buenos-Ayres; er fand mehrere Neſter und eins derſelben auch vom Seidenſtar (Sturnus — Molothrus — bonariensis, *Gml.*) belegt. Das Neſt ſtand in einer baumfreien Gegend, welche mit Diſteln u. a. Kräutern und hohem Graſe bewachſen war, nur 30 cm. hoch zwiſchen dichten Pflanzenſtengeln und Grashalmen und war außen aus Wurzeln und Gräſern ziemlich dickwandig, doch nur loſe gewoben, innen mit zarten Gräſern, Würzelchen und Faſern, ſowie einigen Pferdehaaren recht tief und ſehr ſorgfältig glatt gerundet. Das in der letzten Hälfte des Novembers gefundene Gelege beſtand immer in drei bis fünf Eiern. L. Holtz beſchreibt die Eier als weiß, ſchwach bläulichgrünlich ſchimmernd mit braunen, weinröthlichen, verwaſchen blaugrauen und violetten Flecken gezeichnet. Näheres iſt über das Freileben nicht bekannt.

Dr. Franken, welcher ein Männchen beſaß, lobt ſeinen Geſang nicht beſonders; v. Schlechtendal bezeichnet denſelben aber als eigenthümlich ſchwirrend, ſowol an den des Heuſchreckenſängers, als auch an den des einheimiſchen Girlitz erinnernd. Im Herbſt 1876 erhielt ich von Chs. Jamrach in London ein Pärchen, welches jedoch ſo krankhaft ankam, daß beide bald eingingen. Im zoologiſchen Garten von London iſt er ſeit 1873 vorhanden. Sollte der Vogel demnächſt im Handel häufiger erſcheinen, ſo würde er wol als eine erwünſchte Bereicherung der Vogelſtuben gelten können, da er ungleich ſanfter und friedlicher als ſein Verwandter ſich zeigt. Leider iſt bis jetzt dazu wenig Ausſicht, da die meiſten braſiliſchen Vögel uns nur in geringer Anzahl zugeführt werden.

Der gelbbäuchige Girlitz iſt von Br. Goldzügel benannt. — Chipiu (Heimatsname, nach Burmſt.). — Le Chardonneret à ventre jaune, Yellow-bellied Finch.

Nomenclatur: Fringilla luteiventris, *Meyen;* Sycalis luteiventris, *Cb., Gr., Brmst., Strnb, Hltz., Br.;* Sycalis arvensis, *Scl.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 409.

Fringilla luteiventris: supra fusca pluma quaque livide limbata; remigibus et rectricibus fuscis albido limbatis; uropygio olivaceo-virescente; subtus laete flava; loris annuloque oculari luteis; lateribus capitis collique fumigato-viridibus; iride umbrina; mandibula rostri cornei dilutiore; pedibus fulvido-fuscis. — ♀ conveniens, tantum obscurior; subtus virente livida.

Der Kubafink [Fringilla canóra].

Mit dem herandämmernden Abend wird es ſtill in der Vogelſtube. Die letzten Schreier, einige Keilſchwanzſittiche, haben ſich zur Ruhe in die Niſtkäſten zurückgezogen; hin und wieder ertönt noch das rauhe ſchäk, ſchäk der Bayaweber, und kleine Prachtfinken wiſpern im Dickicht. Auf dem Raſen liegen die Regen- und Argoondawachteln, und von Zeit zu Zeit erhebt ſich ein Männchen und läßt ſein melodiſches tikterik erſchallen. So erſtirbt ein Laut nach dem andern. Plötzlich aber hören wir dicht neben uns einige ſchrillockende Töne, und aus einem in Kiefernzweigen hängenden weberartigen Neſte kommen ein Par Vögelchen hurtig hervor, nicht aber in der Weiſe der zuletzt geſchilderten Finken einander befehdend und jagend, ſondern in jener unendlichen Zärtlichkeit, welche die kleinen Aſtrilde zeigen, immer dicht neben einander. So eilen ſie nach dem Futterplatz, ſind hier ſehr eifrig thätig und ſchlüpfen dann in das Neſt zurück. Bald darauf erſchallt in demſelben das Zirpen der Jungen, welche in voller Dunkelheit von den Alten geätzt werden. Am nächſten Morgen finden wir dieſen Vogel, den kleinen Kubafink, bereits in aller Frühe wieder munter; er zählt zu den anmuthigſten und ſchönſten Bewohnern der Vogelſtube. In ſeiner geringen Größe, Beweglichkeit, ſowie im ganzen Weſen iſt er den kleinſten Prachtfinken außerordentlich ähnlich, während er doch keineswegs zu dieſer Unterfamilie der Finken gehört, welche in ſeiner Heimat, Amerika, bekanntlich garnicht vertreten iſt.

Sein olivengrünes Gefieder wird durch die ſammtſchwarze Färbung des Geſichts und der Bruſt, namentlich aber durch einen breiten, lebhaft ſchwefelgelben, im Nacken nicht zuſammenreichenden Halskragen ungemein geziert. Der Schnabel iſt glänzend ſchwarz und das Auge dunkelbraun. Das Weibchen iſt düſter bräunlicholivengrün und hat nicht wie das Männchen ein lebhaft ſchwefelgelbes, ſondern nur ein bräunlichgelbes Halsband; ſeine Bruſt iſt düſter ſchwärzlichbraun. Die Größe ſtimmt mit der des grauen Aſtrild überein. Seine Heimat iſt die Inſel Kuba.

Die alten Schriftſteller geben nichts bemerkenswerthes über ihn an. Bechſtein erwähnt ihn ganz kurz, ſagt, er komme aus Mexiko und lobt ſeinen ſanften, flötenartigen Geſang; er ſei in ſeinem Betragen lebhaft und artig; man ſtecke ihn in einen Käfig und füttere ihn mit Kanarienſamen und Hirſe. Leider giebt er nicht an, in weſſen Beſitz ſein ‚braunwangiger Kerubeißer‘ ſich befunden und

welchen Preis derselbe damals gehabt. Gmelin hatte als Heimat auch Mexiko angenommen; Dr. Gundlach berichtigt dies aber und schildert ihn in folgendem: „Diese Art scheint nur auf der Insel Kuba vorzukommen und durch Gmelin's falsche Angabe des Vaterlandes mag Vigors sie nicht erkannt und ihr einen neuen Namen gegeben haben. Der Vogel lebt vorzugsweise in den Steppen und an Bachufern und erscheint nur zuweilen in bebauten Gegenden. In manchen Orten kommt er garnicht vor, während man dort den nahe verwandten größern Kubafink zahlreich sieht, an anderen wiederum trifft man nur ihn. Obwol er jenem in vieler Hinsicht gleicht, so hat er doch eine abweichende Lebensweise, z. B. findet man ihn stets in Pärchen und wo einer sich zeigt, wird man auch den andern bemerken. Sie setzen sich meistens unmittelbar neben einander und man könnte für sie die Bezeichnung Inseparables anwenden. Sodann nistet der Vogel meistens auf dünnzweigigen Bäumen, im Dickicht, höher vom Boden als der Verwandte und baut auch ein größres Nest. Er läßt nicht ein bloßes Zwitschern, sondern einen kurzen, lauteren Gesang hören. Daß er aber wie ein Kanarienvogel singen lerne, wie Don Esteban Pichardo angiebt, ist sicher nicht richtig. Man kann ihn in Käfigen halten und sind diese groß, so sieht man ihn auch nisten. Sollte einer sterben, so muß man ihn schnell entfernen, denn im andern Falle gehen bald mehrere zugrunde, vielleicht aus Trauer. Die Nahrung besteht in Sämereien, besonders in Grassamen, aber auch aus zarten, saftigen Pflanzen, z. B. wildem Portulak. Das Nest hat eine kugelige Gestalt und wird aus trockenen Kräutern, Würzelchen, Haren, Thier- und Pflanzenwolle, Federn u. a. m. hergestellt und innen weich ausgepolstert." Näheres über das Freileben und die Brut ist nicht bekannt; um so ausführlichere Berichte liegen aus der Vogelstube vor. Ohne mich zu irren, darf ich wol behaupten, daß ich in der meinigen auch diese Art zuerst gezüchtet habe. Dies ist dann bald auch in mehreren anderen geschehen und ich bringe zunächst den Bericht des Herrn Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz.

„Ein von Ihnen erhaltnes Kubafink-Pärchen bezog in meiner Vogelstube sogleich das bei Ihnen begonnene Nest, welches Sie mir nebst dem Strauch, in dem es hing, mitgeschickt hatten, und baute es vollkommen aus. Dasselbe war von runder Gestalt mit langem röhrenartigen Eingang von unten herauf. Kaum hatte ich gehofft, daß die Vögelchen wirklich zur Brut schreiten würden, weil sie soviel außerhalb des Nestes sich aufhielten, daß ich glauben mußte, die Eier würden verderben. Nichtsdestoweniger flogen eines Tags die Jungen aus oder richtiger gesagt, sie waren herausgehüpft, denn fliegen konnten sie noch nicht, als sie das Nest verließen. Sie wurden jedoch von den Alten sorgsam bis zum vollen Flüggewerden weiter gefüttert. Ihr Nest nahm nun ein Madagaskarweber inbeschlag, riß es auseinander und baute es in seiner Weise um. Die Kuba-

finken errichteten in einem Strauch hoch oben an der Decke ein neues und zwar ein flaches, tellerartiges Nest und brachten auch in diesem wieder eine Brut glücklich zum Ausfliegen. Da sie aber späterhin regelmäßig ihre Nester in der erstangegebnen Gestalt hergestellt haben, so kann ich wol annehmen, daß dies letztre Nest nur gleichsam ein Nothbau war, den sie infolge der Befehdungen seitens der Weber- oder anderer Vögel angelegt hatten. Ich will nun eine Brut nach ihrem gewöhnlichen Verlauf beschreiben. Das Pärchen baut am liebsten in recht feines, dichtes Geäst, z. B. in einen Haufen zusammengesteckter Spargelzweige. Das Nest hat in der Regel die Gestalt einer Retorte mit einer langen, gebognen Röhre als Eingang. Am willkommensten dazu sind den Vögeln kurzgeschnittene Roßhare, ganz feine Grasrispen, Agavefasern und feine Schalenstückchen von Birken. Dies alles schleppt vorzugsweise das Männchen zusammen; es fliegt nicht mit einem einzelnen Halm zu Neste, sondern erst, wenn es den Schnabel ganz voll gesammelt hat. Das Weibchen trägt gleichfalls ein, doch hauptsächlich nur Moos und kurze spreuartige Stoffe. Beide bauen sehr fleißig und paren sich in dieser Zeit oft. Mit großem Muth vertheidigt das Männchen sein Nest gegen jeden Vogel, selbst gegen viel größere; überhaupt sind während des Nistens beide sehr bösartig, jedoch nur in der Nähe des Nestes und am Futtertisch. Bei mir haben sie niemals mehr als vier Eier gelegt. Sie brüten anscheinend unzuverlässig, denn ihre Lebhaftigkeit und Hurtigkeit treibt sie alle Augenblicke von den Eiern; doch lieben sie die Brut sehr und sind nicht empfindlich gegen das Besichtigen des Nestes. Nach 11 Tagen kriechen die Jungen aus, aber etwas ungleich, sodaß es manchmal auch 13 Tage währt. Sehr bald hört man das Wispern derselben und nun füttern die Alten ungemein fleißig. Vorzugsweise gern nehmen sie frische kleine Ameisenpuppen und in der Zeit, in welcher diese zu erhalten sind, haben sie bei mir die meisten Bruten glücklich aufgebracht; sonst verschmähen sie auch das Eifutter nicht. Ungemein früh verlassen die Jungen das Nest, oft bereits, wenn die Flügelfedern noch garnicht aus den Kielen hervorsprießen; dann können sie natürlich noch nicht fliegen, sondern suchen sich, beständig zirpend, auf der Erde ein versteckes Plätzchen. Bisher habe ich noch nicht feststellen können, nach wie vielen Tagen sie eigentlich aus dem Neste schlüpfen. In den meisten Fällen konnten sie dann wol schon fliegen, sahen jedoch immer noch sehr nackt und dürftig aus. Sobald die Jungen ausgeflogen sind, fangen die Alten sofort wieder an, das Nest auszuputzen, oder sie tragen es ab, um es anderwärts hinzubauen. Die Zahl der Nestlinge in den vielen bei mir flügge gewordenen Bruten war verschieden, zwischen 1—4 Köpfen. Bis zur ersten Mauser behalten sie das düstre Kleid, dann zeigt sich zuerst die schwärzliche, immer dunkler werdende Larve, ebenso die Färbung der Brust und zugleich wird der anfangs sehr schmale gelbe Streif allmälig breiter. Je älter der Vogel wird,

einen desto größern Umfang nimmt dieser gelbe Kragen ein. Vorsichtigerweise muß man es vermeiden, die Jungen von den Alten fortzunehmen, wenn man sie nicht für immer trennen will. Denn sobald sie nur einen Tag herausgefangen und allein eingesperrt worden, darf man sie nicht wieder zu den letzteren fliegen lassen, weil dieselben nun plötzlich sich so böse gegen sie zeigen, daß sie nicht eher ruhen, als bis einer der kleinen Zukömmlinge nach dem andern todt ist. Und das ist leicht erreicht, denn dieselben sind ungemein zart, während die Alten doch als sehr kräftige, ausdauernde Vögel gelten dürfen. Auf solche Weise habe ich früher mehrere verloren, indem sie vom alten Wütherich so lange gejagt wurden, bis sie vor Angst zur Erde gefallen und luftschnappend in wenigen Minuten todt waren. Auch die jungen Männchen fangen, sobald sie sich verfärben, gefährlichen Streit selbst im kleinen Käfige mit einander an."

Diese hübsche Schilderung ergänzt Herr Kaufmann Emil Gäbel in Graudenz in folgendem: „Wer Kubafinken in der Vogelstube züchten will, halte es von vornherein als Nothwendigkeit fest, daß er niemals mehr als ein Pärchen frei fliegen lasse. Die Unverträglichkeit und Zanksucht zwischen Hartlaubszeisig und Graugirlitz, welche mitunter so weit geht, daß einer von ihnen auf dem Platze bleiben muß, ist garnicht zu vergleichen mit der Unruhe, Heftigkeit und Kampflust eines zur Zeit der Liebe erregten Pärchens dieser Finken. Das Männchen zaust und jagt selbst bedeutend größere Vögel mit Wuth aus der Nähe seines Nestes fort. Letztres ist ein wahrer Kunstbau und wird nach meinen Erfahrungen keineswegs immer in gleicher Weise hergestellt, sondern sehr verschieden angelegt, obwol die retortenähnliche Form mit mehr oder minder wagerechter Flugröhre, welche zuweilen bis 40 cm. lang, und darunter mit einem straußeigroßen, gefilzten Beutel, am häufigsten ist. Eine zweite Gestalt des Nestes ist ein großer gefilzter Beutel mit dem Eingange von oben. Bei diesem letztern sind die Wandungen stets dichter und dicker gewebt, als bei dem erstern. Als Baustoffe werden mit Vorliebe lange Baststreifen, Kokus- und Agavefasern verwendet. Das Innere ist zwar geglättet, doch keineswegs so weich ausgepolstert, als man angesichts der Zartheit dieser reizenden Vögelchen annehmen möchte. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. Die Jungen machen sich, nachdem sie etwa 8 Tage alt sind, durch ein sehr lautes, charakteristisches Zirpen bemerkbar. Kaum einigermaßen befiedert, halbnackt und ohne Schwänzchen fliegen sie aus und sind so behend, flink und quecksilbern als die Alten, von denen sie solange, bis sie selber fressen können, geführt, mit ungemeiner Liebe beschützt und mit wahrhaftem Todesmuth gegen die Angriffe anderer Vögel vertheidigt werden. Nur zu bald aber verwandelt sich diese innige Hingebung in das schroffste Gegentheil; sie dürfen sich, sobald die Alten die zweite Brut begonnen haben, nicht dem Nest nähern und werden, wenn es geschieht, vom alten Männchen mörderisch überfallen und nicht

ſelten getödtet. In ſolcher Weiſe verlor ich anfangs zahlreiche prächtig gediehene Junge und erſt durch den Schaden bin ich klug geworden. Man muß ſie eben beizeiten herausfangen. Im übrigen aber empfehle ich dieſe allerliebſten Vögelchen allen Liebhabern mit der Verſicherung, daß jeder Züchter ſeine Freude an ihnen haben wird."

Dieſen Mittheilungen kann ich noch folgende anfügen. Im Handel gehörte der Kubafink von jeher zu den ſelteneren, in neuerer Zeit aber auch zu den koſtbareren, weil vielgeſuchten Stubenvögeln. Trotz vielfacher Züchtung und regſamen Verkaufs iſt ſeit dem Beginn der ſiebenziger Jahre der Preis für ein Pärchen von 18 Mark bis auf 24 Mark, und wenn ſie längere Zeit fehlen, ſelbſt bis auf 30 Mark geſtiegen. Er wird von allen Großhändlern, jedoch nur einzeln oder in wenigen Pärchen eingeführt. Neuerdings hat ihn Schoebel in Grünau bei Berlin am zahlreichſten in den Handel gebracht, doch iſt es noch in letzter Zeit vorgekommen, daß derſelbe ein Männchen der nachfolgend beſchriebnen größern Art als Weibchen abgegeben hat — ein Irrthum, welcher früher bei allen Händlern ſich zeigte, weil nämlich die Weibchen beider Arten eher als die Männchen den Reiſebeſchwerden erliegen und daher viel ſeltner ſind. Die Beliebtheit dieſes Vogels begründet ſich in der leichten Züchtbarkeit und den gerühmten Eigenthümlichkeiten; von einem Geſange kann dagegen in Wirklichkeit keine Rede ſein, trotzdem man ihn ſo gern Chanteur de Cuba nennt; man hört ſelbſt in der Liebeszeit nur leiſes Pfeifen und Wiſpern. In ſeinem ganzen Weſen hat er, wie bereits eingangs erwähnt, überaus große Aehnlichkeit mit den Aſtrilden, und der Bau des überwölbten Neſts, ſowie der Umſtand, daß das erſte Pärchen in meiner Vogelſtube reinweiße Eier legte, führten mich bereits zu der Annahme, daß er ein Mittelglied, bzl. ein Vertreter der Prachtfinken in Amerika ſei. Nähere Beobachtung ergab dann aber das irrthümliche dieſer Anſicht, zumal, wie in den vorhergegangenen Schilderungen zu erſehen iſt, auch zahlreiche andere verwandte Finken, namentlich in ihren erſten Bruten, weiße Eier legen, wie überhaupt die Eier aller dieſer Vögel in der Vogelſtube und im Freien außerordentlich abändern. — Eigentlich bösartig, ſodaß ſie Genoſſen in der ganzen Vogelſtube verfolgten, ſind ſie durchaus nicht, ſondern eben nur in der Umgebung des Neſtes zeigen ſie ſich ſehr biſſig. Der Bau wird gewöhnlich in 6—8 Tagen vollendet und ſonderbarerweiſe verlaſſen ſie, bevor das erſte Ei gelegt worden, denſelben bei jeder Störung leicht und beginnen an einer andern Stelle oder auch für längere Friſt garnicht zu niſten. Beide Gatten des Pärchens brüten nicht abwechſelnd wie die meiſten Verwandten, ſondern in der Regel gemeinſam zu gleicher Zeit. Die ganze Brut vom erſten Ei bis zum Flüggewerden der Jungen rundet ſich ziemlich regelmäßig auf 4 Wochen ab. Ich habe den Kubafink im Käfige ebenſowol als auch in der Vogelſtube mit gutem Erfolg gezüchtet. Er

zeigt sich sehr ausdauernd und erhält sich auch im ungeheizten Raume über Winter vortrefflich.

Der Kubafink, kleine Kubafink oder Gelbkragen, heißt auch Goldkragen (Br.). — Im östlichen Theile der Insel Kuba Senserenico, im westlichen Tomeguin del Pinar (Gundlach). — Braunwangiger Kernbeißer (Bechstein). — Le Bouvreuil olive ou sincerini et le Chanteur de Cuba; Melodious Finch.

Nomenclatur: Loxia canora, *Gml.*, *Bchst.*; Pyrrhula collaris, *Vgrs.*; Passerina collaris, *Lmb.*; Euethia canora, *Cb.*, *Gndl.*, *Br.*; Fringilla canora, *Thnm.* [Brown-cheeked Grosbeak, *Lth.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb olivengrün; Stirn, Wangen, Kehle und Brust schwarz; Scheitel grau; oberhalb des Auges entspringt eine prächtig gelbe Linie, geht hinter dem Ohre fort, erweitert sich dann und vereint sich fast unterhalb der Kehle in eine Art von Halsband; die Federn dieses männlichen Schmucks können sich etwas sträuben; Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun mit olivenfarbigen Rändern; Unterseite bräunlichgrau, von der Mitte des Bauchs an fast reinweiß. Schnabel glänzendschwarz; Auge dunkelbraun; Füße hellbräunlichgrau. Weibchen: Das Olivengrün ist weniger rein; Kopf, Wangen und Kehle sind grau, rostbraun angeflogen und an der Kehle schwarz gescheckt; die Farbe des Halsbands ist blaßgelblichbraun; der Brust fehlt die schwarze Farbe. Das junge Männchen gleicht dem Weibchen, aber die Färbung ist unrein. (Gundlach).

Das Männchen ist oberhalb olivengrün, die aschgrauen Flügelschwingen haben schmale gelblicholivengrüne Außensäume, sodaß der zusammengelegte Flügel ebenfalls olivengrün erscheint; Schwanz oberseits olivengrün, unterseits aschgrau, die beiden äußersten Federn oberhalb mit lebhaft gelblicholivengrünem Außenrande; Oberkopf dunkelgrünlichaschgrau; Stirnrand, Gesicht, Wangen, Kehle reinschwarz; vom Kopf oberhalb des Auges hinunter über's Ohr um die Backen ein sich immer mehr verbreitendes safrangelbes Band, welches am Halse am breitesten ist; Brust schwarz, nach dem Unterkörper zu allmälig in Grau übergehend; Bauchiweißlichgrau, Seiten grünlich überhaucht; untre Flügelseite aschgrau; Hinterleib und Unterschwanzdecken grauweiß; Schnabel glänzendschwarz; Auge braun; Füße hellbräunlichgrau. Weibchen oberhalb graulicholivengrün, Flügel- und Schwanzfedern mit schmalen gelblicholivengrünen Außensäumen; Gesicht und Kehle schwärzlichgrau, umrahmt von einem breiten düsterrostbraunen Bande; Brust dunkelgrau; Unterkörper grau, untrer Hinterleib weißlichgrau. — Jugendkleid: Flaum weißlichgrau, Wachshautdrüsen gelblichweiß; Gefieder beim Verlassen des Nestes oberhalb düster bräunlicholivengrün; das Halsband blaßgelb, doch bei den jungen Männchen bereits deutlich hervortretend; Gesicht und Brust schwärzlichbraun; Unterseite fahlgrau; Schnäbelchen fahlbraun. (Ruß).

Fringilla canóra: supra olivaceo-viridis, marginibus externis remigum cinereorum e flavido olivaceo-viridibus; rectricibus supra olivaceo-viridibus, subtus cineraceis, extimis ambabus exterius virente-olivaceo-marginatis; pileo obscure subviride cinereo; margine frontali, facie, genis gulaque atris; fascia crocea a superciliis trans aurem circa genas deorsum dilatante, circa collum latissima; pectore nigro; abdomine cinerescente; crisso et infracaudalibus canis; rostro nitide nigro; iride fusca; pedibus subfumidis. — ♀ supra e fumido olivacea, marginibus exteris remigum et rectricum anguste luride virente marginatis, facie fasciaque lata hanc genasque subnigro-cinereas circumcludente sordide rufa; pectore obscure cinereo; subtus grisea, crisso cano.

Juvenis: lanugine subcana, glandulis cerae flavente albis; serius supra sordide olivaceo-virens, collari flavido; facie subfusca; subtus livide cinerea; rostro subfusco.

Länge 9,6 cm.; Flügelbreite 15 cm. (Gundlach).

Beschreibung des Eies: Gestalt ungleichhälftig, an der halbkugeligen Basis, nach der stumpfspitzen Höhe stark abfallend. Grundfarbe graugrünlichweiß mit sehr feinen und einigen größeren, meist in Gruppen vereinigten, nach der Höhe einzelner werdenden, nach der Basis

mehr gehäuften Fleckchen. Das Korn ist überaus zart. Länge 15—16 mm.; Breite 11—12 mm. (F. A. L. Thienemann). — Ei reinweiß, um das dicke Ende mit einem kleinen Kranz von grünlichen gespritzten Punkten, welche desto zahlreicher zu werden scheinen, je mehrere Eier der Vogel legt. (Graf York v. Wartenburg). — Ei grünlich- oder bläulichweiß, schwarz- oder rothbraun gepunktet; selten ganz reinweiß. (Ruß).

Ovum: a basi semiglobosa ad finem obtuso-acutum versus valde decrescens; virente canum maculis et subtilissimis et nonnullis majoribus, plerumque acervatim congestis, basin versus creberrimis; testa tenerrima (Thienemann). — Ovum albissimum punctulis subviridibus (C. York v. Wartenburg). — Ovum virente vel coerulescente album, nigro-vel rufo-punctulatum, rarius pure album (Russ).

Der größere Kubafink [Fringilla lépida]

stimmt mit dem vorigen fast völlig überein, ist jedoch ein wenig größer, und hat nicht den breiten gelben Kragen, sondern nur über und unter den Augen und neben der schwarzen Kehle lebhaft gelbe Streifen. Das Weibchen ist düstrer und zeigt nur schmale gelbe Augenstreifen. Im übrigen ist er ebenso munter und ersetzt reichlich durch Liebenswürdigkeit und Anmuth, was ihm an Farbenschönheit fehlt. Im Handel ist er keineswegs häufig und besonders das Weibchen muß als große Seltenheit gelten. In der Regel wird er nur einzeln mit dem Verwandten zusammen eingeführt; der Preis ist übereinstimmend.

Seine Heimat erstreckt sich nicht nur wie bei jenem blos über Kuba, sondern auch über andere Inseln der Antillengruppe, z. B. Jamaika, Portoriko und St. Domingo.

Buffon sagt nur, daß Linné ihn durch Jaquin kennen gelernt habe. Er halte sich in den Wäldern von Havana auf, werde leicht zahm und singe anhaltend mit so leiser Stimme, daß man dieselbe kaum hören könne, wenn man nicht ganz nahe bei ihm stehe. Die übrigen älteren Schriftsteller geben nichts näheres über ihn an. Bechstein erwähnt ihn nicht, Bolle dagegen führt ihn in seinem Verzeichniß als Kubavogel auf; auch sagt er gelegentlich seiner herrlichen Schilderung des Kanarienwildlings, daß er ihn in Berlin als wilden Kanarienvogel habe feilbieten sehen.

Auch über sein Freileben berichtet Gundlach eingehend: „Er ist Standvogel auf Kuba und gemein im Felde und in waldlosen Gegenden, weniger an Waldrändern und wol niemals kommt er tief in den Wäldern vor. Im Sommer und zur Nistzeit lebt er pärchen- oder familienweise, in der trocknen oder kalten Jahreszeit vereinigt er sich zu großen Scharen auf den Zuckerpflanzungen, wo er Zucker auf den Trockenplätzen frißt, oder auf den Kaffeepflanzungen, wo er ebenfalls Nahrung genug findet. Diese bilden im wesentlichen Sämereien, besonders Grassamen, sowie auch zarte saftige Pflanzenstoffe, namentlich wilder Portulak; begierig leckt er den Honigsaft aus großen Blumen. Niemals thut er dem Menschen Schaden. Man findet fast das ganze Jahr hindurch Nester mit Eiern

oder Jungen; ausnahmsweise auch in den Wintermonaten. Die eigentliche Niſtzeit beginnt aber erſt in der Regenzeit des Frühlings. Das Neſt ſteht faſt immer in geringer Höhe über dem Boden, in Sträuchern, Kaffee-, Orangenbäumchen u. a. Es iſt verhältnißmäßig groß, mehr oder weniger kugelig gebaut, mit einem Seiteneingange, und beſteht äußerlich aus trockenen Kräutern, Haren, Wolle, Federn, Würzelchen, Baumwolle u. drgl. und innen aus einer Lage weicher Stoffe, Pflanzenwolle, Federn u. a. m. Die Zahl der Eier beträgt zwei bis drei, nicht aber, wie d'Orbigny angiebt, fünf.

„Man kann ihn leicht im Käfige erhalten, und wenn dieſer groß iſt, auch züchten. Die Fütterung beſteht in Kanarienſamen und fein geſchrotnem Mais. Der Geſang hat keinen Werth; er iſt ſchwach und gleicht einigermaßen den Tönen, welche die Heuſchrecken hervorbringen. Außerdem hat er nur einen Lockton. Daß er, wie d'Orbigny behauptet, ſingen lerne, glaube ich nicht. Dieſe Angabe beruht ſicherlich auf einem Irrthum."

Bis jetzt iſt er bei uns in der Gefangenſchaft noch nicht gezüchtet, und es dürfte ſich kaum in irgend einer Vogelſtube ein richtiges Pärchen befinden. Dies iſt aber ſehr zu bedauern, denn es wäre doch höchſt intereſſant, zu beobachten, ob das niedliche Vögelchen mit ſeinem nächſten Verwandten in allen beſonderen Eigenthümlichkeiten übereinſtimmt.

Der größere Kubafink iſt auch Goldbraue (Br.) benannt und heißt bei den Händlern meiſtens nach ſeinem vaterländiſchen Namen Tomegin. — Tomeguin de la Tierra (im Weſten von Kuba); Chinchilita (im Süden; doch werden mit dieſem Namen dort alle kleinen Sänger bezeichnet); Vieidita (im Oſten) und Pechito (im äußerſten Oſten der Inſel); nach Gundlach. — [Havaniſcher Fink, Buffon].

Le Bouvreuil olivert ou sincerini et Grand Chanteur de Cuba; Olive-Finch.

Nomenclatur: Fringilla lepida, *L., Bff., Gml., Thnm., Bll.*; Emberiza olivacea, *L., Gml.*; Emberiza dominicensis, *Brss.*; Passerina lepida et P. olivacea, *Vll.*; Spermophila olivacea, *Gr.*; Euethia lepida, *Cb., Gndl., Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb olivenfarbig; vorderer Theil der Augenbraue, ein Fleckchen am untern Augenlid und der obere Theil der Kehle (Kinn) ſafrangelb; ein Streif oberhalb der Augenbrauen über die Stirn, ein Streif zwiſchen Schnabel und Auge längs der gelben Färbung bis zur Kehle und dieſe am untern Theile ſelbſt breit ſchwarz; Schwingen und Schwanzfedern ſchwarzbraun, olivengrün geſäumt; Unterſeite grau, olivengrünlich überhaucht; Bauch weißlich; untere Schwanzdecken grünlich, heller gerändert; Schnabel ſchwarz; Auge dunkelbraun; Füße hellröthlichbraun. Weibchen: Oberhalb mehr graulich-olivengrün, die beim Männchen gelben Stellen ſind blaß, faſt ſtrohfarben, die ſchwarzen erſcheinen nur ſchwärzlich und die Federn des untern Theils der Kehle ſind nur an der Wurzel ſchwärzlich, breit grau gerändert mit olivengrünlichem Anfluge, jedoch ebenſo wie die Untertheile weißlicher als beim Männchen. Ich habe gelbe und auch weißgefleckte Spielarten oder Albinos geſehen. — Das junge Männchen gleicht in der Färbung dem Weibchen (dieſe ganze Beſchreibung iſt nach Dr. Gundlach gegeben).

Fringilla lepida: supra olivacea; superciliis anterioribus, macula supercilii inferioris mentoque croceis; stria una supra supercilia, altera inter rostrum et oculum usque ad gulam nigram nigris; remigibus et rectricibus fusco-nigris, olivaceo-viride limbatis; subtus cinerea, olivaceo-virente afflata; ventre albido; sub-

caudalibus subviridibus, dilutius marginatis; rostro nigro; iride fusca; pedibus dilute badiis. — ♀ supra cinerescente nigra; picturis ♂ flavis fere stramineis, nigris tantum subnigris tantumque basi plumarum gularium ut gastraei albidiorum nigra, margine subolivaceo-marginato.

Länge 11,5 cm.; Flügelbreite 15,8 cm.; Schwanz 4 cm.

Der Venezuelafink [Fringilla Frantzii] bedarf nur der Erwähnung. Er ist dem vorigen sehr ähnlich, jedoch durch einen bräunlichen Ton des Olivengrün, durch reinschwarzen Oberkopf und gleiche Brust, sowie bemerkbar bedeutendere Größe verschieden; die gelben Streifen sind in gleicher Weise vorhanden. Seine Heimat erstreckt sich über Venezuela bis Südmexiko. Dr. A. v. Frantzius führt ihn als auch auf Kostarika vorkommend an. Ueber das Freileben ist garnichts bekannt, doch wird dasselbe von dem der beiden Verwandten nicht abweichen. Lebend eingeführt dürfte er bis jetzt noch nicht sein. — Er ist auch Goldbärtchen (Br.) benannt. — Tiaris pusillus, *Swns.;* Phonipara lepida et P. pusilla, *Bp.;* Euethia pusilla, *Cb., Br.*

Der Jamaikafink [Fringilla zena]. Oberhalb düster olivengrün, jede Schwungfeder mit schmalem hellen Außensaum; Oberkopf und Stirn, Kopfseiten, Kehle und Oberbrust bräunlichschwarz; unterhalb fahl weißlicholivengrün; die gelben Abzeichen der beiden vorigen fehlen. Auge braun; Schnabel braun mit hellerem Unterschnabel; Füße bräunlichgrau. Die Heimat soll sich über die Inseln Jamaika und St. Croix erstrecken; nach Gundlach kommt er jedoch auch auf Portoriko, nach Bryant auch auf Bahama vor. Die alten Schriftsteller hießen ihn Sperling oder Grünfink von Bahama und gaben mancherlei Irrthümliches inbetreff seiner an, namentlich über die Färbung und Größe. Seeligmann behauptet auch, daß er sich auf die Spitze eines Busches setze und immer in einerlei Ton singe. Die neueren Schriftsteller aber, wie Gundlach und Gosse, sagen, daß er durchaus keinen Gesang habe. In allem übrigen wird er den vorhergehenden Verwandten wol durchaus gleichen. Im Londoner zoologischen Garten ist er seit 1865 vorhanden. Bei uns dürfte er meines Wissens erst einmal lebend eingeführt sein, indem ich ein Pärchen mit dem kleinen Kubafink zusammen von Herrn Schöbel in Grünau erhielt. Beide waren jedoch fahl und in kläglichem Gefieder und starben, ehe sie sich eingewöhnt hatten. An eine häufigere Einführung ist wol kaum zu denken. — Von Br. ist er auch Schwarzgesichtchen benannt [Grünsperling, Seeligm.; zweifarbiger Sperling, Müll.]. — Le Bouvreuil bicolor ou Chanteur de Jamaica; Dusky Finch. — Fringilla zena*) et bicolor, *L.;* Fringilla et

*) Die Etymologie von „zena" ist nicht zu ermitteln. Aus dem Spanischen wie Portugiesischen stammt es nicht; ob es vielleicht ein vaterländischer Name aus irgend einer der indianischen westindischen Sprachen sein mag? Möglich auch, daß Linné bei seiner Vorliebe für mythologische Namen eine Beziehung zu Zeus (adjektivisch Zenus) damit ausdrücken wollte (so Apollinus von Apollo, Heraclaeus von Heracles ꝛc.).

Phonipara zena, *var.* portoricensis, *Brnt.;* Fringilla et Phonipara zena, *Cb.;* Spermophila bicolor, *Gss.; Albr.;* Euethia bicolor, *Gndl., Br.;* Phonipara bicolor, *Gr.* [Passer bicolor bahamensis, *Ctsb.;* Chloris bahamensis, *Brss.;* Le Verdinière, *Buff.;* Bahama Sparrow, *Cat.*].

Der Kronfink von Südamerika [Fringilla pileata].

Im Jahre 1874 erhielt Herr Dr. Bodinus diese zierliche, ungemein interessante Art in vier Köpfen vom Direktor des Pariser Akklimatisationsgartens, Mr. Geoffroy de St. Hilaire, zum Geschenk. Dann, ein Jahr später, wurden einige Pärchen von Bekemans in Antwerpen in den Handel gebracht und ein solches gelangte durch C. Gudera in die Sammlung des Herrn Dr. Franken in Baden-Baden. Ein Pärchen befand sich auch unter den Geschenken, welche der Sultan von Sansibar zum Dank für die freundliche Aufnahme in London nebst anderen Thieren dem dortigen zoologischen Garten zukommen ließ; im Jahre 1875 waren in demselben nach der „List of the vertebrated animals" vier Männchen und ein Weibchen vorhanden. Zufällig hatte Herr W. Mieth ein Pärchen bei einem kleinen Händler in Hamburg gefunden und ich erwarb dasselbe für meine Vogelstube. Gleicherweise erhielt ein solches Herr A. F. Wiener in London — und dies dürften wol sämmtliche bis zum Ende des Jahres 1877 nach Europa lebend eingeführten Exemplare gewesen sein.

„Obgleich einfach gezeichnet, ist er doch überaus schön. Auf den ersten Blick könnte ihn ein Nichtkenner für eine schwarzköpfige Grasmücke [Sylvia atricapilla, *Lth.*] halten; bei näherer Betrachtung erscheint der Schwarzkopf aber, ganz abgesehen von allen übrigen Unterschieden, viel mehr mäusegrau, während dieser Fink seidenartiggrau bis grauweiß ist. Der Schnabel ist selbstverständlich viel stärker und weniger gestreckt und die Beine sind höher. Männchen und Weibchen sind nahezu übereinstimmend gefärbt, nur hat das erstre eine schwarze und das letztere eine kaum bemerkbar bräunliche Kopfplatte; auch ist sein Unterkörper verwaschen längsgestrichelt. In der Erregung aber vermag das Männchen seine Kopffedern zu erheben, fächerartig auszubreiten und zu bewegen, sodaß eine prächtig purpurrothe Krone plötzlich aufleuchtet und verschwindet. Die Größe ist mit der des Hartlaubszeisigs übereinstimmend." (Dr. Franken). Die Geschlechter sind sehr leicht daran zu unterscheiden, daß das Weibchen den schönen rothen Schopf nicht hat.

Der prachtvolle Kronfink ist in Südamerika heimisch und soll von Südbrasilien bis Neugranada verbreitet sein. Burmeister sagt, daß er in der Provinz Minasgeraes nicht selten, aber auch nicht gemein sei; er lebe im lichten Walde oder im hohen Gebüsch, im Sommer parweise, im Winter einzeln oder in kleinen Trupps, ernähre sich von Sämereien und lasse von Zeit zu Zeit einen kurzen Lockton, aber durchaus keinen Gesang hören. Das Nest hat der Forscher nicht gefunden. Auch ist näheres über das Freileben nicht bekannt. In Brasilien

wird er sammt seinen nächsten Verwandten mit Fallen, Leimruten und Schlingen gefangen, vielfach im Käfige gehalten und wol blos mit zerstoßnem Mais nebst etwas Kanariensamen ernährt, bei welcher Fütterung er vortrefflich ausdauern soll (nach Prinz v. Wied).

„Wenn der Vogel erregt ist", schreibt Herr Wiener, „so sträubt er die wundervoll tief und glänzend roth gefärbten Kopffedern, sodaß sie, nicht wie die Haube des Kardinals oder wie die eines Kakadu, sondern wie eine Stralenkrone aussehen, welche vom Mittelpunkt des Scheitels gleichsam aufflammt und von den dunklen Federchen abgeschlossen wird. Wer das Vögelchen zum erstenmale sieht, könnte es für einen zarten Weichfutterfresser halten, denn der Schnabel und Kopf, der ganze Körper mit Ausnahme des Schwanzes und selbst die Bewegungen erinnern an eine Bachstelze. Allein er ist ja selbstverständlich ein Fink, ernährt sich von Hirse und Kanariensamen, nimmt jedoch auch sehr gern Mehlwürmer. Zu viele von letzteren sollte man ihm aber nicht geben, denn mir ist ein Männchen am übermäßigen Genuß derselben, indem es sie den kleinen Prachtfinken fortraubte, eingegangen. Der unter kleineren Genossen ebenso verträgliche als schöne und anmuthige Fink ist allen Liebhabern warm zu empfehlen."

Dies letztre kann ich nach meinen Beobachtungen ebenfalls bestätigen. Ich hatte ein Pärchen etwa ein rundes Jahr hindurch in der Vogelstube und erfreute mich an ihnen namentlich, wenn sie in das Gitter vor dem Fenster draußen kamen, wo das Männchen dann mit prächtiger, hoch erhobner Haube, hängenden Flügeln und gestelztem Schwanze sein Weibchen umhüpfte und ihm seine schönsten Töne zurief, welche freilich keineswegs in einem Gesange, sondern nur in einem heisern, zuweilen durchdringenden Zirpen bestehen. (Wenn ein neuerer Schriftsteller ausdrücklich angiebt, daß der kurze Lockton mit anderen Lauten „zu einem leisen Gesange" verwebt werde, so beruht dies lediglich auf Erfindung; von irgend einem Singen kann bei diesem Vogel garkeine Rede sein, das darf ich aus Erfahrung behaupten, und gleiches sagen Burmeister, Franken, Wiener u. A.).

Dieser Kronfink gehört ganz entschieden zugleich zu den ausdauerndsten aller fremdländischen Stubenvögel. Ich erhielt das Pärchen in einem traurigen Zustande: von der Reise recht angegriffen, in beschmutztem zerlumpten Gefieder und krankhaft; doch erholte es sich bei geeigneter Pflege, vorläufig im kleinen Käfige, sehr bald. Dann aber tummelten sich beide in der Vogelstube gar lustig umher und sie zählten zu den wenigen, den Tropen entstammenden Bewohnern, welche noch bis tief in den Spätherbst hinein das Gitter draußen besuchten und sich selbst durch kalten Wind und Regen nicht verscheuchen ließen. Trotzdem haben sie leider niemals genistet; ich versuchte es ebensowol im Käfige, als auch freifliegend in der Vogelstube sie zu züchten, doch ist es mir leider nicht gelungen. Mein Pärchen erhielt sodann Herr Oskar Vetter in Ludwigsburg, der,

über große Räumlichkeiten verfügend, hoffentlich eine glückliche Zucht erzielt hat. Immerhin, davon bin ich fest überzeugt, wird der Kronfink, falls man ihn nur häufiger einführt, unter den beliebtesten, fremdländischen Stubenvögeln obenan stehen. Der Preis ist sehr hoch, denn man kauft das Pärchen wol kaum unter 60 Mark, gewöhnlich kann man es vielmehr mit 75 Mark veranschlagen. Es ist dann freilich Sache des Geschmacks und der besondern Liebhaberei, ob man eine solche Summe für ein Pärchen zahlen will, das freilich als überaus prächtig, jedoch blos als Schmuckvögel anzusehen ist.

Der Kronfink von Südamerika ist auch Rothhaubenfink (Br.) benannt. Nach Burmeister nennen ihn die Brasilianer in Minasgeraes: Ticko-ticko-rey, im Sertong von Bahia: Papa-capim.

Le Pinson huppé rouge; Red-pileated Finch or Pileated Finch.

Nomenclatur: Fringilla pileata, *Pr. Wd.*; Tachyphonus pileatus, *Hrtl.*; Tanagra cristatella, *Spx.*; Tachyphonus fringilloides, *Swns.*; Passerina ornata, *Lss.*; Emberiza ruficapilla, *Sprm.*; Lophospiza pileata, *Bp.*; Coryphospingus pileatus, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.*; Tachyponus cristatellus, *Gr.*; Tiaris pileata, *Schff.* [Montese cabeza de bermillon, *Azar.*]

Wissenschaftliche Beschreibung: oberhalb düster bräunlichgrau; Kopf, Halsseiten und der bemerkbar hervortretende Zügel weißlichgrau; eine kleine Haube am Oberkopf schwarz, mit einem glänzendrothen Streif von der Stirn bis zum Hinterkopf (die Federn der ganzen Haube, die schwarzen sowol als auch die rothen, können in der Erregung willkürlich erhoben werden); obere Flügeldecken bräunlichgrau; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fein heller außengesäumt und mit fahlen Innenrändern, obere Flügeldecken graubraun; Kehle, Brust, Bauch, Unterleib und untere Schwanzdecken düsterweiß, untere Flügeldecken reinweiß. Schnabel bräunlichhorngrau, Unterschnabel heller braun; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau. — Das Weibchen ist dem Männchen sehr ähnlich, doch oberhalb einfarbig bräunlichgrau, am Oberkopf ohne die rothe Haube heller grau, bräunlich überhaucht.

Fringilla pileata: supra obscure cinerea; capite, loris sat notabilibus collique lateribus canis; cristula pilei erigente nigra, hujusque plumis mediis a fronte ad occiput usque nitide rubris; tectricibus al. fumidis; remigibus rectricibusque fuscis, exterius dilutius sublimbatis, interius livide marginatis; gula pectore, abdomine, crisso et infracaudalibus sordide albis; subalaribus albissimis; rostro subfusco-corneo, mandibula dilutiore; iride fusca; pedibus fumigatis. — ♀ mari simillima, at supra unicolor fumido-cinerea; pileo cristulae rubrae vacuo.

Länge $14{,}_4$ cm.; Flügel $7{,}_8$ cm.; Schwanz $5{,}_2$ cm.

Der Kronfink von Brasilien [Fringilla cristata] ist am Oberkopf hell und glänzend scharlachroth; Ohrdecken dunkelbraun; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkelblutroth; Bürzel und Bauchseiten sind lebhafter gefärbt, reiner blutroth; Kehle fleischroth; die Brust ist am meisten roth, noch reiner als der Bürzel; Schnabel schwärzlichbraun, Unterschnabel röthlichweiß; Auge rothbraun; Füße fleischbraun. Beim Weibchen ist der Scheitel nicht schopfartig verlängert, sondern der Kopf einfarbig wie der Rücken. Länge $15{,}_7$ cm.; Flügel $8{,}_7$ cm.; Schwanz $6{,}_1$ cm. Die Heimat erstreckt sich über den Süden Brasiliens, St. Paulo, Sta Katharina, Rio grande de Sul und weiter westwärts über Paraguay bis Ekuador. Er lebt im Sommer parweise, im Winter in kleinen Flügen

auf den wüsten Distelfeldern, hält sich von den Ansiedlungen möglichst fern und nistet ziemlich hoch im dichten Gebüsch. Das Gelege besteht in drei bis vier weißen, vom stumpfen nach dem spitzen Ende zu abnehmend graubraun getüpfelten Eiern. Man hält diesen hübschen Vogel gern in Käfigen, in denen er gut ausdauert und mit gestoßnem Mais sich ernähren läßt (nach Burmeister). Bis jetzt ist er noch nicht lebend eingeführt worden, doch dürfen wir sicherlich seiner Ankunft entgegensehen, sobald der Thier-, bzl. Vogelhandel zwischen Brasilien und Europa nur einigermaßen geordnet sein wird. — Er heißt bei Br. Haubenfink; bei den Brasilianern wird er Cardinal genannt (Burmst.). — Le Pinson à crête rouge; Red-crested Finch. — Fringilla cristata, *L.*, *Gml.*, *Bff.*, *Lth.*; Fringilla araguira, *Vll.*; Fringilla flammea, *Tmm.*, nec Auct.; Tachyphonus rubescens, *Swns.*, *Hrtl.*, *Azr.*; Lophospiza cristata, *Bp.*; Coryphospingus cristatus, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.*; Emberiza araguira, *Lfrsn.*, *d'Orb.* [Araguirá, *Azar.*].

Der Kronfink von Ekuador [Fringilla cruenta]. An Rücken, Flügeln und Schwanz kohlschwarz; Unterseite roth, Bauchseiten mehr orange; das Männchen hat einen ähnlichen Schopf wie der Kronfink von Südamerika. Die Heimat ist Guyaquil (Burmeister). Chenu giebt folgende Beschreibung: Krone glänzendroth; oberhalb schwarz, ebenso Flügel und Schwanz, Schwingen mit weißem Innenrande, unterhalb roth; Brust feuerfarben; Bauch und Seiten orange. Ueber das Freileben ist nichts bekannt. Brehm behauptet, daß er nur in Ekuador vorkomme, dort aber sehr gemein sei. In den Handel ist er bis jetzt sicherlich noch nicht gelangt. — Br. nennt ihn Purpurkronfink. — Le Pinson couronné rouge; Redcrowned Finch. — Tiaris cruenta, *Lss.*; Lophospiza cruenta, *Bp.*, *Chn.*; Coryphospingus cruentus, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.* [L'Araguira ensanglanté, *Chenu*].

Der Kronfink von Bolivia [Fringilla griseocristata], im ganzen Gefieder bleigrau, unterhalb heller; Haube aus verlängerten, aber nicht abweichend gefärbten Federn bestehend; Seitenfedern weißgespitzt; Schwanz schwärzlich. (Burmeister). Chenu hat von seinem Araguira à huppe grise eine Abbildung, im übrigen aber über die Lebensweise u. s. w. nichts gegeben und näheres über den Vogel ist überhaupt nicht vorhanden. Bis jetzt ist er bei uns noch nicht lebend eingeführt. — Emberiza griseo-cristata, *d'Orb.*; Coryphospingus griseocristatus, *Cb. Brmst.* — [L'Araguira à huppe grise, *d'Orbig.*]. — Hoffentlich dürfen wir erwarten, daß alle diese schönen Kronfinken mit der Zeit lebend eingeführt und die Vogelstuben bevölkern werden.

Der Jakarini- oder Atlasfink [Fringilla jacarina].

Unter diesem Namen kommt ein Vögelchen in den Handel, welches man auf den ersten Blick wol leicht mit dem allbekannten Atlasvogel (s. S. 198) verwechseln kann, da es wie jener einfarbig schwarz ist, mit schön blauem Glanz. Es unterscheidet sich jedoch dadurch, daß es kleiner und viel schlanker ist und ein

spitzes, nicht weißes, sondern wie die Füße dunkelbraunes Schnäbelchen hat. Bei näherer Betrachtung erscheint der ganze Körper auch fein graubraun marmorirt. Das Weibchen ist oberhalb braungrau, fein heller gestrichelt, unterhalb gelblichbraun, an der hellern Brust jede Feder mit dunklem Schaftstreif. Die Heimat erstreckt sich über ganz Südamerika. Burmeister fand es nur bei Rio de Janeiro sehr häufig und in allen Gärten vor der Stadt, doch besitzt er auch Exemplare aus Kolumbien.

Trotzdem der Vogel bereits den ältesten Schriftstellern bekannt war, ist er bisher doch nur selten eingeführt und namentlich das Weibchen war garnicht zu erlangen. Buffon sagt von dem Jakarini, daß Markgraf ihn wol schon erwähnt, über sein Freileben jedoch noch keine Mittheilung gemacht habe, dagegen habe Sonnini de Manoncourt, der den Vogel zu Guiana, wo er sehr gemein sei, gesehen, angegeben, daß er gern gepflügte Aecker, niemals aber große Wälder besuche. Er lasse sich auf kleine, namentlich Kaffebäume, nieder und entfalte hier ein sonderbares Treiben, indem er sich 30—45 cm. oberhalb des Astes, auf welchem er sitze, gerade in die Höhe erhebe und dann senkrecht auf dieselbe Weise herabfallen lasse. Er thue dies viele Stunden hintereinander und unterbreche solche Luftsprünge nur dadurch, daß er auf einen andern Strauch fliege, um dort dasselbe Spiel von neuem zu beginnen. Dabei lasse er fortwährend ein Freudengeschrei erschallen und breite den Schwanz fächerförmig aus. Das ganze sei sicherlich nur ein Liebesspiel, ausgeführt, um dem Weibchen zu gefallen; letztres zeige dergleichen Bewegungen niemals. Das Nest bestehe aus trockenen Kräutern und Gräsern von kugelförmiger Gestalt und etwa 5 cm. im Durchmesser. Zwei länglichrunde, grünlichweiße mit kleinen rothen Flecken, am dickern Ende dichter und dunkler besprengte Eier bilden das Gelege. Edwards hat den Vogel abgebildet und sagt, daß die Portugiesen ihn Negretto nennen; er ernähre sich von Körnern. Vieillot führt als Heimat Guiana und Brasilien an und ertheilt folgende Rathschläge: man müsse ihn vor Kälte bewahren, und, um ihn zum Nisten zu bringen, 25—30 Grad Wärme gewähren. Sein Käfig sei mit jungen grünen Bäumen auszuschmücken. Die vom letztern gegebene Beschreibung des Eies stimmt mit der oben angeführten überein. Chenu weist noch auf die zwei Arten hin, welche die älteren Schriftsteller aufstellten und die Burmeister in einer Anmerkung dahin erklärt, daß diese von Bonaparte u. A. festgehaltene Scheidung sich begründe in den weißen Flügeldecken des einen und den schwarzen des andern Vogels; erstrer sei nur in Brasilien, letztrer in Guiana und Kolumbien heimisch. Burmeister sowol, als auch Cabanis lassen beide aber zusammenfallen und sagen, daß jene Verschiedenheiten nur unbedeutende Merkmale seien. Im übrigen giebt Chenu nur die von Sonnini gemachten, bereits von Buffon angeführten Beobachtungen wörtlich wieder.

Burmeister macht einige Mittheilungen über das Freileben: „Im Garten des Herrn L'Allemand, am Fuße des Korkovado (Laranjeras) brütete ein Pärchen. Sein Nest stand in einem Kaffeestrauch, etwa 2,4 Meter hoch über dem Boden und war vorzugsweise aus feinen trockenen Luftwurzeln einer und derselben Pflanze nur locker zusammengeschichtet. Es enthielt um Weihnachten zwei bebrütete Eier von grünlichweißer Grundfarbe, mit helleren und dunkleren, ungleich vertheilten, ziemlich großen graubräunlichen Spitzflecken und am stumpferen Ende mit einigen schwarzen Punkten. Die Eier sind nicht völlig so groß, als die des europäischen Hänflings und etwas länglicher. Weder ich, noch Prinz v. Wied haben Gesang von diesem Vogel vernommen; man hält ihn trotzdem gern in Käfigen und füttert ihn mit Kanariensamen, wobei er oft sehr lange aushält. Im Freien sucht er seine Nahrung gleich den Ammern am Boden; er ist in Brasilien unter dem Namen Jakarini Jedermann bekannt." Euler fand am 25. Februar ein Nest mit zwei stark bebrüteten Eiern einer zweiten Brut; er meint, daß diese Zahl die regelmäßige des Geleges sei. A. v. Frantzius zählt ihn unter den Vögeln Kostarikas mit, berichtet aber sonst nichts näheres. Weder Bechstein noch Bolle führen ihn auf, und er dürfte auch sicherlich erst seit der neueren Zeit in den Handel gelangt sein.

Seiner Seltenheit wegen hat er den hohen Preis von 15—24 Mark für das Pärchen, während er doch durch keinerlei besondere Eigenthümlichkeiten sich auszeichnet und nur für den Kenner und besondern Liebhaber dieser Finken von Werth ist. In meiner Vogelstube befindet sich ein Pärchen, welches ich von H. Möller erhalten, seit etwa zwei Jahren. Sie leben still und versteckt im Gebüsch; in der warmen Jahreszeit kommt das Männchen jedoch zur späten Abendstunde regelmäßig in das Luftfenster hinaus und läßt hier unermüdlich seinen Gesang erschallen. Dieser ist freilich kein Lied, sondern nur ein wunderliches Zirpen mit einer schrill klingenden Schlußstrofe. Erst bei voller Dunkelheit hört der fleißige Sänger auf. In der langen Zeit haben die beiden Vögel auch nicht einmal zu nisten versucht und weder im Frühlinge, noch zu andrer Zeit bekümmern sie sich jemals um einander. Auch im Besitz der Herren Dr. Franken in Baden-Baden und Graf Roedern in Breslau befindet sich je ein Pärchen; im zoologischen Garten von London ist die Art schon seit dem Jahre 1858 vorhanden und sicherlich ist sie im Laufe der Zeit hin und wieder eingeführt worden; so sah ich ein Männchen im Berliner Aquarium im ersten Jahre, gleich nach der Eröffnung. Dasselbe kannte freilich damals dort Niemand. Hoffentlich gelingt es über kurz oder lang diesen Vogel auch zu züchten.

Der Jakarinifink oder Springfink heißt auch Atlasfink (wol zu unterscheiden von dem Atlasvogel oder Atlaswidafink); Jacarini der Brasilianer; Negretto der Portugiesen (Edw.). — Le Pinson Jacarini; Jacarini Finch.

Nomenclatur: Tanagra jacarina, *L., Lth., Bff.*; Fringilla nitens, var β., *Gml.*; Tanagra et Passerina jacarini, *Vll.*; Fringilla splendens, *Vll., Pr. Wd., Eul.*; Euphone jacarina, *Lchtst.*; Carduelis obscurus, *Cv.;* Emberiza jacarini, *d'Orb., Lfrsn.;* Spiza jacarina, *Cb., Tschd.;* Volatinia jacarina, *Cb., Scl., Chn., Frntz.*, [s. V. splendens] *Bp., Br.*; Volatinia Jacarina, *Brmst.;* Tiaris jacarina, *Gr.* — [Jacarini brasiliensibus, *Mrcg., Inst.;* Carduelis brasiliana, *Wlghb.;* Cardinalis obscurus ♀, *Cuv.;* Tanagra brasiliensis nigra, *Brss.*]. Volatin, *Azr.*; Le Jacarini, *Buff, Vll.;* Jacarini, *Edw.;* Jacarini Tanager, *Lth.*; Moineau de Cayenne.

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Glänzendſchwarz, ſtahlblau oder auch etwas erzfarben ſchillernd, die Federn des Rumpfs im Winterkleide mit graubraunen Rändern. Schnabel ſchieferſchwarz, Unterſchnabel am Grunde heller grau; Auge ſchwarzbraun; Füße ſchieferſchwarz. (Der jüngere Vogel hat braunſchwarze Flügel- und Schwanzfedern ohne Metallſchimmer und einen weißlichen Flügelrand am Bug nebſt ebenſolchen inneren Deckfedern und Säumen der Schwingen ſelbſt). Das Weibchen iſt oberhalb dunkelgraubraun, jede Feder mit dunklerm Mittelſtreif; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, erſtere ſchmal bräunlich außengeſäumt und an der untern Hälfte der Innenfahnen breit fahl gerandet, Deckfedern breit fahl außengeſäumt; Kehle und Bauchmitte ziemlich reinweiß; Hals, Bruſt, Bauchſeiten und Unterleib hell graugelblich, jede Feder mit braunem, ſpitzem Schaftſtreif. — Das Jugendkleid ähnelt anfangs dem des Weibchens völlig, aber ſchon nach der erſten Mauſer wird ſein Kopf- und Rumpfgefieder glänzendſchwarz mit braunen Federrändern, während die Flügel- und Schwanzfedern die frühere Färbung beibehalten. Allmälig nimmt der ſchwarze Ton mit dem Stahlglanze immer mehr zu und nur der weißliche Flügelrand bleibt mit einem Theile der inneren Flügeldeckfedern. Bei recht alten Männchen gehen auch dieſe Federn ins Schwarze über. (Burmeiſter).

Fringilla jacarina: nitide nigra, chalybaeo-vel subaereo micans, plumis trunci vest. hiem. fumido-marginatis; rostro schistaceo; iride fusca; pedibus schistaceis. — ♀ supra obscure fumida, obscurius striolata remigibus fuscis, exterius fuscescente submarginatis, dimidio pogonii interni inferiore late livide marginato; cauda fusca; pluma quaque colli, pectoris, hypochondriorum ventrisque dilute cano-flavidorum striam scapi acuminatum offerente chalybaeam. — Juvenis femellae simillima, alis caudaque fusco-nigris, nitore metallico carentibus; margine flexurae al., tectricibus subalaribus limbisque remigum albentibus.

Länge $11{,}6^{cm.}$; Flügel $5{,}2^{cm.}$; Schwanz $3{,}9^{cm.}$

Der gehäubte Springfink [Fringilla ornata]. Das hübſche, dem vorigen nahe verwandte Vögelchen verdient freilich ſeine lateiniſche Bezeichnung nicht. Es iſt nach Burmeiſter munter und wenig ſcheu, wird meiſtens nur einzeln geſehen und kommt bis in die Nähe der menſchlichen Wohnungen. Lebensweiſe, Fortpflanzung u. ſ. w. ſind nicht bekannt. Der genannte Forſcher erlegte es im Kamposgebiet, doch fand er nicht das Neſt. Die Heimat ſoll ſich auf das Innere Braſiliens beſchränken, nach Prinz v. Wied auf den Oſten, wo es ſehr häufig ſei. Näheres geben weder die älteren, noch die neueren Schriftſteller an. Stirn, Zügel, Oberkopf bis zum Nacken, Kehle und Vorderhals bis zur Bruſt hinab ſchwarz; die Kopffedern zugeſpitzt, die hinteren allmälig ſchopfartig verlängert; Nacken, Rücken und kleine Flügeldecken bleigrau, Schwingen ſchwarz, weiß geſäumt, hintere, gleich den großen Deckfedern hell weißlichgrau geſäumt, mittlere Handſchwingen mit weißem Grunde; Schwanzfedern ſchwarz, am Grunde weiß;

Backen, Halsseiten und oberer Bürzel weiß; Brustseiten, Bauch und Steiß rostgelb. Schnabel hell horngrau; Auge braun; Füße dunkelfleischfarben. Weibchen und junger Vogel am Oberkopf olivenbräunlich mit kleinerer Haube; Rücken aschgrau; Flügel und Schwanz graubraun, weniger weiß am Grunde; ganze Unterseite blaß gelbroth. Größe kaum bedeutender als die des vorigen. — Bis jetzt dürfte dieser Vogel noch nicht lebend eingeführt sein, da er jedoch nach Burmeister in seiner Heimat nicht selten ist, so läßt sich dies wol bald erwarten. — Schopffink (Br.) — Fringilla ornata, *Pr. Wd.*, *Tmm.*; Tiaris ornata, *Swns.*, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.*; Tiaris comptus, *Lchtst.*; Lophospiza ornata, *Chn.*

Der Indigofink [Fringilla cyánea].

Tafel XII. Vogel 59.

Kaum giebt es einen andern fremdländischen Stubenvogel, welcher als so allbekannt und von altersher bis zur Gegenwart herab als so beliebt gelten darf, wie dieser allerdings schöne, einfarbig blaue, kanarienvogelgroße Fink, dessen Weibchen nur schlicht bläulichgrau ist. Er gehörte zu dem ersten Sing- und Schmuckgefieder, welches von Amerika aus bei uns eingeführt worden, und gleicherweise gelangt er auch jetzt noch regelmäßig alljährlich in bedeutender Anzahl in den Handel.

Seine Heimat erstreckt sich über Nordamerika und vorzugsweise den Osten der Vereinigten Staaten; er geht beiweitem höher nördlich hinauf als der nahverwandte Papstfink, doch ist die Nordgrenze seines Vorkommens mit Sicherheit noch nicht festgestellt. Als Zugvogel erscheint er in der Mitte oder zu Ende d. M. April und wandert im Oktober nach Mexiko, Mittel- und bis Südamerika hinab.

Die alten Schriftsteller wußten ihn bereits als nahen Verwandten unserer Finken, Hänflinge, Stiglitze u. a. von ähnlichen amerikanischen Vögeln, namentlich dem blauen Kernbeißer oder Bischof, zu unterscheiden. Alle behaupten, daß der Gesang mit dem des europäischen Hänflings übereinstimme oder ihm doch sehr ähnlich sei. Catesby gab wol die erste erkennbare Abbildung. Buffon sagt schon, daß das schöne Himmelblau des Männchens zum Winterkleide sich in das schlichte Grau des Weibchens verwandle. Vieillot's Werk zeigt eine ziemlich fantastische Abbildung; im übrigen bestätigt dieser Schriftsteller die Angaben der früheren, doch weist er auch darauf hin, daß man diese Art zur Nistzeit nur parweise halten dürfe, weil die Männchen dann einander wüthend befehden; im grauen Gefieder dagegen seien sie friedlich. Zu Bechstein's Zeit kostete das Pärchen 4 Louisd'or; sonst theilt auch er nur bereits Gesagtes mit.

Eine ausführliche Schilderung des Freilebens bringt Thomas G. Gentry. Der Vogel ist in Ostpennsylvanien sehr häufig zu finden und kommt dort gegen den 12. Mai an. Waldsäume und mit Dornsträuchern bewachsene Feldränder sind sein Lieblingsaufenthalt. In der Nistzeit besucht er auch die Nähe der Ge-

bände, Gärten und Höfe, doch benimmt er sich immer scheu und mißtrauisch und nistet hier niemals. Während der warmen Jahreszeit ernährt er sich vorzugsweise von Kerbthieren, namentlich fliegenden, die er mit großer Geschicklichkeit fängt, und deren Bruten, sodann aber von Gräser- und verwandten Sämereien, von den Samen der Vereinsblütler, ferner von Knospen und Blüten verschiedener Pflanzen und später auch von Beeren. Alle seine Bewegungen sind gewandt und behend; sein Flug ist niedrig, mäßig schnell und mit anmuthigen Schwingungen. Seine Lebensweise ist im ganzen still, versteckt zwischen Gebüsch, niedrigen Bäumen und auf der Erde. Der Gesang besteht nur in einigen kurzen Silben, welche laut und schnell wiederholt, allmälig immer leiser hervorgebracht werden, bis sie schließlich völlig ersterben; er klingt etwa: tsiwi-tsitsch-tsisch, tsi-wi-tsitsch-tsitsch-tsiwi-tsisch (tsewe-tsich-tsich-tse-we-tsich-tsewe-tsich). Das Männchen setzt sich in den Wipfel eines kleinen Baumes und schmettert seine Melodie stundenlang mit nur kurzen Ruhepausen und selbst am heißen Mittage, wenn alle anderen Vögel träge und schweigsam im Schatten sitzen. Doch läßt es den Gesang eigentlich nur während der Monate Mai und Juni erschallen; späterhin wird derselbe immer schwächer. Bereits eine Woche nach der Ankunft erfolgt die Parung. Das Nest steht gewöhnlich im dichten Gebüsch eines Dornstrauchs und wird von beiden Gatten des Pärchens in drei bis vier Tagen erbaut. Während das Männchen die Stoffe herbeiträgt, formt und gestaltet das Weibchen. In der Regel ist das Nest, etwa 1 Meter hoch vom Boden, äußerlich aus Pflanzenstengeln, Blättern, Gräsern, Baumrinde und Spinnenweben zusammengesetzt, mit Pflanzenfasern, selbst Papierstückchen und Läppchen durchwebt und innen mit Würzelchen, Grasblättern und Pferdehaaren glatt und sauber ausgepolstert. Sein Durchmesser beträgt $11{,}_{8}$ cm., die Mulde ist $7{,}_{8}$ cm. weit und $6{,}_{5}$ cm. tief. Jüngere Vögel erbauen nachlässigere, viel weniger künstliche Nester. Täglich wird ein Ei gelegt, und wenn das Gelege, in der Regel von vier Eiern, vollzählig ist, beginnt sogleich die Brut, seitens des Weibchens allein, doch wird dasselbe vom Männchen gefüttert und sorgsam bewacht. Brutdauer 13 Tage. Beim Nahen eines Feindes geht das Männchen diesem mit Geschrei und bewundernswerthem Muth entgegen und beide Gatten verfolgen den Nesträuber mit lauten schrillen Klagerufen. Schon nach ungefähr 11 Tagen verlassen die Jungen das Nest und nach abermals 10 Tagen können sie selber fressen; sie bleiben jedoch mit den Alten in kleinen Flügen beisammen und diese ernähren sich späterhin vorzugsweise von den Beeren des Wachholders. In jedem Jahre machen sie eine Brut und nur dann eine zweite, sehr späte, wenn die erste zerstört worden. Zu Ende des Monats September oder zu Anfang Oktobers findet der Abzug statt.

In der Gefangenschaft gewöhnt sich der Vogel bald ein und wird so zahm wie ein Kanarienvogel, gleichviel, ob er bereits alt oder noch jung sei. Als

fleißiger Sänger ist er recht geschätzt, und wie man sagt, soll er den Gesang des Kanarienvogels mit überraschender Treue nachahmen lernen. Die Fütterung besteht in Rübsen und Kanariensamen.

Herr H. Nehrling vervollständigt diese Schilderung noch in folgendem: „Der Indigovogel gehört zweifellos zu den schönsten unserer Finken. Sein Verbreitungsgebiet soll sich bis an den Missouri erstrecken, doch findet man ihn bereits am Mississippi selten; im Staate Illinois habe ich ihn nur einigemal gesehen und in Wiskonsin garnicht; hier dürfte er kaum vorkommen. In Wiesen und Feldern siedelt er sich selten an, am liebsten an Waldsäumen und kleinen Dickichten. Das einfache, vorzugsweise aus Grashalmen erbaute Nest steht zwischen mancherlei Pflanzen, gewöhnlich ganz dicht über dem Boden. Das Gelege enthält fast regelmäßig 5 Eier. Im Frühlinge des Jahres 1876 entflog mir ein prachtvolles Männchen, welches sich einige Tage hindurch in den noch unbelaubten Bäumen des benachbarten, dicht mit Gebüsch und Stämmen bepflanzten Gartens herumtrieb. Es war eine herrliche Erscheinung, wenn dieser Vogel von der Spitze eines Bäumchens herab seinen einfachen Gesang erschallen ließ oder wenn er in seiner schönen blauen Färbung inmitten einer Schar von anderen Finken auf dem Boden nach Körnern suchend umherlief. Stets befand er sich in Gesellschaft der Winterfinken, weißkehligen Sperlinge und Zirp- oder Gesellschaftsfinken. Nach einigen Tagen verschwand er plötzlich, erschien aber nach etwa zwei Wochen wieder und hatte sich ein Weibchen mitgebracht. Beide wurden dann von mir vermittelst eines Fallenkäfigs, in welchem sich ein andres Männchen als Lockvogel befand, gefangen. Man hält den Vogel hier nicht so häufig in der Gefangenschaft, als wol zu erwarten wäre; erstens ist er, das Männchen nämlich, nicht unter dem Preise von 3 Dollar zu haben, und zweitens erachtet man ihn nicht für besonders ausdauernd. Alle Indigofinken, welche der Händler Kämpfer hier in Chikago hat, kommen aus dem Osten, vornämlich aus dem Staate New-York."

Nach den Angaben von Baird u. A. ist diese Art auch auf Kuba vorhanden. Gundlach bestätigt es und sagt, daß sie dort garnicht selten sei; sie erscheine im Herbst als Zugvogel und ziehe im April wieder fort; auf den Kaffefeldern und im Gebüsch sei sie überall zu sehen, niemals aber im Walde. Sie sei scheu und entfliehe schon von weitem in schnellem Fluge. Man halte das Männchen im Käfige, doch mehr der schönen Färbung als des Gesanges wegen. Prinz Wied beobachtete sie am untern Theile des Missouri, wo er sie in den Gebüschen und an den Waldungen Pennsylvaniens parweise antraf. Dr. Frantzius fand sie auf Kostarika. Die Mittheilungen aller übrigen Forscher, besonders auch die Audubon's, stimmen mit den von Gentry und Nehrling gegebenen überein.

Die namentlich von Ch. Reiche alljährlich zu vielen Hunderten eingeführten Männchen werden von anderen Großhändlern gewöhnlich dutzendweise entnommen

und durch die ganze gebildete Welt abgesetzt. Auch bei uns kauft man vorzugsweise diese allein, hauptsächlich als Schmuck-, seltener als Singvögel. Ihren Gesang beurtheilt Alexander v. Homeyer als einen fröhlichen vollen Schlag, welcher zwischen dem des europäischen Zaunkönigs und der Heckenbraunelle in der Mitte stehe. Der Züchtung gegenüber hat sich der Indigofink bis jetzt wenig fügsam gezeigt. Bis vor kurzem wurden, wie bei vielen anderen Vögeln, die unansehnlichen Weibchen niemals in den Handel mitgebracht; erst seitdem man der Vogelzucht weitverbreitetes Interesse zugewendet, tauchen ihrer hier und da einzelne auf und werden im Kleinhandel meistens theurer als die Männchen bezahlt. In meiner Vogelstube sind einige Bruten flügge geworden, und wenn das Pärchen ungestört ist, so schreitet es ohne Schwierigkeit zum Nisten. In der Regel macht es auch hier nur eine Brut im Jahre und auf deren guten Verlauf ist keineswegs mit Sicherheit zu zählen. Bei Herrn Graf Yorck v. Wartenburg nistete i. J. 1873 ein Pärchen, jedoch ohne Erfolg, und außer den i. J. 1875 bei mir aus zwei Bruten erzogenen vier Jungen sind keine Ergebnisse einer glücklichen Züchtung bekannt geworden.

Bei entsprechender Fütterung und Verpflegung, zu der neben mannigfaltigen Sämereien ganz entschieden auch Mehlwürmer und Ameisenpuppengemisch gehören, zeigt sich der Vogel sehr ausdauernd und erlangt nach der etwa im September eintretenden und bis zum März währenden Graufärbung das herrliche blaue Federkleid wieder. Im Gesellschaftskäfige ist er für gewöhnlich ruhig und friedlich, nur zur Zugzeit in den Herbst- und Frühlingsmonaten erscheint er sehr erregt und verursacht durch Flattern und Umhertoben des Nachts nicht selten arge Störungen. In der Vogelstube tritt er in der Nistzeit auch als arger Raufbold auf, welcher jedes Männchen seiner Art, sowie den Papstfink und dann ebenso die entfernteren Verwandten als Todfeinde befehdet; am besten dürfte es daher sein, wenn man Züchtungsversuche mit ihm nur parweise in Heckkäfigen anstellt. Hier und da hat man auch Mischlingszucht mit ihm und Kanarienvogelweibchen versucht; mit Sicherheit ist aber kein Erfolg nachzuweisen, doch weiß ich, daß in einem Falle das Weibchen befruchtete Eier gelegt hatte. Es müßte daher wol gelingen, Bastarde von ihm zu ziehen und diese würden sehr schöne oder doch höchst merkwürdige Vögel sein.

Im Großhandel beträgt der Preis für das Dutzend Männchen zwischen 50 bis 60 Mark und etwa 7 Mark für den einzelnen Kopf; in den Vogelhandlungen der Binnenstädte wird das Männchen zwischen 9 bis 15 Mark verkauft. Hier wie dort schwankt der Preis außerordentlich, weil nämlich die Indigofinken zuweilen in sehr großer Anzahl auf den Markt gebracht werden, während sie dann wiederum lange Zeit fehlen. Die Einfuhr findet in der Regel in unseren Frühlingsmonaten statt.

Der Indigofink oder Indigovogel hat in der Liebhaberei keine weiteren Namen. [Blauer Hänfling, Seeligm.; blauer Distelfink, Klein; blaue Merle, Müll.; Blauhänfling und Minister, Buff.; Indigoammer, Bechst.].

Le Ministre (übereinstimmend bei allen französischen Vogelhändlern, auch bei Bekemans); Indigo Bird (Jamrach u. Brzn. des zool. Grt. v. London); Indigo-vogel (holländisch). — Azullexos (spanisch, nach Cat.); Azulleros oder Blauvogel aus der Ferne (spanisch, nach Seeligm.); Azulejo (im Westen) und Azulito (im Osten Kubas, nach Gundl.); Azulito de alpiste (in Santjago de Cuba, ebenfalls nach Gundl.).

Nomenclatur: Tanagra cyanea, *L.*; Emberiza cyanea, *Gml.*, *Bchst.*; E. coerulea et cyanella, *Gml.*; Fringilla cyanea, *Wls.*, *Audb.*; Passerina cyanea, *Vll.*; Spiza cyanea, *Bp.*, *Audb.*, *Cb.*, *Gndl.*; Cyanospiza cyanea, *Brd.*, *Scl.*, *Frntz.*, *Br.* [Linaria coerulea, *Kln.*; Tanagra carolinensis coerulea, *Brss.*]. — The blue Linnet, *Cat.*; Tanagra bleu de la Caroline, *Briss.*; le Ministre, *Buff.*; Indigo Bunting and Blue Bunting, *Penn.*, *Lath.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Im Prachtgefieder fast einfarbig glänzendblau; Kopf und Kehle etwas dunkler und lebhafter; schmaler Zügelstreif schwarz; Schwingen und Schwanzfedern braunschwarz, schmal blaugrau außen und breit weißlich innen gesäumt, Flügeldecken schwarz, breit himmelblau gerändert. Schnabel braun, Unterschnabel blasser, am Mundwinkel ein wenig orangefarben; Auge dunkelbraun; Füße schwarzbraun. — Das Weibchen ist oberhalb braun; Kopf und Kehle etwas heller, graulichbraun; unterhalb bläulichweißgrau, mit dunkleren bräunlichen Längsstreifen gefleckt. — Das Männchen im Winterkleide gleicht dem Weibchen, doch ist es immer daran zu erkennen, daß die Oberseite nicht reinbraun ist, sondern daß die Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern blau gesäumt sind; auch ist die Unterseite nicht längsgestrichelt, sondern gewöhnlich schwach blaugefleckt. — Jugendkleid dem des Weibchens gleich, Flügel- und Schwanzfedern sind jedoch düster blaugrau gerandet; Unterseite mit bläulichen Schaftstrichen; Schnäbelchen graubraun mit breit gelbem Grunde; Füße hell hornbraun.

Fringilla cyanea: vestimento ornato praedita fere unicolor cyanea, capite gulaque paululum obscurioribus et laetioribus; loris angustis nigris; remigibus rectricibusque nigro-fuscis, exterius anguste subcinereo-, interius late albido-marginatis; tectricibus al. nigris, late coeruleo-marginatis; rostro fusco, mandibula dilutiore, angulis oris subaurantiis; iride fusca; pedibus e nigro fuscis. — ♀ supra umbrina, capite gulaque pallidioribus; subtus coerulescente cana, subfusco-striata. — ♂ vest. hiem. cum femella conveniens tamen tectricibus al., remigibus rectricibusque coeruleo-limbatis, atque gastraeo haud coeruleo-striato, sed submaculato.

Länge 13,9 cm.; Flügel 6,5 cm. (Flugbreite 21,5 cm.); Schwanz 5,2 cm.

Juvenis: femellae simillima, at remigibus et rectricibus sordide subcoeruleo-marginatis; subtus coerulescente striolata; basi rostri fumidi late flava; pedibus subcorneis.

Beschreibung des Eies: Bläulichweiß, wenig glänzend; eiförmig bis bauchig; Länge 18 mm.; Breite 14 mm. (Nehrkorn). Das Ei ist auf blauem Grunde mit dunklen Punkten gezeichnet (Nehrling). Das Ei ist lichtbläulichweiß, ungefleckt; ovalrund (Gentry).

Ovum: lacteum, subnitidum; oviforme, ipsum ventricosum (Nehrkorn). Ovum coerulescens, obscurius punctatum (Nehrling). Ovum sublacteum, immaculatum, ovato-rotundum (Gentry).

Der Papstfink [Fringilla ciris].

Tafel XII. Vogel 57.

Zu den farbenreichsten aller Finken gehörend und deshalb auch Unvergleichlicher genannt, darf er zugleich als einer der gemeinsten Vögel des Handels gelten. Herr C. Reiche in Alfeld führt ihn alljährlich zu vielen Hunderten

nach Europa ein, welche ebenso wie die Indigofinken und mit diesen zusammen durch die Groß- und Kleinhändler in Deutschland und anderen Ländern verbreitet werden und immer guten Absatz finden.

Ein herrliches ins Violette spielende Blau an Kopf und Hals; Gelbgrün an Rücken, Flügeln und Schwanz; lebhaftes Roth an der ganzen untern Seite — das ist das bunte Gefieder, welches ihn in der That schön, wenn auch nicht unvergleichlich erscheinen läßt. Das Weibchen ist einfarbig gelbgrün, oberhalb dunkler, unterhalb heller. Größe des vorigen.

Als Heimat führt Baird die südlichen Staaten Nordamerikas, namentlich die, welche am Atlantischen Ozean liegen, an. Auch er ist ein Wandervogel.

Gleich dem Verwandten war er bereits den ältesten Schriftstellern bekannt. Die erste gute Abbildung gab Edwards und zugleich eine Beschreibung beider Geschlechter nach lebenden Vögeln, welche man in London in Käfigen hielt, die jedoch nicht die volle Schönheit der freilebenden zeigten. Schon damals brachte man diese Art in zahlreichen Köpfen von Nordamerika nach England, um sie an die Liebhaber von Seltenheiten zu verkaufen oder zu verschenken. Catesby's Abbildung ist nicht deutlich und dann ist von ihm fälschlich China als Heimat genannt. Auch Linné hatte sich geirrt, indem er das Weibchen als blau mit weißem Bauche und im Winter fast grau schildert. Die übrigen älteren Schriftsteller geben nichts bemerkenswerthes an. Buffon, der auch die Verfärbung zum Winterkleide beschreibt, hält ihn für weichlicher, als die afrikanischen Vögel, z. B. die Widafinken. Nach der Eingewöhnung daure er jedoch acht bis zehn Jahre in der Gefangenschaft aus. Er gehöre auch zu den Vögeln, welche die Holländer bereits vor hundert Jahren, ebenso wie kleine Prachtfinken u. a. mit glücklichen Erfolgen züchteten. Vieillot sagt über ihn etwa folgendes: Obwol le Pape nur einen schwachen Gesang hat, so ist er um der außergewöhnlichen Schönheit seiner Farben willen doch allbeliebt. Unter allen kleinen Vögeln Amerikas wird er zugleich am häufigsten nach Europa eingeführt, wo man sogar mit viel Geduld und Mühe schon dazu gelangt ist, glückliche Bruten von ihm zu erziehen. Orange- und Zitronenbäume sind es vornämlich, auf denen er sein Nest erbaut. Er kann seine Jungen nur dann auffüttern, wenn man ihm neben dem Körnerfutter auch Larven, kleine Raupen u. a. Insekten bietet. Erst im dritten Jahre erhalte das Männchen sein prachtvolles Gefieder, und er zähle zu den Vögeln, welche sich alljährlich zweimal verfärben; da dies jedoch unregelmäßig geschehe, so finde man nicht leicht zwei übereinstimmend aussehende Männchen. Im Jugendkleide seien beide Geschlechter dem alten Weibchen sehr ähnlich. Bechstein wiederholt im wesentlichen nur das von den erwähnten Schriftstellern gesagte, giebt auch die Fütterung ebenso, als in Hirse, Zichorien-, Mohn- und Kanariensamen bestehend, an, den Gesang bezeichnet er als sanft und angenehm. Zu seiner Zeit kostete

ein Männchen 2 bis 3 Louisd'or und früher, wie er sagt, 4 Louisd'or. — Nach Dr. Gundlach findet man ihn vom Oktober bis zum April auf Kuba als Zugvogel im Gebüsch, in Kaffeefeldern, an Bergrändern, besonders dort, wo solche Kräuter wachsen, deren Samen er frißt, nicht selten. „Er ist scheu, fliegt schnell, aber nicht weit weg. Man hält ihn viel in Käfigen, besonders des schönen Gefieders wegen. Auch ist sein Gesang gut und er singt sehr oft des Nachts. Zieht man junge Männchen im Käfige auf, so erhalten sie nicht das volle schöne Roth des alten im freien Zustande, sondern nur Gelb oder Graugelb, und selbst die gefangenen alten Männchen verlieren die Prachtfarben. Im Freien behält diese Art das bunte Gefieder, wenn sie es einmal bekommen hat, und unterscheidet sich hierdurch von der vorigen." In der letztern Angabe irrt sich Dr. G. bekanntlich, denn der Papstfink gehört ebenso wie der Indigofink zu denen, welche sich im Herbst zum unscheinbaren Kleide des Weibchens verfärben. Das Männchen unterscheidet sich vom letztern dann nur durch die etwas dunklere Schattirung. Dr. v. Frantzius sah ihn auf Kostarika, macht jedoch keine näheren Mittheilungen. Die eingehendste Schilderung des Freilebens hat Audubon gegeben. Dasselbe stimmt im hauptsächlichsten mit dem des Indigofink überein und ich brauche daher nur kurz darauf einzugehen: Im Oktober wandert er südlich nach Mexiko und bis Südamerika und etwa in der Mitte des April kehrt er zurück. Sein Lieblingsaufenthalt sind Obstpflanzungen. Jedes Pärchen hat ein kleines beschränktes Gebiet, aus welchem es eifersüchtig alle anderen Vögel vertreibt. Das Männchen sitzt auf der höchsten Spitze eines Baumes, wo sein Prachtgefieder in den Sonnenstralen herrlich erglänzt, erhebt sich singend in die Luft und führt sonderbare Flugkünste aus und beginnt wol einen hitzigen Kampf mit seinem nächsten Nachbar oder einem andern in sein Gebiet dringenden Männchen. Zuweilen nistet ein Pärchen in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen und dann kann man das Männchen nicht selten anstatt auf hohen Zweigen auf der Dachfirste oder dem Schornstein sitzend bemerken. Fast in ganz Nordamerika wird der Vogel gern gesehen, namentlich von den deutschen Ansiedlern, auch viel gefangen und in Käfigen gehalten und selbst hier und da gezüchtet. Man überlistet ihn gewöhnlich in ähnlicher Weise als bei uns den Edelfink, mit Schlagfalle oder Leimrute, indem man durch einen lebenden oder ausgestopften Vogel seine Eifersucht reizt. Die jüngeren werden scharenweise mit Netzen an der Tränke gefangen. Den Gesang halten die amerikanischen Schriftsteller für schwächer und einförmiger als den des Verwandten, während die deutschen Liebhaber ihn allenthalben recht gern hören; jedenfalls erklingt er, wenn auch wenig wechselvoll, doch angenehm. Nest, Gelege und Entwicklung der Jungen sind fast völlig übereinstimmend; doch zieht er im Gegensatz zu jenem jährlich zwei Bruten auf.

Auch von dieser Art ist das Weibchen im Handel nicht leicht zu erlangen, freilich nicht so schwer, wie bei der vorigen. Die hauptsächlichste Schwierigkeit der Züchtung liegt darin, daß man sehr häufig Vögel als Weibchen kauft, welche erst im nächsten Frühjahr blaue Köpfe bekommen und also als junge Männchen sich zeigen. Dann aber ist es meistens für das laufende Jahr zu spät, um noch ein andres Weibchen zu beschaffen — und im nächsten Jahre ist das Männchen fast regelmäßig nicht mehr brutfähig. Ich erhielt zuerst im Jahre 1870 von Herrn Karl Hagenbeck drei Pärchen, deren Männchen einander in der Vogelstube so arg befehdeten, daß ich sie sogleich trennen mußte. Das eine Pärchen begann gegen den April hin mit dem Nestbau. Das Weibchen trug weiche Papierstreifen, Heuhalme und Bastfasern zu einer losen Unterlage zusammen, packte darauf etwas Moos und formte nun aus Baumwollfäden, Werg, Pferdehaaren und Agavefasern eine flache Mulde. Die Brutdauer beträgt 13 Tage. Das Weibchen brütete allein. Sobald die Jungen das Nest frühzeitig verlassen, fing das Weibchen sogleich eine neue Brut an. Das Verhältniß der beiden Gatten eines Pares ist ein eigenthümliches, von dem anderer Finken ziemlich abweichendes. Eine eigentliche Zärtlichkeit findet kaum statt; Männchen und Weibchen werden mit der herannahenden Brutzeit sehr aufgeregt und lebhaft und wippen mit den Schwänzen auf und ab. Sobald das Weibchen zu bauen beginnt, zeigt das Männchen sich gegen alle anderen Vögel sehr böse, indem es die Umgebung des Nestes bewacht und jeden etwaigen Ruhestörer vertreibt. Im übrigen betheiligt es sich an der Herstellung desselben garnicht, füttert auch kaum hin und wieder einmal das Weibchen und zeigt erst mehr Theilnahme, wenn die Jungen heranwachsen, welche dann von beiden gemeinsam ernährt werden. Diese gleichen dem alten Weibchen. Wenn das letztre nun von neuem zu nisten anfängt, füttert das Männchen allein die Jungen noch geraume Zeit hindurch. Das erste Nest in meiner Vogelstube stand frei in einem dichten Birkbusch etwa in Mannshöhe; zum zweitenmal wurde in das mit Leinwand ausgenähte Korbnest eines ganz niedrig an der Wand hängenden Harzer Bauerchens gebaut und zum drittenmal wurde es, wahrscheinlich weil das Pärchen von einem Madagaskarweber arg befehdet worden, ganz hoch an der Decke in einem Tannengebüsch angelegt. Das Gelege bestand immer nur in 3 bis 4 Eiern.

Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß durchaus keine große Mühe erforderlich ist, um den Papstfink zu züchten. Bei entsprechender Verpflegung und Einrichtung des Käfigs und umsomehr in der Vogelstube schreitet er regelmäßig zum Nestbau und erzieht fast immer glücklich zwei und selbst drei Bruten hintereinander. Da in den ersten Frühlingsmonaten frische Ameisenpuppen nur schwierig zu beschaffen sind, so gewöhne man die Vögel an eingequellte, mit Eierbrot, Eikonserve und dergleichen Gemische nebst Mehlwürmern, womit sie die Jungen

gut großfüttern. Während das Hochzeitskleid des alten freilebenden Männchens farbenreich und prächtig, allerdings schmetterlingsähnlich bunt, so ist das des jungen Männchens im ersten Frühlinge noch kaum von dem des alten Weibchens zu unterscheiden, bei großer Aufmerksamkeit kann man es an dem sich mehr und mehr gelb bis orangefarben abhebenden Augenringe und der helleren Unterseite erkennen. Auch im zweiten Jahre erlangt es noch beiweitem nicht die volle Schönheit des Alterskleides; es ist unterhalb gewöhnlich nur orangefarben, an Flügeln und Schwanz aber fast einfarbig grün. Das junge Weibchen erscheint dann düsterer grün und matter gelb als das alte. Wenn sich die gezüchteten Vögel überhaupt so prächtig verfärben sollen, als es die im Freien erwachsenen sind, so bedarf es außerordentlich verständnißvoller Pflege und günstiger Verhältnisse zugleich. Jene Prachtfarben sind nämlich so sehr zart und vergänglich, daß fast alle eingeführten Papstfink-Männchen in der Gefangenschaft binnen kurzer Zeit das schöne Roth und selbst das Blau verlieren und sich in unscheinbares Grüngelb, ja sogar in düstres Bräunlichgrüngelb verfärben. Obwol man es bei entsprechender Fütterung mit Sämereien und Fleischnahrung zugleich ermöglichen kann, daß der Unvergleichliche viele Jahre hindurch in der Gefangenschaft ausdauernd sich zeigt, obwol man ihn mit Glück zu züchten und die Jungen ebenso wie die Alten zu erhalten vermag, so ist es bis jetzt doch noch kaum gelungen, zu erzielen, daß einerseits die letzteren sich zu den prächtigen Farben zurückverfärben und daß andrerseits die ersteren dieselben sicher erhalten. Nur in überaus seltenen Fällen, bei günstigsten Licht-, Luft- und Fütterungsverhältnissen ist die Farbenpracht beim alten zurückgekehrt oder beim jungen erschienen. Eine sichere Kenntniß dieser Verhältnisse, der Ursachen des Verschwindens und Wiederkommens jener Farben haben wir noch nicht. In Hinsicht des Wesens dieses Vogels, seiner Friedlichkeit, Verpflegung u. s. w. gilt durchaus das über den Indigofink Gesagte. Auch mit ihm hat man neuerdings vielfach versucht, Kanarienbastarde zu ziehen. Trotzdem mir aber kein zuverlässiger Fall einer solchen gelungnen Züchtung bekannt geworden, so zweifle ich durchaus nicht an der Möglichkeit. Um seiner Schönheit und der übrigen Vorzüge willen gleicherweise verdiente er wirklich die Bevorzugung, welche ihm, wie erwähnt, vielfach zutheil wird. Die Anfänger in der Liebhaberei für die fremdländischen Vögel sollte man jedoch immer auf die Vergänglichkeit seiner Prachtfarben und auf die Nothwendigkeit einer zweckmäßigen Verpflegung hinweisen, wie solche vorhin angegeben ist. Im Sommer sind auch halbreife Grassämereien, Hafer u. a. und späterhin allerlei Beeren und Früchte und auch Grünkraut zu bieten. Außerdem aber ist stets frische, warme Luft und reichliches unmittelbares Licht, jedoch auch ein Schutzdach oder eine dichte Rute im Käfige gegen die sengenden Sonnenstralen nothwendig. Bei bloßer Körnerfütterung geht er fast regelmäßig an Verstopfung u. a. Krankheiten in der Mauser zugrunde.

Beiläufig ſei angeführt, daß nach der von Profeſſor Dr. Blaſius aufgeſtellten, in verſchiedenen Werken veröffentlichten Liſte der europäiſchen Vögel der Papſtfink auch als in England vorkommend aufgeführt iſt. Baird bemerkt dazu, daß es doch wol nur ein dem Käfige entflogner Vogel geweſen ſein könne. In derſelben Weiſe ſah ich im Sommer 1871 mehrere Wochen hindurch ein prächtiges Männchen unter den Sperlingen auf dem Leipziger und Potsdamer Platz von Berlin, bis es dann plötzlich verſchwunden, wol von einem Liebhaber eingefangen oder von einer Katze geraubt war.

Der Preis beträgt im Großhandel für das Dutzend Männchen 60 Mark, für das Stück 8 Mark, für das Dutzend Weibchen 36 Mark, für das Stück 5 Mark, doch ſchwanken die Preiſe wie bei dem vorigen. Im Inlande, bei den Händlern zweiter Hand, kauft man das Männchen für 9 bis 15 Mark und das Pärchen für 15 bis 18 Mark.

Der Papſtfink oder Unvergleichliche heißt auch in Deutſchland Nonpareil. — Le Pape ou Nonpareil; Nonpareil Finch or Painted Finch; Nonpareil-vink (holländiſch); Mariposa pintada (ſpaniſch). — Arco-iris (in der Stadt Trinidad das Männchen, nach Gundl.); Verdon (ebendaſelbſt das Weibchen, nach Gundl.).

Papſt oder blauköpfiger Diſtelfink (Cat., Buff.); Papſtvogel (Müll.); amerikaniſcher Fink (Scopoli); dreifarbiger Fink und gemalter Vogel (Seeligm.); gemalter Ammer (Bechſt.).

Nomenclatur: Emberiza ciris, *L.*, *Wls.*, *Bchst.*; Passerina ciris, *Vll.*, *Gndl.*, *v. Hmr.*; Fringilla ciris, *Audb.*; Spiza ciris, *Bp.*, *Audb.*, *Cb.*; Cyanospiza ciris, *Brd.*, *Br.*, *Frntz.* [Fringilla tricolor, *Cat.*, *Kln.*; Fringilla mariposa, *Scpl.*; Painted Finch, *Cat.*, *Penn.*; Pinson de trois couleurs, *Cat.*; the China Bul-finch, *Alb.*; le Verdier de la Louisiane, *Briss.*; le Pape, *Buff.*; Painted Bunting, *Lath.*, *Brd.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf, Nacken bis zum Rücken und Kopfſeiten ultramarinblau; ein breiter Streif vom Schnabel bis zum Auge gelblich, der ſchöne ſchmale Augenring lebhaft roth; Mantel und Schultern hell-, Flügel dunkelgrasgrün; Schwingen- und Schwanzfedern dunkelgrünlichbraun, düſterröthlich außengeſäumt, die letzten kleineren Schwingen jedoch einfarbig grün; die größten oberen Flügeldecken düſterroth, wodurch eine ſchräg ſtehende Querbinde über den Oberflügel gebildet wird, die kleineren Flügeldecken bläulichgrün; Bürzel und obere Schwanzdecken düſterroth; ganze Unterſeite lebhaft ſcharlachroth; Schnabel dunkelbraun, Unterſchnabel heller bläulich; Auge dunkelbraun; Füße bläulichgrau. — Weibchen oberhalb dunkelgrün, Geſicht und Kehle weißlichgelbgrau; Mantel und Schultern dunkelgelblichgrün; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, düſtergrün außengeſäumt; Bruſt düſtergrünlichgelb; Bauch, Hinterleib und untere Schwanzdecken fahl olivengelb. — Jugendkleid (wie immer ſogleich nach dem Ausfliegen aufgezeichnet): Oberhalb fahl graugrün, Geſicht und Kehle gelblichgraugrün; Schwingen und Schwanz dunkelbräunlichgraugrün; ganze Unterſeite fahl grünlich gelb, bemerkbar heller als das alte Weibchen; beide Geſchlechter gleichgefärbt.

Fringilla ciris: capite, cervice usque ad dorsum capitisque lateribus ultramarinis; stria lata a rostro ad oculum usque flavida; annulo oculari angusto laete rubro; interscapilio scapulisque dilute, alis obscure herbaceis; remigibus rectricibusque virente fuscis, exterius ferrugineo-limbatis; remigibus secundariis posticis unicoloribus viridibus; tectricibus al. minoribus deuteris rubiginosis fasciam trans alam fingentibus obliquam; tectricibus al. proteris aeruginosis, uropygio et supracaudalibus ferrugineis; gastraeo toto laete scarlatino; rostro fusco, mandibula coerulescente; iride fusca; pedibus subcoeruleo-cinereis.

♀ supra obscure viridis, facie gulaque luride canis; interscapilio scapulisque obscure flavente viridibus; abdomine crisso et infracaudalibus livide olivaceo-aurantiis.

Länge 13,9 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 5,2 cm.

Juvenis: luride glauca, facie gulaque e flavido glaucis; remigibus caudaque fumoso-virentibus; subtus livide virens, dilutius quam ♀ adulta (serius utraque concolor).

Beſchreibung des Eies: Grundfarbe weiß mit einem Stich ins bläuliche. Ueber das ganze Ei zerſtreut, doch mehr am ſtumpfen Ende vereinigt, violette, roſafarbene und braune kleine Flecke; matt, bauchig; Länge 19 mm.; Breite 14 mm. (Nehrkorn). Auf perlweißem Grunde dunkelpurpurbraun gefleckt (Audubon). Bläulichweiß, braun und violett beſpritzt, am dickeren Ende mit Fleckenkranz (Ruß).

Ovum: lacteum maculis minutis violaceis, rosaceis fuscisque praesertim in basi obsitum (Nehrkorn). O. margaritaceum e fusco purpureo-maculatum (Audubon). O. lacteum maculis fuscis et violaceis in basi fingentibus coronulam (Russ).

Der liebliche Papſtfink [Fringilla amoena] und **der vielfarbige Papſtfink** [Fringilla versicolor]. Die beiden nächſten Verwandten des Indigo- und Papſtfink würden zu den willkommenſten, weil ſchönſten Erſcheinungen in der Vogelliebhaberei gehören, wenn ſie nicht die allerſeltenſten wären. Beide ſind nachweislich bisher nur einmal lebend nach Europa gelangt, und zwar kaufte ſie im Jahre 1875 Direktor Dr. Bodinus in mehreren Köpfen von jeder Art für den Berliner zoologiſchen Garten vom Direktor Bekemans in Antwerpen, welcher letztere ſie bisher ebenfalls noch niemals beſeſſen hatte. Ebenſo ſind ſie bis jetzt im zoologiſchen Garten von London noch nicht vorhanden geweſen.

Der liebliche Papſtfink iſt an Kopf, Hals, Unterrücken und oberen Schwanzdecken ſchön und glänzend indigoblau; Rücken ſchwärzlichblau mit lebhaft blauem Schein; Schultern bräunlichſchwarz mit zwei weißlichen Querbinden, deren obere breiter und mehr weiß iſt, die weißen Deckfedern mit gelblichem Spitzenrande; Schwungfedern ſchwarzbraun mit bläſſerem weißlichen Vorderrande; Schwanzfedern ſchwarzbraun mit bläulichen Rändern; Bruſt lebhaft roſtgelb, Oberbruſt roſtroth; Unterbruſt und Bauch weiß, Seiten roſtgelb überlaufen. Schnabel und Füße bräunlichſchwarz, Auge graubraun (nach Prinz v. Wied). Weibchen oberhalb düſterfahlbraun; Schwingen und Schwanzfedern braun, düſtermeerblau außengeſäumt und mit einer helleu Querbinde; kleine Flügeldecken und Bürzel düſtergrünlichblau; ganze Unterſeite hellbräunlichroſtfarben, Kehle und Oberbruſt dunkler, Bauch und untere Schwanzdecken heller weißlich. Schnabel dunkelbraun, Unterſchnabel heller, Auge hellbraun, Füße ſchwarzbraun. Größe des Indigofink. Heimat die Hochebenen im Weſten von Nordamerika und Kalifornien. Ueber ſein Freileben iſt faſt garnichts bekannt. Prinz v. Wied beobachtete einen Schwarm Männchen am oberen Miſſouri, wo ſich dieſe Art in den großen Pappelwaldungen gewöhnlich parweiſe aufhält. Das ſchöne blaue Männchen ſitzt wie unſer Buchfink auf einem Zweige, 3—4 Meter hoch, und läßt ſeinen kleinen Geſang hören. Im September ſieht man ſie familienweiſe

zu sechs bis acht Köpfen südwärts ziehen. — Thomas Say lieferte die erste Beschreibung, als er mit Major Long die Reise nach den Felsenbergen machte. Später brachte Townsend mehrere Exemplare vom Kolumbiaflusse mit. Auch das Nest hat dieser Beobachter gefunden und Audubon hat dasselbe beschrieben. Der letztere und Bonaparte gaben zugleich Abbildungen, von denen jedoch nur die Audubon's im allgemeinen zutreffend ist. In der Lebensweise wie in allem übrigen dürfte der Vogel mit den beiden Verwandten durchaus übereinstimmen.

Der vielfarbige Papstfink ist von dunkelbräunlich-purpurrother Grundfarbe; Stirnrand, Zügel und Bartzeichnung sind schwarz, und der Augenring ist zinnoberroth; Vorderkopf, Augenbrauenstreif und Backen sind lilablau; Mantel bräunlichpurpurroth, jede Feder fahl endgesäumt; Schwingen und große Flügeldecken dunkelbraun, fahlbläulichgrau außengesäumt, kleine Flügeldecken lilablau, ebenso der Bürzel; die oberen Schwanzdecken sind reindunkelblau; Schwanz dunkelbraun, jede Feder schmal düsterblau außengesäumt; Kehle fahlpurpurroth, ganze übrige Unterseite purpurviolett, von der Bauchmitte an fahlgrau. Eine Beschreibung des Weibchens ist nicht zu finden und unter den nach Berlin gelangten Vögeln war ein solches auch nicht vorhanden. Ueber das Freileben ist nichts bekannt und dasselbe wird wol sicherlich mit dem der Verwandten übereinstimmen. Die Heimat erstreckt sich nach Baird über Mexiko bis zum Rio grande; nach Bonaparte kommt er auch in Peru vor und nach einem populären Schriftsteller auch in Guatemala und Honduras. Beide Arten dürften selbst in ihren Heimatsländern nicht häufig sein, und daher können wir wol kaum erwarten, daß sie jemals zahlreich im Vogelhandel erscheinen werden.

Der liebliche Papstfink ist von Prinz v. Wied blauköpfiger Zierfink und von Br. Lazulifink genannt. — Le Pape-Lazuli; Lazuli Nonpareil Finch; Lazuli Finch (Baird). — Emberiza amoena, *Say*; Fringilla amoena, *Bp.*, *Audb.*; Spiza amoena, *Bp.*, *Audb.*, *Pr. Wd.*; Cyanospiza amoena, *Brd.*, *Br.* — Der vielfarbige Papstfink oder vielfarbige Zierfink heißt bei Br. Buntfarbenfink. — Many-coloured Nonpareil Finch; Le Pape versicolor. — Spiza versicolor, *Bp.*, *Cb.*; Carduelis luxuosus, *Lss.*; Cyanospiza versicolor, *Brd.*, *Br.*; Fringilla lazulina, *Lchtst.* [Spiza Leclancheri, *Lfrsn.*].

* * *

Als **Sperlinge** reihen die meisten Ornithologen eine vielgestaltige Vogelgruppe ohne weiteres den bisher besprochenen Finken an und scheiden sie nur in viele mehr oder minder berechtigte Sippen. Da ich jedoch das Wort Sperling im weitesten, volksthümlichen Sinne hier auffasse, so zähle ich nicht allein die eigentlichen Sperlinge (Passer, *Briss.*) nebst allen kleineren Sippen (Stein- oder Felsensperling, Goldsperling, Kehlsperling u. a.), sondern auch die Ammersperlinge oder Ammerfinken mit. Eine Berechtigung dazu giebt mir die Thatsache, daß diese Vögel als: Passer, Passerella, Passérculus, ferner als Fringilla und Emberiza neben den in unendlicher Mannigfaltigkeit aufgestellten Namen: Embernagra, Haemophila, Zonotrichia, Pooecétes, Chondestes, Peucaea, Niphaea, Phrygilus, Ammódromus, Hedyglossa, Spinus, Spiza, Euspiza, Haplospiza, Melospiza, Rhopospiza, Coturniculus, Struthus u. s. w., von den verschiedenen Gelehrten und Ungelehrten aufgeführt werden Um

nur einigermaßen Klarheit in diesen fabelhaften Namenwirrwar zu bringen, bleibt mir nichts andres übrig, als daß ich alle diese Vögel als Sperlinge zusammenfasse oder sie in zwei große Gruppen scheide und die sog. Ammerfinken den Ammern (Emberiza, *L.*) anschließe. Ich wähle das erstre und führe alle diese Vögel meinen Lesern als Sperlinge vor.

Die Gesammtheit der Spazen bietet für die Vogelliebhaberei im allgemeinen nur ein überaus geringes Interesse. Wol giebt es unter ihnen einzelne recht hübsche Erscheinungen; die meisten aber gewähren weder als Sing- noch als Schmuckvögel solche Annehmlichkeiten, daß man einen besondern Werth auf ihre Haltung und Züchtung legen könnte. Bis jetzt haben meines wissens auch kaum einige Arten als seltene Ausnahmen in der Gefangenschaft genistet. Im Sinne des ganzen Plans meines Werks darf ich daher sämmtliche Sperlinge nur kurz und übersichtlich behandeln. Für die besonderen Liebhaber sei jedoch noch bemerkt, daß die eigentlichen Sperlinge ausdauernde kräftige Vögel sind, während die Ammersperlinge zarter und weichlicher erscheinen. Die Verpflegung und Fütterung ist mit der aller bisher geschilderten Finken übereinstimmend.

Der Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung [Fringilla arcuata].

Dem europäischen Sperlinge in Gestalt und Größe gleich und in der Färbung sehr ähnlich, ist er doch ungleich schöner. Der Oberkopf von der Stirn bis zum Nacken, Backen und Kehle und ein Schild auf der Oberbrust sind tiefschwarz; ein breiter Streif vom Auge zum Ohr und hinunter, in einen noch breitern Halskragen sich erweiternd, sind reinweiß; Schultern und Nacken grau; Mantel und Rücken bis zum Bürzel rothbraun; Flügel schwärzlich mit zwei breiten weißen Querbinden und jede Feder mit breitem fahlen Saum; Schwanz oberseits ebenso, unterseits dunkelaschgrau; ganze Unterseite bräunlichweiß; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße braungrau. Das Weibchen ist an Oberkopf und Hinterhals nicht schwarz, sondern graubraun; Augenbrauenstreif bis zum Schlaf weißlichrostgelb; ein Streif ums Ohr bräunlichgrau; der übrige Kopf, sowie die Halsseiten hellgelblichrostroth; Kehle und Oberbrust graubraun; ganze Unterseite gelblichrothweiß. Seine Heimat soll sich nur über Südafrika, insbesondre das Kaffernland erstrecken. Brisson schon gab ihm den von mir angeführten Namen und Buffon beschrieb ihn als kap'schen Sperling oder Kernbeißer. Die übrigen älteren Schriftsteller erwähnen ihn nicht. Ebensowenig ist näheres über sein Freileben bekannt. Die Lebensweise soll nach Layard der des gemeinen Spaz in jeder Hinsicht gleichen, also auch darin, daß er ebenso lediglich oder doch vorzugsweise an und in den menschlichen Wohnungen sich aufhält und nistet.

Er wird nur selten einzeln oder parweise von Fräulein Hagenbeck oder Chs. Jamrach eingeführt. Ich besaß ein Pärchen geraume Zeit, ohne daß es, freilich im Käfige mit anderen zusammengehalten, zur Brut gelangte. Da beide Vögel späterhin am Wurm im Gehirn eingingen, während diese scheußliche Krankheit sonst unter der Bevölkerung meiner Vogelstube noch garnicht vorgekommen, so ist es ja möglich, daß sie solche bereits mitgebracht hatten, trotzdem sie erst nach nahezu 1½ Jahren zum Tode führte, und daß in derselben eben auch ihr Verhalten begründet gelegen. Ein andres Pärchen im zoologischen Garten von Berlin nistete sehr leicht, erzog jedoch keine Jungen. Wenn dieser Sperling gesund in

unſere Vogelſtuben und Käfige gelangt, ſo wird er ſicherlich unſchwer zu züchten ſein. Der Preis iſt hoch; man kauft das Pärchen nicht unter 15 bis 18 Mark.

Der Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung heißt im Handel Kapſperling. — Le Moineau du Cap; Cape Sparrow.

Nomenclatur: Passer arcuatus, *Gr., Cb., Lrd., Br.*; Passer hispaniolensis, *Dglnd., Gld.*; Pyrgita arcuata, *Hier.* [Passer capitis bonae spei, *Briss.*; Le Moineau du Cap de bonne espérance, *Briss.*; le Croissant, *Buff.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 438.

Fringilla arcuata: pileo a fronte usque ad cervicem, genis, gula clipeoque gutturali atris; stria lata ab oculo usque ad aurem et deorsum in collare latius dilatante pure albis; cervice scapulisque cinereis; interscapilio dorsoque usque ad uropygium ferrugineis; fasciis duabus latis trans alas subnigras albis; pluma quaque late livide limbata; gastraeo toto sordide albido; iride fusca; rostro nigro; pedibus fumosis. ♀ pileo haud nigro, sed fumigato; stria superciliari usque ad regionem temporalem gilva; stria circa aurem subfumida; capite reliquo collique lateribus subfulvis; gula guttureque fumosis; gastraeo toto ochraceo.

Länge $14,_4$ cm.; Flügel $7,_8$ cm.; Schwanz $5,_7$ cm.

Swainſon's Sperling [Fringilla Swainsoni].

Ein rechter Spaz, im Weſen dem europäiſchen ſehr ähnlich und mit allen ſeinen Untugenden, Frechheit, Dreiſtigkeit, Zudringlichkeit. Kopf und Hals graubraun; Mantel, Schultern und obere Schwanzdecken deutlicher braun; obere Flügeldecken, Mittel- und Hinterrücken zimmtrothbraun; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, an der Außenfahne ſehr ſchmal fahlbraun geſäumt; Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne roſtbraun gerandet, eine mehr oder minder deutliche weiße Querbinde über den Oberflügel. Kinn, Bauchmitte, unterer Hinterleib und untere Flügeldecken faſt weiß; ganz Unterſeite bläulichgrau. Schnabel ſchwarz (im Winter iſt der Schnabel wie beim Hausſperlinge heller, mit gelblichem Grunde, Hgl.); Auge kaſtanienbraun; Füße hell röthlichbraun. — Weibchen mit dem Männchen übereinſtimmend, aber alle Farben heller; Bauch, Hinterleib und untere Schwanzdecken reinweiß; über den Flügel geht eine breite weiße Querbinde; Schnabel hell hornbraun, Unterſchnabel heller; Größe des Hausſperlings. Nach Finſch und Hartlaub unter allen afrikaniſchen Verwandten am weiteſten, faſt über den ganzen Erdtheil verbreitet. Heuglin meint, daß er im Gebirge nicht über 2000 bis 2300 Meter hinaufgehe. Man wollte mehrere Lokalraſſen oder wol gar beſondere Arten nach der abweichenden Größe, lebhafteren Färbung, größern, geringern oder ganz fehlenden Flügelbinde unterſcheiden; ſo namentlich den kleineren einfachen Spaz (F. simplex, *Swns.*) von Weſtafrika und den Angolaſpaz (F. diffusa, *Smth.*). Sie dürften ſicherlich zu einer Art zuſammenfallen, und für die Liebhaberei brauchen ſie keinenfalls getrennt zu werden. „Swainſon's Sperling lebt pärchenweiſe in Kordofan, am weißen und blauen Nil, Abeſſinien, den Bogosländern u. a., wo er wol überall Wandervogel iſt und Felder, Lichtungen, Steppenland, Gehöfte und Dörfer beſucht. Sein Benehmen, Nahrung und Lockton kennzeichnen ihn als echten Sperling, doch iſt der letztre rätſchender. Das Neſt fand ich während der ganzen Regenzeit theils in Strohdächern, unter Dach-

sparren, in Mauerlöchern, theils in dichten Dorngebüschen. Brehm will es schon im April gesehen haben. Auch benutzt dieser Spaz gern fremde Nester, wie die der Gelbweber, Schuppenköpfchen u. a. Die selbstgebauten sind verhältnißmäßig klein, von außen aus Grashalmen, Wurzeln, Zeugstücken, Baumwolle zusammengetragen, und innerlich lose mit Haren, Federn u. drgl. gefüttert. Gelege 3 bis 4 Eier. Im Herbst rottet er sich auch zuweilen in Familien und Flüge zusammen, welche dann weit im Lande umherstreifen." (Heuglin). Reichenow giebt an, daß er in der Stimme und ebenso in der Lebensweise und Fruchtbarkeit dem Haussperling gleiche. Er fand an der Goldküste am 10. August drei, am 25. fünf Eier und zu Ende Septembers große Junge im Nest. Gordon sagt, daß dieser Sperling an der Westküste viel weniger dreist und unverschämt als anderwärts sei, er fliege dort in den Straßen der Ortschaften umher, besonders in den Vorstädten, zeige sich jedoch recht scheu und vorsichtig.

Nur einzeln oder in wenigen Pärchen und zufällig mit anderen Vögeln zusammen eingeführt gelangt er in den Handel und zwar namentlich von Antwerpen aus. Ich habe es mehrmals versucht, ein Pärchen in der Vogelstube zu züchten. Dort richtet er sich sofort häuslich ein. Das Nest stand in den verschiedensten Oertlichkeiten, zuerst einmal in einem Frühauf'schen Nistbaum für Wellensittiche, nur aus Heuhalmen und vielen Federn geschichtet; dann wurden die Nester von Prachtfinken und Webervögeln eingenommen und die rechtmäßigen Bewohner verdrängt. In dieser Hinsicht erscheint der Spaz als ein böser Kunde, indem er eine fast ebenso schadenbringende Thätigkeit wie der Bandfink entwickelt. Einmal baute das Pärchen auch ein sehr schön gestaltetes Nest frei im Gebüsch. Die Grundlage bestand aus Reisern und Halmen, auf dieser war die Höhle aus Agavefasern, Fäden und Halmen geformt und mit Federn ausgepolstert. Das obere Dach aber bildeten dünne schmiegsame Birkenreiser, welche gewölbt, ähnlich wie beim Nest der Elster, eingefügt worden. Gelege 4 bis 6 Eier. Das Jugendkleid ist einfarbig fahl bräunlichgrau; Kopf heller grau; ganze Unterseite fahl weißlichgrau; die Flügelbinde ist schwach fahlgelb angedeutet; Schnabel braun mit breitem gelben Grunde; Auge schwarz; Füße fleischgrau. Außer der Nesterzerstörung wird dieser Spaz auch dadurch verderblich für die Vogelstube, daß er gegen Prachtfinken und andere kleine Genossen sich sehr bissig und boshaft zeigt, während er doch keine Vorzüge als Stubenvogel hat. Einen Gesang habe ich niemals vernommen, wol aber läßt er, wenn man ihn greift und in der Hand hält, langgezogene, klagende melodische Laute erschallen, welche man sonst nicht von ihm hört. Er erfreut sich in der Liebhaberei keiner Beachtung und wird nicht einmal zu dem geringen Preise von 6 bis 9 Mark für das Pärchen gekauft.

Swainson's Sperling oder der Swainsonsperling ist auch Swainson'scher Sperling (Hgl.), Waldhüttensperling (Br.) und Swainson's Sperlingsweber (Rchb.) genannt; bei den Händlern heißt er irrthümlicherweise auch Swainsonsweber.

Le Moineau à tête grise; Grey-headed Sparrow.

Nomenclatur: Pyrgita Swainsonii, *Rpp.*; P. diffusa, *Smth.*, *Bp.*; P. simplex, *Swns.* [nec *Lchtst.*], *Grd.*; P. gularis, *Lss.*; Fringilla grisea, *Lfrsn.* [nec *Vll.*; nec *Hgl.*]; Pyrgita spadicea, *Lchtst.*, *Bp.*; Passer Swainsonii et diffusa, *Bp.*; P. Swainsonii, *Rpp.*, *Hgl.*; P. simplex, *Cb.*, *Hrtm.*; P. simplex et diffusus, *Gr.*; P. simplex et diffusa, *Hrtl.*, *Hgl.*; Pyrgita crassirostris, *Pr. Wrtbrg.*, *Hgl.*; Pyrgitopsis simplex, *Hrsf.* et *Mr.*; P. Swainsonii, *Bp.*; Pyrgita simplex et Swainsonii, *Hgl.*, *Antn.*, *Br.*, *Kng.-Wrth.*, *Lrd.*; P. diffusus, *Hrtl.*, *v. d. Dck.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Passer Swainsoni, *Css.*, *Rchn.* [Le Pyrgitopsis de Swainson, *Rchb.*].

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 439.

Fringilla Swainsoni: capite colloque fumeis; interscapilio, scapulis et supracaudalibus distinctius umbrinis; tectricibus al. superioribus, dorso, tergoque cinnamomeis; remigibus rectricibusque fuscis, exterius anguste livide sublimbatis; tectricibus mediis exterius ferruginoso-marginatis; fascia trans alam superiorem albida; mento, abdomine medio, crisso et tectricibus subalaribus albentibus; gastraeo toto e coerulescente cano; rostro nigro (tempore hiemali basi rostri dilutioris flavida); iride badia; pedibus subrufis. ♀ cum mare conveniens, sed omnino dilutior; abdomine, crisso et subcaudalibus pure albis; fascia lata trans alas alba; rostro subcorneo, mandibula dilutiore.

Länge 15—18,1 cm.; Flügel 8—8,9 cm.; Schwanz 5,9—7,4 cm.

Beschreibung des Eies: Denen des Haussperlings gleichend, nicht größer, doch glatt- und dickschaliger, auf hellbräunlichem Grunde dunkel erdbraun gefleckt. Länge 19,5 mm., Breite 15,2 mm. (Heugl.). Auf hellem (?) oder bräunlichem Grunde mit großen verwaschenen, licht oder dunkel kastanienbraunen Flecken. Länge 18,75—19,75 mm.; Breite 14,5—15,25 mm. (Rchn.).

Ovum ovo Fringillae domesticae aequale, at testa laeviore et crassiore; dilute umbrinum, obscurius maculatum (Heuglin). O. subumbrinum, maculis magnis elutis dilute vel obscure castaneis obsitum.

Der Wüstensperling [Fringilla simplex] ist dem vorigen im ganzen ähnlich, und da er einerseits nur einen geringen Verbreitungsbezirk hat und andrerseits auch dort nicht häufig ist, so zeigt er keine Aussicht, als Stubenvogel zu uns zu gelangen — abgesehen davon, daß er als solcher auch keinen Werth haben würde. Er ist zart isabellgrau, mit einem schwarzen, scharf abgegrenzten Strich vom Auge nach der Kehle und Oberbrust; Wangen und ganze Unterseite weißlich. Heuglin fand ihn nur um die Wüstenbrunnen, als Standvogel in kleinen Flügen, die Lagerstätten der Karavanen besuchend. In Wesen, Lockruf u. s. w. gleicht er dem Feldsperling. — Fringilla simplex, *Lchtst.* [nec *Swns.*]; Passer simplex, *Hgl.*

Der rothköpfige Sperling [Fringilla italica], dem europ. Haussperlinge so ähnlich, daß ihn die meisten Vogelkundigen nur als örtliche Spielart ansehen; Oberkopf und Nacken einfarbig braun, über dem schwarzen Zügelstreif noch ein schmaler weißer; Brustschild nicht rein-, sondern grauschwarz; Bürzel und obere Schwanzdecken dunkler graubraun. Vorzugsweise Gebirgsvogel und außer dem Osten von Südeuropa auch über Kleinasien und Theile von Nordostafrika verbreitet. Er war noch nicht im Handel vorhanden. — Rothkopfsperling (Br.). — Fringilla Italiae, *Vll.*; F. cisalpina, *Tmm.*; Passer domesticus, var. italicus, *Blas.* et *Keys.*, *Hgl.* — [Moineau d'Italie, *Chn.*].

Der Weidensperling [Fringilla salicicola] wird von einem Vogelkundigen als feststehende Art betrachtet, von anderen aber ebenfalls nur als Spielart des Haussperlings angesehen. Kopf und Nacken sind röthlich-kastanienbraun; Zügenstreif schwarz, Augenbrauenstreif weiß; im übrigen dem Haussperlinge gleich. Weibchen heller als das des letztern. In Lebensweise und Nestbau zeigt er besondere Eigenthümlichkeiten. Unter allen Sperlingen hat er sich dem Menschen am wenigsten angeschlossen. Städte und Dörfer meidet er ganz. Niederungen in der

Nähe der Gewässer, Inseln u. a. sind seine Aufenthaltsorte. Die Nester haben Beutelform und sind denen der Webervögel ähnlich. Verbreitung Spanien, Nordafrika nebst den Kanarischen Inseln und Westasien. In den Handel gelangt ist er noch nicht. — Fringilla salicicola, *Vll.*; F. hispaniolensis, *Tmm.*; Passer salicarius, *Blas.* et *Keys.*; P. salicicolus, *Hgl.* — [Moineau des Saules, *Chn.*].

Der braunköpfige Sperling [Fringilla castanóptera] wurde von dem Naturforscher Speke auf der Hochebene des Somalilandes in Afrika erlegt und befindet sich nur in diesem einen Exemplar im Museum der asiatischen Gesellschaft zu Kalkutta. — Passer castanopterus, *Blth.*, *Hrtl.*, *Scl.*, *Hgl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*

Der Motitasperling [Fringilla motitensis] aus Südafrika ist von Heuglin auch im Nordosten gefunden, wo er im Innern von Kordofan familienweise, jedoch weniger gesellschaftlich als die Verwandten lebt. — Passer motitensis, *Smth.*, *Bp.*, *Lrd.*, *Hgl.*

Der Röthelsperling [Fringilla russata], an Oberkopf und Nacken zimmtroth; Mantel und Schultern ebenso, doch schwarz längsgefleckt; Augenbrauenstreif schmal weiß; nur ein kleiner schwarzer Fleck an der Kehle; sonst dem Haussperlinge gleich, doch die Unterseite hellgrau. Weibchen an Kopfseiten und Kehle fahl rostgelblich, sonst mit dem des H. übereinstimmend. Heimat China und Japan, auch die Insel Formosa. — Passer russatus, *Tmm.*, *Schlg.*; P. rutilans, *Tmm.*

Der Baumsperling [Fringilla arbórea, *Lchtst.*], welcher über fast ganz Nordostafrika verbreitet ist, wird von den meisten Vogelkundigen lediglich als örtliche Abart des Haussperlings angesehen.

(Ich füge hier einige Bemerkungen Heuglin's an, aus welchen sich das Verhältniß, in dem alle zuletzt besprochenen Sperlinge zum Haussspaz stehen, am besten ergiebt: „Man hat versucht, ihn in mehrere Arten oder klimatische Varietäten zu scheiden, zwischen denen sich jedoch keine ganz scharfen Grenzen ziehen lassen. Die hauptsächlichsten, bei den alten Männchen deutlicher hervortretenden Unterschiede bestehen in abweichender Färbung des Scheitels, der beim Weiden- und rothköpfigen Sperling lebhaft rostbraun ist. Der erstre zeigt zugleich noch viel hellere, fahl gelblichweiße Außenfahnen der Federn des Mantels und eine breite, kräftige, schwarze Schaftstreifung an den Weichen und Brustseiten auf ziemlich reinweißem Grunde. Der südliche Haussperling ist im allgemeinen etwas kleiner, dagegen lebhafter gefärbt [Baumsperling; F. arbórea, *Lchst.*] als der europäische; das Schwarz auf Kehle und Oberbrust ist mehr ausgedehnt, die Ränder der Federn sind hier häufig scharf weiß; Wangen und Unterseiten sind heller, oft fast reinweiß, der weiße Augenbrauenstreif ist zuweilen scharf oder auch ganz verwischt, ebenso die Flügelbinden").

Der St. Jago-Sperling [Fringilla jagoënsis]:· Oberkopf und Hinterhals dunkelbraun; Zügelstreif und Strich unterm Auge schwarz; ein breiter, zimmtrother Streif an den Kopfseiten; ganze Oberseite zimmtbraun, Mantel breit schwarz längsgestrichelt; Kehle mit länglichem schwarzen Fleck; ganze Unterseite bräunlichweiß. Weibchen ohne den dunkelbraunen Oberkopf, Zügel- und Augenstreif; Schnabel schwarz; Füße bräunlichgrau. Größe geringer als die des europäischen Feldsperlings. Heimat die Inseln des grünen Vorgebirges. Gould hat ihn unter den Vögeln beschrieben, welche von der Reise des Schiffes „Adler" herrühren. Die Lebensweise soll mit der des erwähnten Verwandten übereinstimmen und die Eier, welche Dohrn im Januar erhielt, waren denen des Haussperlings gleich. — Zwergsperling (Br.). — Passer jagoënsis, *Gld.*, *Dhrn.*, *Br.*; P. Hansmanni, *Bll.*; P. erythrophrys, *Tmm.*

Der Steinsperling [Fringilla petronia].

Als Stubenvogel muß ich einen Sperling mitzählen, welcher durch Bolle's herrliche Schilderung großes Interesse erregt und zugleich bei manchen Liebhabern

als ein beachtenswerther Sänger gilt. Er ist oberhalb fahl graubraun, mit hellbraunem Scheitelstreif, fahlem Zügel, breitem dunkelbraunen Streif durch's Auge und schmalem gleichen Streif unterm Auge; Mantel dunkelbraun, bräunlichweiß längsgefleckt, über den Flügel eine fahlweiße Querbinde; Schwanzfedern dunkelbraun, matt grüngelblich außengesäumt und mit großem weißen Spitzfleck; unterseits gelblichweiß, jede Feder fahlbraun gesäumt, an der Kehle ein runder hellgelber Fleck; Schnabel dunkelbraun, Unterschnabel bräunlichgelb; Auge braun; Füße düster fleischfarben. Weibchen übereinstimmend, doch mit kleinerem Kehlfleck. Größe des Haussperlings. Heimat Südeuropa, aber auch die kanarischen Inseln, Madeira und nordwestliches Asien.

Bolle beschreibt sein Freileben im einsamen Gebirge, wie in den Ortschaften, wo er ganz in der Weise des Haussperlings sich ansiedelt. Der Lockton ist ein nicht unmelodisches langgedehntes Schnalzen, dem sperlingsartige Laute, wie err, err, folgen. Er ist in Santa Cruz der einzige Sperling und wird viel öfter gehört als gesehen, weil er eben an den höchsten Stellen der Gebäude wohnt und durch seine unscheinbare Färbung dem Auge entgeht. Der Forscher hielt mehrere in der Gefangenschaft; sie werden mit Lockvögeln ins Garn gebracht und sind leicht zu überlisten. Bereits nach wenigen Tagen wurden sie zahm und zutraulich. Als Allesfresser füttert man sie mit Sämereien, süßen Früchten, eingeweichtem Brot, Salatblättern und daneben mit Kerbthieren und Würmern. Besonders lieben sie die noch milchigen Maiskolben und Feigen. Unter einander, sowie gegen andere Vögel sind sie verträglich. Bolle betrachtet den Steinsperling als ein Bindeglied zwischen den Gattungen Sperling und Lerche und sagt: „Ich darf wol behaupten, daß sie ebenso angenehme als selten gehaltene Stubenvögel sind. Toussenel sah sie in Frankreich im Käfige nisten. Nur eins finde ich an ihnen auszusetzen, daß nämlich ihr fortwährend ausgestoßener Ruf sie namentlich im Frühlinge lästig machen kann. Um diese Zeit wird man gut daran thun, sie aus dem Wohnzimmer zu entfernen." Ueber den Gesang sagt der Forscher nichts, dagegen fügt er hinzu, daß dieser Spaz häufig und selbst in der Freiheit an widernatürlicher Wucherung des Schnabels und der Hornhaut der Füße leide. Nach anderen Angaben soll derselbe ein erstaunliches Nachahmungstalent zeigen und den Gesang vieler Vögel ganz vorzüglich wiedergeben lernen. Ueber sein Vorkommen auf den Balearen berichtet Alex. v. Homeyer und bezeichnet ihn als einen scheuen und vorsichtigen Vogel. „Die Männchen sitzen morgens auf hohen Punkten und schreien mit bewundernswürdigem Eifer ihr dreisilbiges ciüīb, ciüīb, welches höchst charakteristisch ist und kaum mit einer andern Vogelstimme verglichen werden kann." Weiter darf ich die Schilderung dieses Sperlings nicht ausdehnen, da er im ganzen doch nur selten, von Krain, der Schweiz oder Italien aus durch Baudisch und Alpi in Triest oder durch Zivsa in Troppau in den Handel gelangt. Preis 9 bis 12 Mark für das Pärchen.

Der Steinsperling wird auch Bergsperling (Br.) genannt. — Auf Madeira Pardao (portugiesisch, nach Zuchold); Pajaro de hermita (d. h. Kapellenvogel, auf Teneriffa, nach

Bolle); Risquero (auf Gomera, nach Bolle); Crucculeu de monti (im südlichen Sardinien), Furfurinū de monte (im nördlichen S.), Passera lagia (in Italien), nach Salvadori.

Moineau des montagnes; Mountain Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla petronia, *L.*, *Gml.*, *Lth.*, *Zchld.*, *v. Mll.*; Fr. stulta, *Gml.*, *Gr.*; Fr. bononiensis et leucura, *Gml.*; Petronia stulta, *Strckl.*, *Bth.*, *Bp.*, *Cb.*, *Hrsf.* et *Mr.*, *Tcznws.*, *Schlw.*; Passer petronia, *Kch.*, *Bll.*, *Hmr.*; Fringilla (Pyrgita) petronia, *Keys.* et *Blas.*, *Krp.*; Petronia rupestris, *Bp.*; Gymnoris petronius, *Htt.*; Pyrgita petronia, *Hgl.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 443.

Fringilla petronia: supra livide fumigata, stria supra verticem dilute umbrina; loris lividis; stria lata per oculum fusca, altera angusta infra oculum; interscapilio fusco, sordide albido-striato; fascia trans alas albente; rectricibus fuscis, exterius virescente flavido-limbatis, lateque albo-terminatis; subtus flavente album, pluma quaque subfumide-limbata; macula gulari dilute flava; rostro fusco; mandibula flavente; iride fusca; pedibus sordide carneis. — ♀ conveniens, macula tantum gulari minore.

Der kurzzehige Steinsperling [Fringilla brachydáctyla] „wurde von Hemprich und Ehrenberg in den Gebirgen nahe bei Qonfudah in Arabien entdeckt und von mir im abessinischen Küstenland und im südöstlichen Kordofan wiedergefunden, und zwar während und nach der Regenzeit vom Ende des August bis Ende des November. Ob Stand- oder Zugvogel, kann ich nicht angeben. Er hält sich in der Nähe von Gehöften (gleich dem Feldsperlinge) auf und rottet sich im Herbst in kleine Flüge zusammen, welche, scheu und flüchtig umherschweifend, ammerartige Locktöne hören lassen. Nach Tristram (welcher ihn auch im Käfige besessen hat) nistet er in Syrien in niedrigen Büschen und legt vier bis fünf weiße, wenig schwarz gefleckte Eier." (Heuglin). Die Heimat erstreckt sich außer Nordostafrika auch über Westasien. Oberhalb fahl bräunlichgrau; Augenbrauen- und Bartstreif fahlweiß; Flügel dunkelbraun, jede Feder fahl heller gesäumt, Oberflügel mit heller Querbinde; Schwanzfedern dunkelbraun, fein heller außengesäumt und mit weißen Spitzenflecken; ganze Unterseite bräunlichweiß; Schnabel fleischroth mit schwärzlicher Spitze; Auge braun; Füße bräunlichfleischfarben. Das Weibchen soll übereinstimmend sein. Größe des Feldsperlings, aber schlanker. — Wüstensperling (Br.). — Fringilla brachydactyla, *Hmpr.* et *Ehrbrg.*; Petronia brachydactyla, *Lchtst.*, *Bp.*, *Cb.*, *Frstr.*, *Hgl.*; Fringilla grisea, *Hgl.*; Pyrenestes lacteus, *v. Mll.*; Carpospiza longipennis, *v. Mll.*, *Cb.*; Carpospiza brachydactyla, *Hgl.*

Der Kehlsperling [Fringilla dentata].

Dem Swainsonsperling ähnlich, doch an einem runden gelben Fleck an der Kehle kenntlich. Als Heimat wird bis jetzt nur Abessinien und der Sudan genannt. Heuglin schildert ihn im Folgenden: „Er erscheint in der Färbung und Gestalt durchaus sperlingsartig. Ich beobachtete ihn längs des blauen Nils und seiner Zuflüsse, einzeln auch im Gebiet des weißen Flusses und im abessinischen Tiefland. Er ist wol Standvogel, findet sich parweise und in kleinen Flügen auf Lichtungen in der Waldregion und in Gewässern. Im Benehmen und Lockton hat er viel Aehnlichkeit mit anderen Sperlingen. Seine Eier sollen in Webervogelnester gelegt werden und reinweiß sein. Im Magen fand ich Gräsersämereien und Insekten." Näheres ist über das Freileben nicht angegeben. Im Handel ist er nicht selten, jedoch immer nur in wenigen Köpfen eingeführt.

Da er weder ſchön iſt, noch ſingt, wol aber in ſperlingsweiſe unfriedlich ſich zeigt und ebenſo die Neſter anderer zerſtört, ſo verlohnt es ſich kaum, ihn als Stubenvogel mitzuzählen; allenfalls iſt er in einem im Freien ſtehenden Flugkäfige unter größeren und derberen Bewohnern zu halten. Das Pärchen treibt ſich ſchwanzwippend in der Vogelſtube umher und zeigt ſich bei jeder Gelegenheit lebhaft und unruhig, doch ſehr dreiſt. Mehrmals haben ſie eine Brut begonnen, viel grobes Geniſt in irgend eine Höhlung oder in ein großes Weberneſt zuſammengeſchleppt und aus Gräſerriſpen, Baumwolle und Federn die Mulde geformt. Sonderbarerweiſe iſt es aber nicht zum Eierlegen gekommen. Uebrigens würde er wol ebenſoleicht als der Swainſonſperling zu züchten ſein; da ich jedoch gerade viele Prachtfinken in der Vogelſtube hatte, entfernte ich die bösartigen Kehlſpazen bald und bin alſo zur Erzielung, bzl. Beobachtung der Brut nicht gelangt. Meines wiſſens hat den Vogel auch ſonſt Niemand gezüchtet, und in der Literatur iſt über die Brut im Freien auch nichts zu finden.

Nomenclatur: Xanthodina dentata, *Sndvll.*, *Hgl.*, *Hrtl.*; Petronia dentata, *Bp.*; Passer lunatus, *Hgl.*; Pyrgita fazoglensis, *Pr. Wrtbg.*, *Hgl.*; Petronia albigularis et P. petronella, *Br.* [nec *Lchtst.*]; Xanthodina dentata et albigularis, *Hgl.*; Pyrgita? *Vrth.*; Pyrgita nigripes, *Mus. Berol.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oben röthlich braungraun; Oberkopf rein aſchgrau; Zügel, Backen, Bruſt, Bauchſeiten und Unterſchwanzdecken heller grau; ein deutlicher Streif über die Augen, vorn weißlich, nach hinten fahl röthlich; über die Backen ein verwaſchener, braungrau eingefaßter Streif; Kinn und Kehlmitte abgegrenzt weiß; an der Oberbruſt ein deutlich gelber Fleck; Schwungfedern, Flügeldeckfedern und Schwanz graubraun; Schulterfedern mit verwaſchenem, Handſchwingen mit deutlicherem hellen Außenrande, letztere nach der Baſis hin weißlich geſäumt; zweite Handſchwinge die längſte, die erſte länger als die dritte; Bauch weißlich, theilweiſe grau überwaſchen. Schnabel dunkel hornfarben, Unterſchnabel an der Baſishälfte fahl fleiſchroth; Auge röthlichbraun; Füße bleigrau. Das Weibchen iſt oben mehr ſtahlröthlich; Backen, Bruſt und Bauchſeiten gelblichroth überwaſchen; übers Auge bis zum Nacken ein deutlicher breiter fahl röthlichweißer Streif; an der Kehle ein kaum bemerkbarer gelber Fleck; Hand- und Schulterſchwingen fahl röthlich gerandet; Flügeldeckfedern an der Spitze deutlicher fahl röthlich; Schnabel gelblich horngrau. Jugendkleid dem des Weibchens ähnlich, aber ohne gelben Kehlfleck.

Fringilla dentata: supra umbrino-cinerescens, pileo saturate cinereo; loris, genis, pectore, hypochondriis et supracaudalibus canis; stria superciliari conspicua ante albida, post rufescente; stria malari eluta, fumoso-cincta; mento gulaque media circumscripte albis; macula conspicua jugulari flava; remigibus, al. tectricibus et rectricibus fuliginosis; remigibus tertiariis elute, primoribus exterius stricte pallide marginatis, his basin versus albido-limbatis; remige secundo longissimo, primo tertium superante; abdomine albente partim cano-lavato; rostro nigricante corneo, dimidio mandibulae basali subcarneo; iride castanea; pedibus plumbeis. — ♀ supra lividior; genis, pectore et hypochondriis subfulvo-lavatis; stria conspicua lataque superciliari cervicem versus porrecta subfulvo-albida; macula gulari flava parum distincta; remigibus primoribus et tertiariis fulvo-marginatis; tectricibus al. distinctius livide terminatis; rostro livide subcorneo. — Juvenis femellae similis macula verum jugulari flava nulla.

Länge $12{,}4-13$ cm.; Flügel $7-7{,}6$ cm.; Schwanz $4{,}2-5{,}2$ cm.

Der große Kehlsperling [Fringilla pyrgita] „unterscheidet sich durch den hellen kräftigeren, mehr gerundeten und weniger kegelförmigen, an den Schneiden auffallend eingezogenen Schnabel, durch viel längern Schwanz und hellere Färbung; der Augenbrauenstreif fehlt gänzlich; die weißliche Kehle ist seitlich nicht scharf dunkler eingefaßt, der gelbe Kehlfleck ist 17—19 mm. breit. Ich beobachtete den großen Kehlspatz einzeln in den Waldungen, am Westabfall des Bogosgebiets. Er lebt mehr in niedrigem Gebüsch und hat einen ammerartigen Lockton." (Heuglin). Anderweitige Mittheilungen sind nicht vorhanden. — Xanthodina pyrgita, *Hgl.*

Der gelbhalsige Kehlsperling [Fringilla flavicollis] ist der einzige aus dieser ganzen Verwandtschaft, über dessen Freileben nähere Angaben vorhanden sind, und obwol er bisher keineswegs lebend in den Handel gelangt, so muß ich doch die Mittheilungen über ihn wenigstens kurz zusammenfassen, da aus denselben ja auf die Lebensweise aller übrigen geschlossen werden kann. Kopf und ganze Oberseite fahl bräunlichgrau, Streif an der Kopfseite weißlich; Flügel dunkelbraun, jede Feder fahl außengesäumt; Schwingen innen breit fahl gerandet, zwei helle Querbinden über den Oberflügel; kleine Flügeldecken zimmtbraun; Schwanz dunkelbraun, jede Feder außen fein fahl gesäumt; Kehle vom Unterschnabel an weiß, ein Fleck auf der Unterkehle lebhaft gelb, ganze Unterseite bräunlichweiß, Bauch mehr reinweiß, Schnabel schwarzbraun; Auge braun; Füße graubraun. Weibchen fahler und mit kleinerem Kehlfleck. Die Heimat erstreckt sich über fast ganz Indien. Blyth fand ihn in den Midnapore-Dschungledickichten, wo er in der Weise des Haussperlings lebte mit denselben Gewohnheiten und auch mit gleichen Tönen. Er trieb sich in der Nähe der Gebäude auf Bäumen umher, ohne jedoch auf oder in die ersteren zu kommen. Nach Jerdon ist er überall gemein in dichten Dschunglegebüschen, Hainen, Alleen, wo er in kleinen Flügen genau denselben zirpenden Ton wie der gemeine Sperling hören läßt und sich von Sämereien, Körnern und Blütenknospen ernährt. Er soll in Baumlöchern brüten. Elliot sagt, daß er auch in alten Töpfen oder in Löchern an den Hausgiebeln niste. Das Ei ist grünlichweiß, purpurbraun gestrichelt uud gefleckt. — Bindenkehlspatz (Br.). — Fringilla flavicollis, *Frnkl., Gr., Hdgs.;* F. jugularis, *Lchtst.*; F. stulta, ind. var., *Lth.* [The Yellow-necked or Jungle Sparrow, *Jerd.;* Raji (in Hindostan) nach *Jerd.*; Jungli Charia (d. h. Jungle Sparrow), *Jerd.;* Maharoi, *Hamilt.*].

Noch einige andere Kehlsperlinge will ich hier einreihen, doch darf ich sie lediglich herzählen. Sie gewähren für die Liebhaberei keinerlei Interesse, denn einerseits sind sie noch garnicht lebend eingeführt und zeigen dazu auch keine Aussicht, andrerseits zeichnen sie sich von den vorhin geschilderten, welche die Liebhaber doch beinahe völlig verschmähen, durch keinerlei besondere Vorzüge aus.

Der größte Kehlsperling [Fringilla flavigula, *Sndvll.*] aus Südafrika (Pyrgita petronella, *Bp.*; P. petronioides [!], *Lfrsn.*). — **Der grauköpfige Kehlsperling** [Fringilla canicapilla, *Frnkl.*] aus Indien. — **Der gelbbrüstige Kehlsperling** [Fringilla xanthosterna, *Nttr.*] und der **Augenbrauen-Kehlsperling** [Fringilla superciliaris, *Hay*], beide aus Asien. (Nach Heuglin).

Der Goldsperling [Fringilla lútea].

Als der hübscheste unter allen Spazen zeigt er auch zugleich ein angenehmes Wesen und ist sanfter und verträglicher. Der Kopf und die ganze Unterseite sind lebhaft gelb; Mantel und Flügel hell zimmtbraun. Das Weibchen ist düsterer gelb und unterhalb bräunlichweiß. Größe etwas geringer als die des Feldsperlings. Die Heimat erstreckt sich über Ostafrika und den südlichen Theil des Nordostens.

Das Freileben schildert Heuglin in folgendem: „Brehm hält ihn für einen Standvogel in Nordostafrika; ich möchte ihn jedoch für einen Zugvogel erklären. Mit Beginn der ersten Sommerregen erscheint er in großen Scharen am blauen Nil, in Senar, Ondaref, Südnubien und Kordofan. Die Nordgrenze seines Vorkommens erstreckt sich bis zur großen Nilkrümmung zwischen Dar Berber und Dar Dongolah. Er bevorzugt namentlich die Nähe von Gewässern und Hochbäumen; in der Steppe findet man ihn auch wol, häufig jedoch nur in der Nähe von Regenteichen und Wüstenbrunnen, außerdem besucht er Baumwollfelder, Brachäcker, Hecken, ja selbst Gehöfte und Dörfer. So kommt der Goldsperling im Juni und Juli in größeren Flügen in die Stadt Chartum und treibt sich hier als unbehelligter Gast auf Tennen und um Stallungen herum oder schart sich reihenweise auf Mauern und Dachkanten. In Flug, Stimme und Lebensweise gleicht er im allgemeinen dem europäischen Feldsperlinge, doch zeichnet er sich durch sanfteres Wesen vortheilhaft aus, auch möchte ich ihn als weniger lebhaft und beweglich erachten. In den Vor- und Nachmittagsstunden fallen massenhafte Schwärme auf der Tränke ein, entweder an flachen, sandigen Stellen des Stromufers oder auf überhängenden Zweigen längs des Hochgestades, die sich dann durch das Gewicht der dicht an einander gedrängten Vögelchen bis zur Oberfläche des Wassers herabbiegen. Den Augenblick, in welchem die ganze Gesellschaft hier munter schwatzt und badet, benutzt nicht selten ein großer Raubfisch, um einige wegzuschnappen. Eine große verlassene Nistansiedelung, die ich im dichten Akaziengebüsch in der Steppe von Ostsenar gefunden, halte ich für die des Goldsperlings. Die kleinen Nester standen zu Dutzenden auf jedem Strauch, waren sauber aus trocknem, feinem Grase erbaut, etwas beutelförmig, tiefer als breit und oben nicht überwölbt; ihre Höhe über dem Boden wechselte zwischen etwa $^2/_3$ und 4 Meter. Nach Br. baut er in Büsche und legt drei bis vier Eier. Im September und Oktober rotten sich die Alten sammt den Jungen in Flüge von tausenden zusammen, schwärmen noch einige Zeit in der Steppe umher und verschwinden dann für mehrere Monate während der trockensten Jahreszeit. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in den Sämereien wilder Gräser, doch verschmähen sie auch nicht die harten Körner von Dohen und Angoleb.“ Mit diesen Angaben stimmen im wesentlichen die anderer Forscher überein. Der hübsche, liebenswürdige Vogel wurde bis dahin leider selten eingeführt und meines wissens sind bisher auch nur Männchen in den Handel gekommen. Vor einigen Jahren erhielt ich drei solche von Herrn C. Lintz in Hamburg und dann auch ein einzelnes von Frl. Hagenbeck. Die anmuthigen Vögel zeigten sich überaus lebhaft, doch keineswegs zänkisch oder bösartig. Beim Nisten dürften sie nicht so schädlich wie die anderen Sperlinge werden, da sie wahrscheinlich freistehende Nester im Gebüsch errichten würden. Einen Gesang habe ich von ihnen nicht gehört, nicht einmal

das gemeinsame sperlingsartige Schülpen, wol aber ein gleichmäßiges, entrüstetes telterell bei jeder Störung in der Vogelstube. Sobald Weibchen hinzukommen, ändert sich jedoch das Benehmen eines jeden bis dahin einzeln lebenden Männchens, gleichviel von welcher Art, bedeutsam. Hoffentlich wird dieser Spaz demnächst häufiger zu uns gelangen, und wir dürfen ihn dann als eine willkommene Bereicherung der Vogelstuben betrachten.

Der Goldsperling oder Goldspaz heißt auch Goldfink (Hgl.). — Le Moineau doré; Golden Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla lutea, *Lchtst.*, *Tmm.*, *Lss.*, *Hgl.*, *Br.*, *Kg.-Wrth.*; Serinus luteus, *Rpp.*, *Hgl.*; Auripasser luteus, *Bp.*; Chrysospiza lutea, *Cb.*, *Br.*, *Hgl.*; Auripasser lutea, *Antn.*; Carduelis lutea, *Pr. v. Wrtb.*, *Hgl.*; Pyrgita lutea, *Nmcl. Mus. Berol.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Schwefelgelb; Mantel und Schultern lebhaft zimmtbraun; Flügel schwarzbraun; große und mittlere Deckfedern nach der Spitze zu mit gelblichweißem Rande; kleine Flügeldecken hellgelblichgrau; Schwungfedern mit hellbräunlichen Rändern; Schwanzfedern blaß graubraun, gegen die Spitze hin schwärzlicher mit rostgelblichem Saum; Unterschwanzdecken gelblichweiß, meist mit braunen Schaftstrichen; Schnabel und Füße fahl fleischroth; Auge dunkelbraun. Weibchen heller gefärbt; Oberkopf, Nacken und Bürzel fahl röthlichgelb mit helleren Federrändern.

Fringilla lutea: sulfurea, interscapilio et scapularibus laete cinnamomeis; alis fumoso-nigricantibus; tectricibus al. majoribus mediisque apicem versus flavido-albente marginatis, minoribus incano-flavidis; remigum marginibus badiis; rectricibus cano-fumosis apicem versus nigricantibus et ferrugineo-submarginatis; subcaudalibus flavente albidis, plerumque fumido-striatis; tibialibus subfuscis; rostro pedibusque luride carneis; iride fusca. — ♀ dilutior pluma quaque pilei, cervicis et uropygii subfulvorum flavido-marginata.

Länge 12,4 cm.; Flügel 6,5 cm.; Schwanz kaum 5,2 cm.

Beschreibung des Eies: weiß mit braunen Punkten getüpfelt. Länge 15 mm. (Br.).

Ovum album; fusco-punctulatum.

Der grüne Goldsperling [Fringilla euchlóra] ist von Heuglin nach den Originaltypen des Berliner Museum, welche von Hemprich und Ehrenberg im östlichen Abessinien und in den Bergen von Qonfudah in Arabien eingesammelt worden, beschrieben. Heuglin selbst hat nicht Gelegenheit gehabt, ihn im Freien zu beobachten, und weiteres über diese Art ist überhaupt nicht bekannt. Die Heimat ist noch nicht genau festgestellt, und da der Vogel kaum die Aussicht gewährt, eingeführt zu werden, so bedarf es nur dieser beiläufigen Erwähnung. — Fringilla et Pyrgita euchlora, *Lchtst.*; Fringilla albeola, *v. Mll.*; Chrysospiza euchlora, *Cb.*, *Hgl.*

Der schuppenköpfige Sperling [Fringilla frontalis].

Schon seit Vieillot's Zeit her bekannt, doch bis zur Gegenwart überaus selten und immer nur einzeln eingeführt, würde er, falls er häufiger in den Handel gelangte, zu den beliebtesten Bewohnern der Vogelstube gehören. Manche Ornithologen zählen ihn zu den Webervögeln; mit gleicher Berechtigung darf er aber zu den Sperlingen gestellt werden.

In der Gestalt gleicht er dem Graugirlitz, nur ist er etwas größer und hochbeiniger; auch zeichnet er sich durch eine sonderbar aufrechte Haltung aus.

Das Gefieder ist hellgrau, oberhalb dunkler, unterhalb grauweiß; auf dem Oberkopf schwarz mit weißer Säumung jeder Feder, wodurch eine Schuppenzeichnung entsteht; Wangen grauweiß mit schwarzem Knebelbart an jeder Seite, der dem Vogel ein recht ausdrucksvolles Ansehen verleiht; Hinterkopf und Hinterhals sind rostroth. Sein Wesen erinnert an die Lerchen und Ammern. Die Heimat erstreckt sich über den Osten und Westen von Afrika.

Vieillot schildert ihn als sehr weichlich und sagt, daß er alle unsere einheimischen Sämereien verschmähe und nur Senegalhirse fresse, bis er sich allmälig an andere Samen gewöhnt habe. Er bedürfe einer Wärme von 20 Grad, und wenn man ihn züchten wolle, einer noch viel höheren. Da er nur einen schwachen, kaum bemerkenswerthen Gesang hören lasse und überhaupt selten singe, so gefalle er allein durch sein sanftes, verträgliches Wesen.

Ueber das Freileben berichtet sodann Heuglin: „Er ist häufig im abessinischen Küstenlande im wärmern Habesch, in Südnubien, in Senar und Kordofan, doch wie es scheint, an gewisse Oertlichkeiten gebunden. Gegen das Ende der Regenzeit erbaut er große Nester mitten in dichten, fast undurchdringlichen Dorngebüschen aus trockenen Grashalmen von backofenförmiger Gestalt, sehr dicht und mit kleinem, mit Federn, Haren, Pflanzen- und Thierwolle fein ausgekleideten Nistraum. Antinori glaubt, daß dieser Vogel, den er nur im Gebiet des Gazellenflusses antraf, nicht weiter als wenige Grade nördlich vom Aequator gehe, während ich ihn noch zahlreich bis gegen den 17. Grad nordwärts gesehen. Zur Brutzeit lebt er pärchenweise in der Steppe und auf Lichtungen in der eigentlichen Waldgegend, doch kommt er auch auf die Hecken in der Nähe der Gehöfte, in diese selbst und auf die Dächer. Im Herbst zieht er sich in größere Scharen zusammen, und diese schwärmen wie die Feldsperlinge auf Stoppelfeldern und Viehtriften umher, fallen aber ebenso gern auf einzeln stehenden hohen Bäumen an Wüstenbrunnen und Teichen ein. Der Lockton ist ein rätschendes Zirpen und der schwache Gesang erinnert an den des Stiglitz. Ich fand frisch belegte Nester im September im Bogosland und soeben ausgeflogene Junge im November in Kordofan. Er dürfte Strich- oder Zugvogel sein."

Das erste Schuppenköpfchen ist wol vom Händler E. Geupel in Leipzig (1871), der damals mancherlei seltene Vögel aus England erhielt, nach Deutschland eingeführt. Im Laufe der Zeit ist es dann mehrmals, theils von Antwerpen aus durch Gudera, theils durch die Hagenbeck'sche Großhandlung in den Handel gebracht, leider jedoch immer nur einzeln, und so habe ich es ebenfalls einigemal in der Vogelstube gehabt. Es zeigt sich als ein hübsch gefärbtes, anmuthiges und harmloses, ausdauerndes, durchaus nicht weichliches Vögelchen. Gezüchtet ist es bis jetzt noch nicht. Der Preis ist ziemlich hoch, 15 bis 18 Mark für den Kopf.

Der ſchuppenköpfige Sperling oder das Schuppenköpfchen heißt auch Schuppenkäppchen (Br.) und Stirnſchuppenfink (Rchb.); er wird irrthümlicherweiſe auch Schnurrbärtchen genannt. — Le Sénégali à front pointillé; Frontal Grosbeak.

Nomenclatur: Loxia frontalis, *Vll.*; Amadina frontalis, *Rpp.*, *Hgl.*; Estrelda frontalis, *Gr.*; Sporopipes frontalis, *Cb.*, *Bp.*, *Hrtl.*, *Hgl.*, *Kg.-Wrth.*; *Antn.*, *Lfbr.*, *Vrth*, *Br.*; Pholidocoma frontalis, *Rchb.* [Le Sénégali à front pointillé, *Vll.*; Frontal Grosbeak, *Lath.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberkopf ſchwarz, kleinſte vordere Federchen mit weißem Spitzenpunkt, die folgenden mit weißem, die letzten mit roſtrothem Spitzenſaum, ein Schnurrbart von jedem Schnabelwinkel abſtehend, ſchwarz; Hinterkopf und Nacken roſtroth; Rücken, Flügel und Schwanz graubraun, Schwingen und Schwanzfedern breit fahl geſäumt; Wangen weißlichgrau; Kehle faſt reinweiß; ganze Unterſeite grauweiß. Schnabel roſenroth; Auge braun; Füße fleiſchfarben. — Das Weibchen iſt an Oberkopf und Genick fahler graulich und im ganzen übrigen Gefieder heller, indem die Federn der Oberſeite breit graulichweiß geſäumt iſt.

Fringilla frontalis: plumulis pilei nigri anticis albo-terminatis, intermediis albo-, posticis ferrugineo-limbatis; mystace a rostri angulo distante nigro; occipite cerviceque ferrugineis; dorso, alis caudaque fumosis; remigibus rectricibusque late livide limbatis; gula albida; gastraeo toto incano; rostro albido-roseo; iride umbrina; pedibus rosaceis. — ♀ pileo, cerviceque lividius canis, propter plumas notaei incano-limbatas omnino dilutior.

Länge kaum 11,8 cm.; Flügel 6,3 cm.; Schwanz 4,4 cm.

Beſchreibung des Eies: Es gleicht dem des Haussperlings, iſt aber kleiner und glänzender, ziemlich hartſchalig, von bräunlichgrauer Grundfarbe mit dunkleren graubraunen Flecken gleichförmig bedeckt. Länge 15 mm., Breite 11 mm. (Heuglin).

Ovum ovo Fringillae domesticae simillimum at minus et nitidius, luride canum, fumoso-maculatum; testa duriuscula.

Der ſchnurrbärtige Sperling [Fringilla lepidóptera] iſt dem vorigen in der Geſtalt, Größe und im ganzen Weſen ähnlich. Sein Kopf iſt ſchwarz, jede Feder fahl gerandet; Nacken und Mantel mäuſegrau; die Schwingen braun, die Deckfedern ſchwarzbraun, breit weiß geſäumt; Schwanz ſchwarz, jede Feder weißlich gerandet; der lange und breite Bartſtreif ſchwarz, fein weiß geſäumt; Kehle weiß, Oberbruſt weißgrau und die ganze Unterſeite reinweiß. Als Heimat iſt Südafrika, namentlich das Damaraland, angegeben, doch hat Heuglin auch ein Exemplar im Tieflande von Weſtabeſſinien im Bambusgebüſch erlegt. In der Lebensweiſe gleicht er dem vorigen. Nach Ayres iſt er nirgends häufig und fehlt im waldloſen Lande völlig. Das Neſt war von länglich-kugelförmiger Geſtalt mit einer langen Einflugröhre, ſodaß es einer Retorte glich, deren Hals ſich nach unten neigt; es ſtand im Dorngebüſch etwa ein Meter hoch, war aus Gräſern geſchichtet, deren Stengel nach allen Seiten hervorſtanden, und innen mit Pflanzenſeide ausgefüttert. Das Gelege bildeten fünf grünlichweiße, am dickeren Ende dicht braun gefleckte, zuweilen auch mit braunen Linien gezeichnete Eier. Reichenbach ſchildert den Vogel dann noch ohne Quellenangabe: „Er hält ſich im Gebüſch an Flußufern, auf angebautem Lande, meiſtens zu zwei bis drei Köpfen oder auch in kleinen Flügen auf, frißt Samen und baut das Neſt im Graſe oder auf einem niedrigen Buſch. Daſſelbe erſcheint flach kugelig, hat nur etwa 10,4 cm. Durchmeſſer und ein rundes Flugloch von 2,6 cm. Weite; es iſt an einem Zweige angewebt und ein Bündel Halme liegt vor ihm.“ Bis jetzt dürfte dieſe Art wol erſt ein einziges Mal eingeführt ſein; im Beſitz des Herrn Linden. — Schnurrbärtchen (Br.); Schuppen-Kapweberfink (Rchb.). — Fringilla lepidóptera, *Lchtst.*; Amadina squamifrons, *Smth.*; Fringilla squamifrons, *Hgl.*; Sporopipes lepidopterus, *Cb.*, *Bp.*, *Hgl.*, *Rchb.*, *Br.*; Ploceus lepidopterus, *Gr.*; Estrelda squamifrons, *Gr.*, *Lrd.*; Euplectes lepidopterus, *Hrtl.* [L'Ecailleux, *Rchb.*; The scale-headed Weaver-finch, *Rchb.*].

Der Winter-Ammerſperling [Fringilla hiemalis].

Ein ſchlanker und anmuthiger, lebhafter und zutraulicher Vogel von oberhalb einfarbig ſchwärzlichblaugrauem Gefieder, an der Bruſt blauſchwarz, an Unterbruſt und Bauch reinweiß, von der Größe des Feldſperlings. Seine Heimat erſtreckt ſich über die nördlichen und öſtlichen Gegenden Nordamerikas und weit nach dem Norden hinauf, wo er namentlich in den Gebirgen als Zugvogel lebt. Baird gibt die öſtlichen Vereinigten Staten bis zum Miſſouri und zu den ſchwarzen Bergen an.

Thomas Gentry berichtet ausführlich über ſein Freileben, und ich will daſſelbe nach deſſen Mittheilungen in folgendem ſchildern: „In Pennſylvanien erſcheint der Schneevogel mit dem erſten Fall der Flocken zugleich oder ſchon einige Tage vorher. Still und lautlos kommt er an und ebenſo zieht er fort. Zuweilen, bei ſehr kalter Witterung, habe ich ihn bereits zu Mitte Oktobers beobachtet, gewöhnlich aber zeigt er ſich erſt im November. In der erſten Zeit ſieht man ihn dann auf Wieſen, Feldern und an Waldrändern; ſobald Schnee fällt oder ſtarke Kälte eintritt, ſucht er vom Hunger getrieben die Nähe menſchlicher Wohnungen auf, wo er zutraulich und ſelbſt zudringlich wird und in den Höfen und Gärten von Abfällen ſich ernährt. Er kommt ſogar dreiſt unter das Hofgeflügel, um von deſſen Futter zu zehren. In den Herbſtmonaten dienen ihm Beeren und Sämereien zur Nahrung; im Winter lieſt er eifrig die Samen von allerlei Kräutern von den vertrockneten Stengeln ab, ſowie die Eier und Puppen von Kerbthieren; im Frühlinge frißt er auch die Staubgefäße und Stempel aus den Blüten mancher Pflanzen. Die Unterſuchung des Magens ergab neben Sämereien und kleinen Steinchen auch rothe Ameiſen u. a. Der Flug iſt niedrig, wellenförmig und ziemlich ſchnell. Nahrungſuchend trifft man ihn vorzugsweiſe am Boden und ebenſo ſitzt er meiſtens nicht hoch im Gebüſch, ſelten auf den Spitzen hoher Bäume. Obgleich zutraulich und dreiſt, iſt er manchmal ſcheu und ſchreckſam; er lebt ſcharenweiſe, ſteigt bei jedem ungewöhnlichen Geräuſch ſofort auf, kehrt aber im Bogen zu derſelben Stelle zurück. Der Lockton iſt ein leiſes zick (tsic). Sobald er im Frühlinge wieder nach den Waldrändern u. a. zurückkommt, zeigt er ſich viel mehr mißtrauiſch und zugleich lebhafter. Sein fröhlich ſchallender Geſang läßt ſich allenfalls durch folgende Silben wiedergeben: twi-twi-twi-ēh-twiiiii-ēh (twē-twē-twē-āh-twēēēēē-āh). Zum Theil ähnelt derſelbe dem des Zwergſperlings (F. pusilla), doch iſt er weder ſo laut, noch ſo ausgedehnt. Im Wanderleben dieſer Art ſcheinen bedeutende Unregelmäßigkeiten vorzuherrſchen. So waren die Winterfinken z. B. im letzten Drittel des Juni 1875 hier noch ebenſo häufig wie ſonſt im Winter und überaus munter und lebendig. Dieſer ſpäte Aufenthalt war jedenfalls durch die außerordentlich lange Dauer des

Winters hervorgerufen und ich schließe daraus, daß ihre Brutplätze von hier nicht fern sein können; wahrscheinlich im nächsten Gebirge. Leider sind ja weite Strecken Amerikas noch nicht ausreichend ornithologisch erforscht und für die meisten Liebhaber hat die Brutentwicklung eines solchen gemeinen Vogels, wie des Winterfink, keinen besondern Reiz. Er nistet südlich bis Virginien in Gebirgsgegenden, östlich bis Newyork und bis zu den nördlichen Neuenglandstaten, überall nur im Hochlande; je mehr nach Norden zu, desto häufiger findet man ihn in der Ebene. Uebrigens will man seine Nester auch ziemlich weit südlich hinab gesehen haben, einigermaßen zahlreich jedoch nur bis zum 65. Breitengrade. Das Nest steht sowol im lichten Gebüsch, als auch auf Grasflächen am Boden und ist unter Grasbüscheln, Wurzeln oder trocknem Laube versteckt. Dr. Brewer bemerkte dasselbe im nördlichen und östlichen Maine mehrmals in Nebengebäuden; so waren in einem Holzschuppen dicht an der Wohnung des Herrn Dawson mehrere Nester vorhanden, trotzdem die ganze Familie fortwährend vorübergehen mußte; andere standen unter vorspringendem Flußufer. Von außen ist dasselbe aus groben Halmen, Gräsern und Stroh, feinen Wurzeln, Rindenfasern und Pferdehaaren zusammengesetzt und innen mit zartem Mos und mit Thierwolle ausgepolstert. Die Mulde ist tief und geräumig, der Größe des Vogels entsprechend."

Zur Ergänzung sei noch die nachstehende sehr hübsche Darstellung von Nehrling angefügt: „Obschon nicht durch glänzende Farbenpracht ausgezeichnet, durch tüchtige Leistungen im Gesange auch keineswegs hervorragend, ist der Winterfink doch ein überaus schmucker, angenehmer und lieblicher Vogel, der sich besonders in der Freiheit die Liebe und das Wohlwollen eines jeden nicht an der Natur stumpfsinnig vorübergehenden Menschen erwerben muß. Hier, in Nord-Illinois, erscheint er zu Mitte bis Ende März, verweilt bis zum letzten April oder anfangs Mai und zieht dann nördlicher nach seinem Brutgebiete, der eigentlichen Heimat. Mit dem beginnenden Oktober kommt er wieder an und bleibt bei sehr günstiger Witterung, wenn die Erde noch nicht in ihr weißes Schneekleid gehüllt ist, oft bis Weihnachten und wol länger. In der Regel kurz vor Eintritt des kalten, stürmischen Wetters, zieht er in kleinen Gesellschaften südlicher bis in die Mittel-, theilweise sogar bis in die schon an Tropengegenden erinnernden Golfstaten, um hier, fern von allem Nahrungsmangel, fern von der nun rauhen, stürmischen Heimat, den Winter zu verbringen. Während der Zugzeit erscheint er selbst in größeren Städten, um dreist in den Gärten und auf Höfen Nahrung und Herberge zu suchen. Ich habe dies hier in der Stadt Chikago schon mehrfach zu beobachten Gelegenheit gehabt. Gar mancher muß seine Arglosigkeit mit dem Leben oder mit der Freiheit bezahlen, indem unzählige dieser so reizenden, liebenswürdigen Vögel den Katzen und anderm Raubzeug zur Beute fallen, noch mehrere aber, besonders in den Städten, den Steinwürfen einer unwissenden, gefühllosen,

rohen Straßenjugend erliegen. Aber der Winterfink hat in seinen Scharen nicht blos Leid zu erdulden — auch an Freuden und Freunden fehlt's ihm nicht. Die meisten Farmer lieben den trauten Vogel und thun ihm kein Leid: sie lassen es gern geschehen, daß er sich mit seinesgleichen und nahen Verwandten an den Heuschobern, vor Scheunen und in Gärten versammelt, um die hier verstreuten Grassämereien aufzusuchen. Besonders ist es ihr heitres Spiel und ihre harmlose Neckerei, wie sie solche sowol in ihrer Heimat, als auch in der Zugzeit treiben, welche den Beobachter fesseln. Einige jagen sich auf dem Boden hin und her, andere suchen einander im Geäst der Bäume zu fangen, wieder andere verfolgen sich in der Luft und entfalten so, indem sie den Schwanz fächerartig ausbreiten, sodaß die schneeweißen Federn in demselben deutlich sichtbar sind, eine überraschende Pracht. An warmen Oktobertagen kann man dieses seltsame Spiel recht häufig bemerken. Oft steigt plötzlich einer pfeilschnell in die Luft und stürzt, allerlei Zickzackbewegungen ausführend, ebensoschnell wieder herab, während ihm ein andrer, dieselben Bewegungen genau nachahmend und den Schwanz fächerartig ausbreitend, folgt, bis sich endlich beide auf einem Baume niederlassen, um bald von neuem dieses eigenthümliche Flugspiel zu beginnen. Bei derartigen Neckereien vernimmt man auch oft den Lockruf, welcher wie „tuck, tuck, tuck, tuck" klingt und sehr rasch nacheinander ausgestoßen wird; sonst ertönt in der Regel nur ein sanftes „Zipp" oder „Zupp". Der Gesang ist leise, aber ganz wohlklingend, dem des Goldzeisigs (Fringilla tristis, *L.*) in manchen Strofen nicht unähnlich. Nur in den Frühlingsmonaten bis etwa zu Ende des Juli hat man Gelegenheit, denselben zu hören. Auf dem Boden laufen die Winterfinken geschickt umher nnd ebenso beweisen sie, daß sie im Geäst der Bäume und Büsche zuhause sind. Ihre Schlafplätze wählen sie stets im dichten Gezweige eines Baums, besonders einer Tanne oder Fichte, da diese ihnen gegen die kalten Frühlingswinde vortrefflich Schutz zu bieten vermögen. Friedlich dicht nebeneinander findet oft eine ganze Gesellschaft auf einem solchen Baume Nachtherberge. Im Fluge führen sie die sonderbarsten Bewegungen und Wendungen aus, und man könnte sie hierin wol annähernd nur mit manchen Ammern, sonst aber mit keinem unserer hiesigen Finkenvögel vergleichen. Beim Suchen nach Futter zeigen sie die merkwürdige Eigenschaft, daß sie auf der Erde hühnerähnlich scharren. Ihre Reise machen sie nachts. Ich habe oft beobachtet, daß am Morgen sich Scharen zeigten, wo am Abend vorher noch kein einziger zu bemerken war, und ebenso, daß abends noch Hunderte munter spielend und schäkernd nach Futter suchten, am folgenden Morgen aber nicht ein einziger mehr zu sehen war. Die Oertlichkeit, welche sich dieser Fink in seiner eigentlichen Heimat zum Aufenthalte und zur Anlage des Nestes wählt, ist stets mit einzelnen Bäumen und vielem Buschwerk bestanden; große freie Strecken meidet er gänzlich. Auch während der

Zugzeit kann man diese Beobachtung machen. Man findet ihn nie in der offnen Prairie, sondern stets an buschreichen Waldsäumen, in Hecken und in mit Bäumen und Büschen dichtbewachsenen Gärten; am liebsten sind ihm aber Nadelholzdickichte. Wird eine Gesellschaft vom Boden aufgescheucht, so sucht sie hier Zuflucht und Schutz. Im nördlichen Wiskonsin, in der Nähe der Stadt Green Bay, trifft man ihn schon recht häufig als Brutvogel an. Hier wohnt er in den mit Nadel- und Laubholzgebüschen bestandenen Waldsäumen; doch dürfen diese Oertlichkeiten nicht dicht bewachsen sein, sondern es müssen viele kleine freie Stellen in denselben vorhanden sein. Das Nest befindet sich stets auf dem Boden, in der Nähe eines Strauchs oder eines mit Gras bewachsenen Erdhügels und ist aus Halmen, Tannennadeln und etwas Bast gebaut; in der Regel stehen mehrere in der Nähe beisammen, denn er nistet gern gesellig. Die Geschlechter sind vom aufmerksamen Beobachter verhältnißmäßig leicht zu unterscheiden. Beim etwas größeren Männchen treten die Farben dunkelfahl und weiß, deutlich fast grell hervor, während beim Weibchen die fahle Zeichnung viel heller, das Weiß an Bauch und Unterbrust aber als schmutzigweiß erscheint; beide Farben kommen deshalb bei diesem auch nicht so sehr zur Geltung, scheinen vielmehr ineinander überzugehen. — Der Geselligkeit des Vogels halber ist der Fang ein sehr leichter. Ich selber habe oft mit einer einfachen Falle eine beliebige Anzahl gefangen, um sie in der Gefangenschaft kennen zu lernen. Es ist durchaus nicht schwierig, ihn lange Zeit bei einfacher Nahrung am Leben zu erhalten und niemals geht er an Fettsucht zugrunde. Besonders zu loben ist an ihm das immer muntre, sehr zuthuliche Wesen, das stets schmucke, zierliche Gefieder, die kräftige Ausdauer, die Verträglichkeit mit seinesgleichen und andersartigen Vögeln und das auch im größern Käfige sich darbietende Spielen und Necken untereinander; letztres kann man jedoch nur beobachten, wenn man eine größere Anzahl zusammenhält. Er fügt sich, sobald man ihn in das Bauer zu anderen Vögeln bringt, sogleich in sein Los, beginnt gewöhnlich bald den Futternapf zu besuchen, nimmt meistens nach einigen Wochen schon einen Mehlwurm aus den Fingern u. s. w. Ich habe einige, die so zahm sind, daß sie, wenn sich Jemand gegen den Käfig lehnt, an den Kleidern und Haren rupfen und sogar Baustoffe aus der Hand holen und diese umherschleppen. Auch die Wärme können sie sehr gut ertragen und haben im Sommer selbst in den heißesten Tagen durchaus nicht von ihr zu leiden. Hier, wo die Vogelliebhaberei eben erst sehr wenig Anklang findet, hält man den Vogel nicht in der Gefangenschaft, obwol er sich seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen vorzüglich dazu eignet. Ich glaube, daß man den Winterfink in Deutschland mit wenigen Kosten einzubürgern im Stande wäre und ich möchte hiermit dazu anregen."

Prinz Wied gibt an, daß er nach Richardson's Mittheilung nicht über den 37. Breitengrad hinaufgehe, besonders im Norden und in den höheren Gebirgen, daß

er aber auch in den Vereinigten Staten niste und zwar nicht im Alleghany-Gebirge allein, wie Audubon behauptet, da er ihn im Mai und Juni nicht selten am Missouri beobachtete. Im Felsengebirge soll er nicht selten vorkommen; in den südlichen Staten erscheint er im November und überwintert daselbst. Am Wabasch fand der Forscher ihn zu Ende Oktobers in kleinen Gesellschaften von 15 bis 20 Köpfen am Rande der Wälder und in den Pflanzungen. Jagte man sie auf, so fielen sie auf den benachbarten Bäumen ein. Ueber den Gesang ist außer dem von Gentry und Nehrling angeführten wenig gesagt; man hat ihn mit dem Zwitschern junger Kanarien verglichen. Auch im übrigen geben Audubon, Wilson, Baird u. a. amerikanische Schriftsteller nichts wesentliches weiter über den Winterfink an.

In den Handel gelangt er selten, denn er wird von Reiche oder Fräulein Hagenbeck nur beiläufig und einzeln, höchstens aber einmal in einigen Pärchen eingeführt. Das erste Par erhielt ich von Karl Hagenbeck schon im Jahre 1868 und ich habe mich an seiner ungemein großen Lebhaftigkeit, den zierlichen und anmuthigen Bewegungen und dem leisen, eintönigen, doch nicht unangenehmen Gesange erfreut. Es begann bald zu nisten und ich habe dies dann in meinen Berichten im „Journal für Ornithologie" mehrmals kurz erwähnt. Trotzdem ergriff Herr A. E. Brehm auch hier die Gelegenheit, gegen mich u. a. neben ihm stehende Schriftsteller in seiner liebenswürdigsten Weise herzuziehen, während er doch gleich auf der nächsten Seite zugeben mußte, daß er selbst bis zum Jahre 1872 die Ammerfinken oder vielmehr die bis dahin eingeführten Arten derselben nur aus einem großen Flugbauer her kenne und sie daher weder nach dem Gesange, noch nach ihren anderen Eigenthümlichkeiten beurtheilen könne. — In meiner Vogelstube erhielt sich das erwähnte Pärchen einige Jahre hindurch vortrefflich und nistete fast regelmäßig im März bis Ende Mai, alljährlich mehrmals. Das sehr kleine Nest wurde von beiden Gatten aus Grasrispen, Papierstreifen und Baumwollfäden erbaut und mit Pferdehaaren ausgerundet. Infolge ihrer bereits erwähnten Lebhaftigkeit brachten sie aber anfangs niemals die Jungen auf oder sie verließen das Nest wol schon bei der geringsten Beunruhigung. Erst ein zweites Pärchen zog dann mehrere Bruten auf, im ersten Jahre eine und im nächsten zwei, jedesmal von drei Jungen aus Gelegen von drei bis vier Eiern. Die Brutdauer währt 12 Tage; das Weibchen brütet nur allein, wird vom Männchen gefüttert und eifersüchtig bewacht und beide ziehen gemeinsam die Jungen auf. Im ganzen dürfte die Zucht in der Vogelstube wol selten glücken, obgleich der Vogel sich trotz seiner nordischen oder gebirgigen Heimat doch auch in dieser wohlzufühlen scheint und gut ausdauert. Während er zugleich zu den friedlichen Bewohnern einer solchen gehört, so ist er doch keineswegs beliebt, denn er erscheint weder besonders schön, noch als ein tüchtiger Sänger und ebenso mangeln ihm sonstige vorzugsweise anziehende Eigenthümlichkeiten. Der Preis steht auf 12 bis 18 Mark für das Pärchen.

Der Winterammerſperling oder Winterfink, Schneefink oder Schneevogel iſt auch blauer Schneevogel (Brd.) und Winterammerfink (Br.) benannt.

Le Moineau de neige américain; American Snow Bird; Common Snow Bird; Black Snow Bird.

Nomenclatur: Fringilla hyemalis, *L., Audb., Bp., Gr., Gld., Pr. Wd.* [nec *Gml.* et *Lth.*]; Emberiza hyemalis, *L.*; Fringilla hudsonia, *Frstr., Gml., Wls.* [nec *Lchtst.*]; F. nivalis, *Wls.*; Spiza et Struthus hyemalis, *Bp.*; Niphaea hyemalis, *Audb., Cb.*; Junco hyemalis, *Scl., Brd., Gntr., Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Oberhalb aſchgrau, Hinterkopf und Rücken mit olivenbräunlichem Schein; Schwingen und Flügeldecken ſchwärzlichbraun mit fahlen Außenſäumen, die hinteren Schwungfedern röthlichgrau gerändert; Schwanz ſchwarzbraun, die beiden äußerſten Federn weiß, die folgenden mit mehr oder minder großen weißen Schaftflecken; Vorderkopf, Geſicht, Vorderhals und Oberbruſt ſchwärzlichgrau; Unterbruſt, ganze übrige Unterſeite, untere Flügelſeiten und untere Schwanzdecken reinweiß. Schnabel röthlichweiß mit ſchwach ſchwärzlicher Spitze; Auge dunkelbraun; Füße fleiſchroth. — Das Weibchen iſt kaum bemerkbar heller und ebenſo kleiner. — Jugendkleid: oberhalb düſter bräunlichſchwarzgrau, unterhalb fahl bräunlichgrau, am Hinterleib weißlich.

Fringilla hiemalis: supra cinerea, occipite dorsoque olivaceo-fuscescente affiatis; remigibus alarumque tectricibus fumosis, exterius livide limbatis; remigibus posterioribus subrufo-cano-marginatis; rectricibus e nigro fuscis, ambabus exterioribus albis, reliquis magis minus albo-maculatis; sincipite, facie, collo antico pectoreque nigricante cinereis; epigastrio, gastraeo reliquo, subalaribus et subcaudalibus pure albis; apice rostri rubente albi subnigro; iride fusca; pedibus carneis. ♀ vix dilutior minorque.

Länge 15 cm.; Flügel 7,7 cm.; Schwanz 6,4 cm.

Juvenis: supra sordide fumida; subtus livide subfusco-cana, ventre albido.

Beſchreibung des Eies: Gelblichweiß, dicht mit kleinen röthlichen Flecken gezeichnet (Audb.). Gelblichweiß, röthlichbraun gefleckt, dichter am dickern, ſpärlicher am ſpitzen Ende; ovalrund (Gentry). Weißlich, mehr oder weniger mit chokoladenbraunen kleinen, oft auch mit einigen großen dunkelbraunen Flecken gezeichnet (Nehrling). Röthlichgelb mit rothbraunen und ſchwarzbraunen Unter- und Oberflecken, die hauptſächlich am ſtumpfen Ende zuſammengehäuft ſtehen; matt, bauchig; Länge 19 mm., Breite 14 mm. (Nehrkorn).

Ovum: lacteum maculis parvulis dense obsitum (Aud.). — Ovum lacteum in basi densius, in apice parcius badio-maculatum; ovatum (Gentry). — Ovum rubente ochraceum maculis badiis et nigro-fuscis, basin praesertim occupantibus; opacum ventricosum (Nehrk.).

Als die nächſten Verwandten des vorigen ſeien noch erwähnt:

Der Winter-Ammerſperling vom Oregon [Fringilla oregona, *Twnsd.*] aus dem Weſten von Nordamerika; nach Baird von der Küſte des ſtillen Ozeans der Vereinigten Staten bis zur öſtlichen Seite des Felſengebirges vorkommend. Kopf, Hals und Bruſt ſind graulichſchwarz, übrige Oberſeite braun; Unterſeite weiß; Schnabel roth. Größe des vorigen. Er wurde gelegentlich einmal von Reiche und Schoebel eingeführt. In der Lebensweiſe und in allem übrigen dürfte er mit den vorigen übereinſtimmen. — Nach Br. Schneeammerfink. Oregon Snow Bird (Nehrl.). — (Fringilla hudsonia, *Lchtst.* [nec *Frstr., Gml., Wls.*]; F. atrata, *Brndt.*).

Der braunſchulterige Winter-Ammerſperling [Fringilla dorsalis, *Henry*] iſt nur von Dr. Henry bei Fort Thorn in Neumexiko geſammelt und von Baird beſchrieben. Er iſt oberhalb licht aſchgrau; Schultern röthlich kaſtanienbraun; Schwingen und Schwanz faſt reinſchwarz, die drei äußerſten Federn des letztern weiß; Wangen und Schnabel ſchwarz, Unter-

schnabel hellbräunlich. Wie in der Größe, so dürfte er auch in allem übrigen dem Winterfink durchaus gleichen.

Der graue Winter-Ammersperling [Fringilla cinérea, *Swns.*] aus Mexiko. An Kopf und Nacken dunkelgrau, Mantel und Schultern rothbraun, ganze übrige Oberseite bräunlichgrau, nur die Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, heller gesäumt und die beiden äußersten der letzteren weiß, Zügel und Backen schwärzlich; Unterseite bläulichgrau, Bauchmitte und Hinterleib düsterweiß. Sonst in allem dem Verwandten gleich, nur ein wenig größer. Er ist erst kaum bekannt und bis jetzt noch nicht lebend eingeführt. — Grauammerfink nach Br. Mexican Snow Bird (Nehrl.). — (Fringilla rufidorsalis, *Lchtst.*; Junco phaeonótus, *Wgl.*). — **Der grauköpfige Winter-Ammersperling** [Fringilla Woodhousi] ist im Felsengebirge heimisch, von den schwarzen bis zu den San Franzisko-Bergen und in Neumexiko. Er unterscheidet sich von dem Winterfink hauptsächlich durch etwas geringere Größe, einen deutlich kastanienbraunen Fleck auf dem Rücken und lichteres Grau an der untern Seite; etwas kleiner. — Greyheaded Snow Bird (Nehrl.). — (Struthus caniceps*), *Woodhouse*). — Die letzteren beiden faßt Dr. Elliot Coues in seinem Werke „Birds of the North-West" als eine Art, in zwei Lokalrassen, zusammen.

Der Gesellschafts-Ammersperling [Fringilla socialis].

Wiederum einer von diesen Spazen, der dann und wann eingeführt wird, obwol er freilich weder häufig noch besonders beliebt ist. Sein Freileben ist sehr bekannt und vielleicht eingehender beobachtet, als das des europäischen Haussperlings. Die Heimat erstreckt sich nach Baird über ganz Nordamerika, vom atlantischen bis zum stillen Ozean; auch auf Kuba kommt er nach Gundlach u. A. vor. An der Stirn ist er schwärzlichbraun, Scheitellinie und Augenbrauenstreif sind weiß; Oberkopf röthlich kastanienbraun mit feinen schwärzlichen Schaftstrichen; ein schmaler Streif durchs Auge schwarz; Kopf- und Halsseiten aschgrau; Mantel und Schultern rostbräunlichbraun, jede Feder mit dunklem Schaftstrich und hellem Außensaum; obere Flügeldecken, Bürzel und Schwanzdecken graubraun; Schwingen und Schwanz dunkelbraun; zwei weiße Querbinden gehen über den Flügel; ganze Unterseite aschgrau, Kehle und Hinterleib weißlich; Schnabel dunkelbraun; Auge braun; Füße fleischroth. Etwas unter Feldsperlingsgröße. — Nehrling schildert ihn in folgendem. „Er ist einer unserer gemeinsten Vögel, etwa so groß wie der Birkenzeisig, mit dem er übrigens von Unkundigen oft verwechselt wird. Zu Ende des Monats März kehrt er aus der Winterherberge nach den Nordstaten zurück, und man sieht ihn dann häufig in Gesellschaft von Winterfinken und anderen verwandten Arten sich in Gärten, Feldern und Gesträuch umhertreibend. Mitte Aprils etwa wählt sich jedes Pärchen sein Brutgebiet. Besonders gern siedelt er sich in gebüschreichen Gärten in der Nähe menschlicher Wohnungen an, am liebsten sind ihm aber dichte Dornhecken, da diese ihm gegen seine vielen Feinde Schutz gewähren. Auf hohen Bäumen erblickt man ihn selten, dagegen weiß er sich in dichten Sträuchern mit großer Geschicklichkeit zu bewegen. Er ist allerwärts, auch bei den hiesigen Deutschen, am besten unter dem Namen Chipping

*) S. 402 habe ich bereits einen Stiglitz als Fringilla caniceps aufgeführt; ich lege daher dieser Art den Namen des Forschers bei, welcher sie zuerst beschrieben.

Bird bekannt und beliebt. Die Brutzeit beginnt mit dem Monat Juni und dauert, da gewöhnlich drei Bruten gemacht werden, bis Ende August. Das Nest steht immer in niedrigen, sehr dichten Dorngesträuchen, Stachelbeerbüschen, Lebensbäumen und allerlei anderm niedrigen und buschigen Nadelholz; es wird in der Regel so versteckt angelegt, daß man es schwer aufzufinden vermag. Von außen ist es aus Gräsern hergestellt und innen mit Haren weich gepolstert. Das Gelege bilden vier bis fünf Eier. Die Jungen werden mit Kerbthieren, besonders mit einer kleinen grünen, sehr schädlichen Raupe aufgefüttert. Auch die Alten ernähren sich zum größten Theile von Insekten, und nur gegen den Herbst hin, wenn diese mangeln, verzehren sie ausschließlich kleine Sämereien. Schädlich kann dieser Vogel nie werden, dagegen ist seine Nützlichkeit in den Gärten sehr groß. Dieser Umstand und sein angenehmes, zutrauliches Wesen machen ihn bei Allen, die ihn kennen, beliebt. Der Gesang ist kaum zu beachten, da er nur in wenigen zirpenden Lauten besteht; einzelne Töne erinnern allerdings an das Gezwitscher junger Kanarienvögel. Nur von wenigen Vogelfreunden wird er hier im Käfige gehalten." Nach Thomas Gentry ergänze ich das gesagte noch im nachstehenden: Der Raspelsperling ist einer der häufigsten Vögel Pennsylvaniens; man bemerkt ihn aber nicht eher, als bis Feld und Wald schon längst von den Lauten des Sing- und Zwergsperlings wiederhallen. Er erscheint erst in der letzten Woche des Aprils, und als ein liebenswürdiges, zutrauliches Geschöpfchen zeigt er eine merkwürdige Zahmheit. Bei offenstehender Thür dringt er nicht selten in bewohnte Zimmer ein, und wir wissen Beispiele, in denen ein solcher Vogel täglich regelmäßig kam und sein Futter aus der Hand sich holte. Er zeigt ein ungemein geschäftiges Wesen und hält sich vorzugsweise auf dem Boden oder in niedrigem Gebüsch auf. Sein Gesang bildet eine einfache anspruchslose Melodie und diese wird stundenlang fast ohne Unterbrechung vorgetragen. Aufregung gibt er durch ein einsilbiges, in Pausen ausgestoßenes ‚schieb' zu erkennen. Männchen und Weibchen erbauen gemeinsam in etwa vier Tagen das Nest, welches überaus unregelmäßig erscheint; meistens wird es außen von Würzelchen und Halmen und innen von Pferdeharen hergestellt, in der Regel als gleichmäßige offene Mulde, zuweilen jedoch auch mit dachartig überstehender Hinterwand. Die Brutdauer beträgt nach Gentry zehn Tage; sie wird indessen sicherlich elf bis zwölf Tage währen. Das Weibchen wird vom Männchen gefüttert, und das Nest vertheidigen beide eifrig und muthvoll. Insekten, Eier, Larven und Puppen, namentlich auch Blattläuse und Ameisen, bilden die Hauptnahrung für die Jungen, welche schon zwölf Tage nach dem Ausschlüpfen das Nest verlassen und in weiteren acht oder neun Tagen völlig selbständig sind, aber mit den Alten, die hier alljährlich nur eine Brut machen, zusammen umherschweifen. Im Herbst ernähren sie sich vorzugsweise von Gras- und Krautsämereien und Beeren, und man sieht sie dann

in kleinen Flügen beſonders auf angebautem Boden. Im Oktober beginnt die Wanderung. Auch die bekannteren Naturforſcher Audubon und Nuttall vergleichen den Geſang mit den Lauten eines unfertigen Kanarienſängers und heben beſonders hervor, daß er unermüdlich, ſelbſt in tiefer Nacht, ſich hören läßt.

In letzterer Zeit iſt dieſer Vogel mehrfach, jedoch größtentheils nur in einzelnen Köpfen, von Herrn E. Reiche und Frl. Chr. Hagenbeck, aber auch von Anderen, ſo namentlich von E. Geupel, zuweilen in den Handel gebracht. Ein Pärchen für die Vogelſtube iſt jedoch kaum zu erlangen. Ich habe ihn hier nur deshalb ſo ausführlich behandelt, weil er gewiſſermaßen als das Muſterbild aller übrigen folgenden anzuſehen iſt. Der Preis läßt ſich nicht angeben, doch pflegt er nur wenige Mark für den Kopf zu betragen.

Der Geſellſchafts-Ammerſperling, Geſellſchaftsſperling, Geſellſchaftsſpaz oder Geſellſchaftsfink, heißt auch Raspelſperling, Zirpfink (Nehrl.) und Geſellſchafts-Ammerfink (Br.).

Le Moineau chapelant; Chipping Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla socialis, *Wls., Audb.*; Spizella socialis, *Bp., Brd., Gntr.*; Emberiza socialis, *Audb.*; Spinites socialis, *Cb.*; Zonotrichia socialis, *Gr., Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſiehe S. 457.

Fringilla socialis: fronte nigricante fusca; linea verticali striaque superciliari albis; pileo rubiginoso, nigricante striolato; vitta angusta per oculum nigra; capitis collique lateribus cinereis; interscapilio humerisque ferruginosis, scapo plumarum dilute terminatarum obscuro; tectricibus al. superioribus, uropygio et supracaudalibus fumigatis; remigibus caudaque fuscis; fasciis duabus trans alas albis; gastraeo cano; gula crissoque albicantibus; rostro fusco; iride fusca; pedibus carneis.

Beſchreibung des Eies: glänzend hellgrün, am dickeren Ende mit braunen und ſchwärzlichen Flecken gezeichnet; verhältnißmäßig klein und ſehr zartſchalig (Nehrl.). Bläulichgrün, am breiteren Ende umberfarben und dunkelbraun gefleckt; länglich eiförmig (Gentr.).

Ovum: nitide virens, basi fusco et nigricante maculata; sat parvum, tenerrimum (Nehrl.). Ovum subaeruginosum maculis baseos umbrinis fuscisque; oblongo-ovatum (Gentry).

Der Berg-Ammerſperling [Fringilla montícola, *Gml.*] iſt am Oberkopf röthlichkaſtanienbraun; Zügel und Augenbrauenſtreif, ſowie Kopf- und Halsſeiten bräunlichgrau, Schläfen- und Bartſtreif röthlichbraun; Mantel und Schultern roſtröthlichbraun, jede Feder mit dunklem Schaftſtrich und gelblichem Außenſaum; Flügel mit zwei weißen Querbinden; Kehle und Oberbruſt fahlbräunlichgrau, Mitte der Oberbruſt und Bruſtſeiten röthlichbraun, ganze übrige Unterſeite düſterweiß; Schnabel ſchwarz, Unterſchnabel gelblich; Auge braun; Füße dunkelbraun; Finkengröße. Der Vogel kommt nach Baird im ganzen öſtlichen Nordamerika bis zum Miſſouri und auch in Neumexiko vor und gleicht nach Gentry u. A. in der Lebensweiſe dem vorigen; er wandert bis in die Südſtaten und kehrt erſt ſpät im April nach ſeiner nordiſchen Heimat zurück. Der Eine lobt ſeinen Geſang, der Andre hält ihn für einen Stümper; ein beſondrer Künſtler wird er wol ſchwerlich ſein. Bis jetzt iſt er nur höchſt ſelten in einzelnen Köpfen von Jamrach eingeführt. — Baumſperling in Amerika; rothſcheiteliger Fink (Pr. Wied); Bergammerfink (Br.). — Moineau des arbres ou Moineau du Canada; Tree Sparrow or Canadian Sparrow. — Passer canadensis, *Brss.*; Fringilla arbórea, *Wls.* [Moineau du Canada, *Buff.*; Mountain Finch, *Lath.*].

Der Zwerg-Ammerſperling [Fringilla pusilla, *Wls.*], deſſen Heimat nach **Baird** über das öſtliche Nordamerika bis zum Miſſouri ſich erſtreckt, gewährt für die Liebhaberei auch kein beſondres Intereſſe. Da er meines wiſſens bisher nur ein einzigesmal, von Herrn **Möller** in Hamburg, eingeführt worden, ſo genügt die beiläufige Erwähnung. An Oberkopf und Nacken iſt er roſtbraun, Kopf- und Halsſeiten ſind bräunlichroſtroth, Backen dunkler; Mantel und Schultern roſtröthlichbraun, jede Feder mit dunklerem Schaftſtrich; ganze Unterſeite graubräunlich, von der Bauchmitte ab weißlich. Etwas unter Feldſperlingsgröße. Das Freileben ſoll dem der vorigen gleichen. Ueber den Geſang ſind die Meinungen verſchieden. Nach **Gentry** iſt er melodiſch und wechſelvoll, nach Anderen gering. — Zwerg- und Feldſperling in Amerika; Zwerg- und Feldammerfink (Br.). — Le Moineau nain; Dwarf Sparrow; Field Sparrow *(Baird.)*. — (Fringilla juncorum, *Ntll.* [Little brown Sparrow, *Cat.*]).

Der blaſſe Ammerſperling [Fringilla pallida, *Sws.*, nec *Audb.*] iſt bisher noch garnicht eingeführt. Oberhalb bräunlichgelbgrau; Oberkopf und Mantel ſchwärzlich geſtrichelt, erſterer mit grauem Scheitelſtreif; Augenbrauenſtreif weißlich; Backen bräunlichgelb; Nacken und Halsſeiten aſchgrau; undeutliche dunkle Bart- und Backenſtreifen; Flügel und Schwanz dunkelbraun, jede Feder mit fahlem Außenſaum, über den erſteren zwei helle Querbinden; Bruſt bräunlich, ganze übrige Unterſeite düſterweiß. Das **Weibchen** ſoll fahler ſein. Größe des vorigen. Die Heimat des Vogels ſind der obere Miſſouriſluß und die hohen Zentralebenen; er kommt nach **Gundlach** auch auf Kuba vor. In allem übrigen dürfte er ebenfalls den vorigen gleichen. — Blaßammerfink (Br.) — Clay-colored Bunting *(Brd.)*. — (Emberiza Shattuckii, *Audb.*).

Brewer's Ammerſperling [Fringilla Breweri, *Css.*]. Dem vorigen ſehr ähnlich, die Zeichnungen jedoch dunkler; Kopfplatte ſchwarz geſtreift, ohne die hellen Mittel- und Augenbrauenſtreifen. Größe ein wenig geringer. Heimat das Felſengebirge der Vereinigten Staten bis zur Küſte des ſtillen Ozeans. Ueber das Freileben iſt nichts näheres bekannt; es gleicht auch wol dem der vorigen. — Brewer's Sparrow (*Brd.*). — (Emberiza pallida, *Audb.*, nec *Swns.*).

Der ſchwarzkehlige Ammerſperling [Fringilla atrigularis, *Cb.*]. Kopf bis zum Nacken und ganze Unterſeite grau, letztere heller als der Kopf; Gegend um den Schnabel und der obere Theil der Kehle ſchwarz; Schnabel röthlich; Füße dunkel (Cb.). Feldſperlingsgröße. Heimat Mexiko, ſüdlich vom Rio Grande (Brd.). Kehlammerfink (Br.). Black-chinned Sparrow, (*Brd.*). — (Struthus atrimentalis, *Cch.*).

Der Sing-Ammerſperling [Fringilla melódia].

Vor allen übrigen Verwandten zeichnet ſich dieſer Spaz durch eine Eigenthümlichkeit aus, die ihm den Namen eingetragen und die ihn zugleich werthvoll für die Liebhaberei macht, durch den Geſang nämlich. Er iſt oberhalb roſtröthlichgrau mit dunkleren rothbraunen Schaftflecken; über den Kopf ein grauer, fein dunkel geſtrichelter Mittelſtreif und zwei breitere rothbraune Längsſtreifen; Zügel- und Augenbrauenſtreif aſchgrau; ein Backenſtreif nach oben zu fahl gelblichroſtroth, ein Backenſtreif nach unten zu rothbraun; ein Bartſtreif hell und dunkelbraun geſleckt; Wangen aſchgrau; Kopfſeiten fahl röthlichgelb; Flügel- und Schwanzfedern dunkelbraun mit röthlichbraunen Außenſäumen; unterhalb grauröthlichweiß; an Oberbruſt und Seiten dunkler röthlichfahl und fein braun ſchaftſtreifig, Bruſtmitte mit länglichem ſchwarzen Fleck. Schnabel ſchwärzlichbraun, Unterſchnabel heller bläulich, am Grunde gelblichgrau; Auge braun; Füße fahlbraun. Das **Weibchen** ſoll nicht verſchieden ſein. Finkengröße. Die Heimat erſtreckt ſich über den ganzen Oſten von Nordamerika und nördlich hinauf bis Kanada.

Prinz von **Wied** nennt ihn einen gemeinen Vogel in Nordamerika, beſonders in Pennſylvanien, welcher in der Lebensweiſe viel Aehnlichkeit mit dem europäiſchen

Goldammer hat. „Man sieht ihn auf einem einzeln stehenden Baume oder auf einem Zaune sitzen, auch auf dem Boden, und er läßt einen kleinen zirpenden Lockton hören. Sein Gesang, welchen er in der Parungszeit oft erschallen läßt und nach welchem ihn die Amerikaner Singsperling benennen, ist ein, ich möchte sagen, erbärmliches, kurzes und leises Gezwitscher. Das Nest fand ich, wie bei dem Goldammer, am Ufer unter einer Baumwurzel angelegt. Dasselbe war ziemlich schlecht aus Grashalmen erbaut und innen mit Wurzeln und einzelnen Pferdehaaren ausgefüttert; es enthielt drei Eier, doch hatte der Vogel ohne Zweifel noch nicht ausgelegt. Im Winter hielten sich am Wabasch kleine Flüge mit pennsylvanischen, Berg- und Winter-Ammersperlingen, sowie Trauerzeisigen vereinigt auf, doch waren sie dann weniger zahlreich als die übrigen Standvögel." Eingehender berichtet über das Freileben Herr H. Nehrling in folgendem. „Er ist eine unserer gemeinsten Finkenarten. Sowol in Wiskonsin als auch in Illinois habe ich ihn zahlreich vorgefunden. Schon zu Mitte des Monats März kehrt er von seiner Wanderung zurück und läßt sogleich nach der Ankunft seinen wirklich angenehmen Gesang hören. In der Regel sitzt er dabei auf Pfählen, Fenzen, auch auf Bäumen oder anderen hervorstehenden Gegenständen und von denselben herab erschallen oft stundenlang froh und wohlgemuth seine zwar einfachen, doch anmuthigen Lieder. Den erfreuendsten Eindruck macht dieser Gesang auf den Zuhörer, wenn die Erde noch mit Schnee bedeckt ist. Als Aufenthalt zieht der Vogel am Wasser gelegene Wiesen, in denen einzelne Bäume und Gebüsche stehen, allen anderen Oertlichkeiten vor. In wasserarmen, baum- und gebüschlosen Gegenden findet man ihn nicht. Das Nest steht gewöhnlich auf der Erde, doch zuweilen auch auf niedrigen Büschen, jedesmal aber nahe am Boden. Von außen besteht es aus Grashalmen und innen ist es mit Grasrispen oder auch mit Haren ausgepolstert. Das Gelege bilden vier bis fünf Eier. Zwei, oft auch drei Bruten werden in jedem Jahre gemacht. Der Flug erscheint schwerfällig; auf den Bäumen und im Gebüsch aber und besonders auf dem Boden zeigt sich der Singfink sehr gewandt. Hier sucht er auch vornämlich seine Nahrung, welche im Frühlinge und Sommer zumeist aus Kerbthieren, im Herbst und Winter dagegen in allerlei kleinen Unkrautsämereien besteht. Mit Vorliebe liest er von den Blättern der Sträucher kleine unbeharte Raupen ab. Schädlich wird er nie. Im Spätherbst zieht er in kleinen Flügen dem Süden zu. Schon im südlichen Illinois überwintert er zuweilen, jedoch nimmt die große Mehrzahl in den Staten, welche vom Golf von Mexiko bespült werden, Winterherberge. Wie alle Ammersperlinge, so eignet auch er sich vortrefflich zum Stubengenossen. Immer heiter und munter, glatt und schmuck im Gefieder, genügsam und seinem Pfleger sehr zugethan und in den Frühlingsmonaten unermüdlich im Vortragen seiner Lieder, das sind seine bemerkenswertheften Eigenthümlichkeiten."

Auch Th. Gentry gibt eine ausführliche Schilderung, welche im wesentlichen mit der vorhergehenden übereinstimmt. Er spricht aber förmlich mit Schwärmerei von dem Gesange dieses Sperlings: „Bereits wochenlang vor dem Beginn des Nistens läßt das Männchen von der höchsten Baumspitze herab seine lieblichen Töne erschallen; etwa von der Mitte des Monats März an hört man den Gesang ununterbrochen vom frühen Morgen bis lange nach Sonnenuntergang. Selbst in der Mittagsstunde, wenn die meisten Vögel doch still sind und im Schatten ruhen, vernimmt man ihn in gleicher Weise. In Hinsicht der Mannigfaltigkeit und des Reichthums der Töne wird er nur von wenigen anderen übertroffen. Einige Wendungen erinnern an das liebliche Lied der Mäusedrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*), andere zeigen große Aehnlichkeit mit dem des Berg-Ammersperlings. Gewöhnlich erklingt der Gesang lebhaft und munter, zuweilen jedoch auch klagend. Der des Kanarienvogels übertrifft ihn wol an Abwechselung, steht jedoch an Anmut und Lebendigkeit hinter ihm zurück. Folgende Silben bilden mit leidlicher Genauigkeit das Lied eines Meisters dieser Art: tsi-tsi-tsi-t'wiih-teio-tw'-tw' — whe-wheeeee-kih-kih-kih, tsi-tsi-tsi-twiih-twiiii, tsi-tsi-tsi-tweh-törrrr, tsi-tsi-tsi-tweh-törrrr — tsi-tweh-tweh-twiiiih-tw' (tsĭ-tsĭ-tsĭ-t'wēē-tū-tw'-tw-whă-whăăăă-kē-kē-kē-tsĭ-tsĭ-tsĭ-twēē-twĭĭĭĭĭ, tsĭ-tsĭ-tsĭ-twā-tūrrrr, tsĭ-tsĭ-tsĭ-t'wā-tūrrrr — tsĭ-twā-twā-twĭĭĭĭĭĭ-tw'). Sein Lockton ist ein einfaches wit (hwĭt), welches langsam und in Zwischenräumen ertönt. Dieselben Silben scharf und kurz ausgestoßen, drücken Unbehagen oder Aufregung aus. Die Einleitung zum Gesange gleicht fast der des Berg-Ammerfink und mag etwa in folgender Weise erklingen: twi-twi-twi-twi-twi-i-i-i-i (twĭ-twĭ-twĭ-twĭ-twĭ-ĭ-ĭ-ĭ-ĭ), sie wird jedoch viel weniger lebhaft vorgetragen."

Die hervorragenden Naturforscher Audubon, Nuttall u. A. sagen im wesentlichen dasselbe über das Lied des Vogels, als die beiden letzteren Schriftsteller, deren eingehende Schilderung ich angeführt habe, und Nuttall hebt besonders hervor, daß es zu wechselnden Zeiten auch mannigfaltig verschieden erklinge. „Da aber", sagt er, „der Vogel zu den allergewöhnlichsten gehört und überall und fortwährend singt, so wird auf sein muntres und melodisches Lied gewöhnlich wenig Werth gelegt."

Nicht ganz so selten im Handel als die übrigen Verwandten, wird er zeitweise in einigen Köpfen oder Pärchen von allen Großhändlern eingeführt, welche nordamerikanische Vögel auf den Markt bringen; früher erhielt ihn der Händler Hieronymi in Braunschweig mehrmals in bedeutenden Sendungen; die unscheinbaren Spazen blieben jedoch in der großen Anzahl der damals zu uns gelangenden farbenreichen Vögel unbeachtet, zumal sie in ihrer Haupteigenthümlichkeit, dem Gesange, nicht bekannt waren; sie wurden an das Berliner Aquarium im ganzen

Schwarm mit verkauft und gingen dort allmälig zugrunde. In der Vogelſtube zeigt ſich der Singſperling friedlich, anſpruchlos und ausdauernd; obwol ich aber ihrer drei Köpfe länger als ein Jahr beherbergt, ſo haben ſie weder geniſtet, noch einmal geſungen. Sie kamen freilich in ſehr traurigem Zuſtande an und während ſie ſich erholten und mauſerten, fraßen ſie ſich zugleich an den langentbehrten Leckereien zu fett, ſodaß ſie im nächſten Frühjahre noch vor der beginnenden Brut erkrankten und dann auch herausgefangen und ſorgfältig behandelt nicht mehr zu retten waren. Wer Freude an dieſem Sperling haben will, wird ihn wol einzeln im kleinen Käfige halten müſſen, wo er ſein Lied ſicherlich angenehm und fleißig erſchallen laſſen mag. Der Preis beträgt für das Pärchen 15 Mark und für den einzelnen Kopf 6 bis 9 Mark. Für einen ſolchen Preis iſt das Männchen trotz der Unſcheinbarkeit ſeiner Farben immerhin als angenehmer Stubenvogel anzuſehen.

Der Sing-Ammerſperling oder Singſperling iſt auch Singfink und Singammerfink (Br.) benannt. — Le Moineau melodieux; Song Sparrow or Melodious Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla melodia; *Wls.*, *Lchst.*, *Audb.*; Zonotrichia melodia, *Bp.*, *Br.*; Melospiza melodia, *Brd.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 460.

Fringilla melodia: supra ferruginoso-cinerea badio-striata; striis trans caput tribus, utraque laterali latiore badia, intermedia cinerea, subtiliter obscure lineata; stria lororum striaque superciliari cinereis; striis duabus malaribus, una seorsum livide ferruginosa, altera deorsum badia; vitta mystacali dilutius obscuriusque maculata; genis cinereis; capitis lateribus livide fulvis; remigibus rectricibusque fuscis, exterius badio-limbatis, subtus rubente incana, gutture pectorisque lateribus luride subfulvis, fusco-lineolatis; macula oblonga pectoris medii nigra; mandibula rostri nigricante fusci subcoerulea, basi testacea; iride fusca; pedibus livide umbrinis. ♀ haud distincta.

Länge $15{,}2$ cm., Flügelbreite $19{,}8$ cm., Flügel $7{,}3$ cm., Schwanz $6{,}1$ cm.

Jugendkleid: Oberhalb blaſſer als das der Alten, doch deutlicher geſtreift; die Streifen auf dem Kopf kaum bemerkbar; unterhalb gelblich fein, doch ſcharf dunkelbraun geſtrichelt (Brd.).

Juvenis: supra avi adulta dilutior, at distinctius striata; striis capitis fere evanidis; subtus flavicans, sed distincte fusco-lineata.

Beſchreibung des Eies: Bläulich; ſtark, aber fein rothbräunlich gepunktet (Prinz von Wied). Ei auf grünlichweißem Grunde mit vielen großen und kleinen dunkelbraunen Flecken bezeichnet (Nehrling). Ei düſterweiß mit roſtfarbenen und lichtpurpurnen Flecken gezeichnet, welche gleichmäßig über die Oberfläche vertheilt ſind. Bei einigen Exemplaren ſind die Flecke ſo zahlreich, daß ſie die Grundfarbe ganz verdecken, bei anderen ſind ſie unregelmäßig vertheilt, ſodaß leere Stellen bleiben (Gntr.).

Ovum: coerulescens dense sed subtiliter subrufo-punctulatum (Pr. Wied). — Ovum virente album maculis numerosis et majoribus et minoribus notatum (Nehrling). — Ovum luride album maculis ferrugineis et dilute purpureis, aequabiliter dispersis notatum, interdum creberrimis colorem occultantibus principalem, rarius irreguraliter coacervatis (Gentry).

Heermann's Ammerſperling [Fringilla Heermanni, *Brd.*]. Dem vorigen ſehr ähnlich; oberhalb roſtröthlichbraun, ſchwarz ſchaftſtreifig, an den Seiten dunkler braun und breiter ſchaftfleckig oder vielmehr dunkelbraun längsgeſtreift; die unteren Schwanzdecken roſtröthlichgelb, fein

dunkelbraun ſchaftſtreifig. Größe beträchtlich geringer. Heimat Kalifornien bis zu den Felſenbergen. In allem übrigen dem vorigen gleich; auch der Geſang ſoll nach Cooper's u. A. Mittheilungen ziemlich übereinſtimmend ſein. Lebend eingeführt iſt er noch nicht. — Schlag-Ammerfink (Br.) — Heermann's Song Sparrow (*Brd.*).

Gould's Ammerſperling [Fringilla Gouldi, *Brd.*], von Kalifornien, iſt dem Sing-Ammerſperling und noch mehr Heermann's Sperling ähnlich, an Bruſt und Seiten deutlich ſchwarz geſtreift und ebenſo an Kopf und Oberrücken geſtrichelt; doch iſt er viel kleiner.

Der rothe Ammerſperling [Fringilla rufina, *Brndt.*] iſt im Weſten der Vereinigten Staten vom ſtillen Ozean nördlich bis zum ruſſiſchen Amerika verbreitet. Er erſcheint wiederum dem Singſperling ähnlich, aber dunkler röthlich und die Zeichnungen ſind mehr verſchwommen; etwas größer als der Singſperling. Näheres iſt über ihn nicht angegeben. — (Fringilla cinerea, [*Gml.*] *Audb.*; F. guttata, *Nttll.*).

Der Trugammerſperling [Fringilla fallax, *Brd.*], heimiſch in den Felſenbergen bis zum Kolorado, iſt wiederum dem Sing-Ammerfink ſehr ähnlich, hat aber nicht die dunkelen Schaftſtriche an der Unterſeite und iſt beträchtlich größer. — Trugammerfink (Br.) — Melospiza fallax, *Brd.*

Linkoln's Ammerſperling [Fringilla Lincolni, *Audb.*], durch die Vereinigten Staten vom atlantiſchen bis zum ſtillen Ozean verbreitet und Zugvogel, der zum Winter bis Mexiko und noch weiter hinab bis Guatemala wandert. Er iſt oberhalb fahlbraun, ſchwarz ſchaftſtreifig; über den Kopf ein bräunlichgrauer, ſchwarzgeſtrichelter Mittelſtreif, Zügel- und Augenbrauenſtreif bräunlichgrau; Wangen graubraun, fein hellgeſtrichelt; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fahlbräunlich außengeſäumt, Oberflügel mit zwei ſchmalen Querbinden; von der Kehle bis zum Hinterleib düſterweiß. Schnabel braun, am Grunde bläulich; Auge braun; Füße gelbbraun. Das Weibchen ſoll übereinſtimmend ſein. Größe des Feldſperlings. Gentry berichtet, daß er im Freileben dem Singſperling ähnlich ſei und wie dieſer ſtundenlang ohne Unterbrechung von der Spitze eines niedrigen Baumes oder Buſches herab ſeinen Geſang erſchallen laſſe; doch ſei er weniger zutraulich, lebe nicht in der Nähe des Menſchen, ſondern mehr im Dickicht. Nach Weſten hin zeige er ſich immer zahlreicher und in Mexiko ſei er ſehr gemein. Meines wiſſens iſt er bis jetzt nur von Frl. Hagenbeck eingeführt. — Linkolnſpaz (Ruß' „Handbuch"), Saumammerfink (Br.). — Moineau de Lincoln; Lincoln's Sparrow; Lincoln's Finch (*Brd.*). — Fringilla Lincolni, *Audb.*; Passerculus zonarius (*Bp.*), *Scl.*

Der Bruch-Ammerſperling [Fringilla palustris, *Wls.*], am Vorderkopf ſchwarz, Ober- und Hinterkopf dunkelrothbraun, ein breiter Augenbrauenſtreif aſchgrau, ein ſchmaler Wangenſtreif ſchwarz, ein Bartſtreif weißlich und ein Streif an der Kehle hinunter ſchwärzlich, Wangen und Halsſeiten aſchgrau; Nacken ſchwarz, mit einer graubraunen, dunkel geſtrichelten Mittellinie; ganze Unterſeite grünlichweiß, Oberbruſt und Schenkel düſterer bräunlich, fein dunkel geſtrichelt; Schnabel dunkelbraun; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ſoll nicht verſchieden ſein. Die Heimat erſtreckt ſich nach Baird über den Oſten Nordamerikas vom atlantiſchen Meere bis zum Miſſouri. Ueber das Freileben berichtet Gentry ausführlich. In Oſtpennſylvanien iſt der Vogel nur Wintergaſt. Er lebt in ſumpfigen mit Strauch beſtandenen Gegenden, an Flußufern ſehr verſteckt und wird nur von Kundigen bemerkt. Der Geſang iſt laut und lebhaft, aber eintönig und ohne angenehme Melodie. Das Neſt ſteht in hohem Graſe und Binſen, und die vier bis fünf Eier ſind weißlichblau oder grau beſpritzt und bepunktet. Von Herrn Gudera wurde er früher mehrmals eingeführt, doch hat er keine Bedeutung für die Liebhaberei. — Bruchſperling (Ruß' „Handbuch"); Riedammerfink (Br.). — Le Moineau palus; Swamp Sparrow. — Fringilla georgia, *Nttll.*

Der weißkehlige Ammersperling [Fringilla albicollis].

Er gehört zu den häufiger eingeführten und auch beliebteren dieser sonst doch keineswegs besonders geschätzten, weil unscheinbaren Vögel. An Ober- und Hinterkopf ist er schwarz mit einem schmalen weißen Mittel- und breitem gelben Augenbrauenstreif; Wangen aschgrau mit feinem schwarzen Strich; oberhalb roströthlichbraun, an Mantel und Schultern jede Feder schwarz schaftfleckig und fahl röthlichgelb außengesäumt; Schwingen olivengrünlichbraun, schmal fahl außengesäumt, über den Flügel zwei düstergelblichweiße Querbinden; Bürzel fahl roströthlichbraun; Schwanzfedern olivengrünlichbraun, schmal fahl außengesäumt; Kehle weiß; Unterkehle und Oberbrust bräunlichgrau; ganze Unterseite düsterweiß, Brust- und Bauchseiten dunkel längsgestrichelt; Schnabel bräunlichgrau, Unterschnabel hellblau; Auge braun; Füße fleischroth. Das Weibchen ist matter gefärbt; das Weiße an der Kehle düsterer und nicht so rein; die Flügelbinden fast garnicht gelblich. Ammergröße.

Seine Heimat erstreckt sich über den Osten von Nordamerika bis zum Missouri. „Als Brutvogel", sagt Nehrling, „findet man ihn in Illinois und im mittleren Wiskonsin nicht; im Norden des letztgenannten States nistet er jedoch zahlreich. Zur Zeit der Wanderung zeigt er durchaus keine Scheu, sondern besucht zutraulich die Gärten und selbst die unmittelbare Nähe der menschlichen Wohnungen. Gewöhnlich sieht man ihn in kleinen Gesellschaften von 10 bis 20 Köpfen, oft auch gemeinsam mit dem Winterammerfink, mit dem er zugleich kommt und wegzieht. Etwa zu Mitte Oktobers erscheinen die Flüge im nördlichen Illinois, verweilen hier bis Schnee fällt und ziehen dann südwärts. Zuweilen kann man sie sechs bis acht Wochen in ein und derselben Gegend beobachten. Zu Anfang des Monats April kehren sie zurück, bleiben etwa bis Mitte Mai und verschwinden dann gewöhnlich plötzlich. Auf dem Boden laufen sie geschickt umher und suchen ihre in kleinen Sämereien bestehende Nahrung, wobei sie die besondre Eigenthümlichkeit zeigen, daß sie wie die Hühner mit den Füßen kratzen und scharren. Ich habe viele von ihnen in mancherlei Weise gefangen und es bietet eben durchaus keine Schwierigkeit, ihrer habhaft zu werden, da sie völlig furchtlos sind; so kommen sie z. B. dreist unter mein Fenster, um die hingestreuten Körner aufzulesen. Auch gewöhnen sie sich schnell ein und machen dem Besitzer durch Beweglichkeit und Zutraulichkeit, sowie Schmuckheit, Ausdauer und Genügsamkeit, namentlich aber durch anmuthigen Gesang, viele Freude."

Th. Gentry schildert diesen Spaz sehr eingehend, und zur Ergänzung des obigen sei folgendes entlehnt. „Er ist in Ostpennsylvanien nicht sehr häufig, erscheint im letzten Drittel des April und zwar stets mit dem weißgekrönten Ammersperlinge (Fringilla leucophrys, *Frstr.*) gemeinsam, hält sich im niedrigen Gebüsch feuchter und abgelegener Gebiete auf und ist wenig scheu. Sein Gesang ist laut und klangvoll und besteht in zwölf Lauten, welche eintönig und ohne Unterbrechung vom frühen Morgen bis zum späten Abend erschallen. Die Nahrung bilden Gräser- und Kräutersämereien und mancherlei Kerbthiere. Hier

bei uns nistet er nicht. Nach Dr. Brewer's Beobachtung brütet er einzeln im nordwestlichen Theile von Massachusetts und sehr häufig in den britischen Provinzen. John Richardson fand ein Nest am 4. Juni, welches aus Gras gebaut und mit Federn und Haren gepolstert war, ein andres mit Pflanzenwolle; im übrigen gleicht es denen der Verwandten. Es steht immer auf dem Boden, im dichten Grase, im Gebüsch oder am Fuße eines Baumes und enthält 4 bis 6 Eier. In manchen Gegenden soll der Vogel überaus scheu und mißtrauisch sein, in anderen wiederum in den Gärten dicht bei den Häusern und ebenso zutraulich als der Singsperling leben; in Südkarolina und Louisiana scharen sie sich manchmal zu 50 Köpfen und darüber zusammen."

Im übrigen berichten die Vogelkundigen wenig über das Freileben. Audubon gibt nur noch an, daß er trotz seiner sonstigen Aengstlichkeit und seines schlechten Fluges nicht selten weit hinaus ins Freie nach Nahrung suchend pilgert. Den Gesang nennt er sanft, klagend und lieblich, wenn auch nur kurz. Auch Wilson fügt nichts besondres hinzu, und Prinz Wied, der die Art in Indiana und am Missouri beobachtete, ebenfalls nicht. Den Gesang bezeichnet letztrer als gering.

Zuweilen sieht man den Vogel bei allen Händlern, jedoch stets nur in wenigen Köpfen. Im Jahre 1874 wurde er von Herrn Schoebel in vielen Pärchen eingeführt, von denen drei in meine Vogelstube gelangten. Sei es nun aber, daß dieselben auf der Ueberfahrt vernachlässigt worden oder durch irgend eine andre Ursache in schlechtem Zustande in den Besitz des genannten Händlers gekommen waren, kurz und gut, sie erschienen äußerst abgezehrt und strotzten förmlich von Ungeziefer und zwar von ganz eigenartigen überaus großen Milben. Durch die nöthige Vorsicht und Sorgfalt konnte ich meine übrigen Vögel vor jener Plage wol bewahren, aber die Spazen gingen mir sämmtlich ein und ich vermochte weder den Gesang noch die Brut zu beobachten. Trotzdem dieser Sperling im Handel also nicht zu selten ist, hat ihn bis jetzt doch meines wissens noch Niemand gezüchtet. Sonderbarerweise zeigte ein einzelner, den ich im Jahre 1876 von Herrn Lintz erhielt, ebenfalls einige solcher Milben; ich will es jedoch dahingestellt sein lassen, ob dieselben nur diesem Vogel und seinen nächsten Verwandten eigenthümlich sind. Jedenfalls ist beim Ankauf derartiger neuen Gäste für die Vogelstube Vorsicht geboten. Der Preis pflegt 15 Mark für das Pärchen zu betragen; bei größerer Einfuhr 9 Mark.

Der weißkehlige Ammersperling oder pennsylvanische Sperling (Ruß' „Handbuch") heißt noch weißkehliger Fink (Prinz Wied), fälschlich Weißhalssperling und auch Bäffchenammerfink! (Br.).

Le Moineau à gorge blanche ou le Moineau de Pennsylvanie. White-throated Sparrow or White-throated Song Sparrow and Pennsylvanian Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla albicollis, *Gml.*, *Wls.*, *Lchtst.*; Zonotrichia albicollis, *Bp.*, *Cb.*, *Brd.*, *Br.*; Passer pennsylvanicus, *Brss.*; Fringilla pennsylvanica, *Lth.*, *Audb.*, *Swns.*; Zonotrichia pennsylvanica, *Swns.*, *Bp.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 465.

Fringilla albicollis: pileo accipiteque nigris; stria verticali angusta alba, utraque superciliari lata flava; lineola genarum cinerearum nigra; supra badia, plumis interscapilii et humerorum nigro-striatorum exterius livide fulvo-limbatis; remigibus olivaceo-virente fuscis, exterius livide limbatis; fasciis trans alam duabus luride gilvis; uropygio livide ferrugineo; rectricibus olivaceo-virescente fuscis, exterius anguste livide marginatis; gula alba, gutture fumigato; subtus sordide alba, pectoris abdominisque lateribus obscure lineolatis; rostro fumido, mandibula subcoerulea; iride fusca; pedibus carneis. — ♀ pallidior gula luride albida, fasciis alarum parum flavescentibus.

Länge $16{,}3^{cm}$; Flügel 7^{cm}; Schwanz 7^{cm}.

Beſchreibung des Eies: Grünlichweiß mit roſtbräunlichen Flecken überdeckt, gewöhnlich ſo zahlreich, daß die Grundfarbe kaum zur Geltung kommt (Gntr.).

Ovum: virente album maculis numerosis colorem principalem interdum prope obtegentibus obsitum ferrugineis (Gtr.).

Der Ammerſperling mit weißer Krone [Fringilla leucophrys, *Frstr.*], heimiſch in Nordamerika vom atlantiſchen Ozean bis zum Felſengebirge; Reinhardt will ihn auch in Grönland gefunden haben. Oberkopf mit kleiner weißer Platte und zwei breiten ſchwarzen Längsſtreifen über dieſelbe hinweg von der Stirn bis zum Hinterkopf; Augenbrauen- und Schläfenſtreif weiß, darunter ein ſchwarzer Streif und der Zügel weißlich; Kopf- und Halsſeiten aſchgrau, Mantel und Schultern grau, rothbraun ſchaftfleckig; Schwingen- und Schwanzfedern dunkelbraun, fahl röthlich außengeſäumt, Flügel braun mit zwei weißlichen Querbinden; Bürzel fahl röthlichbraun; Unterſeite hell aſchgrau; Kehle, Bruſt- und Bauchmitte weißlich, Seiten und Hinterleib fahl röthlichgelb; Schnabel bräunlichroth; Auge braun; Füße dunkel graubraun. Das Weibchen hat nicht die weiße Platte, iſt am Oberkopf rothbraun mit einem röthlich fahlen Mittelſtreif. Größe des vorigen. Audubon, dann Prinz Wied, geben kurze, und Gentry eine ſehr ausführliche Beſchreibung des Freilebens, welches im weſentlichen mit dem des weißkehligen Sperlings übereinſtimmt. Seine eigentliche Heimat ſind ſumpfige Gegenden mit niedrigen Nadelholzbäumen und dichter Moosdecke, namentlich in den Wäldern von Labrador. Der Geſang beſteht nach Audubon in fünf bis ſechs lauten, klangvollen, doch klagenden Tönen mit angenehmem Schluß. Gentry ſagt: „Derſelbe währt mit kleinen Pauſen von früh morgens bis ſpät abends und iſt eigentlich ein ſanftes Flöten in nur zwei langgezogenen Silben beſtehend, bald anſchwellend, bald erſterbend, denen dann fünf andere Laute folgen, welche ziemlich ſchnell ſteigend und fallend wiederholt werden.“ Er drückt den Geſang in folgenden Silben aus: piih-diih-dii-dii-dii-dii (pēē-dēē-dēē-dēē-dēē-dēē-dēē). Im Handel erſcheint der Vogel ſehr ſelten; meines Wiſſens iſt er nur einmal im Jahre 1873 von Herrn Gudera in drei Köpfen eingeführt. Ein Preis läßt ſich nicht angeben. — Weißſcheiteliger Fink (Pr. Wd.); Weißkronſperling und Weißkronfink (Br.) — Le Moineau à couronne blanche; White-crowned Sparrow and White-eyebrowed Finch.

Gambell's Ammerſperling [Fringilla Gambelli, *Nttll.*], dem vorigen überaus ähnlich, aber mit düſterm, nicht weißem Schläfenſtreif; Augenbrauenſtreif dagegen weiß; Größe etwas geringer. Heimat vom Felſengebirge bis zur Küſte des ſtillen Ozeans (Brd.). Der Vogel zeigt keine Ausſicht in größerer Anzahl lebend eingeführt zu werden und ſelbſt wenn dies auch einmal der Fall ſein ſollte, ſo wird dieſe Erwähnung genügen, da er einerſeits keinen beſondern Werth für die Liebhaberei haben kann und andrerſeits wol in jeder Hinſicht den vorhergeſchilderten Verwandten gleicht. — Silberkronfink (Br.). — Zonotrichia leucophrys, *Nwbr.* [nec *Frstr.*].

Der Kron-Ammerſperling [Fringilla coronata, *Pll.*] iſt an Ober- und Hinterkopf ſchwarz mit gelbem, nach dem Nacken zu grauem Mittelfleck; Kopf- und Halsſeiten grau, Nacken und

Hinterhals schwärzlichgrau; ganze übrige Oberseite röthlichbraun, an Mantel und Schultern breit schwarzbraun schaftstreifig; Schwingen dunkelbraun, schmal fahl außengesäumt, Flügel mit zwei schmalen weißen Querbinden; Schwanzfedern dunkelbraun mit feinem fahlen Außensaum; Kehle hellgrau, Brust und übrige Unterseite bräunlichgrau, Bauch und Hinterleib fahl röthlichbraun; Schnabel bräunlichhorngrau; Unterschnabel heller gelblich; Auge braun; Füße gelblichgrau. Weibchen nur mit matt grünlichgelbem Scheitelstreif, an Kopfseiten und Brust fahl roströthlich. Ammergröße. Heimat der Nordwesten der Vereinigten Staten bis zum südlichen Kalifornien. Wandervogel, der zum Winter südwärts zieht. Bis jetzt dürfte er noch nicht lebend eingeführt sein und im übrigen gilt von ihm das vom vorigen gesagte. — Goldkronfink (Br.) und Goldkronsperling. — Golden-crowned Sparrow (*Brd.*). — Emberiza atricapilla, *Audb.* [nec *Gml.*]; Fringilla aurocapilla, *Nttll.* [Black-crowned Bunting, *Penn.*, *Lath.*].

Harris' Ammersperling [Fringilla quérula, *Nttll.*], heimisch an den Ufern des Missouri, nach Baird bei Fort Leavenworth und nach Prinz Wied unweit der Mündung des Laplatastusses. Dadurch von allen vorhergehenden verschieden, daß er an Oberkopf, Gesicht, Kopfseiten, Kehle bis zur Oberbrust reinschwarz, unterhalb an Brust und Bauch reinweiß erscheint, mit röthlichbraunem dunkelschaftstreifigen Rücken und zwei weißen Binden über die Flügel. In der Größe und wahrscheinlich auch in allem übrigen ist er ebenfalls den vorigen gleich; bestimmtes ist weiter nicht angegeben. — Harris' Finch, *Brd.* — (Fringilla comata, *Pr. Wd.*; F. Harrisi, *Audb.*).

Der bärtige Ammersperling [Fringilla mystacalis, *Hrtl.*] aus Mexiko, von Finkengröße; an Kopf, Hals und Oberbrust graubraun, mit kurzem weißen Bartstreif, längerem weißen Streif vom Schnabelwinkel abwärts und schwarzem Zügelstreif; oberhalb rostrröthlichgraubraun, schwarz schaftstreifig, die dunkleren Schwingen fahl außengesäumt, über den Flügel zwei weiße Querbinden; Schwanzfedern schwarz, schmal weiß gesäumt; Brust und Bauch weiß, Hinterleib röthlichfahl. Das Weibchen soll übereinstimmend sein. Eingeführt ist der Vogel noch nicht; und dürfte in allem übrigen den vorigen gleichen. — Bartammerfink (Br.).

Der Morgen-Ammersperling [Fringilla matutina].

Zu den nicht ganz selten eingeführten zählend, hat dieser Ammerspaz zugleich den Vorzug, daß Prinz von Wied, Burmeister und neuerdings Landbeck ausführliche Nachrichten über sein Freileben gegeben. Er ähnelt mehr dem Rohrammer als dem Haussperlinge im Ansehen. Sein Oberkopf ist grau mit einem schwarzen Streif über jedem Auge; Ohrdecken oben weiß, dann schieferschwarz, meist gestrichelt, Nacken rostroth; Rückengefieder und Flügel röthlichbraun, jede Feder mit breitem schwarzen Schaftstreif, die großen Deck- und die Achselfedern außerdem mit fahlgelbem Endfleck und die Reihe der kleinen weißgespitzt; Schwingen schwarzbraun, fein graulichrothbraun gerandet, die letzten Armschwingen mit breitem, mehr rostrothem Saum; Schwanz oberhalb schwarz jede Feder rostroth gerandet, unterhalb grau und ebenso die Innenseite der Schwingen; Kehle weiß mit schwarzem Seitenstreif vom Auge bis zur Halsmitte; Brustmitte und Bauch bis zu den Beinen weiß, Seiten bräunlichgrau, Bauchmitte hellrostroth, Hinterleib grauweiß. Schnabel braun, Unterkiefer graugelb; Auge graubraun; Füße gelblichfleischfarben. Das Weibchen ist übereinstimmend, doch mit viel blaßerm Farbenton. (Nach Burmeister). Finkengröße. Heimat wol der größte Theil von Südamerika, insbesondre ganz Brasilien. „Man trifft", sagt der letztgenannte Forscher, „diesen Vogel in jedem Dorfe in großer Zahl, sieht ihn auf den Straßen im Pferdedung umhersuchen, wie bei uns die Sperlinge und Ammern und hört morgens gleich nach Sonnenaufgang seine sanfte, melodische

Stimme von der Dachfirſte herab. Er niſtet aber nicht an den Gebäuden, wie die eigentlichen Sperlinge, ſondern nur in den Gebüſchen der Gärten, baut ein großes Neſt aus trockenen Halmen, Haren und Federn und legt vier bis fünf Eier. Im Walde begegnet man ihm ſehr ſelten, nur in einſamen, nicht ſehr bevölkerten Gegenden am Rande der Wälder. Seine Nahrung ſind Sämereien, welche er am Boden ſucht." Dieſe Mittheilung ergänzt Landbeck in folgendem. „Der hübſche Fink kann als Vertreter des Feldſperlings angeſehen werden, mit dem er im Aeußern einige, im Benehmen aber große Aehnlichkeit hat. Er iſt faſt überall häufig, lebt in der Nähe der menſchlichen Wohnungen, in Geſellſchaft des chileniſchen Sperlings (Fringilla diuca, *Mln.*) und ernährt ſich dem Hausſperlinge gleich, indem er alles eßbare frißt und namentlich an reifen Kirſchen und Feigen Schaden verurſacht. Er iſt ſehr zutraulich, kommt nicht ſelten in die Zimmer herein, um Brotkrumen aufzuleſen, und erfreut durch ſeine Zahmheit und zierliche Geſtalt. Geſäeten Sämereien wird er dort, wo er häufig iſt, ſchädlich, indem er dieſelben aus der Erde ſcharrt und frißt; ſo namentlich Gerſte und Hafer. Er ſingt ammerartig während des ganzen Tages, nicht ſelten auch in finſtrer Nacht, gleichſam im Schlafe, und zwar etwa folgende Strofen: gie-tie-tie-tweih oder ſoviel als zieh, zieh, ih. Bei den Chilenen ſingt er: ‚mi dio Augustin' (mein Onkel Auguſtin). Er macht mehrere Bruten im Jahre, und das Neſt, welches im Gebüſch oder Graſe auf der Erde ſteht, hat die größte Aehnlichkeit mit dem des Goldammers. Im Käfige iſt er leicht zu erhalten und ſingt auch fleißig. Nicht ſelten kommen weißgefleckte oder ganz weiße Spielarten vor." Auch Burmeiſter berichtet von einer ſolchen.

Obwol er von den Großhändlern, Fräulein Hagenbeck, Reiche und früher auch von Schöbel einzeln ziemlich oft, manchmal ſogar in mehreren Pärchen eingeführt wurde, ſo hat er für die Liebhaberei doch keine Bedeutung erlangt, weil er keinerlei beſondere Vorzüge zeigt. Gezüchtet iſt er noch nicht, da bis jetzt wol Niemand ſich die Mühe gegeben hat, mit dieſem unſcheinbaren Spaz derartige Verſuche anzuſtellen.

Den Morgen-Ammerſperling, Morgenfink oder braſilianiſchen Sperling (Brmſt.) nennen die Braſilianer Chingolo und Chingolino, in Minas Ticko-Ticko (nach Burmeiſter); bei den Chilenen heißt er Chingol (Landbeck).

Le Moineau Chingolo; Chingolo Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla matutina, *Lchtst.*; Tanagra ruficollis, *Spx.*; Fringilla chilensis, *Mn.*; F. nuchalis, *Tmm.*; Zonotrichia subtorquata, *Swns.*; Pyrgita peruviana et peruviensis, *Lss.*; Passer pileatus, *Bdd.* — [Fringilla capensis, *Lth.*, *Bff.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 468.

Fringilla matutina: pileo cinereo, stria superciliari nigra; regione parotica schistacea, seorsum alba, plerumque striolata; cervice ferrugineo; alis dorsoque badiis, late nigro-striatis; tectricibus majoribus et axillaribus gilvo-, minoribus albo-terminatis; remigibus fusco-nigris, fumide rufescente submarginatis, brachialibus ultimis late ferruginoso-limbatis; rectricibus supra nigris, rubiginoso-marginatis,

his ut remigibus subtus cinereis; vitta laterali utrinsecus gulam albam ab oculo usque ad collum medium vergente nigra; pectore medio abdomineque albis; hypochondriis fumidis; ventre medio rufescente; crisso incano; rostro fusco, mandibula luride gilva; iride umbrina; pedibus flavide carneis. — ♀ conveniens, sed pallidior.

Als Ammerſperling von Bolivien [Fringilla hypochondria, *Orbg.*] erwähnt Burmeiſter einen Vogel, über welchen jedoch nichts näheres vorhanden iſt und der daher hier nur genannt ſei.

Der Savannen-Ammerſperling [Fringilla savanna].

Ein kleiner Spaz, der wiederum zu den gewöhnlichen Erſcheinungen des Vogelmarkts gehört, doch ebenſo wenig beliebt als die anderen iſt. Oberkopf bräunlichſchwarz mit düſtergelblichem Mittelſtreif, Augenbrauenſtreif bis zum Hinterkopf gelb, darunter ein brauner Streif, Wangen düſter röthlichgelb mit ſchwarzem und feinem gelblichen Backenſtreif und ſchwarzem Bartſtreif; ganze Oberſeite röthlichbraun, jede Feder mit ſchwärzlichblauem Schaftfleck und fahlem Außenſaum; Schwingen ſchwarzbraun, ſchmal fahl außengeſäumt, Flügeldecken breiter fahl gelblich außengeſäumt und gerandet; Schwanzfedern ſchwarzbraun mit fahlen Außenſäumen; Kehle gelblichweiß, vom Bartſtreif eingefaßt, Bruſt röthlichbraun, dunkelbraun ſchaftfleckig; ganze Unterſeite reinweiß, untere Schwanzdecken dunkelſchaftfleckig; Schnabel braun; Auge dunkelbraun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ſoll übereinſtimmend ſein. Sperlingsgröße. Heimat nach Baird öſtliches Nordamerika bis zu den Miſſouri-Ebenen; wandert zum Winter ſüdwärts; Gundlach fand ihn auch auf Kuba und zwar vom November bis zum April.

Gentry gibt eine eingehende Schilderung auch ſeines Freilebens. Dort, in Oſtpennſylvanien, hält er ſich in der Regel nur vom Anfang des März bis zur Mitte Aprils auf und eilt dann nordwärts. Seine Lebensweiſe iſt viel mehr als die der vorigen auf den Boden beſchränkt und nur ſelten ſieht man ihn auf einem Buſch oder Baum. Nach Mr. Verrill iſt er im weſtlichen Maine ein gemeiner Sommergaſt und niſtet dort zuende des Monats Mai; nach Dr. Brewer findet man die Neſter am Meeresufer in den Felſen und Klippen zu vielen geſellig beiſammen. Während des niſtens iſt er mißtrauiſch und vorſichtig. In Hinſicht der Ernährung, des Neſtbaues und Geleges (die Eier ſind auf grünlichweißem Grunde röthlichblau oder roſtgelblich gefleckt) und in allem übrigen gleicht er den vorigen. Ueber den Geſang ſagt Gentry nichts; Nuttall dagegen bezeichnet denſelben als laut und in einzelnen Strofen dem des Kanarienvogels ähnlich. Nachts, ſagt der letztere, zirpe er heuſchreckenähnlich. Gundlach fügt nichts weſentliches hinzu, nur daß er zuweilen in den Reisfeldern Schaden anrichte und daß ſein Fleiſch, wenn er fett iſt, wohlſchmeckend ſei.

Der Savannen-Ammerſperling oder Savannenſperling (Ruß' „Handbuch") heißt bei Br. Steppenammerfink. — Graminero auf Kuba (nach Gundl.). — Le Moineau des Savannes; Savannah Sparrow.

Nomenclatur: Fringilla savanna, *Wls.*, *Audb.*; Linaria savanna, *Rchrds.*; Passerculus savanna, *Bp.*, *Cb.*, *Brd.*, *Gndl.*; Emberiza savanna, *Audb.*; Zonotrichia savanna, *Gr.*, *Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 470.

Fringilla savanna: stria media pilei subfusco-nigri sordide flavida; stria superciliari usque ad occiput flava, altera subter fusca; stria genarum luride fulvarum subtili flavida, altera mystacali gulae albae circumdata nigra; notaeo toto badio, macula scapi plumarum livide marginatarum nigricante coerulea; remigibus nigro-fuscis, exterius anguste livide limbatis; tectricibus al. exterius latius subgilvo-limbatis; rectricibus e nigro fuscis, exterius livide limbatis; pectore badio, fusco-striolato; gastraeo toto albissimo; infracaudalibus obscure striatis; tomiis et gnathidiis rostri fusci rubente albis; iride fusca; pedibus e gilvo canis. — ♀ conveniens.

Länge 13 cm.; Flügelbreite 20,8 cm. (Gundlach).

Der nordiſche Ammerſperling [Fringilla sandwichensis, *Gml.*]. Dem vorigen nach Baird überaus ähnlich, doch etwas dunkler, an Nacken und Halsſeiten gelblichroſtroth, ſchwach dunkel ſchaftſtreifig; Schwingen und Flügeldecken mit breiten roſtröthlichen Außenſäumen; ganze Unterſeite reinweiß. Feldſperlingsgröße. Heimat das nordweſtliche Nordamerika vom Kolumbiafluſſe bis zum hohen Norden. Baird bemerkt, daß der Name nicht von den Sandwich-Inſeln, ſondern vom Sandwichſund hergeleitet iſt. In Lebensweiſe und allem übrigen wird er wol mit den vorigen übereinſtimmen und lebend vorhanden dürfte er bisher nur im zoologiſchen Garten von Hamburg geweſen ſein. — Polarſperling (Ruß' „Handbuch"), Polarammerfink (Br.). — Emberiza arctica, *Lth.*; Emberiza chrysops, *Pll.* [Sandwich-Bunting, *Lath.*; Unalaschka Bunting, *Penn.*].

Der Gras-Ammerſperling [Fringilla gramínea, *Gml.*] iſt über ganz Nordamerika verbreitet und überall gemein, trotzdem aber bis jetzt nur einzeln und ſelten lebend eingeführt. Er iſt oberhalb hellgelblichbraun, dunkelbraun ſchaftſtreifig; Augenbrauen- und Backenſtreif weißlich, letzterer ober- und unterhalb fein dunkel begrenzt; Wangen braun, fahl geſtreift; Schultern und Flügel hellkaſtanienbraun, jede Feder heller außengeſäumt, letztere mit weißlicher Querbinde; Schwanz ſchwarzbraun, die äußerſten Federn weiß und die nächſten nur weiß geſpitzt; Hals, Bruſt und Seiten fahlbraun, dunkler geſtrichelt; ganze übrige Unterſeite düſterweiß; Schnabel braun; Auge braun; Füße fleiſchroth. Finkengröße. (Nach Baird). Ueber das Freileben berichtet Gentry eingehend. Trockene Felder und Weiden ſind ſein Aufenthalt und er lebt hier in der Weiſe der Feldlerche; ſingend ſitzt er jedoch auf einem Strauche oder niedrigen Baume. Das Neſt iſt ſtets an der Erde verſteckt zwiſchen hohem Graſe oder niedrigem Geſträuch. Gelege vier bis fünf röthlichweiße, roth und braun gefleckte Eier. Der Geſang iſt dem des Singſperlings ähnlich, doch nicht ſo wechſelvoll. Die Forſcher Audubon, Nuttall, Cooper u. A., mit deren ausführlicher Schilderung dieſe Angaben übereinſtimmen, loben den Geſang faſt alle mehr; er ſoll namentlich dem des Kanarienvogels ähnlich ſein. In der übrigen Lebensweiſe gleicht er den vorigen. Er wurde von Reiche und dann auch von Geupel einmal eingeführt. — Grasſperling (Ruß' „Handbuch"); Grasammerfink (Br.). — Le Moineau du gazon. — Grass-Finch or Bay-winged Bunting (*Brd.*).

Der gelbflügelige Ammerſperling [Fringilla passerína, *Wls.*] iſt über den Oſten von Nordamerika verbreitet und kommt nach Gundlach auch auf Kuba vor. Oberhalb rothbraun, jede Feder grau geſäumt und mit ſchwarzbraunem Schaftfleck; über den Kopf ein fahlrother feiner Scheitelſtreif; bräunlichrother Zügelſtreif; Wangen bräunlichgrau, von feinem rothbraunen Streif begrenzt; Flügel- und Schwanzfedern ſchwach olivengräulichbraun, fahlröthlich außengeſäumt, kleine Flügeldecken hellgelb, große röthlichbraun gefleckt, wodurch zwei Querbinden über den Flügel gebildet ſind; ganze Unterſeite weiß; Schnabel röthlichgrau, Unterſchnabel heller gelblich; Auge braun; Füße gelbgrau. Etwas unter Sperlingsgröße. Das Weibchen ſoll nur fahler ſein. Gentry ſchildert auch ihn ausführlich. Er iſt Zugvogel und kommt zuende Aprils oder anfangs Mai und zeigt ſich in manchen Gegenden häufig, in

anderen selten. In der Lebensweise, Ernährung, im Nisten und in allem übrigen gleicht er den Verwandten. Nach Gundlach läuft er einer Maus ähnlich auf dem Boden, verbirgt sich gern hinter Grasbüscheln, Erdschollen, Steinen, setzt sich wol nie auf einen Baum, sondern allenfalls auf einen Busch. Der Gesang ist eigentlich nur ein Lockton; auch Gentry nennt den ersteren kurz und schwach, dem Zirpen einer Heuschrecke ähnlich; Audubon dagegen bezeichnet ihn als eine melodische Weise. Da der Vogel sehr verbreitet und auch häufig ist, so wird er demnächst wol eingeführt werden. — Sperlingsammerfink (Br.). — Yellow-winged Sparrow (*Brd.*). — Fringilla savannarum, *Gml.*, *Nttll.*

Henslow's Ammersperling [Fringilla Henslowi, *Audb.*], ebenfalls aus dem Osten Nordamerikas. Oberhalb röthlichbraun; Oberkopf, Hals und Oberrücken grünlichgelb, Scheitelstreif breit schwarz, fein heller gefleckt, zwei feine schwarze Bartstreifen an jeder Seite; Wangen schwärzlichgrau; Kehle weißlichgelb; im übrigen den vorigen ähnlich. Sperlingsgröße. — Spazenammerfink (Br.). Henslow's Bunting (*Brd.*).

Leconte's Ammersperling [Fringilla Lecontei, *Audb.*], ebenfalls von Nordamerika und den beiden vorigen ähnlich, mit gelblichweißem Strich über den Kopf; Wangen und breiter Augenbrauenstreif gelblichorangeroth; an der ganzen Oberseite licht gelblichroth, schwärzlichbraun schaftstreifig; ganze Unterseite einfarbig, nicht gestrichelt; etwas kleiner als der gelbflügelige Sperling. Leconte's Bunting (*Brd.*).

Der bleigraue Ammersperling [Fringilla manimbe, *Lchtst.*] aus Brasilien; den Ornithologen sehr bekannt, jedoch lebend noch nicht eingeführt. Grau; Rückengefieder mit schwarzbraunen Schaftstreifen; Armschwingen rothbraun gesäumt; Zügel und Flügelrand am Bug goldgelb; Mitte der Unterseite weiß. Vom Ansehen und der Größe eines weiblichen Haussperlings, nur klarer und mehr bleigrau. Schnabel blaßgelb; Auge braun; Füße gelblichfleischfarben. Aufenthalt Wiesen und Umgebung der Flüsse mit einzelnen Büschen. Nest an einem Zweige hängend. Eier röthlichweiß, heller oder dunkler rothbraun gefleckt. Lebensweise sperlingsartig; Gesang leise, etwas melodisch (nach Burmeister). — Wachtelammerfink (Br.). — Ammodromus xanthornus, *Gld.* [Manimbé, *Azr.*].

Der spitzschwänzige Ammersperling [Fringilla caudacuta, *Gml.*, nec *Lath.*]. Oberkopf dunkelaschgrau mit breitem gelblichrothbraunen Backen- und Schnurrbartstreif, Hinterkopf fahl olivengrünlichbraun; ganze übrige Oberseite olivengrünlichgrau; Flügelrand gelb; Kehle und Brust hellröthlichbraun, fein dunkel schaftstreifig; ganze übrige Unterseite weiß. Sperlingsgröße. Die Heimat erstreckt sich über den Osten von Nordamerika. Näheres ist nicht angegeben, und eingeführt ist er bis jetzt auch noch nicht. — Küstenammerfink (Br.). — Sharp-tailed Finch (*Brd.*). — Fringilla littoralis, *Nttll.* [Sharp-tailed Oriole, *Penn.*].

Der Strand-Ammersperling [Fringilla maritima, *Wls.*]. Dem vorigen ähnlich, aber am Oberkopf mehr gestrichelt und in der ganzen Färbung oberhalb mehr olivengrünlichbraun; Hinterkopf und Nacken röthlicholivenbraun; Backenstreif dunkelbraun, fein gestrichelt und ein zweiter feiner hochgelb, Bartstreif dunkelgrau; Kehle weiß; Flügelrand gelb; ganze Unterseite olivenbräunlichgrau. Sperlingsgröße. Heimat das östliche Nordamerika. Aufenthalt Sümpfe und Grasflächen neben Gewässern. Er zeigt in seiner Lebensweise nichts bemerkenswerthes weiter, als daß man sein Nest sehr zahlreich auf erhöhten Stellen an den Gewässern und oberhalb derselben findet. Einen Gesang hat er nicht, und abgesehen davon, daß er wol niemals zahlreich zu uns gelangen wird, ist er auch für die Liebhaberei werthlos; ich habe ihn nur einzeln im zoologischen Garten von Berlin gesehen. — Seeammerfink (Br.); Strandsperling (Ruß' „Handbuch"). — Le Moineau maritime; Seaside Finch; Maritime Sparrow. — Ammodromus Macgillivrayi, *Audb.*

Samuel's Ammersperling [Fringilla Samuëlis, *Brd.*], von Kalifornien, ähnelt nach Baird dem Singsperling, ist jedoch beträchtlich kleiner und düsterer; Kopf und ganze Oberseite

braun, dunkler ſchaftſtreifig und jede Feder fahl geſäumt, über den Kopf ein ſchmaler dunkler Mittelſtreif, Augenbrauenſtreif grauweiß, Backenſtreif faſt weiß; Flügel faſt einfarbig bräunlichroth; Kehle, Bruſt und Seiten grau, ſchwärzlich geſtreift und gefleckt; ganze übrige Unterſeite bläulichweiß. Näheres iſt nicht bekannt, und der Vogel zeigt auch keine Ausſicht, eingeführt zu werden.

Der geſtreifte Ammerſperling [Fringilla grámmaca, *Say*] iſt verbreitet über ganz Nordamerika, auch Texas und Mexiko. Oberkopf kaſtanienbraun, gegen die Stirn hin ſchwarz, Mittel- und Augenbrauenſtreif weiß, Zügelſtreif ſchwarzbraun, Backenſtreif und kleiner Streif vom Auge bis zum Schnabel ſchwarz, Halbmond unter dem Auge weiß, Wangenfleck rothbraun, Bartſtreif ſchwarz; ganze Oberſeite graulichbraun, dunkelſchaftſtreifig; Flügel mit röthlichfahler Querbinde; Schwanzfedern ſchwarzbraun, breit weiß geſpitzt; ganze Unterſeite weiß. Wenig über Sperlingsgröße. In der Lebensweiſe und in allem übrigen dürfte er mit den verwandten übereinſtimmen. Eingeführt iſt er nur höchſt ſelten, doch wird dies demnächſt wol häufiger geſchehen, da er zu den verbreitetſten und häufigſten Vögeln Nordamerikas zählt. — Strichelammerfink (Br.); Lerchenſpaz (Ruß' „Handbuch"). — Moineau-alouette; Lark Sparrow or Lark Finch. — Chondestes strigatus, *Swns.*

Der zweiſtreifige Ammerſperling [Fringilla bilineata, *Css.*]. Oberhalb einfarbig düſter bräunlichaſchgrau, an Kopf und Bruſt reiner bleigrau; Augenbrauen- und Backenſtreif reinweiß, erſterer nach innen ſchwarz gerandet, Wangen ſchwarz, nach dem Hinterkopf zu ſchiefergrau, Bartſtreif weiß, Kehle bis zur Oberbruſt ſchwarz; Schwanz ſchwarz, die äußeren Federn weiß; ganze Unterſeite reinweiß; Schnabel blau. Nach Baird nur im Thal des Rio Grande gefunden. Black-throated Sparrow (*Brd.*) — **Bell's Ammerſperling** [Fringilla Belli, *Css.*] aus Kalifornien. Oberhalb bläulichaſchgrau; Kopfplatte gelblichgrau, Augenbrauenſtreif, Streif vom Auge zum Schnabel und Wangen weiß, Streif an der Kehlſeite und Kehle bis zur Oberbruſt ſchwärzlichgrau; Flügelfedern gelblichbraun gerandet, Flügelbug gelblichgrün; Schwanzfedern ſchwarz, die äußerſten weiß gerandet; unterſeits reinweiß; Schnabel und Füße blau. Etwas größer als der vorige. Bell's finch (*Brd.*). — **Der breitſchwänzige Ammerſperling** [Fringilla lateralis, *Nttr.*]. Oberkopf und Nacken grau, über dem Auge ein weißer Streif; Rücken und Bürzel roſtroth überlaufen; Bauchſeiten roſtroth; ſeitliche Schwanzfedern mit weißer Spitze. Heimat Braſilien, nirgends häufig (Brmſtr.). Als bezeichnend iſt zu bemerken, daß Kehle und Bruſt ockergelb ſind und die drei äußerſten Schwanzfedern breite weiße Spitzen haben (Cbns.). Pipilo superciliosa. *Swns.* [Montese obscuro y roxo, *Azr.*]. — Sehr ähnlich iſt der **weißbrüſtige Ammerſperling** [Fringilla assimilis, *Bss.*] aus dem ſüdlichen Braſilien und Paraguay, daran allein zu erkennen, daß Kehle und Bruſt weißlich oder weißgrau und nur die beiden äußerſten Schwanzfedern weißgeſpitzt ſind. — **Cabanis' Ammerſperling** [Fringilla Cabanisi, *Bp.*] ſoll nur dadurch verſchieden ſein, daß er keinen roſtroth überlaufenen Unterrücken und Bürzel hat. — **Der ſchwarzrothe Ammerſperling** [Fringilla nigrorufa, *Lfrns.* et *Orbg.*] aus Südbraſilien und Paraguay. Oberkopf, Backen, Rücken, Flügel und Schwanz mattſchwarzbraun, Streif über dem Auge und Rand der roſtrothen Kehle weiß; Rückengefieder ſchwarzbraun; Steiß gelb; Bauchſeiten rothbraun; Bauchmitte und Spitzen der äußeren Schwanzfedern weiß; Sperlingsgröße (Brmſtr.). Pipilo personata, *Swns.* [Chipiu negro y canela, *Azr.*]. — **Der graurückige Ammerſperling** [Fringilla thoracica, *Nrdm.*]. Oberkopf ſchwärzlichgrau, heller ſchaftſtreifig, Streif unterm Auge weiß, Wangen grau; Rückengefieder grau, olivengrünlich überlaufen, über dem Flügel eine weiße Binde; Kehle weiß, Oberkopf und Seiten lebhaft roſtroth; Bruſt, Bauchſeiten und Bürzel heller und die Bruſtmitte weißlichgelb. Etwa Sperlingsgröße. Heimat Südauſtralien. (Nach Burmeiſter). Pipilo rufitorques, *Swns.*; Carduelis rufogularis, *Lss.* — **Der ſchiefergraue Ammerſperling** [Fringilla schistacea, *Lchtst.*]; ganze Oberſeite hell ſchiefergrau, Zügel und Ohrgegend mattſchwärzlich, Backen ſchwarz, Kehle mit weißgelblichem Anfluge; Unterſeite weiß, Bauchſeiten hellgrau; Schwanzfedern weißgeſpitzt.

Größe des vorigen. Heimat das Innere Brasiliens. (Nach Cbus. und Brmstr). — **Der schwarzweiße Ammersperling** [Fringilla melanoleuca, *Lfrsn.* et *Orbg.*] ist an Oberkopf und Backen, Flügel- und Schwanzfedern schwarz, Schwingen grau gerandet und die drei äußersten Schwanzfedern weißgespitzt, Rückengefieder im übrigen bräunlichgrau; Unterseite weiß, Bauchseite graulich. Heimat Süd- und Westbrasilien. (Nach Brmstr.). Chipiu negro y blanca, *Azr.* — **Der Halsband-Ammersperling** [Fringilla torquata, *Bp.*] aus den Laplataſtaten; Augenbrauenſtreif bis zum Nacken weiß; Wangen und Bruſtbinde ſchwarz; ganze Oberſeite bleigrau, Flügel und Schwanz ſchwärzlich, Schwingen und Deckfedern weißgerandet, äußere Schwanzfedern ganz weiß, die folgenden weißgeſpitzt; Steiß roſtroth; Bauchmitte weiß (Brmstr.). Weshalb er Halsbandſperling heißt, weiß ich nicht. — **Der olivengrüne Ammersperling** [Fringilla olivácea, *Bp.*] aus Braſilien; an Oberkopf und Flügeln olivengrünlichgrau; Augenſtreif weiß; ganze Oberſeite olivengrün; Unterſeite weißlichgrün, Kehle am hellſten (Brmstr.). — **Der Sommer-Ammersperling** [Fringilla aestivalis, *Lchtst.*] aus dem mittleren und ſüdlicheren Nordamerika; oberhalb dunkelbraun mit graublauem Scheitelſtreif und grauem Augenbrauenſtreif; Schwingen und Schwanzfedern fahl außengeſäumt; Unterſeite fahl gelblichbraun, Binde an der Oberbruſt dunkler braun, Bruſt ſchwach dunkel gefleckt. Er ſoll ſich nach Bachmann durch vorzüglichen Geſang vor allen Verwandten auszeichnen. Sommerammerfink (Br.); Bachman's Finch, *Brd.* (Fringilla Bachmani, *Audb.*; F. aestiva, *Nttll.* [Summer-finch, *Lath.*]). — **Caſſin's Ammersperling** Fringilla Cassini, *Wdhs.*] iſt dem vorigen ſehr ähnlich, ein wenig kleiner; oberhalb blaſſer, die aſchgrauen Federſäume ausgedehnter, die Rückenfedern nicht ganz dunkelbraun, ſondern nur ſchaftfleckig; Augenbrauenſtreif kaum bemerkbar, Kopfſeiten heller; ganze Unterſeite weiß. Heimat Texas. (Nach Baird). — **Der rothhäppige Ammersperling** [Fringilla ruficeps, *Css.*] aus Kalifornien; oberhalb bräunlichaſchgrau; Oberkopf und Nacken kaſtanienbraunroth; Augenbrauenſtreif weißlichgrau; Bartſtreif ſchwarz; ganze Unterſeite fahl bräunlichgelb, Bruſt und Seiten dunkler aſchgrau. Etwas über Sperlingsgröße (Brd.). — **Der rothſcheitelige Ammersperling** [Fringilla rufivirgata, *Lwrnc.*] aus dem Südweſten Nordamerikas und von Mexiko; oberhalb düſter olivengrünlichbraun; Oberkopf mit breitem rothbraunen Scheitelſtreif, Zügel und Wangenſtreif grau, darunter mit ſchmalem rothbraunen Strich; Flügelrand gelb; Kehle und ganze Unterſeite weißlich. Sperlingsgröße (Brd.). Bruchammerfink (Br.). — **Der Plata-Ammersperling** [Fringilla platensis, *Gml.*]; grau; Rücken, Flügel und Schwanz grünſchwärzlich ſchaftſtreifig und fahlgelb geſpitzt, große Deckfedern gelbgrün gerandet; unterhalb hellgrau; Schnabel ſchwarz, Unterſchnabel weißgelb; Auge braunſchwarz; Füße gelblichfleiſchroth. Droſſelgröße. Heimat Südbraſilien, Laplataſtaten und Paraguay. Bis jetzt iſt der ſchöne, ſtattliche Ammerſpaz noch nicht lebend eingeführt, da jedoch Braſilien dem Vogelhandel immer mehr aufgeſchloſſen wird, ſo dürfen wir ihn vielleicht bald erwarten. Sumpfammerfink (Br.). Embernagra dumetorum, *Lss.*; Emberizoides poliocephalus, *Drw.* [Habia de banado, *Azr.*]. — **Der fuchsrothe Ammersperling** [Fringilla iliaca, *Mrrm.*]. Seine Heimat iſt der Oſten der Vereinigten Staten bis zum Miſſiſippi (Baird). Oberhalb dunkelkaſtanienbraun, Kopf und Mantel grau ſchimmernd und ſchwach dunkel längsgeſtrichelt; Zügel und Augenring weißlich, Schläfenſtrich grau, Kopfſeiten mit weißer Binde, Wangen weißlich geſtrichelt; Schwingen und Schwanzfedern mit helleren Außenſäumen und Flügel mit verwaſchenen Binden; Unterſeite weiß, zimmtroth gefleckt. Ammergröße. Gentry gibt eine ausführliche Schilderung, nach welcher er in der Lebensweiſe mit den verwandten übereinſtimmt. Das Neſt ſteht gewöhnlich über Mannshöhe und immer nur in Waldgegenden; Audubon fand es jedoch auch auf dem Boden im Graſe verſteckt. Er wandert nach Letzterem bis Karolina und Florida hinab. Dr. Brewer rühmt den Geſang und nennt ihn melodiſch, reich und wechſelvoll; derſelbe werde von dem keines Vogels in ſeiner Familie übertroffen. Gentry hat den Geſang nicht gehört. Bis jetzt dürfte dieſer Sperling erſt in wenigen Köpfen von Reiche eingeführt ſein; hoffentlich gelangt er jedoch demnächſt zahlreich in den Handel und dann wollen wir ihn als guten Sänger begrüßen. Fuchsfarbiger Fink (Prinz v. Wied); Fuchsammerfink (Br.); Fuchsſperling (Ruß' „Handbuch"). Le Moineau à couleur de renard; Fox-colored Sparrow (*Brd.*). Fringilla ferruginea,

Gml.; F. rufa, *Wls.* — **Der Amſel-Ammerſperling** [Fringilla Townsendi, *Audb.*] aus dem Weſten von Nordamerika, oberhalb dunkel olivengrünlichbraun, Schwingen, Flügel- und Schwanzdecken, wie Schwanzfedern röthlichbraun außengeſäumt; ganze Unterſeite weiß, rothbraun gefleckt. Amſelgröße. Amſelammerfink (Br.). Fringilla meruloides! *Vgrs.*; [Emberiza unalaschcensis, *Gml.*]. — **Der rothbraune Ammerſperling** [Fringilla rufescens, *Swns.*] aus Mexiko. Oberkopf mit roſtbraunem Mittelſtreif und jederſeits ſchwarzem Längsſtrich, Augenbrauenſtreif grau; Zügel-, Backen- und Bartſtreif ſchwarz, neben dem letztern ein gelblicher Streif; ganze Oberſeite roſtbraun, jede Feder fahl außengeſäumt; Flügeldecken und Schwanz dunkler braun, röthlich außengeſäumt; Kehle weiß, Vorder- und Hinterhals röthlichgrau; Bruſt- und Bauchſeiten röthlichbraun; Bruſt, Bauchmitte und Hinterleib weiß. Ueber Finkengröße. Dornammerfink (Br.). — **Der Erd-Ammerſperling** [Fringilla humeralis, *Lchtst.*] aus Mexiko; Haube und Nacken dunkelbraun, Bartſtreif weiß, Geſicht und Halsſeiten ſchwärzlich; Flügel dunkelbraun, kleine Flügeldecken und Rücken rothbraun, dunkel ſchaftfleckig, größere Flügeldecken weißlich gerandet; Schwanz dunkelbraun, äußerſte Feder weißlich gerandet; Kehle weiß, deren Einfaſſung und Bruſtbinde ſchwarz; Bauch weiß; Weichen und untere Schwanzdecken graugelb. Ueber Sperlingsgröße (Cab.). — **Der ſtille Ammerſperling** [Fringilla silens, *Lth.*] aus dem mittleren Braſilien; Kopf ganz ſchwarz, über den Scheitel ein grauer, über jedem Auge ein weißer Streif; Nacken und Bruſtſeiten grau; Rücken und Flügel olivengrün; Schwingen und Schwanzfedern braun, grünlich gerandet; Flügelbug gelb; Kehle weiß mit ſchwarzem Halsring; Bruſt und Bauch weiß, Seiten bleigrau; Schnabel ſchwarz. Größe des vorigen. Ammerhabia (Br.). Arremon torquatus, *Vll.* — **Der grünſcheitelige Ammerſperling** [Fringilla affinis, *Lfrsn.*] aus dem inneren Braſilien. Kopf ſchwarz mit grünlicher Scheitelmitte, weißem Augenſtreif bis zum graugrünen Nackenringe; Rücken und Flügel olivengrün; Schwingen und Schwanzfedern braun, grünlich gerandet, Bugrand ſchmal gelb; Kehle weiß mit ſchwarzem Halsring; Bruſt und Bauch weißlich; Seiten grünlichgrau, Hinterleib aſchgrau; Schnabel ſchwarz. Größe des vorigen. (Brmſtr.). Embernagra torquata, *Lfrsn.*; Arremon conirostris, *Mus. Par.* — **Der gelbſchnäbelige Ammerſperling** [Fringilla flavirostris, *Swns.*] aus dem nördlichen Braſilien. Dem vorigen überaus ähnlich und hauptſächlich nur durch den blaßgelblichen Schnabel verſchieden. Es dürfte daher noch nicht feſtgeſtellt ſein, ob er wirklich eine ſichere Art bildet (Brmſtr.). Gelbſchnabelhabia (Br.) — **Der Ammerſperling mit braunem Nacken** [Fringilla brunneinucha, *Lfrsn.*] von Mittelamerika iſt in der Grundfarbe dunkel olivengrün; Vorderkopf, Zügel und breiter Streif durchs Auge ſchwarz, an der Wange ein kleiner, weißer Fleck, Ober-, Hinterkopf und Nacken braun, von der Kehle an die ganze Unterſeite weiß, doch erſtere mit breitem ſchwarzen Querband. A. von Frantzius fand ihn in den Gebirgswaldungen von Koſtarika und Sclater hat ihn beſchrieben; ſonſt iſt nichts über ihn bekannt. Braunnackenhabia (Br.). — Arremon frontalis, *Tschd.* [Buarremon xanthógenys, *Cb.*]. — **Der keilſchwänzige Ammerſperling** [Fringilla sphenúra, *Vll.*]*), nicht ſelten im Innern Braſiliens. Graubraun, oberſeits ſchwarz ſchaftſtreifig; Flügelrand grünlichgelb; Bürzel und Schwanz roſtgelb; Unterſeite düſterweiß. Etwas unter Droſſelgröße. Er lebt ammerartig vorzugsweiſe auf der Erde, namentlich an den Wegen. (Nach Brmſtr.). Der Vogel dürfte demnächſt wol nebſt anderen zu uns gelangen. (Emberizoides marginalis, *Tmm.*; Sylvia herbicola, *Vll.*; Sphenura fringillaris, *Lchtst.*; Embernagra macroura, *Orbg.*). Cola aguda encuentro amarillo, *Azr.* — **Der ſchwarzgeſichtige Ammerſperling** [Fringilla melanótis, *Tmm.*] aus dem Innern Braſiliens. Oberkopf, Backen und Bruſtſeiten ſchwarz; Augenbrauenſtreif bis zum Nacken weiß; Rücken und Flügel braungrau, dunkel ſchaftfleckig; Flügelrand am Bug goldgelb; Schwanz ſchwarz; ganze Unterſeite roſtgelblichweiß. Hänflingsgröße. (Nach Brmſtr.). [Oreja negra, *Azr.*]. — **Der einfarbige Ammerſperling** [Fringilla unicolor, *Lfrsn.*].

---

*) Da ich S. 399 bereits einen Fink mit der lateiniſchen Bezeichnung F. marginalis geſchildert habe, ſo muß ich hier auf eine neuere zurückgreifen.

Heimat der größte Theil Südamerikas. Er ist dunkel bleigrau mit schieferschwarzem Untergefieder; Schwingen und Schwanz bräunlich, Handschwingen am Außenrande weiß; Unterkörper einfarbig bleigrau. Das Weibchen ist olivengrünlichgrau; Schwingen und Schwanz mehr braun; Unterseite weißlichgrün, dunkel schaftstreifig. Sperlingsgröße. Landbeck fand ihn in den Kordilleren bis zu etwa 2000 Meter Höhe; in der Lebensweise pieperähnlich und wenig scheu. Er singe fliegend oder auf Felsen, auch wol auf Baumspitzen sitzend. Näheres ist nicht gesagt. Schieferammerfink (Br.). [Chlorospiza plumbea, *Ph.* et *Ldb.*] — **Der Feld-Ammersperling** [Fringilla rustica, *Tschd.*] aus Peru; bleigrau, Scheitel und Rücken dunkler, letzterer bräunlich überlaufen; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, lichter gerandet; Unterkörper heller bleigrau; Bauchmitte und Hinterleib weiß. Weibchen grünlichgrau, unterseits heller, dunkel gestreift. Beträchtlich unter Feldsperlingsgröße. (Nach Brmstr.). — **Der kohlschwarze Ammersperling** [Fringilla carbonaria, *Orb.*] aus Patagonien. Dunkelschieferschwarz, bläulich überlaufen, alle Federn des Nackens und Rückens in der Mitte dunkler, Schwingen und Deckfedern lichter gerandet; Stirnrand und Schwanz reiner schwarz. Schnabel und Füße blaßgelb. Nahezu Feldsperlingsgröße (nach Brmstr.). — **Gay's Ammersperling** [Fringilla Gayi, *Eyd.* et *Gerv.*] aus Chile und Patagonien; schiefergrau; Rücken olivengrünlichbraun; Brustmitte, Bauch, Bürzel und Steiß gelblich; Weibchen graulicher im Ton; Flügel und Schwanz brauner; nahezu Haussperlingsgröße (nach Brmstr.). Landbeck sagt, daß er in der Weise des Bergfink lebe, munter sei, immer mit dem Schwanze schwippe und dreist in die Nähe der Wohnungen komme und gern Ueberbleibsel, namentlich Kartoffeln, fresse. Sein Lockton laute tschipp; der Gesang sei einfach und nur eine vielmalige Wiederholung des Rufs: tiht, twiii. Seiner Schönheit wegen werde er gern gehalten und zeige sich anspruchslos und ausdauernd. Chanchito der Chilenen (Landb.) — **Burmeister's Ammersperling** [Fringilla Burmeisteri] aus den Laplatastaten; „völlig vom Aussehen des vorigen; Kopf, Vorderhals und Flügeldecken hell bleigrau, jede Feder mit schwarzgrauem Mittelstreif, wodurch an der Kehle zwei dunklere Streifen; Schwingen und Schwanzfedern braungrau, fein bleigrau gerandet; Rücken olivengrün, dunkler gescheckt; Brust rostgelblichgrün, fast orange; Bauch und Steiß gelbgrau, untere Schwanzseite in der Mitte schwarz; Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel weiß; Auge hell-, Füße hornbraun; über Sperlingsgröße." (Brmstr.). Phrygilus caniceps, *Brmst.* (Auch eine Fringilla caniceps habe ich bereits S. 402 angeführt, daher muß ich für diese Art eine andere Benennung wählen; ich thue dies zu Ehren des Vogelkundigen, der sie zuerst beschrieben). — **Der Lerchen-Ammersperling** [Fringilla alaudina, *Kttl.*] von Chile und Peru. Oberseits lerchenfarbig, braun und schwarz gestreift; Kopf, Hals, Brust und Bauch bleigrau, Hinterleib weiß; Schwanzfedern schwarz mit weißem Fleck an der Innenfahne; Schnabel gelb. Finkengröße. Nach Landbeck bewohnt er gleich dem vorigen steinige Anhöhen, treibt sich nach Lerchenart umher, singt pieperähnlich und steigt auch singend in die Luft und ebenso flatternd langsam herab. Im Dezember fand der Reisende ihn zahlreich auf den Bergen an der Seeküste in Gerstenfeldern mit eben flügge gewordenen Jungen. Er ist ebenfalls leicht einzugewöhnen und als Stubenvogel zu empfehlen. Tropfenammerfink (Br.). Emberiza guttata, *Mn.*; Fringilla erythrorhyncha, *Lss.*; F. campestris, *Bp.* — **Der Strauch-Ammersperling** [Fringilla fruticéti, *Kttl.*] von Chile und Patagonien. Schiefergrau, am Oberkopf und Rücken schwarz gestreift; Flügeldecken mit zwei weißen Binden; Handschwingen weiß gerandet; Zügel, Kehle, Vorderhals und Brust schwarz, Bauch und Steiß weiß; Schnabel und Füße gelblichfleischfarben; Auge braun. Weibchen heller, oberseits braungrau, unterseits grau; am Oberkopf bräunlich; Kehle schwärzlich (Kittlitz). Etwas über Sperlingsgröße. Nach Landbeck ist er in Chile gemein, geht sommers auf die Kordilleren bis zu etwa 4000 Meter Höhe, nistet dort und kommt dann in die Thäler wieder herab. Sein fleißiger Gesang ist nicht schön, sondern besteht nur in einem kreischenden Triller, der wie zittjähnt erklingt und mit einer lauten Schlußstrofe endet. In der Gefangenschaft hält er sich sehr gut und erträgt die Ueberfahrt nach Europa vortrefflich. Buschammerfink (Br.). Emberiza luctuosa, *Eyd. Gerv.*; Rara negra (Heimatsname nach Landb.). — **Der gelbgestreifte Ammersperling** [Fringilla

xanthogramma, *Gr.*] würde hier wol ganz zu übergehen ſein — da in der geſammten wiſſenſchaftlichen Literatur garnichts über ihn zu finden iſt — wenn nicht Landbeck („Zoologiſcher Garten" 1877) bemerkte, daß er als eine Zierde des Vogelhauſes betrachtet werden dürfe, zumal er auch ein guter Sänger ſein ſolle. „Ein hübſch ausſehender Vogel, oberſeits olivengrün, unterſeits blaßgelb, ein Streif über dem Auge und ein ſolcher an der Seite der Kehle lebhaft gelb, letztere und Zügel kohlſchwarz. Das Weibchen iſt ſchwarz und grau geſtreift, ohne Gelb. Gimpelgröße, aber geſtreckter und langflügeliger. Er wurde zuerſt auf den Falklandsinſeln und im Feuerlande gefunden, doch iſt er auch nicht ſelten auf den höchſten Kordillerenpäſſen zwiſchen Chile und Mendoza. Ueber die Lebensweiſe iſt nur wenig bekannt."

Der Diuka-Ammerſperling [Fringilla diuca].

Unter den leider immer einzeln und ſelbſt pärchenweiſe nur ſelten zu uns gelangenden mittel- und ſüdamerikaniſchen Finken haben Reiche und Chs. Jamrach in London hin und wieder einmal den ſog. Nachtſperling erhalten und derſelbe iſt auch ſeit dem Juli 1875 im zoologiſchen Garten von London vorhanden. Er iſt oberſeits bleigrau; Schwingen und Schwanzfedern bräunlichgrau, außen dunkelgrau, innen weiß geſäumt, die äußerſten Schwanzfedern ſchräg, von außen nach innen abnehmend, weiß geſpitzt; ganze Unterſeite weiß, doch mit dunkelgrauer Binde über die Oberbruſt; Bauchmitte und Hinterleib bräunlich überflogen; Schnabel ſchwarz; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen ſoll übereinſtimmend ſein. Beträchtlich über Sperlingsgröße. Er gilt nach Burmeiſter in Chile als ein beliebter Sänger, und Landbeck ſchildert ihn in folgendem: „Dieſer eigentliche chileniſche Sperling iſt hier überall verbreitet, wird aber auch in den Laplataſtaten, im Gebiet der Kordilleren gefunden. In Chile iſt er ungemein zahlreich, bewohnt Städte, Dörfer, einzelne Gehöfte, Gärten, Blumenfelder u. a., brütet auf Bäumen und Gebüſchen mehrmals im Jahre, macht ein großes Neſt aus Wurzeln, Reiſern, Federn, Haren, Lappen und legt 5—6 Eier von weißlicher Grundfarbe, grau gefleckt und beſchnirkelt. Er iſt klug und vorſichtig wie der Hausſperling, ernährt ſich von allem möglichen, beſonders aber von Obſt und Getreide und verurſacht an Süßkirſchen nicht unbeträchtlichen Schaden. Ein hübſcher munterer Vogel, der auf der Erde gleich einer Lerche umherläuft. Seine Locktöne ſind ſperlingsartig und ſehr mannigfaltig, und ſein Geſang, der eigentlich mehr geſprochen als geſungen wird, lautet ungefähr wie ſcheu-ſchin, tweu-jo, jotſchin, tſchiro, tſchiri, tſchiu, tren, tio, twoit, tſchatt, tſchin, ſchan, hoid u. ſ. w. Den einfachen Geſang beginnt er mit Tagesgrauen, im Sommer um 4 Uhr morgens und dann ſingt er faſt während des ganzen Tages. Bei den Chilenen iſt er ein beliebter Stubenvogel, der ſeines Geſangs wegen im Käfige gehalten wird. Semmelfarbige und ſchneeweiße Spielarten ſind nicht ſelten."

Der Diuka-Ammerſperling iſt auch Edelammerfink (Br.) und Nachtfink (Ruß' „Hndb.") benannt. — Le Moineau Diuca; Diuca Finch or Diuca Sparrow; Diuca der Chilenen (Landb.).

Nomenclatur: Fringilla Diuca, *Mln.*, *Gml.*, *Ktl.*, *Brmst.*; Emberiza diuca, *Orbg.*; Euspiza diuca, *Gr.*; Hedyglossa Diuca, *Cb.*; Phrygilus diuca, *Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben.

Fringilla diuca: supra plumbea; remigibus rectricibusque subfumidis, exterius cinereo-, interius albo-limbatis; apicibus rectricum extimarum ab extera ad interiorem oblique decrescentibus albis; gastraeo toto albo; fascia pectoris obscure cinerea; abdomine medio crissoque subfusco-lavatis; rostro nigro; iride fusca; pedibus plumbeis. — ♀ conveniens.

Der gebänderte Diuka-Ammerſperling [Fringilla fasciata, *Lchtst.*]. Dem vorigen überaus ähnlich, doch Stirnrand, Zügel und Backen unter dem Auge ſchwarz; Flügel ſchwarz, letzte Reihe der kleinen Deckfedern weiß; große Deckfedern mit weißlichem Rande; Mittelſchwanzfedern ſchiefergrau, die ſeitlichen ſchwarz, an Spitze und Außenſaum grau; Oberſchnabel braun, Unterſchnabel weißlich. In den Gebüſchen des Kamposgebiets bei Lagoaſanta in Braſilien iſt er nicht ſelten; er zeigt ſich munter und wenig ſcheu, hat eine kurze Melodie, iſt aber kein eigentlicher Sänger. In allem übrigen ſtimmt er wahrſcheinlich mit dem vorigen durchaus überein. (Nach Brmſt.). — Tanagra axillaris, *Sp.*; Diuca fasciata, *Brmst.* etc. — **Der Diuka-Ammerſperling aus Bolivien** [Fringilla speculifera, *Orbg.*] weicht durch breit am Außenrande weißgefärbte mittlere Handſchwingen und einen reinweißen Bauch nebſt Steiß, ganz weiße äußere Schwanzfedern und einen weißen Fleck unter dem Auge von dem vorigen ab. (Brmſtr.).

Es gibt noch eine recht beträchtliche Anzahl verwandter Ammerſperlinge, welche von manchen Gelehrten und Forſchern in ſeltſamer Weiſe umhergeworfen werden, ſodaß ſie bald hier, bald dort ihren Platz finden. Will man eine ſolche Vogelgemeinſchaft in unzählige kleine Sippen und Geſchlechter zerſplittern, ſo läßt ſich allenfalls eine Aufſtellung ermöglichen, welche freilich ihre bedeutſamen Schwächen hat und für den Laien, bzl. den Liebhaber und Züchter, keinenfalls verſtändlich iſt; will man dagegen die offenbar naheſtehenden einheitlich aneinanderreihen, ſo ſtößt man natürlich auf nicht geringe Schwierigkeiten. Trotz der letzteren darf ich mich jedoch nicht beirren laſſen, ſondern will hier auch die nachfolgend verzeichneten Arten als Ammerſperlinge mitzählen: **Der braunohrige Ammerſperling** [Fringilla biarcuata, *Lfrsn.*] von Koſtarika, Guatemala und Mexiko; Oberſeite bräunlich, Unterſeite weißlich, Hinterleib graubraun; mit weißer Färbung der Gegend um die Augen, des Zügel- und breiten Backenſtreifs; Vorderkopf, Stirnmitte, Bartſtreif und Binde auf der Bruſtmitte ſchwarz; Hinterkopf, Nacken und Ohrgegend braunroth; untere Schwanzdecken ſchwach graugelblich. (Nach Cb.) (Pyrgisoma Kieneri, *Bp.*; Atlapetes rubricatus, *Cb.*) — **Der weißohrige Ammerſperling** [Fringilla leucótis, *Cb.*] von Koſtarika. Durch weiße Einfaſſung der Augen, großen weißen Fleck zwiſchen Oberſchnabel und Auge, weiße, ſchwarz eingefaßte Ohrgegend und lebhafte gelbe Halsſeiten ausgezeichnet; im übrigen oberhalb röthlicholivengrünlichgrau, Bruſt mit breiter Binde (Cb.). Weit über Sperlingsgröße. — **Der gelbkehlige Ammerſperling** [Fringilla flavigularis, *Scl.*] von Neugranada. Oberhalb olivengrün, Flügel und Schwanz dunkelbraun; Kehle gelb, Unterſeite aſchgrau, Bauch gelblichweiß. Sperlingsgröße. — Der grünſteißige Ammerſperling [Fringilla chrysopógon, *Bp.*] von Mittelamerika; der weißnackige Ammerſperling [Fringilla albinucha, *Lfrsn.*] von Mexiko; der blaßnackige Ammerſperling [Fringilla pallidinucha, *Bss.*] von Kolumbien; der ſchwarzköpfige Ammerſperling [Fringilla capitalis, *Cb.*] von Koſtarika; der zimmtfarbene Ammerſperling [Fringilla semirufa, *Bss.*] von Neugranada (Röthelhabia, Br.); der Augenbrauen-Ammerſperling [Fringilla superciliaris, *Lfrsn.*] ebenfalls von Neugranada; der weißſtirnige Ammerſperling [Fringilla albifrons, *Vll.*] vom Rio grande; Deville's Ammerſperling [Fringilla Devillei, *Bp.*] von Braſilien; der weißbrillige Ammerſperling [Fringilla ophthalmica, *Dbs.*] von Mexiko; der ſchwarzbrillige Ammerſperling [Fringilla postocularis, *Cb.*] von Guatemala, ſeien blos erwähnt; ſie, ſowie verſchiedene andere, mehr oder minder feſtſtehende Arten muß ich hier übergehen, da ſie für die Liebhaberei keine Bedeutung haben und eine ſolche auch ſchwerlich erlangen werden.

Der rothäugige Grundammersperling oder Grundröthel [Fringilla erythrophthalma].

Von Zeit zu Zeit kommt dieser größte und stattlichste aller Ammersperlinge in den Handel und um seiner absonderlichen Gestalt und Färbung und seines anmuthigen Aussehens halber findet er immer willige Aufnahme. Man hält ihn gern in den Vogelstuben, namentlich aber ist er nicht selten in den zoologischen Gärten vorhanden. Der Kopf, sowie die ganze Oberseite und die Brust sind glänzendschwarz; Schwingen bräunlichschwarz, die ersten an der Außenfahne mit weißem Fleck, die nächsten am Ende der Außenfahne weißlich; Schwanz schwarz, die äußersten Federn mit breitem weißen Ende, die nächsten weniger weiß; Unterkörper weiß, die Seiten jedoch mit breiter gelblichrostrother Binde; untere Flügelseite weiß, untere Schwanzdecken gelblichweiß. Schnabel bräunlichgrau, Unterschnabel gelbgrau; Auge feuerroth; Füße gelblichbraun. Das Weibchen ist übereinstimmend, doch hat es anstatt der schwarzen Färbung nur mattes, schwärzliches Braun und der Schwanz ist düster röthlichbraun. Seine Größe ist beträchtlicher als die eines Gimpels.

Die Heimat erstreckt sich nach Baird weit über den Osten Nordamerikas bis zum Missourifluß; nach Anderen ziemlich über die ganzen Vereinigten Staten. Er ist Zugvogel und soll gleich dem europäischen Edelfink in getrennten Geschlechtern wandern. Ueber die Lebensweise haben mehrere Schriftsteller, namentlich Audubon, berichtet und zwar stimmt dieselbe im wesentlichen mit der aller hier bereits geschilderten Verwandten, welche vorzugsweise auf der Erde leben, überein. Prinz von Wied berichtet folgendes: „Wir haben ihn überall angetroffen, sowol im Alleghany-Gebirge in Pennsylvanien, als auch am Ohio, Wabasch, Mississippi und Missouri. Er schlüpft in dichtem Gebüsch umher, meist parweise und läßt seine Stimme hören, die wie to-hi klingt. Sahen wir im Sommer im dichten, mit Brombeerranken durchzogenen und mit hohem Grase und anderen Pflanzen durchwachsenem Gebüsch und ebenso auf den Inseln des Missouri im Weidendickicht einzelne Vögel schlüpfen und schossen sie, so waren es meistens diese. Im strengsten Winter soll der Grundröthel mehr südlich ziehen, allein in Indiana traf man ihn den ganzen Winter hindurch, wenigstens im Monat Dezember.“ Ausführliche Mittheilungen, theils nach eigenen Anschauungen, theils nach anderen Schriftstellern, macht sodann Gentry: „Im Frühlinge ist er in Ostpennsylvanien häufig; zur Mitte des Monats April kommt er in Scharen an, bald aber trennen sie sich in einzelne Pärchen. Ihren Hauptaufenthalt bilden mit dichtem Gestrüpp und Gras bewachsene Ebenen und feuchte Walddickichte, doch sieht man sie auch in weniger abgelegenen Gegenden, selbst in Büschen an belebten Wegen, und sie zeigen sich hier keineswegs scheu. Wenige verwandte Arten gibt es, die sich so beständig an der Erde aufhalten, wie der Grundröthel (daher auch der Name); nur zufällig setzt er sich auf niedriges Gebüsch, auf hohe Bäume aber garnicht. Wie alle seine nächsten Verwandten zeigt er ein sonderbares hühnerähnliches

Scharren. Wenn man bei ſtillem Wetter hier und da im Walde das trockene Laub am Boden ſonderbar raſcheln hört, ſo rührt dies von ſeinen Bewegungen her, indem er dort, namentlich unterhalb der Brombeerranken und Nadelholzgebüſche emſig und ſtundenlang nach Nahrung ſucht. Sein Flug iſt niedrig, ſchnurrend und wellenförmig. Auf der Erde bewegt er ſich ſehr behend, laufend und hüpfend. Der einfache Lockruf klingt laut ko-riit (ko-reet); erſchreckt läßt er den ſcharfen ſchrillen Ruf tſchi-wink (chē-wink) dreimal wiederholt hören. Sein Geſang mag durch folgende Silben ausgedrückt ſein, welche von der Nuttallſchen Angabe etwas verſchieden erſcheinen dürften: t'wit-t' witiih-ti-ti (t'whĭt-t' wītēē-tĕ-tĕ). Die Nahrung beſteht in Sämereien, Beeren und verſchiedenen Kerbthieren. Gegen Mitte des Monats Mai beginnt die Parung und im letzten Drittel des Monats der Neſtbau. An Dickichträndern ſteht das Neſt auf dem Boden, zwiſchen den großen Laubmaſſen, welche den letztern bedecken und im Gebüſch. Es wird von beiden Gatten des Pärchens ſehr eifrig und in wenigen Tagen erbaut; beſteht von außen aus Blättern, Stengeln und dünnen Reiſern, innen aus Faſern und Rindenbaſt und iſt mit feinen Würzelchen und Lärchentannennadeln ausgelegt. Die Eier, gewöhnlich vier Stück, ſind ovalrund, auf düſterweißlichem Grunde mit lichtbraunen Punkten und Flecken, am dickeren Ende am dichteſten, beſetzt. Die Brutdauer beträgt 13 Tage; nach etwa 14 Tagen verlaſſen die Jungen das Neſt und nach abermals 10 Tagen ſind ſie ſelbſtändig, doch bleiben ſie mit den Alten familienweiſe bis zum Abzuge Mitte Oktobers beiſammen. Sie machen alljährlich nur eine Brut.“ In einer Schilderung der Singvögel Amerikas von J. Straubenmüller nach dem New-Yorker „Belletriſtiſchen Journal“, mit Erläuterungen in der Zeitſchrift „Die gefiederte Welt“ gegeben, iſt geſagt, daß der Grundröthel ein ganz abſonderliches Benehmen zeige, wenn ein Menſch ſeinem Neſte nahe; er ſtelle ſich flügellahm — wie dies bekanntlich auch andere Vögel thun — und wälze ſich anſcheinend krank auf dem Boden, um den Feind von ſeiner Brut fortzulocken.

In der Vogelſtube hält ſich das Pärchen für gewöhnlich ſtill und verſteckt im Gebüſch, hurtig durch die Zweige ſchlüpfend; zum Frühjahr hin läßt das Männchen aber ſeinen lauten wunderlichen Ruf, der mit dem Miauen einer Katze wenigſtens eine entfernte Aehnlichkeit hat, häufig hören. Dann ſtimmt es auch, flügelſchlagend und ſchwanzwippend einige zuſammenhängende Töne an, welche freilich die Bezeichnung Geſang keineswegs verdienen. Trotzdem würde es als Bewohner der Vogelſtube immerhin willkommen ſein, zumal das Pärchen dort wol unſchwer zur Brut ſchreiten dürfte; allein jetzt beginnen ſie beide eine unheilvolle Thätigkeit, indem ſie über alle ſchwächeren Genoſſen mörderiſch herfallen und daher ſchleunigſt entfernt werden müſſen. Sicherlich mit Erfolg züchten würde man ſie in einem entſprechend eingerichteten, geräumigen Käfige, und zu derartigen Ver-

ſuchen möchte ich hier umſomehr anregen, als mit allen dieſen Ammerfinken bisher noch keinerlei Ergebniſſe erreicht worden. Der Preis beträgt im Großhandel 10 Mark für das Par, einzeln 15 bis 24 Mark. Herr Reiche führt jährlich etwa 50 Par ein.

Der rothäugige Grundammerſperling oder Grundröthel heißt auch Grund- oder Bodenfink, rothäugiger Fink, Fink mit rothbraunen Augen (Prinz von Wied) und Tohivogel.

Le Pinson rouge-gorge; Ground Robin; Towhee; Chewink; Red-eyed Ground-finch.

Nomenclatur: Fringilla erythrophthalma *L.*, *Audb.*; Emberiza erythrophthalma, *Gml.*, *Wls.*; Pipilo ater, *Vll.*; Pipilo erythrophthalmus, *Vll.*, *Bp.*, *Audb.*, *Cb.*, *Brd.*, *Br.*; [Towhee Bird, *Cat.*; Towhee Bunting, *Lath.*, *Penn.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 479.

Fringilla erythrophthalma: capite, notaeo toto pectoreque nitide, nigris; remigibus subfusco-nigris, exterioribus exterius maculam offerentibus albam, interioribus exterius albido-terminatis; rectricibus nigris, extimis latius, sequentibus angustius albo-terminatis; subtus alba vitta laterali utrinque subfulva; subalaribus albis; subcaudalibus substramineis; rostro subfumido, mandibula livide cana; iride ignea; pedibus ochraceo-umbrinis. — ♀ aequalis, at nigrescente-fuscior, cauda sordide badia.

Länge 19,9 cm.; Flügel 8,3 cm., Schwanz 9,1 cm.

Der gefleckte Grundammerſperling [Fringilla maculata, *Swns.*], dem vorigen im allgemeinen gleich, doch nach Baird beträchtlich kleiner und nicht, wie ein populärer Schriftſteller angibt, etwas größer; im übrigen hauptſächlich nur dadurch verſchieden, daß die kleinen Flügeldeckfedern an der Schulter auf der Außenfahne weiße Längsflecke haben, die erſten Schwingen weniger weiß ſind, die Außenfahne an der äußerſten Schwanzfeder dagegen reinweiß iſt. Der bedeutſamſte Unterſchied liegt alſo in der Größe, und darin daß dieſer viel kräftigere Beine hat. Seine Heimat erſtreckt ſich über die Südküſte von Kalifornien und die Thäler des Gila und Rio Grande (Baird). Im Freileben, ſowie in allen anderen Eigenthümlichkeiten dürfte er mit dem Verwandten völlig übereinſtimmen. Seiner ſonderbaren Lockrufe wegen ſollen ihn die Bewohner Kaliforniens auch Katzenvogel nennen. Im Laufe der Jahre hat Herr Vogelhändler Mieth zweimal einen einzelnen von kleinen Hamburger Händlern mitgebracht, doch ſind beide vor dem Verkauf geſtorben. — Katzenammerfink (Br.); Kaliforniſcher Grundröthel (Ruß' „Handbuch"). — Moineau-chat; Cat Sparrow or Californian Ground Robin. — Pipilo megálonyx, *Brd.*

Außerdem führt Baird noch mehrere nahe verwandte Vögel an, welche im weſentlichen von den beiden vorigen ſehr wenig verſchieden ſind und nicht allein in allen ihren Eigenthümlichkeiten, namentlich in der Lebensweiſe, ſondern auch in der geringen Bedeutung, welche ſie für die Liebhaberei, ſelbſt bei zeitweiliger Einführung erreichen könnten, wol völlig übereinſtimmen und die ich daher nur beiläufig mitzählen darf: **Der weißſchulterige Grundammerſperling** [Fringilla scapularis, *Rss.*] aus dem Oregon- und Waſhington-Gebiete unterſcheidet ſich von dem Grundröthel hauptſächlich durch breites Weiß auf den Schultern und wenig geringere Größe. — Fringilla oregona, *Bell.*; F. et Pipilo arctica, *Audb.*, nec *Swns.* (Da unter den bis hierher geſchilderten Finken die beiden letztgenannten Synonyme bereits vorhanden ſind, ſo mußte ich auch für dieſen nothgedrungen eine andere lateiniſche Bezeichnung wählen). — **Baird's Grundammerſperling** [Fringilla Bairdi, *Rss.*] von der Hochebene am obern Miſſouri; dem Grundröthel wiederum ähnlich, ohne weißes Abzeichen auf den Schultern und Flügeldecken, mit weniger gleichmäßig weiß gezeichnetem Schwanz und etwas kleiner. — Pyrgita arctica, *Swns.* [nec *Audb.*]; Pipilo arcticus, *Brd.* (Auch dieſer Art will ich, da unter den Ammerſperlingen mehrere Arten das Synonym arctica zeigen, einen neuen lateiniſchen Namen beilegen. Zunächſt hätte nun der ältere Autor Swainſon berückſichtigt werden müſſen, da aber eine Fr. Swainsoni S. 430 ſchon vorhanden, ſo ziehe ich den zweiten Autor Baird heran). — **Abert's Grundammerſperling** [Fringilla Aberti, *Brd.*]; oberhalb blaß bräunlichgelbroth, unterhalb

heller, am lichteſten auf der Bauchmitte; Kopfſeite und Gegend rund um den Schnabel dunkelbraun; wenig größer als der Grundröthel. Heimat Neumexiko und die Gegenden am Fuß der Felſenberge überhaupt. — **Der braune Grundammerſperling** [Fringilla fusca, *Swns.*]; viel dunkler als die vorigen, an Kopfſeiten, Schnabelumgebung und Oberkehle blaßröthlichbraun; Kehle dunkel gefleckt. Größe des vorigen. Heimat die Küſtengegenden Kaliforniens. **Braunammerfink** (Br.). Fringilla crissalis, *Vgrs.*; Pipilo mesoleuca, *Brd.* — **Der grünſchwänzige Grundammerſperling** [Fringilla chlorúra, *Audb.*] iſt oberhalb olivengrün mit einfarbig kaſtanienbrauner Kopfplatte; Stirn, Augenbrauenſtreif, Kopfſeiten, Hals, Oberbruſt und Körperſeiten bläulichaſchgrau; Kinnbackenſtreif und Kehle weiß; Flügel hellolivengrün, hellgelb gerandet; Schwanz hellolivengrün. Die Heimat erſtreckt ſich über die Felſenberge bis zum Süden von Mexiko; insbeſondre aber das Thal vom Rio grande (Brd.). Blanding's Finch (*Brd.*). Fringilla blandingiana, *Gmbl.*; Pipilo rufipileus, *Lfrsn.* — Einige von den Forſchern noch außerdem aufgeführte Arten, wie der grüne Grundammerſperling [Fringilla — Pipilo — mácronyx, *Swns.*], der rothbraune Grundammerſperling [Fringilla — P. — rútila, *Pll.*] ſeien nur der Vollſtändigkeit halber wenigſtens erwähnt.

Die Gimpel [Pyrrhulinae].

Von der großen Familie der Finkenvögel im allgemeinen und der Unterfamilie der Finken im besondern unterscheidet sich die kleine Sippschaft der Gimpel durch solche Merkmale, daß man sie nicht ohne weiteres unter die letzteren einreihen darf.

Es sind kräftige Vögel mit verhältnißmäßig großem Kopf, kurzem, dicken, kolbigen und seitlich gewölbten Schnabel, der in einen kleinen Haken sich zuspitzt, die Schnabelwurzel ist kurz beborstet; die Flügel sind mittellang, der Schwanz ziemlich lang, die Füße kurz und recht stark, das Gefieder weich und dicht, stets angenehm gefärbt und die Geschlechter sind verschieden. Die Verbreitung erstreckt sich über Europa, Asien, Afrika und Amerika; in Australien hat man noch keine Art gefunden. Ihre Nahrung besteht in Sämereien, den Körnern von Beeren, deren Fleisch sie fortwerfen, und Knospen, sowie bei den meisten auch nebenbei in Kerbthieren; einige verursachen zeitweise beträchtlichen Schaden an den Blütenknospen der Obstbäume u. a. Sie sind Zug- oder Strichvögel, halten sich vornämlich auf Bäumen, in Vorhölzern, Hainen, Baumgärten, weniger im tiefen Walde auf. Lockton und Gesang sind angenehm, letzterer ist bei einigen auch wechselvoll und melodienreich; andere lernen vorzüglich fremde Lieder oder sind zum Nachflöten beliebter Weisen abzurichten.

Das Nest findet man auf Bäumen, bei manchen Arten auch in Felsenspalten, es bildet immer eine offene Schale und ist dem der naheſtehenden Finken ähnlich, wenn auch an Kunstfertigkeit nicht gleich; es enthält ein Gelege von vier bis sechs gefleckten Eiern. Im übrigen gleicht die ganze Brut ebenfalls denen jener nächsten Verwandten.

Alle Gimpel leben gesellig und erscheinen ebenso in der Gefangenschaft wie im Freileben als verträgliche, liebenswürdige und anmutige Vögel. Der Volksglaube hält sie für einfältig, denn als Gimpel wird ein geistig beschränkter Mensch gescholten. Dies ist jedoch unrichtig, da sie wol harmlos und zutraulich, dabei aber auch klug und scharfsinnig sind; selbst ein Dompfaff oder gemeiner Gimpel, welcher aus dem hohen Norden gekommen, den vielen Verfolgungen und Gefahren glücklich entgangen ist und seine Harmlosigkeit verloren hat, läßt sich keineswegs leicht überlisten.

Sie haben fast sämmtlich für die Stubenvogel-Liebhaberei großen Werth und einige Arten sind für dieselbe sogar von hoher Bedeutung. Leider kommen die meisten fremdländischen Gimpel nur selten und zeitweise in den Handel. Während

sie unschwer sich eingewöhnen und bald zutraulich werden, stellen sie dem Pfleger aber zwei erhebliche, bis jetzt noch keineswegs besiegte Schwierigkeiten entgegen. Einige von ihnen sind nämlich überaus schwer für die Dauer zu erhalten, wohingegen andere nur zu bald ihre prachtvolle rothe Farbe in den verschiedenen Schattirungen verlieren und sich in unscheinbares Gelbgrau färben. In der Schilderung der einzelnen Arten und namentlich bei den Angaben über ihre Fütterung werde ich auf diesen Uebelstand noch näher zurückkommen.

Da man in neuerer Zeit den europäischen Gimpel oder Dompfaff in Flugkäfigen im Freien und selbst in Vogelstuben vielfach gezüchtet hat, so ist nicht daran zu zweifeln, daß dies auch mit den meisten seiner Verwandten ebenfalls erreicht werden kann. Vorläufig sei hier nur der Hinweis gegeben, daß die Seite 326 erwähnten Rathschläge für solche Zucht zu beachten sind. Weiterhin werde ich dieselbe eingehender besprechen. Alles nähere wollen die Leser in der Darstellung jeder einzelnen Art suchen.

Ohne weitere Theilung fasse ich diese ganze Sippe zusammen, indem ich die wissenschaftlich aufgestellten Geschlechter eigentlicher Gimpel [Pyrrhula, *Cv.*], Karmingimpel [Carpódacus, *Kp.*], Hakengimpel [Pinícola, *Vll.*], langschwänziger Gimpel [Urágus, *K.* et *Bl.*] und Wüstengimpel [Bucanétes, *Cb.*] nicht mehr in ihren besonderen, einander mehr oder minder hervortretend gegenüberstehenden Merkmalen abgrenze, sondern vielmehr den größten Nachdruck auf die ausführliche Schilderung der einzelnen Arten nach allen ihren Eigenthümlichkeiten hin lege.

Der Karmingimpel [Pyrrhula erythrina].

Wenn auch nicht zu den überseeischen, so gehört dieser schöne Gimpel doch zu den fremdländischen Stubenvögeln und deshalb sei er hier eingehend behandelt, obwol ich ihn auch in das „Handbuch für Vogelliebhaber" II aufgenommen habe. Da er nämlich in Deutschland hier und dort vorkommt und sogar, wennschon nur selten, auch bei uns nisten soll, so mußte ich ihn unter den einheimischen Stubenvögeln berücksichtigen.

Seine Färbung ist prächtig; an Kopf und Bürzel hellkarminroth; Rücken rothbraun; Flügel und Schwanz dunkler röthlichbraun, erstere mit zwei weißlichen Querbinden; Hals und Oberbrust kräftig rosenroth, Unterbrust röthlichweiß. Die Größe stimmt nahezu mit der des Haussperlings überein. Das Weibchen ist einfarbig grau mit gelbgrünem Bürzel.

Vom nördlichen Europa, Schweden, Lappland, Finnland und fast ganz Rußland an erstreckt sich seine Heimat über einen großen Theil Sibiriens bis Kamtschatka und das Amurland; als Wandervogel dringt er auch nach Polen, weit hinein nach Deutschland und ebenso in den Süden Asiens. Dr. Hans-

mann erlegte i. J. 1874 ein prächtiges Männchen in der Nähe von Stettin; R. Tobias hat nachgewiesen, daß er in Schlesien hier und da nistet. Dr. J. W. v. Müller gibt an, daß er alljährlich regelmäßig im August oder September pärchenweise ins südliche Frankreich (Provence) komme. Im Jahre 1876 erhielt Chs. Jamrach in London eine beträchtliche Anzahl von einem aus Kalkutta anlangenden Schiffe, und Blyth sagt, daß er dort bei den Vogelhändlern zu finden sei. Jerdon fügt hinzu, daß er gegen den November von Norden her auf der Halbinsel einwandere und bis zum März bleibe. Der letztere Forscher beobachtete ihn in den dichten Dschunglegebüschen und in großen Hainen des nördlichen Flachlands. Auch hier wird er zuweilen gefangen und seines Gesangs wegen im Käfige gehalten. Nach R. Swinhoë's Angaben ist er zur Winterzeit auch in China vorhanden. Man hat behauptet, daß er je mehr nach dem Osten zu, desto schöner in den Farben erscheine; und daß die schönsten die in China vorkommenden seien. Dr. Eversmann sagt, daß er an der mittleren Wolga und im südlichen Ural sehr gemein sei, gegen den Herbst hin sich in Scharen zusammenrotte, noch eine zeitlang die lichten Waldungen durchstreiche, dann im September und Oktober fortziehe und in der ersten Hälfte des Aprils zurückkehre. In der Gegend von Turkestan erscheint er nach Dr. Severzow im April und zieht im August bereits ab. Man will festgestellt haben, daß er gleich einigen anderen Vögeln nach einer gewissen Richtung hin allmälig weiter vordringe und zwar west- und südwärts. So berichtet Professor A. v. Nordmann, daß er im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts in Finnland kaum bekannt gewesen; man habe den ersten i. J. 1824 dort geschossen; aber schon seit der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zeige er sich allenthalben zahlreich. In Helsingfors, wo im botanischen Garten sieben Pärchen nisteten, ließ er sich erst in der zweiten Hälfte des Mai hören und Dr. Dybowski meint, daß er überall in Ostsibirien spät eintreffe; selbst die Angaben hervorragender Forscher, wie v. Middendorff und Radde, beruhten in dieser Hinsicht in Irrthum und einer wahrscheinlichen Verwechselung mit dem Rosengimpel.

Als seinen Aufenthalt bezeichnen die Reisenden feuchte und buschige Oertlichkeiten, insbesondre das Weidengebüsch längs der Flußufer, auch ohne hohe Bäume. Das Nest steht im Nadelholz- und Dorngesträuch etwa mannshoch über der Erde, von außen aus langen, dürren Grashalmen locker gewebt, innen mit Grasrispen und Pferdehaaren sauber gerundet; es enthält gegen die Mitte des Juni vier bis sechs Eier. Die beiden alten Vögel stürzen dem sich nahenden Menschen muthvoll und stürmisch entgegen. Sie sollen jährlich nur eine Brut machen.

In meinem oben erwähnten kleineren Werke hatte ich angegeben, daß der Karmingimpel angeblich auch in Deutschland niste. Herr Professor Zitteles in Salzburg berichtete darauf das folgende: „Ich habe mit Sicherheit

eine Brut dieſer ſchönen Vogelart in Niederöſterreich (und wir Deutſch-öſterreicher rechnen alle Länder weſtlich von der Leitha immer zu Deutſchland mit) feſtgeſtellt. Im Juni des Jahres 1869 ward nämlich ein Männchen in dem ganz nahe am Ufer des Traiſenfluſſes gelegnen Garten des Kreisingenieur Oppenheim in St. Pölten beobachtet. Der Gärtner ſah ſodann vier junge Vögel unter einem Strauch am Boden liegen. Ein Neſt konnte er aber trotz vielen Suchens nicht entdecken. Die wahrſcheinlich ſoeben ausgeflogenen Jungen wurden in einen Käfig gethan und dieſer an einer Mauer im Garten aufgehängt. Das eine ſtarb ſchon am erſten Tage, die anderen aber fütterte der an ſeiner rothen Färbung erkennbare Alte durch das Drahtgitter. Als mir Herr Oppenheim dies erzählte, vermuthete ich anfangs, daß es ein Kreuzſchnabel wäre, bald aber überzeugte ich mich, zuerſt an den Jungen und dann mit meinem Fernrohr auch an dem Alten, daß ich im Irrthum ſei. Herr Oppenheim befürchtete, daß der ſeltene Gaſt die Beute eines Raubvogels oder einer Katze werden könnte und beſchloß, ihn einzufangen. Das gelang bald; allein ſchon an demſelben Nachmittage war er todt und am nächſten Tage ſtarben auch die drei Jungen. Der prächtige alte Karmingimpel befindet ſich ausgeſtopft in der Naturalienſammlung der Oberrealſchule von St. Pölten."

Ueber das Freileben in ſeinen eigentlichen Heimatsſtrichen berichten namentlich die bereits oben genannten Forſcher und Reiſenden. Der Vogel iſt munter und lebhaft, fliegt ſchnurrend, flach, bogenlinig und geht nicht ungeſchickt auf der Erde. Im Frühlinge und Sommer ſieht man ihn pärchenweiſe, im Herbſt und Winter in großen Scharen umherſtreichend. Die Nahrung beſteht in mancherlei, namentlich öligen Sämereien, auch Knospen und jungen Schößlingen. Durch Verwüſtung von Flachsfeldern oder Blütenknospen werthvoller Obſtbäume wird er nicht ſelten recht ſchädlich. Nach v. Nordmann's Angabe frißt er vorzugsweiſe die Samen von Ulmen und Rüſtern. Sein Lockton erklingt hüz, wiihi und hell pfeifend dio. Auch über ſeinen Geſang ſind die Urtheile verſchieden. Der Naturforſcher Blyth bezeichnet denſelben als ſchwach, zwitſchernd, doch ſanft und angenehm, etwa mit denen des europäiſchen Diſtelfink und Hänfling übereinſtimmend; der Lockruf gleiche einigermaßen dem des Kanarienvogels. Auch Altvater Naumann hatte ihn bekanntlich als dem des Hänflings und zugleich dem des Rohrammers ähnlich gelobt. Weitere maßgebende Urtheile ſind nicht veröffentlicht. Näheres über ſeine Lebensweiſe iſt leider nicht angegeben, doch wird dieſelbe ſicherlich der S. 483 im allgemeinen geſchilderten aller Gimpel überhaupt gleichen. Middendorff fand ein Pärchen noch etwa 5600 Meter hoch über dem Meere. Radde erlegte in Sibirien ein Männchen, welches die prachtvolle rothe Färbung verloren hatte und in dem fahlen Kleide erſchien, das dieſe Vögel, wie erwähnt, in der Gefangenſchaft anlegen.

Vieillot schildert ihn ebenfalls schon, freilich mit mancherlei Irrthümern. Er kannte als Vaterland nur Indien, von wo aus diese Art also bereits damals in den Handel gebracht wurde. Auch für sie schlägt er einen hohen Wärmegrad vor und meint, daß sie bei solchem, wenn auch schwierig, doch wol zu züchten sei. Die graubraune Färbung nach dem Verlust des schönen Roth hält er für das Winterkleid. Obwol dieser Gimpel aber seitdem allenthalben vielfach gehalten worden, hat man doch fast garkeine weiteren Aufzeichnungen über sein Gefangenleben veröffentlicht. Im Laufe der Jahre habe ich ihn mehrmals beherbergt. Zuerst hatte ich ein Männchen, welches mit einem Weibchen des amerikanischen Purpurgimpels, jedoch erfolglos, nistete; dann aber erzog ein Par in der Vogelstube drei Junge. Das Nest stand in einem dichten Gebüsch ziemlich hoch, unmittelbar an der Wand, war im äußeren Bau aus Grasrispen, Rohrfahnen, weichen Papierstreifen und Fäden geformt und innen zierlich mit langen Pferdehaaren — Agavefasern hatte ich damals für meine Vögel noch nicht — gerundet. Die drei Eier wurden in zwölf Tagen erbrütet und die Jungen erschienen im schwachen bläulichen Flaum. Die genaue, gewissenhafte Beschreibung des Jugendkleides, welche ich bereits im Sommer 1872 und sicherlich zuerst veröffentlicht habe, stimmt mit der dann von Herrn Professor Zeitteles in der „Gefiederten Welt" (November 1873) gegebnen fast völlig überein. Ich darf hierauf wol mit Nachdruck hinweisen, einerseits um die Bedeutung solcher Vogelzüchtungen wieder einmal hervorzuheben und andrerseits um den haltlosen Angriffen meiner Widersacher, namentlich des Herrn Alfred Edmund Brehm, immer von neuem durch Thatsachen entgegenzutreten. Spätere Züchtungsversuche, die man besonders im Käfige angestellt, haben keine Erfolge gebracht. Wenigstens ist ein solcher nirgends mitgetheilt.

Der Fang geschieht vermittelst Fußschlingen oder Leimruten, welche vornämlich mit Flachssamen geködert werden. Wie bei allen Gimpeln, so ist auch seine Eingewöhnung ohne Schwierigkeit und man füttert ihn mit Rübsen, abwechselnd mit Hanf-, Kanarien- und Leinsamen, nebst Grünkraut und Weichfutter aus geriebenen Mören, eingeweichtem Weißbrot und Mohn. Ohne Zweifel würde er zu den angenehmsten Stubenvögeln zu zählen sein, denn er ist doch ein hervorragender Sänger, zugleich schön, verträglich und ausdauernd, aber seine Farbe ist so vergänglich, daß das Roth bereits nach kurzer Zeit mehr und mehr abblaßt und in der ersten Mauser völlig und auf Nimmerwiedererscheinen verschwindet; die Färbung verwandelt sich dann in ein ziemlich gleichmäßiges, unscheinbares, wenn auch nicht unschönes Bronzegelbbraun. Was die Ursachen der Vergänglichkeit des prächtigen Roths anbetrifft, so hat man mit Sicherheit bis jetzt noch nichts feststellen können. Weder die Behauptung, daß die Fütterung, noch die, daß die Lichtverhältnisse einen derartigen Einfluß äußern können, hat

ſich als durchaus ſtichhaltig erwieſen; vielmehr hat ſich das Ergebniß gezeigt, daß ſolche Finken ſelbſt bei vollem unmittelbaren Sonnenlicht ſich entfärbten, während andrerſeits die mannigfaltigſten Futtergaben ebenfalls dies nicht verhinderten. Trotzdem dürfte nach meiner Ueberzeugung doch der Mangel irgend eines Nahrungsmittels ſich geltend machen. Kürzlich hat Herr Karl Scholz in Poisdorf in meiner oben erwähnten Zeitſchrift mitgetheilt, daß ein Hänfling bei ihm die ſchöne rothe Farbe nach der Mauſer wiederbekommen und ein 6 Jahre hindurch im Käfige gehaltner Stiglitz ſeine Prachtfarbe nicht verloren. Den Hänfling hatte Herr Scholz zwiſchen ein Fenſter gebracht, in welches er eine Tanne geſtellt, und er gibt an, daß derſelbe viel von ihrem Grün gefreſſen und ſich darauf verfärbt habe. Vielleicht liegt hierin ein Wink für die zweckmäßige Verpflegung zur Erhaltung des Prachtgefieders aller dieſer rothen Vögel; ich bitte die Leſer daher, derartige Verſuche zu machen, um wennmöglich ein ſolches Ziel zu erreichen.

Ziemlich regelmäßig alljährlich wird der Karmingimpel durch den Herrn Gleitzmann aus Moskau und durch kleinere deutſche Händler in mehr oder minder bedeutender Anzahl, neuerdings auch pärchenweiſe, bei uns, ſowie nach England und Frankreich eingeführt. Der Preis iſt erheblich geſtiegen, denn während er früher $7{,}_{50}$ bis 9 Mark betrug, ſteht er gegenwärtig auf 15 bis 18 Mark für das Pärchen und etwa 9 bis 12 Mark für das Männchen.

Der Karmingimpel heißt auch Karminhänfling oder Brandfink (fälſchlich rothhäubiger Fink und ſchwarzer Zeiſig).

Le Bouvreuil rougeâtre; Ruddy Finch or Carmine Bunting.

Nomenclatur: Loxia et Pyrrhula erythrina, *Pll.*; Loxia erythrina et L. obscura *Gml.*; Fringilla erythrina, *Meyer*, *Rss.* („Handbuch"); Loxia cardinalis, *Bsk.*; Coccothraustes rosea, C. erythrina et Loxia rosea, *Vll.*; Haemorrhous roseus, *Jerd.*; L. erythraca, *Endl.* et *Schlz.*; Erythrothorax rubrifrons, *Br.*; Erythrospiza erythrina, *Bp.*, *Gld.*, *Blth.*, *Strckl.*; Pyrrhulinota roseata et Propasser sordidus, *Hdgs.*; Carpodacus erythrinus, *Kp.*, *Gr.*, *Hdgs.*, *Blth.*, *Bp.* et *Schlg.*, *Bp.*, *Cb.*, *Hrsf.* et *Mr.* [Tooty Finch, *Lth.*; Tuti or Surklar Tuti (in Hinduſtan), *Blth.*, *Jerd.*; Amonga Tuti (in Nepal), *Hdgs.*; Chota Tuti (in Sylhet), *Hamilt.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf, Kehle, Oberhals und Bürzel karminroth; Hinterhals und Rücken braungrau, dunkler röthlich gefleckt; Schwingen dunkelbraun, gelblichweiß und röthlich außengeſäumt, über den Flügel zwei weißliche Querſtreifen; Schwanz graubraun, heller röthlich gekantet; Bruſt weißlich karminroth; Bauch, Hinterleib und innere Flügelſeite graubräunlichweiß. Schnabel horngrau; Auge dunkelbraun; Füße dunkelfleiſchroth. — Weibchen oberhalb matt olivengrünlichbraun, jede Feder heller geſäumt, Wangen bräunlichgrau; Flügeldecken fahl gerandet, über den Flügel zwei weißliche Binden; Schwingen und Schwanzfedern fahl grünlichgelb gerandet; Bürzel matt gelblichgrün; Kehle weißlichgrau, bräunlich längsgefleckt; Bruſt fahlbräunlichgrau, braun längsgefleckt; Unterleib düſterweiß, meiſt ungefleckt. — Jugendkleid: Oberhalb braungrau mit grünlichem Schein; Bürzel düſter gelblichgrüngrau; Unterkörper düſter bräunlichweiß, fahlbraun gefleckt. (Ruß). Nach der erſten Mauſer kommt wenig Roth zum Vorſchein und erſt im dritten oder vierten Jahre ſoll der ſchöne Vogel ſeine volle prächtige Färbung erlangen. — Gelblichbraun ohne jegliche Spur von Roth, oben etwas

dunkler, die Federn eigentlich braun mit gelben Säumen, unten gelb mit braunen Längsflecken; Flügel mit zwei roſtbräunlichen Binden; Bauch weißgelblich, faſt ungefleckt. (Zeitteles).

Pyrrhula erythrína: capite, gula, jugulo et uropygio kermesinis, nucha dorsoque fumidis, obscurius rubicunde maculatis; remigibus fuscis, exterius rubente et subgilvo-marginatis; vittis duabus trans alam albidis; rectricibus fumidis, rubicunde terminatis; pectore albente kermesino; abdomine, crisso et subalaribus luride albidis: rostro corneo, iride fusca; pedibus obscure carneis. — ♀ supra olivaceo-virente fusca plumis singulis dilutius limbatis; genis fumidis: tectricibus al. livide marginatis; fasciis duabus trans alam albentibus; remigibus caudaque livide virescente marginatis; uropygio luride flavido-viridi: gula incana, subfusco-striata: pectore livide fumigato, fusco-striato: abdomine sordide albo, plerumque immaculato.

Länge 15,7 cm.; Flügelbreite 27,7 cm.; Schwanz 5,9 cm.

Juvenis: supra fumida, virente lavata; uropygio luride gilvo-viridi; subtus sordide albida, livide subfusco-maculata *(Russ)*. Ochraceo-fusca rubro prorsus carens: supra paululum obscurior plumis fuscis, flavido-limbatis; subtus flava, fusco-striata: fasciis duabus trans alam ferruginosis; abdomine albente flavida maculis vix ullis *(Jeitteles)*.

Beſchreibung des Eies: Tief blaugrün, am dickeren Ende ſchwarzbraun, reinſchwarz und rothbraun gefleckt, gepunktet und geſtrichelt. (Naumann). — Blaugrün, rothbraun und ſchwarz fein gepunktet und geſtrichelt. (Ruß). Grundfarbe kräftig blaugrün mit dunkelbraunen und ſchwärzlichen ſcharf abgegrenzten Punkten, welche am ſtumpfen Ende meiſtens zu einem Kranze vereinigt ſind; glänzend; Geſtalt ſchön eiförmig. Länge 20 mm.; Breite 14 mm. (Nehrkorn).

Ovum: saturate aeruginosum basi nigro-fusca, nigro- et badio-maculatum, punctulatum et lineolatum *(Naumann)*. — Aeruginosum rufo-nigroque punctulatum et lineolatum *(Russ)*. — Saturate aeruginosum maculis fuscis nigrisque circumscriptis, circa basin plerumque in coronulam congestis notatum: pulchre ovatum *(Nehrkorn)*.

Der Roſengimpel [Pyrrhula rósea, *Pll.*]. Faſt noch ſchöner als der vorige läßt er es umſomehr bedauern, daß er niemals auf unſerm Vogelmarkt erſcheint. Als hochnordiſcher Vogel — ſeine Heimat erſtreckt ſich über den größten Theil Sibiriens — dürfte er freilich, wenigſtens nach den Erfahrungen, welche man ſolchen Gäſten unſerer Vogelſtuben gegenüber bisher gemacht hat, wol nur ſchwierig für die Dauer im Käfige zu erhalten ſein; abgeſehen davon, daß ſeine prachtvolle zarte Färbung binnen kürzeſter Friſt verſchwinden würde. Er iſt am Oberkopf karminroth, dunkler geſchuppt und ſilberfarben glänzend; der übrige Kopf und Hals ſind bräunlichkarminroth; Kopfſeiten und Hinterkopf roſenroth; Mantel dunkelbraun, roth ſchaftſtreifig, Schulterfedern braun, weißlich geſäumt; Schwingen dunkelbraun, gelblich geſäumt; über dem Flügel eine weiße und eine röthlichweiße Querbinde; Bürzel roſenroth; obere Schwanzdecken roſa, dunkel ſchaftfleckig; Schwanz dunkelbraun, jede Feder roſenroth geſäumt; Kehle wie der Oberkopf, Vorderhals und Bruſt hoch roſenroth, Bruſtſeiten dunkelroth ſchaftfleckig; Bauch weiß, jede Feder ſchwach roſenroth geſäumt, ebenſo, aber kräftiger die ebenfalls weißen unteren Schwanzdecken; Schnabel horngrau; Auge braun; Füße horngrau. Weibchen oberhalb lerchengrau; Kopf dunkel roſenroth; Bürzel karminroth. Größe des vorigen. Buffon u. a. ältere Schriftſteller erwähnen ihn nur ganz kurz. Ueber ſein Freileben ſind faſt garkeine Mittheilungen gemacht; die Reiſenden haben ihn nur als Wandervogel beobachtet, Radde in Laubwaldungen, auch im Gebirge. Dybowski berichtet aus Oſtſibirien: „Er kommt im Frühjahr in großen Scharen zu Ende des Monats März, und der Durchzug dauert bis zur Hälfte des April; einzelne verweilen auch bis zur Mitte des Mai. Im Herbſt erſcheint er vom 25. September an und verweilt bis zum 24. Oktober auf dem Durchzuge. Nach Angabe des Herrn Crekanowski niſtet er in den am Angoraſluß unweit des Dorfes Paduna gelegenen Thälern." Die Brut iſt jedoch durchaus unbekannt; ſie wird,

sowie die ganze Lebensweise, wol denen der Verwandten gleichen. Bemerkenswerth ist dann nur noch, daß er auch zuweilen in Europa vorkommt; so nach Blasius auf Helgoland. — Bouvreuil rose; Rosy Bullfinch. — Erythróthorax albifrons, *Br.*

Der Purpurgimpel [Pyrrhula purpúrea].

Tafel XII. Vogel 58.

Als einen stattlichen, überaus schönen und zugleich leidlich gut singenden Vogel habe ich diesen Gimpel schon früher und wol mit Recht bezeichnet. Seine Grundfarbe ist grau, jedoch am ganzen Oberkörper, an der Brust bis zum Bauch rosen- bis dunkelpurpurroth überlaufen. Das Weibchen ist einfarbig grau, an Brust und Unterleib drosselähnlich gefleckt. In der Größe gleicht er dem Haussperlinge. Die Heimat erstreckt sich über ganz Nordamerika; freilich erscheint er in den südlicheren Gegenden nur als Wanderer.

Die älteren Schriftsteller führen ihn als violetten karolinischen Gimpel auf, ohne jedoch etwas besondres über ihn zu sagen. Bechstein gibt auch nichts nähres an und fügt nur hinzu, daß seine Schönheit mehr werth sei, als sein zwitschernder Gesang.

Ueber das Freileben berichten die bekannten amerikanischen Naturforscher, namentlich Audubon und Nuttall; nach ihnen gibt auch Gentry eine ausführliche Schilderung. In Ostpennsylvanien sieht man ihn vom Anfang des Monats Oktober bis zur Mitte des April recht zahlreich in kleinen Scharen, welche sich bei starker Kälte und Nahrungsmangel pärchenweise vereinzeln und bei mildem Wetter wieder vereinigen. Zutraulich und dreist kommen sie mit den Winterfinken zusammen in die Nähe der Gebäude, besonders auf die Geflügelhöfe. Ihre Nahrung besteht in allerlei Gräser- und Kräutersämereien, Knospen und Blüten, sowie Kerbthieren und deren Bruten. Auch dieser Gimpel soll in den Obstgärten an den Blütenknospen nicht selten argen Schaden verursachen. Der Flug gleicht dem des europäischen Grünfink; aufgescheucht und davoneilend, kehrt er dann im Bogen fast regelmäßig zu derselben Stelle zurück. Das Nest steht gewöhnlich etwa mannshoch auf dem Zweige einer Pechtanne oder Zeder und ist aus Stengeln, Reisern, Fasern und Baststreifen geschichtet, innen mit Federn, zarter Thier- und Pflanzenwolle gepolstert. Man findet es nur in den nördlicheren Gegenden; selbst in Pennsylvanien nistet er nach Gentry nicht mehr. Wie die Lebensweise, so gleicht auch die Brut in ihrer ganzen Entwicklung der des vorhin geschilderten nahen Verwandten. Seinen Gesang hat man mit dem des Kanarienvogels verglichen, doch ist er weniger wechselvoll, sanfter, klagender. Während des Singens sträubt das Männchen die Stirnfedern und bläst die Kehle auf. Inbetreff der Beurtheilung auch seines Liedes sind die Meinungen sehr verschieden. Die amerikanischen Vogelkundigen schildern dasselbe zwar als lebhaft, anmuthig, fröhlich, keineswegs aber als hervorragend; damit stimmt der Ausspruch eines populären Schriftstellers nicht überein,

welcher es als verhältnißmäßig ausgezeichnet rühmt und versichert, daß es ihm die größte Freude bereitet habe. Ein tüchtiger Musikkenner, Herr Landkammerrath Vogt in Blankenhain, meint, es sei ein harmloser, doch ziemlich einfacher, nichts weniger als vorzüglicher Gesang; ebenso habe ich denselben schon früher als immerhin recht angenehm bezeichnet.

Im ganzen Wesen, in der Verpflegung und in allem übrigen überhaupt ist er ebenfalls mit dem Karmingimpel übereinstimmend, so namentlich inhinsicht seines ruhigen und friedlichen Benehmens in der Vogelstube. Audubon und Wilson schildern ihn zwar als zänkisch und tyrannisch unter kleineren Vögeln, dergleichen habe ich jedoch an mehreren Pärchen in meiner Vogelstube nicht wahrgenommen, und die vielen Liebhaber und Züchter, welche ihn außer mir gehalten, haben auch zu keinerlei Klagen Anlaß gefunden. In ergötzlicher Weise schildert Herr Vogt das Benehmen eines Männchens im Flugbauer. „Von den drei Atlaswidafinken, welche mein Vogelhaus bewohnen, sind zwei harmlos und thun keinem andern Genossen etwas zu Leide. Der dritte dagegen ist bösartig und verfolgt gerade die kleinsten und schwächsten unausgesetzt, indem er sie weidlich quält. Zu meiner Freude aber handhabt ein Purpurfink gewissermaßen die polizeiliche Gewalt. Sobald der Atlasvogel über einen kleinen herfällt, stürzt der Purpurgimpel sofort hinzu und zerzaust den Raufbold, daß die Federn nur so stäuben. Alle übrigen Mitbewohner aber läßt er durchaus unbehelligt."

Bis jetzt ist dieser schöne Gimpel noch nicht in der Gefangenschaft gezüchtet, und dies mag daran liegen, daß er gleich den Verwandten nur zu bald seine prächtige Farbe verliert und damit den Reiz für die Liebhaber, sodaß dieselben es nicht der Mühe für werth erachten, derartige Versuche anzustellen. Von Herrn Reiche oder Frl. Hagenbeck in einzelnen Köpfen oder Pärchen eingeführt, zeigt er sich nach überstandener Reise gewöhnlich ruppig, kahl, mit abgestoßenem Schwanze, und wenn dann endlich das Gefieder in der Mauser sich erneuert, so ist das schöne Roth für immer verschwunden und ein ähnliches Bronzegelb wie bei dem vorigen erschienen. Deshalb wird er selbst bei bedeutenderer Einführung doch wol niemals zu großer Beliebtheit gelangen. Im übrigen dürfte auch er nicht schwierig zu züchten sein. Der Preis beträgt zwischen 15 bis 24 Mark.

Der Purpurgimpel oder Purpurfink hat keine weiteren Namen. [Purpurfarbner Fink, Seeligm.].

Bouvreuil pourpre; Purple Finch or Purple Bullfinch.

Nomenclatur: Fringilla purpurea, *Gml.*, *Wls.*, *Audb.*, *Rss.* [„Hndbch."]; Pyrrhula purpurea, *Tmm.*; Haemorrhous purpurea, *Sws.*: Erythrospiza purpurea, *Bp.*, *Audb.*; Carpodacus purpureus, *Gr.*, *Bp.*, *Bp.* et *Schlg.*, *Cb.*, *Brd.*, *Br.* [Pyrrhula carolinensis violacea, *Brss.*; Bouvreuil violet de la Caroline, *Briss.*; Pinson violet, *Cat.*; Purple-finch, *Cat.*, *Penn.*, *Lath.*; le Bouvreuil ou Bec-rond violet de la Caroline, *Buff.*; Hempbird, *Brtr.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Der ganze Körper iſt ſchön karminroth, an Kopf und Rücken dunkler, letzterer mit ſchwarzbraunen Schaftſtrichen, ein ſchmaler Stirnſtreif, Wangen, Zügel und ganzes Geſicht heller roſenroth; Flügel- und Schwanzfedern dunkel röthlichbraun, jede Feder fahl roth außengeſäumt und geſpitzt, zwei undeutliche röthliche Querbinden über den Flügel; Bruſt blaſſer roſenroth, Bauch und Hinterleib faſt reinweiß. Schnabel horngrau; Auge braun; Füße fleiſchfarben. — Weibchen oberhalb bräunlichgrau, an Mantel und Flügeln jede Feder fahl gerandet; Augenbrauenſtreif weiß; Bürzel olivengrünlichgelb; ganze Unterſeite graulichweiß, jede Feder mit großem dunklen Längsfleck. Es iſt an dieſer droſſelähnlichen bunten Unterſeite unſchwer zu erkennen.

Pyrrhula purpúrea: pulchre kermesina, capite dorsoque obscurioribus, hoc fusco-nigro-striato; vitta angusta frontali, genis, loris facieque tota rosaceis; remigibus rectricibusque badiis, exterius livide rufo-marginatis et terminatis; fasciis elutis duabus trans alam rubentibus; pectore subroseo; abdomine crissoque albioribus; rostro corneo; iride fusca; pedibus carneis. — ♀ supra subfumea plumis interscapilii alarumque livide marginatis; stria superciliari alba; uropygio olivaceo-virescente; subtus incana plumis singulis maculam magnam nigram offerentibus oblongam. Avis gastraeo turdi instar picto facile distincta.

Länge $15,_2^{cm.}$; Flügel $8^{cm.}$; Schwanz $5,_7^{cm.}$

Der kaliforniſche Purpurgimpel [Pyrrhula californica, *Brd.*], aus dem Weſten der Vereinigten Staten von Nordamerika; dem vorigen ſehr ähnlich, doch an Kopf und Bürzel dunkler purpurroth, mit einem breiten helleren Augenbrauenſtreif und lichtroſenrothem Strich vom Schnabel über die Wangen bis zum Hinterkopf. Das Weibchen iſt oberhalb mehr olivengrünlich und die Mittelflecke der Federn am unteren Körper ſind breiter und nicht ſo ſcharf abgegrenzt. In allem übrigen wird er mit dem vorigen wol übereinſtimmen; eingeführt iſt er noch nicht. — Western Purple Finch, *Brd.* — Carpódacus californicus, *Brd.* — Als Caſſin's Purpurgimpel [Pyrrhula Cassini, *Brd.*] aus den Felſenbergen erwähnt der amerikaniſche Forſcher Baird eine Art, die auch in Aſien vorkommen ſollte, welche aber Dr. Dybowski und dann auch Prof. Cabanis als ſolche nicht gelten laſſen. Sie bedarf daher hier nur der Erwähnung.

Der Hausgimpel [Pyrrhula familiaris, *M'Cll.*]. Ein Vogel, den Baird nur beſchreibt und von dem er ſagt, daß ſeine Heimat ſich von dem Felſengebirge bis zum ſtillen Ozean erſtrecke, und welcher bisher lebend noch nicht bei uns eingeführt worden, veranlaßt mich trotzdem, ſeine ausführliche Schilderung hier aufzunehmen, und zwar einerſeits, weil dieſelbe in überaus intereſſanter geiſtvoller Weiſe nach Caſſin's Darſtellung von Dr. Karl Bolle gegeben iſt und andrerſeits, weil ich der feſten Ueberzeugung bin, daß er demnächſt bald einmal lebend zu uns gelangen wird. „Wenn der Winter unſerer nördlichen Himmelsſtriche in ſeiner Strenge nachgelaſſen hat und die Jahreszeit einer glänzenderen Sonne und neu aufſproſſender Blumen zurückkehrt, wird keiner ihrer erſten Vorboten mit freudigeren Empfindungen bewillkommnet, als die wiedererſcheinenden zutraulichen Vögel, welche, wie der Zaunkönig, der Blauvogel und der Haustyrann es lieben, in die unmittelbare Nähe unſerer Wohnungen zu kommen und dort eine paſſende Stelle zu ſuchen, wo ſie ihr Neſt erbauen und ihre Jungen großziehen können. Sie nehmen die Gaſtfreundſchaft des prunkvollen Palaſtes nicht minder in Anſpruch, als die des einfachſten Häuschens, und in beiden werden ſie mit gleicher Freude begrüßt. Unter allen ſolchen Vögeln erſcheint kaum eine Art durch ihre große Zutraulichkeit ſo bemerkenswerth, als der oben genannte kleine Fink, deſſen Heimat die weſtlichen Länder Nordamerikas ſind. Er nähert ſich nicht blos den menſchlichen Wohnungen ohne Furcht und macht eine Gewohnheit daraus, in paſſenden Räumlichkeiten und anderen Gebäuden eine Niſtſtätte zu beziehen, ſondern er ſucht ſogar in beträchtlicher Zahl ſolche anſcheinend wenig für ihn geeigneten Oertlichkeiten, wie es Ortſchaften und Städte doch ſind, auf. In mehreren

derſelben in Kalifornien und Neumexiko iſt er überaus zahlreich zu finden und gilt entſchieden als ein Liebling der Bevölkerung.

„Verſchiedene Arten der Gattung, zu welcher er gehört, alle einander ziemlich ähnlich, bewohnen den Norden Amerikas; andere wiederum leben unter denſelben Breitengraden in der alten Welt. Die Männchen aller tragen ein Kleid vom ſchönſten Karmoiſinroth oder von mannigfach und zart ſchattirtem Purpur; die Weibchen ſind ſtets viel einfacher gefärbt und zeigen im allgemeinen mit jenen wenig Aehnlichkeit. Der bekannteſte dieſer Vögel in Nordamerika iſt der Purpurfink, ein gewöhnlicher Wintergaſt in den mittleren und ſüdlichen Staten, wo er ein umherſchweifendes Leben in den Waldungen führt, im Frühlinge aber nach dem Norden und in die Gebirge Pennſylvaniens zurückkehrt, wo man ihn ſeiner Schönheit und ſeines angenehmen Geſanges wegen ſehr gern ſieht.

„Der oben genannte Vogel aber ſcheint die Art zu ſein, welche Gambel im Journal der Akademie von Philadelphia den karmoiſinſtirnigen Fink (Erythrospiza frontalis, *Say*) nennt und in folgendem ſchildert: ‚Dieſer niedliche Sänger ward zuerſt in Neumexiko beobachtet, namentlich in Santa Fé, wo er häufig und ſehr zutraulich lebt, ſich um die Höfe und Gärten herum aufhält und ſein Neſt unter die Portale und Schuppen der Häuſer baut. Im Juli waren die Jungen flügge. Unter einem langen Schuppen am Marktplatze ſtanden außerordentlich viele Neſter, und die alten Vögel ſetzten ſich uns zuweilen, während wir vor der Thür ſaßen, dicht vor die Füße, um Krümchen für ihre Jungen aufzuleſen. In Kalifornien trifft man ſie ebenfalls in großer Anzahl an, und hier ſind ſie nicht minder zahm; ſie werden dort von den Einwohnern Buriones (ſoll wol heißen Gorriones, d. h. Sperlinge, Bll.) genannt. Den Winter hindurch leben ſie in Scharen an buſchigen Bergabhängen, Hecken, Weinbergen und in Gärten, wo ſie ſich von verſchiedenen Sämereien ernähren und zuweilen an den Trauben beträchtlichen Schaden verurſachen. Früh im März erfolgt die Parung, und bald ſieht man ſie eifrig mit dem Bau der Neſter beſchäftigt. Sie zeigen dabei, obwol oft getäuſcht, das vollſte Vertrauen zum Menſchen und niſten beſtändig an den Häuſern auf vorſpringenden Balken, unter Thorwegen, an Dachrinnen, in Schauern, Käſtchen oder in irgendwelchen Winkeln, welche ſie vorfinden. Ein Neſt erblickte ich in einem über der Thür aufgehängten Samenkaſten. Sie bauen auch auf dem wagerechten Zweige eines Baumes im Garten, und ſehr viele Neſter werden in den Weidenhecken der Weinberge angelegt. Jedem andern Platze aber ziehen ſie die Balken unter den Schuppen und an den Häuſern vor und lohnen, wenn man es ihnen geſtattet, mit ihren lieblichen Liedern, welche den ganzen Sommer hindurch vom Dache herab in der Nähe des Neſtes ertönen. Das letztere beſteht aus kleinen Reiſern und Kräuterſtielen, Weidenkätzchen und Flaum und wird mit Pferdehar ausgefüttert; oft iſt es auch vorzugsweiſe aus Federn, Baumwolle oder Wolle mit einigen Reiſern und trocknem Gras zuſammengeſetzt und ebenfalls mit Pferdehar ausgelegt. Fünf Eier, bisweilen von einfach bläulichweißer Farbe, meiſtens jedoch mit wenigen zerſtreuten dunkelbraunen Strichen und Tüpfelchen am ſtumpfen Ende, bilden gewöhnlich das Gelege; manchmal findet man auch blos vier Eier und nicht ſelten zeigen dieſe nur auf einer Seite wenige Fleckchen und Strichelchen. Unmöglich iſt es, mit Worten den Geſang dieſes Orpheus des Weſtens zu ſchildern, und obwol Kalifornien viele gute Sänger, u. a. den Spottvogel beſitzt, ſo hat es doch keinen aufzuweiſen, deſſen Lied das Herz mehr erfreute oder dem Ohre melodiſcher und zärtlicher erklänge, als das dieſes Finken.‘

„Der Vogel ward zuerſt vom Oberſt M'Call mit hinreichender Genauigkeit beſchrieben. ‚Ich fand dieſen lieblichen kleinen Fink zu Santa Fé, wo er im März zu niſten begann, obwol das Wetter noch winterlich war und häufiger Schneefall noch länger als einen Monat hindurch immer wiederkehrte. Trotzdem hörte der Geſang des Männchens nicht auf. Die Klänge mahnten mich oft an die ſanften Triller des Hauszaunkönigs und ebenſo an das helle Schmettern des Kanarienvogels. Die Männchen vom vorigen Jahre waren zwar bereits gepart und ſangen nicht minder fleißig als die älteren, doch trugen ſie noch nicht ihr volles Gefieder und hatten wenig oder nichts von dem Roth, welches den völlig erwachſenen Vogel auszeichnet. Die Neſter befanden ſich in den ſchon genannten Oertlichkeiten und waren außer den bereits aufgezählten

Stoffen auch aus langen Baumwollfäden und Stückchen alten Zeuges, kurz aus unzähligen Resten und Abfällen dicht gewoben. Mitte Aprils wurden die Jungen der ersten und oft erst im August die der dritten Brut flügge; vor Ende Septembers aber waren fast alle aus der Umgebung der Stadt verschwunden. Als ich in Neumexiko wohnte, beobachtete ich stets eine liebenswürdige Zartheit im Wesen dieses lebhaften kleinen Sängers und dieselbe trug ihm die volle Zuneigung Aller, ebenso des reichen Eigenthümers eines Landguts als des ärmlichen Tagelöhners ein. Denn dieselbe fröhliche Melodie, welche zur Mittagszeit dem Ohr des erstern schmeichelte, während er sich in seiner Hängematte schaukelte, begrüßte auch den letztern, wenn er bei Tagesanbruch auf Arbeit ging. Diese vertrauliche Zahmheit bewog mich dazu, den obigen Namen ihm beizulegen. Auch sein Benehmen gegen andere Vögel erscheint mild und friedfertig und ich will nur ein Beispiel erzählen. Auf der Piazza des Hauses, welches ich bewohnte, hatte sich eine ganze Ansiedelung dieser Vögel gebildet. Als die Jahreszeit milder wurde und die zarteren Vögel vom Süden her anlangten, erschien auch ein Pärchen rother Schwalben (Hirundo rufa, *Vll.*) und begann inmitten jener Nester das seinige zu erbauen. Eine solche Zudringlichkeit würde doch die meisten anderen Vögel zur Befehdung der Eindringlinge erregt haben. Ganz anders aber benahmen sich die kleinen Hausfinken. Zuerst wichen sie und schienen die Fremdlinge mit Mißtrauen anzusehen; als diese aber ruhig in ihrer Arbeit fortfuhren, wurden sie von ihnen durchaus nicht gestört, und so sah ich die ganze Gesellschaft in vollkommener Eintracht nisten.'

„Am westlichen Abhange ist der Hausfink in ganz Kalifornien gemein, aber nicht im Orangegebiet. Er nistet sowol in Hecken als auch an Gebäuden. Oft fand ich ihn in großen Schwärmen an den Rändern der ausgedehnten Felder mit wildem Senf. Diese ursprünglich von den spanischen Missionären eingeführte Pflanze überzieht hier nämlich jetzt ganze Bezirke und erreicht eine fast baumartige Größe. Ob er in diesen Dickichten nistе, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Seine Nahrung besteht je nach den Jahreszeiten in Knospen, Früchten, verschiedenen Gräser- und Kräutersamen, welche letzteren er, oft mit dem Kopf nach unten oder seitwärts an die schwankenden Stengel sich klammernd, aus den Kapseln holt. Auch Insekten verzehrt er, wie ich glaube, jederzeit. In dem Zustande als halbes Hausgeflügel zu Santa Fé schien er übrigens nichts eßbares zu verschmähen. Mit dem Schluß des Sommers scheint er sich in Scharen zusammenzuschlagen und in der Weise des nächsten Verwandten, des Purpurgimpels, zu wandern. Die Schwärme ziehen dann für den ganzen Winter fort nach Mexiko und wahrscheinlich auch nach Mittelamerika."

Der Hausgimpel gleicht im allgemeinen dem Purpurfink, doch ist er bedeutend kleiner. Der ganze Kopf, Rücken, Steiß, Vorderhals und die Brust sind bräunlichroth, ins Karmoisinrothe spielend, am hellsten an Stirn, Unterrücken und oberen Schwanzdecken, am dunkelsten auf dem Rücken; Schwingen und Schwanz sind schwärzlichbraun, jede Feder bleicher gesäumt; Bauch und untere Schwanzdecken sind weiß, jede Feder braun längsgestreift. Schnabel gelbbraun, Unterschnabel heller. Das Weibchen ist am Oberkörper dunkelbraun, jede Feder dunkler längsgestreift und heller aschgraulich gerandet. Unterkörper düsterweiß, braun längsgestrichelt; überall ganz ohne Roth. (Cassin). Ich glaube umsoeher, daß der Vogel demnächst bei uns auf dem Markte erscheinen werde, als ja nicht allein kalifornische Vögel bereits hin und wieder in den europäischen Handel, sondern seltsamerweise auch manchmal Vögel aus anderen Welttheilen von Kalifornien aus nach Europa gebracht werden, so z. B. einmal eine bedeutende Anzahl von Sonnenvögeln.

Der Hausgimpel oder kalifornische Hausfink (Cass.). — The American House-Finch (*M'Ell.*), Bourion: House Finch (*Brd.*). — Fringilla frontalis*), *Say, Gmb.*: Fringilla haemórrhoa, *Lchtst.*

*) Die eingangs stehende lateinische Bezeichnung, welche dem schönen englischen, bzl. deutschen Namen entspricht, mußte ich hier an Stelle der allerdings älteren beibehalten, da ich S. 448 bereits eine Fringilla frontalis geschildert habe und da ich die leidigen Doppelnamen selbst innerhalb einer großen Familie soweit als irgend möglich vermeiden will.

Der rothbäuchige Gimpel [Pyrrhula rhodocolpus, *Cb.*] wird im „Museum Heineanum" als feststehende Art angeführt, während die Herren Bonaparte und Schlegel ihn nur für ein junges Männchen des vorigen halten. „Er ist kaum kleiner und unterscheidet sich durch eine andre Schattirung des Roth, welches dem des Purpurgimpels sehr ähnlich ist; auch erscheint die Begrenzung weniger scharf, und Scheitel, Oberrücken und die ganze Brust sind röthlich angeflogen. Ein Männchen befindet sich im Berliner Museum." Bei dieser Erwähnung muß ich es bewenden lassen. — **Der rothmantelige Gimpel** [Pyrrhula rhodóchlamys, *Bp.*] aus Sibirien darf ebenfalls nur erwähnt werden, da irgend etwas näheres über ihn nicht aufzufinden ist. (Carpodacus Sóphia, *Bp.* et *Schlg.*; C. grandis, *Blth.*; [Red-mantled Grosbeak, *Gould.*]). — **Der Gimpel vom Sinai** [Pyrrhula sinaitica, *Lchtst.*] „lebt parweise und in Flügen im peträischen Arabien auf Felsen, sonnigen Abhängen, Viehtriften und an Regenbetten. Er ist ein sehr lebhafter und ziemlich scheuer Vogel, ernährt sich vornämlich von feinen Gräsersämereien und zieht wahrscheinlich im Winter fort. Auf Gebüsch habe ich ihn nicht gesehen; aufgescheucht streicht er schreiend und niedrig über dem Boden fort, um sich meistens bald wieder auf Steinen niederzulassen. Er ist in der Grundfarbe schwärzlichaschgrau, schön rosenroth übergossen und im übrigen den vorhergehenden Verwandten, unter denen er zu den größten gehört, ähnlich. Wie weit seine Verbreitung reicht, dürfte wol kaum bekannt sein." (Hgl.). Sinaitischer Gimpel und Rosengimpel, Gimpel und Rosengimpel vom Sinai nach Hgl. Fringilla sinaitica, *Lchtst.*; Pyrrhula sinoica, *Tmm.*; Carpodacus synoicus, *Gr.*; Pyrrhula sinaica, *Rpp.* — **Der rothschulterige Gimpel** [Pyrrhula rhodóptera, *Lchtst.*], ein Vogel, welchen Heuglin hier einreiht, den Cabanis dagegen als Mittelglied zwischen den Steinsperlingen (Petronia, *Kaup*) und Kernbeißern (Coccothraustes, *Bchst.*) hinstellt. Er zeichnet sich durch seinen sehr dicken rothen Schnabel, blutrothe Füße und sehr lange und spitze Flügel aus. Seine Heimat ist Arabien, Palästina, der Libanon; im nördlichen Persien kommt er als Zugvogel vor. Näheres ist nicht bekannt. (Montifringilla sanguínea, *Gld.*; Erythrospiza phoenicóptera, *Bp.*).

Der Hakengimpel [Pyrrhula enucleator].

Wiederum ein hochnordischer Gimpel, dessen Heimat sich über die nördlichsten Theile Europas, Asiens und Amerikas erstreckt. Zum Winter kommt er nach dem Süden Schwedens, in die russischen Ostseeprovinzen und bis nach Rußland weiter hinein, bei sehr starker Kälte nach Nord- und Mitteldeutschland, in einzelnen Köpfen sogar bis Süddeutschland streichend und immer den Ebereschenbeeren nachgehend.

Sein Gefieder ist lebhaft und prächtig roth, Kopf und Hals fast karmoisin, Rücken und Mantel dunkler roth, aschgrau überhaucht, Flügel röthlichaschgrau mit zwei weißlichen Querbinden, Schwingen und Schwanz schwarzbraun, jede Feder fein hell gesäumt. Das Weibchen ist oberhalb gelblichaschgrau, an Kopf und Hals düster ockergelb, unterhalb heller graugelb. Er ist von Drosselgröße.

Vorzugsweise die Nadelholzwälder der Ebenen, seltener gebirgige oder gemischte, niemals reine Laubholzwaldungen dienen zu seinem Aufenthalt. Hier steht das Nest etwa mannshoch und darüber stets auf kleinen Bäumen, meistens dicht am Stamm, als eine aus Reisern, Halmen, Flechten, Würzelchen, sehr dicht gewebte, mit Haren und Federn gepolsterte offene Mulde, welche von beiden Gatten des Pärchens gemeinsam erbaut wird. Vier bis sechs Eier bilden das Gelege. Das Weibchen brütet allein und die Brutdauer soll 14 Tage betragen. Die

Nahrung soll vornämlich in Nadelholzsämereien, ferner in den Kernen von Vogel- und anderen Beeren und Baumknospen bestehen; wahrscheinlich auch in Kerbthieren. Sein Locken erklingt sanft hihiü! und den leisen, jedoch sehr lieblichen und wechselreich flötenden Gesang läßt er besonders eifrig im Frühlinge, doch auch den ganzen Winter hindurch hören. Der Flug ist schnell, wellenlinig, vor dem Niedersetzen schwebend; auf dem Boden springt er ungeschickt, im Gezweige aber zeigt er sich hurtig und gewandt. Gleich den meisten nordischen Vögeln ist er nicht scheu, sondern dreist und daher leicht zu überlisten; er wird auf Leimruten, in Sprenkeln, Schlaggarnen u. a. unschwer gefangen und soll sich sogar, wie schon Buffon und andere ältere Schriftsteller und neuerdings auch Nordmann berichten, eine Pferdeharschlinge, welche an einer langen Stange befestigt ist, über den Kopf streifen lassen. Ebenso leicht geht seine Eingewöhnung vonstatten. Er frißt ohne weiteres, wird sehr zahm und zutraulich, verliert aber ebenfalls nach der Mauser die rothe Farbe und erscheint dann schlicht orangegelbgrau. Im Zimmer singt er in den letzten Frühlingsmonaten besonders schön. Frisch eingefangen darf er nicht sogleich in eine warme Stube gebracht werden, denn er kann die Wärme überhaupt nicht gut ertragen, am wenigsten aber einen plötzlichen starken Temperaturwechsel. Die Händler füttern ihn gewöhnlich nur mit Hanfsamen, doch dürfte es sicherlich gut sein, wenn man ihn an Rübsen, Hafer nebst Ebereschen- und Wachholderbeeren gewöhnt und ihm auch namentlich zur Mauserzeit Mehlwürmer und ein Futtergemisch aus Ameisenpuppen bietet. Er soll nur wenige Jahre in der Gefangenschaft ausdauern, aber freifliegend oder im Flugkäfige nicht schwierig nisten.

Gerade über diesen Vogel ist eine ungemein reiche Literatur vorhanden und von Schriftstellern aller Zeiten, von Brisson, Edwards, Buffon u. A. bis zu Bechstein und jüngeren Zeitgenossen herab, sind mehr oder minder eingehende Schilderungen oder doch Beiträge zu seiner Kenntniß aufgezeichnet; nach denselben habe ich die vorstehende kurze Darstellung gegeben. Wenn trotzdem sein Brutgeschäft erst wenig erforscht worden, so liegt dies eben darin, daß er in jenen unwirthlichen Gegenden des Nordens nistet, wo bis jetzt die Vogelkunde doch nur verhältnißmäßig geringe, derartige Ergebnisse erreichen konnte. Nach den Aussagen der meisten Reisenden ist er ein Wandervogel, welcher in der Lebensweise dem verwandten Karmingimpel gleichen dürfte. Radde gibt an, daß er in Ostsibirien in der ersten Hälfte des Oktobers in die Mauser komme, während dieselbe anderwärts schon zu Anfang Septembers oder zu Ende des August vollendet sein soll. In Schweden wird er nach den Mittheilungen von Meves in manchen Jahren in der Zeit vom Oktober bis zum Februar zu Hunderten aus Upland und Norland, weniger aus der Umgegend von Stockholm, auf den Markt gebracht; in ähnlicher Weise, wenn auch beiweitem nicht in so großer Anzahl, gelangt er zuweilen aus dem preußischen Litauen als Krammetsvogel nach Berlin.

Die beste Schilderung in der neueren Zeit hat Herr B. Marquardt in Bernau in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ veröffentlicht: „Der Hakengimpel erscheint in Livland jeden Winter mit Sicherheit, wenn die Ebereschen reichlich tragen. Sobald die Beeren reifen, kommen sie einzeln oder in kleinen Gesellschaften von 3 bis 5 Köpfen, nach und nach in immer zahlreicheren Scharen, so daß solche gegen Weihnachten hin 30 bis 50 Köpfe zählen, an. Auffallend ist der Größenunterschied unter den Vögeln in einunddemselben Fluge, indem er bei den von mir gemessenen Exemplaren zwischen Gimpel- und Drosselgröße (17 — 23,4 cm.) schwankte. Erst in den großen Schwärmen sieht man ausgefärbte Männchen und immerhin verhältnißmäßig selten, so daß man wol annehmen muß, dieser Gimpel erhalte sein Prachtkleid erst ziemlich spät. Von Weihnachten an verringert sich die Anzahl in den Scharen und die letzten habe ich im April bemerkt. Ob er in Livland nistе, ist mir nicht bekannt. Die Flüge streifen im Lande umher, ohne daß man eine bestimmte Richtung wahrnehmen kann, doch mögen sie im ganzen wol die südliche festhalten. Sie wandern in den frühen Morgenstunden und zwar von einem größeren Walde zum andern; einst sah ich einen Flug mittags ziemlich hoch und mit lautem Locken dahinziehen. Immer wählen sie zum Aufenthalt weite Waldungen, in denen Fichten vorherrschen und die Drosseln für reichliche Ansamung von Ebereschen gesorgt haben. Mit anderen Vögeln, welche auf denselben Futterbäumen zehren, wie Seidenschwänze, Drosseln, Dompfaffen, vereinigen sie sich nicht. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Fichtenknospen, nicht in Fichtensamen, wie fälschlich angegeben wird. Wo sich eine Schar einige Tage hindurch aufgehalten hat, ist der Schnee rings herum mit den Hüllblättchen der Knospen bestreut. Niemals habe ich bemerkt, daß der Hakenschnabel zum Hervorziehen des Samens aus den Zapfen diene; auch bei meinen Gefangenen sah ich dies nie, der Same mochte noch so verlockend zwischen den Schuppen hervorstehen. Sie werfen die Zapfen wol spielend hin und her, wie sie es mit anderen Gegenständen ebenfalls zu thun pflegen; fiel der Same heraus, so fraßen sie ihn garnicht einmal. Arbeiteten sie wirklich mit Ernst an einem Zapfen, so geschah dies regelmäßig, um eine kleine braune Wanze zwischen den Schuppen hervorzuziehen, welche dort Winterherberge gefunden hatte. Brachte ich ihnen dagegen eine knospenreiche Fichte ins Zimmer, so gingen alle mit dem größten Eifer ans Werk, und in unglaublich kurzer Zeit war selbst die kleinste und versteckteste Knospe verzehrt. Beim Fressen auf den schwanken Zweigen benutzen sie fortwährend die Flügel, um sich im Gleichgewicht zu erhalten und den Schnabel ähnlich wie die Kreuzschnäbel. Auch sieht man wie bei jenen und den Seidenschwänzen besonders die alten Männchen auf den Wipfeln, wahrscheinlich als Wächter. So stand ich einst beobachtend vor einem Baume, als ein Männchen von der Spitze desselben herab seinen Warnungsruf ertönen ließ und im Augen-

blick die ganze Gesellschaft in die dichtesten Zweige geschlüpft war. Ich wunderte mich darüber, da sie doch sonst gegen einen Menschen fast garkeine Scheu zeigen; allein das Räthsel löste sich, als einige Augenblicke später ein Sperber dahergestrichen kam, den der Warner also bemerkt hatte. Nahrungsuchend hält sich die Schar durch beständiges Locken zusammen. Nach einer kurzen Mittagsrast fliegen sie noch einmal zu den Ebereschen, dann aber ziemlich früh zu ihren Schlafplätzen. Auf noch unbelaubten Bäumen sah ich sie nie, obgleich z. B. die Birken einen bedeutenden Theil der livländischen Wälder bilden und von den Dompfaffen der Knospen wegen regelmäßig besucht werden, auf Wachholderbüschen nur einmal.

„Von den Bauern, welche in den Wäldern wohnen, werden sie häufig gefangen und zwar vermittelst Brettchen, die mit Schlingen besteckt und mit Ebereschenbeeren geködert, an hohen Stangen angebracht und aufgestellt werden. Mir selbst ist der Fang nicht gelungen, während doch z. B. Dompfaffen ohne weiteres in meine Fallen gingen. Für die Gefangenschaft eignet sich kein Vogel besser als er und die entgegengesetzten Erfahrungen mögen wol daher rühren, daß die Hakengimpel von den Fängern und Händlern eine zu üble Behandlung erdulden müssen, bevor sie in verständige Pflege gelangen. Ich ließ die meinigen im Zimmer frei fliegen und alle ohne Ausnahme waren schon nach einer Woche überaus zahm und nach weiteren acht Tagen kamen sie geflogen, um mir das Futter aus der Hand zu nehmen. Kein einziger ist mir gestorben und ich setzte sie nach jahrelanger Gefangenschaft vollkommen gesund in Freiheit, als ich Livland verließ. Sie erhielten im Winter Hanf und Ebereschenbeeren, dazu recht mannigfaltiges Grünzeug, namentlich aber Knospen von Fichten, Espen u. a. Bäumen. Da ich weder Mehlwürmer noch Ameisenpuppen hatte, so setzte ich ihnen fein gehacktes Fleisch mit Weißbrot vor, doch fraßen sie es nicht. Ein einziger gewöhnte sich an Fleisch und zog dann gepökeltes vor. Im Sommer suchte ich ihnen so viele Kerbthiere als möglich zu verschaffen, brachte ihnen besonders Disteln, welche mit schwarzen Blattläusen bedeckt waren und fütterte sie wochenlang mit den grünen Afterraupen der Stachelbeerwespe. Auch fraßen sie halbtodte Fliegen und Schaben, selbst rothe Schwärmerraupen verzehrten sie nach und nach und versteckten dann wol den Rest. Sie badeten fast mit derselben Leidenschaft wie die Stare, auch fischten sie aus kleineren Aquarien die Libellenlarven heraus und noch mehr die Wasserspinnen; auf letztere lauerten sie förmlich und ergriffen sie mit Sicherheit, sowie sie an die Oberfläche kamen. Ich hielt sie im geheizten Zimmer und die Stubenwärme wurde ihnen durchaus nicht schädlich, während dies doch bei anderen nordischen Vögeln, z. B. den Schneeammern, der Fall ist; ja, im Gegentheil suchten sie die Nähe des Ofens auf, sodaß ich ihnen dort einen Sitz anbringen mußte, um zu verhüten, daß sie sich die Füße auf dem heißen Griff der Ofenthür verbrannten. Mit ihren kräftigen Schnäbeln

richteten sie freilich Unfug genug an, zernagten namentlich Bücher, doch zeigten sie andrerseits wiederum soviel Anmuth, Klugheit, Zahmheit, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie einzusperren. Ein altes Männchen, dem ich den Flügel abgeschossen hatte, und das also zum Fliegen unfähig war, hielt ich vier Jahre hindurch im Bauer und es starb nur, weil ich es beim Wechsel des Wohnorts unverständiger Pflege anvertrauen mußte. Bei diesem Hakengimpel beobachtete ich die merkwürdige Erscheinung, daß sich bei der letzten Mauser wieder ein rother Fleck im Nacken zeigte, der sich zu einem breiten Bande ausdehnte während sich der Scheitel orange färbte. Ich will noch hinzufügen, daß ich in Livland wiederholt die Behauptung aussprechen hörte, man könne durch ausschließliche Fütterung mit Ebereschen die rothe Farbe dauernd erhalten. Ob dieselbe sich auf eine Thatsache stützt, weiß ich freilich nicht. Die oben mitgetheilten Beobachtungen habe ich in einem Zeitraum von sechs Jahren gemacht. Sie weichen von denen Anderer bedeutend ab, und da der Vogel doch beiweitem noch nicht bekannt genug ist, so mögen sie als gewissenhafter Beitrag zu seiner Kenntniß doch einigermaßen von Werth sein."

Bereits vor mehr als 50 Jahren hat der Hofgärtner Klöber zu Karlsruhe in Oberschlesien, ein recht guter Vogelkenner und Züchter, nach Mittheilung des Dr. Gloger an das zoologische Museum zu Breslau Hakengimpeleier gegeben, welche bei ihm in der Gefangenschaft gelegt waren. Dann hat ein Herr Becker nach Brehm's Angaben den Erfolg erzielt, daß ein Pärchen im Flugbauer zweimal, jedoch leider ohne die Jungen aufzubringen, nistete. Das Nest war aus Graswurzeln, Kokusbast und Pferdehaaren erbaut und stand ganz frei ohne jeden Schutz etwa 1 Meter hoch über dem Boden in einer kleinen Fichte zwischen zwei Zweigen. Ein Gelege bestand in drei, das andre in zwei Eiern, doch starb das Weibchen beim dritten. Weitere Züchtungsversuche sind bis jetzt leider nicht bekannt geworden. Herr von Homeyer hat in der „Isis" (1834) berichtet, daß ein gerade in der Mauser befindlicher Hakengimpel, welcher entflogen, dann in einer Dohne erhängt gefunden und mit Sicherheit wiedererkannt worden, die Erscheinung zeigte, daß die in der Freiheit hervorgekommenen Federn von natürlicher hochrother Farbe waren, die in der Gefangenschaft bereits hervorgesproßten jedoch die gelbe Farbe unverändert beibehalten hatten. Einen Beweis für meine Behauptung, daß die rothe Farbe bei allen diesen Vögeln doch im wesentlichen in der Nahrung begründet liege, gibt Herr Professor A. v. Nordmann in der Beobachtung, daß selbst noch nicht vermauserte junge Hakengimpel, welche an der Schnabelwachshaut sicher zu erkennen sind, bereits das schöne rothe Gefieder haben, und wennschon der Vorgang und die Zeit des Ueberganges aus dem grünlichgrauen schwarzgefleckten Nestkleide in ein gelbes und dann rothes noch keineswegs beschrieben worden, dürfte es sich doch wol mit

Bestimmtheit annehmen lassen, daß eine solche ausnahmsweise frühe Färbung lediglich in Ernährungsverhältnissen begründet liegen kann. Die Angabe Marquardt's, daß der Hakengimpel die Maden in den Tannenzapfen fresse, bestätigt übrigens nur eine bereits im Jahre 1864 von F. Schwaitzer gemachte Mittheilung, in welcher derselbe berichtet, daß er bei der Untersuchung im Kopfe eines geschossenen Männchens jene Maden ebenfalls gefunden habe.

Während alle älteren Schriftsteller anführen, daß der Hakengimpel auch im Norden Amerikas vorkomme, behaupten jüngere amerikanische Gelehrte, insbesondre Professor Spencer F. Baird, daß der dortige eine selbständige feststehende Art sei. Diese, der kanadische Hakengimpel, sei etwas größer und zeige einige bestimmte Unterscheidungsmerkmale, auf welche ich weiterhin in der wissenschaftlichen Beschreibung zurückkommen werde. Seine Heimat erstrecke sich über den hohen Norden Amerikas und in strengen Wintern komme er bis in den Süden der Vereinigten Staten herab. Gentry gibt sodann eine Schilderung seines Freilebens, der ich nun folgendes entnehme. In Ostpennsylvanien erscheint er zu Anfang des Monats Dezember und hält sich bei kaltem Wetter in den dichten Nadelholzwäldern auf, welche er jedoch zum Frühjahr hin verläßt, um die Aepfel- und Birnengärten aufzusuchen, wo er durch Zerstörung von Knospen nicht selten argen Schaden anrichtet. Die kleinen Scharen zeigen sich so wenig scheu, daß sie nicht einmal davonfliegen, wenn einer heruntergeschossen wird. In anderen Theilen Nordamerikas sieht man ihn besonders in Pappel- und Weidenhainen zahlreich. Das Nest, welches nur in hochnordischen Gegenden gefunden wird, entdeckte Mr. Boardmann in einem Erlenbusch nahezu mannshoch vom Boden; es war durchgängig nur aus grobem grünen Moose hergestellt und enthielt zwei Eier. Näheres ist von den amerikanischen Schriftstellern leider nicht mitgetheilt.

Als das Berliner Aquarium unter dem ersten und dann auch unter dem zweiten Direktor inhinsicht der Vogelwelt noch in vollem Glanze dastand, brachte der Händler Stader aus Moskau fast regelmäßig alljährlich eine beträchtliche Anzahl von Hakengimpeln in den Handel; nachdem der Genannte von Deutschland fern geblieben, gelangte höchstens dann und wann einmal ein Exemplar durch den alten Brune zu uns. Vor einigen Jahren aber kaufte ich ein einzelnes Männchen von Bewig unter den Königskolonaden in Berlin. Seitdem waren sie wol völlig vom Markt verschwunden. Im Dezember 1877 führte sodann der Händler Gleitzmann aus Moskau eine überaus große Anzahl nordischer Vögel aus Rußland durch Berlin, um sie in London zu verkaufen, und in derselben befanden sich etwa 140 Köpfe Hakengimpel, unter ihnen nur dreißig Männchen im prachtvoll rothen Kleide; alle übrigen waren jüngere Männchen und Weibchen. Kurz nachher erschienen die Hakengimpel auch in Deutschland ziemlich zahlreich im Handel, und zwar hauptsächlich durch Herrn Sanitätsrath Dr. Grun in

Braunsberg (Oſtpreußen), durch die Händler Fürſtenberg ebendort und Bartſch in Berlin. Den meiſten Liebhabern iſt es jedoch diesmal leider gerade ſo wie früher ergangen, indem die Vögel nur zu bald ſtarben. Für ihre Verpflegung, bzl. Erhaltung, dürfte daher der Hinweis des Herrn Marquardt auf die Haupt- und Lieblingsnahrung, Nadelholzſchößlinge, wol zu beachten ſein.

Der Preis iſt überaus ſchwankend. Gleitzmann wollte das Pärchen nicht unter 24 bis 30 Mark abgeben; Fürſtenberg bot ſie dann, das prächtig rothe Männchen für 9 Mark, das orangefarbene Männchen für 5 Mark und das Weibchen für 1 Mark aus.

Der Hakengimpel heißt auch Hakenfink, Hakenkernbeißer und fälſchlich Hakenkreuzſchnabel und größter Kreuzſchnabel, Hartſchnabel, Fichtengimpel und Fichtenhacker, Kernfreſſer, Krappenfreſſer, finniſcher Papagei (in Livland), Pariſer Papagei, ſchwediſcher Papagei (Linné) und Parisvogel.

Bouvreuil pin; Pine Finch. — Tallbit und Nachtwach in Schweden (Bff.); Tallbitarna (ebendort nach Meves); Nattvaka (d. h. Nachtwächter) in Norland (nach Albrecht).

Nomenclatur: Loxia enucleator, *L.*, *Gml.*; L. flamengo, *Sprrm.*, *Gml.*; L. psittácea, *Pll.* [nec *Lth.*]; Fringilla enucleator, *Meyer*, *Rss.* [„Hndbch.“]; Strobilóphaga enucleator, *Vll.*; Corythus enucleator, *Cv.*, *Bp.*, *Bp.* et *Schlg.*, *Gld.*; Pinícola enucleator, *Cb.*, *Br.* — Coccothraustes canadensis, *Brss.*; Loxia enucleator, *Frstr.*, *Wls.*; Pyrrhula enucleator, *Audb.*; Córythus enucleator, *Bp.*, *Audb.*; Pinicola canadensis, *Cb.*, *Brd.*; P. americana, *Cb.*; [P. enucleator, *Cb.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Lebhaft und prächtig roth; Kopf und Hals faſt karmoiſinroth; Rücken und Mantel dunkler roth, aſchgrau durchſchimmernd, indem jede Feder nur breit roth gerandet iſt; Schwingen ſchwärzlichgrau mit feinen röthlichen Außenſäumen und hellgrauen Innenſäumen; Flügel aſchgrau mit zwei breiten weißlichen, roſenroth ſchimmernden Binden; Bürzel reiner und heller roth; Schwanzfedern ſchwärzlichgrau mit feinem fahlen Außenſaum, ſchwach grünlich überhaucht; ganze Unterſeite himbeerroth, von weitem wie heller geſchuppt erſcheinend; Hinterleib und untere Schwanzſeite aſchgrau, die unteren Schwanzdecken fahl geſäumt. Schnabel ſchwärzlichgrau, Unterſchnabel am Grunde heller; Auge braun; Füße ſchwarzbraun. — Das Weibchen iſt an Kopf und Hals grünlichgelbgrau, Zügel und Kehle heller gelblich; Rücken grau, jede Feder fahl gelb gerandet; Schwingen und Schwanzfedern ſchwärzlichgrau, jede Feder fahl außengerandet und gekantet; über dem Flügel zwei weißliche Binden; Bruſt gelblichgrau, Bauch reiner grau. Schnabel fahler horngrau; Auge braun; Füße ſchwärzlichgrau. — Die jungen Männchen erſcheinen im Uebergangskleide graugelb, mehr oder weniger dunkel mit bräunlichem Ton und dürften in der Regel erſt im dritten Jahre das volle ſchöne Roth erhalten. — Beim Vergleichen eines amerikaniſchen Hakengimpels mit einem europäiſchen in der Sammlung der Akademie von Philadelphia fand Baird folgende Unterſchiede: Die Größe des erſtern iſt, wie bereits S. 500 erwähnt, bedeutender; das Roth iſt etwas verſchieden, der Flügel zeige mehr Weiß in ziemlich breiten und ſcharf abgegrenzten, reinweißen Außenrändern der großen Flügeldecken, die beiden Binden über dem Flügel ſind alſo breiter, reiner; der Schnabel iſt tief dunkelbraun und die Füße ſind ſchwarz.

Pyrrhula enucleator: laetissime rubra, capite colloque subkermesinis; dorso et interscapilio obscurius rubris ac plumae cujusque tantum late rubromarginatae causa lumen offerentibus cinereum; remigibus subnigro-cinereis, exterius subtiliter rubente. interius incano-marginatis; fasciis duabus trans alam cineraceam latis albidis, rubro-micantibus; uropygio dilutius rubro; rectricibus nigricante cinereis, exterius livide limbatis, virente afflatis; gastraeo toto kermesino, dilutius squamulato; crisso latereque caudae inferiore cinereis; subcaudalibus livide limbatis; rostro nigricante cinereo, basi mandibulae dilutiore; iride fusca; pedibus nigro-fuscis. —

♀ capite colloque virente gilvis; loris gulaque nigricante cinereis; plumis dorsi cinerei livide flavido-marginatis; remigibus rectricibusque e nigro cinereis, livide exterius marginatis et terminatis; fasciis duabus trans alam albidis.

Länge 23,5 cm.; Flügelbreite 34 cm.; Schwanz 8,5 cm.; (Flügel 10,7 bis 11 cm. nach Albr.).

Juvenis: maris junioris vestimentum transitorium gilvum, plus minus fuscatum.

Beſchreibung des Eies: länglich-eiförmig, ſchiefergrau mit grünlichem Schein, mit dichten braunen Flecken beſpritzt und namentlich am dickeren Ende ſchwärzlichbraun und dunkelpurpurröthlich gefleckt (Wolley). — Grundfarbe lebhaft bläulichgrün, am ſtumpfen Ende verwaſchen rothbraun gewölkt und hier auch mit einzelnen kaſtanienbraunen Flecken; den Eiern des gemeinen Gimpels ähnlich, doch ſo groß wie die des Kernbeißers (Päßler).

Ovum: oblongo-ovatum, schistaceum, subviride micans, maculis dense conspersum fuscis, in basi praesertim obsitum subnigro-fuscis et purpureis *(Wolley)*. — Ovum laete subaeruginosum basi elute rufo-nubilata necnon castaneo-submaculata *(Pässler)*.

Die **fremdländiſchen eigentlichen Gimpel**, welche dem europäiſchen Gimpel oder Dompfaff in der Geſtalt, Färbung und im ganzen Weſen mehr oder minder gleichen, haben für die Liebhaberei bisher erſt geringe Bedeutung und zwar einerſeits, weil ſie entweder noch garnicht oder doch nur ſelten lebend in den Handel gelangt und andrerſeits, weil manche von ihnen als Arten noch keineswegs ſicher feſtgeſtellt ſind. Da einige aber ebenſowol von den ruſſiſchen Händlern, als auch von Oſtindien aus über London oder Hamburg wenigſtens einzeln eingeführt werden, ſo will ich ſie ſämmtlich kurz aufführen.

Der rothköpfige Gimpel [Pyrrhula erythrocéphala, *Vgrs.*] iſt eine unbeſtritten feſtſtehende Art, deren Heimat das Gebiet des Himalaya und die als Strichvogel in Indien vorkommt. Er unterſcheidet ſich von dem europäiſchen Verwandten ſchon von vornherein dadurch, daß er an Kopf und Halsſeiten dunkelroth iſt, mit einem ſchmalen ſchwarzen Bande um den Schnabel; Nacken und Schultern düſter röthlichgrau; Schwingen und kleine Flügeldecken ſchwarz, große Flügeldecken aſchgrau, über den Flügel eine weiße Querbinde; Bürzel, ſowie Ober- und Unterſchwanzdecken weiß; Schwanz ſchwarz; Kehle, Bruſt und Oberbauch hell zinnoberroth mit orangegelbem Schein; Unterbauch und Hinterleib fahl bräunlichgrau; Schnabel ſchwarz; Auge braun; Füße fahl röthlichbraun. Das Weibchen iſt an Kopf und Hals fahl grünlichgelbgrau; oberhalb dunkel bräunlichgrau mit einer weißen Querbinde über den Flügel; Schwanz ſchwärzlichgrau; ganze Unterſeite hell bräunlichgrau. In der Lebensweiſe und in jeder andern Hinſicht dürfte er mit unſerm europäiſchen Dompfaff übereinſtimmen, und ich bitte daher, die Schilderung deſſelben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (Einheimiſche Vögel) nachzuleſen. — Rothkopfgimpel (Bp.) — [Red-headed Bullfinch, *Hrsf.* et *Mr.*].

Nach Prof. Cabanis kennt man bis jetzt neun Gimpelarten, welche von Triſtram in folgender Weiſe neben einander geſtellt ſind. Die Gimpel aus nördlichen Gegenden haben ſämmtlich den ſchwarzen Kopf und die vier zuerſt folgenden Arten zeigen auch einen weißen Bürzel; von ihnen ſind zwei größer und zwar:

Der kochenillerothe Gimpel [Pyrrhula coccínea, *Selys.*] in Europa heimiſch, und

Caſſin's Gimpel [Pyrrhula Cassini, *Brd.*] aus Nordamerika.

Drei Arten ſind kleiner, und zwar außer unſerm gemeinen Dompfaff:

Der graubäuchige Gimpel [Pyrrhula griseiventris, *Lfrs.*; P. orientalis, *Tmm.*] aus Japan, und

Der mäuſegraue Gimpel [Pyrrhula murína, *Gdm.*] von den Azoren; dieſer letztre hat keinen weißen Bürzel.

Die Gimpel aus dem Himalaya unterſcheiden ſich in folgender Weiſe. Keiner hat den ſchwarzen Kopf. Der bereits oben beſchriebene rothköpfige Gimpel zeigt, wie der Name ergibt, einen rothen und ſein Weibchen einen gelben Kopf.

Der pomeranzengelbe Gimpel [Pyrrhula aurantiaca, *Gld.*] von Kaſchmir iſt an Kopf und Rücken orangefarben;

Der rothschwänzige Gimpel [Pyrrhula erithacus, *Blth.*] von Sikhim ist an Kopf und Rücken aschfarben mit lebhaft rother Brust und nicht schwarzem, sondern rothem Schwanz;

Der Nepal-Gimpel [Pyrrhula nipalensis, *Hdgs.*] vom östlichen Himalaya ist an Kopf und Rücken aschfarben mit heller aschgrauer Unterseite.

Nachdem sodann mit ziemlicher Sicherheit festgestellt worden, daß Cassin's Gimpel als eine bestimmte Art fortfällt und sich als Weibchen des kochenillerothen Gimpels erweist, welches sich aus dem Norden Ostsibiriens nach den vormals russisch-amerikanischen Besitzungen verflogen hat, tritt an dessen Stelle:

Der aschgraue Gimpel [Pyrrhula cinerácea, *Cb.*] aus Ostsibirien, mit schwarzem Oberkopf, hellaschgrauem Mantel, ohne röthliche Färbung der Brust, weißem Bürzel und hellaschgrauem Unterleib. Das Weibchen ist mehr reingrau, am Unterleib blaßgrau, Unterbauch und Unterschwanzdecken weiß.

Die Akten inbetreff der gelehrten Untersuchungen sind noch keineswegs geschlossen, und ob diese oder jene Art mit einer andern zusammenfällt oder noch neue hinzutreten, das muß den Forschungen der Zukunft vorbehalten bleiben. Für die Liebhaberei dürfte es ausreichend sein, daß wir diese fremdländischen Gimpel im allgemeinen kennen und wissen, durch welche Hauptmerkmale sie sich von einander unterscheiden. Im übrigen verweise ich hinsichts ihrer Haltung und Verpflegung auf das in der Einleitung gesagte.

Der sibirische langschwänzige Gimpel [Pyrrhula sibirica], welcher auch in Japan vorkommen und sich laut Temminck sogar schon bis nach Europa verflogen haben soll, ist rosenroth, silbergrau schillernd; Stirn hochroth, Oberkopf mehr silbergrau, Nacken röthlichdunkelbraun, grau scheinend; Flügel braun, jede Feder weiß oder röthlichweiß gesäumt, zwei breite röthlichweiße Binden über den Flügel; Schwanzfedern braun, roth außengerandet, die äußersten weiß; Bürzel rosenroth; Kehle silbergrau, Brust und Bauch weißlichkarminroth; Schnabel horngrau; Füße gelblichgrau. Zur Nistzeit soll das ganze Gefieder prächtig rosenroth sich färben. Das Weibchen ist weißlichgrau mit den rosenrothen Abzeichen des Männchens, doch matter. Bachstelzengröße. Bis jetzt ist dieser schöne Gimpel noch nicht lebend eingeführt, da er jedoch nach Radde in Sibirien gefangen und im Käfige gehalten werden soll, so dürfen wir wol erwarten, daß die russischen Händler auch ihn bald einmal zu uns bringen, zumal gegenwärtig der Vogelhandel nach Rußland hinein und von dort her zu uns überaus lebhaft sich entwickelt. In der Lebensweise dürfte er den übrigen ausführlich geschilderten, namentlich aber dem Karmingimpel gleichen, doch soll er sich vorzugsweise in sumpfigen Gegenden aufhalten. Seine Brut hat man im Juni und Juli beobachtet. Das Nest steht auf Zwergbirken, seltener Weiden oder Lärchen, etwa 1,50 bis 2 Meter hoch, dicht am Stamm; es ist sehr künstlich aus Fasern und Stengeln erbaut, dickwandig, gewöhnlich kegelförmig, seltener halbkugelig, mit zarten Grashalmen und Thierhaaren, manchmal auch mit Federn ausgefüttert, doch nicht um die Aeste geflochten. Das Gelege besteht in drei bis fünf blaugrünlichen, namentlich am dickern Ende schwärzlich gefleckten und kurz gestreiften Eiern. Dr. Dybowski fand den Vogel in Ostsibirien, winters auf den nach Süden gelegenen Bergabhängen, sommers in den Thälern und namentlich in den Gebüschen und Hainen an Fluß- und Bachufern, sowie an den Rändern der Steppenquellen. Sehr scheu, verläßt er die Eier leicht und nimmt auch niemals ein Kukuksei an, sondern zerstört lieber das Nest. Der Gesang ist leise, doch angenehm. Die Reisenden Severzow, Dybowski, Parrez, Przewalski, Radde u. A. haben ihn in Daurien, Turkestan und in der Mongolei gesehen. — Meisengimpel (Br.). — Loxia sibirica et Pyrrhula caudata, *Pll.*; Pyrrhula longicauda, *Tmm.*; Urágus sibiricus et Pyrrhula sibirica, *K.* et *Bl.*, *Schlg.*, *Bp.*

Der blutrothe langschwänzige Gimpel [Pyrrhula sanguinolenta, *Tmm.* et *Schlg.*] wird, obwol dem vorigen sehr verwandt, doch als eine besondre Art erachtet und kommt außer in Japan auch auf dem ostasiatischen Festlande vor. Bevor näheres über ihn bekannt ist, muß ich es bei dieser Erwähnung bewenden lassen, zumal der überaus seltene Vogel bisher keine Aussicht zeigt, lebend eingeführt zu werden.

Der Wüstengimpel [Pyrrhula githaginea].

Es gewährt besondere Freude, das Leben eines Vogels darzustellen, welcher nicht allein den Liebhabern vorzugsweise anmuthig und lieblich erscheint, sondern auch in seinem Freileben bereits eingehend erforscht und geschildert ist. Ein solcher, der sog. Wüstentrompeter, tritt uns jetzt entgegen, und wir würden ihn als einen der liebenswürdigsten und werthvollsten Stubenvögel zugleich bezeichnen müssen, wenn nicht ein Uebelstand gar schwer ins Gewicht fiele, nämlich der, daß er leider nur höchst selten in den Handel gelangt.

Sein ganzes Gefieder ist rosenroth, mehr oder minder grau gemischt; Oberkopf aschgrau, Mantel graubraun, Flügel und Schwanz bräunlichgrau, alles rosenroth überhaucht; unterhalb lebhaft rosenroth. Das Weibchen ist bedeutend mehr braungrau, doch ebenfalls stark rosenroth überhaucht. „Es ist ein lebhaftes und schönes Vögelchen, ein wenig stärker als der Kanarienvogel, dem das etwas dicke Köpfchen mit dem papageienartig gewölbten Scharlachschnabel, da dasselbe von einem keineswegs kurzen und sehr beweglichen Halse getragen wird, nichts von der Zierlichkeit seiner Formen raubt. Der etwas gedrungene Körper, welcher meistens eine mehr aufrechte als wagerechte Stellung zeigt, ruht auf blaßrothen Beinen, die nebst Füßen und Nägeln von bemerkenswerther Zartheit für einen Vogel sind, der sich fast beständig auf dem harten Erdboden bewegt. Die weit geöffneten Augen heben sich vermittelst eines Kranzes weißlicher Federchen vortheilhaft von dem Grundton des Gefieders ab."

Seine Verbreitung erstreckt sich über alle Gegenden Nordost-Afrikas, in denen die Wüste bis an das Stromthal herantritt und über diese selbst, also Oberegypten und Nubien, die Sahara, nicht minder aber auch das steinige Arabien, über die Kanarischen Inseln und ebenso Westasien. „Als die Länder Südeuropas, in denen er vorkommt, sind die französische Provence, Toskana und der griechische Archipel bekannt, am häufigsten ist er an einem der im äußersten Süden unseres Welttheils liegenden Punkte, der Insel Malta, wo er in jedem Winter einkehrt und vom Dezember bis März verweilt. Die eigentliche Heimat ist aber immer nur die Wüste."

Die älteren Schriftsteller haben ihn kaum gekannt, wenigstens nur kurze Bemerkungen über ihn veröffentlicht. Seine Abbildung gaben Temminck, Roux, Prinz Bonaparte und dann Gould. „Die Ornithologie kennt unsern Vogel erst seit dem Feldzuge der Franzosen gegen Egypten. Obwol am Nil und in Palästina Zeuge sehr alter Civilisationen und Europa so nahe wohnend, war er doch bis dahin der Wissenschaft fremd geblieben. Kein naturgeschichtlicher Schriftsteller erwähnt seiner vor der Erforschung Egyptens, die mit dem Degen in der Faust geschah. Seine Geschlechter hatten auf den Sphinxen der Pharaonen ge-

ruht, in der Cyrenaika griechische Kultur erblühen und fallen gesehen. Sie waren um die Tempelpforten des Jupiter Ammon und um die Zellen der Einsiedler in der Thebais geschlüpft; was kümmerte den Menschen der kleine Vogel, was kümmerte er die erst so spät neugierig gewordene, noch junge Wissenschaft! Sie erfuhr erst im Beginn unsres Jahrhunderts, daß die Wüsten Afrikas einen rosenfarbenen Gimpel haben."

Obwol ich im Hinblick darauf, daß in diesem, seinem Abschlusse nahenden ersten Bande meines Werks noch eine beträchtliche Anzahl der Finkenvögel behandelt werden müssen, zu größtmöglichster Raumersparniß gezwungen bin, so kann ich es mir doch nicht versagen, die herrliche Schilderung, welche Dr. Karl Bolle gegeben und aus der bereits das Obige entlehnt ist, wenigstens im Auszuge hier noch weiter mitzutheilen:

„Baumlos und von der heißen Sonne der Küstengegend beschienen muß das Wohngebiet sein, welches der Wüstengimpel liebt, und hier gibt er den dürrsten und steinigsten Orten den Vorzug; hier lebt er, mehr Geröll- als Felsenvogel stets gesellig, außer der Brutzeit, familienweise oder in kleinen Trupps. Gar bald würden wir seine Spur zwischen den seinem Gefieder so unmerkbar gleichgefärbten Steinen verlieren, wenn nicht seine Stimme, eine der größten Merkwürdigkeiten des Vogels, uns als Wegweiser diente. Horch! ein Ton, wie der einer kleinen Trompete zittert durch die Luft: gedehnt, vibrirend, und wenn unser Ohr ein feines ist und wir gut gehört, werden wir diesem seltsamen Klange vorhergehend, oder unmittelbar nach ihm, einige leise, silberhelle Noten vernommen haben, die wie die kaum hörbaren Akkorde einer von unsichtbaren Händen gerührten Harmonika glockenrein durch die stille Wüste hinklangen. Oder es sind sonderbar tiefe, dem Gequak des kanarischen Frosches nicht unähnliche, nur weniger rauhe, hastig wiederholte Silben, die der Vogel selbst mit fast gleichen, aber schwächeren Lauten, bauchrednerisch, als kämen sie aus weiter Ferne, beantwortet. Ist es schon mißlich, Vogeltöne überhaupt durch Buchstaben wiederzugeben, so dürfte es bei diesen um so schwieriger sein. Es sind eben Stimmen, die man vernommen haben muß, um sich von ihnen eine richtige Vorstellung zu machen. Niemand wird einen wirklichen Gesang von einem Vogel so beschaffener Gegenden erwarten. Die erwähnten, abenteuerlichen Klänge, denen er oft noch eine Reihe krähender und schnurrender anhängt, vertreten bei ihm die Stelle eines solchen. Sie passen in ihrer Seltsamkeit so vollkommen zu der gleichfalls ungewöhnlichen Umgebung, daß man ihnen stets freudig lauscht und auf sie horcht, sobald sie schweigen. Diese Trompetenstößchen sind wie eine der melancholischen Stimmen der Wüste selbst oder als ob die Djinns der Einöde redeten, „Vox clamantis in deserto". Während er steiles, felsiges Gebirg nicht gerade aufzusuchen scheint, liebt er besonders das Malpais, jene öden schwarzen Lavaströme voll gletscherartig klaffender

Riſſe und Schlünde, auf denen kaum ein Hälmchen grünt, die ihn aber in ihren Höhlungen ſichere Schlupfwinkel bieten. Nie ſieht man ihn gleich dem Steinſperlinge ſich auf einen Baum oder Strauch niederlaſſen. In bewohnteren Gegenden ziemlich ſcheu, zeigt er ſich in dem Schweigen und der Einſamkeit der Wüſte recht zutraulich, namentlich die Jungen. Die Nahrung beſteht ganz oder faſt allein in Pflanzenſtoffen, insbeſondre in Gräſerſämereien, die man im Magen der erlegten als mehlartigen Brei vorfindet. Auch iſt er begierig nach den ölhaltigen Körnchen der Vereins- und Kreuzblütler und mag wol junge Blätter ebenfalls verzehren, da er ſich ſolche in der Gefangenſchaft gutſchmecken läßt. Obgleich er als Bewohner ſehr trockener Gegenden lange durſten kann, ſo vermag er doch nicht, Waſſer auf die Dauer zu entbehren. Wie ſpärlich, trüb und lau auch die Quelle rinnt oder der Teich fault, ſie müſſen durch einen, wenn auch meilenweiten Flug täglich einmal wenigſtens erreichbar ſein. Dieſe Finken ſind daher auf die Nachbarſchaft der Oaſen angewieſen und ihr Erſcheinen iſt für durſtgequälte Karawanen ein günſtiges Vorzeichen. Ich ſelbſt ſah ſie auf den Kanaren meiſt morgens und abends zur Tränke fliegen. Sie trinken viel auf einmal, in langen Zügen, zwiſchen welchen ſie den Kopf erheben, baden ſich auch wol nachher im ſeichten Waſſer, wenn es vom Schlamm nicht allzuſehr verunreinigt iſt. Nie habe ich bemerkt, daß ſie wie die Sperlinge im Sande ſich wälzen und ſtäuben. Die Brutzeit beginnt im März. Der Gewohnheit der meiſten Wüſtenvögel treu, wird das Neſt ſo verſteckt angebracht und mit ſo ungemein großer Vorſicht verhehlt, daß man es ſelten auffindet. Mir iſt es nie gelungen, eines zu entdecken, ſoviel ich mich auch danach umgeſchaut; doch weiß ich von Augenzeugen, namentlich der Ziegenhirten Fuertaventuras, daß ſie, wo Malpais vorhanden, am liebſten in deſſen Schründen niſten, ſonſt aber ihr Neſt auf der Erde unter große, überhängende Zweige bauen. An ſolch' einer Stelle hatte es der Mayordomo von Arguineguin, wie er mir erzählte, als Knabe bei Jinamar auf Kanaria gefunden. Auch ſteht es bisweilen in den Zwiſchenräumen der Feldſteine, aus denen die die trockenen Aecker umgebenden Mauern roh aufgethürmt ſind und in Felsſpalten mit weitem Eingange. Es hat einen ziemlich tiefen Napf und iſt kunſtlos aus dem groben Stroh der Wüſtengräſer geflochten, innen mit größeren Federn, meiſtens denen des Gangahuhns, auch wol mit einigen Flocken von Kamelwolle oder Ziegenhar leicht gepolſtert. Das Gelege bilden 3 bis 5 Eier. Wie viele Bruten alljährlich gemacht werden, vermag ich nicht mit Sicherheit anzugeben. Weniger als zwei möchten es indeß nicht leicht ſein, da ich noch im Juli die Alten parweiſe traf, auch der Vogel an für ihn geeigneten Orten häufig genug iſt. Die flüggegewordenen Jungen ſtreichen in Trupps umher, denen ſich nach der Niſtzeit auch die Eltern, deren Mauſer in der zweiten Hälfte des Juli anfängt, zugeſellen und ſie ſo zahlreicher machen. Im Herbſt und Winter werden dieſe Scharen durch

viele aus Afrika herüberkommende verstärkt, denen es ein leichtes ist, den Meeresarm zwischen den Inseln und der Küste zu überfliegen. Man hat schon ermüdete Wüstenfinken an Bord der Fahrzeuge, mit denen die Isleñosischer auf jener von größeren Schiffen gemiedenen See kreuzen, sich niederlassen sehen. Diese seine Reisen erklären auch, indem sie ihn uns zugleich als Reisevogel vorführen, sein alljährliches Erscheinen auf Malta."

Bevor ich die Bolle'schen Darstellung fortsetze, muß ich zunächst die Angaben anderer Reisenden über das Freileben anfügen. A. Leith Adams fand ihn in Egypten häufig: „Man hört den hellen klingenden Ruf längs der Grenzen der felsigen, die Wüste begrenzenden und der daranstoßenden beackerten Gebiete. Hier schützt ihn seine Färbung einigermaßen gegen Feinde. Er nistet neben dem Haussperlinge in alten thebaischen Gräbern. In Nubien sieht man nicht selten, daß ein Sperber mit einem Wüstentrompeter in den Klauen um die Felsklippen streicht, verfolgt von den hellen und klangvollen Klagetönen des ganzen Schwarms. Im Januar nähern sich die Männchen den Weibchen und beginnen ihre Liebesspiele; jene leisten lange Widerstand und erst zu Ende des Monats findet die Parung statt; wie bei anderen Vögeln, so zeigen sich auch bei ihnen die kräftigsten und am üppigsten gefiederten Männchen am begehrlichsten." Nach Dr. Robert Hartmann's Angaben schädigt er mit dem Weidensperlinge gemeinschaftlich in großen Scharen in Nordost-Afrika nicht selten arg die Weizensaten, und läßt sich weder durch Schleudern, noch Scheuchen oder Geschrei gehörig vertreiben. Dies bestätigt auch Chalihl-Effendi, dessen Heimatsangabe ich oben benutzt habe, indem er noch folgendes hinzufügt: „In Nord- und Mittelnubien und in Egypten lebt er in großen Flügen, oft wol von 80 Köpfen, fällt wie andere Finken auf den Feldern ein und streicht auf ihnen zwischen dem Strome und Gebirge umher. Je wilder und zerklüfteter das letztre, umso sicherer ist er zu finden. Man verfolgt ihn nicht und er zeigt sich daher sehr zutraulich, hält sich aber fern von anderen Vögeln, selbst an den Brunnen der Wüste, wo er in jeder Oase vorkommen dürfte. Am Brunnen der Bajuda war er der häufigste Vogel, und sogar zahlreicher als die Wüstenlerchen und Wüstenammern. Nach den Grenzen der Wüste hin scheint er seltener zu sein; in Mittel- und Unteregypten habe ich ihn niemals gesehen." Heuglin beobachtete ihn längs des Nil zwischen dem 27. und 23. Grad nördlicher Breite und ebenso im peträischen Arabien; er meint, daß die Brutzeit wol schon in den März, sicher aber in den April und Anfang Mai falle. „Im Juni scharen sie sich in kleine Flüge zusammen, welche auf Brachäckern, an Wegen, in Steinbrüchen und Klüften, auf Ruinen und Felseninseln und am Rande der Wüste sich flüchtig umhertreiben und meistens von Gräsersämereien sich ernähren. Sie scheinen im Spätherbst zu streichen, ohne eigentlich zu wandern. Gewöhnlich sind sie garnicht scheu und

bilden immerhin eine liebliche Erscheinung auf den glühenden kahlen Felsen oder in der ausgebrannten pflanzenlosen Wüste. Der Lockton ist ein hölzernes ter, ter, der Gesang ist unbedeutend, oft schwätzend oder mehr zirpend, aber immer mischen sich Laute hinein, die mit denen eines Kindertrompetchens zu vergleichen sind."

Der zuerst genannte Forscher fährt sodann folgendermaßen fort: „Lange hat es gedauert, ehe es mir gelang, lebende Wüstentrompeter zu erhalten, und erst nach vier Jahren, nachdem in Fuertaventura alle meine Bemühungen vergeblich gewesen, war ich glücklich genug, in Kanaria diesen sehnlichen Wunsch erfüllt zu sehen. Nun erfuhr ich auch, wie man sie fängt, und zwar bedarf man dazu eines Garnes und eines Lockvogels (Reklamo) derselben Art. Letztern fesselt man möglichst fern von Busch und Baum in einem wüsten Thalgrunde u. a. Orten, wo man weiß, daß die Art umherstreicht, zu ebener Erde an. Auf seine unaufhörlich ausgestoßenen Lockrufe erscheinen bald die Kameraden, hüpfen wie tanzend von Stein zu Stein und picken von dem um den Lockvogel herum ausgestreuten Futter. Da klappt das Netz über ihnen zusammen — und sie sind gefangen. Anfangs trotzig und wild, nehmen sie doch bald den gebotnen Kanariensamen. Da ich ihrer zehn mit nach Deutschland gebracht habe und deren noch mehrere besitze, so bin ich im Stande, über sie als Stubenvögel zu berichten. Sie sind hart und ausdauernd und vermögen, obwol sie im Winter die Nähe des Ofens aufsuchen, doch eine ziemlich niedrige Temperatur zu ertragen. Ich verlor während der Seereise, der andere Vögel so leicht unterliegen, keinen einzigen von ihnen. Man kann sie in Deutschland recht gut vom April bis zum Oktober im Freien lassen, nur ist es selbstredend, daß sie gegen wirklichen scharfen Frost verwahrt werden müssen. Ueberaus angenehm werden sie im Zimmer dadurch, daß sie abends bei Licht stets munter und fast noch lebhafter als am Tage sind. Kaum wird die Lampe angezündet, so erschallen ihre Trompetentöne, ohne daß sie durch Flattern, wie viele Kerbthierfresser, zu später Stunde lästig würden. Sie führen dann belustigende Konzerte auf; bald sind es schöne und helle, aber kurze Trompetenklänge, bald ist es jener langgedehnte dröhnende Ton, welcher die Hauptnote ihres Gesangs bildet. An den letztern reihen sich oft ein Schnurren oder verschieden betonte Laute, welche fast wie das Miauen einer Katze sich anhören; oder sie beginnen mit leisen und reinen Tönen, dem Läuten eines Silberglöckchens ähnlich und dann folgt ein ganz entgegengesetztes, fast ammerartiges Geschrei. Auf den quakenden Ton käk, käk, käk, welchen sie häufig wiederholen, antwortet regelmäßig ein viel tieferer, leise und kurz ausgestoßener. Durch alle diese, bald rauhen und fast krächzenden, bald flötend klingenden, immer jedoch höchst ausdrucksvoll vorgetragenen Laute gibt der Vogel seine verschiedenen Empfindungen zu erkennen. Selten hört man ein zwar unzusammenhängendes, doch länger währendes Geplauder, dem kleiner Papageien ähnlich. Alle jene Töne aber, fast

ohne Ausnahme, sind so absonderlich sprechend und wohlklingend, daß man wol darüber erstaunt, sie von einem so kleinen Vogel zu vernehmen. Vielleicht wäre seine Stimme durch Erziehung einer ähnlichen Vervollkommnung fähig, wie wir solche an unserm Dompfaff bewundern. Er zeigt ein keckes, anmuthiges Wesen, Zahmheit gegen Menschen und Verträglichkeit gegen seinesgleichen und andere Vögel. Die sonderbaren, stark betonten Trompetenrufe der Männchen — nur diese lassen solche hören — erschallen auch im Spätherbst und Winter, indem sie mit denselben einander fortwährend locken. Am lautesten trompeten sie im Frühlinge. Dabei legen sie den Kopf hinten über in den Nacken und richten den weitgeöffneten Schnabel gerade hoch; die leiseren Töne bringen sie mit geschlossenem Schnabel hervor. Zur Parungszeit namentlich, aber auch beim Singen überhaupt, machen sie komische Bewegungen, tanzen förmlich um einander und verfolgen sich gegenseitig hitzig, wenn sie erregt sind. Ueber den Erdboden huschen und hüpfen sie mit großer Schnelligkeit, ducken und verbergen sich, kriechen aber nie in Höhlungen mit engem Eingang. In den Sonnenstralen strecken sie sich behaglich mit gesträubtem Gefieder aus, reizende Gruppen bildend. Sie baden nicht oft; zur Mauserzeit bedürfen sie vorzüglich sorgsamer Pflege, da sie ohne solche leicht kränkeln und erliegen.

„Auch im Käfige halten sie sich ihrer Lebensweise gemäß am liebsten am Boden auf, lernen jedoch, sich auf Sprossen und Stangen zu setzen. — Im April d. J. 1858 brachte ich ein Pärchen in eine zum Gebauer eingerichtete Kammer, deren vergittertes Fenster den Stralen der Mittagssonne zugänglich war. Bald hatte ich die Freude, zu sehen, daß sie alle der Parung vorangehenden Spiele durchmachten. Sie trieben einander mit hoch aufgerichteter Haube, schnäbelten und fütterten sich aus dem Kropfe, zwar nicht oft, aber um so leidenschaftlicher stets in höchster Erregung mit gesträubten Scheitelfedern und herabhängenden, wie krampfhaft zuckenden Flügeln. Als Nistort wählten sie ein hoch an der Decke hängendes Harzerbauerchen und bauten das Nest fast nur aus Stroh, innen mit Federn ausgelegt. Beim Eintragen nahmen sie nicht wie andere Vögel nur einen Halm, sondern deren so viele in den Schnabel, als dieser zu fassen vermochte. Der schlichte einfache Bau ging nur langsam vonstatten und wurde fast ausschließlich vom Weibchen ausgeführt, obwol auch das Männchen etwas eintrug. Niemals verweilten beide längere Zeit zusammen im Nest; wenn der eine hinzukam, so schlüpfte der andre sogleich hinaus. Am Morgen des 24. April fand ich das erste Ei im Neste und an jedem folgenden Tage ward ein solches hinzugelegt, bis ihre Zahl vier betrug. Das Weibchen hatte bis dahin zwar noch nicht fest gesessen, würde jedoch wahrscheinlich gebrütet haben, wenn ich mich nicht entschlossen hätte, die Hälfte dieses ersten Geleges auf dem Altar der Eierkunde zu opfern. Die übrig gebliebenen beiden Eier legte ich einem

Kanarienweibchen unter, welches sich als vortreffliche Brüterin bewährt hatte und nach Brutdauer von 14 Tagen auch ein Junges ausbrachte. Dies sah garnicht so häßlich aus, wie sonst wol junge Singvögel, sondern ganz niedlich. An den nackten Theilen, namentlich am Halse, war es fleischfarben, sonst ziemlich dicht mit zartem schneeweißen wol 8 mm. langen Flaum bedeckt, welcher am Oberkopf gleichsam ein langes Häubchen bildete. Trotz der guten Pflege seitens des Kanarienweibchens starb es kaum eine Woche alt, vielleicht an überreichlicher Atzung, da es das einzige Junge im Neste war. Bald darauf begannen die Trompeterchen eine zweite Brut; vom 3. bis 5. Mai bezogen sie ein neues Nest, verließen dieses jedoch, besserten das halbzerstörte aus und nahmen es dann wieder an. Am 9. Mai wurde das erste Ei gelegt, welchem noch zwei andere folgten. Leider fing nun aber das Weibchen an zu kränkeln und wollte nicht mehr brüten, während ich ihm diesmal die Eier ließ. Still und betrübt saß das Männchen neben dem Neste und wurde erst unruhig, nachdem sein Weibchen, das letzte, welches ich besaß, gestorben war; mehrere Tage hindurch flatterte es dann ruhelos umher.

„Gleich anderen Finken habe ich die Wüstentrompeter mit allerlei Sämereien versorgt, in deren Auswahl der Vogel zwar nicht heikel ist, doch die größeren öligen, z. B. Hanf, den mehlhaltigen wie Hirse und Kanariensamen vorzieht. Ferner frißt er gern die Samen des Löwenzahns, welche er aus den grünen Köpfchen geschickt hervorzuholen versteht, sodann die Körner aus den halb- oder ganz reifen Kornähren, die Früchte verschiedener Amaranthus-Arten und die zarten Blätter von Kohl, Salat, Kreuzkraut und Vogelmiere; von thierischen Stoffen nur Ameisenpuppen, während lebende Kerbthiere unberührt bleiben. Er ist übrigens überaus leicht zu erhalten; ich sah, daß man auf den Kanaren einige mit bloßem zerkleinerten Mais fütterte. Uebrigens frißt er auch allerlei weiches Futter, in Milch oder Wasser geweichte Semmel, selbst gekochte Kartoffeln, ferner Obst u. drgl. gern. Das passendste Futter für ihn dürfte jedoch ein Gemisch von Hirse oder Kanariensamen mit ein wenig Hanf und von Zeit zu Zeit etwas Grünkraut sein. Auf den kanarischen Inseln wird er trotz seiner Vorzüge kaum jemals als Stubenvogel gehalten, weil er dort so gemein ist, wie mir neuerdings ein Freund schreibt. Ich glaube indeß eher aus Mangel an Liebhaberei, die sich in jenen Gegenden nur auf wenige Singvögel beschränkt."

Dr. Bolle hatte schon darauf hingewiesen, daß der Vogel sich zur Nistzeit hin in ein ungleich prächtigeres lebhafteres Hochzeitskleid verfärbt, und dies bestätigt namentlich Chalihl-Effendi. — Aber gleich allen übrigen Verwandten verliert auch er das schöne Roth mehr und mehr in der Gefangenschaft.

Als einen Gegenstand des Vogelhandels darf man diesen prachtvollen Gimpel leider noch nicht ansehen, denn außer den von Bolle mitgebrachten zehn Köpfen waren wol kaum jemals andere in den Handel gelangt. Erst im Jahre 1874

führte Ch. Jamrach in London wenige Exemplare ein, und zwar ohne die Art zu kennen, unter der wunderlichen Bezeichnung rosenrothe Paddas; von denselben erhielt ich drei. Außerdem dürfte nur noch Herr Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram ein Pärchen besessen haben. Die meine Vogelstube bewohnenden, von denen ich ein Par an Herrn Graf Rödern in Breslau abtrat, während der einzelne bald zugrunde ging, haben leider keine Gelegenheit zu weiteren Beobachtungen gegeben. Sie hielten sich fast ausschließlich auf dem oberen Boden eines großen, hoch oben an der Decke hängenden Käfigs auf, welcher den kleineren Prachtfinken zur Nistherberge diente und auf dem sie rastlos hin- und herliefen. Ihre Töne habe ich garnicht gehört und ich muß annehmen, daß sie infolge unzweckmäßiger Verpflegung während der Ueberfahrt krankhaft in meine Hände gelangten. Da der Trompeter in seiner Heimat keineswegs selten ist, so läßt sich wol erwarten, daß er über kurz oder lang zahlreicher zu uns kommen und die schöne Bolle'sche Schilderung ergibt, daß er sich dann nicht allein als ein herrlicher, sondern auch als ein kräftiger, keineswegs weichlicher Vogel zeigen werde. Denn, wenn er unschwer zur Brut schreitet, so muß er doch auch ausdauernd sein. Der Preis dürfte immerhin hoch stehen, denn unter 45 Mark wird man das Pärchen schwerlich erlangen können.

Der Wüstengimpel oder Wüstentrompeter ist auch Wüstenfink, Trompeter- und Papageiengimpel benannt.

Le Bouvreuil de la désert; Desert Bullfinch. — Trumbettier (Trompeter), auf Malta; Pajaro moro (der maurische Vogel) oder schlechtweg Moro auf den Kanaren im allgemeinen, Pajaro majorero oder Pispo und nach Berthelot auch Gorrion colorado (bunter Sperling) auf Fuertaventura und Lanzarote (Bolle); Asfúr el hadjar (d. h. kleiner Steinvogel) in Egypten (Ch.-Eff.).

Nomenclatur: Fringilla githaginea, *Lchtst.*, *Rss.* [„Hndb."]; Pyrrhula Paraudaei, *Audb.*; Pyrrhula githaginea, *Tmm.*, *Rpp.*, *Bl.* et *Ksl.*, *Hgl.*, *Br.*; Erythrospiza githaginea, *Bp.*, *Bp.* et *Schlg.*, *Gld.*, *Adms.*, *Hrtm.*, *Bll.*, *Frstr.*, *Chmbrs.*, *Tlr.*, *Hgl.*; Carpodacus Paraudaei, *Gr.*, *Cb.*, *Rx.*, *Gld.*; Bucanetes githagineus, *Cb.*, *Hgl.*, *Mlhrb.*, *Wrght.*, *Antn.*, *Br.*; Carpodacus githagineus, *Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Scheitel und Nacken rein aschgrau, mit seidenartigem Glanz, Schultern und Rücken mehr oder weniger bräunlichaschgrau, mit röthlichem, durch so gefärbte Federn gebildeten Anfluge; die größeren Flügeldecken blaßbräunlich, breit rosenroth gerandet; Schwingen und Steuerfedern dunkelbraungrau, an der äußern Fahne karminroth, an der innern weißlich gesäumt, an der Spitze etwas breiter verwaschen weißlich gerandet; das übrige Gefieder zeigt eine mattglänzende, schwer zu beschreibende Mischfarbe von Atlasgrau und Rosa, welche namentlich an der Stirn, den Zügeln, der oberen Augengegend, den Backen und der Kehle, am kräftigsten unmittelbar um den Schnabel, in reines rosiges Karmin übergeht. Mehr oder minder stark hervortretende, breitere oder schmälere rothe Ränder aller Federn bedingen diese Farbenmischung. Der Bauch und die unteren Steißfedern sind blaßrosenröthlich. Ganz alte, besonders schön ausgefärbte Männchen zeigen auch rothgesäumte Achselfedern und einen viel stärker angehauchten Rücken. Die Unterseite ist bei ihnen fast ganz dunkel rosa und alle Theile sind von kräftiger mehr gesättigter Karminfarbe als bei den jüngeren, mitunter fast blutroth. Schnabel wundervoll korallenroth; Auge dunkelbraun; Füße blaßroth, mit hornfarbenen Nägeln. — Das Weibchen ist am ganzen Oberleibe bräunlichgrau. Diese Färbung verliert sich allmälig

in die hellere der Unterseite, welche von der Kehle bis zu dem weißlichen Bauche röthlich überflogen ist und überhaupt einen rothgrauen Farbenton zeigt. Am meisten spielt derselbe noch an der Kehle, unmittelbar unter dem Schnabel ins reine Rosa. Der Bürzel ist von ziemlich gesättigter, doch unrein rosenrother Farbe, welche nach hinten zu durch die breiter werdenden Säume kräftiger erscheint. Die Schulterfedern sind schmutzigrosenroth gekantet, die inneren Flügeldecken weißlich; die größeren Flügeldecken, Schwung- und Schwanzfedern gleichen denen des Männchens, nur sind sie nach außen hin schmäler und viel weniger reinkarminroth gerändert; wie beim letztern sind die Kanten der mittleren Steißfedern am breitesten roth, je mehr nach außen hin, desto schmäler und grauer werden sie, an den beiden äußersten erscheinen sie ganz blaßgrau. Die unteren Schwanzdecken sind nach dem After zu blaßrothgrau, am Hinterbauch, wo sie an Größe zunehmen, weißgrau mit undeutlich bräunlichen Schaftstrichen. Schnabel gesättigt gelbroth; Füße blasser roth als die des Männchens. (Bolle).

Jugendkleid: helllehm- oder schmutzigisabellgelb; große und kleine Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern schwärzlichbraun, beiderseits graugelb gesäumt; Bürzel isabellgelb; Wangen gelblich; Kehle bis über die Brust weißlich; Bauch düsterweiß, untere Schwanzdecken gelblich. Schnabel und Füße fleischfarben. (Bolle).

Pyrrhula githaginea: subroseo-cinerea (ob plumas cinereas roseo-marginatas), vertice cerviceque pure cinereis, serico-nitentibus; fronte, capistro*), loris, regione superoculari, genis, gulaque subkermesinis; humeris dorsoque fuscato-cinereis, rufescente afflatis; tectricibus al. subumbrinis late roseo-marginatis; remigibus rectricibusque fumigatis, exterius kermesino-, interius albido-limbatis, latiusque albido-terminatis; abdomine crissoque subrosaceis; rostro laetissime corallino; iride fusca; pedibus rubentibus; unguibus corneis. — ♀ supra fumido-cinerea; subtus dilutior; a gula usque ad abdomen albidum rosaceo-afflata; uropygio sordide roseo; plumis humeralibus luride roseo-marginatis; tectricibus al. majoribus, remigibus et rectricibus angustius subroseo-marginatis; subalaribus albidis; crisso cano, medio rubente; infracaudalibus anterioribus subrubris, posterioribus incanis, subfusco-striatis; rostro aurantio; pedibus dilute rubentibus.

Länge 13 cm.; Flügel $7{,}8$ cm.; Schwanz $2{,}8$ cm.

Juvenis: testacea vel luride isabellina, tectricibus al. majoribus et minoribus, remigibus rectricibusque nigricante fuscis, utrinque gilvo-limbatis; uropygio isabellino; genis flavidis; collo a gula usque ad pectus albido; abdomine luride albo; infracaudalibus flavidis; rostro pedibusque carneis.

Beschreibung des Eies: Farbe blaßmeergrün oder noch heller, mit zerstreuten rothbraunen Pünktchen und Flecken, die am spitzen Ende sehr vereinzelt stehen, am stumpfen einen Kranz bilden. Dieser zeigt außer mehreren feinen dünnlinigen Schnörkeln und Zickzacken auch nicht selten ziemlich große hellrothbraune, an den Rändern verwaschene Flecke, die meist in ein geschlängeltes Schwänzchen auslaufen, manchmal aber fast rund sind und in einzelnen Fällen auch über die mehr einfarbige Hälfte des Eies zerstreut stehen. (Bolle).

Ovum: pallide aeruginosum punctulis maculisque badiis dispersis, basin versus magis minus coacervatis, illic interdum in maculam confluentibus unam obsitum.

Der düstere Wüstengimpel [Pyrrhula obsoléta, *Lchtst.*], welcher nach Dr. Severzow in Zentralasien, bzl. Turkestan, im Tieflande, als eigentlicher Gartenvogel lebt und dessen volle Verbreitung bis jetzt noch unbekannt sein dürfte, wurde zuerst von Eversmann in der Bucharei gefunden. Näheres über ihn ist nicht angegeben und daher muß ich es bei dieser Erwähnung bewenden lassen, zumal er in der Lebensweise und in allem übrigen mit den Verwandten wol übereinstimmen dürfte, und da er, wenigstens vorläufig, ohne jede Bedeutung für die Liebhaberei ist. (Erythrospiza obsoleta, *Eversm.*).

*) capistrum = Gegend um den Schnabel herum.

Chrom. Lith. Th. Fischer Cassel.

Die Kernbeißer und Kernbeißerfinken [Coccothraustinae].

Als einheitliche Vogelgemeinschaft muß ich jetzt eine vielgestaltige Gruppe zusammfassen und schildern, obwol die Angehörigen derselben von anderen volksthümlichen und gelehrten Schriftstellern in überaus zahlreiche Sippen zersplittert worden. Da sie jedoch in vielen Hauptmerkmalen im wesentlichen übereinstimmen, in Lebensweise, Ernährung und Fortpflanzung wenig von einander abweichen und da ich mir vorbehalte, bei jedem einzelnen Geschlecht die besonderen Eigenthümlichkeiten hervorzuheben, so darf ich sie ohne Bedenken zusammenstellen.

Mit Ausnahme von Australien findet man zugehörige Arten in allen Welttheilen. Es sind der Mehrzahl nach größere Finken bis zu Drossel-, doch auch hinab bis zu Prachtfinkengröße. Kräftig gebaut mit verhältnißmäßig großem Kopf zeigen sie als Hauptkennzeichen einen starken und dicken, nicht sehr abweichend, meistens kegelförmig gestalteten, doch auch zusammengedrückten oder bauchigen Schnabel und stämmige, kräftig und scharf bekrallte Füße. Die Gestalt ist gedrungen, selten schlank. Die Flügel sind mehr oder minder kurz, nur bei wenigen lang und spitz, mit dritter oder vierter längster Schwinge; Schwanz in der Regel kurz ausgeschnitten, auch gerundet, nur bei einer geringen Anzahl lang. Das Gefieder ist dicht und weich mit angenehmen, bei manchen recht prächtigen Farben, und mit verschiedener Färbung der Geschlechter. Einige Arten tragen als Zierde einen Federschopf. Nicht wenige darf man als angenehme, bzl. hervorragende Sänger erachten; eine Beurtheilung dieser Eigenthümlichkeit muß ich mir für jede einzelne Art vorbehalten.

Vorzugsweise Baumvögel, stimmen sie in der Lebensweise fast ganz mit den eigentlichen Finken überein. Ihre Nahrung besteht in mancherlei Sämereien, Kernen, Früchten und Beeren, sowie auch in Kerbthieren und Gewürm. Das Nest steht immer frei im Gebüsch auf Bäumen und Stäuchern, nur selten hoch; es bildet stets eine offne Mulde und enthält farbige und gezeichnete Eier.

Für die Liebhaberei sind sie größtentheils von hohem Werth. Viele von ihnen gehören zu den regelmäßig und auch in großer Anzahl anlangenden Gästen des Vogelmarkts, so namentlich die Kardinäle in fast allen Arten. Manche hat man auch bereits mit Glück in der Gefangenschaft gezüchtet; im allgemeinen aber sind doch noch nicht viele derartige Versuche mit ihnen angestellt worden. Man füttert sie mit verschiedenen Sämereien, mehligen und öligen, nebst Zugabe von Ameisenpuppengemisch, Mehlwürmern, Eierbrot, Beeren u. a. Früchten, Grün-

kraut u. drgl. Im übrigen sei auf die Abschnitte über Verpflegung und Zucht überhaupt hingewiesen. Hier muß ich vorläufig nur mit Bezug auf eine besondre Eigenthümlichkeit Rathschläge geben. Kräftig und ausdauernd im Käfige, fressen gleich vielen anderen Finkenvögeln auch einige hierher gehörende sich leicht zu fett und gehen dann an Unterleibsentzündung u. a. zugrunde. Man besichtige besonders die ruhigen, meist still sitzenden hin und wieder, und sobald sie auffallend fett erscheinen, entziehe man ihnen alle nahrhaften Futterzugaben, reiche ihnen nur Körner, auch viel Grünkraut, und bringe sie, wenn möglich, in einen geräumigen Flugkäfig, vielleicht gar mit einigen unfriedlichen Genossen zusammen.

* * *

Unter den eigentlichen **Kernbeißern** [Coccothraustes, *Bchst.*] und **Kernbeißerfinken** oder **Kernknackern** [Coccoborus, *Swns.*], zu denen ich auch die sog. Kardinäle [Cardinalis, *Bp.*], die Pfäffchen [Sporóphila, *Cb.*] und die Ruder- oder Papageifinken [Pitylus, *Cv.*] zähle, gibt es verhältnißmäßig viele im Handel vorkommende Arten, von denen jedoch nur wenige als vorzugsweise beliebte Stubenvögel gelten dürfen. Als Hauptmerkmale der Kernbeißer sind ein eigenthümlicher Höcker am Oberschnabel, welcher in den Unterschnabel hineinpaßt und dann einige hakenförmig gebildete Schwingen im Flügel zu erachten. Die übrigen Verwandten zeigen jene Absonderlichkeit an ihren mehr oder minder langen und spitzen Schwingen nicht und ihre kegelförmigen Schnäbel haben auch nicht den erwähnten Höcker. In der Lebensweise und in allem übrigen sind sie aber völlig übereinstimmend; auf alle abweichenden besonderen Kennzeichen werde ich bei den einzelnen Arten näher eingehen.

Der Maskenkernbeißer [Coccothraustes personatus].

Zu den größten und stattlichsten der fremdländischen Finken gehörend, wird er leider nur selten von Fräulein Hagenbeck oder Chs. Jamrach in einzelnen Köpfen, höchstens in einigen Pärchen in den Handel gebracht. An Oberkopf, Gesicht und Kehle ist er tief glänzendschwarz; ganze übrige Oberseite röthlichfahl-bräunlichgrau; Flügel und Schwanz ebenfalls schwarz, die ersteren mit breiter weißer Querbinde in der Mitte; Unterseite fahl bräunlichgrau; Bauchmitte, Hinterleib, untere Flügel- und Schwanzdecken reinweiß; Schnabel düster orangegelb; Auge tiefbraun; Füße gelblichgrau. Das Weibchen ist bräunlichgrau, am Kopf nicht tiefschwarz, sondern nur dunkler schwärzlichbraungrau; über dem Flügel eine schmale weißliche Querbinde. Größe etwas bedeutender als die des europäischen Kernbeißers. Heimat nur Japan. Ueber das Freileben ist fast garnichts bekannt. In der Fauna von Japan haben Temminck und Schlegel nur die Beschreibung, jedoch nichts bemerkenswerthes über die Lebensweise geboten; dieselbe dürfte wol mit der des europäischen Kernbeißers übereinstimmen. Die Forscher Dr. Dybowski und Godlewski erlegten ein Pärchen auf ihrer Reise im südlichen Assurilande und an den Küsten des japanischen Meeres, wie sie sagen, während der Brutzeit; doch ist leider ebenfalls nichts näheres angegeben. Die in meiner Vogelstube mehrmals vorhanden gewesenen Männchen (ein Weibchen erhielt ich nur einmal und dasselbe starb sogleich) erschienen im Wesen und Benehmen dem erwähnten Verwandten durchaus gleich, doch habe

ich von einem derselben einen fleißig vorgetragnen, einfachen und kleinen, nicht unangenehmen Gesang gehört. Herr Aug. F. Wiener in London verlor ein Männchen an Ueberfütterung und warnt dringend, daß man sie nicht immer frei in der Vogelstube fliegen lassen, sondern wenigstens zeitweise absondern und dann mager füttern solle. Im übrigen zeigt dieser Kernbeißer sich harmlos und friedlich und er dürfte immerhin einen Schmuck für die zoologischen Gärten bilden; für die Vogelstuben hat er jedoch ungleich geringern Werth. Freilich wird er wol überall unschwer zum nisten schreiten, denn im Berliner Aquarium begann ein Pärchen bereits ein Nest zu erbauen. Im Verhältniß zu seinem Preise, 20 Mark für den Kopf, ist er aber weder schön noch liebenswürdig genug.

Der Maskenkernbeißer ist auch japanesischer Kernbeißer (Ruß' „Handbuch") und schwarzköpfiger Kernbeißer (Wiener) benannt. — Le Grosbec du Japon et le Grosbec ou Coccothrauste masqué; Masked Hawfinch.

Nomenclatur: Coccothraustes personatus, *Tmm.* et *Schlg.*; Eophóna personata, *Sws.*; Fringilla personata, *Rss.* („Handbuch").

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 514.

Coccothraustes personatus: supra fumigato-rufescens, pileo, facie gulaque nitide aterrimis, alis caudaque nigris; fascia trans alam mediam alba; subtus livide fumigatus, abdomine medio, crisso, subalaribus et infracaudalibus pure albis; rostro luride aurantio; iride obscure fusca; pedibus gilvis. — ♀ subfumida capite obscurius fumigato; fascia trans alam angusta albida.

Der schwarzschwänzige Kernbeißer [Coccothraustes melanúrus].

Noch seltener im Handel als der vorige, wird er zuweilen von Bekemans in Antwerpen, fast immer jedoch nur einzeln eingeführt; im zoologischen Garten von London ist er bereits mehrmals vorhanden gewesen. Die vier Köpfe aber, welche das Berliner Aquarium unter dem ersten Direktor von der Antwerpener Versteigerung erhalten, waren keineswegs, wie im „Führer" fälschlich angegeben, diese Art, sondern die vorhergehende. Der zoologische Garten von Berlin hat den kleineren Kernbeißer nur ein einzigesmal im Jahre 1875 in einem Exemplar besessen, und ich glaube auch kaum, daß derselbe außerdem schon jemals nach Deutschland gelangte. Er ist am ganzen Kopf und an der Kehle bis zur Oberbrust hinab glänzend schwarz, an der letztern allmälig dunkelbraungrau werdend; Rücken und Schultern fahlbraun; Flügel schwarz mit breitem weißen Querfleck und weißem Rande; Bürzel bräunlichgrau; obere Schwanzdecken grauweiß; Schwanz metallglänzend schwarz; Körperseiten gelblichbraun; ganze Unterseite reinweiß: Schnabel schwach bräunlichgelb; Auge rothbraun; Füße weißlichhorngrau. Das Weibchen ist am Kopf und der ganzen Oberseite bräunlichgrau; Oberkopf und Kopfseiten reiner grau; Schwingen schwarz mit weißer Querbinde; Bürzel bräunlichgrau; Schwanzfedern grau mit schwarzen Spitzen, die äußersten ganz schwarz; Kehle weißlich; Brust bräunlichgrau; Seiten gelblichbraun: Bauch gelblichweiß. Die Größe ist beträchtlich geringer, als die des vorigen. Als Heimat ist China bekannt. Irgend etwas näheres über die Lebensweise ist leider nicht zu finden, nur die kurze Angabe, daß auch von dieser Art ein altes Pärchen in der Brutzeit durch die vorhin genannten Reisenden

geſchoſſen worden. Man kann wol mit Sicherheit annehmen, daß er mit dem vorigen, bzl. den einheimiſchen Kernbeißer, in jeder Hinſicht übereinſtimmend iſt.

Der ſchwarzſchwänzige Kernbeißer iſt auch Schwarzſchwanzkernbeißer (Br.) und Kernbeißer von China (Ruß' „Handbuch") geheißen.

Le Coccothrauste à queue mélaïne, Grosbec à queue mélaïne ou Grosbec de la Chine (*Vekemans*); Black-tailed Hawfinch.

Nomenclatur: Loxia melanura, *Gml.*, *Shw.*, *Lth.*; Eophóna melanura, *Gld.*, *Hrsf.* et *Mr.*; Coccothraustes melanura, *Jard.* et *Slb.*, *Gr.*; Hesperiphóna melanura, *Bp.*; Fringilla melanura, *Rss.* [„Handbuch"]. — Black-tailed Grosbeack, *Lath.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 515.

Coccothraustes melanurus: capite, gula, gutture nitide nigris, hoc sensim fumigato; dorso humerisque livide fuscis; alis nigris maculam transversam latam campteriumque exhibentibus alba; uropygio fumido; supracaudalibus incanis; cauda nigra, metallice nitido; lateribus livide umbrinis; gastraeo toto albissimo; rostro testaceo; iride badia; pedibus albente corneis. — ♀ subfumida pileo capitisque lateribus cineraceis; fascia trans remiges nigros alba; uropygio fumigato; rectricibus cinereis nigro-terminatis, extimis totis nigris; gula albida; pectore fumida; lateribus ferruginosis; abdomine flavente albo.

Hierher gehörende nahe verwandte Vögel ſind noch die folgenden: **Der japaneſiſche Kernbeißer** [Coccothraustes japonicus, *Tmm.* et *Schlg.*], ebenfalls aus Japan und den vorigen in der Färbung ähnlich. Dr. Dybowski verwechſelte ihn in Oſtſibirien, wo er ihn zur Sommerzeit in geringer Anzahl in den mit Vogelpflaumen bewachſenen Sträuchern beobachtete, mit dem gemeinen Kernbeißer und Taczanowski bemerkt dazu, daß dieſe Arten einander überaus naheſtehend ſeien. Eine nähere Beſchreibung und Schilderung brauche ich nicht zu geben, da die Art noch nicht lebend eingeführt iſt und dazu auch keine Ausſicht zeigt. — **Der Kernbeißer mit fleiſchfarbenen Füßen** [Coccothraustes carnipes, *Hdgs.*] iſt in Turkeſtan von Severzow gefunden und zwar überall in der Zone der Nadelhölzer. Im Muſeum der oſtindiſchen Kompagnie iſt er aus Nepal vorhanden. (Flesh-footed Grosbeak, *Hdgs.*; Coccothraustes speculigerus, *Brndt.*). — **Der gelbliche Kernbeißer** [Coccothraustes icteroides, *Vgrs.*] wurde von Dr. v. Stoliczka im Winter in Kotegurh im Himalaya geſammelt, und das Muſeum der oſtindiſchen Kompagnie enthält Exemplare aus Bengalen. (Icterine Grosbeak, *Gr.*). — **Der ſchwarzgelbe Kernbeißer** [Coccothraustes melanoxanthus, *Hdgs.*] bewohnt nach den Angaben des Forſchers Hodgſon die nördlichen Gegenden Nepals, wandert von dort im Sommer ſogar ins Innere, reife Steinfrüchte ſuchend. (Coccothraustes fortirostris, *Lfrsn.*; Black and yellow Grosbeak, *Hdgs.*).

Der roſenbrüſtige Kernbeißer [Coccothraustes ludovicianus].

Tafel XIII. Vogel 68.

Hochobenan in der Reihe aller beliebten fremdländiſchen Stubenvögel ſtehend, zählt er zugleich zu denen, welche der Handel, wenn auch nicht gerade häufig und in großer Anzahl, ſo doch nicht gar zu ſelten bietet. Er wird ziemlich regelmäßig alljährlich von Herrn C. Reiche und Fräulein Hagenbeck eingeführt; auf den großen Berliner Ausſtellungen der Jahre 1877/78 hatte Herr R. Schoebel einige Pärchen.

Theils als Sänger einzeln im kleineren Käfige, theils parweiſe zum Hecken in der Vogelſtube wird er ſehr gern gehalten, und in dieſer wie in jener Hinſicht

kommen mehrere seiner angenehmen Eigenschaften zur Geltung. An Kopf, Nacken, Rücken, Flügeln und Schwanz ist er glänzendschwarz, mit weißen Binden über den Flügel; Unterhals und Oberbrust spitz nach dem Bauch zu laufend und ebenso die Schultern sind prächtig karminroth; Unterflügeldecken lichtrosenroth; Brust und Bauch reinweiß. Das Weibchen ist schlichtgrau, ohne schwarzen Kopf, unterhalb drosselartig gefleckt und nur am Flügelrande rosenroth überhaucht. Die Größe stimmt mit der des gemeinen Kernbeißers überein. Nach Baird erstreckt sich seine Verbreitung über den ganzen Osten der Vereinigten Staten von Nordamerika und zwar westlich bis zu den Missouri-Ebenen und südlich bis Guatemala. Zum Winter wandert er bis Neugranada hinab.

Die alten Schriftsteller erwähnen ihn nur kurz, wie Brisson und Buffon, oder sie haben ihn garnicht gekannt; die beiden Genannten geben auch bereits Abbildungen und der erstere beschreibt ihn als Dickschnabel von Luisiana. Ungleich reicher ist die neuere und neueste Literatur an eingehenden Darstellungen seines Frei- und Gefangenlebens zugleich.

Wenden wir uns nun zunächst dem erstern zu. Prinz von Wied, der ihn in Pennsylvanien und am Missouri erlegte, sagt nur kurz, daß er in der Lebensweise anderen Kernbeißern und verwandten Finken gleiche und nicht scheu sei. Auf der Insel Kuba beobachtete ihn Dr. Gundlach im Oktober und noch mehr im April, auf höheren Bäumen nach Beeren oder Samen suchend, doch nicht in allen Jahren regelmäßig. Ebenso kommt er nach Hill auf der Insel Jamaika vor und nach Dr. v. Frantzius gehört er auch zu den Vögeln Kostarikas. Der letztere Forscher sah ihn zuweilen, obwol nicht häufig, vom Februar bis Juni bei St. José und zwar gewöhnlich Weibchen und junge, noch nicht ausgefärbte Männchen, nur einmal ein altes Männchen im vollkommenen Farbenschmuck. Ob er hier nistet, ist nicht festgestellt und als Sänger kennt man ihn ebenfalls nicht.

Eine kurze, hübsche Schilderung des Freilebens gibt Herr H. Nehrling in folgendem: „Zu den interessantesten und schönsten Vögeln der gemischten Waldungen von Wiskonsin darf ich wol ohne Bedenken den rosenbrüstigen Kernbeißer zählen. Von den deutschen Ansiedlern wird er recht bezeichnend Rothbrust genannt. Er ist von allen unseren einheimischen Vögeln mein besondrer Liebling, denn an ihn knüpfen sich wie an keinen andern, süße Jugenderinnerungen. Im mittleren Wiskonsin, etwa zwölf englische Meilen von der am Michigansee erbauten Stadt Scheboygan liegt ein kleiner Landsee, welcher ringsum von Bergen umgeben ist, die theils mit Nadel-, theils mit Laubholzbäumen bewachsen sind und aus denen eine Anzahl Quellen hervorrieseln. Hier, in dieser romantischen Gegend, in welcher die Vogelwelt überaus reichhaltig und mannigfaltig vertreten ist, verlebte ich meine Jugendjahre. In den Sommermonaten weilte ich fast täglich auf einem dieser Berge. Nicht allein die schönen Tannen und anderen

Waldbäume oder die Kristallquellen waren es, welche mich fesselten, sondern namentlich ein Vogel, der hoch oben im luftigen Gezweige seine wunderlieblichen Lieder ertönen ließ — und zwar der rosenbrüstige Kernbeißer. Man muß seinen Gesang in einer Gegend, in welche er so recht hinein gehört, selber belauscht haben, um ihn recht würdigen und ihm das verdiente Lob spenden zu können. Etwa anfangs Mai stellte sich das Pärchen ein und verblieb bis in den September. Der Vogel ist hier keineswegs häufig. Man findet ihn nur an den günstigsten Oertlichkeiten, in gemischten, bergigen, nicht allzu dichten, von kleineren Flüssen durchzogenen oder von ebensolchen Seen begrenzten Waldungen. Im nördlichen Illinois habe ich ihn niemals gefunden. Herr Kämpfer, Vogelhändler in Chikago, bezieht diese Kernbeißer stets aus dem Osten, vornämlich aus dem Staate New-York."

Ausführlicher berichtet Gentry über das Freileben: „Er ist in Ostpennsylvanien keineswegs häufig und kommt auch unregelmäßig, etwa zur Mitte des Monats Mai an. Dann sieht man ihn in hohen offenen Wäldern in den Baumgipfeln, niemals aber, gleich verwandten Vögeln, im Gebüsch und auf niedrigen Bäumen längs der Flüsse. Er ist überaus scheu, liebt einsame Oertlichkeiten, hält sich auf den großen Eichen immer außer Schußweite und flüchtet schleunigst beim Nahen eines Menschen davon, während ein Flug sonst stundenlang auf einunddemselben Baume verweilt. In großen Schwärmen lebt er nicht, sondern scheint bereits parweise einzutreffen, denn man findet die Pärchen stets zusammen und zwar sogleich nach der Ankunft. Aufmerksame Beobachtung hat mich davon überzeugt, daß er in unserer Gegend nicht nistet, während das zärtliche Benehmen der Pärchen mich doch darauf schließen ließ; so kämpfen namentlich die Männchen hitzig um die Weibchen. Der Flug ist leicht wellenförmig und meist langgezogen. Man findet sie nahrungsuchend nur selten auf der Erde. — John Richardson beschreibt den Gesang als klar, weich und harmonisch. Nuttall, der ein Männchen im Käfig hielt, sagt, daß es ein melodischer und unermüdlicher Sänger sei, welcher fast die ganze Nacht hindurch seine Töne erschallen lasse. Diese seien theils kräftig und durchdringend, theils klagend und süß. Während des Singens zeige er eine Erregung oder ein Entzücken, das auch in körperlichen Bewegungen sich ausspräge. An Ausdruck und Kraft des Gesanges werde er nur von der Spottdrossel übertroffen. Sein Lockruf ertönt sanft tschuck (chuck). Während seines nur zweiwöchentlichen Aufenthalts ernährt er sich von Sämereien und Beeren, sowie von Kerbthieren in allen ihren Verwandlungen und Bruten, und vor dem Abzuge frißt er namentlich Baumknospen, saftige Tannenschößlinge, Staubgefäße und Stempel aus Baumblüten, besonders denen des rothen Ahorns. Nach dem Osten von Massachusetts, gibt Dr. Brewer an, kommt er gegen Mitte des Monats Mai und nistet in der ersten Woche des Juni auf niedrigen Bäumen

an Waldrändern, vorzugsweise in kleinen Hainen, an den Ufern der Ströme. Ebenso fand ihn Allan nistend in Kanada. Das Nest ist aus groben Pflanzenstengeln, Blattstückchen, Halmen und Reisern geschichtet, außen auch mit Mosflöckchen durchwebt und innen mit feineren Stoffen ausgepolstert. Es ist eine offene Mulde, welche 3 bis 4 Eier enthält, die in 14 Tagen erbrütet werden. Alljährlich nistet das Pärchen nur einmal. Auch in Wiskonsin fand Dr. Hoy sieben Nester auf einer fünf Morgen großen Fläche, welche im Dorngebüsch etwa 2 bis 3 Meter hoch vom Boden standen, und zwar nisteten hier diese Pärchen alljährlich in gleicher Geselligkeit. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und ersteres läßt während des nistens, am fleißigsten und anmuthigsten in der Nähe des Nestes, seinen Gesang erschallen, so daß es dadurch nur zu leicht den Stand desselben verräth."

Alle derartigen Schilderungen finden ihre Bestätigung im wesentlichen in der eines der hervorragendsten amerikanischen Forscher, Audubon's nämlich. Dieser beobachtete den Vogel nistend nur in großen zusammenhängenden Waldungen, wo das Nest im Frühlinge oder Frühsommer stets in der Nähe eines Gewässers auf einem hohen Busch, ja meistens sogar auf einem hohen Baume stand und außen aus Reisern, Laub, Rindenbast und Fasern von wilden Reben, innen aus Würzelchen und Pferdehaaren erbaut war. Die Jungen werden anfangs fast ausschließlich mit kleinen weichen Kerbthieren und deren Bruten, späterhin mit Sämereien gefüttert. Erst im dritten Jahre gelange das Männchen zum vollen Prachtgefieder. Bachmann hebt besonders hervor, daß das Pärchen während der Brut allerlei Kerbthiere, namentlich Maikäfer, Heuschrecken und selbst hurtige, wie Fliegen, emsig verfolgt.

Wie schon erwähnt, wird dieser Kernbeißer vielfach in den Vogelstuben gehalten und unter Anderen hat Herr Graf Yorck von Wartenburg schon längst darauf hingewiesen, daß er hier, im Gegensatz zu vielen seiner Verwandten, als ein durchaus friedlicher und harmloser Vogel auftritt; nur im engen Käfige und mit vielen kleineren Vögeln zusammen ist er, namentlich am Futternapf, bissig und vermag mit seinem starken Schnabel wol hin und wieder einem kleinen Prachtfink recht gefährlich zu werden. Die Fütterung ist einfach die in der allgemeinen Uebersicht der Kernbeißer angegebene und mit Vorliebe frißt er Hanfsamen. Herr v. Schlechtendal beobachtete, daß er auch gern frisch getödtete Drohnen verzehrte. Gleich allen Verwandten frißt er sich ebenfalls leicht zu fett und stirbt dann an Unterleibsentzündung und dergleichen Krankheiten. Man fängt daher besonders gegen das Frühjahr hin das Heckpärchen aus der Vogelstube oder den einzelnen Sänger aus dem Käfige, untersucht sie genau und behandelt sie wie S. 514 angegeben. Bei solcher Verpflegung zeigen sie sich so ausdauernd, daß man sie viele Jahre hindurch erhalten kann.

Die Meinungen der Vogelliebhaber stehen einander inbetreff keiner Eigenschaft ihrer gefiederten Lieblinge so widersprechend gegenüber, als hinsichts des Gesangs. Der eine preist ausschließlich unsere europäischen sog. Meistersänger, die Nachtigal, den Sprosser und deren Verwandte, während ein andrer auch den Sängern unter den Finkenvögeln Gerechtigkeit widerfahren läßt. In der Verschiedenheit der Urtheile aber, für und wider den hervorragenderen Gesang dieser oder jener Vogelgruppe, erscheint es dem Unbefangenen am auffallendsten, daß sich nicht selten ein heftiger Streit über einunddieselbe Art erhebt. Nun würde zwar das alte Sprichwort zur Geltung kommen: über den Geschmack läßt sich nicht rechten — allein im Eifer des Ausfechtens einer Meinung kann man es ja garnicht vermeiden, daß in dem Lob oder Tadel entschieden zu viel gethan und der rechte Weg der Wahrheit verfehlt wird. Die amerikanischen Schriftsteller Audubon, Wilson, Baird u. A. außer den bereits erwähnten, loben fast einstimmig eine Anzahl der dortigen Finkenvögel als die vorzüglichsten Sänger, und mehrere der letzteren tragen bekanntlich den Beinamen der europäischen Gesangskönigin, wie die virginische Nachtigal (der rothe Kardinal), die brasilische Nachtigal (der graue Kardinal) u. a. m., während man auch den Vögeln anderer Welttheile in dieser Hinsicht Lob spendet und z. B. den Bülbül im allgemeinen als ostindische Nachtigal bezeichnet. Wenn diese Vögel aber bei uns im Käfige oder in der Vogelstube sich hören lassen, da können wir solch' begeistertes Lob nicht begreifen, und die meisten sachverständigen Beurtheiler des Vogelgesangs unter uns schätzen nicht einmal das Lied der amerikanischen Spottdrossel hoch, welches doch von vielen Anderen als das herrlichste unter allen und weit bedeutender, als das unserer Nachtigal erachtet wird. Eine wenigstens annähernd richtige Erklärung dürfte allerdings darin zu finden sein, daß bei den Aussprüchen über die Vogellieder doch zweifellos ganz besondere Verhältnisse gewichtig sich geltend machen, und zwar vor allem die Stimmung des Hörenden, beeinflußt durch die Naturumgebung und Oertlichkeit, die Tageszeiten u. s. w. Wer einsam am Rande des Hochwalds, zwischen Wiesen und blumigen Auen wandelnd in den wonnigen Eindrücken eines lieblichen Frühsommerabends schwelgt, wird das Lied der Drossel im hohen Föhrenwipfel ganz anders beurtheilen, als der, welcher denselben Vogel im engen Zimmer hört und von seinen lautschallenden Tönen sich belästigt fühlt. Bedenken wir dazu noch, daß die meisten der zu uns gelangenden fremdländischen Vögel entweder aus dem Nest genommene und in der Hand aufgefütterte Pfleglinge, welche den ursprünglichen Gesang ihrer Art niemals gehört und also auch nicht gelernt haben, oder daß sie durch den Fang und die Ueberfahrt arg gemißhandelte Exemplare sind, so wird ein ehrlicher Vogelfreund sich ebenso hüten, ihrer Fähigkeit und ihren Leistungen jeden Werth abzusprechen, wie er sich nicht leicht zu überschwenglicher Begeisterung durch dieselben hinreißen

läßt. Von diesen Gesichtspunkten aus beurtheilt, findet man zunächst den Gesang der Vögel von einundderselben Art je nach abweichender Begabung, bzl. je nach der Behandlung überaus verschieden. So auch bei unserm rosenbrüstigen Kernbeißer; der eine singt gut, der andre schlecht. Im ganzen ist das Lied viel mehr lieblich, als von hervorragend künstlerischer Bedeutung. Es ertönt als eine sanfte, süße Klage, die aber einerseits zu geringe Abwechselung bietet und andrerseits bei einzelnen Vögeln mit schrillen unschönen Lauten durchwebt wird; besonders anmuthend dünkt sie uns abends beim Mondschein oder bei Lampenlicht. Selbst der beste Sänger aber unter den rosenbrüstigen Kernbeißern dürfte das überschwengliche begeisterte Lob der amerikanischen Schriftsteller kaum verdienen.

Will man aber einen schönen Vogel anschaffen, welcher nicht durch schmetternden Gesang stört, vielmehr ungemein zutraulich und zahm wird, unschwer nistet und bei einfacher, selbstverständlich sachgemäßer Pflege viele Jahre hindurch vortrefflich ausdauert, so wähle man ihn.

An den Männchen in meiner Vogelstube beobachtete ich im Laufe der Zeit einen Vorgang, welcher vielen Liebhabern noch neu sein dürfte. Im Winter des ersten Jahres, in welchem ich ein Pärchen hielt, bemerkte ich, daß das Männchen nach und nach sein schönes Roth verlor. Da das Rosenroth, wie die rothe Farbe in ihren verschiedenen Schattirungen überhaupt, bei einer beträchtlichen Anzahl von Vögeln bekanntlich in der Gefangenschaft verschwindet, so hielt ich meinen prächtigen Kernbeißer nun für ziemlich werthlos. Zur nahenden Nistzeit unterwarf ich ihn längere Frist hindurch einer spärlicheren Verpflegung, weil er sich im Herbst an Obst, Eierbrot u. a. zu fett gefressen; als ich ihn dann aber, nach überstandner Hungerkur, nebst seinem Weibchen freifliegen ließ, er sich von neuem gehörig verpflegte und in die hochzeitliche Erregung gerieth, trat zu meiner Verwunderung der rothe Brustlatz wieder groß und kräftig hervor. Diese Erscheinung wiederholte sich auch späterhin bei mehreren Männchen und nachdem ich sie bereits im Sommer 1875 veröffentlicht, ist sie seitdem noch von verschiedenen anderen Seiten bestätigt worden.

Auch die Züchtung dieses Kernbeißers in der Gefangenschaft habe ich wol zuerst erreicht. Das Pärchen baute ein sehr großes, nichts weniger als kunstvolles Nest, entweder auf dem Boden eines hochhängenden Drahtkäfigs in eins der größeren Nistkörbchen oder in ein leeres Harzerbauerchen in der sog. Krone der Vogelstube. Immer wurde der Ort möglichst hoch gewählt. Das Weibchen trug fast allein die Baustoffe zusammen und zwar mit Vorliebe halbtrockene verschleppte Vogelmiere, und auf einem Haufen derselben wurde dann aus Agavefasern eine nur leichte, nicht besonders künstliche Mulde geformt und mit einigen Federn ausgelegt. Das Gelege bestand fast regelmäßig in vier Eiern und abweichend von den Angaben der Naturforscher hinsichtlich des Freilebens brütete

nur das Weibchen allein; ebenso nisteten meine Vögel und zwar habe ich im Laufe der Zeit mehrere Pärchen gehalten, fast regelmäßig zweimal im Frühjahr. Beide Gatten des Pärchens füttern die Jungen sehr eifrig und zwar anfangs vorzugsweise mit frischen Ameisenpuppen oder dem Gemisch aus gequellten und Eierbrot, späterhin fast lediglich mit dem letztern und eingeweichten Sämereien, auch nehmen sie sehr gern allerlei Kerbthiere, Mehlwürmer, Maikäfer, Fliegen u. a. m. Die Entwicklung im übrigen stimmt mit der in der Freiheit geschilderten überein.

Der Preis ist noch immer ziemlich hoch und beträgt 30 bis 54 Mark für das Pärchen.

Der rosenbrüstige Kernbeißer ist auch Rothbrust und wunderlicherweise Rosenbrustknacker (Br.) genannt. [Louisianischer Kernbeißer, Müller; Rosenkehlchen, Buff.].

Le Grosbec à poitrine rose ou Coccothrauste à poitrine rose; Rose-breasted Grosbeak. Degollado, auf Kuba (nach Gundl.).

Nomenclatur: Loxia ludoviciana, *L.*, *Wls.*; Fringilla punícea et Loxia obscura, *Gml.*; Loxia rosea, *Wls.*; Coccothraustes rubricollis, *Vll.*; Guiraca ludoviciana, *Swns.*, *Bp.*, *Brd.*; Fringilla ludoviciana, *Audb.*, *Rss.* [„Hndbch"]; Pyrrhula ludoviciana, *Sb.*; Coccothraustes ludoviciana, *Rchrds.*; Coccóborus ludovicianus, *Audb.*, *Pr. Wd.*; Goniaphea ludoviciana, *Bwdch.*, *Gntr.*; Hedýmeles ludoviciana, *Cb.*, *Scl.*, *Br.* [Coccothraustes ludoviciana, *Brss.*; Le Grosbec de la Louisiane, *Briss.*; Rosè-gorge, *Bff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Der ganze Kopf, Nacken, Oberkehle, Rücken, Flügel und Schwanz glänzendschwarz, über den Flügel zwei weiße Binden und die äußersten Schwanzfedern am unteren Theil der Innenfahne weiß; Schultern karminroth, untere Flügendecken lichtrosenroth; Bürzel weiß; Unterhals und Oberbrust spitz zu bis zur Brustmitte laufend prachtvoll karminroth; Brust und Bauch reinweiß, Bauchseiten sparsam schwarz gestrichelt; Schnabel gelblichweiß, Spitze des Oberkiefers schwärzlich; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichbleigrau. — Weibchen oberhalb fahl olivengrünlichgrau, dunkelbraun schaftfleckig; Längsstreif über den Scheitel, Augenbrauenstreif und Zügel düsterweiß; Kopfseiten braun; Flügel und Schwanz schwärzlichbraun, erstere mit zwei weißlichen Querbinden, untere Flügelseite gelb; ganze Unterseite bräunlichweiß, Brust mit dunkelen Längsstreifen; hinterer Unterleib reinweiß. — Jugendkleid dem des alten Weibchens gleich, nur heller und matter. Schnabel horngrau; Auge schwarz; Füße gelblichgrau. (Nach der ersten Mauser tritt beim jungen Männchen an der innern Flügelseite zartes lichtes Rosenroth hervor, während es im übrigen völlig dem alten Weibchen gleicht. Im zweiten Jahre erscheinen einzelne rosenrothe Federchen an der Brust und diese ist viel reiner weiß als beim alten Weibchen; erst im dritten Jahre kommt die volle rothe Färbung zum Vorschein.)

Coccothraustes ludovicianus: capite toto, cervice, gula, dorso, alis caudaque nitide nigris; fasciis duabus trans alam necnon apicibus rectricum extimarum introrsum albis; humeris kermesinis; tectricibus subalaribus subroseis; uropygio albo; colore a gutture usque ad pectus medium in tenuitatem desinente laetissime rosaceo; pectore abdomineque albis; hypochondriis nigro-substriatis; rostro saturate gilvo-albo; iride fusca; pedibus fuscato-plumbeis. — ♀ supra olivaceo-virente cana, fusco-striata; vitta trans verticem, stria superciliari lorisque luride albis; capitis lateribus umbrinis; alis caudaque nigricante fuscis, illis fascias duas albidas ostendentibus; subalaribus flavis; subtus luride albida, pectore obscure striato; crisso albissimo.

Länge $18{,}9^{cm.}$; Flügel $9{,}6^{cm.}$; Flugbreite $29^{cm.}$; Schwanz $7{,}1^{cm.}$

Juvenis: femellae adultae simillimus, sed dilutior et pallidior; rostro corneo; iride nigra; pedibus gilvo-cinereis.

Beſchreibung des Eies: Blaugrün, gelb- und zimmtbraun geſtrichelt und gefleckt. (Audb.). Spangrün oder grünlichweiß mit roſtfarbenen Flecken gezeichnet, welche mehr oder weniger über die ganze Oberfläche vertheilt ſind. (Gntr.). Grundfarbe ſchön blaugrün, einzelne heller mit violetten bis rothbraunen, theils verwiſchten, theils ſcharf begrenzten Flecken, beſonders am ſtumpfen Ende; Geſtalt ſchön eiförmig; wenig glänzend. Länge 24—26 mm.; Breite 16—18 mm. (Nhrk.).

Ovum: aeruginosum fulvo- et cinnamomeo-lineatum et maculatum *(Audb.)* O. aeruginosum vel virente album maculis ferrugineis, irregulariter dispersis *(Gntr.)*. O. laete aeruginosum, interdum dilutius, maculis violaceis, ipsis badiis inprimis in basi obsitum parte elutis, parte circumscriptis; pulchre ovatum; parum nitens *(Nhrk.)*.

Der ſchwarzköpfige Kernbeißer [Coccothraustes melanocéphalus], ein naher Verwandter des vorigen, deſſen Heimat ſich nach Baird über das Flachland von Mexiko bis zur Küſte des ſtillen Ozeans erſtreckt. Er iſt am ganzen Kopf nebſt Kinn, Mantel, Rücken, Flügeln und Schwanz ſchwarz; ein breiter Mittelſtreif über den Kopf, Schläfenſtreif und breiter Kragen am Hinterhals gelblichbraun, faſt hellzimmtbraun; am Oberrücken jede Feder gelblichbraun geſäumt; Bürzel gelblichbraun, ſchwarz ſpitzfleckig; über den Flügel zwei breite weiße Binden; obere Schwanzdecken weiß, die beiden äußerſten Schwanzfedern an der Grundhälfte ebenſo; Unterſeite weiß; Bruſtmitte mit zitrongelbem Fleck, Bruſt- und Bauchſeiten bräunlichweiß; untere Flügeldecken lebhaft zitrongelb; Schnabel dunkelbraun, Unterſchnabel heller; Auge braun; Füße fleiſchfarben. Das Weibchen iſt dem Männchen ähnlich, doch ſein Schwarz an Kopf, Flügeln und Schwanz weniger tief, mehr olivengrünlichgrau; untere Flügeldecken hellgelb. Die Größe iſt etwas beträchtlicher als die des vorigen. Gundlach hatte irrthümlich angegeben, daß er auch auf Kuba vorkomme, ſpäterhin hat er ſelbſt dies jedoch widerlegt. Näheres über die Lebensweiſe oder ſonſtige Eigenthümlichkeiten iſt nicht bekannt, doch wird er wol in allem dem roſenbrüſtigen Kernbeißer gleichen. In den Handel gelangt er höchſt ſelten und einzeln und dann wol nur in die zoologiſchen Gärten. — In Ruß' „Handbuch" mexikaniſcher Kernbeißer und bei Br. Schwarzkopfknacker. — Le Coccothrauste ou Grosbec du Mexique; Mexican Hawfinch, Black-headed Grosbeak. *Brd.* — Guiraca melanocephala, *Swns.*, *Bp.*, *Brd.*; Fringilla xanthomaschalis, *Wgl.*; Coccothraustes melanocephala, *Rchrds.*; Fringilla melanocephala. *Audb.*, *Rss.* [„Hndbch."]; F. maculata, *Audb.*; Pitylus guttatus. *Lss.*; Coccoborus melanocephalus, *Audb.*; Hedymeles melanocephala, *Cb.*, *Br.*; Fringilla epopoea, *Lchtst.*

Der grüne Kernbeißer [Coccothraustes viridis, *Vll.*] iſt im ganzen Gefieder gelbgrün; Stirn mehr grünlichgelb; Zügel, Geſicht und Oberkehle ſchwarz; ganze Unterſeite lebhaft gelb; Schnabel ſchwarz; Auge braun; Füße bräunlichfleiſchfarben. Größe des europäiſchen Kernbeißers. Seine Heimat iſt ganz Braſilien und auch Guiana. (Burmeiſter zweigt noch einen braſiliſchen Kernbeißer, Coccothranstes brasiliensis, *Cb.*, als beſondre feſtſtehende und nur in Braſilien vorkommende Art ab, doch werden beide wol zuſammenfallen). In Lebensweiſe und allem übrigen ſtimmen ſie ſicherlich mit dem vorigen überein. — Maskenkernknacker (Br.). — Le Grosbec ou Coccothrauste vert; Green Hawfinch. — Coccothraustes cayanensis, *Brss.*; Loxia canadensis (!), *L.*; Coccothraustes viridis, *Vll.*; Pitylus canadensis, *Cv.*; P. personatus, *Lss.*; Caryothraustes viridis, *Cb.*, *Br.*; Fringilla viridis, *Rss.* [„Hndbch."] — (Fringilla cayanensis, *Lchtst.*; F. viridis, *Pr.*, *Wd.* [nec *Vll.*]; Caryothraustes brasiliensis, *Cb.*, *Brmst*).

Der gelbe Kernbeißer [Coccothraustes tibialis] von Koſtarika; oberhalb dunkel-, unterhalb hellgelb; Zügel ſchwarz, Kopfſeiten und Hinterhals ſchwärzlich quergeſtreift; Mantel, Schultern, Flügel, obere Schwanzdecken und Schwanz ſchwarz, aber an Rücken und Schultern jede Feder fahlgelb geſäumt und an den Schwanzdecken weiß geſpitzt; der Flügel auch mit

einer weißen Querbinde. Das Weibchen soll nur matter gefärbt sein. Etwa von Kernbeißergröße. Dr. v. Frantzius beobachtete ihn auf Kostarika, wo er die Maisfelder besuchen und des Gesanges wegen im Käfige gehalten werden soll. Näheres ist nirgends angegeben; sein Gesang gleiche dem des europäischen Gimpels, in welchem Falle er freilich als trefflicher Sänger, wie ein populärer Schriftsteller ihn bezeichnet, nicht gelten könnte. Lebend eingeführt dürfte er bis jetzt noch nicht sein. — Herkulesknacker (Br.). — Pheucticus tibialis, *Brd.*, *Frntz.*

Der graubäuchige Kernbeißer [Coccothraustes poliogaster, *Dbs.*] aus Mexiko und Mittelamerika, von Frantzius auch auf Kostarika gefunden, ist dem grünen Kernbeißer sehr ähnlich, aber an der ganzen Unterseite grau. Er gehört zu den am wenigsten bekannten Vögeln. — Graubauchknacker (Br.) — Pitylus flavocinereus, *Css.*; P. episcopus, *Bp.* — **Den gelbbäuchigen Kernbeißer** [Coccothraustes aureoventris, *Lfrsn.* et *Orb.*] aus Kolumbien, **den grünbäuchigen Kernbeißer** [Coccothraustes chrysopeplus, *Vgrs.*] und **den großschnäbligen Kernbeißer** [Coccothraustes magnirostris, *Bp.*] kann ich hier nur beiläufig erwähnen, da sie vorläufig keine Aussicht zeigen, eingeführt zu werden und näheres über sie auch nicht bekannt ist.

Der rothe Kardinal [Coccothraustes virginianus].

Tafel XIII. Vogel 63.

Mit der tiefen Finsterniß ist laut- und bewegungslose Ruhe in der Vogelstube eingetreten. Kaum glauben wir, daß in diesem Raume mit uns noch etwa zweihundert Wesen athmen; doch eine hastige Bewegung wäre dazu ausreichend, um einige der quecksilbernen kleinen Astrilde aufzustören, und binnen wenigen Minuten würden uns ihrer dann so viele umschwirren und umtoben, daß wir an der erwähnten Thatsache nicht mehr zweifeln könnten. Wir lassen das kleine Gefieder jedoch lieber ruhen und verhalten uns horchend still und regungslos.

Einen eigenthümlichen Eindruck macht es, wenn inmitten der Dunkelheit und Stille nun plötzlich ein lauter langgezogener Ton erschallt, der von Zeit zu Zeit wiederholt wird. Wir sind ja gewöhnt, Vogellieder nur bei heiterm Sonnenschein zu hören oder der Klage der Nachtigal mindestens bei silbernem Mondlicht zu lauschen. Jedenfalls finden wir aber diese Laute, welche immer häufiger sich erheben und zuletzt in einen zusammenhängenden Gesang übergehen, durchaus wohlklingend und angenehm. Der Sänger ist eben der rothe Kardinal, ein schöner dunkelrother Vogel mit scharlachrothem Kopfe nebst ebensolchem Federbusch, an Gesicht und Kehle tiefschwarz und mit starkem lichtkorallenrothen Schnabel; von der Größe des europäischen Kernbeißers. Das Weibchen ist am ganzen obern Körper röthlichgraubraun, an Stirn, Augenbrauen und Haube bräunlichroth und mit hellrothem Schnabel.

Seine Heimat erstreckt sich über das mittlere und südliche Nordamerika, nach Baird bis zum Missouri, sowie auch über Kalifornien und Mexiko. Einzeln kommt er jedoch auch ziemlich weit nördlich hinauf vor, so nach Prinz v. Wied im State New-York und in gelinden Wintern als Standvogel westlich vom Alleghany-Gebirge am Ohio und Wabasch. Je weiter nach Süden zu, desto zahlreicher soll er auftreten. Auf den Bermuda-Inseln lebt er nach Wedder-

burn und Hurdis in den Gärten als Standvogel und nistet alljährlich zweimal; die Jungen der ersten Brut werden im April, die der zweiten im Juli flügge. Auch Baird bestätigt diese Angaben.

Den ältesten Schriftstellern war er schon bekannt; Seeligmann, Buffon u. A. gaben Abbildungen und bereits zur Zeit des erstern wurde er lebend nach England gebracht, wo man ihn schon damals um des Gesangs und der Schönheit willen schätzte. Der ihm beigelegte Namen, die virginische Nachtigal, sei dahin zu erklären, daß er nachtigalähnliche oder gleiche Strofen hören lasse. Scopoli hatte gemeint, daß man ihm die Bezeichnung Kardinal in spöttischer Weise gegeben, während Buffon gegen eine solche Behauptung Verwahrung einlegt und hervorhebt, daß sich die Wissenschaft niemals zum Spott über die Religion hergeben könne. Letzterer vergleicht ihn mit dem Hakengimpel und sagt, daß er, abgesehen von dem Schopf, als eine Spielart desselben erachtet werden dürfe. Uebrigens singe nicht allein das Männchen, sondern auch das Weibchen fleißig. Ebenso preist Vieillot ihn, gleicherweise des prächtigen Gefieders, als des Gesanges wegen. Man dürfe ihm zur Fütterung nur Hirse bieten, denn Hanf, so gern er ihn fresse, sei ihm durchaus schädlich. Näheres gibt der Forscher aber über diesen, bereits in jener Zeit vielbekannten und beliebten Vogel leider nicht an. Bechstein sagt, daß er den Namen Nachtigal mit vollem Recht trage, denn sein Gesang habe mit dem dieser Königin unter den Singvögeln die größte Aehnlichkeit. Derselbe sei so laut, daß dem Hörer die Ohren gellen, und ertöne im Käfige das ganze Jahr hindurch, die Mauserzeit allein ausgenommen. In der Freiheit liebe er türkischen Weizen und Buchweizen, von welchem er oft ganze Haufen zusammentrage, sie künstlich mit Laub und Zweigen bedecke und nur ein kleines Loch zum Eingange in seine Vorrathskammer offen lasse; im Zimmer füttre man ihn mit Hirse, Kanarien-, Rübsamen und Hanf und er befinde sich dabei viele Jahre recht wohl. Man habe in England schon den Versuch gemacht, ihn in Vogelhäusern, welche frei im Garten stehen, brüten zu lassen. — Damals kostete in Deutschland das Pärchen 6 bis 8 Louisd'or. Seit Bechstein her ist er sodann fortwährend eingeführt und bis zur Gegenwart hinauf als Stubenvogel allenthalben gern gesehen.

Alle vogelkundigen Schriftsteller Amerikas sind entzückt von seinem Gesange; sie schwärmen aber nicht nur von diesem, sondern auch von der Schönheit seines Gefieders, welches schon von weitem in die Augen fällt und überall der Landschaft zu einer großen Zierde gereicht. Audubon sagt, daß man ihn tief im einsamen Walde, in den Baum- und Gemüsegärten, in den weiten baumlosen Feldern, ebenso wie inmitten der Städte und Dörfer finde. Namentlich in den südlichen Staten könne man selten einen Garten betreten, ohne einen der prächtigen rothen Vögel durch die Zweige der Bäume huschen zu sehen. „Aber", fährt

er fort, „wo der Kardinal auch erscheint, überall ist er willkommen, ein Liebling Jedermanns, weil seine Farbe so glänzendschön, sein Gesang so reich und melodisch ist. Der letztere beginnt laut und klar und erinnert dann an die schönsten Töne des Flageolets; mehr und mehr sinkt er aber, bis er zuletzt ganz leise erstirbt. In der Zeit der Liebe wird das Lied mit großer Macht vorgetragen, denn der Vogel ist sich dann seiner Vollkraft bewußt, er schwellt seine Brust, breitet den Schwanz fächerartig aus, schlägt mit den Flügeln und wendet den Kopf bald rechts, bald links, gleichsam als wolle er sein eignes Entzücken über die wundervollen Töne zu erkennen geben. Immer von neuem werden die Melodien wiederholt und der Sänger schweigt nur, um Luft zu schöpfen. Lange vorher, ehe die Sonne den Himmel im Osten vergoldet, beginnt der Gesang und verstummt nur, wenn das flammende Gestirn so heiße Stralen herabsendet, daß diese alles Leben in der Natur zu zeitweiliger Ruhe zwingen. Sobald aber die nahende Kühlung die verschmachtenden Thiere wieder hochaufathmen läßt, hebt das Lied von neuem an, und so kräftig, als habe der Sänger noch niemals seine Lunge angestrengt, ruft er das Echo wach in der ganzen Nachbarschaft. Nicht eher geht er zur Ruhe, als bis die Abendschatten sich um ihn her verbreiten. In dieser Weise sucht der Rothvogel Tag für Tag die Langeweile des brütenden Weibchens zu vertreiben und von Zeit zu Zeit stimmt auch dieses, jedoch leiser, mit der Bescheidenheit seines Geschlechts, mit ein. Wenige Amerikaner verweigern diesem holden Sänger den Zoll der Bewunderung. Wie erfreulich ist es, bei trüber Witterung, wenn das Dunkel schon die Wälder deckt und man die Nacht bereits hereingebrochen wähnt, dann plötzlich die herrlichen wohlbekannten Töne unseres Lieblingsvogels erklingen zu hören! Gar oft ist mir dieses Vergnügen zutheil geworden und um keinen Preis möchte ich es für immer missen."

Mit kaum geringerer Begeisterung spricht Wilson von dem Rothvogel und von den amerikanischen Singvögeln überhaupt. „Man hat den Kardinal oft als die virginische Nachtigal bezeichnet und in der That verdient er diesen Namen, der Klarheit und Mannigfaltigkeit seiner Töne wegen, welche ebenso wechsel- als klangvoll sind und vom Beginn des März bis in den September hinein vernommen werden. Sein Gesang ist dem der europäischen Nachtigal völlig gleich und doch stehen seine Töne, so herrlich sie auch erklingen mögen, noch weit unter denen unserer Walddrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*) und selbst unter denen unserer braunen Drossel (Turdus fuscescens, *Stph.*). Unsere unübertreffliche Spottdrossel (Turdus polyglottus, *L.*) aber ist längst als der Nachtigal ebenbürtig bekannt; und diese Vögel bilden noch nicht einmal ein Zehntel aller unserer herrlichen Sänger. Könnten die Europäer an einem Maiabend gegen Sonnenuntergang an unseren Waldsäumen dem Vogelgesange lauschen, sie würden wahrlich vor Staunen und Bewunderung sich kaum zu fassen vermögen! Die Meinung

aber, welche man gewöhnlich in Europa hegt, daß der Vogelgesang in den Wäldern Amerikas mit den Vogelliedern in Europa sich nicht messen könne, würde sicherlich schwinden. Man kann freilich keinen Vergleich ziehen zwischen den tiefen Wäldern Amerikas und den fruchtbaren Feldern Englands, denn es ist ja wohlbekannt, daß es in den ersteren nur selten Singvögel gibt; wenn man aber gleiche Oertlichkeiten in den Vereinigten Staten und in Europa inbetrachtzieht, so wird man zweifellos finden, daß jene nicht nachstehen und daß gerade der Westen in dieser Hinsicht bevorzugt ist. Die wenigen Singvögel, welche bis jetzt von hier nach Europa gebracht worden, haben die hervorragendsten Kenner in Verwunderung gesetzt."

„Ebenso durch herrliche Farbenpracht, als durch lebhaften Gesang ausgezeichnet", sagt J. Straubenmüller in New-York, „hält man ihn viel in Käfigen. Nicht die Männchen allein, sondern auch die Weibchen singen. Die Töne sind laut und klar wie die einer Flöte; dann nehmen sie ab, werden sanft und weich und schwellen wiederum an, sodaß sie manchmal belästigen. Man hat die Erfahrung gemacht, daß ein solcher Vogel 21 Jahre hindurch in der Gefangenschaft ausdauerte."

Seltsamerweise sind die deutschen Naturforscher, welche den Gesang des Vogels in seiner Heimat gehört haben, von denselben keineswegs besonders erbaut. Prinz von Wied sagt kurz, daß derselbe mehr sonderbar als angenehm erklinge; der Vogel werde eigentlich nur um seiner prächtigen Farbe willen im Käfige gehalten. Cabanis findet ihn ebenfalls nicht außerordentlich und Gerhardt sagt nur, er laute wie dihu dui dui diu diu diu diu diu di und entspreche im übrigen nicht der Schönheit seines Gefieders.

Nach den Berichten sowol der amerikanischen als auch der deutschen Schriftsteller ist die Lebensweise ziemlich genau beobachtet. Er hält sich während der Frühlings- und Sommermonate parweise, im Herbst und Winter dagegen in kleinen Flügen, welche aus den Alten mit den erwachsenen Jungen bestehen, an den von Audubon genannten Orten auf. In gelinden Wintern bleibt er auch in den nördlichen Staten, wie in den südlichen immer, in der Heimat und kommt mit den verschiedenen Ammersperlingen, Ammern, Tauben u. a. zusammen in die ländlichen Gehöfte, auf die Höfe und vor die Scheunen und fliegt gern in die offenen Ställe, auf Kornböden u. a.; er übernachtet in den dichten Kronen der Obstbäume oder auch in den Heuschobern. Jeder strenge Winter dagegen zwingt ihn, südwärts zu wandern und er streicht dann überall umher, wo er Nahrung findet. Mit dem Beginn des Monats März kehrt er bereits wieder zurück und zwar erscheinen, ebenso wie bei manchen unserer europäischen Vögel, die Männchen früher als die Weibchen. Im übrigen ist sein Freileben dem der verwandten Kernbeißer wenig ähnlich. Nicht wie jene sitzt er stundenlang still

auf einer Stelle, sondern er ist stets ruhelos und in Bewegung, fliegt hin und her, von Busch zu Busch, hüpft auf dem Boden, schlüpft gewandt durch das dichteste Gebüsch und fliegt im kurzen, ruckweisen, harten und geräuschvollen Fluge. Im Sitzen trägt er den Leib wagerecht, läßt den Schwanz gewöhnlich gerade herabhängen, stelzt ihn aber auch zuweilen; fortwährendes Schwippen und Wippen der Flügel und des Schwanzes begleiten jede seiner Bewegungen. Wenig scheu, ist er leicht zu schießen, doch verfolgt man ihn wenig, im Gegentheil ist er bei den Amerikanern, wie bei den Deutschen dort allgemein beliebt und wird gehegt und beschützt und gefangen nur, um ihn als Stubenvogel zu halten. Wilson gibt als vorzugsweise Nahrung Mais an; außerdem frißt er allerlei Sämereien, Beeren, Kirschen und andere Früchte, sowie auch Kerbthiere. Sein Lieblingsfutter sollen die Blüten des Zuckerahorns sein, sowie auch Holunderbeeren.

Je nach der Witterung, früher oder später im März, sondern sich die einzelnen Pärchen von den bis dahin umherschweifenden Flügen ab, suchen die Brutplätze auf und zwischen den in der Nähe wohnenden Männchen beginnen nun eifersüchtige Kämpfe. Streitlustig stürzen sie einander entgegen, balgen sich in der Luft oder im Gesträuch wüthend umher, bis eines das andere besiegt hat und es unter schrillem Geschrei weithin jagt. Der rückkehrende Sieger läßt dann einen schmetternden Jubelgesang erschallen.

Das Nest wird sehr verschiedenartig angelegt. Der Oertlichkeit entsprechend steht es auf einem einsamen Baum inmitten des Feldes, am Waldesrande, in einem freien Gebüsch oder tief im finstern Dickicht und nicht selten befindet es sich in unmittelbarer Nähe eines Gehöfts; am häufigsten sieht man es nahe bei einem Gewässer. Dünne, biegsame Zweige, Halme und Rebenschlingen, darüber trockene Blätter, Moos und Fasern bilden den Bau, und die innere Mulde soll nur mit zarten Grashalmen ausgelegt werden. Das Gelege besteht in 4 bis 6 Eiern. In nördlicheren Gegenden findet regelmäßig blos eine Brut im Jahre statt, während in den südlicheren jedes Pärchen ihrer zwei bis drei macht.

Eine ausführliche einigermaßen abweichende Schilderung des Freilebens bringt Th. Gentry. Auch er lobt den Kardinal zunächst der Pracht seines Gefieders und zugleich des herrlichen Gesangs wegen. „In Pennsylvanien ist er in feuchten niedrigen Wäldern mit vielem Wachholder- u. a. Gebüsch und ebenso an den mit Erlen bewachsenen Wasserläufen ein ständiger Gast. Hier zeigt er sich scheu und furchtsam, sodaß man sich ihm nur schwer nähern kann. Die Pärchen scheinen in dauernder Ehe zu leben, denn sie kommen gemeinsam an und äußern auch außer der Brutzeit gewisse Zärtlichkeiten. Ihren Aufenthalt bildet vorzugsweise niedriges Gebüsch und nahrungsuchend sieht man sie fast immer an der Erde. Den Gesang darf man als wechselvoll und recht melodisch erachten; unschicklicherweise aber wird der Vogel als Nachtigal von Amerika bezeichnet. Denn um

dieſem Namen zu entſprechen, entbehrt ſein Lied viel zu ſehr der Fülle, Mannigfaltigkeit und des ſüßen Wohlklangs, welche das jener Sängerin hat. Auch das Weibchen wetteifert an emſigem Singen mit dem Männchen, was doch bei den Vögeln im allgemeinen ſelten der Fall iſt. In hellen Mondſcheinnächten erſchallt der Geſang des Männchens oft bis zum Tagesanbruch. Es ſei mir geſtattet, denſelben durch folgende Silben, welche ſchnell, laut und rein vorgetragen werden, zu veranſchaulichen: hwi-tſchii-hwi-tſchii-whi-tſchii, ku-tſchi-ku-ſchi-hwii-tu-tiu-tiu-kwiit (hwi-chēē-hwi-chēē-hwĭ-chēē, koo-chē-koo-chē-whēē-to-tiou-tiou-kwēēt). In der Erregung ruft er ein lautes und ſcharfes tſchip. Die Nahrung beſteht in Kräuter- und Gräſerſämereien nebſt Beeren u. a. Früchten, ſowie Kerbthieren in allen Verwandlungsſtufen. Seine große Gefräßigkeit macht ihn ſo dreiſt, daß er winters nicht allein vor den Ställen der Farmer auf den Höfen u. a. erſcheint, ſondern auch an ſolchen Orten, wo man ihn eifrig verfolgt. Man fängt ihn in Schlingen, welche entweder mit Buchweizen, nach dem er ſehr begierig iſt, geködert ſind oder für welche ein Weibchen als Lockvogel benutzt wird. Wenn man kein lebendes hat, ſo kann man auch ein ausgeſtopftes ſo aufſtellen, daß es weithin zu ſehen iſt, während Jemand im Verſteck den Lockruf nachahmt. Gegen die Mitte des Monats April hin beginnt die Niſtzeit. Ein Dorngeſträuch von Hagebutten oder dergleichen, auch wol ein Dickicht von wilden Reben oder virginiſchem Wachholder birgt das Neſt, welches in etwa vier Tagen von beiden Gatten des Pärchens erbaut wird und zwar auf einer Grundlage von Reiſern, Krautſtengeln und Grashalmen, innen mit zarten Gräſern ausgelegt und von der Größe eines Droſſelneſtes. Es ſteht ebenſowol in der Ebene als auch im Hochlande und enthält 4 bis 5 Eier, von denen täglich eins gelegt wird. Das Weibchen brütet allein, gefüttert und bewacht vom Männchen, und die Brutdauer beträgt 14 Tage. Gleich vielen anderen Vögeln ſucht das Männchen den nahenden Menſchen oder jeden andern Feind durch Klagegeſchrei und wunderliche Geberden von dem Neſt abzulenken. In jedem Jahre werden zwei Bruten gemacht. Etwa 15 Tage alt, verlaſſen die Jungen das Neſt und nach weiteren 11 oder 12 Tagen ſind ſie ſelbſtändig, doch bleiben ſie noch lange mit den Alten zuſammen. Sie werden anfangs mit allerlei weichen Kerbthieren, deren Larven und Bruten und ſpäterhin mit Beeren und Sämereien gefüttert."

Auch in der Gefangenſchaft ſind Lebensweiſe, Brutentwicklung und alle übrigen Eigenthümlichkeiten bei ihm ſo eingehend beobachtet, als kaum bei einem andern Vogel, und zwar erklärlicherweiſe deshalb, weil er eben zu den beliebteſten unter allen fremdländiſchen gehört. Gleich manchen Prachtfinken u. a. iſt er bereits etwa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von Liebhabern in Holland und dann auch in England gezüchtet worden. Leider ſind jedoch keine zuverläſſigen Aufzeichnungen über derartige Erfolge vorhanden. In Deutſchland hat

ihn zuerst Herr Hermann Leuckfeld in Nordhausen gezüchtet, späterhin ist dies auch in verschiedenen zoologischen Gärten, insbesondre in Köln von dem damaligen Direktor Herrn Dr. Bodinus, und in neuerer Zeit auch in zahlreichen Vogelstuben erreicht worden.

Herr Leuckfeld erzählte seine Beobachtungen in folgendem: „Längere Zeit hindurch hielt ich ein Pärchen rother Kardinäle, ohne daß dieselben sich um einander bekümmerten; im Gegentheil, fast immer lagen sie einander in den Haren oder vielmehr in den Federn. Nach dem Tode des Männchens bezog ich ein andres sehr schönes, junges, damals von Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg, welches sogleich anfing, mit dem Weibchen schönzuthun, was von demselben auch erwidert wurde. Ich beherbergte die Kardinäle in einer Vogelstube zwischen verschiedenen Finkenarten u. a. m. freifliegend und bemerkte bald zu meiner großen Freude, daß sie dicht an der Wand in einem Tannengebüsch den Nestbau begannen. Als Grundlage für das Nest brachten sie biegsames Reisig an und darüber nur noch Papierstreifen, obwol auch mancherlei andere Baustoffe vorhanden waren. Das Männchen arbeitete am meisten daran, brachte auch die nöthige Rundung durch Drehen mit dem Körper hervor und lockte dabei fortwährend mit den bekannten, schönen, langgezogenen Tönen. Zu weiterm gelangten sie aber nicht; entweder war es bereits zu spät im Jahre, denn der Herbst nahte schon, oder sie fanden sich durch die übrigen Vögel gestört, vielleicht war auch beides der Fall. Zugleich zeigten sie sich überaus unverträglich, denn die kleineren Vögel wurden von ihnen in grausamster Weise verfolgt, und nicht selten lebensgefährlich verletzt. Dieser Bösartigkeit halber setzte ich sie im nächsten Jahre allein in eine halbdunkle Kammer, welche ich durch einen kleinen Vorban aus Drahtgitter von meinem Geschäftslokal trennen ließ. Der Raum wurde mit feinem Kies ausgestreut, mit Sitzstangen und einem Tannenbäumchen nebst einem halboffnen Nistkasten ausgestattet und nun dem Pärchen allein überlassen. Sie schritten bald zur Brut. Sehr interessant war es, zu beobachten, wie das Männchen sein Weibchen zu ehelichen Liebkosungen lockt. Mit halbausgebreiteten Flügeln, den Schwanz fächerartig gespreizt, meistens tief hinabgesenkt, doch zuweilen, dem Pfau ähnlich in die Höhe schnellend, den Körper ganz zurückbiegend und den Kopf abwechselnd bald nach der einen, bald nach der andern Seite schief haltend, hüpft es in solcher drolligen Stellung hinter dem Weibchen her und läßt dabei seine schönen langgezogenen, denen der Nachtigal allerdings ähnlichen Töne erschallen. Bald legte das Weibchen, ohne vorher Lust zum Nestbau gezeigt zu haben, fünf Eier von der Sitzstange herab, sodaß ich zu meinem großen Verdruße an jedem Tage ein zerbrochenes entfernen mußte. Jetzt faßte ich den Entschluß, ihnen hinsichtlich des Nestbaus zuhilfe zu kommen. Dies ist bekanntlich bei fast allen Vögeln, mit Ausnahme der Kanarien nicht

rathsam, hier glückte es jedoch. Ich hing in einer Ecke des Raumes einen alten hölzernen Käfig auf, ungefähr von der doppelten Größe eines Harzerbauerchens, mit einer offnen Seite und in demselben drehte ich eine Nestgrundlage aus frischen, biegsamen Besenreisern zusammen. Zu meiner Freude nahmen sie diese Vorrichtung an und bauten sie mit Papierstreifen und feinen langen Bastfasern aus. Das fertige Nest hatte etwa den Umfang des einer Drossel, enthielt aber viele aufgeschichtete Baustoffe und sah daher sehr hoch aus. Bei dieser Brut, sowie auch bei allen späteren baute nur das Weibchen allein. Das Gelege bestand in vier Eiern und wurde wiederum vom Weibchen allein bebrütet. Nach vierzehntägiger Brutdauer hörte ich — es war gerade der erste Pfingsttag — deutlich das Zirpen der Jungen, und nun beeilte ich mich, allerlei Futter zu bieten und zwar eingequellte Sämereien, hartgekochtes und geriebnes Eigelb, Ameisenpuppen und Mehlwürmer. Die Alten beachteten jedoch zunächst nur die letzteren nebst ein wenig Eigelb. Am nächsten Tage gab ich frischen, weißen Quarkkäse, über welchen sie mit wahrer Gier herfielen und von nun an nur mit solchem und Mehlwürmern fütterten; sie verbrauchten täglich ziemlich einen ganzen Käse und ein Schock der letzteren. Zur Stillung des eignen Hungers fraßen die Alten fast nur Sämereien. Bereits am zehnten Tage hüpften die Jungen aus dem Neste, trotzdem der Schwanz und die Schwingen noch beiweitem nicht völlig entwickelt waren. Sie sahen sehr häßlich und hochbeinig aus, doch wuchsen sie rasch heran und erreichten bald die Größe der Alten. Alle vier erschienen ganz gleichmäßig dunkelbraungrau, fast wie das alte Weibchen, doch ohne jedes rothe Abzeichen und mit schwarzbraunem Schnabel. Sie wurden von beiden Alten gemeinsam gefüttert und zwar noch sehr lange Zeit, nachdem sie schon recht gut selber fressen konnten. Sobald das Pärchen jedoch zur zweiten Brut schritt, begann zuerst das Weibchen die Jungen zu beißen, während das Männchen sie noch immer fütterte; nicht lange aber, da wurden sie von beiden und dann vom Männchen sogar am meisten gemißhandelt, sodaß ich sie aus dem Raume entfernen mußte. Ich sperrte sie zusammen in ein großes Bauer, wo sie sich jedoch unter einander ebenfalls schlecht vertrugen und sich gegenseitig die Federn auszupften, sodaß sie bald halbnackt und blutrünstig aussahen. Zuletzt war ich genöthigt, ein jedes von ihnen allein zu setzen. Als ich später ein junges Weibchen versuchsweise zu dem alten Pare setzte, gerieth das des letztern in eine so eifersüchtige Wuth, daß es über das junge herfiel und dasselbe tödtlich verwundete, bevor ich dies noch verhindern konnte. Will man also rothe Kardinäle züchten, so darf man niemals zwei Pärchen zusammenbringen, und man sollte auch keine anderen Vögel in demselben Raume halten. Die Jungen verfärbten sich bald, und zwar waren es drei Männchen und ein Weibchen. Die Alten nisteten nur noch einmal in demselben Jahre und brachten in gleicher Weise drei Junge, und

zwar zwei Männchen und ein Weibchen auf. Im nächstfolgenden Jahre hatte ich in der Heckkammer einige Veränderungen getroffen, namentlich aber war das Gebauerchen, in welchem die Vögel genistet, verkramt und obwol ich ein andres ähnliches angebracht, zeigten sie doch durchaus keine Neigung zur Brut. Nachdem ich dann aber viel später jenen alten Nistkäfig wieder aufgefunden und ihn an derselben Stelle angebracht hatte, begannen sie sogleich noch mit einer Brut, obwol es bereits im Monat August war. Einen merkwürdigen Beweis von der Lebenszähigkeit der Jungen muß ich noch anführen. Bei der letzten Hecke fand ich ein solches noch ganz nacktes anscheinend leblos auf dem Boden liegen; es war wahrscheinlich beim schnellen Abfliegen des alten Weibchens aus dem Neste gerissen worden und von dem letztern, etwa $1_{,50}$ Meter hoch, auf den Boden hinabgefallen. Ich hielt es für todt, bemerkte aber bald, nachdem ich es in der warmen Hand gehabt, daß es noch ein Lebensfünkchen zeigte. Schnell erwärmte ich es daher, und das Geschöpfchen kam nicht allein wieder zum Leben, sondern erholte sich noch vollständig und wurde mit den anderen groß, nachdem ich es in das Nest zurückgebracht hatte. — Will man die Kardinäle lebens- und nistfähig erhalten, so muß man sie vor starker Wärme behüten. Ich habe die Beobachtung gemacht und bei einem meiner Bekannten bestätigt gefunden, daß ein Vogel dieser Art, in die Nähe eines nur einigermaßen stark geheizten Ofens gebracht, in Krämpfe verfiel. Ebenso darf man ihnen außerhalb der Brutzeit nur selten Mehlwürmer geben, wol aber möglichst oft Grünkraut."

Nach vieljahrelangen Erfahrungen in meiner Vogelstube kann ich die obigen werthvollen Mittheilungen noch einigermaßen ergänzen. Als ich mit den Züchtungen fremdländischer Vögel begann, gehörte der rothe Kardinal noch zu denen, von welchen man nur die Männchen, theils zum Schmuck, theils als Sänger kaufte; die Weibchen wurden daher garnicht oder doch nur selten und einzeln mit eingeführt. Nur mit großer Mühe konnte ich ein solches erlangen und durch einen Zufall erhielt ich dann zwei zugleich, indem ich das erste bei Herrn Hagenbeck bestellt hatte, während mir Herr Leuckfeld ein andres von seiner Zucht sandte. Somit fing ich mit zwei Pärchen zugleich meine Versuche an. Die Männchen erschienen sehr verschieden, sowol im Aussehen als auch im Gesange. Das eine war ein alter Vogel, welcher bereits seit mehreren Jahren im Käfige gelebt, wodurch seine Färbung sich in ein matteres und abgebleichtes Roth verwandelt hatte, das andre, unlängst erst aus der Heimat gekommen, prangte noch im prächtigsten Schmuck glänzenddunkelrothen Gefieders. Außerordentlich kräftig und sehr fleißig ließ das erstere sein Lied erschallen, das letztere hingegen sang nur bruchstückweise und auch keineswegs so klar und stark. Ich hatte nun das ältere Männchen mit dem gezüchteten Weibchen zusammengebracht, und dieses Par hielt ich in einem sehr großen Käfige, das andre aber beherbergte ich

freifliegend in einem Verschlage mit Nymfen- und Wellensittichen zusammen. Als Nestvorrichtungen hatte ich mehrere der von Herrn Leuckfeld beschriebenen halboffenen Nistbauerchen, ferner in einer Ecke ein großes und dichtes Gebüsch und schließlich noch einen aus ganz frischen Birkenreisern geflochtenen, der Größe der Kardinäle entsprechenden Korb, welcher inmitten eines großen und dichten Reiserbesens stand, angebracht. Beide Pärchen wählten für alle Bruten diese letztre Vorrichtung. Vorläufig gelangte jedoch nur das erstere Par zum Ziel, während das letztere sich etwa sechs Wochen hindurch durchaus unthätig zeigte. Das gezüchtete junge Weibchen baute das Nest ganz allein, indem das Männchen nur hin und wieder einen Halm hinzutrug. In den Nistkorb wurde eine Unterlage aus abgebissenen biegsamen Birkenreisern rundgelegt und darüber eine Schicht von dünnen und sehr weichen Papierschnitzeln in großer Masse und auf diese wiederum aus Sackfäden eine gut gerundete Nestmulde geformt. Die Vögel waren indessen äußerst wild und scheu, und da ich in dieser Zeit gerade viele Besuche in der Vogelstube erhielt, so wurden sie so sehr gestört, daß das Weibchen eines Tages in der Hast beim Abfliegen das Genist aus dem Nestkorbe herausriß und dann nach einander vier Eier in einer Ecke auf den Boden des Käfigs legte. Ich versuchte nun ebenfalls, wie Herr Leuckfeld, ihnen zu helfen, packte das ganze fein säuberlich in den Korb und dann die Eier hinein. Zu meinem Bedauern wurde aber dies Nest nicht angenommen. Das zweite Pärchen begann endlich, nachdem ich es aus der Kammer, wo es von den Wellensittichen wol immer beunruhigt worden, in einen Käfig gebracht und ihm hier eine Unterlage aus weichen Bastfasern gegeben, zu nisten; das Weibchen brütete auf einem Gelege von fünf Eiern vortrefflich, tödtete dann aber sämmtliche Junge, sobald sie die Schale durchbrachen. Auch zeigte es sich gegen andere Vögel sehr bösartig. Sobald nämlich ein solcher dem in der Vogelstube stehenden Käfige zunahe kam, wurde er sofort bei den Beinen erpackt, durch das Drahtgitter hinabgerissen, ihm dann der Schädel zerquetscht und sein Gehirn gefressen. Nachdem ich dies Weibchen abgeschafft und ein andres erhalten, nisteten beide Pärchen mehrmals gut und ich kann den Verlauf der Brut im allgemeinen, wie folgt, schildern.

Das Nest wird in der Regel vom Weibchen allein erbaut, und zwar am liebsten frei im Gebüsch, auf einem dichtästigen wagerechten Zweige, wo es dann auf einer Grundlage von Reisern und Moos oder auch Papierstreifen aus Würzelchen, Bastfasern, Fäden u. a. geformt und mit Agavefasern sorgsam gerundet ist. Seltener wählt das Pärchen ein oben offenes Bauerchen und nur im Nothfall, wenn der Nestbau garnicht zustande kommen will, darf man ihnen in der bereits beschriebenen Weise hilfeleisten. Einen Tag um den andern wird ein Ei gelegt. Das Weibchen brütet stets allein und wird sogar vom Männchen meistens nicht einmal gefüttert, dagegen bewacht dieses sehr eifersüchtig die Brut und jagt jeden

nahenden fremden Vogel fort. Am vierzehnten Tage kommt das erste der Jungen aus. Die beiden Alten füttern diese gemeinschaftlich, und ihre Entwickelung schreitet sehr rasch vorwärts; am fünften Tage öffnen sie die Augen; zwischen dem zehnten bis zweiundzwanzigsten, gewöhnlich aber bereits früher verlassen sie das Nest. Erst in der fünften Woche erlangen sie volle Befiederung und die Größe der Alten, während das Weibchen inzwischen längst wieder nistet. Der Verlauf einer jeden Brut dürfte sich auf etwa fünf bis sechs Wochen abrunden. Schon in der fünften Woche nach dem Flüggewerden beginnt eine Verfärbung dahin, daß der röthliche Ton des Gefieders immer kräftiger hervortritt, die rothen Abzeichen erscheinen und ebenso der Schnabel durch Fahlgelb und Gelbroth in Roth übergeht. Im Frühjahr des dritten Jahres aber bekommt das junge Männchen erst die volle glänzende Farbe und den korallrothen Schnabel. Daher ist es nicht selten der Fall, daß sich zum Verdruß des Besitzers ein angebliches Weibchen gerade zur beginnenden Nistzeit als ein junges Männchen entpuppt.

Inhinsicht des Gesanges ist es außerordentlich schwer, ein sicheres Urtheil festzustellen. Zunächst kommt der Umstand zur Geltung, daß bei der Beurtheilung der Vogellieder im allgemeinen die Naturumgebung ihre Einflüsse in bedeutungsvoller Weise geltend macht; sodann ist der Vogel im Käfige, sei es infolge überstandener Leiden beim Fange und auf der Reise, oder sei es infolge unrichtiger Behandlung und Verpflegung, meistens nicht imstande, seine naturgemäße Gesangkunst zu entfalten; schließlich aber muß auch der Umstand inbetracht gezogen werden, daß die Begabung der einzelnen Sänger doch eine überaus verschiedenartige ist. Im allgemeinen dürfte der rothe Kardinal wol zu den hervorragenderen Sängern gezählt werden können; nur wird sein sonst so angenehmer Gesang im Zimmer, insbesondre für nervenschwache Personen, nicht selten unerträglich, weil er zu stark schallt. Die Liebhaber in Deutschland sind übrigens ziemlich einstimmig im Lobe desselben und hören namentlich die langgezogenen flötenden Töne gern. Herr Bruno Günther hebt besonders hervor, daß dieser Vogel vom März an unermüdlich und zwar von morgens 3 Uhr „seinen angenehmen Schlag mit dem schönen Schluß trrrrrrr“ bis zum Abend erschallen läßt, dann nur während der spät im Herbst eintretenden Mauser schweigt und bereits im ersten Drittel des Dezembers wieder zu singen beginnt; selbstverständlich nur bei bester Pflege. Betrachten wir im übrigen die Schönheit seiner Erscheinung, die Leichtigkeit und Billigkeit seiner Unterhaltung, seine kräftige Ausdauer, welche selbst manchen übelen Einflüssen widersteht und schließlich auch seine nicht besonders schwierige Züchtung, so müssen wir anerkennen, daß er es verdient, zu den geschätztesten Stubenvögeln gezählt zu werden.

Im Laufe der letzten Jahre hat man, wie bereits erwähnt, vielfach glückliche Zucht sowol freifliegend in der Vogelstube, als auch in entsprechend eingerichteten

großen Käfigen erzielt und die inbetreff derselben veröffentlichten Erfahrungen stimmen im wesentlichen mit den vorstehend mitgetheilten überein. Wenn die Alten, entweder Männchen oder Weibchen, die Jungen selber tödten und auffressen, wie dies leider nicht selten vorkommt, so liegt es in der Regel entweder an dem Mangel geeigneten Futters oder darin, daß sich die Vögel nicht sicher genug fühlen, um die volle Elternliebe zu entfalten, schließlich auch wol in ganz besondrer Bösartigkeit. Um trotzdem zum guten Ergebniß zu gelangen, bedarf es der größten Aufmerksamkeit, damit man die Ursache ermitteln und, wenn möglich, abstellen kann. Herr Pfarrer Winkler in Fischenthal in Zürich hielt rothe, graue, Dominikaner- und grüne Kardinäle zusammen in einem Raum, in welchem sie ziemlich friedlich mit einander lebten; doch zur nahenden Nistzeit mit dem Beginn des Monats April fingen sie an, einander in erbitterter Weise zu befehden, sodaß sie getrennt und jedes Pärchen abgesondert werden mußte. Die rothen zeigten sich in der Herstellung der Nester überaus lässig, sodaß sie entweder auf den kahlen Boden des Körbchens die Eier legten oder fortwährend Baustoffe eintrugen und das Gelege überdeckten. Meines Erachtens war dies lediglich eine Folge der gegenseitigen Beunruhigungen oder doch Erregungen. Einzeln gehalten baut das Pärchen, falls es einerseits nicht zu junge oder andrerseits nicht zu alte, stürmisch-wilde Vögel sind, in der Regel ein gutes Nest, oder es nimmt doch die Hilfe zur Herstellung desselben an. In einem solchen Falle schob Herr Wiener in London eine Filzplatte unter die auf dem bloßen Korbe liegenden Eier und auf derselben wurden die Jungen erbrütet. Infolge einer Störung aber vernichteten die Alten die letzteren, und da man dies ja bereits mehrfach beobachtet hat, so sei vor jeder Beunruhigung dringend gewarnt, namentlich wenn das Par nicht ausreichend zahm ist.

Ueber die Parung und das Liebesspiel berichtet Herr Lithograph Farsky in Prag: „Seit nahezu zwei Jahren besaß ich ein prachtvolles Männchen, welches sehr friedliebend war, selbst gegen die kleinen Astrilde und höchstens einen Kampf mit seinem eignen Spiegelbilde im Fensterglase unternahm. Als ich dann ein Weibchen anschaffte und dieses in einem Käfige ins Vogelzimmer brachte, entfaltete das Männchen unbeschreiblich liebenswürdige, reizende Bewegungen und lockte mit wehmüthig-süßen, förmlich rührenden Tönen. Trotzdem war das Weibchen nicht zu beruhigen, sondern schoß wild im Bauer umher. Nach acht Tagen versuchte ich, beide in einem großen Käfige zusammenzubringen, aber ich mußte sie schleunigst trennen, da das Männchen mit Ungestüm das Weibchen verfolgte und letzteres mit Angstgeschrei vor ihm aus einer Ecke in die andre tobte. Erst im nächsten Frühjahre konnte ich sie wieder zusammensetzen und nun folgte das Männchen dem zirpenden Weibchen mit Locktönen und Liebesbezeigungen. Plötzlich wechselte das Par die Rollen; das Weibchen lockte und sprang vor, das Männchen

zirpte und sprang beiseite; jenes begann nun den ganzen Gesang dieses, aber mit herrlichen Molltönen zu schlagen und führte dann girrend gleichsam einen Tanz auf, welchen ein andermal das Männchen wiederholte, jedoch noch weit komischer."

Einige wichtige Ergänzungen zu all' dem gesagten gibt Herr Realschullehrer C. L. Zigann in Welau. „Nach vier verunglückten Bruten brachte das Pärchen vier Junge aus und ernährte dieselben anfangs hauptsächlich mit reichlich gebotenen Heuschrecken. Dabei wurde das alte Weibchen so zahm, daß es das Futter aus der Hand nahm. Die Jungen wuchsen kräftig heran und unterschieden sich vom erstern späterhin nur durch die blasseren Schnäbel. Ein sechstes Gelege wurde gleich früheren garnicht bebrütet, aus dem siebenten dagegen wiederum eine Brut mit vier Jungen glücklich aufgefüttert. Das Pärchen hatte also in dem einen Sommer zwanzig Eier gelegt und zweimal vier Junge erzogen. Als Nahrung erhielten sie schon lange vor der Brut viel Weichfutter, rohes Rind- und Schöpsenfleisch, sowie namentlich Mai-, Juni- und Julikäfer. Bei zu reichlicher Fütterung mit den Käfern litt das Weibchen, trotzdem viel Grünkraut gegeben wurde, an Verstopfung. Vorzugsweise erpicht sind sie auf Heuschrecken, von denen sie eine unglaubliche Masse vertilgen können. Unter keinen Umständen vergesse man reichliche Versorgung mit Sepia, denn während der Brutzeit verzehrt das Pärchen wol täglich eine ganze Schale. Den Sommer hindurch wurde der Heckkäfig bei schönem Wetter stets des Morgens ins Freie und Abends wieder ins Zimmer zurückgebracht, wodurch das brütende Weibchen sich niemals stören ließ. Eine Hauptbedingung für die erfolgreiche Zucht ist aber die, daß solche Vögel von vornherein gezähmt werden. Man stelle daher auch im Zimmer den Käfig immer nur so, daß sie unter menschlicher Gesichtshöhe sich befinden, wodurch sie am leichtesten zahm werden und damit erst begründete Aussicht auf gute Zuchtergebnisse gewähren. — Ein Kanarienvogel-Weibchen erbrütete und erzog glücklich einen rothen Kardinal, ein Vorkommniß, welches bis jetzt anderweit noch nicht beobachtet sein dürfte." Herr A. Hesler berichtet, daß ein Kardinal-Weibchen die Jungen anderer Arten in liebevoller und bereitwilliger Weise fütterte. „Es kann", sagt der Genannte, „für junge körnerfressende Vögel wirklich garkeinen bessern Pfleger geben." Ich möchte jedoch hinzufügen, daß dies wol nur ein günstiger Ausnahmefall sein wird, denn die meisten rothen Kardinäle beißen, wie bereits erwähnt, alle in ihre Nähe gelangenden schwächlichen, kranken oder jungen Vögel todt und fressen ihr Gehirn. Manches Pärchen freilich zeigt sich nicht bösartig, wie namentlich Herr Apotheker Jänicke in Hoyerswerda angibt, während die meisten anderen Liebhaber und Züchter, so Herr Dr. Fleischmann, in der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg u. A. immer das Gegentheil feststellten.

Bei sehr aufmerksamer Betrachtung findet man wol, daß die in den Handel gebrachten Kardinäle nicht allein inhinsicht des Aussehens, sondern auch namentlich des Gesangs bemerkenswerthe Verschiedenheit zeigen. Anfangs glaubte ich, dieselbe sei nur im Alter begründet, als ich dann jedoch die Angabe fand, daß der Engländer Ballock behaupte, die in Mexiko vorkommenden Rothvögel seien schöner gefärbt, als die nordamerikanischen, achtete ich bei den einzelnen Sendungen, welche die Großhandlungen empfingen, sorgsam auf den Bezugsort, soweit sich derselbe eben ermitteln läßt. Herr W. Mieth in Berlin erhielt im Jahre 1875 von dem Hamburger Händler Wucherpfennig eine beträchtliche Anzahl vorzugsweise prächtig rother Vögel, welche auch einen ganz absonderlichen, ungleich schönern Gesang hatten. Die Nachforschung ergab, daß diese Kardinäle auf einem französischen Schiffe über Marseille eingeführt und also wol aus dem Süden gekommen waren, während die übrigen nach Deutschland gelangenden doch fast regelmäßig über New-York von Herrn C. Reiche zu uns gebracht werden. Jene feurigrothen Südländer trugen fast sämmtlich, wahrscheinlich infolge unzweckmäßiger Verpflegung auf der weiten Reise, den Todeskeim und es war mir daher leider nicht möglich, näheres inbetreff ihrer festzustellen, zumal ich damals auch keine frischeingeführten Nordländer zum Vergleich erlangen konnte. Die Frage, ob diese und jene, selbstverständlich nicht als besondere Arten, sondern eben nur als Lokalrassen inhinsicht des Gesanges und der Farbe wirklich mehr oder minder von einander abweichen, muß bis auf weitres eine offene bleiben.

Auf Kuba hatte Dr. J. Gundlach im Januar 1861 im Walde bei Kardenas einen rothen Kardinal gesehen und ihn daher im Verzeichniß der Vögel dieser Insel aufgeführt, späterhin jedoch sich davon überzeugt, daß es nur ein aus dem Käfige entflohener gewesen sein konnte, da diese Art dort nicht freilebend vorkommt.

Herr Landkammerrath Vogt in Blankenhain erzählt, daß ein rother Kardinal im Juli dort entkommen, sich im Walde umhergetrieben und allen Nachstellungen entgangen sei; auch von den sonst so schießwüthigen Bauern war er verschont geblieben und hatte sich munter und frisch gezeigt, selbst im November bei 6 Grad Kälte, bis er vom Nahrungsmangel endlich in eine Falle getrieben wurde. Sein Gefieder war von außerordentlicher Pracht und herrlichem Glanz. Noch interessanter ist die Mittheilung des Herrn Reinhold Hoffmann, welchem in der Gegend von Stettin ein Pärchen entflogen war. Aus derselben sei folgendes entlehnt: „Zwei Tage hindurch harrte ich der Flüchtlinge bei offnem Fenster, jedoch vergebens, und so mußte ich sie für verloren halten. Doch wer beschreibt mein Erstaunen, als ich sie am Morgen des achten Tages außen am Fenster sitzen sah. So vorsichtig als möglich bemühte ich mich, den Flügel zu öffnen, aber sie flogen, in der Morgensonne förmlich erfunkelnd, dem nahen Walde zu und kamen, obwol ich sie mit allen möglichen Leckereien erwartete, nicht wieder zurück. Nach

drei Wochen etwa zeigten sie sich in einem Nachbargarten und der Versuch, sie vermittelst einer Spritze mit Wasser zu erhaschen, gelang leider auch nicht, weil sie sich, obgleich völlig naß, doch noch in eine dichte Hecke stürzen und so entkommen konnten. Dann blieben sie durchaus verschwunden. Ein recht strenger Winter war eingekehrt und vorübergegangen und ich bedauerte meine schönen Vögel als längst umgekommen. Im erwachenden Frühlinge machte ich in Gesellschaft eines alten Freundes einen weiten Spaziergang. Frühmorgens wanderten wir zum Dörfchen hinaus. Nach einem Marsch von drei Stunden Wegs gelangten wir zu einem von Wiese und Wald umgebnen Teiche und setzten uns hier auf den Rasen. In das Anschauen der schönen Naturumgebung versunken, bemerkte ich zwei rothe Vögel, welche hurtig über unseren Köpfen dahinflogen und die ich im ersten Augenblick für Karmingimpel hielt. Um uns jedoch zu überzeugen, erhoben wir uns schnell und folgten ihnen ins nahe Kiefernbickicht. Vorsichtig wandten wir uns der Stelle zu, wo sie eingefallen waren, als uns plötzlich ein lauter durchdringender Schlag entgegentönte, welchen ich sogleich als den des rothen Kardinals erkannte. Unwillkürlich dachte ich dabei an meine Ausreißer. So drangen wir immer tiefer in das dichter werdende Gebüsch, als uns lautes Zirpen verrieth, daß wir uns in der Nähe eines Nestes befanden. Nach kurzem Suchen entdeckten wir auf einem struppigen Baume ein aus Halmen und Würzelchen gebautes Nest mit zwei fast flüggen Jungen, rothen Kardinälen nämlich. Meine Freude kannte keine Grenzen. Unter einem Busche versteckt wollte ich nun vor allem beobachten, ob das Pärchen wirklich mein entflohenes sei. In gleicher Weise hatte mein Freund sich mir gegenüber gelagert. Nicht lange, da erschienen die Erwarteten und während das Männchen sich hoch auf den Busch setzte, kam das Weibchen mir so nahe, daß ich es mit Sicherheit als das meinige erkennen konnte und zwar daran, daß ihm die Vorderzehe am rechten Fuß fehlte, welche ihm ein Papagei einst zerbissen hatte. Nach einigen Tagen begab ich mich wieder in Begleitung meines Freundes und mit Leimruten und Schlaggarn versehen, abermals dorthin, fing glücklich die Alten, nahm die Brut mit mir und kann zum Schluß berichten, daß die letztre auch in der Gefangenschaft glücklich aufgefüttert wurde." Seitdem sind zahlreiche derartige Beispiele mitgetheilt worden und es dürfte als unumstößlich feststehen, daß der nordamerikanische Rothvogel den Winter selbst im nördlichen Deutschland vortrefflich zu überdauern vermag.

Zur zweckmäßigen Fütterung hat man gerade für einen so wichtigen Vogel erklärlicherweise zahlreiche Vorschläge veröffentlicht, bzl. bereits Erfahrungen gemacht; in den Abschnitten, welche von der Pflege und Zucht der Vögel überhaupt handeln, werde ich dieselben übersichtlich mittheilen. Vorläufig sei nur darauf hingewiesen, daß man ihn in der ersten Zeit nach der Einführung nur ausschließlich

mit Hanfſamen füttern darf und erſt allmälig an andere Sämereien gewöhnen kann. Ein Lieblingsfutter für ihn ſind außer den Heuſchrecken namentlich lebende Maikäfer.

Der Preis beträgt, wenn ſie friſch angekommen ſind, 15 bis 20 Mark für das Männchen und etwa 8 Mark für das Weibchen; bei eingewöhnten Vögeln bis 24 Mark das Männchen und bis 15 Mark das Weibchen. Das Dutzend Männchen verkauft Herr C. Reiche in Alfeld für 100 Mark und Weibchen für 50 Mark. Der genannte Großhändler führt jährlich etwa 2500 Männchen und 1000 Weibchen ein.

Der rothe Kardinal heißt auch blos Kardinal, virginiſcher Kardinal, nordamerikaniſcher Kardinal, virginiſche Nachtigal, Rothvogel, Haubenkernbeißer und Haubenblutfink. [Indiſcher Haubenfink, virginiſcher Dickſchnabel, rother Steinbeißer, gehaubter Kardinal, karminrother Kirſchenfink, rother Dickſchnabel und Kardinalkernbeißer, nach alten Schriftſtellern].

Le Cardinal rouge; Red Bird, Cardinal Grosbeak and Virginian Nightingale; Roode Kardinaal.

Nomenclatur: Coccothraustes virginianus, *Brss.*; Loxia cardinalis, *L.*, *Gml.*, *Wls.*; Coccothraustes cardinalis, *Vll.*; Fringilla (Coccothraustes) cardinalis, *Bp.*; Fringilla cardinalis, *Nttll.*, *Audb.*; Pitylus cardinalis, *Audb.*; Cardinalis virginianus, *Bp.*, *Cb.*, *Brd.*, *Br.* [Coccothraustes indica cristata, *Aldr.*; Enucleator indicus, Luscinia virginiana, *Frsch.*; Coccothraustes cristata, *Frsch.*, *Brss.*; Avis rubra, *Kln.*; Loxia rubra, *Scpl.* — Rouge Gros-bec, Rossignol de Virginie, *Alb.*; Cardinal Red-bird, *Cat.*; Grosbec de Virginie et Grosbec des Indes, *Brss.*; Virginian Nightingale, *Willugh.*; Cardinal huppé, *Buff.*; Cardinal Gros-bec, *Lath.*; Cardinal de Virginie, *Vll.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Ganzer Körper glänzendroth; Kopf nebſt ſpitzer Tolle oder Federbuſch ſcharlachroth; Zügelſtreif bis ums Auge, Streif hinunter um den Schnabel nebſt der Oberkehle tiefſchwarz; Rücken, alſo Schultern, Mantel und Bürzel ſcharlachroth, jede Feder düſterer geſäumt; Schwingen und Flügeldecken dunkler roth, fahlbraun außen- und endgeſäumt; Schwanz dunkelſcharlachroth; ganze Unterſeite heller ſcharlachroth. Schnabel glänzend zinnoberroth; Auge röthlichbraun; Füße bräunlichfleiſchfarben bis dunkelbraun. — Das Weibchen iſt oberhalb olivenbraun; Stirn, Augenbrauenſtreif und Haube bräunlichhochroth, letztere faſt reindüſterroth; Zügelſtreif und Kehle nur ſchwach ſchwärzlich; Flügel bräunlichroth; Schwingen braun, mit düſterrothen Außenfahnen; Schwanzfedern braun, roth außengeſäumt; ganze Unterſeite gelbbraun. Schnabel zinnoberroth, meiſt ſchwach gelblich; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau.

Neſtflaum: bläulich (das Junge hat einen ſehr dicken Kopf und großen Mund und ſieht häßlich aus). — Das Jugendkleid gleicht dem des alten Weibchens, doch erſcheint das Braun mehr düſtergrau; jedes rothe Abzeichen und auch der rothe Ton des Gefieders fehlt durchaus; Schnabel bräunlichſchwarz, Füße dunkelgrau. — Jugendkleid in der Verfärbung nach Prinz Wied (Männchen im Dezember erlegt): Haube, Geſicht und Unterrücken bereits ſchön zinnoberroth; Rücken olivengraubraun, ſtark dunkelroth gefleckt und gemiſcht; Schwingen mit hellzinnoberrothem Außenrande und graubrauner Innenfahne; Schwanz dunkelroth; Unterhals, Bruſt- und Bauchſeiten gelblichgraubraun gefleckt; innere Flügeldecken hell zinnoberroth, Schnabel zinnoberroth, Oberkiefer in der Mitte noch dunkelbräunlich; Füße röthlichgraubraun. Weibchen (zu Anfang Novembers erlegt): die ſchwarzen Federn um den Schnabel weißlich gemiſcht und gerandet, daher nur grau; Haube und Augenbrauen ſtark mit rothen Federn gemiſcht; Rücken olivengraubraun; Flügel und Schwanz bräunlichzinnoberroth; Unterhals und Oberbruſt dunkelröthlichgelb, Bruſtmitte weißlich; innere Flügeldecken hellzinnoberroth; Schnabel wie beim Männchen; Füße bräunlichfleiſchfarben.

Coccothraustes virginianus: corpore toto nitide rubro, capite cum crista acuminata scarlatino; capistro, loris ad oculum usque gulaque atris; plumis interscapilii dorsique totius scarlatinorum obscurius limbatis; remigibus tectricibusque al. obscurius rubris, interius et in fine fumigato-limbatis; cauda obscure scarlatina; gastraeo toto dilutius scarlatino; rostro nitide cinnabarino; iride badia; pedibus fuscato-carneis, ipsis fuscis. — ♀ supra olivaceo-fusca, fronte, stria superciliari cristaque rufis, hace sat purius rubra; loris gulaque nigricantibus; alis rubicundis, pogonio remigum fuscorum sordide rubris; rectricibus fuscis, exterius rubro-limbatis; subtus omnino fulva; rostro cinnabarino, plerumque subflavide imbuto; iride fusca; pedibus fuscato-cinereis.

Länge $21{,}6$ cm.; Flügel $9{,}6$ cm.; Flügelbreite $29{,}3$ cm.; Schwanz $10{,}3$ cm.

Neonatus: lanugine coerulescente. — Juvenis: femellae adultae persimilis, attamen luridius cinereus; colore rubro prorsus carens; rostro fuscato-nigro; pedibus obscure cinereis. — Juvenis (sec. *M. Wied*) ♂ (m. Decemb. necatus) crista, facie tergoque jam laete cinnabarinis; dorso olivaceo-fumido, largiter rubro-maculato mixtoque; remigum pogonio interiore fumido, exteriore dilute cinnabarino-marginato; cauda ruberrima; gutture, pectoris abdominisque lateribus gilvo-fumide maculatis; tectricibus subalaribus dilute cinnabarinis; maxilla rostri cinnabarini media fuscata; pedibus luride rubentibus. — ♀ (m. Novb. necat.) capistro nigro albide submaculato; crista et superciliis largiter rubro-commixtis; dorso olivaceo-fumigato; alis caudaque rufis; gutture pectoreque obscure fulvis, hoce medio albente; tectricibus subalaribus dilute cinnabarinis; rostro ut maris picto; pedibus fuscato-carneis.

Beschreibung des Eies: Auf düsterweißlichem Grunde mit röthlichen und olivenbraunen Flecken gezeichnet (Audb.). Auf weißem, lavendelfarben scheinenden Grunde mit aschbraunen Flecken dicht gezeichnet; länglichoval (Gentry). Grundfarbe weiß, bläulich oder gelblichroth und ebenso verschieden theils violett, theils grau, braun oder fuchsig gefleckt, die Flecke über das ganze Ei vertheilt, manchmal aber auch am stumpfen Ende gehäuft; schön eiförmig; matt. Länge 23 bis 27 mm., Breite 18 mm. (Nehrk.). Bläulichweiß, olivengrün und bräunlichroth gefleckt (Ruß). Grünlichweiß und überall, insbesondre am stumpfen Ende gelblich- oder olivenbraun gefleckt; während aber das Weiß der Eier ein und desselben Geleges zwischen bläulich- und reinweiß wechselt, so sind auch die Flecke sehr verschieden vertheilt, sodaß ein Ei fast gleichmäßig dicht besprengt und das andre am spitzen Ende fast reinweiß erscheint (Leuckfeld).

Ovum: sordide albide rubens, olivaceo-fusco-maculatum *(Audb.)*. Ovum albidum, lilacino-micans maculis olivaceo-fuscis dense notatum *(Gentry)*. Ovum album, vel coerulescens, vel flavente rubidum, maculis variis, modo violaceis, modo cinereis, nunc fuscis, nunc rufis obsitum, aequaliter dispersis, interdum in basi coacervatis: pulchre ovatum, opacum *(Nehrk.)*. O. subaeruginosum, olivaceo-virente fuscoque maculatum *(Russ)*. O. subviride album, ubique praesertim in basi flavide vel olivaceo-maculatum; nonnunquam in apice fere albicans *(Leuckf.)*.

Der purpurrothe Kardinal [Coccothraustes phoeniceus]. Auf der Hamburger Geflügelausstellung d. J. 1877 hatte Fräulein Hagenbeck einen einzelnen Vogel, welcher bis dahin sicherlich noch garnicht lebend eingeführt worden, den obengenannten Kardinal nämlich, dessen Heimat sich über Mittelamerika, Venezuela und Trinidad erstrecken soll. Er ist ansehnlich größer und stärker als der virginische rothe, mit kräftigerem mehr gewölbten, nicht rothen, sondern bleigrauen Schnabel. Zugleich zeigt sein Gefieder einen beiweitem tieferen dunkelrothen Farbenton; er hat nur einen schmalen reinschwarzen Rand um den Unterschnabel, und schließlich unterscheidet er sich durch die größere, mit dem oberen Winkel helmartig nach vorn zurückgekrümmte Haube; Flügel und Schwanz sind kaum bemerkbar dunkler als der Rücken, dagegen ist die untere Seite wahrnehmbar heller; das Auge ist hellbraun; die Füße sind dunkel bläulichbleigrau. Das Weibchen kenne ich nicht. Leider ist keinerlei nähere Schilderung dieser Art zu

finden. Den Jahrgang 1837 der „Proceedings of the Zoological Society“ (London), in welchem Gould ihn beschrieben, vermag ich leider nicht zurathe zu ziehen, ich habe die Beschreibung hier vielmehr nach eigner Anschauung und glücklicherweise sogar nach zwei Männchen gegeben und muß an ihrer Richtigkeit festhalten, obwol dieselbe mit der von Br. nach Gould aufgestellten keineswegs übereinstimmt. Fräulein Hagenbeck hatte auf der Berliner „Aegintha“-Ausstellung in demselben Jahre noch ein tadelloses Männchen, während das erwähnte erstere auf einem Auge blind war. Hoffentlich wird dieser den Verwandten an Schönheit fast noch übertreffende Kardinal mit der Zeit mehrfach im Handel erscheinen. — Purpurkardinal (Br.) — Cardinalis phoeniceus, *Gld.*, *Br.*

Der spitzhäubige Kardinal [Coccothraustes sinuatus]. Im Gegensatz zu dem vorigen dürfte dieser Kardinal bis jetzt noch garnicht lebend zu uns gelangt sein, doch läßt sich wol erwarten, daß er demnächst auch einmal kommen werde. Baird gibt als seine Heimat das Thal vom Rio grande in Texas und auch Mexiko an und die Vögel namentlich des letztern Landes werden ja neuerdings immer mannigfaltiger und zahlreicher bei uns eingeführt. Seine aufgerichtete und spitze Haube (welche länger und schmaler als beim rothen Kardinal ist), Stirn, Zügelstreif und Wangen sind dunkel karmoisinroth; der Oberkopf, d. h. die vordere Seite der Haube, der Rücken und die ganze übrige Oberseite sind fahl graubraun; Schwingen und Flügeldecken dunkelroth, röthlichbraun gespitzt; Schwanzfedern bräunlichroth mit dunkel braunrothem Ende; Kehle, Brust, Bauch und Hinterleib nebst den unteren Flügeldecken hell karminroth, Brust- und Bauchseiten fahl bräunlichgrau, untere Schwanzdecken röthlichweiß; Schnabel gelblichgrau; Füße braungrau. Das Weibchen ist ähnlich, unterhalb bräunlichgelb; Kehle und Bauchmitte roth überhaucht; Schnabel bräunlichgrau. Die Größe stimmt mit der des rothen Kardinals überein (nach Baird). — Schmalschnabelkardinal (Br.) — Pyrrhuloxia sinuata, *Bp.*

Der gehäubte graue Kardinal [Coccothraustes cucullatus].

Tafel XIII. Vogel 64.

Der Dominikaner-Kardinal [Coccothraustes dominicanus].

Tafel XIII. Vogel 65.

Der braunkehlige graue Kardinal [Coccothraustes capitatus].

Der schwarzkehlige graue Kardinal [Coccothraustes gularis].

Prächtige Vögel sind es, welche ich ihrer Aehnlichkeit wegen ohne weitres zusammenfassen darf, indem ich selbstverständlich in der Schilderung jedes einzelnen die besonderen unterscheidenden Merkmale hervorheben werde. Die beiden ersteren gehören zu den seit altersher allbekannten und bis zur Gegenwart auch allbeliebten fremdländischen Stubengenossen, während die beiden letzteren bis jetzt nur ausnahmsweise, höchst selten einmal in den Handel gelangt sind.

Der gehäubte graue Kardinal ist an Kopf, Kehle und von dieser aus im spitzen Winkel bis zur Oberbrust dunkel blutroth; Kopf mit spitzer ebenfalls rother Tolle oder Haube, welche aus zartgefaserten Federn besteht; Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz dunkel schiefergrau, am erstern jede Feder weiß gefleckt, Schwingen und Schwanzfedern fahlgrau außengesäumt und Flügeldecken mit breiten aschgrauen Säumen; vom Ohr jederseits ein breiter Streif und ebenso die ganze Unterseite reinweiß, längs der Brustseiten schiefergrau gefleckt. Schnabel fleischfarben, an der obern First bräunlich; Auge röthlichbraun; Füße bräunlichgrau. Das Weibchen dürfte kaum zu unterscheiden sein; man meint zwar, daß sein Roth blasser, und sein Weiß düsterer erscheine, allein dies ist nach meiner Ueberzeugung nur bei jungen Vögeln der Fall.

Die Größe ist wenig geringer, als die des rothen Kardinals. Seine Heimat erstreckt sich über ganz Brasilien, Paraguay und Bolivien.

Der Dominikaner-Kardinal ist am ganzen ungehäubten Kopfe nebst einem, jedoch nicht spitzzulaufenden, sondern abgerundeten Schilde, welches kaum bis zur Oberbrust reicht, ebenfalls roth; der Nacken bis zum Mantel ist schwärzlich, jede Feder mit großem weißen Fleck; Mantel grau, jede Feder fein schwarz endgesäumt; Schwingen schwarzbraun, weißlich gesäumt, Flügeldecken dunkel grauschwarz; Schwanzfedern schwarz, schmal grau außengesäumt und fahl gespitzt; ganze untere Seite, vom Unterhals an nebst den unteren Flügeldecken reinweiß. Schnabel schwärzlichhorngrau, Unterschnabel weißlichgrau; Auge braun; Füße dunkelbraun. Das Weibchen dürfte ebenfalls kaum zu unterscheiden sein; man behauptet, daß es kleiner und sein Roth, besonders am Vorderhals matter und nicht so weit ausgedehnt sei. Sichere Merkmale sind dies jedoch keineswegs. Die Größe stimmt nahezu mit der des vorigen überein. Er ist in Nord- und Mittelbrasilien heimisch.

Der braunkehlige graue Kardinal hat ebenfalls einen scharlachrothen unbehäubten Kopf, doch ist die nach der Oberbrust hin spitz zulaufende Färbung von der Kehle an nicht roth, sondern schwärzlichbraun; Flügel und Schwanz sind schwarz, die Schwingen am Grunde und an der Innenfahne weißlich gesäumt; ganze Unterseite reinweiß; Schnabel hell rosenroth; Auge karminroth; Füße fleischfarben. Das Weibchen soll übereinstimmend sein, jedoch einen an der First dunkelbraunen Schnabel haben. Er ist bemerkbar kleiner, als die beiden vorigen. Südbrasilien, Paraguay und Bolivien sind seine Heimat.

Der schwarzkehlige graue Kardinal ist auch ungehäubt und dem Dominikaner ähnlich, erscheint jedoch im ganzen dunkler; Kopf und Kehle blutroth und darunter ein schwarzer Fleck; Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz schieferschwarz (die Schwingen nicht weiß gerandet); Halsseiten bis zum Nacken und ganze Unterseite reinweiß; Schnabel hornschwarz, Unterschnabel weißlich; Auge braun; Füße bläulichschiefergrau, fleischroth scheinend. Das Weibchen wird wol nicht verschieden sein, doch ist es noch nicht beschrieben. In der Größe gleicht er dem vorigen. Die Heimat erstreckt sich über Guiana und süd- und ostwärts bis in das Gebiet des Amazonenstroms und des Rio negro.

Mit dem grauen Kardinal sowol, als auch mit dem Dominikaner haben sich bereits die alten ornithologischen Schriftsteller viel beschäftigt; schon Seelig-mann, Brisson, Buffon u. A. gaben Abbildungen. Der letztere warf beide Vögel als eine Art zusammen und betrachtete den einen nur als Abänderung des andern. Die als Gattungsnamen gegebne heimische Bezeichnung Paroara hat wol zuerst Markgraf („Historia naturalis Brasiliae"; 1648) gebraucht; Brisson verwarf sie, und während sie von Buffon u. A. noch beiläufig gebraucht wurde, stellte sie Bonaparte als Paroaria wieder hin. Ob der im Lateinischen wie im Deutschen schon seit altersher benutzte Name Dominikaner-Kardinal nicht ursprünglich Kardinal von Domingo bedeuten soll, wage ich nicht zu erörtern. Linné und dann Buffon nennen ihn freilich domingischer Sperling. — Seelig-mann's Abbildung war bereits nach einem lebenden Vogel hergestellt und damals schon brachte man die Art mehrfach von Lissabon aus nach London. Vieillot trennte mit Sicherheit den gehäubten von dem glattköpfigen Kardinal und hielt den erstern für keinen Sänger; dennoch sei er, lediglich um seiner Schönheit

willen, sehr gesucht. In der Gefangenschaft zeige er sich bei der Fütterung mit Hirse und Kanariensamen vortrefflich ausdauernd. Ihm gebühre vor dem glattköpfigen der Vorzug. Dieser letztre sei schon zu jener Zeit in Frankreich garnicht selten gewesen und habe sich als ein gegen Kälte nicht empfindlicher Vogel erwiesen; ein solcher erhalte sich bei ihm seit sechs Jahren im Käfige sehr gut; freilich dürfe man ihn nicht im Freien überwintern. Alt eingefangen bleibe er wild und scheu. Auch er gehöre zwar nicht zu den Sängern, doch zu den farbenprächtigsten Vögeln. Die Angaben Vieillot's über die Lebensweise im Freien brauche ich nicht anzuführen, denn dieselben sind ja ausführlicher von den neueren Schriftstellern gebracht. In Bechstein's Mittheilungen finden wir im wesentlichen nur die Buffon's wieder. Bemerkenswerth ist jedoch, daß ein Dominikaner-Kernbeißer damals 3 Louisd'or kostete und daß man, „ehe sich die Schiffsleute darauf legten, fremde Vögel mitzubringen", 5 bis 6 Louisd'or für einen bezahlen mußte. In dem Verzeichniß von Dr. Karl Bolle ist angegeben, der gehäubte singe, der glattköpfige aber nicht.

Eingehende Berichte über das Freileben aller dieser Graukardinäle haben die reisenden Naturforscher leider nicht veröffentlicht. Burmeister sagt im wesentlichen nach Azara's Angaben nur kurz folgendes: „Den grauen Kardinal findet man im Innern Brasiliens auf feuchten buschigen Niederungen, am Rande der großen Flüsse einzeln oder parweise. Er nistet im dichten Gebüsch, baut in mäßiger Höhe ein ziemlich großes Nest aus trockenen Halmen und legt 3 bis 4 Eier. Das Freileben des Dominikaners stimmt mit dem des vorigen überein. Den braunkehligen Kardinal sieht man im Sommer meistens parweise, doch weder auf offenen Triften, noch im dichten Urwalde, im Winter in kleinen Flügen, welche oft in die Nähe der Ansiedlungen kommen und besonders gern das zum Trocknen ausgehängte Fleisch benaschen. Seine eigentliche Nahrung besteht in Sämereien und Insekten. Das Nest errichtet er im dichten Gebüsch mäßig hoch und dasselbe enthält 3 bis 4 Eier. Der schwarzkehlige Kardinal schließlich hält sich parweise an den Ufern der Flüsse auf und man bemerkt ihn in den übers Wasser hinaushängenden Zweigen." Prinz von Wied fügt nur noch hinzu, daß die grauen Kardinäle einen hellen Lockruf haben, ihr Gesang aber ein bloßes Gezwitscher sei. Sie werden vielfach gefangen und im Käfige mit zerstoßnem Mais und Reis ernährt, bei welcher einfachen Fütterung sie sich sehr gut erhalten lassen, aber still und einfältig erscheinen. Die Beobachtung in der Gefangenschaft hingegen ergibt, daß sie sämmtlich als muntere und anmuthige, außerordentlich lebhafte, nicht selten wildstürmische Vögel sich zeigen. Ebensowol in meiner Vogelstube als auch in unzähligen anderen Sammlungen hat sich dies bestätigt, und ich will sie nun zunächst nach den Mittheilungen schildern, welche zahlreiche Züchter gemacht und denen ich dann schließlich meine Erfahrungen anreihen werde.

In seiner „Encyclopédie d'Histoire naturelle“ (Paris) erzählt Chénu, daß Herr Passerini auf den Wunsch der Prinzessin von Florenz in den Jahren 1837 bis 1839 Züchtungsversuche mit grauen Kardinälen anstellte. Das Pärchen erbaute in den Zweigen eines kleinen Baums sein Nest vornämlich aus Blättern und Gräsern und dasselbe enthielt drei weiße mit kleinen grünen, am stumpfen Ende dichter stehenden Flecken bedeckte Eier. Die ersten Jungen, welche am 15. Juli nach fünfzehntägiger Brutdauer auskamen, ließen die Alten verhungern, und erst als zur Fütterung gehacktes Fleisch, Insekten, Würmer u. drgl. gegeben wurde, brachten sie eine andere Brut im August noch glücklich auf. Er beobachtete, daß die jungen Vögel die vollen schönen Farben des Gefieders nicht vor dem dritten Jahre erlangen.

In Deutschland, wo die Zucht der Sing- und Schmuckvögel bekanntlich erst in neuester Zeit erwacht und zu großer Bedeutung gelangt ist, hat den grauen Kardinal jedenfalls Herr Dr. Bodinus, zu gleicher Zeit mit dem rothen, damals in Köln gezüchtet, und zwar i. J. 1862. Die Schilderung einer gleichen Zucht i. J. 1863 gibt dann Herr Dr. Max Schmidt, Direktor des zoologischen Gartens von Frankfurt a. M.: „Unser Garten erhielt, nachdem er immer schon einzelne graue Kardinäle beherbergt, im Sommer 1862 drei, und zwar, wie sich später herausstellte, ein Männchen und zwei Weibchen. Sie wurden im Käfige in einem geheizten Vogelhause überwintert und zum Frühjahr hin in einen geräumigen Flug im Freien gebracht, wo sie mit grünen Kardinälen, mehreren großen Webern, Lerchen, je einem Dompfaff und Wachtelkönig und verschiedenen Wachtelarten friedlich zusammenwohnten. Es war für Nistgelegenheiten von mancherlei Einrichtung gesorgt und zugleich wurden mannigfaltige Baustoffe geboten. Am 9. April wurde die Volière bevölkert, und bereits am 14. hatten die grauen Kardinäle einen Nistplatz erwählt, ein flaches Korbnest von etwa $15{,}5^{cm.}$ Durchmesser, welches in einem Gestell an der Wand befestigt und nach vorn mit einer $8^{cm.}$ hohen Leiste und verschiedenen Aesten versehen war. Unter vier gleichen Nestern hatten sie das gewählt, welches in der südlichen Ecke des Käfigs stand, am meisten gegen die Witterung geschützt, nach Mitternacht zu aber offen war. Männchen und Weibchen bauten gemeinschaftlich, lediglich aus Haidekrautstengeln. Das überzählige Weibchen hielt sich fast immer in der Nähe auf, wurde anscheinend ganz übersehen und nur vertrieben, wenn es an das Nest kam. Nachdem am 18. April das Nest vollendet war, doch ohne jede Ausfütterung, legte das Weibchen am 19. und 21. und blieb vom Morgen des 23. an fest brütend sitzen; es wurde vom Männchen täglich mehrmals abgelöst. Am 5. Mai waren Junge im Nest vorhanden, welche die beiden Alten nun fleißig fütterten, anfangs vorzugsweise mit Eigelb, später auch mit Eiweiß, gehacktem Fleisch, Ameiseneiern und zerschnittenen Regenwürmern. Bereits am 10. Mai wurden die Köpfe von zwei

Jungen über dem Neſtrande ſichtbar und dieſelben ſchrieen jetzt faſt unausgeſetzt nach Nahrung. Das erſte Junge kam am Morgen des 17. aus dem Neſt geflattert und kletterte unbeholfen auf einem Baume umher, welchen es nicht verließ, ſondern auf dem es auch übernachtete, während das zweite auf dem Neſtrande ſitzen blieb und erſt am andern Tage ebenfalls ausflog. Die zweite Brut begann am 18. Mai und zwar richtete das Weibchen daſſelbe Neſt wieder her. Jetzt bemühte ſich das überzählige Weibchen, auch die Aufmerkſamkeit des Männchens zu erregen; es ſaß auf einem Neſt in der Nähe und ſo oft das Männchen vorüberkam, ſträubte es die Federn, breitete die Flügel aus, wendete den Kopf hin und her und führte auch wol unter heiſerm Geſchrei einige neckende Schnabelhiebe gegen den Nachbar, bis dieſer ſich ihm allmälig immer mehr näherte und dadurch Kampf zwiſchen beiden Weibchen erregt wurde, ſodaß das einzelne entfernt werden mußte. Auch das zweite Gelege beſtand in 2 Eiern, von denen eins hinausgeworfen und nur ein Junges erbrütet und aufgezogen wurde. Inzwiſchen fütterte das alte Männchen die Jungen der erſten Brut noch bis zum 3. Juni und das eine derſelben ſetzte ſich häufig auf den Rand des Neſtes; während ich aber befürchtete, daß es die für das Kleine beſtimmte Nahrung in Empfang nehmen könnte, bemerkte ich, daß es ſich ſtets zur Seite drückte, wenn einer der Alten mit Futter kam und dann ſah ich ſogar, daß es ſelbſt mitfütterte. Am 20. Juni bewegte ſich das Junge im Neſt viel und lebhaft, putzte ſein Gefieder und kletterte endlich auf den Rand des Körbchens, um jedoch erſt am 23. ſpät nachmittags auszufliegen. Die Alten ſchritten ſodann zu noch einer Brut, diesmal aber im Neſt nebenan; dieſelbe ergab wieder zwei Junge, welche am 21. erbrütet wurden und an deren Auffütterung ſich auch das Weibchen der grünen Kardinäle, welche mehrere Fehlbruten gemacht, betheiligte, obwol die Alten dasſelbe jedesmal mit lautem Zanken vertrieben. Das erſte Junge flog am 4. und das zweite am 8. Auguſt aus. Sie zeigten ſich vor der vollen Befiederung recht weichlich, und als infolge eines Gewitters in der Nacht ein raſches und bedeutendes Sinken der Wärme eintrat, ſtarben ſie.“ — Auch im zoologiſchen Garten von Hannover zogen, wie Herr Dr. Niemeyer berichtet, ein Par graue Kardinäle i. J. 1868 ein Junges auf. In demſelben Jahre züchtete Herr Emil Linden dieſe Art. Er hatte ſechs Köpfe graue und Dominikaner-Kardinäle zuſammen inmitten einer großen und mannigfaltigen Geſellſchaft von einheimiſchen und fremdländiſchen Finken, welche ſich anfangs ſehr gut miteinander vertrugen, bis in den erſten Tagen des Monats April ein heftiger Kampf zwiſchen den gehäubten und ungehäubten entbrannte, ſodaß die letzteren entfernt werden mußten. Dann begannen die erſteren ſogleich zu niſten und zwar ein Männchen mit zwei Weibchen. Sie bauten in einem Schilfdickicht auf einem alten Tigerfinkenneſt, und als Herr Linden die Jungen beſichtigte, ſetzten ſich die Alten erbittert zur

Wehr und stießen ihn ins Gesicht. Die Auffütterung geschah hauptsächlich mit frischen Ameisenpuppen.

Trotzdem man im allgemeinen annehmen kann, daß die gehäubten grauen Kardinäle die kräftigeren sind, beobachtete Herr Pfarrer Winkler, daß ein Pärchen Dominikaner die ersteren vom Nest vertrieb und dieses zerstörte. Die grauen erbauten später aus Spargelzweigen und Würzelchen ein künstliches Nest ganz oben an der Decke in einem in einer lauschigen Ecke stehenden, zwischen Zweigen versteckten Körbchen; es bildete eine tadellose halbkugelige, sorgsam ausgerundete Mulde, während dasselbe Pärchen vorher ein unordentliches Nest errichtet hatte. Die Brut ging jedoch leider zugrunde. In einem großen Zimmerkäfige des Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal zeigten sich die grauen Kardinäle überaus zanksüchtig und verhielten sich nur dann ruhig, wenn sie mit stärkeren Vögeln zusammen waren. Auch bei Herrn Dr. Stölker in St. Fiden erschienen sie bösartig, denn sie tödteten zwei Schneefinken, indem sie ihnen Rücken, Schultern und Flügel zerhackten. Das Pärchen war so streitbar, daß es selbst die hinzugebrachten rothen Kardinäle in der wüthendsten Weise befehdete. Eine überaus merkwürdige Beobachtung wurde von Herrn Präparator Martin im Vogelhause des Herrn Oskar Vetter zu Ludwigsburg gemacht. Alle Kardinäle zeigten sich hier zunächst unverträglich und überaus bösartig. Dann mußten sie bei 16 Grad Kälte aus dem geheizten Raum in eine offene Voliere gesetzt werden, wo sie sich trotzdem ganz gut erhielten und dann später auch zur Brut schritten. Da sie den außerordentlich großen Temperaturwechsel (einen Unterschied von etwa 30 Grad) ohne Nachtheil ertrugen, so ist damit wol der Beweis gegeben, daß sie ohne Gefahr im ungeheizten Raum überwintert werden dürfen, wie denn überhaupt alle grauen Kardinäle trotz ihrer tropischen Heimat sich keineswegs als weichliche, sondern vielmehr als sehr kräftige, ausdauernde Vögel zeigen. Herr Major Alexander v. Homeyer fand im zoologischen Garten zu Frankfurt a. M. einen grauen Kardinal, welcher mit Einschluß des rothen Kopfes fast ganz schwarz geworden war, und solche schwarze Färbung des Gefieders zeigt sich auch bei diesen Vögeln in den Handlungen garnicht selten.

Alle diese Beobachtungen seien nun durch die von mir gemachten noch in folgendem ergänzt. In meiner Vogelstube, wo ich zuerst ein Pärchen der gehäubten Kardinäle freifliegend hielt, belebten sie den ganzen Raum, ohne jedoch die kleineren Vögel zu scheuchen oder zu beängstigen. Zur Nistzeit hin begann das Männchen aber eine gar üble Eigenthümlichkeit zu entwickeln, indem es irgend einen kleinen Vogel jagte und zwar immer nur einunddenselben stundenlang, bis er schließlich in irgend einen Winkel sich verkroch, um nimmer wieder hervorzukommen oder bis er leblos zur Erde fiel. Da ich eine solche fortwährende Jagd nicht dulden mochte, so fing ich das Pärchen ein und brachte es in einen geräumigen, mit

Strauchwerk ausgestatteten Käfig. Hier errichtete es in einem offnen großen Harzerbauerchen, welches mit dünnen Birkenreisern durchflochten war, ein Nest, und zwar auf einer Unterlage aus Reiserchen und Würzelchen nur eine mit weichen Schweinsharen dünn ausgelegte Mulde; beide Gatten des Pärchens bauten gemeinsam. Da ich angenommen, daß jene Bösartigkeit des gehäubten grauen Kardinals nur ein absonderlicher Fehler des einzelnen Vogels sei, ließ ich versuchsweise nach der Entfernung der ersteren auch ein Pärchen Dominikaner in die Vogelstube fliegen und dieses zeigte sich geraume Zeit hindurch völlig friedlich, bis es im März zur Brut schritt und dann beiderseits eine ebenso verderbenbringende Thätigkeit entfaltete. Sie übten die Jagd förmlich mit Ueberlegung aus, indem sie den betreffenden Vogel einander zutrieben. Ich setzte auch sie dann in einen Käfig, und hier erbauten sie bereits nach wenigen Tagen in einem großen Birkenbusch ein Nest. Beide trugen eine Unterlage aus Reisern, Papierschnitzeln, Moos und Schilffahnen zusammen und formten darauf aus weichen Grashalmen, Schweinshar und Baumwollfäden eine recht hübsch geglättete Mulde. Das Gelege bestand aus 3 Eiern. Die Jungen hatten einen spärlichen weißen Nestflaum und verließen am 17. Tage das Nest (das Jugendkleid werde ich weiterhin angeben). Bereits nach einigen Wochen geht die Verfärbung vor sich, indem das Braun am Kopfe mehr und mehr rostroth, das Grau dunkler und schärfer abgegrenzt und das Weiß reiner wird; aber erst im Frühlinge des dritten Jahres erhalten sie das volle prächtige Roth. Nach dem Ausfliegen wurden die Jungen vom alten Männchen noch etwa zwei Wochen hindurch gefüttert, während das Weibchen bereits eine neue Brut begann, indem es in das alte Nest eine Lage von frischen Baustoffen schleppte und auf diese diesmal 4 Eier legte, aus denen sämmtlich Junge erbrütet und glücklich aufgezogen wurden. Eine Hauptbedingung für ihre Züchtung ist die, daß man alle Kardinäle nicht allein in den Pärchen einunddersel ben, sondern auch in denen verschiedener Arten getrennt und sie außerdem von allen anderen Vögeln abgesondert hält; sie dürfen also nur parweise in Käfigen gezüchtet werden. Brehm behauptet, daß sie ein bedecktes Körbchen zum Nestbau benutzen, dies beruht jedoch sicher nicht in wirklicher Beobachtung, denn sie errichten, wie ja alle Verwandten, entschieden eine offne Mulde, auch polstern sie diese, falls sie sich nur ungestört wissen und ruhig genug sind, sorgfältig aus. Die Eier werden regelmäßig einen Tag um den andern gelegt und die Brutdauer währt 14 Tage. Das Männchen löst täglich mindestens dreimal das Weibchen ab, doch brütet es im ganzen beiweitem nicht so lange als jenes.

Inbetreff des Gesangs sind die Urtheile sehr widersprechend. Der zuletzt genannte Schriftsteller schildert den des Dominikaners als aus mannigfaltigen wohllautenden Tönen zusammengesetzt, sich durch kräftiges, nicht unangenehmes Schmettern auszeichnend; der des grauen Kardinals sei ähnlich, doch kürzer und

weniger anſprechend. Das Urtheil Bolle's habe ich bereits oben angeführt. Linden nennt den Geſang wohlklingend, aus langgedehnten mannigfaltigen, angenehmen Tönen, untermiſcht mit einem kurzen lauten Schmettern, beſtehend. Die übrigen Beobachter geben leider nichts näheres an. Nach meiner Meinung ſind die langgezogenen Laute im Geſange des grauen Kardinals allerdings recht angenehm, doch werden ſie von ſchleifend klingenden, nicht beſonders lieblichen vielfach unterbrochen. Das Lied des Dominikaners dagegen iſt klangvoller, freilich nicht wechſelreich, doch von nur wenigen Mißtönen verunſtaltet.

Man darf wol mit voller Beſtimmtheit annehmen, daß der braunkehlige und ſchwarzkehlige Kardinal bis zu Ende des Jahres 1872 noch niemals lebend nach Europa eingeführt worden, während der gemeine graue Kardinal und der Dominikaner doch zu den alltäglichen Erſcheinungen des Vogelmarkts gehören und alljährlich regelmäßig in ſehr beträchtlicher Anzahl in den Handel kommen. Von jenen beiden Arten kam die erſtere i. J. 1873 in den zoologiſchen Garten von London und zu Anfang d. J. 1874 erhielt Fräulein Hagenbeck in Hamburg zum erſtenmal eine Sendung. Dieſe Vögel gelangten bald in mehrere Vogelſtuben und auch nach dem Berliner zoologiſchen Garten, ihre Züchtung hat man jedoch nicht erreicht. Die zweite Art wurde ebenfalls i. J. 1874 in einem Par von Bekemans in Antwerpen für den zoologiſchen Garten von Berlin angekauft, während ſie im Londoner noch nicht vorhanden iſt.

Der Preis des grauen Kardinals und des Dominikaners beträgt im Großhandel etwa 20 bis 24 Mark für das Par und durchſchnittlich 15 Frank für den Kopf; bei den Händlern zweiter Hand 30 bis 36 Mark für das Par. Keine geringe Schwierigkeit verurſacht es, beim Einkauf richtige Pärchen zu erlangen, zumal einerſeits ein altes kräftiges Weibchen ebenſo fleißig und auch ebenſo laut ſingt, als ein Männchen und andrerſeits ſelbſt ein richtiges Par nur während der Niſtzeit friedlich beiſammenlebt. Wenn man zwei graue Kardinäle (gleichviel welcher Art) nebeneinanderhält, ſo erſcheint das Roth des Männchens mindeſtens um eine Schattirung dunkler, als das des Weibchens, während das des letztern zugleich bemerkbar ins Goldgelbe ſpielt. Doch iſt dieſer Geſchlechtsunterſchied nur bei gleich alten und völlig ausgefärbten Vögeln ſtichhaltig.

Der gehäubte graue Kardinal heißt auch Graukardinal und braſiliſche Nachtigal. [Domingiſcher oder gezopfter domingiſcher Kardinal, Buff.].

Le Cardinal gris huppé rouge ou le Paroare huppé; Red-crested Cardinal. Roodkop of Grijze Kardinaal.

Nomenclatur: Loxia cucullata, *Lth.*, *Bff.*; Fringilla cucullata, *Lchtst.*; Paroaria cucullata, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.*; Spiza cucullata, *Gr.*; Calyptróphorus cucullatus, *Cb.*; Cardinalis cucullatus, *Rss.* [„Hndb.“]. — [Tije guacu paroara, *Markgr.*; Le Cardinal dominicain huppé de la Louisiane et le Paroire, *Buff.*; Crested dominican Grosbeak, *Lath.*; Crestudo roxo, *Azar.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 541.

Coccothraustes cucullatus: colore capitis gulaeque obscure sanguineo in angulum acutum ad guttur usque desinente; plumis cristae rubrae acuminatae subtiliter fibratis; cervice, dorso, alis caudaque obscure schistaceis; plumis cervicis albo-maculatis; remigibus rectricibusque exterius livide cano-, tectricibus al. late cinereo-limbatis; stria lata ab aure utrinque alba; subtus albissimus, pectoris lateribus schistaceo-maculatis; culmine rostri carnei fuscato; iride badia; pedibus fumidis. — ♀ vix dissimilis paululum pallidior.

Länge 18,3 cm.; Flügel 9,1 cm.; Schwanz 6,3 cm.

Jugendkleid: Weißlichgrau; Kopf fahl bräunlichrothgrau; Flügel und Rücken einfarbig düstergrau; ganze Unterseite fast reinweiß; Schnabel und Auge schwarz; Füße dunkelbraungrau. (Bei der Verfärbung geht die Kopffarbe zunächst in mattes Rostgelb, dann mehr in Rostroth und weiter in fahles Bräunlichroth über, bis sie zuletzt, und zwar erst im dritten Jahre, voll und kräftig roth wird).

Juvenis: incanus; capite livide fumigato-rufescens; alis dorsoque unicoloribus sordide cinereis; subtus albidus; rostro irideque nigris. (Trimus demum capite saturate rubro).

Beschreibung des Eies: Weiß, dicht graugrün besprengt, am stumpfen Ende dunkler; länglichoval (Brmstr). Grünlichweiß, bräunlich- oder grünlichgrau gesprenkelt (Ruß). Grundfarbe bläulichgrau mit graubräunlichen Schalenflecken und dunkleren Oberflecken, die am stumpfen Ende gehäufter stehen. Länge 27 mm.; Breite 20 mm. (Rhrk.).

Ovum: album, dense glauco-adspersum, in basi obscurius; sublongo-ovatum *(Brmst.)*. O. virente album, subfusco- vel subglauco-variatum *(Rss.)*.

Der Dominikaner-Kardinal heißt auch blos Dominikaner und ebenfalls brasilische Nachtigal; glattköpfiger grauer Kardinal (Bll.); Dominikaner-Kernbeißer (Bchst.). [Domingischer Kardinal und domingischer Sperling, nach alten Autoren].

Le Cardinal-Paroare ou le Paroare dominicain; Dominican Cardinal, Pope Bird.

Nomenclatur: Loxia dominicana, *L., Bff., Lth., Vll.*; Spiza dominicana et Spiza larvata, *Gr.*; Fringilla dominicana, *Pr. Wd.*; Paroaria dominicana, *Bp., Brmst.*; Calyptróphorus dominicanus, *Cb.*; Paroaria larvata, *Bdd., Br.*; Cardinalis larvatus, *Rss.* [„Hndb."]. — [Rubicilla americana, *Wlghb.*; Cardinalis dominicanus, *Edw., Slgm.*; Coccothraustes brasiliensis, *Brss.* — Cardinal dominiquain, *Briss.*; Cardinal dominicain, *Buff.*; Dominican Grosbeak, *Lath.*].

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 542.

Coccothraustes dominicanus: a capite toto gutturis tenus ruber; pluma cervicis quaque maculam magnam ostendente albam; plumis interscapilii cinerei subtiliter nigro-terminatis; remigibus nigro-fuscis albido-limbatis; tectricibus al. schistaceis; tectricibus subalaribus albis; rectricibus nigris, exterius anguste cinereo-limbatis livideque terminatis; subtus albissimus; rostro nigricante corneo, mandibula incana; iride fusca; pedibus fuscis. — ♀ vix discrepans.

Länge 17 cm.; Flügel 9,1 cm.; Schwanz 6,1 cm.

Jugendkleid: Weißlichgrau; die Kopffärbung düster graulichrostroth; Rücken und Flügel gleichmäßig fahlgrau; Unterseite düsterweiß. Schnabel und Auge schwarz; Füße dunkelbraun. (Der Vorgang der Verfärbung gleicht durchaus dem des vorigen).

Juvenis: incanus; capite sordide cano-ferrugineo; dorso alisque aequaliter livide canis; subtus sordide albus; rostro irideque nigris; pedibus fuscis. (Trimus demum perfecte coloratus).

Beschreibung des Eies: Auf weißlichgrünem Grunde mit bräunlichen Flecken besprenkelt. Länge 26 mm.; Breite 19 mm. (Ruß).

Ovum: virente album subfusco-adspersum *(Rss.)*.

Der braunkehlige graue Kardinal heißt auch Mantelkardinal (Br.). — Le Cardinal à gorge brune; Brown-throated or Yellow-billed Cardinal.

Nomenclatur: Tachýphonus capitatus, *Orb.*; Paroaria capitata, *Bp., Brmst., Br.*; Cardinalis capitata, *Rss.* [„Hndb."].

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 542.

Coccothraustes capitatus: priori similis, sed obscurior; capite scarlatino; colore a gula ad guttur usque cuneatim decurrente fuliginoso; alis caudaque nigris; basi pogonioque interiore remigum albido-limbatis; subtus albissimus; rostro subroseo; iride kermesina; pedibus carneis. — ♀ simillima, culmine verum rostri fuscato.

Länge 17cm.; Flügel 9,4cm.; Schwanz 6,5cm.

(Jugendkleid nach Burmeister: matter, mehr braungrau am Rücken gefärbt; der Kopf anfangs blaßbraun, dann roſtgelblich und erſt ſpäter wirklich roth; Schnabel und Beine ſehr verloſchen gefärbt. — Ei weiß, graubraun gepunktet).

Der ſchwarzkehlige graue Kardinal heißt auch Rothkopfkardinal und Rothkappe (Br.); rothköpfiger Kardinal (Ruß, „Handbuch").

Le Cardinal à gorge noire ou à tête rouge; Red-headed or Black-throated Cardinal.

Nomenclatur: Tanagra gularis, *L., Bff., Lth., Gr.*; Nemosia gularis, *Vll., Gr.*; Tachyphonus gularis, *Orb.*; Paroaria gularis, *Bp., Brmst., Br.*; Coccopsis et Calyphthrophorus gularis, *Cb., Schmb.*; Cardinalis gularis, *Rss.* [„Hndb."].

Wissenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 542.

Coccothraustes gularis: capite gulaque sanguineis; macula gutturis nigra; cervice, dorso, alis caudaque schistaceis; colli lateribus totoque gastraeo albissimis; rostro nigricante corneo, mandibula albida; iride fusca; pedibus plumbeis, rubicunde micantibus. — ♀ forsan haud dissimilis.

Länge 17cm.; Flügel 9,1cm.; Schwanz 6,5cm.

Der ſchwarzbäckige Kardinal [Coccothraustes melanógenys] von Porto Kabello iſt im Heine'ſchen Muſeum nach Cabanis in einem alten Männchen und zwei Jungen vorhanden. Chenu beſchreibt ihn wie folgt: Oberkopf, Kinn und Kehle roth, Wangen ſchwarz, Halsband weiß; ganzes übriges Gefieder tiefſchwarz; Schnabel ſchwarz mit gelblichem Kieferrand. Als Heimat gibt er die Inſel St. Thomas an. — Nemosia nigrogenys, *Lfrsn.*; Tanagra nigroaurita, *Css.*

Der grüne Kardinal [Coccothraustes cristatellus].

Tafel XVII. Vogel 66.

Unter den Vögeln, welche man im Sprachgebrauch Kardinäle nennt, gehört dieſer zu den ſchönſten und beliebteſten. Er iſt oberhalb dunkelgrünlichgelb, an Oberkopf nebſt Federbuſch und Kehle ſchwarz und an der ganzen Unterſeite lebhaft hellgelb. Das Weibchen iſt oberſeits fahlgraugrün mit ebenſolchem Federſchopf und weißen Wangen; unterhalb fahlgrün. Die Größe iſt kaum geringer als die des grauen und Dominikaner-Kardinals, doch erſcheint er bemerkbar ſchlanker. Seine Heimat dürfte ſich auf Südbraſilien, Paraguay und die Laplataländer beſchränken; mit Sicherheit iſt ſie jedoch noch keineswegs feſtzuſtellen. Ueber das Freileben haben Azara und Burmeiſter nur ganz kurz berichtet: Während der Niſtzeit parweiſe und nach derſelben in kleinen Flügen lebend, hält er ſich vor-

nämlich an der Erde in lichtem Gebüsch auf, erscheint träge, indem er ungern weit fliegt, und ernährt sich von allerlei Sämereien, Kerbthieren und Gewürm. Das sehr große, offne, wenig kunstfertige Nest steht in niedrigem Gesträuch. Er wird unschwer in mancherlei Fallen gefangen.

Obwol er gegenwärtig zu den allbekannten Stubenvögeln zählt, so läßt sich doch kaum nachweisen, wann er zuerst lebend eingeführt worden. Lessou theilt zwar mit, daß ihn schon zu seiner Zeit, also etwa im ersten Drittel dieses Jahrhunderts, Madame Freycinet in Paris aus Buenos-Ayres erhalten hatte. Vieillot hat ihn in seinem Prachtwerk abgebildet, doch geben weder diese noch andere ältere Schriftsteller näheres über ihn an. Bechstein erwähnt ihn in den ersten Auflagen seiner Naturgeschichte nicht, dagegen führt ihn Bolle in dem Verzeichniß der auf dem europäischen Markt vorhandenen Vögel vom Jahre 1858 auf.

In der neuesten Zeit ist sein Gefangenleben sehr eingehend geschildert worden, da man ihn bereits vielfach und mit großem Glück gezüchtet hat. Zuerst dürfte er im zoologischen Garten von Köln im Jahre 1863 beim damaligen Direktor, Dr. Bodinus genistet haben; sodann hat ein Pärchen im Vogelhause des Herrn Verlagsbuchhändler Eduard Hallberger in Stuttgart mehrere Bruten aufgezogen. Darauf erzielte man derartige Erfolge in den zoologischen Gärten zu Frankfurt a. M. und Berlin und im Berliner Aquarium, nicht minder aber auch in zahlreichen Vogelstuben. Ein Hinderniß für seine Züchtung ist die Bösartigkeit, welche manches Pärchen, zuweilen auch nur ein einzelnes Exemplar, in der Vogelstube gegen andere, namentlich kleinere Genossen entwickelt und die der unheilvollen Thätigkeit der grauen Kardinäle ziemlich gleichkommt. So berichten einstimmig Herr Apotheker Jänicke in Hoyerswerda, Herr Präparator Martin aus dem Vogelhause des Herrn Fabrikant Vetter in Ludwigsburg und Herr Pfarrer Winkler in Fischenthal bei Zürich. Letztrer schildert auch zugleich eine Brut: Das Pärchen bewohnte eine kleine Stube mit grauen und rothen Kardinälen zusammen und behauptete in dem Kampfe gegen dieselben seinen Standort. Sie wurden hier nun zur Nistzeit allein gehalten und sofort baute das Männchen in einen kleinen Korb, welcher in einer Astgabel hing, ein recht liederliches Nest, dessen Boden nur mit einigen Blättern belegt war. „Ich kam ihnen dadurch zuhilfe, daß ich das Körbchen in ein andres, mit Mos gefülltes einheftete, um so der Brut von unten her Wärme zu sichern. Dies Nest, welches ich sogleich am alten Ort wieder befestigte, bauten die Vögel nun nicht weiter, sondern bezogen es und am 21. Juli sah ich das erste und am nächsten Tage das zweite Ei. Das Weibchen brütete allein, wurde aber vom Männchen gefüttert. Auffallend war es mir, daß das erstere, wenn es zur Entleerung vom Nest kam, täglich sich badete, ohne daß ich daraus einen Nachtheil wahrnehmen konnte. Am 15. Tage der Brut

lag im Nest ein dunkles bewegliches Klümpchen, am nächsten Tage ein zweites und schon nach drei Tagen streckten sich aus der dunkelflaumigen Masse zwei große Schnäbel, dunkelbraun mit gelben Mundrändern empor. Am drolligsten war die Erscheinung dieser Nestlinge seit dem Tage, an welchem zu allererst von den sichtbaren Federn die Kiele der Holle hervorsproßten und starr aufwärtsstrebten. Das alte Par, welches von allen meinen Kardinälen am zutraulichsten gewesen, entfaltete jetzt eine rührende Sorgfalt; jede Annährung ans Nest ward mit Flügelschlägen und wol gar mit Schnabelhieben zurückgewiesen. Vom ersten Tage an vermehrte ich die Gaben von frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern, letztere von 12 bis 15 Stück täglich bis auf dreißig; nach und nach verminderte ich diese Futterstoffe aber wieder etwas und nöthigte so die Alten, zur Aetzung mehr Quarkkäse und Brot zu verwenden. Die Entleerungen der Jungen zeigten nichts unregelmäßiges. Am 18. August morgens sah ich das eine, abends das andre derselben außerhalb des Nestes; vom 22. August an blieben sie auch des Nachts draußen. Noch ziemlich bettelhaft bekleidet hüpften sie doch mit den Alten sehr lebhaft von Zweig zu Zweig. Zu Ende Oktobers erschienen sie dem alten Weibchen ähnlich, nur alle Schattirungen verschwommen. Einen weitern Nistversuch machten die grünen Kardinäle in diesem Jahre nicht; wahrscheinlich weil die Jahreszeit schon zu weit vorgeschritten war."

Nach meinen Erfahrungen läßt sich das Pärchen selbst durch größere Vögel kaum stören. Im Berliner zoologischen Garten nisteten sie in einem im freien befindlichen großen Flugkäfig, welchen Hühnervögel, Tauben und selbst Glanzstare mit ihnen zusammen bewohnten und in meiner Vogelstube vermochten sie sogar ein Par Singsittiche aus der Nähe des Nestes zu vertreiben. Das letztre wird stets in einem Korbe angelegt und besteht meistens nur aus einer nachlässig zusammengetragnen Schicht von allerlei groben Stoffen, ohne daß eine auch nur einigermaßen sorgfältig geformte Mulde ersichtlich ist. Das Gelege besteht in 4 bis 6 Eiern und die Brutzeit währt 14 Tage. Das Männchen löst während derselben sein Weibchen wol hin und wieder, jedoch nicht zu bestimmten Zeiten ab, füttert es aber fast ausschließlich, so daß es bei dem täglichen Verlassen des Nestes kaum einige Körner allein frißt. Die Jungen werden von beiden Gatten mit Ameisenpuppen, Mehlwürmern, eingeweichtem Eierbrot, auch gesottnem Reis und Grünkraut, allerlei Früchten und selbst gekochten Kartoffeln ernährt. Im übrigen weicht der Verlauf der Brut von dem der grauen Kardinäle in keiner Hinsicht ab.

Ziemlich regelmäßig wird der grüne Kardinal alljährlich über Marseille und Bordeaux nach Europa eingeführt, meistens aber nur einzeln oder in wenigen Pärchen. Anfangs recht zart und gegen schwankende Temperatur, Naßkälte und andere üble Einflüsse sehr empfindlich, zeigt er sich nach der Eingewöhnung ziemlich

kräftig und ausdauernd; immer jedoch bleibt er etwas weichlicher, als seine grauen Verwandten. Den Gesang bezeichnet Herr Major Alexander v. Homeyer als laut und wohlklingend: spīa, speut, spīa, spīa. Er hört sich recht angenehm, doch einförmig an, und man hält den Vogel sicherlich mehr seines interessanten, gewissermaßen wunderlichen Aussehens, um deswillen ihn die Franzosen Räuberhauptmann nennen, sowie seines lebhaften Wesens und leichten Nistens halber, als daß man ihn als Sänger besonders schätzen sollte. Der Preis wechselt zwischen 30 bis 45 Mark für das Pärchen; nur selten sind die frisch angekommenen viel billiger, etwa für 24 Mark das Par, zu haben.

Der grüne Kardinal heißt auch Ammerkardinal (Br.).

Le Bruant Commandeur; Black crested Cardinal. — Cardinal amarillo, in den Laplataſtaten (*Brmst.*). Groene Kardinaal.

Nomenclatur: Gubernatrix cristatella, *Lss.*, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.*; Emberiza cristatella, *Vll.*; Emberiza gubernatrix, *Tmm.*; Gubernatrix cristata, *Swns.*; Lophocórythus gubernatrix, *Gr.*; Cardinalis cristatella, *Rss.* [„*Hndbch.*“]. — Crestudo amarillo, *Azr.*; Commandeur cristatelle, *Chénu.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Kopf gelblicholivengrün mit langer ſpitzer ſchwarzer Haube, breitem gelben Augenbrauenſtreif, ſchwarzem Zügelſtreif und kleinem gelben Streif unterm Auge; Nacken und Wangen düſterolivengrün; Mantel und ganzer Rücken olivengrün, jede Feder mit breitem ſchwarzen Schaftſtrich; Flügeldecken und Schwingen ſchwarz, erſtere mit breiten, letztere mit ſchmalen gelbgrünen Außenſäumen; Unterrücken und Bürzel einfarbig düſter olivengrün; Schwanzfedern ſchwarz, ſchmal olivengrün außengeſäumt, die drei äußerſten Federn lebhaft gelb; Kehle vom Schnabel bis zur Oberbruſt breit ſchwarz; vom Mundwinkel die Gegend neben den Wangen ſowie Halsſeiten und ganze Unterſeite lebhaft gelb. Schnabel bräunlichhorngrau; Auge braun; Füße ſchwärzlichgrau. — Weibchen: Kopf, Rücken und ganze Oberſeite fahl graugrün; Federſchopf graugrün; Augenbrauenſtreif und Wangen graulichweiß; Zügel und Kehle ſchwärzlich; Mantelfedern mit ſchwärzlichem Schaftſtrich; Schwingen und Schwanzfedern ſchwärzlich, weißlich außengerandet; ganze Unterſeite blaß grünlichgrau, an der Bruſt weißlich. Schnabel bleigrau; Auge braun; Füße blaugrau.

Coccothraustes cristatellus: capite flavente olivaceo-viridi; crista pilei longa, acuminata; stria superciliari lata flava, altera lororum nigra, tertiaque parva subter oculum flava; genis cerviceque luride olivaveo-viridibus; scapo plumae cujusque interscapilii dorsique totius late nigro; tectricibus al. et remigibus nigris, illis late, his anguste exterius olivaceo-viride limbatis; tergo crissoque unicoloribus sordide olivaceo-viridibus; rectricibus nigris, anguste olivaceo-viride limbatis, extimis ternis laete flavis; gula a rostro ad guttur usque late nigra; colli lateribus ab oris angulo totoque gastraeo flavissimis; rostro subfusco-corneo; iride fusca; pedibus nigricante cinereis. — ♀ capite, dorso totoque notaeo fumigato-viridibus; crista cano-viridi; stria superciliari genisque incanis; loris, gula scapoque plumarum interscapilii nigrescentibus; remigibus rectricibusque subnigris, exterius albido marginatis; subtus virente cana pectore albicante; rostro plumbeo; iride fusca; pedibus caesiis.

Länge 17$^{cm.}$; Flügel 9,$_{1}^{cm.}$; Schwanz 6,$_{5}^{cm.}$

Jugendkleid: Kopf, Rücken und ganze Oberſeite fahlgraugrün, die ſchwärzlichen Schaftſtriche nur angedeutet; Schwingen und Schwanzfedern ſchwärzlichgrau, fahl außengerandet; Federſchopf fahlgrünlichgrau; Augenbrauenſtreif und Wangen weißlich; Zügel und Kehle grau; ganze Unterſeite fahlgrünlichgrau, Bruſt bis zum Bauch, auch die Seiten dunkelgrau gefleckt oder vielmehr breit ſchaftſtreifig.

Juvenis: capite, dorso totoque notaeo livide cano-virentibus, vix nigricante substriatis; remigibus et rectricibus subnigro-cinereis, exterius livide marginatis; crista livide virente cana; stria superciliari genisque albidis; loris gulaque cinereis; gastraeo toto livide virescente cano; pectore ad abdomen usque et hypochondriis cinereo-maculatis.

Beſchreibung des Eies: rein blaugrünlichweiß, mit einzelnen ſchwarzen Punkten und Flecken gezeichnet (Baldamus); auf grünlichem Grunde dunkler geſprenkelt (Brehm); hellgrünlichblau, ſchwarzbraun gepunktet und gefleckt (Ruß).

Ovum: aeruginoso-albidum punctis maculisque singulis obsitum nigris (*Bld.*). O. virescens obscurius conspersum (*Br.*). O. dilute aeruginosum, nigro-fusco-punctatum et maculatum (*Rss.*).

Der kleine grüne Kardinal [Coccothraustes cristatellina, *Rss.*] iſt ein von Burmeiſter als neue Art beſchriebner Vogel, welchen er in Tukuman in den Laplataſtaten fand: Halb ſo groß als der vorige; Oberkopf ſchwarz, mit ſehr langen Schopffedern; Zügel und Augenbrauenſtreif bis zum Nacken weiß, ebenſo Kehle und Vorderhals, aber am Kinn ein ſchwarzer Fleck; Flügelfedern mit weißlichen Rändern, die drei äußeren Steuerfedern mit weißer Spitze; das ganze übrige Gefieder bleigrau; Schnabel ſchieferſchwarz, Unterſchnabel weiß; Auge braun; Füße ſchieferſchwarz. Das Weibchen iſt ebenſo, doch braungrau. Irgend etwas näheres iſt nicht bekannt. (S. 460 habe ich bereits eine Fringilla pusilla aufgeführt und ich mußte daher auch hier eine neue lateiniſche Bezeichnung geben). — Gubernatrix pusilla, *Brnst.*

Der hellblaue Kernbeißerfink [Coccothraustes coerúleus].
Der dunkelblaue Kernbeißerfink [Coccothraustes Brissoni].

Von dieſen beiden herrlichen Vögeln, im Handel hellblauer und dunkelblauer Biſchof genannt, wird der letztre hin und wieder einzeln oder parweiſe von Fräulein Hagenbeck und den Herren Reiche, Lintz, Möller u. A. eingeführt, während der erſtre zu den allerſeltenſten Erſcheinungen gerechnet werden muß. Beide ſind einfarbig, jener heller und dieſer dunkler, indigoblau. Ebenſo ſind die Weibchen einfarbig braun, das des einen heller, fahlgelblichbraun, das des andern dunkler, fahlbraun. Die Größe beider übertrifft kaum bemerkbar die des Kanarienvogels. Die Heimat des erſtern erſtreckt ſich vom Süden Nordamerikas bis Mittelamerika und Weſtindien, nach Baird auch über Mexiko und Kalifornien, alſo von der Küſte des atlantiſchen bis zum ſtillen Ozean. Dr. v. Frantzius zählt ihn unter den Vögeln von Koſtarika mit. Ebenſo beobachtete ihn Dr. Gundlach auf der Inſel Kuba, wo er zu Anfang des Monats April mit anderen Zugvögeln, jedoch nur ſelten und in gewiſſen Jahren, erſcheint. Die Verbreitung des letztern dürfte ſich auf Braſilien beſchränken.

Während über den nordamerikaniſchen Vogel die Literatur von altersher mancherlei Aufſchluß gibt, hat ſie über den braſiliſchen bis zur Gegenwart nur ganz geringe Mittheilungen aufzuweiſen; dieſer aber bevölkert bereits hier und da die Vogelſtuben, während jener bisher kaum in den zoologiſchen Gärten, geſchweige denn bei den Liebhabern zu finden iſt.

Die älteſten Schriftſteller bringen über beide unrichtige Angaben; ſie werfen ſie entweder als eine Art zuſammen oder ſie wiſſen ſie doch nicht mit Sicherheit zu unterſcheiden. Auch irren ſie ſich zuweilen inbetreff der Heimat, ſo nennt z. B. Edwards Afrika als die des hellblauen Biſchofs, während andrerſeits ſchon Briſſon beide Arten getrennt hatte und die eine als in Karolina, die andre in Braſilien vorkommend, bezeichnete. Bereits Catesby berichtet, daß der hellblaue in Karolina ſelten ſei, einſam und ſtets parweiſe lebe, ſich niemals zu Scharen verſammle und zum Winter fortziehe. Sein Geſang ſei einförmig, immer in demſelben Ton fortlaufend. Im übrigen habe der Vogel viele Aehnlichkeit mit dem europäiſchen Gimpel.

Zu Vieillot's Zeit hatte man namentlich den hellblauen zuweilen in Liſſabon, Paris und London lebend; er ſei ruhig und gewöhne ſich leicht ein, bedürfe jedoch winters einer hohen Wärme, um einige Jahre auszudauern. Sein Geſang ſei unbedeutend, aber ſeine ſchöne Farbe mache ihn werthvoll. Unter günſtigen Verhältniſſen werde er jedenfalls in der Gefangenſchaft niſten. Die fälſchliche Heimatsangabe Edwards' berichtigt er und ſagt, daß der Vogel nur in Braſilien und Paraguay lebe. Der dunkel- und der hellblaue ſeien einander zwar ſehr ähnlich, keineswegs jedoch übereinſtimmend.

Ebenſo beſchreibt Bechſtein beide blauen Kernbeißer. Der hellere befand ſich in der Sammlung des Herzogs von Meiningen, wo er mit Kanarienſamen gefüttert wurde, wenig lockte und leiſe ſang. Als Heimat des dunkelblauen gibt auch dieſer Schriftſteller irrthümlich Angola an. Im übrigen habe er ebenfalls einen leiſen, angenehmen Geſang, dem des Zeiſigs ähnlich; auch zeige er ſich immer munter und werde ungemein zahm, ſodaß er das Futter aus der Hand nehme. In Dr. Bolle's Liſte iſt der erſtere allein und zwar als ſelten vorkommend mitgezählt.

Ueber das Freileben haben Audubon, Prinz v. Wied und Burmeiſter berichtet, der erſtre hatte einen jung aus dem Neſte genommenen und aufgefütterten hellblauen Kernbeißer nach Edinburg mitgebracht, welcher dadurch wunderlich erſchien, daß er eine blanke Münze, wenn ſolche auf den Tiſch gelegt wurde, in den Schnabel nahm und mit ſichtlichem Vergnügen damit ſpielte. Die Lebensweiſe beider Arten dürfte ſicherlich übereinſtimmen und ich faſſe daher vornämlich das über die letzterwähnte geſagte in folgendem zuſammen. Das Pärchen hält ſich im lichten Gebüſch an möglichſt einſamen Stellen auf und erbaut hier meiſtens niedrig, bis zu Mannshöhe, immer ſehr verſteckt ein offnes Neſt, welches außen aus dünnen Reiſern, Würzelchen und Mos beſteht und innen mit Gräſern und Haren zierlich gerundet iſt und faſt regelmäßeg 4 Eier enthält. Das Weibchen brütet allein, doch wird es vom Männchen gefüttert und ebenſo ernähren beide gemeinſam die Jungen. Alljährlich werden zwei Bruten gemacht; nach der

letzten schweifen sie in kleinen Flügen umher und sollen namentlich am Mais beträchtlichen Schaden verursachen. Als Wandrer soll er, und zwar Männchen und Weibchen getrennt und jene zuerst, gegen den Winter hin bis Mittelamerika ziehen und etwa von Mitte bis Ende März zurückkehren. Die Nahrung soll nur in Sämereien, nicht aber in Beeren und Früchten bestehen. Da die dunkelblaue Art jedoch in der Vogelstube ebensowol Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Eierbrot, als auch fein zerschnittene Aepfel, Vogelbeeren, Weintrauben und allerlei andre Frucht frißt, so vermuthe ich, daß beide hierin von den Verwandten nicht abweichen werden. „Im Kamposgebiet des ganzen innern Brasiliens", sagt Burmeister, „nicht im Urwalde, sondern nur an den Waldrändern, auf offenen, mit Gebüsch bestandenen Flächen, sieht man den dunkelblauen einzeln oder im Winter auch wol in kleinen Scharen. Häufig ist er mir indessen nicht vorgekommen." Dr. Karl Euler fand am 9. Februar die genannte Art nestbauend.

Ein Pärchen derselben in meiner Vogelstube nistete im März d. J. 1876 und das Weibchen allein erbaute frei im Gebüsch ein napfförmiges Nest aus Halmen und Fasern, innen mit Mos und Baumwolle gefüttert; ebenso erbrütete es das Gelege von vier Eiern ohne Hilfe des Männchens, nur von diesem gefüttert und zwar in 13 Tagen. Von anderen Züchtern dürfte ein solcher Erfolg bisher weder mit dieser, noch mit jener Art erzielt sein, wie denn beide ihrer Seltenheit wegen bis jetzt überhaupt erst wenig Gelegenheit zu derartigen Versuchen gaben. In Karolina, Louisiana, Georgia u. a. Staten von Nordamerika, wo der hellblaue Vogel keineswegs selten ist, soll er ziemlich zahlreich gefangen und zu dem billigen Preise von einem Dollar für den Kopf verkauft werden, während er bereits in New-York um das doppelte bis dreifache theurer ist. Bei uns bezahlt man den dunkelblauen Bischof, wenn er frisch angekommen ist, mit 20 bis 30 Mark für das Pärchen, doch zeigt er sich dann sehr hinfällig; eingewöhnt beträgt der Preis 45 bis 60 Mark für das Par. Still, ruhig und harmlos im Gesellschaftskäfige wie in der Vogelstube, läßt er einen einförmigen, aber sanften und wohltönenden Gesang hören, ein hervorragender Sänger ist er keinenfalls. Burmeister sagt allerdings, man höre ihm gern eine zeitlang zu, wenn man die Gelegenheit habe, ihn an seinem Lieblingsstande zu belauschen. Er wird ungemein zahm, sodaß er namentlich Mehlwürmer, nach denen er überaus lüstern ist, aus der Hand nimmt, doch ist zu beachten, daß er sich leicht zu fett frißt. Herr v. Schlechtendal berichtet aus dem Gefangenleben über folgende Erfahrungen: „Ich besitze zwei prächtige Männchen, von denen das eine schon seit Jahr und Tag friedlich mit einem Pärchen Hüttensänger zusammen in einem Käfige lebt, während das andre ein großes mit amerikanischen Körnerfressern besetztes Flugbauer bewohnt. Hier zeigte sich bald, daß nicht alle Bischöfe durchaus friedfertiger Natur sind; ein Indigofink, ein Gartentrupial und ein Trauer-

zeisig wurden arg befehdet, während es gegen die rosenbrüstigen Kernbeißer, sowie einen Soldatenstar nicht zu kämpfen wagte. Ebenso ließ ein amerikanischer Seidenschwanz oder Zedernvogel sich durch das drohende Schnabelaufsperren des Bischofs nicht irre machen; er blieb ruhig sitzen und klappte höchstens auch einmal mit dem Schnabel. Abgesehen von der hin und wieder vorkommenden Streitlust sind die dunklen Bischöfe angenehme muntere Vögel, die zugleich recht hübsch singen und jedem Flugkäfige zur Zierde gereichen." Nach Gundlach wird er auch auf Kuba im Käfige gehalten, doch dürften dies von anderwärts hergebrachte Exemplare sein. Der hellblaue Bischof wird im Wesen und in allem übrigen wol mit ersterem übereinstimmen, näheres vermag ich jedoch nicht anzugeben, da ich ihn nur im Berliner zoologischen Garten und Aquarium in je einem Männchen und dann ebenso auf der großen Vogelausstellung d. J. 1877 in Berlin, im Besitz des Herrn Schöbel, gesehen habe. Dasselbe kaufte Herr v. Schlechtendal, nachdem der Preis von 75 Mark bis auf 40 Mark herabgegangen. Auch in der verständnißvollen Pflege dieses bewährten Vogelwirths erholte es sich leider nicht mehr, nachdem es auf den Ausstellungen wol bereits zu sehr gelitten. Außer den Sämereien verzehrte es übrigens nur Mehlwürmer und verschmähte Beren und Grünkraut. Mit Kubafinken u. a. kleinen Genossen lebte es verträglich beisammen. — Im Londoner zoologischen Garten war der hellblaue Kernbeißerfink schon seit dem Jahre 1862, der dunkelblaue aber erst seit d. J. 1865 vorhanden.

Der hellblaue Kernbeißerfink heißt auch blauer Bischof, blos Bischof, und Blaukernbeißer. [Blauer Kernbeißer, guianischer Blaufink, blauer Dickschnäbler, himmelblauer Kernbeißer und blauer nordamerikanischer oder karolinischer Gimpel, nach alten Autoren].

Le Grosbec ou Evêque bleu; Blue Grosbeak or Blue Bishop. — Azulejo real, auf Kuba nach Gndl.

Nomenclatur: Loxia coerulea, *L.*, *Gml.*, *Wls.*; Guiraca coerulea, *Swns.*, *Gndl.*; Fringilla coerulea, *Ill.*, *Lchtst.*, *Bp.*, *Audb.*, *Rss.* [„*Hndb.*"]; Coccoborus coeruleus, *Swns.*, *Audb.*, *Cb.*; Cyanoloxia coerulea, *Bp.*; Goniaphea coerulea, *Bp.*, *Br.*; Guiraca caerulea, *Brd.* [Pyrrhula carolinensis caerulea, *Brss.*; Coccothraustes caeruleus, *Kln.* — Bouvreuil bleu de la Caroline, *Briss.*; Blew Gros-beak. *Cat.*; Bec-rond ou Bouvreuil bleu d'Amérique, *Buff.*; Blue Grosbeak, *Penn.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kobaltblau; Schnabelgrund, Zügel und Oberkehle fast reinschwarz; Rückenmitte dunkelblau, Schwingen schwarz, theilweise rothbraun gerändert, über den Flügel eine gelblichbraune Querbinde; Schwanzfedern schwarz, schmal blau außengesäumt; ganze untere Körperseite heller kobaltblau; untere Flügelseite schwärzlichgrau, untere Schwanzdecken weiß gesäumt; untere Schwanzseite graulichschwarz; Schnabel bräunlichhorngrau, Unterschnabel heller; Auge braun; Füße bräunlichgrau. — Weibchen fahlgelblichbraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller; Wangen bläulich angehaucht; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, schmal bläulich außengesäumt; Flügel mit zwei fahlen Querbinden; Bürzel bläulichgraubraun; Oberkehle weißlich; Schnabel etwas heller braun, Auge und Füße übereinstimmend.

Coccothraustes coerúleus: nitide kobaltinus; rostri radice, loris gulaque subatris; dorso medio cyaneo; remigibus nigris, exterius caesio-limbatis; fascia trans alam ochracea; rectricibus nigris, exterius anguste coeruleo-limbatis; subtus dilutius kobaltinus; alis subtus nigricante cinereis; cauda subtus nigrescente; rostro

subnigro-fusco, mandibula dilutiore; iride fusca; pedibus subfumidis. — ♀ livide ferruginea, supra obscurior, subtus dilutior; genis subcoeruleo-afflatis; remigibus rectricibusque fuscis, exterius anguste subcoeruleo-limbatis, illis fascias duas ostendentibus lividas; uropygio coerulescente fumigato; gula albida; rostro dilutius fusco; iride pedibus ut maris coloratis.

Länge 18,3 cm.; Flügel 8,2 cm.; Schwanz 7 cm.

Der dunkelblaue Kernbeißerfink heißt auch Blaugimpelfink (Br.); schwarzblauer Bischof (v. Schlechtendal); lasurblauer Kernbeißer (Bchst.) und dunkelblauer Bischof (Ruß: „Hdbch.").

Le Grosbec bleu de ciel ou l'Evèque bleu de ciel; Brazilian Blue Grosbeak or Brazilian Blue Bishop.

Nomenclatur: Loxia cyánea, *L., Lth.;* Loxia coerulea, var. β *Gml., Lth., Edw.*: Coccot braustes cyaneus. *Vll.;* Fringilla Brissoni, *Lchtst., Pr. Wd., Eul., Rss.* [„*Hndbch.*"]: Pitylus cyaneus, *Gr.;* P. Brissonii, *Gr., Hrtl.;* Coccoborus cyaneus, *Cb., Brmst.:* Goniaphea cyanea, *Br.*; [Pyrrhula brasiliensis caerulea, *Brss.* — L'Azulam, *Vll.*; Blue Grosbeak, *Lath.;* Pico grueso azulejo, *Azr.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Dunkel indigoblau, Oberkopf heller, über die Stirn oberhalb des Auges bis zum Ohr ein breiter hellblauer Streif; schmaler Rand um den Schnabel, Wangen und Oberkehle schwarz, erstere unterhalb hellblau umgeben; kleine Flügeldecken hellblau, Schwingen schwarz, sehr schmal außengesäumt; Unterdecken und Bürzel ein wenig heller blau als das übrige Gefieder; Schwanz schwarz; ganze Unterseite schwärzlichblau, untere Flügel- und Schwanzseite schwärzlichaschgrau. Schnabel schwarz, Unterschnabel am Grunde heller; Auge braun; Füße heller, bräunlichgrau. — Weibchen röthlichgelbbraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller; Schwingen und Schwanzfedern graubraun, die großen Deckfedern dunkelbraun, röthlichfahl gerandet. Schnabel dunkelgraubraun; Auge braun; Füße bräunlichgrau. — Jugendkleid einfarbig fahlgraubraun, viel heller als das des Weibchens; Flügel und Schwanz schwärzlichgraubraun, doch mit breiten fahlen Außensäumen.

Coccothraustes Brissoni: saturate cyaneus, pileo dilutiore; stria frontali lata ultra oculum ad aurem usque coerulea; capistro, gula genisque nigris, his deorsum coeruleo succinctis; tectricibus al. minoribus coeruleis; remigibus nigris, exterius angustissime limbatis; tectricibus subalaribus uropygioque paululum pallidioribus quam plumis reliquis; cauda nigra; subtus nigricante coeruleus, subalaribus latereque caudae inferiore subnigro-cinereis; rostro nigricante corneo, mandibulae basi dilutiore; iride fusca; pedibus pallidioribus. — ♀ ferruginea, supra obscurior, subtus dilutior; remigibus rectricibusque fumidis; tectricibus al. majoribus fuscis, subfulvo-marginatis; rostro obscure fumigato; iride fusca; pedibus fumidis. — Juvenis unicolor livide fumidus, multo femella pallidior; alis caudaque nigricante fumidis, exterius verum late livide limbatis.

Länge 16,4 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 6,5 cm.

Beschreibung des Eies: Weißlich, dicht rothbraun gefleckt (Ruß).

Ovum albidum, dense badio-maculatum (*Rss.*).

Der meerblaue Kernbeißerfink [Coccothraustes glaucocoeruleus, *Orb.*] aus dem Süden von Brasilien, Montevideo und dem Laplatagebiet, ist heller blau und die Schwingen und Schwanzfedern haben himmelblaue Ränder. Die Größe ist beträchtlich geringer als die des dunkelblauen Verwandten. — Pico grueso azul, *Azr.* (Nach Burmeister).

Der schwarze Kernbeißerfink [Coccothraustes niger].

Schon den alten Schriftstellern bekannt, ist er trotzdem bis auf unsere Tage einer der seltensten Vögel im Handel, und dies müssen wir umsomehr bedauern, da er zu den schönsten der hierher gehörenden Verwandten zählt. Er ist am ganzen

Körper einfarbig tiefschwarz mit weißer Flügelbinde und das Weibchen ist bräunlich-mattschwarz. Seine Größe ist beträchtlich geringer als die des dunkelblauen Bischofs, etwa der des Muskatvogels gleich; doch erscheint er gedrungener und dickerschnäbelig. Buffon erwähnt ihn und bringt eine Abbildung, weiß ihn jedoch nicht mit Sicherheit einzureihen; während Linné Südamerika als Heimat angeführt, gibt erstrer wie schon Brisson und Catesby Mexiko als solche an. Letzterer, der wol nicht nach Anschauung urtheilt, meint, daß er dem Papstfink ähnlich sein müsse, weil er von den Spaniern Mariposa nigra, d. h. schwarzer Schmetterling genannt werde und weil jener bekanntlich ebenfalls Mariposa heißt. Neuerdings hat Gundlach festgestellt, daß diese Art nur auf Kuba vorkommt, wo sie gemein ist, in der Nistzeit parweise und nach derselben familienweise in Wäldern oder Vorgebüschen lebt. „Ihre Nahrung besteht in verschiedenen Sämereien und Beren, vielleicht auch zuweilen in Insekten. In der Zeit vom April bis Juli erbaut der Vogel zwischen Schlingpflanzen, auf Bäumen oder zwischen einem stark verästelten Zweige ein mehr oder weniger kugeliges Nest mit seitlichem Eingange aus dürren Kräutern und Blättern, Haren, Borsten, Federchen und Würzelchen. Das Gelege besteht in drei bis vier Eiern. Sein feiner Gesang ist bei den Einwohnern beliebt, weshalb sie ihn auch vielfach fangen und in Käfigen halten, in welchen letzteren sie ihn mit Kanariensamen und groben Maismehl ernähren. Ich habe auch einen Albino gesehen, welcher nicht schwarz, sondern grauweiß gezeichnet war." Bis zum Jahre 1877 war der schwarze Bischof, wie er von den Händlern meistens genannt wird, sehr selten zu erlangen; ich hatte im Laufe der Jahre nur ein Männchen im Berliner Aquarium gesehen und ein solches von Herrn Karl Gudera in Leipzig erhalten. Dann schickte mir Herr Wiener in London ebenfalls ein Männchen zur Bestimmung und schließlich führte zur genannten Zeit Fräulein Chr. Hagenbeck eine beträchtliche Anzahl ein. Im zoologischen Garten von London befindet er sich allerdings schon seit dem Jahre 1868. Nach meinen Erfahrungen zeigt er sich friedlich und ausdauernd, im ganzen Wesen mit dem dunkelblauen Bischof übereinstimmend; sein Gesang ist angenehm, aber ungemein leise. Recht sehr bedaure ich, daß das Pärchen, welches Fräulein Hagenbeck mir für die Vogelstube gesandt, nicht am Leben geblieben ist, denn ich hätte gern eine Brut dieses Vogels beobachtet. Nach Dr. Gundlach's Angaben weicht das Nest doch von dem aller Verwandten in der Gestalt ab und schon deshalb wäre mir die Erforschung des Brutverlaufs vorzugsweise erwünscht gewesen. Hoffentlich gelangt bald eine neue Sendung auf den Markt.

Der schwarze Kernbeißerfink heißt auch schwarzer Bischof (Ruß' „Handbuch") und Schwarzgimpelfink nach Br. [Kleines schwarzes Rothschwänzlein, Seelgm.; schwarzer Rundschnabel, Buff.].

Le Grosbec noir ou l'Evêque noir; Black Bullfinch, Black Grosbeak or Black Bishop. — Negrito auf Kuba, nach Gndl.

Nomenclatur: Loxia nigrá, *L.;* Pyrrhula nigra et P. arenirostris, *Vll.;* Spermophila nigra, *Gr.;* Melopyrrhula nigra, *Bp., Gndl.;* Goniaphea nigra, *Br.;* Fringilla nigra, *Rss.* [*„Hndb.“*]. — [Pyrrhula mexicana nigra, *Brss.;* Coccothraustes niger, *Kln.* — Bouvreuil noir du Mexique, *Brss.;* Little Black Bull-finch, *Cat.;* Bouvreuil ou Becrond noir et blanc, *Buff.* — Mariposa nigra, (d. h. schwarzer Schmetterling) von den Spaniern in der Heimat genannt, *Cat.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Tief- und glänzendschwarz, schwach bläulich scheinend; oberhalb des Auges einige weiße Federchen (jedoch nicht bei allen); kleine und große Flügeldecken, Flügelrand und die letzten Schwingen am Grunde reinweiß; Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Füße schwärzlichbraun. — Das Weibchen ist im ganzen gleich, doch hat es weniger Glanz, und die schwarze Färbung ist nicht so tief.

Coccothraustes niger: nitide ater, subtiliter coerulescente micans; interdum plumulis nonnullis supra oculum albis; tectricibus al., campterio basique remigum ultimorum albissimis; rostro nigro; iride fusca; pedibus nigricante fuscis. — ♀ omnino concolor sed minus nitens nigraque.

Länge 15 cm.; Flugbreite 21,5 cm.; Schwanz 6,2 cm. (♀ Länge 13,8 cm., Flugbreite 20 cm.; Schwanz 5,5 cm.).

Jugendkleid ganz ohne Glanz und dunkelgrau überflogen (Gundlach).

Juvenis: splendore carens cinereo-afflatus.

Beschreibung des Eies: Gestalt gestreckt, ungleichhälftig, nach der Basis schnell und ziemlich stark nach der stumpfspitzen Höhe zu abfallend. Grundfarbe aus Schmutzigweiß wenig ins Grünliche ziehend, über die Oberfläche ungleich zerstreute und verworrene, um die Basis einen Kranz bildende, kleine und größere Fleckchen von bräunlichgrauer, blaß- und dunkelbrauner, nicht sehr lebhafter Färbung. Länge 17,6 mm., Breite 12 mm.

Ovum: longiusculum, a basi apicem obtuso-acuminatum versus celeriter et fortiter decrescens; sordide albido-virens maculis minoribus majoribusque fumidis et subfuscis conspersum, coronulam circa basin fingentibus.

Der schwarzköpfige Kernbeißerfink [Coccothraustes torridus].

Wenig größer und gedrungener als die kleinen Pfäffchen ist er denselben jedoch in Gestalt und Wesen, sowie auch in der Lebensweise überaus ähnlich; nur ist er beiweitem mehr dickschnäblig. Kopf und Flügel sind schwarz, auf jedem der letzteren ein kleiner weißer Fleck; der übrige Körper ist kastanienbraun. Das Weibchen ist einfarbig braun, oberhalb dunkler, unterhalb heller. Die Heimat erstreckt sich über das mittlere und nördliche Brasilien bis Guiana und wol südlich bis an die Grenzen der Tropen. Er ist nach Burmeister mehr im Innern, auf offenen Triften, als im Waldgebiet heimisch und nirgends häufig. Dr. Karl Euler sammelte ihn in der Provinz Rio de Janeiro. Im Vogelhandel erscheint er immer nur in wenigen Köpfen. Während er im zoologischen Garten von London bereits seit dem Jahre 1860 vorhanden ist, findet man ihn bei uns in den Thiergärten und ebenso in den Vogelstuben recht selten. Nach meinen Aufzeichnungen wurde er i. J. 1873 von Herrn Lintz in Hamburg, 1875 von Fräulein Hagenbeck und 1877 von Herrn Möller einzeln oder pärchenweise eingeführt. Ueber zwei von letzterem bezogene Pärchen schreibt Herr v. Schlechtendal folgendes: „Es sind stille, friedfertige kleine Vögel. Sie verschmähen Mehl-

würmer, Grünkraut und Früchte, halten sich nur an allerlei Gesäme und scheinen völlig gesang- und klanglos zu leben. Ein bereits durch Krankheit geschwächtes Männchen biß mich mit seinem kurzen dicken, scharf gespitzten Schnabel in empfindlicher Weise, als ich es in die Hand nehmen mußte, um es in einen andern Käfig zu versetzen." Gezüchtet ist er bis jetzt noch nicht, und im allgemeinen gewährt er auch nur ein geringes Interesse. Wünschenswerth wäre es allerdings, daß aufmerksame Vogelfreunde ihn zur Zucht bringen, ihre Erfahrungen niederschreiben und dann veröffentlichen möchten.

Der schwarzköpfige Kernbeißerfink heißt auch blos Reisknacker (Br.) und schwarzköpfiger Reisknacker (Ruß' „Handbuch").

Le Grosbec de riz à tête noire; Tropical Seedfinch, or Oryzoborus Finch.

Nomenclatur: Loxia torrida, *Gml., Lth., Azr.;* Coccothraustes rufiventris, *Vll.;* Fringilla torrida, *Lchtst., Pr. Wd., Rss.* [*„Hndb."*]; Loxia nasúta, *Spx.;* Pyrrhula torrida, *Tmm.;* Pitylus torridus, *Orb., Gr.;* Coccoborus magnirostris, *Swns.;* Guiraca magnirostris, Spermóphila nasuta et S. angolensis, *Gr.;* Coccoborus torridus, *Tschd.;* Spermophila torrida, *Bp.;* Oryzóborus torridus, *Cb., Brmst.;* Goniaphea torrida, *Br.* [Loxia angolensis, *L., Lth., Edw.*]. — Pico grueso negro y canela, *Azr.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf und Flügel schwarz, Schwingen am Grunde weiß und ebenso ein kleiner runder Fleck inmitten des Flügels weiß; Brust, Bauch und der ganze übrige Körper kastanienbraun; untere Flügelseite reinweiß, Schnabel schwärzlichgraubraun, Unterschnabel heller; Auge dunkelbraun; Füße dunkel röthlichgraubraun. — Das Weibchen ist olivengrünlichbraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller, mehr rosträthlichgelb; Schwingen und Schwanzfedern schwärzlichbraun; untere Flügelseite düsterweiß; Schnabel bräunlichhorngrau; Auge braun; Füße hell bräunlichgrau.

Coccothraustes torridus: capite alisque nigris, basi remigum maculaque parva alae mediae albis; pectore, abdomine corporeque reliquo castaneis; alis subtus albissimis; rostro fumido, mandibula dilutiore; iride fusca; pedibus rufescente fumigatis. — ♀ olivaceo-virente fusca, supra obscurior, subtus pallidior, subferruginea; remigibus caudaque nigricante fuscis; alis subtus sordide albidis; rostro subfusco-corneo; iride fusca; pedibus subfumidis.

Länge 13 cm.; Flügel 6,5 cm.; Schwanz 3,9 cm.

Der dickschnäblige schwarze Kernbeißerfink [Coccothraustes crassirostris], aus Brasilien, und zwar Guiana und Amazonenstromgebiet und **Maximilian's schwarzer Kernbeißerfink** [Coccothraustes Maximiliani], aus dem Waldgebiet des mittleren Brasiliens, sind beide einfarbig schwarz, etwas grünlich schillernd, mit weißem Fleck inmitten des Flügels und mit unterer weißer Flügelseite. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Arten bestehen nur darin, daß bei der erstern die unteren Schwanzdecken und Wurzeln der Schwanzfedern weiß sind, ebenso alle Hand- und Armschwingen an der Wurzel der Innenfahne wodurch ein großer weißer Flügelfleck gebildet wird, während der des letztern nur klein ist. Jene ist bereits einmal in einem einzelnen Männchen von Fräulein Hagenbeck eingeführt, diese sicherlich noch garnicht. Die Größe beider ist übereinstimmend, etwas beträchtlicher als die des vorigen, nahezu der des europäischen Hänflings gleich. Näheres ist nicht bekannt. — Der dickschnäblige schwarze Kernbeißerfink heißt auch Schwarzknacker (Br.) und schwarzer Reisknacker („Ruß' Handbuch"). Le Grosbec de riz noir; Black Tropical Seed-finch. Loxia crassirostris, *Gml., Lth.* [nec *Pr. Wd.*]; Oryzóborus crassirostris, *Cb., Brmst.* — Maximilian's schwarzer Kernbeißerfink hat keinen weitern Namen. Fringilla crassirostris, *Pr. Wd.* [nec *Gml.*]; Oryzoborus Maximiliani, *Cb., Brmst.*

* * *

Unter der Bezeichnung Pfäffchen oder Papageischnäbelchen erscheinen kleine amerikanische Kernbeißerfinken im Handel, welche ihres komischen Aussehens, harmlosen und liebenswürdigen Wesens und mehr oder minder lieblichen Gesangs wegen hier und da freundliche Aufnahme finden, während sie in ihren schlichten Farben von den meisten Liebhabern und ebenso auch in den zoologischen Gärten gewöhnlich übersehen, bzl. garnicht angekauft werden. Die Färbung der Männchen ist grau in verschiedenen Schattirungen, seltener braun oder schwarz und weiß; die Weibchen sind sämmtlich olivengrünlichgelbgrau, mehr oder weniger düster und in den einzelnen Arten schwierig zu unterscheiden. In der Größe übertreffen die meisten nur um ein geringes die Prachtfinken; wenige Arten kommen dem Kanarienvogel nahezu gleich. Ein besondres Kennzeichen für alle bildet ein weißer oder doch hellerer Fleck inmitten des Flügels und dann hauptsächlich der dicke sehr gewölbte kernbeißer- oder papageienartige Schnabel. Ueber ihr Freileben haben wir nur geringe Kunde; sie ernähren sich von Gräsersämereien und Kerbthieren und halten sich vornämlich im niedrigen Gebüsch am Rande der Felder und Gärten auf. In ihrer Heimat sollen sie häufig im Käfige gehalten werden; auf den Markt gelangen sie jedoch nur selten und meistens einzeln, obgleich es ihrer doch eine überaus große Mannigfaltigkeit gibt. Sie nisten unschwer in der Gefangenschaft, wollen aber durchaus ungestört sein und daher mag es sich wol schreiben, daß bis jetzt erst überaus wenige von ihnen gezüchtet sind. Die Verpflegung ist mit der, welche die Prachtfinken beanspruchen, in jeder Hinsicht übereinstimmend. Bis jetzt sind die Preise der Seltenheit wegen noch ziemlich hoch. Da sie zwar in beträchtlicher Artenzahl, wenn auch meistens nur in einzelnen Köpfen eingeführt werden, keineswegs jedoch entsprechende Bedeutung für die Liebhaberei erlangt haben, so darf ich sie hier nur kurz und übersichtlich besprechen und die allein ausführlicher behandeln, welche sich wenigstens bereits einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Bei den Händlern wie bei den Liebhabern sind sie unter dem oben stehenden von Cabanis gegebnen Namen Pfäffchen überall bekannt, und deshalb behalte ich denselben bei, ebenso wie ich dies auch bei den Kardinälen mußte, während ich doch beide Gruppen eigentlich als Kernbeißerfinken hätte aufführen sollen.

Das Schmuckpfäffchen [Coccothraustes ornatus].

Am häufigsten eingeführt und zeitweise bereits zu den gewöhnlichen Erscheinungen des Vogelmarkts gehörend, erfreut es sich doch keiner besondern Beliebtheit, weil es eben trotz seines prunkenden Namens gar unscheinbar aussieht. Es ist an Stirn, Zügel, Wangen, Kehle und dicht unterm Schnabel schwarz mit weißem Bartstreif; Kopf und Rücken dunkel schiefergrau, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, heller gerandet, Flügel mit weißem Fleck und an der ganzen untern Seite weiß; Mitte des Vorderhalses, Unterbrust, Bauch und Steiß weiß; Schnabel gelblichweiß; Auge braun; Füße schiefergrau. Weibchen gelblichschiefergrau, die großen Deckfedern und hinteren Armschwingen viel heller gerandet, mit weißlicher Spitze; unterseits weiß, nur die Kehle und eine Binde über die Brust schiefergrau; Füße graulichfleischfarben. Größe der Nonnen, doch stämmiger. „Es ist sehr gemein in der Umgebung von Rio de Janeiro und in Minas geraes, selten bei Mendoza und Paraná im Laplatagebiet, lebt besonders in sumpfigen Niederungen, sitzt scharenweise im trocknen Schilf, ernährt sich von allerlei kleinen Sämereien und verursacht in den Reis-, besonders aber in den Hirsefeldern vielen Schaden. Seine Stimme hört man selten, die kleinen Diebe sind vielmehr ganz still und kreischen durchaus nicht, wie unsere Sperlinge“ (Burmeister). Euler fand es nicht vor dem Dezember, vielmehr meistens im Januar nistend und meint, daß die zweite Brut wahrscheinlich im Februar stattfinde. Das Nest soll

im niedrigen Gebüsch, oft in der Nähe menschlicher Wohnungen stehen und aus Würzelchen und Fasern als eine verhältnißmäßig kleine, tiefe und luftige, doch feste Mulde geformt sein. Nur zwei Eier bildeten das Gelege. Das Vögelchen wird fast regelmäßig alljährlich von Fräulein Hagenbeck in einigen Pärchen in den Handel gebracht und der Preis beträgt etwa 15 Mark für das Par. Gezüchtet ist es noch nicht, obwol man es hier und da in den Vogelstuben hat.

Das Schmuckpfäffchen heißt auch Weißbärtchen (Br.). — Le Grosbec à collier; Ornamented Grosbeak or Ornamented Finch. — Papa Capim in Minas geraes, nach Brmstr.

Nomenclatur: Fringilla ornata, *Lchtst.*, *Rss.* [*„Hndb.“*]; Fringilla leucopógon, *Pr. Wd.;* Spermóphila ornata, *Hrtl.;* S. leucopógon et ornata, *Gr.;* Sporophila ornata, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.* [Pico grueso gargantillo, *Azr.;* Gros-bec à collier, *Azr.*

Wissenschaftliche Beschreibung siehe S. 562.

Coccothraustes ornatus: fronte, loris, genis, mento gulaque nigris; stria mystacali alba; capite dorsoque obscure schistaceis; remigibus rectricibusque nigro-fuscis, dilutius marginatis; macula alarum et subalaribus albis; collo anteriore medio, pectore, abdomine crissoque flavente albis; iride fusca; pedibus schistaceis. — ♀ gilvo-schistacea, tectricibus remigibusque brachialibus posticis dilutius marginatis, albido-terminatis; subtus alba, gula fasciaque trans pectus selis schistaceis; pedibus cano-carneis.

Länge $12{,}4^{cm.}$; Flügel $6{,}3^{cm.}$; Schwanz $3{,}9^{cm.}$

Jugendkleid gelblichschiefergrau, ganz mit dem des Weibchens übereinstimmend (Brmstr.).

Juvenis: gilvo-schistaceus, omnino cum femella conveniens.

Beschreibung des Eies: Weißlichgrün, mit zahlreichen braunen Längsflecken und Punkten, welche ungleichmäßig über die ganze Oberfläche vertheilt sind (Natterer).

Ovum: albidulo-viride, maculis oblongis punctisque numerosis fuscis obsitum, irregulariter dispersis (*Nttr.*).

Das blaugraue Pfäffchen [Coccothraustes intermedius].

Tafel XII. Vogel 61.

Ein Pärchen dieser Art, welches nur durch Zufall in meine Vogelstube gelangt war, indem es ein Kaufmann aus seiner Heimat Venezuela mitgebracht hatte, gewöhnte sich sehr schnell ein, zeigte sich harmlos, zutraulich und als ein angenehmer Sänger, dessen Lied dem der Haidelerche einigermaßen ähnelt; auch nistete es bald erfolgreich. Das unscheinbare Vögelchen ist oberhalb bläulichaschgrau, an der Stirn fein schwärzlich gefleckt. Die Flügel sind schwärzlichgrau mit dem kleinen runden weißen Fleck und jede Feder ist fahl außengesäumt; die Schwanzfedern sind oberseits grauschwarz, fein fahl gesäumt, unterseits dunkel silbergrau; die Unterseite von der Kehle bis zum Bauch ist blaugrau, letzterer bläulichgrauweiß; Schnabel schwach röthlichhornweiß; Auge braun; Füße horngrau. Das Weibchen ist einfarbig olivengrünlichgelbbraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller, mit schwarzem Schnabel. Die Größe gleicht der des vorigen. Ueber das Freileben ist nichts bekannt, doch wird dasselbe sicherlich von dem der übrigen Arten nicht abweichen. Das oben erwähnte Pärchen erbaute in einem im Gebüsch hängenden Körbchen aus Fasern, Halmen und Baumwolle ein nicht besonders

künſtliches, großes, flaches Neſt, in welches drei bläulichhellgrüne Eier gelegt wurden. Nach zwölftägiger Brutdauer entſchlüpften die Jungen mit reinweißem ſpärlichen Neſtflaum, und das Jugendkleid beim Verlaſſen des Neſtes war dem des alten Weibchens ähnlich, nur viel mehr graugrün ohne den gelbbraunen Farbenton. Im Jahre 1873 erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ebenfalls ein Pärchen, außerdem aber dürften gerade ſie ſonſt kaum eingeführt ſein; ein Preis läßt ſich daher nicht angeben.

Das blaugraue Pfäffchen hat keine weiteren Namen. — Le Grosbec bleuâtre; Bluish Grosbeak or Bluish Finch.

Nomenclatur: Sporophila intermedia, *Cb.*, *Brmst.*; Gyrinorhynchus intermedius, *Gr.*; Fringilla intermedia, *Rss.* [„Hndb.“].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung, Jugendkleid und Beſchreibung des Eies ſiehe S. 563.

Coccothraustes intermedius: supra caesius, fronte subtiliter subnigro-maculato; macula parva rotunda alarum nigricante cinerearum alba; pluma alarum quaque exterius livide limbata; rectricibus supra cinereo-nigris, livide sublimbatis, subtus argenteo-cinereis; subtus a gula ad abdomen coerulescente incanum usque caesius; rostro rufescente albo-corneo; iride fusca; pedibus corneis. — ♀ unicolor olivaceo-fulva, supra obscurior, subtus dilutior; rostro nigro.

Länge $11{,}3$ cm.; Flügel $6{,}3$ cm.; Schwanz $3{,}9$ cm.

Juvenis: lanugine parca, alba. serius cum femella adulta conveniens, sed magis glaucus afflatu fulvo carens.

Ovum: dilute aeruginosum.

Das bleigraue Pfäffchen [Coccothraustes plúmbeus].

Etwas zierlicher und anmuthiger als die meiſten Verwandten, gelangt es jedoch ebenſo ſelten in den Handel. Es iſt dem vorigen überaus ähnlich und hauptſächlich nur durch einen ſchwachröthlichweißen Schnabel und reinweißen Fleck neben dem Unterſchnabel verſchieden; alſo reinbleigrau, oberſeits dunkler, unterſeits heller; Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz, bleigrau gerandet, Handſchwingen am Grunde weiß, ebenſo die Innenſeite der Flügel; Auge grau; Füße ſchwärzlichgrau. Das Weibchen iſt olivengrünlichgelbgrau, unterhalb heller, mit ſchwarzbraunem Schnabel. Kaum bemerkbar größer als die beiden vorigen. Die Heimat erſtreckt ſich über das innere Braſilien von St. Paulo bis Bahia und weſtlich bis an den Fuß der Kordilleren. „Hier lebt es in kleinen Flügen auf offenen Stellen, hat eine angenehme melodiſche Stimme und gilt für den beſten Sänger des Binnenlandes. Ich ſah es lebend in Kogonhas bei meinem Wirth, welcher es als einen Schatz ſehr hochhielt; da jedoch die Zeit der Mauſer und nachher der Winter eintrat, ſo konnte ich den Vogel nicht ſingen hören.“ (Burmeiſter). Von Fräulein Hagenbeck erhielt ich im Laufe der Zeit mehrmals ein einzelnes Männchen oder Weibchen, doch konnte ich weiter keine Beobachtungen machen, als daß der Geſang recht unbedeutend iſt. Im Londoner zoologiſchen Garten iſt dieſes Pfäffchen ſeit d. J. 1870 vorhanden.

Das bleigraue Pfäffchen oder Graupfäffchen wird auch Bleiſchnäbelchen genannt. — Le Grosbec de plomb; Plumbeous Grosbeak or Plumbeous Finch. — Batevio, bei den Mineiros (nach Brmſtr.); Pico plata (Händlername in der Heimat).

Nomenclatur: Fringilla plumbea, *Pr. Wd.*, *Rss.* [„Hndb.“]; Pyrrhula cinerea, *Ifrsn.* et *Orb.*; Sporophila ardesiaca et cineréola, *Lchtst.*; Spermóphila cinerea, *Gr.*; Sporophila plumbea, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſiehe S. 564.

Coccothraustes plumbeus: priori simillimus, inprimis rostro rubente albido maculaque juxta mandibulam albissima distinctus; ceterum caesius, supra obscurior, subtus pallidior; remigibus rectricibusque nigris, plumbeo-marginatis; basi remigum primorum et subalaribus albis; iride cinerea, pedibus nigricante fuscis. — ♀ olivaceo-livida, subtus pallidior; rostro nigricante fusco.

Länge $11{,}8^{cm.}$; Flügel $6{,}1^{cm.}$; Schwanz $3{,}9^{cm.}$

Das rothſchnäbelige Pfäffchen [Coccothraustes hypoleucus].

Den beiden vorigen wiederum ſehr ähnlich und eigentlich nur an dem noch etwas kräftiger rothen Schnabel zu erkennen, auch bemerkbar größer. Es iſt oberhalb dunkelbleigrau; die ſchieferſchwarzen Schwingen und Schwanzfedern ſind matt bleigrau gerandet, die Handſchwingen und inneren Deckfedern ſind am Grunde weiß; Bruſtſeiten bis zum Bauch hinab heller bleigrau, Bauchmitte und Steiß weiß. Der ſehr dicke Schnabel iſt in der Jugend blaßhorngelbgrau, ſpäter fleiſchroth, zuletzt beinahe korallroth; Auge graubraun; Füße ſchieferſchwarz. Das Weibchen iſt olivengrünlichbraun, Schwingen und Schwanzfedern dunkler braun, olivengrün gerandet; unterhalb heller und gelblicher, Bauchmitte und Steiß weiß; Schnabel nicht ganz roth, nur röthlichgelbbraun; Füße heller, graulichfleiſchroth. Die Heimat erſtreckt ſich über das Innere Braſiliens, wo es in kleinen Flügen häufig iſt. Seiner angenehmen Stimme wegen wird es viel im Käfige gehalten. (Nach Burmeiſter). Ebenfalls ſehr ſelten im Handel, dürfte es wol nur einigemale von Herrn Gubera eingeführt ſein. Auch in der Vogelſtube des Herrn Wiener und im Londoner zoologiſchen Garten, im letztern ſeit d. J. 1875, iſt es vorhanden. Nach meinem Urtheile beſteht der Geſang nur in wenigen kaum melodiſchen Lauten.

Das rothſchnäbelige Pfäffchen heißt auch Korallenſchnäbelchen. — Le Grosbec à bec olivâtre; Olivaceous-billed Grosbeak or Half-white Finch. Pico vermelho, bei den Mineiros (nach Brmſt.).

Nomenclatur: Fringilla hypoleuca, *Ill.*, *Rss.* („Hndb.“); Pyrrhula cineréola, *Tmm.*; Fringilla rufirostris, *Pr. Wd.*; Spermophila cinereola, *Swns.*; Gyrinorhynchus hypoleucus, Spermophila cinereola et S. hypoleuca, *Gr.*; Sporophila hypoleuca, *Cb.*, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.* [Grosbec à bec olivâtre, *Azr.* — Pico triguenno, *Azr.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſiehe oben.

Coccothraustes hypoleucus: supra obscure plumbeus, remigibus rectricibusque schistaceis subplumbeo-marginatis; basi remigum primorum ut tectricum subalarium alba; pectoris lateribus ad abdomen usque dilutius plumbeis, ventre crissoque albis; rostro admodum crasso, juvenum gilvo-corneo, serius carneo, demum subcorallino; iride fumida; pedibus schistaceis. — ♀ olivaceo-viride fusca, remigibus rectricibusque obscurius fuscis, olivaceo-viride marginatis; subtus dilutior et flavior; ventre crissoque albis; rostro rufescente; pedibus dilutioribus, cano-carneis.

Länge $13^{cm.}$; Flügel $6{,}5^{cm.}$; Schwanz $4{,}4^{cm.}$

Das Erzpfäffchen [Coccothraustes collarius].

Weniger selten als die drei zuletzt besprochenen, erscheint es jedoch auch nur einzeln im Handel. Es ist an Kopf, Wangen und Rücken schwarzgrünlich, metallisch glänzend, die Rückenfedern zum Theil graugelb gerandet, im Nacken ein rostgelber Fleck; Flügeldeckfedern, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, gelblich gerandet, die Handschwingen am Grunde, alle Schwingen am Innensaum und die unteren Deckfedern weiß; Seiten und Bürzel rostgelb, obere Schwanzdecken grau, rostroth gespitzt; ein Fleck vor und unter dem Auge, Kehle und Vorderhals weiß, Brust mit schmaler schwarzer Binde; Bauchmitte weißlich; Schnabel graulichhornfarben, am Grunde schwärzlich und mit gelblicher Spitze; Füße graulichhornfarben; Auge dunkelbraun. Das Weibchen ist braungrau, wo das Männchen schwarz; Nackenring und Kehle weißgelb; Flügel- und Schwanzfedern brauner, gelbgrau gerandet; Schwanz dunkler als die Flügel; Brust und Bauch voller röthlichgelbgrau mit blasser Mitte. Die Größe ist ein wenig geringer als die des Schmuckpfäffchens. Das Jugendkleid gleicht dem des Weibchens, doch färbt sich das junge Männchen bald an Kopf, Oberrücken und Brustseiten dunkler, so daß an diesen Stellen schwärzliche Flecke erscheinen, die sich mehr und mehr ausdehnen, bis sie in einander übergehen. Im Innern Brasiliens, doch nicht in den ganz offenen, sondern mehr in den bewaldeten Gegenden pflegt es am Rande der Wälder auf sumpfigem Boden zu erscheinen, auch besucht es gern die Äcker nahegelegener Ansiedelungen, um Sämereien zu fressen (Burmeister). Ein Pärchen in meiner Vogelstube erbaute frei im Gebüsch ein kleines, offenes, tiefes, mit Watte ausgefüttertes Nest und das Gelege bildeten zwei bläulichweiße, braun gefleckte und gepunktete Eier. Die Brutentwicklung stimmt völlig mit der des blaugrauen Pfäffchens überein. Friedlich gegen alle übrigen Vögel, zeigt es sich doch gegen seinesgleichen während des Nistens recht bösartig. Sein Gesang besteht in einem wunderlichen sanften Gezwitscher. Der Preis pflegt für das Pärchen 12 bis 15 Mark zu betragen.

Das Erzpfäffchen hat keine weiteren Namen. — Le Grosbec-mine; Mine Grosbec.

Nomenclatur: Loxia collaria, *L.*, *Lth.*, *Bff.*; Coccothraustes melanocephalus, *Vll.*; Pyrrhula melanocephala, *Lfrsn.* et *Orb.*; Fringilla atricapilla, *Pr. Wd.*; Spermophila collaria, *Bp.*; Gyrinorhynchus collarius, *Gr.*; Sporophila collaria, *Brmst.*, *Br.*; Fringilla collaria, *Rss.* [„Hndb."]. — [Pico. grueso variabile, *Azr.* (junge Vögel beiderlei Geschlechts); Pico grueso ceja blanca, *Azr.* (altes Männchen)].

Wissenschaftliche Beschreibung, Jugendkleid und Beschreibung des Eies s. oben.

Coccothraustes collarius: capite, genis dorsoque nigro-virescentibus, metallice nitentibus; plumis dorsualibus parte gilvo-marginatis; macula cervicali ferruginea; tectricibus al., remigibus rectricibusque nigro-fuscis, flavido-marginatis; basi remigum primorum; limbo remigum omnium interiore et tectricibus subalaribus albis; hypochondriis uropygioque ferrugineis; supracaudalibus cinereis, rufo-terminatis: macula ante subterque oculum, gula guttureque albis: fascia angusta trans pectus nigra; ventre albido; basi rostri cano-cornei nigricante, apice flavido; pedibus cano-corneis; iride fusca. — ♀ picturam maris nigram offerens fumidam; annulo cervicali gulaque flavido-albis; remigibus rectricibusque umbrinis, livide marginatis; cauda alis obscuriore, pectore abdomineque fulvescente canis mediis pallidioribus.

Länge 10,5 cm.; Flügel 5,9 cm.; Schwanz 4,8 cm.

Juvenis: cum femella ad. conveniens; ♂ juv. obscurior mox coloratus.

Ovum: coerulescens album, fusco-maculatum et punctatum (*Rss.*).

Das weißstirnige Pfäffchen [Coccothraustes linéola].

Unter allen Papageienschnäbelchen ist dies wol eins der schönsten. Oberhalb schwarz, zart grünlich glänzend, hat es über die Stirnmitte und jederseits über die Wange einen weißen Streif und auf dem Flügel einen runden weißen Fleck; die ganze Unterseite ist reinweiß; Schnabel glänzendschwarz; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen ist grünlichbraungrau, oberhalb dunkler, unterhalb heller; Flügel schwärzlichgrau, jede Feder mit fahlgrünlichgrauem Außensaum; Schnabel schwarz; Füße schwärzlichgrau. Die Größe kommt nahezu der des Schmuckpfäffchens gleich. Die Heimat erstreckt sich nach Burmeister über das nördliche Brasilien und Guiana, wo es in der Weise des Erzpfäffchens lebt. Es gelangt von allen Verwandten am zahlreichsten in den Handel und bevölkert seit der letztern Zeit recht viele Vogelstuben, wo es zutraulich, friedlich und anmuthig, still und harmlos erscheint und ein kleines liebliches Lied hören läßt, aber garnicht oder doch sehr schwierig nistet. Wahrscheinlich gelangt es nur dann zur Brut, wenn es völlig ungestört ist. Man kauft das Pärchen für 18 bis 24 Mark.

Das weißstirnige Pfäffchen ist auch Bläßchen (Br.) genannt. Bei den Händlern heißt es auch wol brasilianischer Schneefink. — Le Grosbec à front blanc; White-fronted Grosbeak or Lined Finch.

Nomenclatur: Loxia lineola, *L., Bff., Lth.;* Pyrrhula crispa, *Vll.*; Pyrrhula lineola, *Tmm.*; Spermophila lineola et Gyrinorhynchus lineola, *Gr.*; Fringilla lineola, *Pr. Wd., Rss.* [„Hndb."]; Sporophila lineola, *Cb., Bp., Brmst., Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung siehe oben.

Coccothraustes linéola: supra niger, virente micans; stria supra frontem medium genasque alba; macula alae rotunda alba; subtus omnino albissimus; rostro nitide nigro; iride fusca; pedibus plumbeis. — ♀ virente fumida, supra obscurior, subtus dilutior; pluma alarum nigricante cinerearum quaque exterius livide viride cano-limbata; rostro nigro; pedibus subnigro-cinereis.

Länge 10,5 cm.; Flügel 5,4 cm.; Schwanz 3,9 cm.

Das pomeranzengelbe Pfäffchen [Coccothraustes aurantius].

Sehr selten im Handel, wird es meistens nur einzeln von Fräulein Hagenbeck, Chs. Jamrach und neuerdings auch von H. Möller eingeführt. In der Vogelstube des Herrn Wiener war es wol zuerst und im zoologischen Garten von London seit d. J. 1875 vorhanden. Ich konnte zu verschiedenen Malen immer nur ein Männchen erlangen, während ich doch gerade mit dieser ebenfalls vorzugsweise schönen Art gern einen Züchtungsversuch gemacht hätte. Das Männchen ist rostgelbroth, an der Kehle wenig lichter; der Oberkopf von der Stirn bis zum Nacken und der Zügel, ferner die Flügel und der Schwanz sind tief mattschwarz, erstere mit weißem Fleck, weißem Saum der Schwingen und grauer Unterseite, die Schwanzfedern mit weißgrauem Endrand. Das Weibchen ist rostbräunlichbraun; Oberkopf, sowie Flügel- und Schwanzfedern dunkler, letztere breit fahl gesäumt, nur ein kleiner weißer Fleck auf dem Flügel; die Unterseite ist lichter rostgelbroth. Das junge Männchen ist trüber rostgelblichbraun, an Oberkopf, Flügeln und Schwanz schwarzbraun, Flügelfedern breiter grauweiß gerandet und der weiße Fleck auf dem Flügel

kleiner; Schnabel und Beine blaſſer braun. (Burmeiſter). Die Größe iſt etwas geringer, als die aller vorigen und es iſt daher eins der kleinſten Pfäffchen. Seine Heimat erſtreckt ſich über ganz Braſilien und ſeine ſeltene Einführung iſt daher umſomehr verwunderlich. Die alten Schriftſteller waren inbetreff aller Pfäffchen in Irrthümern befangen; ſo gibt Buffon als die Heimat dieſer Art, mit der er noch einen andern Vogel zuſammenwirft, die Inſel Bourbon an. Außer der Beſchreibung weiß er näheres über dieſelbe nicht zu berichten. Nach Burmeiſter iſt dies Pfäffchen überall gemein und in kleinen oder größeren Schwärmen beſonders in den Hirſefeldern häufig zu ſehen; ſie verhalten ſich dabei ganz ruhig und fliegen auch aufgeſcheucht ohne Geſchrei davon. Einen Geſang hat er nie vernommen, ſo oft er ſie auch in den Umgebungen von Neu-Freiburg und bei Lagoa Santa beobachtete. Ueber die Brut gibt der Forſcher leider nichts an und in den Vogelſtuben iſt es bis jetzt noch nicht gezüchtet.

Das pomeranzengelbe Pfäffchen heißt auch orangegelbes und Orangen-Pfäffchen. — Le Grosbec de l'isle de Bourbon; Isle-Bourbon Grosbeak.

Nomenclatur: Loxia aurantia, *Gml.*, *Bff.*, *Lth.*; Pyrrhula pyrrhómelas, *Vll.*; Loxia brevirostris, *Spx.*; Fringilla pyrrhomelas, *Pr. Wd.*; Pyrrhula capistrata, *Vgrs.*; Loxia fratérculus, *Lss.*; Spermophila rubiginosa, *Swns.*; S. pyrrhomelas, *Bp.*, *Gr.*; S. capistrata et S. nigro-aurantia, *Gr.*: Sporophila aurantia, *Cb.*, *Brmst.*; Fringilla aurantia, *Rss.* [„IIndb."]. — [Bouvreuil de l'isle de Bourbon, *Buff.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung und Jugendkleid ſiehe S. 567.

Coccothraustes aurantius: flavido-ferrugineus, gula paulo dilutiore; pileo a fronte ad cervicem usque et loris, necnon alis caudaque atris, illis maculam limbumque remigum alba et subalares cinereas offerentibus; apicibus rectricum albo-marginatis. — ♀ ferrugineo-umbrina, pileo, remigibus rectricibusque obscurioribus, his late livide limbatis; macula alae minuta alba; subtus dilutius ferrugineo-umbrina. — ♂ juv. luridius ferrugineus, pileo, alis caudaque nigro-fuscis, illis latius cano-marginatis; macula alae alba minore; rostro pedibusque pallidis fuscis (*Brmst.*).

Länge 10 cm.; Flügel $5_{,2}$ cm.; Schnabel $2_{,6}$ cm.

Das zweifarbige Pfäffchen [Coccothraustes bicolor], ebenfalls aus Braſilien, wird von Burmeiſter als dem rothſchnäbeligen Pfäffchen überaus ähnlich hingeſtellt; es ſoll ſich nur durch einen dunkleren, mehr ſchieferſchwarzen Rücken und ganz weiße Rumpfſeiten unterſcheiden. Näheres iſt nicht angegeben. Pyrrhula bicolor, *Orbg.* — **Das Pfäffchen mit ſchwarzer Bruſtbinde** [Coccothraustes pectoralis] aus dem nördlichen Braſilien und Guiana iſt oberhalb glänzendſchwarz mit weißem Nackenring; Flügel mit zwei weißen Flecken; Bürzel grau; Unterſeite weiß, an der Bruſt eine ſchwarze Binde. Das Weibchen iſt braungelbgrau, unterſeits heller. Die Größe iſt ein wenig geringer als die des Erzpfäffchens, welchem es im übrigen ſehr ähnlich iſt und deſſen Lebensweiſe es zeigt, mit der Ausnahme, daß es ſich mehr in der Nähe der Anſiedlungen aufhält. Bis jetzt dürfte es noch kaum lebend eingeführt ſein. Loxia pectoralis, *Lath.*: Fringilla americana, *Gml.*; Sporophila americana, *Cb.*; Pyrrhula mysia, *Vll.* — **Hoffmann's Pfäffchen** [Coccothraustes Hoffmanni] iſt dem vorigen ſehr ähnlich, doch durch die nicht weiße, ſondern ſchwarze Kehle verſchieden; der weiße Flügelfleck fehlt gänzlich und die Unterſeite erſcheint weniger reinweiß, da die Federn an der untern Hälfte ſchwarz ſind (Cab.). Nachdem es i. J. 1860 Dr. Hoffmann auf Koſtarika als bisher noch nicht bekannte Art entdeckt hatte, fand es dort auch Dr. v. Frantzius im Jahre 1869. Beide geben jedoch nichts näheres an. Sporophila Hoffmanni, *Cb.* — **Das Trauerpfäffchen** [Coccothraustes

luctuosus], ebenfalls von Kostarika und Kolumbien, ist den beiden vorigen wiederum sehr ähnlich und nur durch den helleren Schnabel, entschieden schwärzere Bauchseiten, reinweiße Bauchmitte und untere Schwanzdecken und größern weißen Flügelfleck verschieden; die weißen Halsseiten fehlen gänzlich. Spermophila luctuosa, *Lfrsn.*, *Gr.*; Sporophila luctuosa, *Cb.* — **Das weißkehlige Pfäffchen** [Coccothraustes albogularis] aus dem Innern Brasiliens, in der Gegend des Amazonenstroms, ist oberhalb bräunlichgrauschwarz, unterhalb reinweiß mit einer schwarzen Binde über die Brust und schmaler weißer Binde über den Flügel; Oberkopf und Stirn fast kohlschwarz; Schnabel hellroth; Füße graulichfleischfarben. Das Weibchen ist oberhalb bräunlichgraugelb, unterhalb weißlich mit gelblichgrauem Schnabel und fleischbraunen Füßen. Die Größe kommt der des Erzpfäffchens nahezu gleich. Seit d. J. 1864 im Londoner zoologischen Garten und dann in der Vogelstube des Herrn Wiener vorhanden, ist es bei uns in Deutschland nur einzeln und höchst selten zu finden. Blos Pfäffchen (Br.). Le Grosbec à gorge blanche; White-throated Grosbeak or White-throated Finch. — Loxia albogularis, *Spx.*; Sporophila albogularis, *Cb.*, *Bp.*, *Brmst.*

Das schwarzköpfige Pfäffchen [Coccothraustes gutturalis]

ist an Stirn, Oberkopf, Backen, Kehle und Vorderhals bis zur Brust kohlschwarz, nach hintenzu allmälig verwaschen, nicht scharf abgegrenzt; Rücken, Flügel und Schwanz grünlichgrau oder düster olivenfarben; Schwingen und Schwanzfedern graubraun, graugrünlich gerandet; ganze Unterseite grünlichgelbweiß, Bauchseiten mehr grau; Schnabel weiß; Auge braun; Füße bräunlichschiefergrau. Das Weibchen ist bräunlicholivenfarben, oberhalb dunkler, unterhalb heller gelblich; Flügel- und Schwanzfedern schwärzlich, heller gerandet; Brust schwach röthlich angehaucht; Schnabel gelbgrau; Füße röthlichbraun. Die Größe stimmt mit der des Schmuckpfäffchens überein. Burmeister fand es bei Rio de Janeiro, wo es gleich den verwandten Arten auf offenen Triften lebt und sich von Gräsersämereien ernährt. Seit d. J. 1876 wird es von Fräulein Hagenbeck zuweilen einzeln oder parweise eingeführt und ein Pärchen befindet sich in der Vogelstube des Herrn Graf Yorck von Wartenburg. Gezüchtet ist es jedoch bis jetzt noch nicht.

Das schwarzkäppige Pfäffchen heißt auch Schwarzkäppchen (Br.). — Le Grosbec à calotte noire; Black-bonnet Grosbeak.

Nomenclatur: Fringilla gutturalis, *Lchtst.*, *Rss.* [„Hndb."]; Loxia plebeja, *Spx.*; Pyrrhula gutturalis, *Lss.*; Spermophila gutturalis, S. ignobilis et S. melanocephala, *Gr.*; Phonipara gutturalis, *Bp.*; Sporophila gutturalis, *Cb.*, *Brmstr.*, *Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung s. oben.

Coccothraustes gutturalis: fronte, pileo, genis, gula guttureque ad pectus usque virente cinereis vel sordide olivaceis; remigibus rectricibusque fumidis, glauco-marginatis; subtus virente flavo-albus, hypochondriis cinerescentibus; rostro albido; iride fusca; pedibus fuscato-schistaceis. — ♀ fuscato-olivacea, supra obscurior, subtus dilutius flavida; remigibus rectricibusque subnigris, pallidius marginatis; pectore subrubido-afflato; rostro testaceo, pedibus badiis.

Länge $11{,}3^{cm.}$; Flügel $5{,}9^{cm.}$; Schwanz $4{,}2^{cm.}$

Das gestreifte Pfäffchen [Coccothraustes lineatus], ebenfalls aus Brasilien und zwar bei Para von Azara u. A. gefunden. Das Männchen ist blauschwarz; Flügeldeckfedern weiß gespitzt, Hinterrücken und Unterseite weiß, quer über die Brust, besonders an den Seiten, schwärzliche Flecke, welche eine Binde bilden, auch die oberen und unteren Schwanzdecken schwarz mit weißen Rändern. Ueber das Weibchen ist nichts genaues bekannt, doch nimmt Burmeister an, daß es oberhalb gelblicholivenbraun, unterhalb blaßgelb sei. Größe ein wenig bedeutender

als die des Schmuckpfäffchens. Näheres ist nicht zu finden. Loxia lineata, *Gml.*; Sporophila leucopterygia, *Bp.*; Pyrrhula leucoptera, *Vll.* [Pico grueso negro y blanco, *Azr.*]. — **Das Wedelpfäffchen** [Coccothraustes flabéllifer, *Rss.*] aus Brasilien, ohne nähere Angabe der Verbreitung. Das Männchen ist kastanienbraun, an Kopf und Rücken heller rostroth, Oberkopf und Nacken jedoch dunkler braun; Flügel- und Schwanzfedern braun, die Deckfedern rostroth gerandet; Brust und Bauch heller rostroth. Das Weibchen ist nicht sicher beschrieben. Die Größe stimmt mit der des rothschnäbligen Pfäffchens überein. (Nach Burmeister). Loxia flabellífera, *Gml.* — **Das rothbrüstige Pfäffchen** [Coccothraustes hypoxanthus], von Azara als das gemeinste unter allen Verwandten in Paraguay bezeichnet, soll auch in Montevideo heimisch sein. Das alte Männchen ist oberhalb schwarz, an Bürzel und Unterseite rostroth; das jüngere Männchen ist oberhalb grau, unterhalb blaßgelb mit rostrother Kehle. Das Weibchen erscheint oberseits braun, unterseits rostgelb und an der Brust rostroth. Die Größe stimmt mit der des weißstirnigen Pfäffchens überein. Fringilla hypoxantha, *Lchtst.* — Einige nahverwandte Vögel, welche vielleicht garnicht als selbständige Arten feststehen, sind hier wol ohne weitres anzureihen und zwar das zimmtfarbne Pfäffchen [Coccothraustes cinnamomeus, *Lfrsn.*] vom Rio grande, das schwarzrothe Pfäffchen [Coccothraustes nigrorufus, *Orb.*] von Bolivien, das rothhalsige Pfäffchen [Coccothraustes ruficollis, *Lchtst.*] von Montevideo, das Telaskopfäffchen [Coccothraustes telasco, *Lss.*] von Peru und das Zwergpfäffchen [Coccothraustes minutus, *L.*] von Kayenne, welches letztere ja bereits von Buffon erwähnt worden, ohne daß man jedoch sicheres und näheres über den Vogel weiß. — Ein Blaupfäffchen [Coccothraustes coerulescens, *Vll.*] hat Bonaparte ohne genauere Heimatsangabe beschrieben und es dürfte auch bei ihm zweifelhaft erscheinen, ob es eine sichre Art ist. H. v. Berlepsch zählt es sogar unter den Synonymen des Schmuckpfäffchens auf. In der Liste des Londoner zoologischen Gartens ist angegeben, daß schon seit d. J. 1864 mehrere Männchen und Weibchen dort vorhanden seien, wahrscheinlich meint man aber das blaugraue oder auch wol das Schmuckpfäffchen. — Das Brillenpfäffchen [Coccothraustes ophthalmicus, *Scl.*] aus Bogota, von Br. deutsch benannt und sonst ohne jede nähere Angabe, zeichnet sich vor allen Verwandten durch einen schmalen grauen Ring ums Auge aus. Im Londoner zoologischen Garten soll es sich seit d. J. 1863, jedoch nur in einem Weibchen, befinden. — **Das Lerchenpfäffchen** [Coccothraustes mitratus, *Lchtst.*] von Montevideo und Peru ist an Stirn, Zügel und Oberkopf schwarz; Nacken, Rücken und Bürzel lerchengrau, alle Federn breit weißlich gerandet, zum Theil ganz weiß; Flügel graubraun mit weißem Spiegelfleck und ebenfalls jede Feder weißlich gerandet; Schwanzfedern schwarzbraun, weißlich gespitzt und gerandet. Das Weibchen ist nicht mit Sicherheit bekannt, auch läßt es Burmeister dahingestellt, ob der Vogel wirklich eine besondre Art bildet. Pyrrhula alaudína, *Lfrsn.* et *Orb.* (Diesen älteren Namen will ich hinter den neueren von Lichtenstein gegebnen zurückstellen, weil S. 476 bereits eine Fringilla alaudína vorhanden ist). — **Das Düsterpfäffchen** [Coccothraustes moestus, *Hrtl.*] ist von Hartlaub als neu entdeckte Art beschrieben mit der Angabe, daß sie wahrscheinlich aus Brasilien herstamme und der kleinen Gruppe der Reisknacker [Oryzóborus, *Cb.*] nahestehe. Kopf, Hals und Brust sind schwarz, Rücken und breite Ränder der Flügeldeckfedern dunkel schieferbläulich; die Schwung- und Schwanzfedern sind heller gesäumt, Innenrand der ersteren und die inneren Flügeldeckfedern zum Theil weiß: Unterseite dunkelbläulichgrau; Schnabel schwarz; Füße bräunlich. Größe des Schmuckpfäffchens. — **Das einfarbige Pfäffchen** [Coccothraustes concolor, *Brmst.*], bei Mendoza im Laplatagebiet von Burmeister gefunden, ist einfarbig bleigrau, an der Bauchseite lichter, Flügel ohne weiße Binde, Schnabel weißlich. — Außerdem führen die Reisenden noch eine beträchtliche Zahl hierher gehörender oder nahverwandter Vögel auf, über welche jedoch einerseits garnichts näheres angegeben ist, während es andrerseits auch nicht feststeht, ob sie zu den Pfäffchen oder zu anderen Familien gehören.

Das Riesenpfäffchen [Coccothraustes Euleri].

In hohem Maße ist es erfreulich, wenn die Liebhaberei der Wissenschaft einen Dienst zu leisten vermag, und ein solcher Fall liegt hier wiederum vor. Der obengenannte Vogel war bis zum Jahre 1874 den Forschern nicht ausreichend bekannt und in den Museen noch nicht vorhanden, während ich von Fräulein Hagenbeck bereits zwei Pärchen erhalten hatte und ihn ausführlich schildern konnte. Das Berliner zoologische Museum erhielt zwei Exemplare, welche Herr Karl Euler in Brasilien in der Provinz Rio de Janeiro gesammelt hatte und Professor Cabanis benannte die Art jenem Forscher zu Ehren. Das alte vollständig ausgefärbte Männchen ist an Kopf und Nacken grünlichgrau, Oberkopf fast reinaschgrau, ein breiter weißer Stirn- und Augenbrauenstreif zieht sich über dem Ohre hin, fast bis zum Nacken; Wangen schwachgrünlichaschgrau; Mantel, Ober- und Unterrücken olivengrünlichbraun; Schwingen und Flügeldecken dunkelbräunlichaschgrau, erstere fein olivengrünlich außen- und breit weißlich innengesäumt, letztere breit olivengrünlich außengesäumt, zwei fahlgelbliche Binden über den Flügel, durch die Spitzen der mittleren und großen Flügeldecken gebildet; Schwanzfedern olivengrünlichaschgrau, fein grünlich außen- und weißlich innengesäumt; Kehle vom Schnabelgrunde an, ferner ein breiter Streif über die Brust und der ganze Bauch fahlgelblichweiß, Hinterleib fast reinweiß; Halsseiten grünlichaschgrau, Brust- und Bauchseiten olivengrünlichgrau, untere Schwanzdecken aschgrau, sehr breit fahlgelblichweiß gespitzt; untere Schwanz- und Flügelseite reinaschgrau. Schnabel bräunlichhorngrau, Unterschnabel wenig heller; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau. Das Weibchen ist oberseits olivengrünlichbraun, an Mantel und Rücken mit lebhaft grünem Anflug, die Schwingen und Flügeldecken sind, erstere schmal, letztere sehr breit, fahlgrau gesäumt, die Flügelbinden heben sich nicht ab; der Strich über den Augen ist schmaler und fahlgelblich; Oberkopf, Wangen und Halsseiten sind nicht aschgrau, sondern olivengrünlichgrau, Kehle, Brust und Bauchmitte sind fahlgelblich, fast weiß, die Seiten bräunlichgelbgrau, ohne grünlichen Anflug. Schnabel dunkler schwärzlichbraun, Unterschnabel nur mit hellem Mittelstreif, Auge braun; Füße schwärzlichgrau. Die Verbreitung ist bis jetzt noch nicht ausreichend festgestellt und dies konnte umsoweniger geschehen, als es noch fraglich bleibt, ob ein zweiter kleinerer, sonst aber fast völlig übereinstimmender Vogel, das falzschnäblige Pfäffchen (Coccothraustes falcirostris, *Tmm.* [nec Euler]), als besondre feststehende Art betrachtet werden darf. Für die Liebhaberei ist es von keiner Bedeutung, da dies letztre Pfäffchen sowieso keineswegs Interesse zu erwecken vermag. Beide zeichnen sich dadurch vor den Verwandten aus, daß der Schnabel sehr hoch und dick ist mit gebogner Firste und hakiger Spitze, der Oberschnabel kleiner, schmaler, niedriger und in den Unterschnabel vollständig eingelassen. Burmeister, der wahrscheinlich nur ein Weibchen des kleineren Pfäffchens beschreibt, sagt blos, daß dasselbe im Waldgebiet der Küstengegend besonders bei Bahia lebe. Weiteres über dieses oder jenes ist leider nicht bekannt. Herr v. Pelzeln gab eine lateinische Beschreibung des alten Männchens vom Falzschnäbelchen, welche im wesentlichen mit der des Riesenpfäffchens übereinstimmt. Nachdem mir ein Pärchen gestorben, erbaute das andre in meiner Vogelstube frei im Gebüsch lediglich aus Baumwolle ein großes unförmliches Nest und erzog ein Junges,

doch konnte ich die Brut nicht beobachten, weil ich gerade krank war. Der junge Vogel ist sodann bald nach dem Ausfliegen im Gebüsch abhanden gekommen, noch bevor es mir möglich war, die Beschreibung des Jugendkleides aufzuzeichnen, und eine fernere Brut zu erzielen, gelang mir leider auch nicht, weil das alte Männchen von einem Papagei todtgebissen wurde und ich kein andres beschaffen konnte. Der Gesang besteht in einem schnurrigen krähenden Geplauder mit einigen langgezogenen Tönen. Späterhin habe ich den Vogel noch einzeln auf den Ausstellungen im Besitz der Großhändler gesehen; er dürfte also immerhin zeitweise eingeführt werden. Ein Preis läßt sich kaum feststellen; als besondre Seltenheit mußte ich das Pärchen mit 30 Mark bezahlen.

Das Riesenpfäffchen hat keine weiteren Namen. — Le Grosbec géant; Giant Grosbeak.

Nomenclatur: Fringilla falcirostris, *Euler* [nec *Tmm.*]; Sporophila Euleri, *Cb.*; Fringilla Euleri, *Rss.* [„Hndb."]. — (Pyrrhula falcirostris, *Tmm.* [nec *Euler*]; Fringilla falcirostris, *Pr. Wd.*; Sporophila olivascens, *Lchtst.*, *Lss.*; Sporophila falcirostris, *Bp.*, *Brmst.*).

Wissenschaftliche Beschreibung siehe S. 572.

Coccothraustes Euleri: capite cerviceque virente cinereis, pileo cinerescente; stria lata frontali et superciliari supra aurem fere ad cervicem usque extensis; genis virente cineraceis; interscapilio, dorso tergoque olivaceo-virente fuscis; remigibus et tectricibus al. fumigatis, illis exterius subtiliter olivaceo-virente, interius late albido-limbatis, his exterius olivaceo-virente limbatis; apicibus tectricum majorum et mediorum fascias duas trans alam livide flavidas fingentibus; gula a rostri basi, stria trans pectus lata abdomineque toto livide albicantibus; crisso albido; colli lateribus virente cinereis; pectoris lateribus et hypochondriis olivaceo-virente cinereis; subcaudalibus cinereis, latissime livide albo-terminatis; latere caudae alarumque inferiore cinereis; rostro fuscato-corneo, mandibula paulo dilutiore; iride fusca; pedibus fumidis. — ♀ Supra olivaceo-virente fusca; interscapilio dorsoque laete viride afflatis; remigibus tectricibusque al., illis anguste, his latissime livide cano-marginatis; fasciis alarum parum conspicuis; stria superciliari angustiore lividaque; pileo, genis collique lateribus olivaceo-virente cinereis; gula, pectore ventreque livide albicantibus; hypochondriis subfulvo-cinereis; rostro obscurior, nigricante fusco; mandibula striam mediam offerente tantum dilutam; iride fusca; pedibus nigricante cinereis.

Länge 13,6 cm.; Flügel 7,2 cm.; Schwanz 5,2 cm. — Größe des falzschnäbligen Pfäffchens: Länge 10,5 cm.; Flügel 6,3 cm.; Schwanz 4,8 cm.

Das Kragenpfäffchen [Coccothraustes leucopsis], Morellet's Pfäffchen [Coccothraustes Morelleti] und das gelbbürzelige Pfäffchen [Coccothraustes ochropygus], alle drei von Kostarika dürften nur nebenbei erwähnt werden, da sie einerseits selbst in den Sammlungen der Museen noch selten sind und andrerseits für die Liebhaberei kaum Bedeutung erlangt hätten — wenn nicht das erstgenannte plötzlich im Handel erschienen wäre. Herr H. Möller in Hamburg hatte einige Köpfe erhalten und brachte ein schönes Männchen im Jahre 1877 auf die große Berliner Vogelausstellung. Die Art kommt dem Erzpfäffchen sehr nahe: Oberkopf, Kopfseiten, Hinterhals und ein breites Band über die Oberbrust sind wie bei jenem schwarz, nur mit dem Unterschiede, daß die Halsseiten und die Unterseite von der Brust bis zu den unteren Schwanzdecken fast weiß und ganz hell ockergelblich angeflogen sind; an der

Stirn und unter dem Auge beiderseits je ein ziemlich großer weißer Fleck, Zügel schwarz, Backen weiß; Oberrücken und obere Schwanzdecken sind in der Mitte schwarz, breit olivengrau gerandet, der ganze Unterrücken ist olivengrau, am Bürzel eine helle schwachgelbbräunliche Stelle; es ist bedeutend größer als das Verwandte. — Morellet's Pfäffchen hat in allen Alters- und Geschlechtszuständen zwei Flügelbinden und das Männchen zeigt einen doppelten weißen Spiegelfleck im Flügel; die ganze Oberseite ist mehr gelbbräunlich und die Unterseite ist entschieden ockergelblich; die Ohrgegend ist mehr ausgedehnt schwarz. In der Größe steht es beträchtlich hinter jenem zurück. Die Verbreitung erstreckt sich nach Baird über das Thal des Rio Grande in Texas und im Süden von Honduras. — Das gelbbürzelige Pfäffchen hat keine Flügelbinden und nur einen Spiegelfleck; Unterrücken und Bürzel lebhaft hell rostroth, Halsseiten fast reinweiß, Unterseite von der schwarzen Brustbinde aus nach hinten lebhaft rostroth, Kehle und Bauchmitte heller. Das Weibchen unterscheidet sich durch den weniger lebhaften nicht gelbbräunlichen, sondern mehr ins Olivengraue ziehenden Anflug des Gefieders. Dieses und das Kragenpfäffchen unterscheiden sich von dem bedeutend kleineren Morellet's Pfäffchen zugleich durch einen auffallend größern Schnabel. „Man könnte", sagt Cabanis übrigens, dessen Beschreibungen ich entlehnt, während ich die des Kragenpfäffchens nach dem vor mir befindlichen Exemplar noch etwas vervollständigt habe, „die lebhafte rostrothe Farbe des Bürzels (der zuletzt beschriebnen Art nämlich) für die höchste Ausfärbung, mithin den Vogel für das ganz alte Männchen von Morellet's Pfäffchen halten, wenn nicht die bei dieser Art in allen Uebergangskleidern vorhandenen hellen Flügelbinden und der mit der stärkern Ausfärbung gleichfalls zunehmende doppelte Spiegelfleck fehlten. Das Berliner Museum besitzt zwei ausgefärbte Männchen und ein Weibchen aus Mexiko und ein Weibchen von Cuernavacca." Dr. v. Frantzius gibt über die Lebensweise von Morellet's Pfäffchen auf Kostarika die folgende kurze Mittheilung: „Es findet sich sehr häufig in der Trockenzeit an den Rändern der Felder und an freien Plätzen, wo es von den hohen abgetrockneten Staudengewächsen frische Beeren abzulesen pflegt; man trifft es vorzugsweise, nebst anderen verwandten Arten, an der sonnigen Südwestseite des Landes überall an." — Wäre das Kragenpfäffchen in einem Pärchen vorhanden gewesen, so hätte ich es trotz des hohen Preises sicherlich gekauft, um einen Züchtungsversuch anzustellen. Es hat keinen weiteren Namen. Sporophila leucopsis, *Cb.* — Morellet's Pfäffchen. Spermophila Morelleti, *Pchr.*, *Bp.*, *Scl.*, *Brd.*; Spermophila albigularis, *Lwrc.* [nec *Spx.*]; Sporophila Morelleti, *Cb.* — Das gelbbürzelige Pfäffchen. Fringilla ochropyga, *Lchtst.*; Sporophila ochropyga, *Cb.*

* * *

Als **Ruder- oder Papageifinken** reihe ich hier außer dem Geschlecht Ruderfink [Pitylus, *Cv.*] auch die nächstverwandten, wie Habia [Saltator, *Vll.*], Graumantel [Schistóchlamys, *Rchb.*], Bastardhabia [Orchesticus, *Cb.*] u. a. m. an. Da die hierhergehörenden Vögel jedoch sämmtlich ohne Ausnahme noch nicht in den Handel gelangt sind, so will ich sie nur ganz kurz behandeln; völlig fortlassen darf ich sie nicht, da manche von ihnen über kurz oder lang zweifellos im Vogelhandel erscheinen werden.

Der rußschwarze Papageifink [Coccothraustes fuliginosus] ist im ganzen Gefieder dunkelschieferschwarz mit schwachem bläulichen Metallschiller; Stirn, Backen, Kehle und Vorderhals kohlschwarz; Flügel bräunlichschiefergrau, Schwingen bläulich gerandet, untere Flügelseite braungrau; Schnabel hellzinnoberroth; Auge braun; Füße schwarzbraun. Etwas über Drosselgröße. (Nach Burmeister). Das Weibchen ist im ganzen matter und düsterer gefärbt; Kehle und Kopfseiten nur mattschwärzlich; auch der Schnabel heller (Brlpsch.). Nach den Angaben des erstern Forschers findet man ihn von St. Paulo bis Bahia und darüber hinaus; seine Verbreitung dürfte sich jedoch ziemlich über ganz Brasilien erstrecken. „Er ist nicht häufig und lebt, gewöhnlich parweise, nicht eigentlich im tiefen Walde, sondern mehr an den Rändern auf buschigen und sonnigen Triften." Pitylus fuliginosus, *Ddn.*, *Scl.*, *Pzln.*; Coccothraustes coerulescens, *Vll.*; Fringilla gnatho, *Lchtst.*; Pitylus erytrorrhynchus, *Swns.*; P. ardesiacus, *Lss.* (Tanagra

psittacina, *Spx.*). — **Der Papageifink mit weißem Rückenfleck** [Coccothraustes grossus, *L.*] ebenfalls aus Brasilien, ist dem vorigen sehr ähnlich, jedoch mehr graublau mit weißem Fleck auf dem Rücken und weißer, reinschwarz umrandeter Kehle; Schnabel gleicherweise roth. Größe beträchtlich geringer. (Nach Burmeister). Dr. v. Frantzius fand ihn auf Kostarika. — **Der große Papageifink** [Coccothraustes magnus] ist am Oberkopf bis zum Nacken nebst Wangen schiefergrau, Zügelstreif und Kehle weiß; Nacken, Rückenseite, Flügel und Schwanz olivengrün; Vorderhals rostgelb, Brust und Bauch grau, Steiß rostgelb; Schnabel schieferschwarz; Auge rothbraun; Füße schiefergrau. Weibchen wenig verschieden, nur matter. Jugendkleid düsterer und an der Unterseite dunkelschaftstreifig. Größe der Singdrossel. Im Waldgebiet der Küsten des ganzen tropischen Brasiliens von Rio de Janeiro bis nach Guyana (auch Peru) in Gärten und Gebüsch überall gemein, wenig scheu, aber hurtig und gewandt, durch schreiende Locktöne auffallend. Das Nest steht in mäßiger Höhe, ist aus Mos gebaut und enthält zwei blaßgrüne Eier mit dichten schwarzen Linien am stumpfen Ende (nach Burmeister). Mit diesen Angaben stimmen im wesentlichen die des Herrn Karl Euler überein. Buntkehle. (Br.). Tanagra magna, *Gml.*; Saltator olivaceus, *Vll.* — **Der grauschwänzige Papageifink** [Coccothraustes similis] aus dem Innern Brasiliens, ebenfalls grau, nur die Rückenmitte und Flügel olivengrün; Schwanz einfarbig schiefergrau; Augenbrauenstreif bis zum Nacken hinab und Kehle weiß; Kinnstreif schwarz; ganze Unterseite rostgelblichgrau; Steiß rostgelb. Weibchen nur matter. Die Größe gleicht der des vorigen. Saltator similis, *Orb.*; Tanagra superciliaris, *Pr. Wd.* [nec *Spx.* et *Azr.*]. — **Der blaugraue Papageifink** [Coccothraustes caesius, *Rss.*] ist nach Burmeister im Süden Brasiliens, westwärts bis an die Kordilleren heimisch und besonders in Paraguay sehr gemein; später hat er ihn im Laplatagebiete gesehen. Den vorigen sehr ähnlich, ist er ebenfalls grau, Augenbrauenstreif und Kehle weiß, Kinnstreif schwarz, Rücken und Flügel olivenbraun überlaufen, Steiß rostgelb. Größe übereinstimmend. Sein Nest findet man in Gebüschen oder auf halber Höhe der Bäume aus Reisern und trockenen Blättern gebaut, und das Gelege besteht in zwei grünen mit feinen schwarzen Linien und Flecken am stumpfen Ende gezeichneten Eiern. In der Gefangenschaft läßt er sich gut zähmen und mit Brot, zerquetschten Maiskörnern und Früchten nebst Fleischstückchen ernähren. Große Bissen kaut er im Schnabel förmlich wie ein Säugethier (nach Azara). Capi (Br.). Saltator coerulescens, *Lfrsn.*; Tanagra superciliaris, *Spx.* [nec *Pr. Wd.*]; Habia cejà blanca, *Azr.* (Da seine beiden lateinischen Benennungen an vorhergegangene Verwandte bereits vergeben sind, so mußte ich auch hier eine neue wählen. — **Der dickschnäblige Papageifink** [Coccothraustes maxillosus] von Montevideo, vom vorigen nur durch den größern und dickern Schnabel, weniger rostfarbne Unterseite und olivengrün angeflogene Flügelfedern verschieden, auch dem grauschwänzigen sehr ähnlich und von diesem durch nicht weiße, sondern schmutziggelbgraue Kehle und lebhafter rostgelbliche Schwanzdecken abweichend. Da über alle diese Arten fast noch garnichts bekannt geworden, so läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, ob sie wirklich als selbständige gelten dürfen oder als übereinstimmend zusammenfallen. Tanagra maxillosa, *Lchtst.*; Saltator maxillosus, *Cb.* — **Der olivengrüne Papageifink** [Coccothraustes oliváceus, *Cb.*] von Guyana ist wiederum dem blaugrauen Papageifink ähnlich, aber mehr olivengrün, Bauchseite rostgelb überlaufen und Steiß ganz rostgelb. Grünhabia (Br.). — **Der schwarzhalsige Papageifink** [Coccothraustes atricollis] aus dem Innern Brasiliens, doch vorzugsweise aus dem Süden. Stirnrand, Zügel, Backen und Kehle schwarz, Oberkopf dunkelbraun, Rücken olivengrünlichbraun; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, rosträthlich gerandet und die letzteren gespitzt; ganze Unterseite hell rostgelblichroth; Schnabel braun; Auge orangeroth; Füße bräunlichfleischfarben. Drosselgröße. Weibchen nur matter gefärbt. Er soll neben Sämereien auch eifrig Kerbthiere fressen, was sich wol von allen Papageifinken voraussetzen läßt. Wenn es sich bewahrheitet, daß er ein guter Sänger ist und daß seine Verbreitung eine bedeutende, sich auch über Paraguay und Bolivia erstreckt, so wollen wir wünschen, daß er recht bald eingeführt werde. Schwarzhalshabia (Br.). Saltator atricollis et S. validus, *Vll.*; T. jugularis, *Lchtst.* [Habia gola negra, *Azr.*]. — **Der schwarzkäppige Papageifink**

[Coccothraustes atriceps] aus Mexiko ist den vorigen wiederum sehr ähnlich, jedoch nur mit schwarzer Kopfplatte und Haube. Dr. v. Frantzius fand ihn auch auf Kostarika und sagt, daß er zu den Vögeln gehöre, welche die auf der Hochebene längs der Wege überall angepflanzten Heckenzäune beleben. Tanagra atriceps, *Lss.*; Arremon gigantéus, *Bp.* [nec *Cb.*]. — **Der Riesenpapageifink** [Coccothraustes gigantódes], auch von Mexiko und dem vorigen gleichend, doch mit grau und schwarz gemischter Haube. Im Freileben stimmt er ebenfalls mit ihm überein. Saltator magnoides [!] *Lfrsn.* S. gigantodes, *Cb.* [nec *Bp.*]. — **Der größte Papageifink** [Coccothraustes grandis], von Kostarika, ist bis jetzt noch fast garnicht bekannt. Tanagra grandis et T. muta, *Lchtst.*; Saltator rufiventris, *Vgrs.*; S. icterophrys, *Lfrsn.*; S. Vigorsi, *Gr.* — Azara's Papageifink [Coccothraustes Azarae, *Orbg.*] von Westbrasilien und Bolivia, soll ein guter Sänger sein. Näheres ist nicht zu finden. Grauhabia (Br.). — Ueber den Orinocko-Papageifink [Coccothraustus orenocensis, *Lfrsn.*] von Venezuela ist ebenfalls garnichts näheres angegeben. Ebensowenig bekannt ist der Schopfpapageifink [Coccothraustes occipitalis, *Nttr.*] aus dem Innern Brasiliens, denn außer der Beschreibung ist auch nichts über ihn zu finden. Tanagra rufa, *Lss.*; Diucopsis leucophaea, *Bp.* [Tangara roux. *Less.*] — **Der elsterbunte Papageifink** [Coccothraustes Leverianus] von Ost- und Südbrasilien ist an Kopf, Hals, Oberrücken und Brust schwärzlichstahlblau; Flügel schwarz- und weißbunt; Schwanz schwarz, weiß gespitzt; alles übrige reinweiß; nahezu von Drosselgröße. Elsterling (Br.); Lanius leverianus, *Gml.*; L. picatus, *Lth.*; Cissopsis bicolor, *Vll.* — **Der größere Papageifink** Coccothraustes major, *Cb.*] von Brasilien, gleicht dem vorigen fast völlig, nur ist er bedeutend größer, nahezu wie eine Elster. Er lebt in den Waldungen der Küstengegend parweise oder in kleinen Flügen auf hohen Bäumen und läßt einen lauten, kurzen, nicht unangenehmen Gesang hören. Die Nahrung soll wie bei allen diesen sog. Elsterfinken, vorzugsweise in Kerbthieren bestehen. Betylus picatus, *Bp.* [nec *auct.*]. — **Der kleinste Papageifink** [Coccothraustes minor, *Lfrsn.*] aus Peru, Bolivia und Ekuador. Mit dem vorigen nahezu übereinstimmend, erscheint er doch viel kleiner, unter Drosselgröße. — **Der Diadem-Papageifink** [Coccothraustes diadematus] von Brasilien, ist für die Leser dieses Werkes vor allen seinen Verwandten interessant dadurch, daß er im Jahre 1873 von Herrn K. Gudera, damals in Leipzig, in drei Köpfen eingeführt wurde. Es waren prächtige Vögel, im ganzen Gefieder schwärzlichlasurblau; Stirn, Zügel, Kehle und Augenring schwarz; Oberkopf weißlichblau, die mittleren Federn mit glänzendblutrothen Flecken; große Flügeldecken, Schwingen und Schwanzfedern schwarz, fein grünlich gerandet, kleine Flügeldecken ultramarinblau, eine breite Flügelbinde bildend; Schnabel glänzendschwarz; Auge dunkelbraun; Füße schwarz. Das Weibchen ist nicht bekannt, es soll nach Burmeister einen heller weißen Oberkopf haben und wird auch wol matter gefärbt sein. Die Größe stimmt nahezu mit der einer Drossel überein und in Haltung und Ansehen gleicht dieser Vogel einem Gimpel. Ich erhielt ein Exemplar, welches jedoch leider bald einging und ausgestopft in meiner Sammlung steht. Es bleibt sehr zu wünschen, daß dieser ungemein schöne und stattliche Papageifink, der in den Wäldern bei Neu-Freiburg, freilich leider nicht häufig, in kleinen Trupps still und versteckt leben soll, wenigstens hin und wieder in den Handel gelangen möchte; er würde eine herrliche Bereicherung unserer Vogelstuben bilden. Blauer Diademfink, Händlername. Stephanóphorus coeruleus, *Strckl.*; Coccothraustes leucocephalus, *Vll.*; Tanagra diadémata, *Nttr.*; Fringilla splendida, *Lchtst.*; Lindo azul cabeza blanca, *Azr.* (Da ein Coccothraustes coeruleus S. 554 bereits vorhanden ist und der Name C. leucocephala, *Vll.*, durchaus nicht zutrifft, so griff ich auf die neuere Bezeichnung von Natterer zurück. — **Der graumantelige Papageifink** [Coccothraustes leucophaeus] aus dem Süden und Osten Brasiliens, von Dompfaffengröße. An Stirn, Zügel, Augenrand und rings um den Schnabel schwarz; Oberkopf hellbraun; Wangen rostgelb; Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz bleigrau; Schwingen und Schwanzfedern dunkler schiefergrau, fahl rostgelb gerandet; Kehle, Vorderhals und Brust röthlichrostgelb; Bauch weißlich. „Ich fand den hübschen Vogel am Rande der Gebüsche und neben offenen Waldwegen meist einzeln oder parweise; er ist sehr wenig scheu." (Burmeister). Wenn ich nicht irre, so habe ich ihn im Berliner Aquarium

bald nach der Eröffnung in einem Männchen gesehen. Graumantel (Br.) Tanagra leucophaea, *Lchtst.*; Saltator ruficapillus, *Vll.*; T. capistrata, *Spx.*; Tanagra conspicillata, *Mus. Par.* — Der schwarze Papageifink [Coccothraustes ater] aus Südbrasilien und Peru. An Stirn, Backen, Kehle und Vorderhals schwarz; Rumpfgefieder bleigrau, Flügel bräunlich überlaufen; Schwanz schieferschwarz. Wenig kleiner als der vorige. Er bewohnt das Urwaldgebiet, hält sich aber vorzugsweise an Waldrändern und in den mit Gebüsch besetzten sumpfigen Niederungen, wo er ziemlich häufig ist. Schleierhabia (Br.). Tanagra atra, *Gml.*; T. melanopis, *Lth.* — Der orangeschnäbelige Papageifink [Coccothraustes aurantiirostris, *Lfrsn.*], welcher von Burmeister in den Laplataſtaten und von Frantzius auf Kostarika gefunden worden und einen hübschen Gesang haben soll, sowie der vielfarbige Papageifink [Coccothraustes multicolor, *Brmst.*] aus den Laplataſtaten, welcher letztre übrigens düsterfarbig wie die anderen ist und die vielversprechende Bezeichnung keineswegs verdient, seien nur beiläufig erwähnt.

Die Ammern [Emberizinae].

Diese eigenartige Familie der Finkenvögel, welche theils den eigentlichen Finken, theils den Lerchen nahesteht, und daher von manchen Ornithologen als Mittelglied zwischen beiden betrachtet wird, hat für die Stubenvogelliebhaberei im allgemeinen nur eine geringe Bedeutung. Die hierher gehörenden Vögel sind mehr gedrungen und mehr dickleibig als jene ersteren und kürzerbeinig als die letzteren. Ihr Schnabel ist klein und kurz, an der Wurzel dick, vorn kegelförmig, doch spitz, der Oberschnabel ist schmaler als der untere, in welchen er hineinpaßt, während der Gaumen mit einem Höcker versehen ist, der zum Aufspelzen der Körner dient; Flügel mittellang, mit zweiter oder dritter längster Schwinge; Schwanz ziemlich lang, gerade oder ausgeschnitten; Füße kurz mit langen Zehen, deren hinterste meist spornartig verlängert ist. Das Gefieder ist locker und reich und bei den Männchen lebhafter gefärbt als bei den Weibchen, während das Jugendkleid von dem beider Alten sich verschieden zeigt. Alle Welttheile bilden ihre Heimat, nur in Australien hat man sie bis jetzt noch nicht gefunden. Als Aufenthalt wählen sie vorzugsweise niedriges Gebüsch und Rohr, wechselnd mit Aeckern und Wiesen. Ihr Flug ist ruckweise und bogenlinig, der Gang hüpfend und schreitend. Zug- oder Strichvögel, leben sie gesellig, manche auch während der Brut. Der Lockton ist langgezogen, der Gesang unbedeutend. Das Nest befindet sich am Boden oder im niedrigen Gesträuch und stellt eine große, offene, ziemlich künstlich geformte Mulde dar, in welcher das Gelege von vier bis sechs farbigen Eiern von beiden Gatten des Pärchens erbrütet wird. In allerlei Getreide- und Grassämereien, nicht aber in öligen Samen, dagegen in vielen Kerbthieren besteht ihre Nahrung. Sowol im Käfige als auch in der Vogelstube zeigen sie sich ungeschickt, wenig beweglich, ohne Anmuth, auch haben sie keinen nennenswerthen Gesang; nur wenige sind als besonders farbenprächtige Vögel geschätzt. Züchtungsversuche hat man mit ihnen bisher kaum angestellt, doch dürften die meisten wenigstens in der Vogelstube unschwer nisten. Ihre Fütterung und Verpflegung stimmt mit der für die Finken angegebnen überein. Die Preise dürften mit Sicherheit wol nicht festzustellen sein, denn alle Ammern sind eigentlich nur zufällige Gäste im Vogelhandel.

Auch sie hat man in mehrere kleine Sippen geschieden, deren Angehörige bald hier-, bald dorthin gestellt werden. Um Verwirrung zu vermeiden, reihe ich sie ebenfalls einheitlich aneinander.

Der Weidenammer [Emberiza auréola].

Von allen in den Handel gelangenden Ammern erscheint dieser am häufigsten. Er ist oberhalb rothbraun, schwarz und weiß gestrichelt; Zügel und Gesicht schwarz, Kopfseiten rothbraun: Flügel und Schwanz dunkelbraun, erstere mit fahler Querbinde und großem weißen Fleck, auch jede Feder breit rothbraun gesäumt; Unterseite gelb, über die Oberbrust eine dunkelrothbraune Binde, hinterwärts weiß. Schnabel röthlichgrau mit schwarzer First; Auge braun, Füße fahl röthlichgrau. Das Weibchen ist fahler und matter gezeichnet; oberhalb röthlichbraun; schwärzlich schaftstreifig; Augenbrauenstreif fahl gelblichweiß; Flügelfedern breit schwärzlich schaftstreifig, über den Flügel eine fahle Binde; Schwanz röthlichbraun: Kehle röthlichgelb; Körperseiten bräunlichgelb, dunkel schaftstreifig; ganze übrige Unterseite düster bräunlichweiß. In der Größe stimmt er etwa mit dem Feldsperlinge überein. Die Heimat erstreckt sich über Nordasien und Nordosteuropa; auch er ist Zugvogel. Ueber sein Freileben haben die Reisenden ziemlich ausführlich berichtet und nach ihren Angaben weicht dasselbe von dem aller Ammern überhaupt nicht wesentlich ab. In Sibirien fand ihn der Naturforscher Radde bis zu einer Höhe von 2000 Meter in den Gebirgen und ebenso in der Ebene an den mit Weidengebüsch bewachsenen Flußufern, in kleinen Birkenwäldchen, niemals aber im Hochwalde. Nach Dr. Eversmann ist er in Sibirien im kasanschen Gouvernement häufig auf überschwemmten Wiesen, selten dagegen in den feuchten, grasreichen Thälern des Ural; er kommt erst spät, nicht vor dem Mai an. Dr. v. Nordmann sagt, daß er nach Liljeborg in Finnland am Onegasee gemein sei; ebenso sahen ihn Dr. Dybowsky und Parrey in Daurien zahlreich. Wie R. Swinhoë angibt, soll er in China allgemein verbreitet sein. In Beiträgen zur Kenntniß der Vögel Ostsibiriens und des Amurgebiets nach den Mittheilungen der Reisenden Radde, Middendorf und Schrenk sagt E. v. Homeyer: „Das südöstliche Sibirien scheint das rechte Vaterland dieses schönen Vogels zu sein, der jedoch, wie schon Pallas angegeben, bis nach Nordsibirien hinauf geht. Die ostasiatischen Weidenammern haben alle einen weißen oder gelben Nackenfleck, welchen die in Europa bemerkten Exemplare sämmtlich nicht zu tragen scheinen, wie dies auch die Abbildungen von Gould und Naumann zeigen. Hierdurch wird meine bereits anderweitig ausgesprochene Ansicht, daß die in Europa gefundenen, vermeintlich ostasiatischen Vögel ein näher gelegenes Vaterland haben, bestätigt." — „Unter den Ammern", sagt Taczanowski, „ist diese Art sowol zur Durchzugs- als auch zur Brutzeit die gewöhnlichste. Sie kommt um die Mitte des Monats Mai an, nistet überall in den Thälern und verbreitet sich bis an die Grenzen der Wälder, wo sie jedoch seltener ist, während sie in den Steppen allenthalben vorkommt, wenn es nur Sträucher oder größeres Unkraut gibt. Das Nest steht auf der Erde im Grase auf trockenen Wiesen oder in Sträuchern ein Meter hoch. In der Mitte des Monats Juni legt das Weibchen vier bis fünf, selten sechs Eier; auch das Männchen brütet. Außerdem wiederholt es unermüdlich sein eintöniges, doch melodisch er-

klingendes Lied. Das Weibchen brütet sehr fest, fliegt erst unter den Füßen auf und flattert dann auf der Erde fort, um den Feind hinwegzuführen. Die Jungen verlassen das Nest schon und verstecken sich im Grase, wenn sie zum Fluge noch nicht fähig sind. Dann fallen die Alten jeden nahenden Störenfried hartnäckig an. Gegen Ende Septembers oder Anfang Oktobers ziehen sie fort." Uebrigens soll nach Opel der Kukuk gern ihr Nest heimsuchen. In Frankreich erscheint dieser Ammer in der Provence nach Dr. v. Müller's Mittheilung ganz unregelmäßig; auch kommt er in Italien vor. In Bulgarien soll er garnicht zu finden sein, dagegen gehört er zu den Vögeln, welche nach Blasius auf Helgoland beobachtet worden.

Er wird alljährlich von den nach Rußland reisenden kleinen deutschen Händlern, jedoch nicht in beträchtlicher Anzahl, eingeführt, und im Spätherbst 1877 brachte der Händler A. C. Gleitzmann aus Moskau in einem großen Transport russischer Vögel auch 21 Weidenammern nach Berlin, um sie dann aber sofort nach London überzuführen. Bei den Liebhabern und Züchtern findet dieser Ammer keinen besondern Beifall; man hält ihn allenfalls einzeln, um des angenehm flötenden Gesangs willen, der in recht melodischen, doch immer wiederholten und dadurch einförmig erklingenden Lauten besteht. Ich hatte ein Pärchen lange Zeit hindurch in der Vogelstube, ohne daß es nistete und ich glaube daher, daß es nicht leicht sein dürfte, ihn zu züchten. Auch ist er nicht friedlich, denn das Männchen verfolgt in ruheloser Weise alle Genossen, welche es zu überwältigen vermag. Der Preis schwankt zwischen 9 bis 12 Mark für das Pärchen.

Der Weidenammer heißt auch fälschlich Gartenammer. — L'Ortolan d'oré de Sibérie; Siberian Golden Bunting. — Altan gurguldai (burätisch, nach Dybowski und Parrey).

Nomenclatur: Emberiza aureola, *Pll.*, *Lth.*, *Gld.*; Fringilla pinetorum, *Lpch.*; Passerina collaris, *Vll.*; Emberiza sibirica, *Erm.*; Euspiza aureola, *Gr.*, *Hdgs.*, *Bp.*, *Blth.*, *Hrsf.* et *Mr.*; Hypocentor aureolus, *Cb.*; Mirafra flavicollis, *Mc. Cll.*, *Gr.*; Euspiza flavigularis, *Blth.*, *Bp.* [Yellow-breasted Bunting].

Wissenschaftliche Beschreibung siehe S. 578.

Emberiza auréola: supra rufo-castanea, nigro-alboque striolata; loris facieque nigris; capitis lateribus rufis; pennis alarum caudaeque fuscis, late rufo-limbatis; alis fasciam lividam maculamque magnam albam offerentibus; subtus flava; fascia trans guttur castanea, post alba.

Der Felsenammer [Emberiza fucata] von Asien, und zwar China, Japan und Bengalen; oberhalb rothbraun, Oberkopf schwarz, Wangen rothbraun, Bartstreif schwarz und darüber ein weißer Streif; Mantel und Schultern breit schwarz schaftfleckig; Schwingen dunkelbraun, schmal fahl außengesäumt, über den Flügel zwei weißliche Querbinden; Schwanzfedern schwarz, die äußeren am Ende weiß und die inneren mit weißem Fleck; Kehle weiß, schwarz schaftfleckig; über die Oberbrust ein rothbraunes Band, ganze übrige Unterseite fahl gelbroth, Körperseiten ebenso, fein schwarz schaftstreifig; Schnabel röthlichbraun mit schwarzer First; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ist oberhalb dunkelbräunlichrostroth, schwarz schaftstreifig; Augenbrauenstreif und Kehle rostgelb, Wangen rothbraun, Oberbrust mit schwarzer Binde. Größe des

Feldsperlings. Nach Pallas gleicht er im Freileben den sibirischen Verwandten und ebenso gibt dies Taczanowski inhinsicht seiner Brut, des Nestes und der Eier an. Swinhoë meint, daß er in China mehr auf den Feldern als auf Felsen zu finden sei und daher den Namen wol garnicht verdiene. „In der Nähe von Kalkutta", sagt Blyth, „wo er gemein ist, wird er mit anderen Vögeln zusammen als ‚Ortolane' zum Verkauf auf den Markt gebracht, und von dort aus gelangt er auch, wiewol höchst selten und nur einzeln, in den Handel." Näheres vermag ich jedoch nicht über ihn anzugeben." — L'Ortolan teindu; Dyed Bunting; Emberiza fucata, *Pll.*, *Gld.*, *Blth.*, *Gr.*, *Tmm.* et *Schlg.*, *Bp.*; Euspiza fucata, *Blth.*, *Hrsf.* et *Mr.*; Onychospina [!] fucata, *Bp.*; Hypocentor fucatus, *Cb.*; Emberiza lesbia, *Tmm.*

Der gelbbäuchige Ammer [Emberiza flaviventris] kommt als einer der schönsten unter allen diesen Vögeln leider so selten in den Handel, daß er für die Liebhaberei eigentlich kaum eine Bedeutung hat. Er ist am Kopf bis zum Nacken tiefschwarz mit einer grauweißen Längsbinde über die Kopfmitte, je einer solchen übers Auge bis zum Schlaf und ebenso vom Mundwinkel bis zur Ohrgegend; Mantel- und Schulterfedern braun, schmal rostgrau gesäumt; Schwingen braunschwarz, fein fahlbraun außengesäumt, Oberflügel mit zwei weißen Querbinden; Hinterhals und Brustseiten röthlichgraubraun; Bürzel und obere Schwanzdecken aschgrau; Oberkehle, Hinterleib, untere Flügel- und Schwanzdecken weiß; übrige Unterseite hochgelb; Brust röthlichorangefarben; Schnabel blei-, Unterschnabel röthlichgrau; Auge braun; Füße röthlichgelbgrau. Weibchen oberhalb heller mit blaß rostfarbenen Kopfstreifen; obere kleine Flügeldecken weiß endgesäumt; ganze Unterseite heller gelb; Brust nur schwach orangefarben. Beim jungen Vogel haben nach Rchn. die Armdecken hellbraune Spitzen, beim älteren weiße. Größe nahezu des Goldammers. Die Verbreitung erstreckt sich weit über Afrika im Westen und Süden, auch über Südmozambik. Inbetreff des Freilebens berichtet Heuglin: „Er ist Zugvogel in Nordostafrika, langt mit den ersten Sommerregen an und zieht im November und Dezember fort. In der baumreichen Steppenlandschaft zeigt er sich einzeln oder parweise im Gezweige, kommt selten auf die Erde herab und meidet, wie es scheint, die Umgebung der Gewässer. Lockton und Gesang sind ammerartig; erstrer klingt etwa: diu-gäck, der letztre ist nicht laut, mehr schwätzend als zirpend und ertönt namentlich in den Vormittagsstunden nicht selten vom Gipfel eines Busches herab. Im Gebiet des Gazellenflusses beobachteten wir ihn von August bis einschließlich Oktober, Antinori dagegen im Februar, auch versichert dieser Reisende, daß er sich meist auf der Erde aufhalte. Hartmann traf im südlichen Senar zu Mitte d. M. Juni ganze Flüge, doch glaube ich fast, daß er sich geirrt und einen andern Vogel gesehen hat." Reichenow fand ihn häufig in den Niederungen des Kamerun: „Er lebt in den Steppengegenden und Feldern und dürfte im Wesen am meisten dem europäischen Ortolan gleichen. Frei auf einem Baumwipfel oder Zweige sitzend, läßt er ununterbrochen zwischen kurzen Pausen seinen einförmigen kleinen Gesang erschallen, der den schwermüthigen Klang unsres Goldammerrufs hat und aus drei abfallenden Tönen zusammengesetzt ist. Die Nahrung besteht der Hauptsache nach in Grassämereien." Einzeln und wol nur zufällig mit anderen Vögeln zusammen eingeführt, sieht man ihn hin und wieder in einem zoologischen Garten; bei den kleineren Händlern oder in den Vogelstuben dagegen kaum. Prachtammer bei Br. [Gelbbäuchiger Ortolan vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Buff.]. L'Ortolan à ventre jaune; Yellow-bellied Bunting. Passerina flaviventris, *Vll.*; Emberiza xanthogastra, *Stph.*; Fringillaria capensis, *Swns.*; F. bicincta. *Gr.*; Emberiza flavigastra, *Rpp.*; E. quinquevittata, *Lchtst.*; E. albicollis et affinis, *Pr. Wrtmbg.* [L'Ortolan à ventre jaune du cap de bonne espérance, *Buff.*; Cape-Bunting, *Lath.*]. — **Cabanis' Ammer** [Emberiza Cabanisi], dem vorigen nächstverwandt, ist er am Oberkörper dunkelbraun; Oberkopf schwarzbraun; Augenbrauenstreif bis zum Nacken weiß; Rückenfedern dunkelschaftstreifig; Schwingen, Deck- und Schwanzfedern schwarzbraun, Flügel mit zwei weißen Querbinden; Kehle weiß, ganze übrige Unterseite reingelb; Schnabel bleigrau, Unterschnabel heller; Auge nußbraun, Füße schmutzigfleischfarben. Größe des vorigen. Näheres hat Herr Reichenow, welcher den Vogel in West-

afrika am Kamerun entdeckt, zuerst beschrieben und benannt, nicht angegeben. Polymitra (Fringillaria) Cabanisi, *Rchn.*

Den siebenstreifigen Ammer [Emberiza tahapisi] aus dem Innern Afrikas würde ich nur beiläufig zu erwähnen brauchen, wenn nicht der Umstand ihn als besonders interessant erscheinen ließe, daß sich ein Exemplar in der großen Sammlung lebender Sing- und Schmuckvögel des Herrn Wiener in London befindet, während er sonst wol noch niemals in den Handel gelangt und auch in keinem zoologischen Garten vorhanden ist. Kopf, Kinn und Kehle sind schwarz, ein Scheitelstreif, je ein Augenbrauen-, Wangen- und Bartstreif, im ganzen sieben, sämmtlich weiß; oberseits röthlichbraun, breit schwarz schaftstreifig; Schwingen und Schwanzfedern schwärzlichbraun, hell rothbraun außengesäumt; Oberkehle weißlichgrau, ganze übrige Unterseite hell gelblichbraun; Schnabel dunkelbraun, Unterschnabel heller, gelblich; Auge grau; Füße gelbgrau. Das Weibchen soll am Kopf schwärzlichgrau sein mit fahlröthlichen Streifen und am ganzen Körper fahler. Sperlingsgröße. Nach Heuglin ist er in Abessinien und im Bogosgebiet Standvogel: „Brehm behauptet, ihn im April im Samhar und in den tiefen Gebirgsthälern am Ostabfall von Mensa brütend gesehen zu haben, während ich das Nest zwischen Juni und Oktober in jenen Gegenden und im Dezember unfern von Gondar im Bette halbausgetrockneter Gewässer fand. Nach dem Berliner Museum soll er auch in Arabien heimisch sein. Er lebt in kleinen Familien oder parweise bis etwa 2000 Meter hoch meistens neben den Wildbächen auf Lichtungen und Felsen, doch kommt er auch in die Nähe menschlicher Wohnungen, auf Zäune in den Gärten und auf Weideplätze. Lockton und Gesang sind dem der Verwandten gleich. Das kleine Nest besteht aus Grashalmen und ist hinter Steinen und Gebüsch unmittelbar auf der Erde angelegt. Ich fand darin zwei bis drei weißliche, etwas lehmfarb angeflogene Eier mit dunkel erdbraunen Flecken, welche meist am stumpfen Ende kranzartig zusammengedrängt stehen. A. Brehm gibt an, daß der siebenstreifige Ammer an den felsigen Ufern des Nil in Südnubien sehr häufig sei; das dürfte jedoch in einer Verwechselung mit dem Streifenammer beruhen." In Westafrika fand ihn Du Chaillu am Kamma und Kap Lopez. Barboza du Bocage sagt, daß er im November und Dezember aus dem höher gelegenen Innern, wo die Regenzeit früher eintritt, nach Biballa komme. Nach Antinori soll er in Tunis häufig sein, doch meint Heuglin, daß dieß ein Irrthum und wol auf den Sáharaammer zu beziehen sei. Näheres ist auch über sein Freileben nicht bekannt. Wüsten-Siebenstreifenammer (Br.). Emberiza Tahapisi, *Smth.*; E. capistrata, *Lchtst.*; Polymitra septemstriata, *Cb.*; Emberiza septemstriata, *Rpp.*; Fringillaria rufa, *Swns.* — **Der gestreifte Ammer** [Emberiza striolata] ist röthlichzimmtbraun, oberhalb dunkler; Kopf und Hals bis zur Brust aschgrau, schwärzlich schaftstreifig; über die Wangen vom Schnabel bis zu den Kopfseiten drei dunkle Längsstreifen; Mantel schwach dunkelschaftstreifig; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, breit röthlichbraun außengesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken lebhaft rostfarben; Brust bräunlichgrau, schwärzlich schaftstreifig; Bauch und Hinterleib düster roströthlichgrau; Schnabel braun, Unterschnabel heller, gelb; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen soll nur matter gefärbt sein. Größe des vorigen. Die Verbreitung erstreckt sich über den nördlichen Theil von Afrika, einige Gegenden von Westasien und den Westen von Indien. „Er lebt", sagt Heuglin, „als Standvogel im mittleren und südlichen Nubien u. a. bis zum 20. Gr. nördl. Br. und zwar meistens familienweise in der Steppe, wo steinige und felsige Striche mit Buschwerk und Gräsern bestanden sind, auf den Klippen der Stromschnellen des Nils und auf kahlen sandigen Flächen. Hier zeigt er sich ziemlich schüchtern und flüchtig und versteckt sich ohne aufzufliegen gern hinter Gestein; seine Stimme ist ammerartig, aber nicht laut und lebhaft." Chalihl-Effendi weist gelegentlich darauf hin, daß er an den Brunnen der Wüste häufig vorkommt. Im April d. J. 1869 beobachtete Dr. E. Rey in Portugal in der Nähe von Lagos ein Pärchen eines auffallend kleinen Ammers, welchen er für diese Art hielt. Da er hoffte, daß die Vögel dort an einer Gartenmauer nisten würden, so erlegte er sie nicht, doch waren sie bald darauf verschwunden, ohne daß er sie sicher feststellen konnte. Uebrigens

fand man diesen Ammer auch bei Konstantinopel. Streifenammer (Br.). L'Ortolan strié; Striated Bunting. Fringilla striolata, *Lchtst.* — Der Sahara-Ammer [Emberiza Sáharae] aus Algier, von dem vorigen nur dadurch verschieden, daß an der ganzen Oberseite die Schaftstreifen fehlen und daß er hier also einfarbig rothbraun erscheint. Er soll nach der Meinung mancher Ornithologen mit ihm als eine Art zusammenfallen, doch ist es mit Sicherheit nicht festgestellt; für die Liebhaberei hat er in diesem wie in jenem Falle keine Bedeutung. Polymitra Saharae, *Lvll. jun.*

Der Ammer vom Vorgebirge der guten Hoffnung [Emberiza capensis], ein Vogel, der zu den seit altersher bekannten gehört und doch bis zur Gegenwart so selten ist, daß er unter den Stubenvögeln nur beiläufig mitgezählt werden darf. Er ist am Oberkopf schwarz mit fahlbraunem schwärzlich gestrichelten Streif über die Kopfmitte; Augenbrauen- und Backenstreif bräunlichweiß und darunter ein schmaler schwarzer Streif; ganze Oberseite braun, breit schwärzlich schaftstreifig; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, schmal fahl außengesäumt, eine breite rostrothe Querbinde über den Flügel; ganze übrige Unterseite fahl bräunlichgrau, Kehle, Hinterleib und untere Schwanzdecken bräunlichweiß. Schnabel schwärzlichhorngrau; Auge braun; Füße dunkelbräunlichgrau. Sperlingsgröße. Es ist noch nicht bekannt, wie weit er sich über Südafrika verbreitet und ebenso fehlt noch jede Auskunft über sein Freileben. Buffon gibt nur die Beschreibung und stellt ihn als anspruchslos gefärbten Vogel in Gegensatz zu dem ungleich schönern gelbbäuchigen Ammer. Im zoologischen Garten von London ist er seit dem Jahre 1869 vorhanden; in unseren Vogelhandlungen oder zoologischen Gärten sieht man ihn höchst selten und in den Vogelstuben ist er wol noch garnicht vorhanden gewesen. Kafferammer (Br.) — [Kap'scher Ammer oder Ortolan, nach alten Autoren.] — Ortolan du Cap; Cape Bunting. — Emberiza capensis, *L.*; E. erythroptera, *Tmm.*; E. caffrariensis, *Stph.* [Hortulanus capitis Bonae spei, *Brss.*; L'Ortolan du Cape de bonne Espérance, *Buff.*].

Der Maskenammer [Emberiza personata, *Tmm.*] aus Japan ist an Kopf, Hinterhals und Halsseiten schmutziggraugrün, Kopfmitte fein schwärzlich schaftstreifig; Augenbrauen- und Bartstreif gelb, Gesicht schwarz; Mantel und Schultern rostbröthlichbraun, breit dunkelschaftstreifig; Schwingen dunkelbraun, röthlichbraun außengesäumt, zwei gelblichbraune Querbinden über den Flügel; Bürzel und obere Schwanzdecken rothbraun; Schwanz düsterrothbraun, Kehle gelb, fein dunkelschaftstreifig; ganze übrige Unterseite reingelb; Körperseiten gelbbraun, breit dunkelschaftstreifig; Schnabel bräunlichgrau; Unterschnabel am Grunde röthlich; Auge braun; Füße röthlichbraun. Das Weibchen soll übereinstimmend sein, nur ohne den gelben Augenbrauenstreif, das Schwarz am Gesicht von geringerer Ausdehnung und an der ganzen Unterseite braun schaftstreifig. Größe nahezu der des Goldammers gleich. Wie E. v. Homeyer mittheilt, kommt er auch in Ostsibirien vor, denn Schrenck erlegte zwei Weibchen der bisher nur aus Japan bekannten Art dort am 3. September in einem Gesträuch von Erlen, Birken und Weiden. Obwol er in Japan gefangen gehalten werden soll, so gelangt er doch nur höchst selten in den Handel. Von Herrn Chs. Jamrach erhielt ich im Jahre 1875 mit anderen japanesischen Vögeln zusammen auch ein Männchen dieser Art, welches ich, nachdem es sogleich gestorben, an das zoologische Museum von Berlin abgab. Ob er sonst noch jemals eingeführt worden, weiß ich nicht zu sagen. L'Ortolan masqué; Masked Bunting. — **Der grauköpfige Ammer** [Emberiza spodocéphala] ist nach v. Middendorf dem vorigen verwandt, jedoch von allen Reisenden als selbständige Art angesehen. Taczanowski, welcher in der hier schon oft erwähnten Sammlung der Vögel aus dem südlichen Ussurilande und namentlich an den Küsten des japanischen Meeres von Dybowski und Godlewski mehrere Pärchen vor sich hatte, sagt, daß kein einziges Exemplar mit jenem Verwandten irgendwelche Aehnlichkeit habe. Er ist an Kopf und Hals bis zur Brust dunkelgrünlichgrau, Gesicht schwarz; Augenbrauen- und Bartstreif gelb, Oberseite röthlichbraun, schwärzlich schaftstreifig, über den Flügel zwei fahlgelbe Querbinden; unterhalb weißlichgelb, Seiten schwarz schaftstreifig. Das Weibchen ist am Kopf grünlichbraun, das Gesicht mehr bräunlich, Unterseite gelblichweiß. Größe bedeutend geringer als die des Goldammers. In Daurien fanden ihn

Dybowski und Parrey häufig vorbeiziehend, doch selten nistend, im Amurlande ist er nach Middendorf der gemeinste Ammer. Dr. Dybowski gibt aus Ostsibirien eine ausführliche Schilderung der Lebensweise und des Nistens. Da dieselbe aber einerseits mit denen der verwandten Ammern übereinstimmt, da andrerseits dieser als Stubenvogel noch keine Bedeutung hat und eine solche voraussichtlich auch nicht gewinnen wird, so muß ich dieselbe übergehen. Nur die Bemerkung, daß das Männchen mit ziemlich melodischer Stimme ein kurzes Lied singe, sei angefügt. Buschammer (Br.) Emberiza spodocephala, *Pll.*; E. mélanops, *Blth.*; E. chlorocephala, *Hdgs.* — **Der zierliche Ammer** [Emberiza elegans, *Tmm.*] aus Japan. An Oberkopf nebst Seiten und Nacken schwarz, Hinterkopf gelb, Augenbrauenstreif weiß; ganze Oberseite rothbraun, an Mantel und Schultern die Federn schwarz schaftfleckig und fahlröthlich gesäumt; Schwingen dunkelbraun, fahl außengesäumt, über den Flügel zwei breite fahle Querbinden, Schwanzfedern schwarz, die äußersten weiß, schwarz gezeichnet; Kehle gelb; großer dreieckiger Fleck an der Oberbrust schwarz; ganze übrige Unterseite weiß, Körperseiten röthlichgrau, rothbraun gestrichelt; Schnabel dunkelbraun, Unterschnabel heller röthlich; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ist am Oberkopf roströthlichbraun, dunkel schaftstreifig; Augenbrauenstreif röthlichgelb, Kopfseiten bräunlichschwarz; die gelbe Kehle und die schwarze Zeichnung an der Oberbrust fehlen. Die Größe kommt der des Maskenammers gleich. Radde beobachtete diesen Ammer auch im Burejagebirge in Ostsibirien nistend und auf dem Durchzuge, während man ihn bis dahin nur in Japan und im Amurlande gefunden hatte. Dybowski und Godlewski erlegten ein Männchen im südlichen Ussurilande. Der erstere Reisende sagt, daß er in Japan um seines Gesangs willen im Käfige gehalten werde, und so dürfen wir wol erwarten, daß er demnächst auch bei uns im Handel erscheint. Da die ganze Lebensweise, Brut u. s. w., soweit eben bis jetzt bekannt, der aller übrigen Ammern gleicht, so wird er als Singvogel wol keinen besondern Werth erlangen, als Schmuckvogel dagegen willkommen sein. Zierammer (Br.) L'Ortolan élégant; Elegant Bunting.

Der Ammer mit gelbem Augenbrauenstreif [Emberiza chrysophrys, *Pll.*]. Am Oberkopf bis zum Nacken schwarz, mit weißem Streif über die Kopfmitte, Augenbrauenstreif bis zum Hinterkopf gelb, Zügel und Wange schwarz; ganze Oberseite schwärzlichbraun, jede Feder heller rothbraun gesäumt; Schwingen bräunlichschwarz, ebenfalls rothbraun außengesäumt, Schwanzfedern schwarzbraun, die äußersten am Ende weiß; ganze Unterseite graulichweiß, an Brust und Seiten braun schaftstreifig; Schnabel dunkelgrau, Unterschnabel heller röthlichgrau; Auge braun; Füße röthlichbraun. Das Weibchen ist an Oberkopf und Wangen bräunlichrostroth, mit gelbem Zügelstreif; ganze Oberseite fahlbräunlich, Wangen und Kehle weißlich; sparsam dunkel schaftstreifig; Oberbrust fahl bräunlichroth, breit dunkel schaftstreifig; übrige Unterseite düstergrauweiß. Sperlingsgröße. Man hat ihn in Mittel-, Süd- und Ostsibirien und Nordchina gefunden und nach Gloger's Angabe ist er auch im südwestlichen Frankreich vorgekommen. Für die Liebhaberei hat er insofern Interesse, als bereits seit dem Jahre 1873 im zoologischen Garten von London zwei Köpfe sich befinden und also weitere Einführung sich wol erwarten läßt. Goldbrauenammer (Br.). [Ammer mit gelben Augenbrauen, Buff.] L'Ortolan à sourcils jaunes; Yellow-browed Bunting. — **Stewart's Ammer** [Emberiza Stewarti, *Blth.*] vom Himalaya. Oberkopf graulichweiß, breiter Augenbrauenstreif bis zum Nacken, Ohrgegend und Kehle schwarz, Wangen weiß; Rücken, Schultern, Bürzel und Oberschwanzdecken tief röthlichkastanienbraun; Schwingen braun, schmal fahl gerandet, Flügeldecken dunkelbraun, heller gerandet; Schwanzfedern schwärzlichbraun, theils weiß gespitzt, theils gesäumt; unterhalb gelblichweiß, über die Brust ein lebhaft kastanienbraunrothes Band; Schnabel und Füße bräunlichfleischfarben; Auge braun. Das Weibchen ist oberhalb blaß olivengrünlichbraun, jede Feder mit dunkelbraunem Schaftstreif; unterhalb heller fahlbraun, dunkler gestreift. Die Größe stimmt mit der des europäischen Gartenammers überein. Dr. Stoliczka fand ihn im Winter an verschiedenen Orten im Himalaya und in Thibet. Irgend etwas näheres über den Vogel ist nicht angegeben. Grey-capped Bunting (*Gld.*). Emberiza caniceps, *Gld.*

Der Fichtenammer [Emberiza pityornis].

Wir gelangen jetzt zu einem Vogel, welcher ebenso um seiner Lebensweise willen, wie auch als Stubenvogel unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen darf. Er ist am Oberkopf weiß; Stirn, Hinterkopf und Kopfseiten schwärzlichgrau; Zügel-, Augenbrauen- und Schläfenstreif rostroth, ebenso die Halsseiten und Kehle, an der Oberkehle aber ein weißlicher, schwärzlich eingefaßter Fleck; Wangenfleck weiß, schmal schwärzlichgrau umrandet; ganze Oberseite röthlichbraun, dunkel schaftfleckig, namentlich an Mantel und Rücken; Schwingen, Flügeldecken und Schwanzfedern schwarzbraun, die ersteren und letzteren fein hell und die oberen Flügeldecken breit rostroth außengesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken rostfarben, ungefleckt; an der Oberbrust eine weiße, halbmondförmige Zeichnung; Hals und Brustseiten, nebst einem Bande über die Oberbrust rothbraun, schwach weißlich gefleckt; ganze übrige Unterseite reinweiß; Schnabel dunkelbraun, Unterschnabel heller; Auge braun; Füße bräunlichgelb. Das Weibchen ist am Kopf einfarbig schwärzlichgrau ohne die weiße Zeichnung, ebenso sind Zügel-, Augenbrauen- und Seitenstreifen düsterer, auch der Wangenfleck ist grauweiß, die Kehle weiß, seitlich rostbraun gefleckt und die Zeichnung an der Brust matter, mehr verloschen; Kopf- und Halsseiten weißlich; die ganze Oberseite ist fahl bräunlichrostroth, dunkel schaftfleckig; Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig röthlichzimmtbraun; auch die ganze Unterseite ist nicht rein-, sondern düsterweiß. Die Größe ist der des Goldammers gleich. Seine Heimat erstreckt sich vom Norden Asiens und Europas aus über ein noch nicht bestimmtes Gebiet und sein Freileben ist ziemlich eingehend erkundet. Bereits Buffon erwähnt ihn, jedoch nur mit der kurzen Bemerkung, daß er sich in den Tannenwäldern Sibiriens aufhalte, dort zu anfang des Frühlings ankomme und wie ein Rohrammer pfeife. Nach Dybowski's Mittheilungen ist er in Ostsibirien auf dem Frühjahrsdurchzuge sehr häufig und kommt als der erste Ammer dort an; im Jahre 1868 wurde er bereits am 3. April gesehen. „Er zeigt sich gesellig an waldigen Bergabhängen oder auf beackerten Feldern nahrungsuchend, niemals aber in den Steppen. In der Lebensweise hat er die größte Aehnlichkeit mit dem Goldammer, doch zieht er zum Winter hin gänzlich ab. Das Nest steht am Rande eines Waldes oder Gebüsches, immer an einem offnen Orte, auf der Erde in einer kleinen Vertiefung, unter einem Strauche, Baumstamm, am Boden liegenden Aste oder auch unter einem Rindenstück. Es ist von außen aus groben, trockenen Kräutern geschichtet und innen mit feinen zarten Gräsern und Roßhaaren glatt ausgelegt. Gegen Ende des Monats Mai werden 4 bis 6 Eier gelegt, welche mit denen des Goldammers die größte Aehnlichkeit haben, doch gewöhnlich mehr bunt sind. Während das Weibchen allein brütet, sitzt das Männchen in der Nähe auf einem dürren Ast und singt ähnlich, nur etwas rauher, als der erwähnte Verwandte. Wenn man dem Nest naht, so fliegt das Weibchen erst dicht unter den Füßen auf und stellt sich nach der Gewohnheit dieser Vögel krank und flügellahm, um den Feind von den Jungen fortzulocken. Sobald diese das Nest verlassen haben, werden sie nur vom Männchen gefüttert. Das Weibchen beginnt zum zweitenmale zu nisten und brütet in der Mitte d. M. Juni wiederum. Die Herbstdurchzüge dauern hier beinahe bis zu Ende Septembers; einzelne Köpfe

sah man sogar noch am 18. Oktober. In dieser Zeit halten sie sich in kleinen Scharen beisammen und suchen ihre Nahrung besonders auf den abgeernteten Hafer- und Buchweizenfeldern.“ Auch in Daurien fanden der Genannte und Parrey ihn sehr häufig und nistend. Dr. Severzow traf ihn in Turkestan im Gebirge nistend und zwar in der vierten Höhenzone. Nach der Richtung des Durchzugs sei zu vermuthen, daß die Vögel hierher nicht aus Sibirien, sondern aus einer noch nicht festgestellten Gegend kommen. Es ist übrigens noch nicht bekannt, welchen Weg sie und die verwandten Ammern, die im Norden Rußlands, bzl. in Sibirien über Sommer weilen und nisten, auf dem Zuge nehmen und wo sie überhaupt zur Winterruhe sich hinwenden. Homeyer weist darauf hin, daß derartige Verhältnisse bei vielen im Nordosten wohnenden Vögeln nicht aufgeklärt seien und daß sichere Nachrichten darüber sehr erwünscht sein würden. Radde fand den Fichtenammer bereits gegen Ende d. M. März und sagt, daß er in fast ganz Sibirien und dem Amurlande gemein sei. Auffallend spät erscheint er dagegen nach Middendorf auf dem Stanowoy-Gebirge, wo er nicht vor dem 23. Mai eintrifft. Schrenck sah ihn im Frühjahr 1855 vom 11. bis 23. April im Amurlande. Nach Angaben von Gloger und Fritsch ist er sodann in Böhmen beobachtet und nach letzterm ebenso in Ungarn und Oberösterreich. Dr. v. Müller verzeichnet ihn unter den Vögeln, welche er in Südfrankreich gesehen und zwar zeige er sich von Zeit zu Zeit in der Provence im Herbst und stets im Jugendkleide, wie denn überhaupt eine beträchtliche Anzahl von Vögeln des hohen Nordostens nach den Ländern am Mittelmeerbecken zur Ueberwinterung gehen. Auch in Italien und zwar bei Cascine in der Nähe von Pisa und in der Sumpfgegend von Grosseto in Toskana beobachtete ihn Schalaw, und im Museum von Genua befinden sich Exemplare von mehreren Arten asiatischer Ammer, welche in der dortigen Gegend erlegt worden.

Ueberaus interessant ist die Schilderung des Gefangenlebens, welche Viktor Ritter v. Tschusi gibt. Er hatte i. J. 1866 ein Männchen auf dem Wiener Vogelmarkt, wo es als Rohrammer ausgeboten wurde, gekauft. Dasselbe war einige Tage vorher in der Nähe von Wien gefangen. „Als ich den Vogel in einen geräumigen Käfig setzte, war er sehr scheu und flog fortwährend gegen die Drähte, sodaß ich ihn, um Verletzungen vorzubeugen, verdecken mußte. Im beginnenden Frühling mäßigte sich sein ungestümes Wesen und zuletzt wurde er recht zahm. Im Sommer hielt ich ihn mit anderen Körner- und Insektenfressern in einem geräumigen Gesellschaftsbauer, wo er als ein ruhiger, wenig lebhafter und verträglicher Vogel lebt. Der Lockruf, den man häufig auch während des Singens hört, gleicht vollständig dem des Goldammers; da ich im Winter des genannten Jahres beide Arten im Käfige in meinem Zimmer hatte, so konnte ich mich täglich davon überzeugen. Nicht selten geschah es, daß vorbeiziehende Gold-

ammern durch seinen Ruf herbeigelockt, im Garten einfielen. Der Gesang hat beinahe nichts ammerartiges; er erinnert vielmehr lebhaft an den des Stiglitz und des Rothkehlchens, namentlich an die feinen langgezogenen schwermüthigen Töne des letztern, welche von ihm jedoch niemals so laut vorgetragen werden, wie dies bei guten Sängern jener Art der Fall ist, sondern eher denen eines jungen sich übenden Rothkehlchens gleichen. Es ist mir daher unbegreiflich, wie Radde, der diesen Ammer doch häufig zu beobachten Gelegenheit hatte, von ihm sagen kann: ‚der angenehme Gesang erinnert wol einigermaßen an den des Edelfink, nur verräth sich auch in ihm der bekannte Ammer-Rhythmus'. — Im Mai, Juni und in der ersten Hälfte des Juli sang er fleißig sein einfaches Liedchen. Der vollständige Federwechsel begann im August; Mitte Septembers hatte er bereits das vollkommene Winterkleid angelegt. Ich glaube, es dürfte nicht überflüssig sein, zu bemerken, daß das Sommerkleid, da es unter dem Winterkleide verborgen ist, durch Abnutzung der anders gefärbten Ränder entsteht.

„Inbetreff des Vorkommens dieses Vogels in Niederösterreich konnte ich nur wenige Angaben auffinden. Temminck bemerkt, daß er i. J. 1824 bei Wien erlegt sei. Graf Gourcy-Droitaumont, der sorgsame Beobachter der Vogelwelt, führt in Oken's „Isis", Jahrgang 1848, zwei Fälle an: ‚das erste Männchen, welches ich beobachtete, war jung und befand sich mit vielen Vögeln von allerlei Arten in einem geräumigen großen Gitter, wo es recht vergnügt zu sein schien. Das andre aber war ein alter, ganz ausgefärbter Vogel, der sehr schön aussah. Auch dieser wurde anfangs in einem großen Vogelhause mit Kanarienvögeln zusammengehalten und zeigte sich sehr verträglich und ebenso munter, als ich ihn späterhin in demselben Käfige allein fand. Diesmal fiel mir seine geringe Wildheit auf, die es mir möglich machte, ihn recht genau anzusehen und mich an seiner schönen Kopfzeichnung zu erfreuen. Er wurde mit Hirse, Hanf u. drgl. ernährt und befand sich dabei recht wohl. Im April sang er fein, leise und noch nicht ganz verständlich und lockte äußerst selten. Doch versicherte sein Besitzer, der Lockton scheine mehr ammerartig zu klingen, als der Gesang, in welchem, wenigstens so lange er leise sang, nichts einem Ammerliede ähnliches zu finden sei. Der Vogel war zu Ende Februars bei Wien gefangen.' Ich bin fest davon überzeugt, daß diese Ammerart zuweilen bei uns gefangen wird, sie fällt dann aber meistens Unkundigen in die Hände, die sie ihres unansehnlichen Winterkleides wegen übersehen oder mit dem Rohrammer verwechseln, dem sie in demselben nicht unähnlich ist, wie dies ja auch mit dem meinigen geschehen war." Irgendwelche anderweitigen Angaben über das Gefangenleben oder auch nur über die Einführung kann ich nirgends finden und ich glaube daher, daß dieser Ammer bis jetzt außerdem noch nicht lebend in den Handel gelangt ist. Sollte ein Liebhaber für ihn sich besonders interessiren, vielleicht eine Sammlung aller

Ammer anlegen wollen, so dürfte es gerathen sein, einem Wiener Händler, also Herrn Karl Gudera, Fräulein Lübke, vielleicht auch Herrn Karl Baudisch in Triest, Herrn F. Zivsa in Troppau oder Herrn Gleitzmann in Moskau, Auftrag zu geben. Alle diese Adressen füge ich für den etwaigen Bezug sibirischer, nord- und südrussischer Vögel u. a. beiläufig hier an. Ein Preis ist natürlich nicht anzugeben.

Der Fichtenammer hat keine weiteren Namen. [Ammer Pityornis, Buff.].

Nomenclatur: Emberiza pityornis*), *Pll.*, *Gml.*, *Gld.*, *Gr.*, *Bp.*, *Cb.*, *Tschs.*; E. leucocéphala, *S. G. Gml.*; Fringilla dalmatica, *Gml.*, *Lth.*; Emberiza Bonapartei, *Brthlm.*; E. albida, *Blth.* [Passer sclavonicus, *Brss.*; Emberiza esclavonica, *Dgl.*].

Wissenschaftliche Beschreibung s. S. 584. — Winterkleid: Kopfplatte und Nacken graubraun; Wangen schmutzigweiß; Kehle, Halsseiten und Streif durchs Auge rostbraun, weiß gerändert; weißer Halsring mit schwärzlichen Spitzen; Rücken graubraun, schwarzbraun längsgefleckt; große Schwingen schwärzlich, kleine Schwingen schwarzbraun, breit rothbraun gerandet, über jeden Flügel zwei weiße Binden; Schwanzfedern schwarzbraun, schwach hell gesäumt, die beiden äußersten mit reinweißem Keilfleck; Bürzel rostroth, jede Feder weiß gesäumt; Oberbrust und Seiten hellrostroth, jede Feder mit breitem hellern Saum; der übrige Unterkörper weiß; Schnabel hornbraun, Unterschnabel düstergelb; Füße hellgelblichbraun (Tschusi).

Emberiza pityornis: pileo albo; fronte, occipite capitisque lateribus nigricante cinereis; loris, superciliis, stria temporali, colli lateribus gulaque ferrugineo-rufis, hac superiore maculam albidam, subnigro-circumscriptam ostendente; macula genarum anguste nigricante cinereo-cincta; notaeo toto badio, eoque praesertim verum interscapilio dorsoque obscure vittatis; tectricibus al., remigibus rectricibusque nigro-fuscis, hoc utroque subtiliter dilute, et tectricibus minoribus late exterius ferrugineo-limbatis; uropygio et supracaudalibus ferrugineis, immaculatis; pictura gutturis semilunari alba; collo pectorisque lateribus fasciaque gutturis rufis, albido-submaculatis; subtus omnino albissima; rostro fusco, mandibula pallidiore; iride fusca; pedibus fulvis. — ♀ capite nigricante cinereo, picturae albae vacuo; loris, stria superciliari et temporali luridioribus; macula genarum incana; lateribus gulae albae badio-maculatis; pectoris notis elutioribus; lateribus capitis colliquc albidis; notaeo toto livide badio, obscure vittato; uropygio et supracaudalibus unicoloribus rubente cinnamomeis; subtus sordide alba. — Vest. hiem. pileo cerviceque fumidis; genis luride albis; gula, colli lateribus striaque trans oculum ferrugineofuscis, albo-marginatis; torque albo, subnigro-limitato; dorso fumido, nigro-fusco-vittato; remigibus primoribus nigricantibus, secundariis nigro-fuscis, dilute sublimbatis, ambabus extimis maculam cuneiformem albam offerentibus; pluma uropygii ferrugineo-rufi quaque albo-limbata; plumis et gutturis et pleurarum ruforum late dilutius marginatis; subtus alba; rostro fuscato-corneo, mandibula gilva; pedibus ochraceis.

Länge 18 cm.; Flügel 9,6 cm. (Flügelbreite 18 cm.); Schwanz 8,3 cm.

Der röthliche Ammer [Emberiza rútila, *Pll.*] ist oberhalb lebhaft zimmtröthlichbraun; Kopf heller, schwachgelblich; Schwingen und Schwanzfedern olivengrünlich außengesäumt; ganze Unterseite schwefelgelb; Körperseiten ins Grünlichgraue übergehend, matt dunkelschaftstreifig; untere Flügelseite gelblichweiß; Schnabel und Füße röthlichbraun; Auge braun. Das Weibchen

*) Pityornus statt Pityornis kann ursprünglich nur auf einem Druckfehler beruhen, der sich dann fortgeschleppt hat; ὄρνος ist garkein griechisches Wort; Ornus lateinisch = Esche (Fráxinus ornus, *L.*) paßt am wenigsten; wäre vox hybrida und widersinnig.

Dr. L.

ist oberhalb fahlbraun, dunkelbraun schaftstreifig, am Bürzel einfarbig röthlichdunkelbraun; Bartstreif braun; Wangen und Kehle fahl röthlich; Oberbrust mattrostroth, dunkelschaftstreifig, ganze Unterseite weißlichgelb. Sperlingsgröße. Die Heimat stimmt mit der des vorigen überein und ebenso dürfte er in der Lebensweise, Brutentwicklung u. s. w. nicht abweichen. Nach Pallas u. A. gehört er zu den selteneren sibirischen Ammern. In Ostsibirien fand ihn Dr. Dybowski jedoch ziemlich häufig, auch nistend; ebenso in Daurien im Vorbeizuge. Für uns gewährt er dadurch ein besondres Interesse, daß ein Exemplar im Jahre 1873 in den zoologischen Garten von London gelangte. Röthelammer (Br.). Red-backed Bunting. — **Der Bauernammer** [Emberiza rústica, *Pll.*] gehört wiederum zu den nordischen Ammern, welche auf ihren Wanderungen gelegentlich auch bis nach dem westlichen und südlichen Europa gelangen. Er ist an Oberkopf und Kopfseiten schwarz mit breiter weißer Binde längs des Scheitels; oberhalb rothbraun, Mantel und Schultern breit schwarz schaftfleckig, Schwingen dunkelbraun, fahl außengesäumt und zwei weiße Querbinden über den Flügel; Schwanzfedern schwarz mit weißem Fleck; Kehle weiß, Oberbrust und Seiten rothbraun; unterhalb nebst der untern Flügelseite reinweiß, Schnabel bräunlichroth mit schwärzlicher First; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ist am Oberkopf dunkelgrau; Scheitel- und Augenbrauenstreif hellgrau; Schläfenstreif röthlichgelb; Bartstreif schwärzlich; Kehle und Oberbrust fahl röthlichweiß, letztere fahlgelb schaftstreifig, Brust braunroth gefleckt; Seiten rothbraun längsgefleckt. Größe nahezu mit der des Goldammers übereinstimmend. Die Heimat erstreckt sich über Nordasien und Nordeuropa und die bei den vorhergegangenen nordischen Ammern erwähnten Reisenden und Naturforscher berichten, daß sie auch ihn im Bereiche ihrer Reisen gefunden haben. Nach Blasius hält er sich im Nordwesten Rußlands zahlreich in Wäldern an freien Stellen und an Waldrändern auf. Die Brut gleicht nach seinen und Radde's Angaben der des Rohrammers. Letzterer fand das Nest in den Weidengebüschen der Flußufer oder in sumpfigen Wäldern und sagt, daß er im südöstlichen Sibirien unter allen Ammern zuerst, bereits zu Ende des März ankomme, dort aber nicht niste. In Ostsibirien erscheint er nach Dybowski ganz regelmäßig Mitte Aprils, bleibt bis zur ersten Hälfte des Mai, kommt wieder im September und verschwindet im letzten Drittel des Oktober. Ebenso ist er in Daurien häufig im Vorbeizuge, nach Middendorf östlich vom Bailkalsee. Mewes fand ihn an der Onegabucht, v. Nordmann auf einer Fußreise nach dem weißen Meere, v. Kittlitz u. A. in Kamtschatka und Schrader in Lappland. Ferner ist er in Schweden nicht selten, nach Swinhoë in Nordchina, wo er nach Angabe des Kapitän Przewalski überwintert. Gätke zählt ihn unter den Gästen Helgolands mit; nach Paeßler wurde ein Exemplar im Altenburgischen erlegt und im Berliner Museum steht ein solches aus dem Voigtlande. Dr. v. Müller sagt, daß er in der französischen Provenze fast regelmäßig in jedem Jahre zu Ende Oktobers noch im Jugendkleide sich zeige und im übrigen sich gut in der Gefangenschaft halte. Auch unter den in Italien beobachteten Vögeln wird er mitgezählt. In der ganzen Lebensweise soll er dem Rohrammer, nach anderen Forschern auch dem Zipammer gleichen; Pallas sagt, daß sein Gesang zwischen dem beider in der Mitte stehe. Im Jahre 1870 brachte der Händler Stader aus Moskau nebst Lasurmeisen u. a. auch einen sibirischen Bauernammer mit. Derselbe ist jedoch bald gestorben. Waldammer (Br.). Emberiza rustica, *Pll.*; E. borealis. *Zttrstd.*; E. lesbia, *Grml.* — **Der Zwergammer** [Emberiza pusilla], wie der Name sagt, wol der kleinste von allen, fast noch geringer als der Feldsperling. Am Oberkopf und Kopfseiten bräunlichroth, über den Kopf vom Nasenloch bis zum Nacken je ein schwarzer Streif, Zügelstreif rothbraun, am Hinterkopf ein schwarzer Fleck; ganze Oberseite braun, an Mantel und Oberrücken jede Feder breit schwarzbraun schaftfleckig; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fahlbraun außengesäumt, über den Flügel eine fahlröthliche Querbinde; Unterseite weißlich, an Hals und Brust schwarz schaftstreifig; Schnabel, Auge und Füße braun; letztere heller. Das Weibchen ist matter gefärbt, mit einem fahlen Streif über die Kopfmitte, je einem braunen an jeder Kopfseite; Zügel und Augenbrauenstreif matt rostroth; Wangen bräunlichroth; die Heimat ist Asien und das östliche Europa. Nordmann fand ihn häufig an der Dwina und auch Liljeborg im nördlichen Rußland. Nach Middendorf kommt er nur wenig im Amurlande

vor. Schrenck entdeckte ein Nest dort in einer Lichtung des Nadelwaldes zwischen dem See von Kidsi und der Meeresküste und zwar auf der Erde zwischen Morstümpeln, kunstlos aus Grashalmen mit Lärchen- und Tannennadeln gebaut. Es enthielt am 17. Juni, zu welcher Zeit freilich noch Ueberreste von Schnee lagen, fünf unbebrütete Eier. An der Onegabucht fand ihn W. Mewes mit Verwandten zusammen. In Ostsibirien ist er nach Dybowski ziemlich häufig, erscheint zu Anfang d. M. Mai, hält sich über Sommer auf ziemlich bedeutenden Bergeshöhen, geht zu Anfang Septembers in die Thäler hinab, bleibt dort bis Ende d. M., einzeln sogar bis zum 23. Oktober, und wandert dann bis nach dem Himalaya. Bei Daraſun in Daurien ist er nach dem Genannten und Parrey häufig im Vorbeizuge. Dr. Krüper sagt, daß Herr v. Gontzenbach ein Exemplar aus Smyrna erhalten und daß ein andres bei Beyrut von einem Vogelsteller gefangen sei. In Nordchina lebt er nach Swinhoë und zieht im Winter südwärts. Gätke und Blasius zählen ihn unter den Wandergästen Helgolands mit. Ebenso erscheint er nach Dr. v. Müller in der Umgegend von Marseille und wird in jedem Jahre weit regelmäßiger gefangen, als die übrigen seltenen Ammern, und schließlich gehört er auch zu den in Italien beobachteten Vögeln. Ueber das Freileben ist nur bekannt, daß die Brut und alles übrige denen der Verwandten gleichen. [Kleiner Ammer, Buff.], Emberiza pusilla, *Pll.*; E. sordida et oinops et Ocyris oinopus, *Hdgs.* — **Der lerchengraue Ammer** [Emberiza impetuani, *Smth.*], bisher nur aus Angola bekannt und von Hartlaub nach einem Exemplare der Pariser Sammlung beschrieben, ist oberhalb isabellfarben, braunstreifig, ein Streifen oberhalb des Auges und ein solcher durch dasselbe fahl, unterhalb heller, röthlichgrau und ungefleckt; Bauch und Hinterleib weißlich. Fringillaria anthoides, *Swns.* — **Tristram's Ammer** [Emberiza Tristrami, *Swnh.*], von Dybowski und Godlewski im Amurlande und vom Missionär David in China gefunden, bedarf ebenfalls nur der Erwähnung. Emberiza quinquelineata, *Dvd.* — **Der veränderliche Ammer** [Emberiza variabilis, *Tmm.*] aus Japan; dunkelgrau, an Mantel und Schultern breit schwarz schaftstreifig; Schwingen schwarzbraun, fahl außengesäumt; Schwanzfedern bräunlichgrau; unterhalb heller; Schnabel rothbraun; Auge braun; Füße röthlichbraun. Das Weibchen hat einen röthlichgelbbraunen Augenbrauenstreif, einen rothbraunen Wangenstreif, darunter einen röthlichweißen und dann einen dunkelbraunen Bartstreif; ganze Oberseite rothbraun; Kehle düsterweiß; Unterseite fahl bräunlichgelb, matt dunkel schaftfleckig. Näheres ist nicht bekannt. Wechselammer (!Br.).

Der rostbärtige Ammer [Emberiza caesia] ist, obgleich dem Gartenammer überaus ähnlich, doch wol von ihm sicher verschieden. Dr. Krüper, der ihn in Kleinasien beobachtet, sagt: „Er ist lange Zeit hindurch von Stubenornithologen als eine unbegründete Art angesehen worden, da man meinte, daß er nur ein durch klimatischen Einfluß etwas veränderter Ortolan sei. Wer sich von dieser Ungereimtheit überzeugen will, mag sich von Mitte März bis Mitte April nach Smyrna begeben und täglich im Freien umherjagen." Leider gibt er aber nicht an, in welchen Kennzeichen die Unterscheidungsmerkmale bestehen. Brehm sagt, daß die „allgemeine Färbung wie beim Gartenammer, die Kopfquerbinden aber deutlicher grau" seien. Meines wissens hat jedoch der Ortolan keine Kopfquerbinde und Naumann, nach dessen Beschreibung der Genannte die seinige aufgestellt haben will, sagt davon ebenfalls nichts; im übrigen ist die Kehle anstatt gelb, blaß rostroth und die Unterseite dunkler zimmtbraun; der Schnabel ist mehr und lebhafter roth. Nähere Merkzeichen dürften bis jetzt wol nicht festgestellt sein. Heuglin, der ihn ebenfalls als selbständige Art betrachtet, beobachtete ihn in kleinen Flügen in Unteregypten im März und zu Anfang des April. „Die Vögel halten sich dann meistens am Rande der Wüste und des Kulturlandes auf, namentlich auf Dünen, kahlen Schutthügeln, Tennen und im Rohrdickicht, zuweilen mit dem Rohrammer zusammen. Vom Anfang des Monats September an begegnet man ihm längs des Nil, in Arabien und Abessinien, ebenfalls meistens gesellig; nach v. d. Mühle ist er die häufigste Ammerart in Griechenland, wo er im April ankommt und nebst Steinschmätzern, Blaudrosseln und Käutzen die unwirtlichen felsigen Hügel bewohnt; sein Gesang sei viel zarter und weniger flötend als der des Verwandten.

ist oberhalb fahlbraun, dunkelbraun schaftstreifig, am Bürzel einfarbig röthlichdunkelbraun; Bartstreif braun; Wangen und Kehle fahl röthlich; Oberbrust mattrostroth, dunkelschaftstreifig, ganze Unterseite weißlichgelb. Sperlingsgröße. Die Heimat stimmt mit der des vorigen überein und ebenso dürfte er in der Lebensweise, Brutentwicklung u. s. w. nicht abweichen. Nach Pallas u. A. gehört er zu den selteneren sibirischen Ammern. In Ostsibirien fand ihn Dr. Dybowski jedoch ziemlich häufig, auch nistend; ebenso in Daurien im Vorbeizuge. Für uns gewährt er dadurch ein besondres Interesse, daß ein Exemplar im Jahre 1873 in den zoologischen Garten von London gelangte. Röthelammer (Br.). Red-backed Bunting. — **Der Bauernammer** [Emberiza rústica, *Pll.*] gehört wiederum zu den nordischen Ammern, welche auf ihren Wanderungen gelegentlich auch bis nach dem westlichen und südlichen Europa gelangen. Er ist an Oberkopf und Kopfseiten schwarz mit breiter weißer Binde längs des Scheitels; oberhalb rothbraun, Mantel und Schultern breit schwarz schaftfleckig, Schwingen dunkelbraun, fahl außengesäumt und zwei weiße Querbinden über den Flügel; Schwanzfedern schwarz mit weißem Fleck; Kehle weiß, Oberbrust und Seiten rothbraun; unterhalb nebst der untern Flügelseite reinweiß, Schnabel bräunlichroth mit schwärzlicher First; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen ist am Oberkopf dunkelgrau; Scheitel- und Augenbrauenstreif hellgrau; Schläfenstreif röthlichgelb; Bartstreif schwärzlich; Kehle und Oberbrust fahl röthlichweiß, letztere fahlgelb schaftstreifig, Brust braunroth gefleckt; Seiten rothbraun längsgefleckt. Größe nahezu mit der des Goldammers übereinstimmend. Die Heimat erstreckt sich über Nordasien und Nordeuropa und die bei den vorhergegangenen nordischen Ammern erwähnten Reisenden und Naturforscher berichten, daß sie auch ihn im Bereiche ihrer Reisen gefunden haben. Nach Blasius hält er sich im Nordwesten Rußlands zahlreich in Wäldern an freien Stellen und an Waldrändern auf. Die Brut gleicht nach seinen und Radde's Angaben der des Rohrammers. Letzterer fand das Nest in den Weidengebüschen der Flußufer oder in sumpfigen Wäldern und sagt, daß er im südöstlichen Sibirien unter allen Ammern zuerst, bereits zu Ende des März ankomme, dort aber nicht niste. In Ostsibirien erscheint er nach Dybowski ganz regelmäßig Mitte Aprils, bleibt bis zur ersten Hälfte des Mai, kommt wieder im September und verschwindet im letzten Drittel des Oktober. Ebenso ist er in Daurien häufig im Vorbeizuge, nach Middendorf östlich vom Bailkalsee. Mewes fand ihn an der Onegabucht, v. Nordmann auf einer Fußreise nach dem weißen Meere, v. Kittlitz u. A. in Kamtschatka und Schrader in Lappland. Ferner ist er in Schweden nicht selten, nach Swinhoë in Nordchina, wo er nach Angabe des Kapitän Przewalski überwintert. Gätke zählt ihn unter den Gästen Helgolands mit; nach Paeßler wurde ein Exemplar im Altenburgischen erlegt und im Berliner Museum steht ein solches aus dem Voigtlande. Dr. v. Müller sagt, daß er in der französischen Provenze fast regelmäßig in jedem Jahre zu Ende Oktobers noch im Jugendkleide sich zeige und im übrigen sich gut in der Gefangenschaft halte. Auch unter den in Italien beobachteten Vögeln wird er mitgezählt. In der ganzen Lebensweise soll er dem Rohrammer, nach anderen Forschern auch dem Zipammer gleichen; Pallas sagt, daß sein Gesang zwischen dem beider in der Mitte stehe. Im Jahre 1870 brachte der Händler Stader aus Moskau nebst Lasurmeisen u. a. auch einen sibirischen Bauernammer mit. Derselbe ist jedoch bald gestorben. Waldammer (Br.). Emberiza rustica, *Pll.*; E. borealis. *Ztrstd.*; E. lesbia, *Grml.* — **Der Zwergammer** [Emberiza pusilla], wie der Name sagt, wol der kleinste von allen, fast noch geringer als der Feldsperling. Am Oberkopf und Kopfseiten bräunlichroth, über den Kopf vom Nasenloch bis zum Nacken je ein schwarzer Streif, Zügelstreif rothbraun, am Hinterkopf ein schwarzer Fleck; ganze Oberseite braun, an Mantel und Oberrücken jede Feder breit schwarzbraun schaftfleckig; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fahlbraun außengesäumt, über den Flügel eine fahlröthliche Querbinde; Unterseite weißlich, an Hals und Brust schwarz schaftstreifig; Schnabel, Auge und Füße braun; letztere heller. Das Weibchen ist matter gefärbt, mit einem fahlen Streif über die Kopfmitte, je einem braunen an jeder Kopfseite; Zügel und Augenbrauenstreif matt rostroth; Wangen bräunlichroth; die Heimat ist Asien und das östliche Europa. Nordmann fand ihn häufig an der Dwina und auch Liljeborg im nördlichen Rußland. Nach Middendorf kommt er nur wenig im Amurlande

vor. Schrenck entdeckte ein Nest dort in einer Lichtung des Nadelwaldes zwischen dem See von Kidsi und der Meeresküste und zwar auf der Erde zwischen Morttümpeln, kunstlos aus Grashalmen mit Lärchen- und Tannennadeln gebaut. Es enthielt am 17. Juni, zu welcher Zeit freilich noch Ueberreste von Schnee lagen, fünf unbebrütete Eier. An der Onegabucht fand ihn W. Mewes mit Verwandten zusammen. In Ostsibirien ist er nach Dybowski ziemlich häufig, erscheint zu Anfang d. M. Mai, hält sich über Sommer auf ziemlich bedeutenden Bergeshöhen, geht zu Anfang Septembers in die Thäler hinab, bleibt dort bis Ende d. M., einzeln sogar bis zum 23. Oktober, und wandert dann bis nach dem Himalaya. Bei Daraſun in Daurien ist er nach dem Genannten und Parrex häufig im Vorbeizuge. Dr. Krüper sagt, daß Herr v. Gontzenbach ein Exemplar aus Smyrna erhalten und daß ein andres bei Beyrut von einem Vogelsteller gefangen sei. In Nordchina lebt er nach Swinhoë und zieht im Winter südwärts. Gätke und Blasius zählen ihn unter den Wandergästen Helgolands mit. Ebenso erscheint er nach Dr. v. Müller in der Umgegend von Marseille und wird in jedem Jahre weit regelmäßiger gefangen, als die übrigen seltenen Ammern, und schließlich gehört er auch zu den in Italien beobachteten Vögeln. Ueber das Freileben ist nur bekannt, daß die Brut und alles übrige denen der Verwandten gleichen. [Kleiner Ammer, Buff.], Emberiza pusilla, *Pll.*; E. sordida et oinops et Ocyris oinopus, *Hdgs.* — **Der lerchengraue Ammer** [Emberiza impetuani, *Smth.*], bisher nur aus Angola bekannt und von Hartlaub nach einem Exemplare der Pariser Sammlung beschrieben, ist oberhalb isabellfarben, braunstreifig, ein Streifen oberhalb des Auges und ein solcher durch dasselbe fahl, unterhalb heller, röthlichgrau und ungefleckt; Bauch und Hinterleib weißlich. Fringillaria anthoides, *Swns.* — **Tristram's Ammer** [Emberiza Tristrami, *Swnh.*], von Dybowski und Godlewski im Amurlande und vom Missionär David in China gefunden, bedarf ebenfalls nur der Erwähnung. Emberiza quinquelineata, *Dvd.* — **Der veränderliche Ammer** [Emberiza variabilis, *Tmm.*] aus Japan; dunkelgrau, an Mantel und Schultern breit schwarz schaftstreifig; Schwingen schwarzbraun, fahl außengesäumt; Schwanzfedern bräunlichgrau; unterhalb heller; Schnabel rothbraun; Auge braun; Füße röthlichbraun. Das Weibchen hat einen röthlichgelbbraunen Augenbrauenstreif, einen rothbraunen Wangenstreif, darunter einen röthlichweißen und dann einen dunkelbraunen Bartstreif; ganze Oberseite rothbraun; Kehle düsterweiß; Unterseite fahl bräunlichgelb, matt dunkel schaftfleckig. Näheres ist nicht bekannt. Wechselammer (!Br.).

Der rostbärtige Ammer [Emberiza caesia] ist, obgleich dem Gartenammer überaus ähnlich, doch wol von ihm sicher verschieden. Dr. Krüper, der ihn in Kleinasien beobachtet, sagt: „Er ist lange Zeit hindurch von Stubenornithologen als eine unbegründete Art angesehen worden, da man meinte, daß er nur ein durch klimatischen Einfluß etwas veränderter Ortolan sei. Wer sich von dieser Ungereimtheit überzeugen will, mag sich von Mitte März bis Mitte April nach Smyrna begeben und täglich im Freien umherjagen." Leider gibt er aber nicht an, in welchen Kennzeichen die Unterscheidungsmerkmale bestehen. Brehm sagt, daß die „allgemeine Färbung wie beim Gartenammer, die Kopfquerbinden aber deutlicher grau" seien. Meines wissens hat jedoch der Ortolan keine Kopfquerbinde und Naumann, nach dessen Beschreibung der Genannte die seinige aufgestellt haben will, sagt davon ebenfalls nichts; im übrigen ist die Kehle anstatt gelb, blaß rostroth und die Unterseite dunkler zimmtbraun; der Schnabel ist mehr und lebhafter roth. Nähere Merkzeichen dürften bis jetzt wol nicht festgestellt sein. Heuglin, der ihn ebenfalls als selbständige Art betrachtet, beobachtete ihn in kleinen Flügen in Unteregypten im März und zu Anfang des April. „Die Vögel halten sich dann meistens am Rande der Wüste und des Kulturlandes auf, namentlich auf Dünen, kahlen Schutthügeln, Tennen und im Rohrdickicht, zuweilen mit dem Rohrammer zusammen. Vom Anfang des Monats September an begegnet man ihm längs des Nil, in Arabien und Abessinien, ebenfalls meistens gesellig; nach v. d. Mühle ist er die häufigste Ammerart in Griechenland, wo er im April ankommt und nebst Steinschmätzern, Blaudrosseln und Käutzen die unwirtlichen felsigen Hügel bewohnt; sein Gesang sei viel zarter und weniger flötend als der des Verwandten.

Das Nest fand ich einzeln im Nildelta und in Kairo um Olivengärten." Krüper fährt in seinen Angaben wie folgt fort: „Der Hauptzug dieser Ammern kommt am 24. und 25. März an und fällt nur an steinigen Anhöhen ein. Merkwürdig ist es, daß man in den Scharen so sehr viele Männchen und nur wenige Weibchen bemerkt. Im April vertheilen sich die Pärchen zum Nestbau. Sie sind nicht besonders scheu und können daher leicht erlegt werden. Auf einem größern Steine sitzend, läßt das Männchen sein kurzes Lied in verschiedenen Tonarten erklingen. Das Nest steht immer auf dem Boden, gewöhnlich hinter einem größern Steine oder auch unter niedrigen stacheligen Pflanzen verborgen; es enthält ein Gelege von 5 bis 6 Eiern, welche denen des Gartenammers ähnlich, doch sicher zu unterscheiden sind. Wahrscheinlich brütet er in Kleinasien und Griechenland zweimal im Jahre." Auch auf Naxos nistet er nach Mittheilung desselben Forschers an öden Stellen der Berge. In der Krimm hat ihn v. Nordmann gefunden und unter den Wanderern, welche auf Helgoland einkehren, wird er von Blasius ebenfalls mitgezählt; nach Dr. v. Müller kommt er schließlich auch in der Provence vor. Rostammer (Br.); blaugrauköpfiger Ammer (Krüper). Emberiza caesia, *Crtschm.*; E. rufibarba, *Hmpr.* et *Ehrnbg.*: E. hortulana, var., *Bls.*; E. rufigularis, *Br.*

Der gelbkehlige Ammer [Emberiza cinérea], welcher sowol in Asien als auch in Afrika heimisch ist, gehört zu den selbst in den Museen noch seltenen Vögeln. Er ist am Scheitel einfarbig gelbgrün, am übrigen Kopf mehr graugelb, fein dunkel schaftstreifig, Kopfseiten und Kehle hellgelb; Oberseite über den Rücken lichtgrau, braun schaftstreifig, Flügel braun mit zwei weißen Querbinden; Schwingen schwarzbraun, schmal fahlweiß gekantet, die hinteren breit fahlweiß gesäumt; Schwanzfedern dunkelbraun, die beiden äußersten mit weißem Keilfleck auf der Endhälfte; Bürzel grau; ganze Unterseite weißgrau, Brust- und Bauchmitte mehr weißlich. Im Herbst ist das Gefieder gelb überflogen, besonders stark auf der Unterseite. Das Weibchen ist am Kopf grünlich überflogen, Scheitel braun schaftstreifig; Kehle gelb; Unterseite weißgrau. Im Herbst ist das Gefieder grüngelb überflogen, besonders stark an der Unterseite. (Nach Professor Blasius). Größe des Gersten- oder Grauammers. In Afrika fand Heuglin nur ein einziges Exemplar. Auch G. E. Shelley hat diese Art auf seiner Reise in Unteregypten nur einmal gelegentlich angetroffen. „Am 7. April", erzählt Dr. Krüper in seinen Beiträgen zur Ornithologie Kleinasiens, „kletterte ich bei Burnova einen Berg hinauf, von dessen Höhe her die Töne dieser seltnen Ammerart erschallten. Dieselbe wurde zuerst von Strickland bei Smyrna aufgefunden und mit dem nur halbpassenden (oben angeführten) lateinischen Namen belegt. Späterhin schoß ich ein schönes Männchen und dann bald noch mehrere. Wie bei allen Ammern, kommen auch von diesen die Männchen zuerst, etwa zehn Tage vor den Weibchen an, und zwar die ersteren in überwiegender Anzahl. Beim alten Männchen erstreckt sich die gelbe Färbung von der Kehle über den ganzen Bauch." Das Nest hat der Reisende nicht gefunden, doch meint er, daß die Fortpflanzung und die Lebensweise mit der des rostbärtigen Ammers übereinstimmen. Sein Lockton ist ein kurzes küp und der Gesang besteht in den Strofen dir dir dir didt di, welche verschieden modulirt werden. Es unterliegt wol keinem Zweifel, daß er auch in Europa vorkommt; er soll in den letzten Jahren in Rußland gefunden sein, und es wäre nicht undenkbar, daß er auch in Griechenland alljährlich sich einfindet. Zedernammer (Br.). Emberiza cinerea, *Strckl.*; E. cinerácea, *Br.* — **Der Gimpelammer** [Emberiza pyrrhuloides] aus Nordafrika und dem südlichen Osteuropa ist dem Rohrammer überaus ähnlich und soll eigentlich nur durch einen auffallend starken, aufgetriebnen und gekrümmten Schnabel verschieden sein, weshalb er auch von manchen Vogelkundigen nur als klimatische Abart angesehen wird. Dr. Eversmann fand ihn am Ausfluß des Ural und der Wolga, an den mit Rohr bewachsenen Ufern des kaspischen Meeres, am Aralsee und am Sir Darja; Blasius zählt ihn unter den auf Helgoland vorkommenden Vögeln mit. Päßler fand ein Nest in Anhalt; doch weiß er nicht sicher anzugeben, ob es wirklich diese Art gewesen. In der Provence hat ihn v. Müller gesehen und ebenso soll im Museum zu Pisa ein in der Umgebung der Stadt erlegtes Exemplar vorhanden sein. Das Freileben dürfte, wie alles übrige, mit dem des

Rohrammers übereinstimmen. Gimpelammer (Br.); Sumpfrohrammer (Päßler). Emberiza pyrrhuloides, *Pll.*; E. palustris, *Sv.* [nec *Tmm.*]. E. caspia, *Ménétr.* — Außerdem werden noch einige andere Rohrammern aufgestellt, ein Sumpfammer [Emberiza palustris, *Tmm.*; nec *Sv.*] und ein graubürzeliger Ammer [E. intermedia, *Mchhlls.*], von denen es jedoch keineswegs feststeht, ob sie als selbständige Arten gelten dürfen. — **Pallas' Ammer** [Emberiza Pallasi], wiederum dem Rohrammer überaus ähnlich und nach Cabanis nur durch den Mangel aller rothbraunen Färbung, sowol an den kleineren Flügeldecken, als auch an den Rändern der Schwingen und den Federn des Rückens verschieden; der weiße Spitzenfleck an der zweiten Schwanzfeder erscheint nicht keilförmig, sondern kürzer und gerundeter. Taczanowski hält die Artbeständigkeit dieses Ammers entschieden aufrecht und berichtigt die obwaltenden Irrthümer inbetreff einer beträchtlichen Anzahl von Synonymen. Ueber die Lebensweise und Brut ist nichts näheres bekannt, doch wird alles sicherlich denen des europäischen Verwandten gleichen. Swinhoë fand ihn in China in Amoy am Yangtzefluß. Emberiza schoeniclus, var. β., *Pll.*; Cynchramus Pallasi, *Cb.*; Emberiza schoeniclus, var. minor, *Mddndrf.*, *Schrnck.*; E. polaris, *Mddndrf.*; E. Alleoni, *Vn.* — Der Sperlingsammer [Emberiza passerina, *Gml.*] ist als selbständige Art noch nicht entschieden festgestellt und könnte ebensowol eine solche als auch nur eine klimatische Abänderung des Rohrammers sein. Aus den Mittheilungen von Middendorf, Taczanowski u. A. ergibt es sich mit Sicherheit nicht. Er soll mehr braunröthlichfahl sein; Ohrfleck rostroth; Bürzel und Oberschwanzdecken fahlweißlich, braun schaftfleckig. — Hutton's Ammer [Emberiza Huttoni, *Blth.*] aus Indien und Persien, dem europäischen Gartenammer überaus ähnlich und nur in einzelnen Zeichnungen verschieden, braucht blos erwähnt zu werden. (Emberiza Buchanani, *Blth.*; E. Cerruti, *De Flpp.*). — Es dürfte wol kaum mit Sicherheit zu entscheiden sein, ob dieser, sowie die nächstfolgenden, nicht blos als klimatische Verschiedenheiten der europäischen Ammern, oder ob sie wirklich als feststehende Arten anzusehen sind; so namentlich ein persischer Ammer [Emberiza shah, *Bp.*], welchen Gray mit dem in der Synonymik des vorigen erwähnten De Filippi'schen Vogel als eine Art zusammenwirft und der als selbständige Art also Schahammer heißen müßte; ferner gehören hierher: Strachey's Ammer [Emberiza Stracheyi, *Mer.*], welcher dem Zipammer bis auf geringe Unterscheidungsmerkmale ähnlich und in Indien heimisch sein soll; der braunkäppige Ammer [Emberiza castaniceps, *Gld.*] aus China und ebenfalls dem Zipammer überaus nahestehend, ebenso wie auch Giglioli's Ammer [Emberiza Gigliolii, *Swnh.*] und der braunohrige Ammer [Emberiza cioides, *Brndt.*, nec *Tmm.* et *Schlg.*], beide aus Ostsibirien; der schwarzohrige Ammer [Emberiza ciopsis, *Bp.*] aus Japan, welcher sich von dem vorigen im wesentlichen nur durch schwarze Ohrenflecke unterscheiden soll, während jener braunrothe habe. (Emberiza cioides, *Tmm.* et *Schlg.*, nec *Brndt.*). — Der Ammer vom Libanon [Emberiza meridionalis, *Cb.*], wiederum dem Zipammer sehr ähnlich und nach Cabanis nur durch dunklere Zeichnung des Kopfes, breitere und kräftiger gefärbte Längsbinden über den Scheitel und an den Kopfseiten, sowie dadurch, daß die Färbung der grauen Kehle sich nicht bis zur Brust herab erstreckt, von ihm verschieden.

Der braunköpfige Ammer [Emberiza lutéola].

Bisher noch ziemlich selten, neuerdings aber von den Großhändlern, Fräulein Hagenbeck und Chs. Jamrach, meistens jedoch nur in einzelnen Männchen eingeführt, findet man ihn hier und da in den Vogelstuben, ohne daß er jedoch einer besondern Beliebtheit sich erfreuen kann. Er ist an Kopf und Kehle im spitzen Winkel bis zur Oberbrust lebhaft rothbraun; Nacken olivengrünlichgelb, Hals und Bürzel zitrongelb; ganze übrige Oberseite graubraun, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich und gelbem Außensaum; Flügel dunkelbraun mit fahlbrauner Querbinde und ebenso wie die dunkelbraunen Schwanzfedern fahl außengesäumt; unterhalb lebhaft zitrongelb; Auge braun; Schnabel gelb-

Dr. Bolle's Angabe um 3 bis 4 Gulden verkäuflich und Herr C. Bandiſch beſtätigt i. J. 1875, daß er garnicht ſelten zu erlangen ſei, während ein jüngerer Reiſender neuerdings behauptet hat, daß er ihn dort vergeblich geſucht. Bei uns wird er ziemlich regelmäßig alljährlich, wenn auch niemals in großer Anzahl, eingeführt und für Geſellſchaftskäfige iſt er als hübſcher Vogel recht beliebt. Als Sänger hat er freilich garkeine Bedeutung, denn er läßt nur ein nichts weniger als kunſtvolles Flöten hören, das er allerdings unermüdlich zum beſten gibt. Gezüchtet iſt er in der Gefangenſchaft noch nicht. Doch iſt dies eigentlich verwunderlich, da man ihn vielfach in den zoologiſchen Gärten ſieht. Der Preis iſt gering, zwiſchen 6 bis 12 Mark für das Pärchen.

Der ſchwarzköpfige Ammer wird im Handel allgemein Kappenammer genannt und heißt auch noch Ortolankönig und Prachtammer. — L'Ortolan à tête noire; Black-headed Bunting.

Nomenclatur: Emberiza melanocephala, *Scp.*; Tanagra melanictera, *Gldst.*; Xanthornis caucasicus, *Pll.*; Fringilla crócea et Passerina melanocephala, *Vll.*; Emberiza granatívora, *Ménétr.*, *Gld.*; Euspiza melanocephala, *Bp.*, *Cb.*, *Br.*; Euspiza simillima, *Blth.*, *Hrsf.* et *Mr.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſiehe oben.

Emberiza melanocéphala: supra subfusco-ferruginea; pileo genisque aterrimis; remigibus rectricibusque fuscis, exterius livide limbatis; fascia trans alam luride albida; subtus laete aurea; rostro plumbeo; iride fusca; pedibus umbrinis. — ♀ livide rubente cinerea; pileo atro carens; subtus sordide rubide alba.

Der ſchwarzkehlige Ammer mit gelber Bruſt [Emberiza americana].

Unter den unfreiwilligen Wanderern, welche nach weiter, beſchwerlicher Seereiſe in den Vogelhandlungen einkehren, ſieht man dieſen Ammer hin und wieder, faſt regelmäßig einzeln und dann gewöhnlich lange Zeit hindurch, da er nur ſelten das Wohlgefallen der Liebhaber findet, obgleich er ein ſtattlicher, keineswegs unſchöner Vogel iſt. Kopf nebſt Kopfſeiten und Hinterhals ſind bräunlichaſchgrau, auf dem Scheitel gelbgrünlich ſcheinend und fein ſchwärzlich ſchaftſtreifig, Augenbrauenſtreif gelb; Wangenſtreif ſchwach gelblichweiß, Wangen faſt reinweiß; ganze Oberſeite bräunlichgrau, Schultern und Oberrücken breit ſchwarz ſchaftfleckig, der übrige Rücken ungeſtreift; Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, fahl außengeſäumt, obere Flügeldecken rothbraun; Oberkehle weiß, ein länglich eiförmiger nach unten bis zur Oberbruſt ſpitz zulaufender Kehl- und Halsfleck reinſchwarz; Bruſt lebhaft gelb, Unterbruſt, Bauch, Hinterleib und untere Schwanzdecken reinweiß; Flügelrand an den Schultern gelb; Seiten bräunlichweiß, fein dunkel ſchaftſtreifig, untere Flügelſeite fahlweiß; Schnabel bräunlichgrau; Auge braun; Füße bräunlichgrau. Beim Weibchen ſind die Zeichnungen matter, Kopf und Hals düſter fahlbraun, Augenbrauen- und Bartſtreif gelblich, Kehlfleck nicht ſchwarz, ſondern gelb. Schnabel bräunlichhorngrau. Die Größe ſtimmt mit der unſres Goldammers überein. Die Heimat erſtreckt ſich über Nordamerika, vornämlich die ſüdlicheren Staten und Texas, wo er hier und da ziemlich zahlreich ſein ſoll, ſodaß es wunderlich erſcheint, weshalb er nicht öfter eingeführt wird. Baird ſagt, daß er in den Vereinigten Staten vom atlantiſchen Ozean bis zur Grenze der hohen Zentralebene zu finden ſei. Prinz v. Wied beobachtete ihn in den Prärien

am Mississippi gegenüber von St. Louis. „Er erscheint sehr ruhig und sitzt wol stundenlang unbeweglich auf einem Baume oder Strauch.“ Nach Angabe des erstern Gelehrten soll er auch auf dem Isthmus von Panama und Daurien vorkommen, auf Kuba jedoch nicht; auf Kostarika dagegen hat ihn Dr. v. Frantzius gesammelt. Ueber das Freileben haben alle amerikanischen Forscher berichtet. Im wesentlichen gleicht dasselbe dem aller übrigen Ammer, welche zur kalten Jahreszeit die Heimat verlassen; er kommt in dem größten Theile Nordamerikas im ersten Drittel bis zur Hälfte des Monats Mai an und streicht vom September bis zum Oktober hin wieder ab und zwar nach Mittel- und selbst bis Südamerika.

Die ausführlichsten Nachrichten gibt uns, wie über viele andere nordamerikanische Vögel, so auch über diesen Ammer, Gentry in seinem hier bereits mehrfach genannten Werkchen: „In Ostpennsylvanien ist er ziemlich häufig und hält sich namentlich auf Wiesen und wüstliegenden Feldern auf. Immer nur parweise, niemals in Scharen beisammen, zeigt er sich außerordentlich zutraulich, sodaß man sich ihm dreist nähern kann; aufgescheucht kehrt er nach wenigen Minuten zu derselben Stelle zurück. Nur vor dem Abzuge sammelt er sich zu großen Schwärmen an, in denen jedoch andere Vogelarten die größte Anzahl bilden. Der Flug ist niedrig, wellenförmig und leicht getragen. In dem unbedeutenden Gesange muß der Eifer die Kunst ersetzen; zwei Monate nach der Ankunft erschallt derselbe an seinen Lieblingsaufenthaltsorten vom Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang unermüdlich uns entgegen. Nach Wilson erklingt derselbe etwa wie: tschip-tschip-tschi-tschi-tschi [chip-chip-chē-chē-chē] und im übrigen ist er dem des Goldammers ähnlich; Audubon vergleicht ihn mit dem des Grauammers. Die Nahrung besteht in allerlei Sämereien, Beren und Insekten, welche er am Boden sucht, während er sich sonst vorzugsweise im Gebüsch und auf niedrigen Bäumen aufhält. Etwa im letzten Drittel des Monats Mai oder zu Anfang des Monats Juni, gewöhnlich fünf Tage nach der Parung, beginnt die Brut. Das Nest steht nach den Beobachtungen von Ridgway, Baird und mir fast immer auf der Erde und nur sehr selten ist es im Gebüsch, doch nur niedrig oberhalb des Bodens, erbaut; aus verschiedenen Gräsern und Pflanzenstengeln geschichtet, ist es mit feinen Stoffen ausgepolstert. Beide Gatten des Pärchens errichten es gemeinsam. Das Gelege besteht in vier bis fünf einfarbig lichtblauen Eiern, von denen täglich eins gelegt wird. Das Weibchen brütet allein; Brutdauer 12 Tage. Bei einer Störung schlüpft dieses geräuschlos vom Nest, läßt dasselbe berauben, ohne jene listigen Verstellungskünste, welche andere Ammern zeigen, zu üben und ohne eine Klage hören zu lassen. Die Jungen werden mit Raupen, Blattläusen und allerlei anderen weichen Kerbthieren gefüttert. Nach 13 Tagen verlassen sie das Nest und werden dann noch neun oder zehn Tage hindurch von den Alten versorgt. Es dürfte nur eine Brut im Jahre

erfolgen.“ Nehrling ergänzt diese Mittheilungen in folgendem: „In Illinois ist er ein echter Prärievogel, denn man sieht dort einzelne Pärchen regelmäßig, wennschon nicht häufig. Auch in Wiskonsin ist er nur selten; in manchen anderen Gegenden scheint er jedoch zahlreich vorzukommen. Sein Lieblingsaufenthalt sind trockene, mit Klee und hohen Gräsern bewachsene Wiesen und Satfelder, doch meidet er die ersteren, wenn sie naß sind und Niederungen überhaupt. An gewisse Oertlichkeiten scheint er nicht gebunden zu sein. Während man ihn in Illinois in Gebüschen und an Waldsäumen nicht sieht, bevorzugt er solche in Wiskonsin. Auch das Nest wird wechselnd an verschiedenen Orten angelegt; ich fand ein solches auf einer ganz freien Stelle im Walde, wo der Boden keinerlei Pflanzenwuchs zeigte, dann eins in einem Erbsenfelde und noch ein andres im Obstgarten in einem dichten Grasbüschel. Nach meiner Beobachtung stellt sich das Weibchen, wenn man dem Neste naht, wol flügellahm, doch huscht es davon ins Dickicht und läßt sich nicht mehr blicken. Auch zur Zugzeit habe ich diesen Ammer niemals in großen Scharen, sondern stets nur in kleinen Flügen gesehen. Seine Hauptnahrung besteht im Sommer in Kerbthieren; Schaden an Sämereien oder dergleichen verursacht er niemals. Der Gesang, welcher von einem Baum, Strauch oder Pfosten herab erschallt, ist kurz, leise und einfach und wird in seiner Einförmigkeit unermüdlich bis zum Ueberdruß vorgetragen. Im Käfige erscheint er als ein recht hübscher und muntrer, ausdauernder und leicht zu erhaltender Vogel.“ Mit diesen Darstellungen stimmen die Mittheilungen der Naturforscher Audubon, Wilson, Nuttall u. A. überein; während aber meine beiden Gewährsmänner nach eigener Anschauung und gleichlautend angeben, daß das Ei einfarbig blau sei, behauptet Brehm, freilich ohne Angabe einer Quelle, daß es schmutzigweiß mit umberbraunen Flecken gezeichnet sei. Alle Genannten sagen, daß der Gesang durchaus einfach und eintönig sei und dies bestätigen auch die Angaben aus den Vogelstuben; immerhin kommt es jedoch auf die Auffassung und die durch die Oertlichkeit u. a. Einflüsse hervorgerufene Stimmung an; so sagt L. Straubenmüller von seinem ‚Schwarzhals‘, natürlich nur nach Beobachtung im Freien, daß er mit seinem Gesange jeden Zuhörer erfreue. In den Handel gelangt er durch Herrn K. Reiche in Alfeld oder Fräulein Hagenbeck in Hamburg, und im zoologischen Garten von London ist er seit dem Jahre 1873 vorhanden, während er auch im Berliner zoologischen Garten und Aquarium, im letztern gleich nach der Eröffnung, mehrmals erschien. Der Preis pflegt etwa 12 bis 15 Mark für das Männchen zu sein; das Weibchen kommt kaum mit und deshalb ist er bis jetzt auch noch nicht gezüchtet.

Der schwarzkehlige Ammer mit gelber Brust heißt auch Schildammer und Schwarzbrüstchen (Br.); schwarzbrüstiger Ammer (Ruß’ „Handbuch“); Schwarzhals (Straubenmüller).

L’Ortolan à gorge noire; Black-throated or American Bunting.

Nomenclatur: Emberiza americana, *Gml.*, *Wls.*, *Audb.*; Fringilla flavicollis, *Gml.*; Passerina nigricolis, *Vll.*; Fringilla americana, *Bp.*; Euspiza americana, *Bp.*, *Brd.*, *Br.*; Euspina americana, *Cb.*; Emberiza mexicana, *Lth.* [Yellow-throated Finch, *Penn.*].

Emberiza americana: capite, ejus lateribus cerviceque fumigato-cinereis; vertice flavo-virente imbuto et subnigro-striato; stria superciliari flava, altera genarum flavido-alba; genis albidis; notaeo toto fumido; humeris dorsoque late nigro-vittatis, tergo immaculato; remigibus rectricibusque fuscis, exterius livide limbatis; tectricibus al. minoribus rufis; macula oblongo-ovata a gula alba usque ad guttur in apicem desinente atra; pectore flavissimo; crisso et infracaudalibus albis; campterio humerali flavo, hypochondriis fuscato-albis, obscure striolatis; subalaribus sordide albis; rostro fumide cano; iride fusca; pedibus fumigatis. — ♀ lividius notata; capite colloque luride umbrinis; stria superciliari et mystacali flavida; macula gulari flava (haud nigra); rostro fuscato-corneo.

Townsend's Ammer [Emberiza Townsendi, *Audb.*] aus Pennsylvanien, der vorigen Art so ähnlich, daß die Ornithologen ihn bisher fast alle nur als eine Spielart desselben angesehen haben. Auch Baird sagt, er wage nicht die Streitfrage zu entscheiden. Gentry hat ihn in Ostpennsylvanien niemals gesehen. Für die Liebhaberei hat es ja garkeine Bedeutung, ob ein solcher Ammer in zwei verschiedenen Arten oder auch nur außer der feststehenden Art noch in einer besondern Lokalrasse vorkommt; daher lasse ich es bei dieser Erwähnung bewenden. — **Der zweifarbige Ammer** [Emberiza bicolor, *Townsd.*] ist schwarz mit großem weißen Bande über die Flügel, Schwingen dunkelbraun, Schwanzfedern schwarz, die äußersten weiß gesäumt und die nächsten mit weißem Endfleck; Schnabel schwarz; Auge braun; Füße horngrau. Das Weibchen ist oberhalb blaßbraun, dunkler gestreift, eine breite bräunlichweiße Querbinde über die Flügel; ganze Unterseite weiß, fein schwarzbraun schaftstreifig. Die Größe ist wenig geringer als die des schwarzkehligen Ammers mit gelber Brust. Seine Heimat erstreckt sich nach Baird im Westen Nordamerikas über die Hochebene des Felsengebirges bis Mexiko. Im Freileben gleicht er den Verwandten, doch schwärmt er zu Zeiten in großen Scharen umher. Ruttall rühmt seinen Gesang und hält ihn dem der europäischen Feldlerche ähnlich. Das Nest steht auf dem Boden zwischen Gräsern und enthält gewöhnlich vier blaue nur spärlich roth gezeichnete Eier. Zweifarbenammer (Br.); Lerchenammer bei den Amerikanern. Lark Bunting or White-winged Bunting (*Brd.*).

Der Schopfammer [Emberiza melanictera].

Nach meinem Geschmack dürfte er der schönste und zugleich anmuthigste unter allen hierher gehörenden Vögeln sein. Er ist an Kopf, Hals und Flügeln glänzendschwarz, metallisch blauschillernd; Schwingen und Schwanzfedern schön kastanienrothbraun; der übrige Körper wiederum reinschwarz. Den Kopf schmückt ein zierlicher, spitzer Federschopf. Der Schnabel ist röthlichbraun; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichroth. Das Weibchen ist dunkelbraun, jede Feder heller gesäumt; Flügel und Schwanz fahler braun; unterseits rothbraun, jede Feder mit schwärzlichem Schaftstrich. Der Schopf ist kürzer und kleiner. Die Größe ist etwa der des Haussperlings gleich, doch erscheint er schlanker und zierlicher. Seine Heimat erstreckt sich über Mittel- und Südindien, besonders China. Ueber das Freileben ist nur äußerst wenig bekannt, doch dürfte er in demselben von anderen Ammern sich nicht besonders unterscheiden. Jerdon hat ihn in hügeligen Gebieten, auf Felsgehängen im spärlichen Gebüsch, doch auch in der Nähe von Feldern gefunden, in Indien aber nicht nistend. Der Gesang sei ein angenehmes Gezwitscher. Swinhoë sah ihn in China im Winter sehr zahlreich, nistend jedoch nur selten.

In seinen Aufzeichnungen über einige Vögel Burmesiens sagt Wardlaw Ramsay: „Ich beobachtete ihn sehr häufig in den Karen-Bergen bis zu einer Höhe von etwa 1000 Metern im März d. J. 1874. Er ist der beiweitem gemeinste Ammer in dem Karen-nee-Lande, wo die felsigen, mit Strauchwerk bedeckten Bergabhänge ihm zu behagen scheinen. Besonders liebt er die Nähe der Wasserläufe in offenen Gegenden, deren Ufer mit Gebüsch bedeckt sind. Sein Gesang, welchen er im Fluge schmettert, ist ein melodisches Flöten, ganz unähnlich dem irgend eines andern Ammers.“ Er gehört zu den im Himalaya und in Thibet von Dr. Stoliczka gesammelten Vögeln und ebenso zu denen, welche die amerikanische Expedition unter Perry aus China mitgebracht hatte. Im Jahre 1876 schickte mir Herr Gaetano Alpi aus Triest ein Männchen und dies dürfte sicherlich die erste Einführung dieser Art bei uns gewesen sein, während freilich nach dem zoologischen Garten von London schon im Jahre 1873 ein Pärchen gelangt war. Nachdem ich mich vergeblich bemüht hatte, ein Weibchen zu erlangen, überließ ich das erwähnte Männchen Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal, dessen großartige Sammlung eine beträchtliche Anzahl seltener und interessanter Vogelarten auch in einzelnen Köpfen beherbergt. Der Genannte berichtete über den Vogel dann späterhin in folgendem: „Als der Ammer bei mir eintraf, brachte ich ihn in einen sehr geräumigen Käfig, welcher nur noch von einem Pärchen Sonnenvögel bewohnt wurde. Diese letzteren liebenswürdigen Vögel schienen über den neuen Mitbewohner zwar sehr erstaunt zu sein, enthielten sich aber jeder Feindseligkeit und der schüchterne Ammer dachte nicht daran, seinerseits eine solche zu eröffnen. Die Sonnenvögel erhalten das gewöhnliche Weichfutter, dazu etwas Mohnsamen und hin und wieder einige Mehlwürmer. Daneben reichte ich ihnen eine Mischung von Reismehl und gestoßenem Eierbrot in etwas angefeuchtetem Zustande. Letztres Futter ziehe ich dem eingeweichten Weißbrot vor und gebe es neben dem Körnerfutter allen meinen kleinen Sperlingsvögeln. Des Ammers wegen setzte ich diesen verschiedenen Futtermitteln nun noch mehrere Hirsearten, sowie etwas Reis und Kanariensamen zu; er verschmähte aber die letzteren Sämereien und hielt sich fast ausschließlich an die weiße Hirse und das Weichfutter; mit großer Gier fraß er auch die ihm gereichten Mehlwürmer. Der etwas kränkliche Vogel erholte sich ziemlich schnell und auch die Mauser ging rasch und glücklich vonstatten, sodaß er bald in seiner ganzen, höchst eigenthümlichen Schönheit prangte. Der zierliche Federschopf wird angelegt, wenn der Vogel ruht oder frißt, aufgerichtet aber sobald er in Bewegung kommt. Durch seine seltsame Färbung muß er auch dem Nichtkenner sogleich als ein schöner Vogel auffallen. Mit seinen Käfiggenossen lebt er im tiefsten Frieden. Gewöhnlich sitzt er hoch oben im Bauer auf einem Zweige, während die Sonnenvögel ihre lustigen Flugkünste üben. Fliegt er aber von seinem hohen Sitze herab, so

geſchieht es leicht und gewandt; anmuthig bewegt er ſich dann mit aufgerichteter Haube am Boden umher, hier und da ein Sandkörnchen aufpickend, bis er auf den Rand des Futternapfs ſich ſetzt, um Hirſe zu freſſen. Einen andern Laut, als den ziemlich leiſen, aber ſcharf klingenden Lockruf habe ich von ihm noch nicht gehört. Es wäre wol zu wünſchen, daß dieſer wirklich prächtige Vogel demnächſt mehrfach eingeführt würde." Ein Preis läßt ſich erklärlicherweiſe nicht angeben.

Der Schopfammer iſt auch Haubenammer (Br.) oder indiſcher Haubenammer (Schlechtendal) benannt.

L'Ortolan à crête noire; Black-crested Bunting.

Nomenclatur: Fringilla melanictera, *Gml.*; Mélophus melanicterus, *Bp.*, *Hrsf.* et *Mr.*, *Br.*; Emberiza cristata, *Vgrs.*, *Sks.*, *Blth.*; E. Lathami, *Gr.*, *Hdgs.*, *Blth.*; Euspiza Lathami, *Gr.*, *Blth.*; Emberiza erythroptera, *Jard.* et *Slb.*; Mélophus erythropterus, *Swns.*; Emberiza subcristata, *Sks.*; E. nipalensis, *Hdgs.* [Goura Finch, *Lath.*; Goura Bunting, *J. E. Gr.*; Crested Black Bunting, *Jerd.*; Putthur Chira in Hindoſtan, *Hamilt.*].

Emberiza melanictera: capite, collo alisque atris, metallice coeruleo-micantibus; remigibus rectricibusque laete rufo-castaneis; corpore reliquo atro; crista capitis eleganter acuminata; rostro badio; iride fusca; pedibus rufis. ♀ fusca, pluma quaque dilutius limbata; alis caudaque livide umbrinis; subtus badia, subnigro-vittata; crista breviore minoreque.

Der Schneeammer [Emberiza nivalis]. Mit dieſem Wintergaſt aus dem hohen Norden beginnt die kleine Gruppe der Sporenammer oder Sporner (Plectróphanes, *Meyer*), deren Hinterzehe lerchenartig verlängert iſt, während ſie im übrigen jedoch wenig von den anderen Ammern verſchieden ſind. Der Schneeammer iſt an der Kopfmitte ſchwarzbraun, mit röthlichbrauner Einfaſſung, Augenbrauenſtreif röthlichgraubraun, Wangen dunkelgraubraun, Nacken röthlichgelbgrau; Rücken und Schultern ſchwarz, jede Feder rothbraun geſäumt, Flügelfedern ſchwarz, breit roſtbraun gerandet, über den Flügel zwei weiße Querbinden; Schwanzfedern ſchwarzbraun, röthlichbraun geſäumt, doch mit ſchwarzem Ende; Kehle düſter gelblichweißgrau; Oberbruſt mit großer roſtrothbrauner Binde; ganze Unterſeite fahl weißlichrothgelb; Schnabel düſter wachsgelb; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichſchwarz. Dieſe Färbung iſt nach dem Alter und den Jahreszeiten recht veränderlich. Das Weibchen iſt wenig matter und am Oberkopf mehr grau. Im Winter iſt beim Männchen Kopf, Hals und die ganze Unterſeite nebſt dem größten Theile der Flügel reinweiß; Mantel, Schultern, Flügelbug, kleine Schwingen und die mittleren Steuerfedern tiefſchwarz; Schnabel und Füße ſchwarz. Das Weibchen iſt weniger rein in den beiden Farben, mit Braun und Grau gemiſcht. Größe des Goldammers. Die Verbreitung erſtreckt ſich über den hohen Norden von Europa, Aſien und Amerika und in kalten Wintern wandert er bis zum ſüdlichen Europa zum Norden Chinas und den mittleren Staten von Nordamerika. Er kommt nach Deutſchland im Dezember und geht zum März zurück. Sein Aufenthalt ſoll vorzugsweiſe niederes Geſtrüpp in Gebirgsgegenden ſein, in rauhen, baumloſen Einöden, nicht aber in zuſammenhängenden Waldungen; er ſetzt ſich nicht auf Baum und Strauch, ſondern nur auf Stein und Fels. Auch das Neſt ſteht in Felsſpalten, unter Steinen und Geſtrüpp und iſt aus Grashalmen, Mos und Flechten geſchichtet und mit Federn und Haren gepolſtert. Vier bis fünf bläulichweiße, röthlichgrau und rothbraun gefleckte, gepunktete und geſtrichelte Eier bilden das Gelege. In der Entwicklung der Brut, ſowie in der ganzen Lebensweiſe gleicht er nebſt den folgenden allen anderen Ammern; doch nähern ſie ſich darin auch bereits bemerkbar den Lerchen. Seine Nahrung beſteht im Sommer vorzugsweiſe in Kerbthieren, vornämlich den zahlloſen Mücken der erwähnten Gegenden und deren Bruten, ſpäterhin in allerlei Sämereien. Wenn die harte Noth eines rauhen Winters ihn aus ſeinen nordiſchen Heimatsgegenden vertreibt und

er auch auf unſeren ſchneebedeckten Feldern vergeblich nach Körnern umherſucht, ſo kommt er nicht ſelten vor die Ställe und Scheunen. Der Lockton klingt hellflötend zöt und klirrend zirr; der Geſang iſt nur ein unbedeutendes Zwitſchern, doch lautönend und nicht unangenehm; er läßt ihn das ganze Jahr hindurch erſchallen, ſelbſt im Winter, wenn nur die Sonne ein wenig ſcheint. Man fängt ihn in Schlingen, Leimruten und Schlaggarn neben den Landſtraßen, angelockt durch Pferdedung und mit Mehlwürmern geködert, in ſeiner Harmloſigkeit noch leichter als den Goldammer. Obwol anfangs ſehr unbändig, geht ſeine Eingewöhnung doch überaus leicht vonſtatten. Neben allerlei Sämereien, namentlich Hafer muß man ihn auch mit etwas Ameiſenpuppengemiſch verſorgen. Still, ruhig und verträglich, dauert er wol mehrere Jahre hindurch im Käfige aus, doch kann er Hitze nicht gut vertragen und muß im Sommer oft mit Badewaſſer verſorgt werden. — Da dieſe Anleitungen zur Pflege für alle nordiſchen Ammern Geltung haben, ſo durfte ich dieſen etwas ausführlicher behandeln, während man ihn eigentlich als europäiſchen oder doch in Europa ſehr häufigen Vogel betrachten muß, weshalb ich ihn auch im „Handbuch für Vogelliebhaber" II geſchildert und hier nur beiläufig eingefügt habe. — Berg-, Eis- und Spornammer, Schneeammerling, Schneefink, Schneelerche, Schneeortolan, Schnee- und Winterſperling, Neu-, Schnee- und Strietvogel, Winterling, Schneeſporner, Schneeſpornammer. — Emberiza nivális, *L.*; E. mustelina et E. montana, *Gml.*; E. glacialis, *Lth.*

Der Spornammer [Emberiza lapponica]; dem vorigen ähnlich, ſowol im Anſehen, als auch im Weſen, unterſcheidet er ſich trotzdem bedeutſam. Er iſt an Kopf und Kehle ſchwarz, unterſeits halbkreisförmig bis zur Bruſt; Augenbrauen- und Schläfenſtreif bräunlichweiß; über den Hinterhals ein breites kaſtanienbraunes Band; ganze übrige Oberſeite dunkelgelblichbraun, ſchwärzlich ſchaftſtreifig; Schwingen bräunlichſchwarz, fahl außengeſäumt, eine weißliche Querbinde über den Flügel; Schwanzfedern ſchwarz, an der Innenfahne mehr oder weniger weiß; Unterkörper weiß, an den Seiten ſchwarz ſchaftſtreifig; Schnabel gelb mit ſchwärzlicher Spitze und ſchwarzblauer Firſt; Füße ſchwarz. Weibchen oberhalb fahl bräunlichroth, dunkel ſchaftſtreifig, Schläfenſtreif röthlichgelb, Bartſtreif ſchwach ſchwärzlich, Wangen bräunlich, fein geſtreift; Nacken matt gelblichroth; Unterſeite fahl gelblichroth, mattbräunlich ſchaftfleckig; Schnabel dunkelbraun; Auge und Füße übereinſtimmend. Bemerkbar kleiner als der Schneeammer, etwa von Sperlingsgröße. Die Heimat ſtimmt mit der des genannten Verwandten überein. „In Nordamerika", ſagt Baird, „kommt er winters in die nördlichen Theile der Vereinigten Staten, aber nicht weit weſtlich über den Miſſouri hinaus. Im vollen prächtig ausgefärbten Gefieder erſcheint er hier ſelten." Schrader fand ihn in Lappland an feuchten Stellen in den Thälern überall (wodurch er ſich alſo, wie auch andere Forſcher hervorheben, von dem Verwandten unterſcheidet), auch als Brutvogel. Sein Geſang ſei ſehr angenehm und habe flötende, denen des Hänflings nicht unähnliche Töne. Ebenſo iſt er von den hier ſchon vielfach genannten Reiſenden in Sibirien u. a. Theilen Rußlands gefunden worden. Nach Przewalski kommt er in Mongolien und im nördlichen China allenthalben vor und auch auf Helgoland iſt er von Gätke beobachtet. Ebenſo führen ihn Vangerow u. A. unter den Vögeln der Mark Brandenburg auf; doch erſcheint er in Deutſchland ſeltener als der vorige. In dem Urtheil über den Geſang ſtimmen die Beobachter überein, indem ſie denſelben als kurz und einfach, doch angenehm bezeichnen; er läßt ihn nur im Fluge in der Weiſe der Lerchen erſchallen. Alles übrige iſt wie beim Schneeammer angegeben. — Berg-, Lerchen-, Sporenammer- und Sporenfink, Lappländer, Lerchenſporner, Lerchenſpornammer und Schneeſporner. — Lapland Longspur (*Brd.*). — Fringilla lapponica, *L.*; F. calcarata, *Pll.*

Der gemalte Ammer [Emberiza picta] iſt in den nördlichſten Theilen der Vereinigten Staten von Nordamerika heimiſch und wandert zum Winter bis in die mittleren hinab. Er iſt an Oberkopf nebſt Haube ſchwarz, Augenbrauenſtreif und kleiner Fleck im Nacken weiß, Ohrfleck ſchwarz; ganze Oberſeite ſchwarzbraun, jede Feder fahl geſäumt; Schwingen dunkelbraun, fahl geſäumt, auf dem Flügel ein großer weißer Fleck und eine fahle ſchmale Querbinde; Schwanzfedern ſchwarzbraun, fahl geſäumt, die beiden äußerſten faſt ganz weiß; Kehle gelb-

röthlichbraun, ganze übrige Unterseite etwas heller bräunlichgelbroth; Schnabel braun, Unterschnabel heller röthlichbraun; Auge braun; Füße fleischfarben. Das Weibchen ist unbeschrieben. Größe des Goldammers. Nach Baird ist seine eigentliche Heimat der Norden von Saskatschevan, und im Winter erscheint er sehr häufig in den Prärien von Illinois. Ueber sein Freileben ist nichts bekannt; es wird von dem der Verwandten jedoch wol nicht abweichen. Er gelangt mit anderen nordamerikanischen Vögeln, freilich nur einzeln und höchst selten in den Handel und, obwol er ein recht hübscher Vogel ist, so verdient er seinen prahlerischen Namen doch wol nicht. Ich sah ihn zuerst im zoologischen Garten von Hamburg im Jahre 1870 und dann drei Jahre später auch ein Männchen im zoologischen Garten von Berlin; im zoologischen Garten von London ist er jedoch noch nicht vorhanden gewesen. Schmuckammer (Br.); Bildammer (Ruß' „Handbuch"). Smith' Bunting (*Brd.*). Plectrophanes pictus, *Swns.*; P. Smithi, *Audb.* — **Der Schmuckammer** [Emberiza ornata], von Nordamerika; Oberkopf, ein kleiner Halbmondfleck an den Kopfseiten und ein Streif vom Auge bis zu jenem schwarz; Kehle und Kopfseiten weiß; Hinterhals mit kastanienbraunem Bande; übrige Oberseite fahlgraubraun, dunkler gestreift; Brust und Oberbauch schwarz; ganze übrige Unterseite weiß; Schnabel bleigrau; Auge braun; Füße grau. (Weibchen unbeschrieben). Sperlingsgröße. Heimat die Ebenen des obern Missouri. (Nach Baird). Näheres ist nicht bekannt. Chestnut-collared Bunting (*Brd.*). Plectrophanes ornatus, *Townsnd.* — **Der schwarzschultrige Ammer** [Emberiza melanóma, *Brd.*], dem vorigen sehr ähnlich, nur wenig größer; das Kastanienbraun auf dem Hinterhalse ist düsterer; die Brustfedern sind röthlich gerandet; Flügel mit weißen Querbinden; das hauptsächlichste Unterscheidungszeichen besteht jedoch darin, daß die Schulterfedern nicht braun, sondern schwarz und fahl gerandet sind; Schnabel gelblich mit dunkelgelber First. Die Heimat sind die Abhänge des Felsengebirges, von wo er zum Winter südwärts bis nach Mexiko wandert. Lazammer (Br.). — **Maccown's Ammer** [Emberiza Maccowni, *Lwrnz.*] aus Nordamerika; Oberkopf, Kinnbackenstreif, Kehle und ein scharf abgegrenzter halbmondförmiger Fleck auf der Oberbrust schwarz; Augenbrauenstreif weiß; Oberseite gelblichbraun, dunkel schaftstreifig; Schultern kastanienbraun; unterhalb reinweiß. Größe des Goldammers. Er zeichnet sich vor allen Verwandten durch einen auffallend großen und starken Schnabel aus. Sein Aufenthalt sind die östlichen Abhänge des Felsengebirges, vom Fort Thorn in Neu-Mexiko bis zu den schwarzen Bergen. Näheres ist auch über ihn nicht angegeben.

Die Lerchen [Alaudinae].

Im Freileben sind sie allbeliebte und geschätzte Vögel, welche uns vom Beginn der milden bis zur rauhen Jahreszeit durch herrlichen, meistens im Fluge erschallenden Gesang und durch ihre Anmuth erfreuen. Kräftig und etwas großköpfig haben sie einen schmalen und dünnen, kurzen oder mittellangen, fast walzenrunden, nur bei wenigen Arten von dieser Gestalt bedeutend abweichenden, dicken oder sogar gekrümmten Schnabel. Die Flügel sind lang und breit, der Schwanz ist kurz, gewöhnlich gerade abgeschnitten; die Füße mittelhoch mit langem geraden Spornnagel am Hinterzeh. Vermöge dieses Lauffußes können sie nur ausnahmsweise auf Baumästen sitzen. Auf dem Boden aber hüpfen sie nicht wie die Sperlinge u. a., sondern rennen flink und geschickt. Das Gefieder ist dicht und voll, in der Regel schlicht gefärbt (lerchengrau) und erst bei genauer Betrachtung angenehm erscheinend; beim Männchen und Weibchen übereinstimmend. Es sind meistens Zug- oder Strichvögel, welche sehr früh im Jahre ankommen und erst spät wieder fortwandern. Zum Aufenthalt wählen sie freie baumlose Gegenden, besonders fruchtbare Felder; nur wenige Arten wohnen am oder im Walde, doch stets auf freien Stellen, manche dagegen in den baum- und selbst pflanzenlosen Wüsten. Sie sind lebhaft und beweglich im Fluge, erheben sich singend, manche sogar sehr hoch in die Luft. Gegen die Nistzeit hin gerathen die Männchen in heftige Fehde. Das Nest steht immer nur am Boden, ist aus dürren Halmen und Gräsern zu einer offnen Mulde geformt und enthält ein Gelege von vier bis sechs farbigen, gefleckten und gepunkteten Eiern. In jedem Jahre werden zwei Bruten gemacht. Die Nahrung bilden allerlei Gräser und andere kleine Sämereien, ferner zarte grüne Pflanzenstoffe, sowie auch Kerbthiere in allen deren Verwandlungszuständen. Im Herbst sammeln sie sich, manchmal auch mit Ammern und verschiedenen Finken zusammen, zu großen Schwärmen an, welche anfangs umherstreichen und dann südwärts wandern; nur wenige Arten bleiben zum Winter als Standvögel in der Heimat. Ihre Verbreitung erstreckt sich über alle Welttheile, beschränkt sich jedoch vorzugsweise auf den Norden, wo sie in überaus zahlreichen Arten vorkommen.

Fast alle oder doch die meisten dürfen als hervorragende Sänger gelten, verhältnißmäßig wenige aber sind allbeliebte Stubenvögel. Zunächst lassen sich die meisten in der Gefangenschaft schwierig erhalten, da sie bis zur vollen Ein-

gewöhnung sich überaus weichlich und schädlichen Einflüssen zugänglich zeigen, bei Vermeidung solcher aber und sobald sie vollständig eingewöhnt sind, können sie doch als recht ausdauernd bezeichnet werden. In der Vogelstube erscheinen sie insofern fast immer als unangenehme Gäste, als sie ganz auffallend an Ungeziefer leiden und mit der Milbenbrut leicht die gesammte Bewohnerschaft übersäen; daher findet man sie hier überaus wenig; vielmehr werden sie nur einzeln in Käfigen beherbergt. Das Bauer, in welchem eine Lerche eingewöhnt wird, muß anstatt der Holz- oder Drahtdecke eine solche aus Leinewand haben, weil der wildstürmische Vogel bei jedem Erschrecken und selbst späterhin während des Singens immer plötzlich emporhüpft und sich nur zu leicht den Kopf zerstößt. Züchtungserfolge hat man bis jetzt noch mit keiner Lerche erreicht und eigentlich sind mit ihnen noch garkeine derartigen Versuche angestellt worden. Die Ernährung besteht in Mohn- und mancherlei anderen öligen und mehligen Sämereien und Zugabe von Nachtigalfutter, irgendwelchem Ameisenpuppengemisch nebst Mehlwürmern oder auch anderen weichen Kerbthieren. Der Preis ist im allgemeinen schwierig anzugeben, da die Lerchen mit wenigen Ausnahmen nicht als ständige, sondern nur als zufällige Gäste im Vogelhandel zu betrachten sind.

Die Kalanderlerche [Alauda calandra].

Bereits Oppian, der im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebte, schildert diesen Vogel und gibt an, wie man ihn fange; und seit jener Zeit her kennen, beschreiben oder erwähnen ihn wenigstens fast alle übrigen ornithologischen Schriftsteller bis zu unsrer Gegenwart herab. Seit altersher ist er auch beliebt und geschätzt und in Paris hat man sogar eine Straße nach seinem Namen benannt.

Die Kalanderlerche ist oberhalb röthlichgraubraun, jede Feder fahl außengesäumt und schwärzlich schaftfleckig; Zügel und schwacher Augenbrauenstreif fahl röthlichgelb, Wangen und schwacher Bartstreif bräunlichgrau, an jeder Halsseite ein großer schwarzer oder schwarzbrauner Fleck; Schwingen schwärzlichbraun, fahl außengesäumt, über den Flügel eine schmale weiße Querbinde; Schwanzfedern bräunlichschwarz, fahl außengesäumt; Kehle in der Mitte weiß, an den Seiten, sowie die Brust fahl röthlichgelb überhaucht, letztre bräunlichschwarz schaftfleckig; ganze übrige Unterseite weiß. Schnabel gelblich- bis bräunlichfleischroth; Auge dunkelbraun; Füße düster fleischroth. Das Weibchen soll nur an dem kleinern und mehr bräunlichschwarzen Halsfleck und kaum bemerkbar geringerer Größe zu erkennen sein. Die letztre ist überhaupt noch etwas beträchtlicher als die der Haubenlerche. Ihre Heimat erstreckt sich über das ganze nördliche Afrika, das wärmere Asien und Südeuropa. Als Wandervogel geht sie tief bis ins innere Afrika und Südasien hinab. Sie lebt auf Getreidefeldern und Wiesen, großen Haiden und Steppen und gleicht in ihren Gewohnheiten der schon erwähnten mehr als jeder andern verwandten Lerche, namentlich auch darin, daß sie an den Wegen und auf den Triften nahrungsuchend umherläuft und daß sie nicht gleich der Feldlerche sich singend emporschwingt, sondern auf der Erde oder von irgend einem erhöhten Punkte aus ihren Gesang erschallen läßt.

Trotzdem sie also bereits aus dem Alterthum bekannt ist, so sind über ihr Freileben im allgemeinen doch außerordentlich wenige Angaben vorhanden. Eben nur so viel, daß dasselbe dem aller Lerchen gleiche. Das an der Erde aus Gräserhalmen gebaute, innen mit Grasblättern, Würzelchen und Haren gerundete Nest steht im hohen Grase oder im Kornfelde versteckt, niemals aber im Gebüsch; es enthält 5 bis 6 Eier. In ihren meisten Heimatsstrichen soll sie alljährlich zwei Bruten machen.

Der Naturforscher Radde sagt, daß sie in Südrußland sehr früh ankomme und zu Ende d. M. April zu nisten beginne, gegen Ende des Mai seien die Jungen flügge. „Sie ist ziemlich scheu, fliegt immer nur im kleinen Bogen, legt niemals eine weite Strecke auf einmal zurück und überwintert hier auch." Nach Mittheilung des Pastor Paeßler belebt sie die Steppen Tauriens zur Frühlingszeit in unabsehbaren Zügen, in denen freilich auch andere Arten vertreten sind. Oberforstmeister Goebel fand sie nistend in der Gegend von Odessa, Dr. Severzow als Zugvogel in Turkestan, wo sie bereits zwischen dem 8. bis 20. Januar anlangt. Modest Bogdanow sah im aralo-kaspischen Gebiet zahllose Scharen der Kalander- und verwandten Lerchen; Dr. Th. Krüper traf die erstere in Kleinasien im Februar und März auf den Feldern, jedoch nicht im Sommer; nach de Filippi ist sie in Persien in öden Gegenden überall häufig. Ebenso beobachtete sie A. v. Homeyer allenthalben in Algier, namentlich in der Mitidja und L. Taczanowski dort in der Provinz Konstantine, wo sie sehr gemein auf bebauten Feldern des Gebirgslandes, ebenso wie in der Wüste rings um die Oasen, minder zahlreich aber in den näher am Meere gelegenen Gegenden und auf weiten Weideplätzen am See Fezzara war. Sie hielt sich hier stets in großen Scharen auf und war im allgemeinen ziemlich vorsichtig. „Im März hatten sich die einzelnen Pärchen noch nicht abgesondert, doch fingen die Männchen bereits an, hoch aufzufliegen und zu singen." Heuglin sagt über sie nur folgendes: „Nach Dr. Rüppell soll sie häufig als Wintergast in Nubien und Egypten vorkommen, von mir wurde sie nur einzeln, einmal im März in Gesellschaft von Haubenlerchen und Bachstelzen am Ufer einer Lagune bei Alexandrien, wo sich ein Pärchen auf frisch umgebrochnem Ackerland umhertrieb, und im November auf der Poststraße zwischen Kairo und Suez angetroffen. Hemperich und Ehrenberg sammelten sie im peträischen Arabien und Hedjas, unter anderen jungen Herbstvögeln, welche sehr düster gefärbt sind." Die Gebrüder Sintenis bemerkten sie in der Dobrudscha in den Steppen sehr häufig; ebenso lebt sie nach Dr. Finsch in den Ebenen Bulgariens, auch als Nistvogel. Ob sie in Böhmen wirklich vorkomme, vermag Professor Fritsch nicht mit Sicherheit anzugeben. In der Nähe der Stadt Löwen in Belgien wurde, wie Ch. F. Dubois mittheilt, im Oktober 1855 eine lebende Kalanderlerche gefangen

und dort dürfte sie wol nur als höchste Seltenheit vorkommen. Dr. v. Müller zählt sie unter den in der französischen Provence beobachteten Vögeln mit und sagt, daß sie dort in der steinreichen Ebene der Crau das ganze Jahr hindurch häufig, in der Camargue dagegen selten sei. Man halte sie ihres vorzüglichen Gesangs halber oft in Käfige. Nach Salvadori ist sie in Sardinien gemein und nicht so mißtrauisch wie um Rom und anderwärts, vielleicht weil sie hier nicht verfolgt wird. Außerdem gehört sie zu den auf den Märkten von Pisa, Rom und Triest in beträchtlicher Anzahl ausgebotenen Vögeln. In Portugal beobachtete Dr. Rey eine große Schar am 5. April, später aber nur einzelne; in Deutschland ist sie an verschiedenen Orten, jedoch nur selten als Wandergast gesehen worden.

Sie kommt in mancherlei Abänderungen vor, namentlich in sehr wechselnder Größe, sowie auch inhinsicht der Gefiederfärbung. „Die Untersuchung der Kalanderlerchen", sagt E. F. v. Homeyer, „von der Wolga, aus Südrußland, Kleinasien, Griechenland, Dalmatien, Toskana, Spanien, Portugal, Algier und Egypten ergibt fast überall eine bedeutende Veränderlichkeit. Die aus Portugal ziehen ein wenig ins Rostfarbne, die aus Toskana zeigen den schwarzen Fleck am Halse am größten; aus Kleinasien sind sie am lichtesten, von der Wolga meistens einfarbig dunkelgrau. Selbst in einunddersel ben Gegend und größtentheils unabhängig vom Geschlecht, wenn auch die Weibchen stets kleiner sind, kommen bedeutende Größenunterschiede vor. Beständiger sind die Abweichungen in den Farben, und bei einiger Uebung läßt sich mit ziemlicher Sicherheit das Vaterland einer jeden einzelnen bestimmen." Auch v. Nordmann fand in den großen Scharen ebenso auffallend große, wie merkwürdig kleine Exemplare, nicht minder aber zugleich viele Farbenspielarten, weiße, weißgefleckte und gelbliche und viele bloße Abänderungen der gewöhnlichen Färbung.

Inbetreff des Gesangs gehen die Meinungen und Urtheile der Schriftsteller auch bei diesem Vogel überaus weit auseinander. Die alten Autoren loben ihn rückhaltlos. Cetti (Naturgeschichte von Sardinien) spricht von demselben mit Begeisterung: „So wie die Kalandra die anderen Lerchen an Größe übertrifft, ist dies auch im Gesange der Fall; ja, sie kann mit jedem andern Vogel um den Vorrang wetteifern. Ihre natürliche Stimme ist ein Geschwätz von nicht besondrer Annehmlichkeit; aber sie faßt mit staunenswerther Kunstfertigkeit alles auf, was sie hört und wiederholt es. Auf dem Lande bildet sie gleichsam ein Echo der Stimmen aller übrigen Vögel und man braucht eigentlich nur sie allein zu hören anstatt alle anderen. Sie ahmt ebenso das Geschrei der Raubvögel wie die Lieder der Singvögel nach und läßt, in der Luft schwebend, Tausende von Rufen, Strofen und Weisen unter einander erschallen. Auch lernt sie, was man ihr vorspielt, und das Flageolet kann keine Schülerin haben, welche schneller

aufzufaſſen und vollkommener nachzuahmen verſtände. Dabei ſingt ſie unermüdlich vom Morgen bis zum Abend. Eine am Fenſter hängende Kalanderlerche vermag alle umwohnenden Leute zu erheitern, und die Vorübergehenden bleiben nicht ſelten ſtehen, um ſie anzuhören; ſie iſt beſonders die Freude der Handwerker, bei denen man ſie häufig findet.“ Ein neuerer Schriftſteller, Graf Gourcy, lobt dann nicht minder ihre Begabung, mit welcher ſie die Stimmen aller anderen Vögel nachzuahmen vermag. Sie könne nicht allein Strofen aus dem Liede des Gartenlaubvogels, ſondern auch den tiefen Ruf der Amſel, nicht ſelten ſogar die Weiſen von Schwalbe, Singdroſſel, Stiglitz, Wachtel, Meiſe, Grünfink, Hänfling, Feld- und Haubenlerche, Fink und Sperling, ferner die Rufe der Spechte, das Kreiſchen der Reiher und ſelbſt menſchliche Laute, wie Schnalzen u. drgl. außerordentlich täuſchend wiedergeben. Herr Albin Groß in Göppingen ſchreibt: „Meine Kalanderlerche iſt wegen ihrer Leiſtungen als Spötter in der ganzen Gegend berühmt; allein vom Ende des Januar an ſingt ſie ſchon ſo laut, daß man es in dem Zimmer, in welchem ſie hängt, nicht aushalten kann. Sie iſt übrigens in einem ungeheizten Raum überwintert worden und ſingt dennoch.“ Derartige Urtheile betreffen erklärlicherweiſe immer nur den im Käfige gehaltnen Vogel, deſſen Geſang ſich bereits bedeutſam vervollkommnet hat. Im Freileben findet derſelbe nicht ſolchen vollen Beifall, erklärlicherweiſe, weil ſie zu den ſog. Spottvögeln gehört und erſt im Käfige die Gelegenheit findet, ſich zur hervorragenden Künſtlerin auszubilden. Radde ſagt nur, daß ihr Geſang dem der Haubenlerche ähnlich ſei und Göbel fügt nichts weiter hinzu, als daß ſie nicht fliegend, ſondern nur im Sitzen ſinge. Alexander v. Homeyer ſagt, das Lied dieſer ſo hoch gefeierten Sängerin des Südens habe auf ihn nicht den Eindruck gemacht, welchen er erwartet, denn trotz vieler Melodie, trotz lauter, weitſchallender Stimme gehe demſelben doch die Zartheit völlig ab und der Vogel müſſe viel mehr als ein Schreier erſten Ranges gelten. Dennoch eigne er ſich ſeines vorzüglichen Nachahmungstalents halber ſehr für die Gefangenſchaft. Wenn man ihn aber ſelten im Beſitz der Liebhaber finde, ſo liege dies, ſagt Dr. Golz, daran, daß das Einfangen und Eingewöhnen der alten Vögel große Schwierigkeiten habe.

In Spanien, Italien und anderen ſüd- und weſteuropäiſchen Ländern, namentlich auch in der Schweiz, iſt ſie als Stubenvogel recht beliebt; bei uns, beſonders im Norden Deutſchlands, wurde ſie jedoch erſt in letztrer Zeit eingeführt. Züchtungsverſuche ſind meines wiſſens bisher noch nicht angeſtellt, doch wäre es wol wünſchenswerth, daß man ſolche auch mit den Lerchen machen möchte. Hier in dieſem Falle könnte ein Erfolg von großer Wichtigkeit ſein, denn bis jetzt iſt das Jugendkleid des Vogels noch nicht beſchrieben. Dr. Bolle erzählt, daß ein Schiff gegen hundert Kalanderlerchen aus Kadix nach Kanaria gebracht hatte, wo ſie als treffliche Sänger verkauft werden ſollten. Durch einen Zufall ging jedoch

die Thür ihres Käfigs auf und sie entkamen sämmtlich, noch ehe man sie ans Land geschafft hatte. Es wäre nicht unmöglich, sagt er, daß dies die Veranlassung zu ihrer Ansiedlung auf den kanarischen Inseln würde und dies ließe sich umsoeher erwarten, da sie in den Nachbarländern doch sehr häufig seien. Im übrigen warnte er im Jahre 1858: „Man hüte sich, aus der Ferne her, in Triest Calandras zu bestellen, denn man würde theure Feldlerchen erhalten, welche dort diesen Namen haben, während die Kalanderlerche selbst Calandron heißt"; gegenwärtig aber braucht man derartige Befürchtungen nicht mehr zu hegen; denn von Baudisch, Alpi und Crevatin in Triest, Zivsa in Troppau und Hromada in Dresden, Karl Gudera und den übrigen Händlern in Wien sind sie immer zu beziehen. Der Preis beträgt für frisch eingeführte Vögel 12 bis 18 Mark für das Männchen und für ein solches gut singendes bis zu 30 Mark.

Die Kalanderlerche hat keinen weitern Namen. [Kalandralerche, große Lerche, Galander und große Ringlerche, nach alten Autoren].

L'Alouette-calandra; Calandra Lark.

Nomenclatur: Alauda calandra, *L.* (nec *Bnll.*); Alauda undata, *Gml.*; Alauda matutina, *Bdd.*; Melanocorypha calandra, *Boie*; M. calandra, subcalandra et albigularis, *Br., Gld., Nmn., Bp., Cb., Lndrm., v. d. Mhl., Mlhb., Sv., Cr., Slvd., De Fllp., Drk., Trstr., Rpp., Hgl., Hrsf.* et *Mr., Bree, Wrght.*; Londra calandra, *Sks.* [Corydalus galerita, *Belon*; Alauda major s. calandra, *Brss.* — La Calandre, *Edw., Buff.*; The Calandra, *Edw.* — Chalandra, Chalandria (italienisch und spanisch) und Corydalos (in Venedig), nach Geßner; Culassade (in der Provence), Alouette de bruyère (bei Orleans) nach Buffon.

Wissenschaftliche Beschreibung siehe S. 603.

Alauda calandra: supra rubente fumida scapo cujusque plumae exterius livide limbatae subnigro; loris striaque superciliari tenui livide fulvis; genis striaque mystacali tenui subfumidis; macula magna lateris colli nigra vel nigro-fusca, remigibus fuscis, exterius livide limbatis; fascia trans alam angusta alba; rectricibus subfusconigris, exterius livide limbatis; gula media alba, ejusque lateribus cum pectore subnigro-vittato, ochraceo-afflatis; gastraeo reliquo albo; rostro gilvo-, ipso fuscatocarneo; iride fusca; pedibus livide carneis. — ♀ macula gulari minore, magis fuscato-nigra differens atque statura paulo minore.

Länge 18,5 cm.; Flügelbreite 39,5 cm.; Schwanz 6 cm.

Die zweifleckige Lerche [Alauda bimaculata], eine der vorigen sehr nahestehende Art, welche von manchen Ornithologen in drei besondere Arten geschieden wird, ob mit Recht, muß dahingestellt bleiben und hat für die Liebhaberei keine Bedeutung. Sie stimmt im allgemeinen mit der eigentlichen Kalanderlerche überein, soll jedoch oberhalb einen mehr rostgrauen Ton haben und dunkler schaftfleckig sein; das Schwarz auf der Halsseite zieht sich gegen die Oberbrust hin zusammen; die Schwingen haben keine weiße Binde und jede Schwanzfeder hat einen weißen dreieckigen Fleck, sodaß der Schwanz von unten eine breite weiße Endbinde zeigt; außerdem ist sie auch beträchtlich kleiner. Ihre Heimat erstreckt sich über Arabien und Nordostafrika, südwärts bis zum blauen Nil. In Abessinien ist sie Wintergast. Betrachtet man alle drei Arten als zusammenfallend, so ist als Heimat auch Palästina und ganz Mittelasien bis Sibirien zu erachten. Sharpe und Dresser haben in den „Birds of Europe" eine eingehende Beschreibung gegeben; näheres über das Freileben ist zwar nicht bekannt, doch wird dasselbe jedenfalls dem der vorigen in jeder Hinsicht gleichen. — Halsbandlerche (Br.) und röthliche Kalander-

lerche. — Alauda bimaculata, *Ménétr.*; Melanocórypha torquata, *Blth.*; M. albo-terminata, *Cb.*; M. rufescens, *Br.*

Die Mohrenlerche [Alauda tatarica].

Im Jahre 1875 brachte der Händler Stader aus Moskau eine kleine Anzahl dieser überaus interessanten Vögel nach Berlin, wo sie theils in den zoologischen Garten, theils in das Aquarium gelangten und auch an Liebhaber zu dem allerdings hohen Preise von 45 Mark für den Kopf verkauft wurden. Ich zögerte einige Tage, bevor ich mich entschließen konnte, gerade für Lerchen eine solche Summe auszugeben und gleich darauf hatte ich Ursache, mein Säumen zu bedauern, denn die wirklich sehr schönen Vögel waren rasch vergriffen. Das Hochzeitskleid ist einfarbig tiefschwarz, oberhalb, besonders an Rücken, Flügeln und Schwanz jede Feder fein fahlweiß gesäumt; Auge braun; Schnabel und Füße schwarz. Das Männchen im Herbstkleide und das Weibchen ist fahlbräunlich, schwärzlichbraun schaftfleckig, Flügel- und Schwanzfedern schwarzbraun, fahl außengesäumt, erste Schwung- oder Schwanzfeder mit weißer Außenfahne; an jeder Halsseite ein schwärzlicher Fleck; unterseits bräunlichweiß, Hals und Brust schwärzlichbraun gestrichelt, Seiten bräunlichweiß, matt dunkelschaftstreifig. Das Jugendkleid soll fahlbräunlich sein, jede Feder breit schwärzlich schaftstreifig; Zügel- und Augenbrauenstreif weiß; Wangen bis zum Ohr fahlröthlichbraun; Flügel schwarzbraun, jede Feder fahl gesäumt; Schwanzfedern ebenso, etwas dunkler, fahl gesäumt und die äußerste mit weißer Außenfahne; ganze Unterseite weiß, Brust breit dunkelbraun schaftfleckig, Körperseiten fahl röthlichbraun gestrichelt; untere Flügelseite schwarz. Bedeutend größer als die Feldlerche, eine der größten Lerchen überhaupt. Die Heimat erstreckt sich über das mittlere Asien, von wo sie zur Winterzeit südlich und westlich wandert und daher auch, freilich nur einzeln, bis zum Südwesten Europas vorkommt. Den alten Schriftstellern war sie bereits bekannt, und sie geben mehr oder minder zutreffende Beschreibungen und Abbildungen, deren beste wol die von Pallas ist, welcher sogar schon ihr Freileben in den Salzsteppen an der Wolga und der tatarischen Wüste schildert und angibt, daß sie zum Winter hin südwärts wandere. Forster, der sie yeltonische Lerche nennt, sagt, daß sie scharenweise jenseits der Wolga in der Nähe des Yelton-Sees lebe und im August sehr fett und von vortrefflichem Geschmack sei. Da sie im Frühlinge und Winter verschiedene Kleider trägt, so nannte sie Gmelin veränderliche Lerche (s. Nomenklatur). Die neueren Schriftsteller wie Bechstein und Bolle haben sie nicht aufzuweisen. Dr. Eversmann traf sie hin und wieder in den östlichen russischen Steppen an, vorzugsweise jedoch in den Salzgegenden. Im Winter sah er sie in Schwärmen von vielen Tausenden in den südlichen Kirgisensteppen umherwandernd, auf den Salzflächen und an den Ufern der Salzmore, wo der Schnee noch liegen bleibt, ihr Futter, welches dann in den Samen der Salzpflanzen besteht, suchend. Nach F. W. Bädeker erscheint sie bei Sarepta an der Wolga im Januar, verschwindet bald wieder für einige Wochen und wird zwar im März in Scharen umherstreichend, aber nur für kürzere Zeit gesehen. Gibt es keinen Schnee, so verbleibt sie auf der hohen Steppe; bei Schneefall

aber kommt sie herab und sucht an den Wegen nach Futter umher, wo sie dann gefangen oder erlegt werden kann. Radde fand sie nebst Berg- und Kalanderlerche in Südrußland in den Bazaren der Städte, namentlich in Odessa, wo sie nicht gefangen, sondern mit Schrot geschossen, feilgehalten werden. Middendorf beobachtete sie im Februar in der Barabasteppe, nahe an der Heerstraße in großen Schwärmen und Göbel erhielt eine, welche unter einem Schwarm von Kalanderlerchen in der Nähe von Odessa gesehen und erlegt worden. „Sie ist Bewohnerin der Steppen Mittelasiens", sagt E. F. v. Homeyer, „und scheint ihre Wege fast ausschließlich westlich mit einer leichten südlichen Richtung zu nehmen. Die Süd- und Südostgegenden Rußlands sehen sie in jedem Winter zahlreich." Derselbe Schriftsteller fügt dann hinzu, daß kein sichrer Nachweis ihres Vorkommens in Deutschland vorliege, während sie in der Nachbarschaft von Brüssel im März 1850 in etwa fünf Köpfen erlegt sein soll. Während der Expedition der geographischen Gesellschaft von Bremen unter Führung des Herrn Dr. Otto Finsch nach Westsibirien i. J. 1876 beobachtete der genannte Gelehrte diese Lerche in verschiedenen Gegenden und zwar auch in der wüstenartigen Steppe von Tarik, wo stundenweit kein Wasser vorhanden. Im übrigen ist über ihr Freileben fast garnichts angegeben, doch dürfte dasselbe wol dem unsrer Feldlerche im allgemeinen gleichen. Nach Dubois soll sie nur einen ganz geringen Gesang haben.

Ueber ihr Benehmen in der Gefangenschaft ist leider nicht viel zu berichten. Im Berliner Aquarium gingen alle Mohrenlerchen bald zugrunde; im zoologischen Garten dagegen ist noch jetzt ein schönes Pärchen vorhanden, und damit ist wol der Beweis gegeben, daß sie in der Gefangenschaft sich ausdauernd zeigen. Einen Gesang habe ich nicht vernehmen können, doch sagte mir der Futtermeister Meusel, daß derselbe laut und klingend, dem der Haubenlerche ähnlich, doch wol noch angenehmer erschalle.

Die Mohrenlerche hieß bei den alten Autoren schwarze Steppenlerche und tatarische Lerche.

L'Alouette noire; Black Lark.

Nomenclatur: Alauda tatarica, *Pll.*; Tanagra sibirica, *Sprrm.*; Alauda yeltoniensis, *Frstr.*, *Rss.* [„Hndb."]; Alauda mutabilis, *Gml.*; Alauda nigra, *Sph.*; Saxilauda tatarica, *Lss.*; Melanocorypha tatarica, *Bp.*, *Cb.*; Calandra nigra, *Dbs.*; Melanocorypha yeltoniensis, *Shrp.* et *Drss.*, *Br.*

Wissenschaftliche Beschreibung siehe S. 608.

Alauda tatarica: vestimento nuptiali unicolore atro; supra pluma quaque imprimis dorsi, alarum caudaeque subtiliter albido-limbata; iride fusca; rostro pedibusque nigris. — Femella et vestimentum maris autumnale subfumida, e nigro fusco-maculata; remigibus rectricibusque nigricante fuscis, exterius livide limbatis; pogonio primae hujus utriusque pennae extero albo; macula lateris colli nigrescente; gastraeo fuscato-albo; collo pectoreque subnigro-fusco-striolatis; hypochondriis luride albis, obscure substriatis. — Juv.: livide umbrina, subnigro-vittata; loris striaque superciliari albis; genis ad aurem usque livide badiis; pluma quaque alarum nigro-fuscarum

livide limbata; pogonio extimae rectricum obscuriorum, livide limbatarum extero albo; pectore fusco-vittato; hypochondriis livide badio-striolatis; subalaribus nigris.

Länge 18 bis 19 cm.; Flügel 13,5 cm.; Schwanz 7,5 cm.

Die mongolische Lerche [Alauda mongolica] aus Mittelasien bewohnt die östlichen Steppen und wandert zum Winter — wohin, weiß man jedoch noch nicht mit Bestimmtheit. Radde beobachtete sie bei der Grenzwacht am Kuluſſutajeſſk in 10 bis 30 Köpfen und bemerkt als auffällig, daß ſie einerſeits alle bewaldeten oder beſtrauchten Gegenden und andrerſeits ſalzhaltigen Boden vermieden. Er meint, daß ſie einzeln in den Hochwaldſteppen brüte, doch fand er das Neſt nicht. Sie ſei ſehr ſcheu, laufe ſehr ſchnell auf der Erde und laſſe ſich vom Jäger nicht leicht ankommen. Da er zeitweiſe ein Männchen erlegte, ſo meint er, daß ſie in den Geſchlechtern getrennt wandere. Ihren Geſang laſſe ſie ebenſo wie die Feldlerche, doch nur im niedrigen Fluge erſchallen, aber recht anhaltend; nach Beendigung deſſelben ſenke ſie ſich wie jene plötzlich zur Erde herab. Ein Urtheil über den Geſang iſt jedoch nicht angegeben. Nach Dr. Dybowski iſt ſie in den Steppen von Oſtſibirien ſehr gemein, kommt im Frühling zeitig an, niſtet mit der gemeinen Feldlerche völlig übereinſtimmend und brütet überaus feſt auf dem Gelege. Auch dieſe Lerche erwähnen die alten Schriftſteller gleich der vorigen, und Pallas ſagt, daß ſie ein eignes, zuweilen plötzlich abgebrochnes Zwitſchern hören laſſe. Im Juni brüte ſie. Näheres iſt weder von den älteren, noch von den neueren Vogelkundigen mitgetheilt worden. Sie iſt oberhalb roſtröthlich zimmtbraun; über die Kopfmitte ein fahlröthliches breites Band, ein ebenſolches quer über den Hinterkopf; Zügel- und Schläfenſtreif weiß, unterhalb des letztern ein zimmtbrauner Streif; Wangen reinweiß; an jeder Halsſeite ein großer ſchwarzer Fleck; an Rücken und Schultern jede Feder fahl röthlichweiß gerandet; Schwingen und übrige Flügelfedern ſchwarzbraun, fahlweißlich geſäumt und mit weißer Querbinde über den Flügel; Schwanzfedern ſchwarz, die mittelſten heller braun und mit weißer Außenfahne; ganze Unterſeite weiß, Bruſt- und Bauchſeiten bräunlichweiß, rothbraun ſchaftſtreifig; Schnabel gelblichhorngrau mit dunkler Firſt; Auge braun; Füße röthlichgrau; das Weibchen iſt nicht beſchrieben. Größe der vorigen. Obwol ſie in China ein nicht ſeltner Stubenvogel ſein ſoll und auch in den Jahren 1866 und 1867 in je einem Exemplar in den zoologiſchen Garten von London gelangt iſt, ſo iſt ſie doch bei uns in Deutſchland noch nicht eingeführt. Steppenlerche und Mongolenlerche; Bai-Ling, d. h. hundert Geiſter, bei den Chineſen (nach Br.). Alauda mongolica, *Pll.*; A. sinensis, *Wtrhs.*

Die ſibiriſche Lerche [Alauda sibirica] iſt am Oberkopf röthlichzimmtbraun, Zügel- und Augenbrauenſtreif nebſt Kopfſeiten weiß, untere Wangenhälfte bräunlichfahl, matt dunkel gepunktet, ganze übrige Oberſeite dunkelbraun, jede Feder fahlbraun außengeſäumt; Schwingen ſchwarzbraun, fahl außengeſäumt, über den Flügel eine ſehr breite weiße Querbinde, Flügelrand und obere Schwanzdecken röthlichzimmtbraun, Schwanzfedern ſchwarz, heller geſäumt, die äußerſte ganz weiß; Oberbruſt fahl röthlichweiß, verloſchen dunkel gepunktet; ganze übrige Unterſeite weiß; Bruſtſeiten röthlichzimmtbraun; Bauchſeiten bräunlich, dunkelſchaftſtreifig; Schnabel bräunlichgelb mit dunklerer Firſt; Auge braun; Füße röthlichbraun. Das Weibchen ſoll nur matter gefärbt ſein. Die Größe iſt ein wenig beträchtlicher als die der Feldlerche. Ihre Heimat erſtreckt ſich über den Oſten Europas und Nordaſien. Von Radde wurde ſie in der Barabaſteppe gefunden, und Dr. Eversmann gibt an, daß ſie bewachſene kräuterreiche Flächen und Anhöhen der Steppe liebe; ſie gehe nordwärts bis Orenburg und ſei namentlich in der Gegend von Ilezk noch ſehr häufig. Sie wähle ſtets gelblichen oder röthlichen Lehmboden ohne Dammerde zu ihrem Aufenthalt. Dr. Finſch beobachtete ſie auf dem Wege von Omsk nach Semipalatinsk in Sibirien. In der Dobrudſcha erlegten ſie die Gebrüder Sintenis auf dem Frühlingszuge unter Kalanderlerchen, doch iſt ſie dort ſehr ſelten. „Von verſchiedenen Schriftſtellern", ſagt E. v. Homeyer, „bald in dieſe, bald jene Gattung umhergeworfen, paßt ſie eben in keine; ſie iſt weder eine Kalander-, noch eine Alpen- oder gar eine Iſabellerche, mit der mongoliſchen Lerche dagegen paßt ſie ganz ausgezeichnet zuſammen. Sie geht öſtlich, wie Radde beobachtet

hat, nicht über das Jeniseigebiet hinaus, nistet bereits in der Wolgagegend und kommt alljährlich im Winter nach Südrußland. Einzelne haben sich bis Belgien verflogen und obwol man in neuerer Zeit ihr Vorkommen in Deutschland nicht festgestellt, sondern vielmehr angezweifelt hat, während bei ihrer westlichen Zugrichtung die in Belgien gefundenen weißflügeligen oder sibirischen Lerchen doch nothwendigerweise durch Deutschland gewandert sein müssen, so ist es dennoch fragelose Thatsache, und zwar wurde diese Art schon seit langer Zeit in unserm Vaterlande beobachtet. Bechstein erzählt: ‚Von dieser Varietät fing ich im März 1789 bei hohem Schnee sieben Köpfe vor meiner Thür unter einem Siebe. Sie hielten sich in einer Gesellschaft von Baumlerchen auf, und unter den anderen Lerchen, die damals in meiner Gegend zu tausenden gefangen worden, war keine mehr von dieser Spielart zu treffen. Ich hielt sie anfangs für eine besondre Art, bis mir ihr ganzes Wesen, Locktöne, Geschrei u. s. w., da ich sie lange Zeit in der Stube hatte, zeigten, daß es Feldlerchen waren. Doch hatten sie keine Kappe. Vielleicht waren es Feldlerchen, die in weit südlicheren Gegenden zu Hause gehören, denn meine Beobachtungen haben gezeigt, daß es eine beständige Varietät sein muß.‘ (Er gibt dann eine genaue Beschreibung und v. H. fährt fort): An eine bloße Spielart ist bei sieben gleichgefärbten Köpfen von vornherein nicht zu denken, und die Beschreibung paßt so durchaus zu der Weißflügellerche, daß man über die Zugehörigkeit garnicht im Zweifel sein kann. Nach den Beobachtungen des Grafen Wodzycki kommt sie übrigens nicht selten bis nach Polen und Galizien.“ Ueber das erwähnte Erscheinen in Belgien berichtet Herr Ch. F. Dubois: „Im Oktober 1855 wurde eine solche Lerche bei Lüttich gefangen, dann im Oktober des nächsten Jahres eine bei Mecheln.“ Inbetreff des Freilebens ist fast garnichts bekannt. Sie soll im ganzen Wesen der Feldlerche ähnlich, aber noch viel weniger scheu sein und auch in gleicher Weise nisten. Nach Angabe der wenigen Beobachter ist ihr Gesang unbedeutend, beiweitem geringer und minder klangreich, als der anderer Verwandten. Ob sie bereits in den Handel gelangt ist, vermag ich mit Sicherheit nicht anzugeben, obwol ich glaube, sie im zoologischen Garten von Hamburg vor einigen Jahren gesehen zu haben. — Spiegellerche (Br.); weißflügelige Lerche (Hmr.). — Alauda sibirica, *Gml.*; A. leucóptera, *Pll.*; A. arvensis ruficeps, *Bchst.*; Calandritis sibirica, *Cb.*; Pallasia (!) leucoptera, *Hmr.*

Die aschgraue Lerche [Alauda cinérea, *Gml.*] vom Vorgebirge der guten Hoffnung; oberhalb dunkelbraun, jede Feder fahl röthlichbraun außengesäumt; Oberkopf dunkelröthlichbraun, Augenbrauenstreif und Kopfseiten reinweiß; kleiner Wangenfleck röthlichfahl; Schwingen dunkelbraun, die erste weiß und die anderen röthlich außengesäumt; obere Schwanzdecken bräunlichdunkelroth; Schwanzfedern schwärzlichbraun, die äußerste mit weißer Außenfahne; an jeder Brustseite ein großer braunrother Fleck; ganzer Unterkörper weiß; Brust-, Bauch- und untere Flügelseiten hellröthlichbraun; Schnabel dunkelbraun; Auge braun; Füße bräunlichgrau. Das Weibchen ist nicht bekannt. Die Größe ist etwas geringer als die der Feldlerche. Nach Layard's Angabe ist sie im Kaplande überall häufig und im Freileben gleicht sie den Verwandten, doch hat der Forscher näheres leider nicht mitgetheilt. Lebend eingeführt ist sie bis jetzt noch nicht, und wenn dies über kurz oder lang auch geschehen sollte, so wird sie doch für die Liebhaberei schwerlich eine besondre Bedeutung gewinnen, ebenso wie sich dies von fast allen folgenden Lerchen annehmen läßt. Graulerche (Br.). Alauda ruficapilla, *Smth.*; A. spleniata, *Strckl.*; Calandrella ruficeps, *Br.* [nec *Rpp.*]. — **Die rothköpfige Lerche** [Alauda ruficeps, *Rpp.*, nec *Br.*] aus Abessinien ist nach Cabanis kleiner als die vorige, an der Brust mehr oder weniger rothbraun und an der ganzen übrigen Unterseite, namentlich an den Bauchseiten, ebenso angeflogen und verloschen gestreift; die äußerste Steuerfeder zeigt nur einen schmalen weißen Saum. „Sie vertritt“, sagt Heuglin, „in den Hochgebirgen Abessiniens, zwischen 2000 bis etwa 3600 Meter Meereshöhe unsre Feldlerche, mit der sie im Benehmen ungemein viele Aehnlichkeit hat. Parweise findet man sie das ganze Jahr hindurch auf Stoppelfeldern, steinigen Brachäckern, an Wegen, um Gehöfte, namentlich auf eisenhaltigem Boden. Das Männchen singt häufig steigend in der Luft oder auf einer Erdscholle, seltener sieht man es auf kleinen Büschen sitzend. Nordwärts trafen wir sie noch in Hamasién, südwärts bis in den Wolo-Gala-

Gebirgen, jedoch nicht westlich vom Tanasee." Nach Barboza du Bocage befindet sich ein Exemplar aus Westafrika im Museum von Lissabon. In allem übrigen stimmt sie mit den vorigen überein. Rothköpfige Berglerche (Hgl.). — **Die Finkenlerche** [Alauda deva] aus dem südlichen Indien ist oberhalb dunkelbraun, jede Feder fahl gesäumt; Augenbrauen- und Zügelstreif roströthlichfahlgelb, Barlstreif dunkelbräunlich, Kopfseiten röthlichbraun; Schwingen und Flügeldecken dunkelbraun, fahl außengesäumt; Schwanzfedern schwarzbraun, die äußersten fahlröthlich außengesäumt; Kehle, Brust und Seiten fahlröthlichgelb, fein dunkelschaftstreifig, ganze übrige Unterseite hell roströthlichgelb; Schnabel bräunlichgelb; Auge dunkelbraun; Füße gelblichgrau. Das Weibchen soll nicht verschieden sein. Größe etwa der Haidelerche gleich. Nach Jerdon's Mittheilungen ist sie in der Lebensweise und allen sonstigen Eigenthümlichkeiten der europäischen Feldlerche überaus ähnlich. Man hält sie dort nicht allein um ihres sehr angenehmen Gesangs willen, sondern auch weil sie in vorzüglicher Weise die Lieder verschiedener Vögel nachahmen lernt, häufig in der Gefangenschaft und hoffentlich wird sie nebst anderen indischen Vögeln demnächst in den Handel gelangen. Kleine Haubenlerche (Hmr.). Mirafra Hayi, *Jerd.*

Die kurzzehige Lerche [Alauda brachydáctyla] gehört jedenfalls zu den am weitesten verbreiteten unter allen überhaupt, denn ihre Heimat erstreckt sich über den Südwesten Asiens, das nordöstliche Afrika und über das südliche bis mittlere Europa; auf Zeylon kommt sie nicht vor, dagegen gehört sie nach Blasius zu den auf Helgoland beobachteten Vögeln. Sie ist oberhalb fahlgelblicherdgrau (bis deutlich rostfarben), schwärzlich schaftfleckig, namentlich an Oberkopf und Rücken; Zügelstreif weiß, Schläfenstreif weiß und darunter ein schwärzlicher; Wangen fahlröthlichgelb, schwärzlich schaftstreifig; an jeder Halsseite ein schwärzlichgrauer Fleck; Flügel fahlgelblichbraun, mit fahlgelblichweißer Querbinde; Schwingen schwarzbraun, röthlichfahl außengesäumt; Schwanzfedern dunkelbraun, fahlröthlichgelb außengesäumt; ganze Unterseite weiß, Brust- und Bauchseiten nebst unteren Flügeldecken fahlröthlichgelb; Schnabel gelbgrau mit schwärzlicher Spitze; Auge braun; Füße graugelb. Das Weibchen soll übereinstimmend sein, mit nur matter gefärbtem und kleinerm Halsfleck. Das Jugendkleid ist nach A. v. Homeyer schön gelb gefleckt. Die Größe ist beträchtlich geringer als die der Haidelerche. Sie zeichnet sich vor den Verwandten dadurch aus, daß sie nicht den langen Spornagel an der Hinterzehe hat. „Wie weit ihre Verbreitung sich eigentlich ausdehnt", sagt E. F. v. Homeyer, „läßt sich noch nicht feststellen, da sie bis zur neuesten Zeit hinauf mit anderen nahestehenden Arten verwechselt worden und auch gegenwärtig noch eine sichre Scheidung und Begrenzung aller hierher gehörenden Lerchen zweifelhaft bleibt. Sie neigt ganz außerordentlich zu Abweichungen, und ich muß gestehen, daß ich auf desto größere Schwierigkeiten stieß, je mehrere Exemplare ich aus den verschiedensten Gegenden in Händen hatte; meine Untersuchung erstreckte sich über solche aus Südrußland, Griechenland, Dalmatien, Spanien, Portugal, Algier und Egypten, welche sich größtentheils in meiner Sammlung befinden." Die Unterschiede liegen nach demselben Schriftsteller vornehmlich darin, daß die Rostfarbe mehr oder minder deutlich, am meisten bei den portugisischen und am geringsten bei den südrussischen ist. Ferner schwankt die Größe sehr beträchtlich und ebenso die Länge der Schwingen selbst um zwei bis drei Linien. Schließlich gibt es auch mancherlei Spielarten, ganz rostfarbene, reinweiße und gescheckte. Die Literatur über ihr Vorkommen ist eine reichhaltige und nach derselben gleicht ihre Lebensweise im wesentlichen der aller nahestehenden, besonders der Feldlerche. Dr. Bolle spricht in seiner geistvollen Weise über ihr Freileben auf den kanarischen Inseln. Zunächst berichtigt er den Irrthum, nach welchem die dort vorkommende Art die Feldlerche sei; „es ist vielmehr", sagt er, „die kurzzehige. Als Standvogel ist sie wol über alle jene Inseln verbreitet. Schon auf jedem Saatfelde in der Nähe von Santacruz ist sie zahlreich anzutreffen und nicht allein auf kornreichen Strichen, sondern auch auf wüstenartigen kahlen Flächen und Hügeln, deren weißer Tuff oder gelber Kalkboden nur geringen, manchmal garkeinen Pflanzenwuchs aufkommen läßt, wie es deren zumal im Osten von Kanaria viele gibt. Im Sommer, mehr aber noch im Herbst, liegt sie scharenweise

in den Stoppelfeldern, auf denen die Halme fußhoch stehen bleiben; auch läßt sie sich gern auf Steinen nieder. Im Frühlinge singen die Männchen, in der Luft einander jagend, abgebrochene Lerchenstrofen. Ueberhaupt hat ihr Gesang mit dem der Feldlerche Aehnlichkeit und wird wie von dieser meistens im Fluge vernommen; er ist jedoch weniger anhaltend und laut. Das Jugendkleid ist, wie bei allen mir bekannten Lerchen, weißbunt gesprenkelt. Gäbe es auf den Inseln Vorrichtungen zum Lerchenfange, so könnte derselbe gewiß lohnend betrieben werden. Selbst als Stubenvogel wird sie trotz ihrer angenehmen Stimme kaum jemals gehalten." Das Obige ergänzt durch die nachstehende Schilderung Herr Major Alexander v. Homeyer von den Balearen: „Diese hübsche kleine Lerche ist hier in einer überraschenden Anzahl vorhanden; allenthalben findet man sie, auf jedem Felde, selbst wenn dasselbe ziemlich zahlreich mit Bäumen besetzt ist, auf den wenigen nassen Süß- und Brackwasserwiesen, in den dürftigen Sandgegenden des südöstlichen Strandes, auf den Felsen der Vorberge, in den fruchtbaren Getreide-, Mais- und Oelfruchtgeländen, kurz überall, nur nicht im eigentlichen Gebirge und im Walde. Sind jedoch die kultivirten muldenförmigen Thaleinschnitte nicht zu klein und eng, so zeigen sich selbst hier einige Pärchen. Bald singt sie aus der Luft, bald von einem Stein oder einer Ackerscholle herab, namentlich abends bei untergehender Sonne oder morgens, während sie gleichzeitig das Gefieder ordnet. Wird irgendwo gepflügt, so finden sich ihrer hunderte aus der ganzen Nachbarschaft der Nahrung halber ein, welche ungefähr dieselbe ist wie bei der Feldlerche. Der Gesang ist lerchenartig. Man erkennt ihn als solchen sogleich, ersieht aber auch, daß er bedeutend schlechter als der unserer deutschen Lerchenarten ist und zwar lauter Stückwerk, nichts Zusammenhängendes, stets mit Pausen zwischen den einzelnen Strofen. Letztere haben mit denen der Feldlerche die meiste Aehnlichkeit, doch sind sie viel unbedeutender; langgezogene Töne gehen voran, während schnellgegebene Nachsätze folgen, welche weder im Wohllaut noch Tempo zum Gesang passen. Die langgezogenen Flötentöne sind schreiend, die Schlußstrofen hölzern und ohne Klang. Einzelne Strofen werden genau ebenso oder nur mit Abänderung des Schlusses bis zum Ueberdruß wol zehn- bis zwanzigmal wiederholt, wodurch man an die langweilige Weise mancher schlechten Sänger unter den Haubenlerchen erinnert wird. Trotzdem besitzt sie aber eine große Fertigkeit im Nachahmen fremder Vogelstimmen. So hörte ich z. B. Strofen vom schwarzkehligen Wiesenschmätzer, Grünfink und Hänfling; ja, selbst das tik, tiktik des Grauammers schwirrt sie wol zwanzigmal hintereinander. In dieser Nachahmungsfähigkeit, den Pausen zwischen den einzelnen Strofen, wie endlich auch inhinsicht des schreienden Tons, ist ihr Gesang dem der Kalanderlerche sehr ähnlich, welcher sie auch im übrigen am nächsten steht. Ihr aufsteigender Flug geschieht sehr schnell, unmittelbar in schrägsteiler Linie; das Herabkommen erfolgt fast senkrecht. Mit außerordentlicher Geschwindigkeit erhebt sie sich lautlos und beginnt erst in der Höhe ihr Lied, in der sie dann singend ihre Bogen beschreibt. Ihre Bewegungen sind denen der Feldlerche ähnlich, ebenso fast alle Locktöne, mit Ausnahme eines haidelerchenartigen Rufs, welcher wie splüi lautet." In Nordostafrika ist sie nach Heuglin Zugvogel, erscheint oft schon zu anfang Septembers, meistens in größeren Scharen auf Brachfeldern, trockenen Viehweiden und namentlich in der Wüste und Steppe. Die einzelnen Flüge sammeln sich im Winter in Kordofan, Senar und Taka zu ungeheuren Scharen an und ziehen im Februar und März wieder in kleineren Schwärmen nordwärts. Auch in Nordarabien und im abessinischen Küstenland ist sie zur Zugzeit zu finden. Jerdon berichtet über ihr Vorkommen im Flachlande Südindiens, wo sie als Zugvogel vom Oktober bis März an Wasserrändern u. a. feuchten Stellen zuweilen so zahlreich ist, daß man wol mehrere Dutzend auf einen Schuß erlegen kann; auch wird sie hier in manchen Gegenden in großer Anzahl gefangen und als Leckerbissen verspeist, so nach Blyth namentlich bei Kalkutta. Phillips, Hutton, Dickson u. A. bestätigen jene Mittheilungen, ohne näheres hinzuzufügen. Dr. Finsch sagt, daß sie selbst auf den höchsten Wiesen des Altai und in der Steppe von Tarik, auch wenn stundenweit kein Wasser vorhanden war, überall vorkam, während er sie auf dem Wege von Omsk bis Semipalatinsk kaum bemerkte. Da sie schon im Jahre 1864 von Algier aus in den zoologischen Garten von London gelangte, so läßt sich wol annehmen, daß sie über kurz oder lang auch bei

uns eingeführt wird. Dann dürfte sie in ganz gleicher Weise wie die Kalanderlerche als Spottvogel geschätzt sein; ob sie freilich jemals einen bedeutenden Werth für die Liebhaberei erlangen wird, ist fraglich. — Gesellschaftslerche, Stummellerche, Kurzzehenlerche und Kalandrelle. — Alauda brachydactyla, *Lssl.*; A. bagheira, *Hmlt.*; A. arenaria, *Stph.*; A. calandrella, *Bnll.*; A. dukhunensis, *Sks.*, *Jrd.*; Emberiza olivácea, *Tckll.*; Melanocórypha ítala, graeca, tenui-rostris et gallica, *Br.* [Boag-geyra Lark or Short-toed Lark, *Lath.*; Kirwa Bunting, *Tckll.*; Social Lark, *Jrd.*; Ortolan, in Indien von den Europäern genannt; Bagheiri, in Hindustan nach *Blth.*, *Hmlt.*, *Jrd.*].

Die weißgraue Lerche [Alauda pispoletta, *Pll.*], den vorhergegangenen Verwandten, namentlich der kurzzehigen Lerche überaus ähnlich, ist sie nach E. v. Homeyer doch durch folgende Merkmale wesentlich verschieden. Ihr ganzes Gefieder zeichnet sich durch weißgraue Färbung aus; der Hals ist gestrichelt; sie hat kürzere Vorderarmschwingen, sodaß die übrigen über diese weit hinaustreten, und besonders auffallend ist die bedeutende Länge des Schwanzes. Heuglin fügt hinzu, daß sie am Oberkörper und an der Brust kräftiger und dunkler gefleckt sei; die Weichen sind rauchbräunlich mit einem geringen Stich ins rostfarbne. Während sie von manchen Schriftstellern nur als Spielart der vorigen hingestellt wird, erklären andere sie für eine selbständige sichre Art, und dies wird wol richtig sein. Ihre Verbreitung ist bis jetzt noch nicht festgestellt, doch dürfte sich dieselbe über große Gebiete erstrecken. Radde erlegte sie in Südrußland; Eversmann in den Steppen am Kaspischen Meere; Goebel erhielt zwei Gelege aus der Umgebung von Odessa; Przewalski fand sie in Ostasien; Bogdanow im aralo-kaspischen Gebiet in großen Wanderscharen; nach Shelley kommt sie in Egypten vor, nach de Filippi in Armenien. — Heine's Lerche [Alauda Heinei, *Hmr.*], welche bisher immer mit der weißgrauen verwechselt worden, stellt E. v. Homeyer als bestimmte Art hin und benennt sie zu Ehren des Oberamtmann Heine zu St. Burkhard, welcher eine der größten Sammlungen ausgestopfter Vögel aus allen Welttheilen besitzt und durch dieselbe sich bekanntlich ein außerordentlich hohes Verdienst um die Ornithologie erworben hat. „Sie ist dunkellerchengrau, ins rostfarbne spielend, an Hinterhals, Brust- und Bauchseiten fein dunkelgestrichelt; Mittelschwingen nur weißlich gesäumt; äußere Schwanzfedern ziemlich ausgedehnt weiß und ohne jede Spur von Rostfarbe. Kehle und Bauch weiß. Sie ist nicht selten in der Wolgagegend, kommt auch in das südliche Rußland und vermuthlich ins westliche Asien." Obwol andere Forscher, wie namentlich H. E. Dresser, sie nicht als selbständige Art anerkennen, hält der erstre sie doch als solche mit aller Entschiedenheit aufrecht. Die Zukunft wird ja alle derartigen Streitigkeiten entscheiden. — Die ungefleckte Lerche [Alauda immaculata, *C. L. Br.*] aus Spanien „zeichnet sich durch den Mangel der Seitenflecke am Halse und durch einen dunklen Fleck seitlich der Schnabelwurzel von der kurzzehigen Lerche aus". (E. v. Homeyer). — Auch eine hermonische Lerche [Alauda hermónensis, *Trstr.*] will man von der kurzzehigen Lerche als besondre Art abzweigen, „indem sie sich durch längern und schlankern Schnabel, bedeutendere Größe, rostrothe Färbung und deutlichern schwärzlichen Halsfleck unterscheidet, in der höhern Bergregion lebt und drei Wochen später nistet" (Homeyer). — Buckley's Lerche [Alauda Buckleyi, *Shll.*] „gleicht in ihrem Wesen der Feldlerche, schwingt sich oft zu bedeutender Höhe empor und läßt aus der Luft ihren kurzen, aber angenehmen Gesang erschallen. Außerdem vernimmt man von ihr ein eigenthümliches Knappen, welches sie durch schnelles Flügelschlagen zu bewirken scheint" (Reichenow). Ueber dasselbe wird weiterhin bei der Bienenlerche eine Erklärung gegeben. Der Genannte sah sie häufig bei Akkra in Westafrika. Die großflügelige Lerche [Alauda macróptera, *Br.*]. „Diese Lerche ist von Alfred Edmund Brehm im Innern Afrikas aufgefunden und unterschieden worden. Solche Unterscheidung im Leben hat allerdings viel Gewicht. Bälge unter allen Umständen mit Sicherheit zu erkennen, ist dagegen sehr schwierig, zumal die nördlichen (egyptischen Vögel) etwas kleiner sind als die von Senar. Die Zeichnung der Oberseite ist etwas kräftiger durch die größeren dunkleren Flecke auf der Mitte jeder Feder als bei der kurzzehigen Lerche. Die Klaue der Hinterzehe ist jedoch länger

Cabanis stellt sie als besondre Art, Alauda Kollyi, *Tmm.*, hin (welche jedoch mit dieser zusammenfällt). Man bemühte sich, einen Vogel zu finden, der zu der Brehm'schen Beschreibung paßte, und so hat man den verschiedensten Lerchen diesen Namen gegeben, der wol am besten aus der Liste der Vögel zu streichen ist." (E. v. Homeyer). Auch Heuglin zweifelt an der Artbeständigkeit — und es ist ganz merkwürdig, daß gerade die besten Freunde jenes Afrikareisenden bei allen Angaben und Behauptungen, welche er nach eigenen Beobachtungen gemacht, Fragezeichen oder gar Ausrufungszeichen nicht unterdrücken können. — **Anderssón's Lerche** [Alauda Anderssoni, *Frstr.*], der aschgrauen und rothkäppigen Lerche anscheinend nahe verwandt und bis jetzt noch keineswegs so weit bekannt, daß es sicher feststeht, zu welcher Gruppe der Lerchen sie eigentlich gehört. Blanford, der sie im östlichen Abessinien in steinigen Gegenden häufig fand, hat sie beschrieben; hier müssen wir uns mit ihrer Erwähnung begnügen. — **Die kleinste Lerche** [Alauda minor, *Cb.*], sagt Cabanis, „ist der weißgrauen äußerst ähnlich, nur daß letztre größer ist, mehr grünen Ton an der Oberseite hat, kräftiger und dunkler gefleckt ist, längere Flügel, längern Schwanz und stärkern, mehr geraden Sporn an der Hinterzehe hat. Von der kurzzehigen Lerche unterscheidet sie sich wesentlich durch die feinere dunklere Strichelung der Oberseite; der dunkle, durch dichtstehende Striche gebildete Fleck an den Seiten der Kehle fehlt ihr fast völlig, dagegen ist die ganze Brust gleichmäßig mit schmalen dunkelbraunen Strichen besetzt; die äußerste Schwanzfeder ist größtentheils und die übrigen sind an den äußeren Rändern weiß." E. v. Homeyer fügt noch als wesentlich zu, daß sie sehr klein aber gedrungen sei, einen kürzern Schnabel habe; vom untern Schnabelwinkel gehe jederseits eine feine, doch deutliche Linie abwärts, eine andre im Bogen unter dem Auge und noch eine durch das Auge. Sie scheint den ganzen Norden Afrikas in angemessenen Oertlichkeiten zu bewohnen. Heuglin sagt, daß sie als Zugvogel im Frühjahr und Herbst in Arabien, Egypten und Nubien in den Wüsten und im Steppenlande unstät umherschweife. Barboza du Bocage theilt mit, daß ein Exemplar im Herbstkleide aus Benguela sich im Museum von Lissabon befinde. Von einigen Ornithologen wird eine nahe verwandte oder übereinstimmende Art unter der Bezeichnung Alauda Rebaudia, *Loche*, als abweichend unterschieden. Loche, A. v. Homeyer und Taczanowski machten Angaben über ihr Vorkommen in Algier, ohne stichhaltige Unterscheidungszeichen anzugeben. E. v. Homeyer wirft sie ohne weitres mit der vorigen zusammen.

Die **Malabar-Lerche** [Alauda malabarica] aus Ostindien und von Zeylon, ist der Feldlerche sehr ähnlich und nur durch geringe Merkmale, namentlich durch fein dunkelschaftstreifige Unterseite und fahlröthlichgelbe untere Flügeldecken von ihr verschieden. E. v. Homeyer hält sie für übereinstimmend mit der Feldlerche. Blyth sagt, sie sei in Bengalen besonders im Februar sehr gemein und werde in großer Anzahl in die Bazare gebracht und als Ortolan verspeist. Jerdon fand sie über ganz Indien weit verbreitet. Auf Zeylon beobachtete sie Layard in gleicher Weise überall im offnen Lande, auf bebauten Feldern, wie in unfruchtbaren sandigen Ebenen. Ihre ganze Lebensweise und Brut (im April) gleiche der europäischen Feldlerche, doch singe sie, wenn auch recht angenehm, keineswegs so schön, wie die erwähnte Verwandte. Dr. Stoliczka sammelte sie im September im östlichen Kaschmir und nach Sewerzow nistet sie in Turkestan. Im zoologischen Garten von London ist sie seit 1872 vorhanden und daher läßt sich wol annehmen, daß wir sie über kurz oder lang auch bei uns im Vogelhandel erwarten dürfen. Trillerlerche (Br.). Alauda malabarica, *Scpl.*, *Gml.*, *Lth.*, *Gr.*, *Blth.*; A. gulgula, *Frnkl.*, *Jerd.*, *Blth.*, *Ctsb.*, *Bp.*, *Lrd.*; A. gracilis et A. gangetica, *Blth.*; A. leiopus v. orientalis, *Hdgs.*; A. arvensis, *Sndvll.* [Common Indian Lark. Poolloo in Zeylon nach Layard]. — Die kleinschnäblige Lerche [Alauda triborrhyncha, *Hdgs.*] von Horsfield und E. Moore im „Catalogue of the Birds in the Museum of the East-India-Company" zwar als eine besondre Art aufgeführt, die sich freilich nur durch unwesentliche Merkmale von der europäischen Feldlerche unterscheide, während sie nach einigen anderen Autoren, z. B. Sharpe und Dresser, mit ihr auch zusammengeworfen wird. — **Die japanische Lerche** [Alauda japonica, *Tmm.* et *Schlgl.*] ist ebenfalls der Feldlerche sehr ähnlich, doch an der

ganzen Oberseite bräunlichschwarz, jede Feder fahl gesäumt; Brust und Seiten gelblichrothbraun; breit schwarz schaftstreifig; auch ist die Größe bemerkbar geringer. Die meisten Schriftsteller geben jedoch an, daß sie der europäischen Verwandten viel zu sehr gleiche, als daß man sie als selbständige Art gelten lassen könne; geschieht dies jedoch, so erstreckt sich ihre Verbreitung über Japan, den Süden von China und die Inseln Hainan und Formosa. Sie soll bei den Japanesen und Chinesen auch als Stubenvogel beliebt sein, und obwol sie bis jetzt noch nicht einmal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen, so läßt sich doch annehmen, daß sie demnächst eingeführt werde. Himmelslerche (Br.). Alauda coelivox, *Swnh.* — Die braune Lerche [Alauda infuscata, *Hgl.*], die rothsteißige Lerche [Alauda erythropýga, *Strckl.*] und Blanfords Lerche [Alauda praetermissa, *Blnf.*] sind afrikanische Lerchen, über welche leider nichts näheres bekannt geworden und die ich daher nur aufzählen kann, mit dem Wunsche, daß die späteren Afrikareisenden sie wieder auffinden, genau beschreiben und schildern mögen. — Die rothschäblige Lerche [Alauda conirostris, *Sndvll.*] wurde nach Ayres in zwei Exemplaren (wahrscheinlich in einem Pärchen) in der Transval-Republik erlegt, während sie auf den offenen Sandbänken im kurzen Grase nach Nahrung umhersuchten. Diese Art zeichnet sich vor allen anderen durch lebhaft röthlichbraunen Schnabel aus. Näheres ist noch wol nicht bekannt. Pink-billed Lark, *Ayres.*

Die Wüstenlerche [Alauda deserti], deren Verbreitung sich über den Norden und Nordosten Afrikas, das westliche und südliche Asien erstreckt und die auch zuweilen in Südeuropa vorkommt, ist oberhalb gelbbräunlichgrau; Zügel fahlweißlich, Wangen röthlichisabellfarben; Flügel dunkler, graugelblichbraun; Schwingen dunkler, fahlröthlich gesäumt; Bürzel fahlröthlichgelbbraun; Schwanzfedern fahlröthlichbraun, die beiden äußersten röthlichisabellfarben; Kehle und Brustseiten weiß, röthlichisabellfarben überhaucht; ganze Unterseite düstergelblichweiß; Schnabel bräunlichgrau, Unterschnabel weißlichgrau; Auge braun; Füße bräunlichgrau. Das Weibchen soll übereinstimmend sein. Größe bedeutend geringer als die der Feldlerche. „Manche", sagt Heuglin, „zeigen eine deutliche schwärzliche Fleckenzeichnung der Kehlseiten, bei anderen fehlt dieselbe jedoch gänzlich; Zügel und Augenkreis, zuweilen auch ein Streif über dem Auge sind isabellweißlich. Sie scheint in Egypten Standvogel zu sein, ebenso im nördlichen Arabien und Nubien, wie im abessinischen Küstengebiet, möglicherweise bis zum Somaliland, dagegen nicht in den Gebirgen von Habesch. Sie bewohnt parweise die Grenze zwischen dem Kulturlande und der Wüste, die letztre selber, namentlich die Umgebung der Karawanenstraßen. Ihr Gesang ist unbedeutend, der Lockton lispelnd." Im übrigen gleicht ihre Lebensweise der verwandter Arten. E. v. Homeyer sagt, daß sie weit verbreitet und überaus veränderlich in der Färbung sei. Gelegentlich gelangt sie wol gleich den Verwandten einzeln in den Handel, ohne daß man ihr jedoch irgend welche Bedeutung beimessen darf. Isabellerche (Hgl.). Alauda deserti, *Lchtst.*; A. isabellina, *Tmm.* [nec *Loche*]; A. lusitanica, *Dgl.*; Melanocórypha arabs et galeritata, *Br.* — Die rückenstreifige Lerche [Alauda cinctuta] „ist", sagt Heuglin, „durch geringere Größe, kleineren zierlichen Schnabel, viel lebhaftere Färbung und besondre Schwingen- und Schwanzzeichnung von der vorigen durchaus verschieden. Während der vorherrschende Farbenton bei jener roströthlichgrau ins Rauchfarbne geht, ist er bei dieser reiner, roströthlichisabellfarben; die Schwingen und Steuerfedern sind bei ihr lebhaft hell rostfarben, erstere nur mit rauchschwärzlicher Spitze, ihre Ränder und die Deckfedern sind schärfer abgegrenzt weißlich; die Unterseite ist reiner weiß. Sie lebt gewöhnlich parweise im wärmeren Arabien, dem mittleren und südlichen Nubien, am Rande des Kulturlandes und in der Steppe, namentlich auf steinigem Boden; sie scheint nicht zu wandern." Dr. Dohrn traf sie auf einer der kapverdischen Inseln, Santjago, an, wo sie auf der Hochebene um Porto Praya nicht selten vorkommt. E. v. Homeyer scheidet sie in zwei Arten, die fahle oder Sandlerche (Alauda pallida, *Lchtst.*) und die rückenstreifige Lerche (Alauda cinctuta*), *Gld.*), welche jedoch

*) Cinctura = Gürtel; das entsprechende Adjectiv ist cinctuta.

nach der Meinung der meiſten anderen Autoren als übereinſtimmend zuſammenfallen. Heuglin ſtellt dann noch eine Alauda fraterculus, *Trstr.*, als beſtimmte Art hin, wahrſcheinlich bilden ſie jedoch alle drei zuſammen eine Art. Sandlerche (Br.). Alauda cinctura, *Gld.*; A. regulus et Ammómanes fraterculus, *Trstr.*; Alauda pallida, *Lchtst.*; A. arenícolor, *Sndvll.*; A. elegans, *Br.* — **Die rothbäuchige Lerche** [Alauda phoenicura] wird nach Jerdon auf der ganzen indiſchen Halbinſel gefunden und zwar in offenen Ebenen, gepflügtem Lande, Stoppelfeldern, auch an öden Stellen, Flußbetten u. a. „Nur ſelten ſetzt ſie ſich auf Gebüſch. Ihr angenehmes, lautes, flötendes Lied, deſſen Grundton wie tu-whii (to-whee) erklingt, läßt ſie in die Luft ſteigend erſchallen, ſetzt es, herabgekommen, als leiſes Gezwitſcher auf der Erde fort und wiederholt dies Spiel mehrmals. Sie ernährt ſich hauptſächlich von verſchiedenen Sämereien und frißt gelegentlich auch Inſekten." Ebenſo ſchildert Sykes das Flugſpiel des Auf- und Niederſteigens. Das Neſt wird nach Tickell auf Wieſen zwiſchen hohem Graſe ſehr verſteckt als eine flache Mulde angelegt und enthält vier längliche ſtumpfſpitze, grünlichweiße, hell- und dunkelbraun gepunktete Eier. Der Genannte fand es im Juni. Sie ſoll der Wüſten- und der rückenſtreifigen Lerche ſehr ähnlich ſein, ſich jedoch namentlich durch einen überaus langen und ſtarken Schnabel unterſcheiden. Ammómanes phoenicura, *Frnkl.* [Red-bellied Lark, *Jerd.* — Ageea, in Hindoſtan, nach *Blyth.*; Koowan Leepee, in den Ebenen, nach *Tick.*]. — Eine nahverwandte Lerche, Alauda phoenicuroides, *Blth.*, führen Horsfield und Moore als ſelbſtändige Art auf, während andere Schriftſteller ſie neuerdings ohne weitres mit der Wüſtenlerche zuſammenwerfen.

Die Theklalerche [Alauda Theklae], in Spanien und Portugal heimiſch, iſt unſerer Haubenlerche ähnlich, doch ſo verſchieden, daß ſie als beſondre Art erachtet wird, was freilich mit voller Sicherheit nicht feſtgeſtellt worden. „Ihre Färbung iſt der der Baumlerche ähnlicher als der irgend einer Haubenlerche mit Ausnahme der abeſſiniſchen. Oberſeits iſt ſie tief ſchwarzbraun mit ſchmalen roſtgelblichen und roſtröthlichen Rändern, ſodaß ſie faſt eintönig dunkel erſcheinen mit Ausnahme des Hinterhalſes, deſſen Federränder breiter hell ſind. Die Unterſeite iſt roſtgelblichweiß mit vielen ziemlich großen braunſchwarzen Längsſtreifen; Schwanzfedern tief bräunlichſchwarz, die beiden erſten lebhaft roſtroth, die beiden mittelſten ſchwarzbraun; Füße fleiſchbraun. In der Lebensweiſe weicht ſie von der Haubenlerche ab, indem ſie die Wege vermeidet und dagegen bebuſchte Berge liebt, auf denen ſie bis zu etwa 1600 Meter Meereshöhe anſteigt." (E. F. v. Homeyer). Zu Ehren ſeiner verſtorbnen Tochter gab ihr Chriſtian Ludwig Brehm den lateiniſchen Namen, welchen der jüngere Brehm dann in Lorbeerlerche verwandelt hat. Auf den Balearen beobachtete ſie Alex. v. Homeyer und ſchildert ſie in folgender Weiſe: „In der Ebene, namentlich auf dem fruchtbaren Felde kannte ich ſie nicht; am Fuße des Gebirges zeigt ſie ſich zuerſt, an den Abhängen iſt ſie überall häufig und ſelbſt auf den kahlen Kamm der höchſten Ketten ſteigt ſie hinauf, um auf Felsblöcken ſitzend ebenſo wie die Felſendroſſeln ihren traurig erklingenden Geſang hören zu laſſen; man trifft ſie hier allenthalben im Gebüſch, an kleinen offenen Stellen. So wie in Deutſchland die Haubenlerche auf der Dachfirſte läuft und die Bewohner des Gehöfts durch ihren Geſang erfreut, alſo ſingt ſie hier wie eine Haidelerche vom Baum herab, aber ihr Geſang iſt ein ganz andrer. In den klagenden Tönen übertrifft ihr Geſang den der letztern noch bedeutend; auch iſt derſelbe durchaus verſchieden von dem der Haubenlerche, er erklingt ſo weich, klagend und ſilberrein wie bei jener, aber noch melancholiſcher und dann, was den ganzen Vortrag anbetrifft, ſtehen die Strofen zur Tonweiſe in engſter Harmonie. Ich kenne kaum etwas ſchöneres, als den gefühlvollen Geſang dieſer Lerche, während im Vergleich dazu der oft ſchreiende Ton und die Sangweiſe unſrer Haubenlerche mir oft zuwider war. Den ſchreienden Lockton, der ja hier zu Lande auf Regen deuten ſoll, hörte ich niemals, dafür eine wehmüthige Klage, trüi, trüi, trüii ähnlich, aber nicht ſo ſtark und ſchreiend wie bei der Kalanderlerche. Schließlich bemerke ich noch, daß ich den Geſang, als ich ihn zuerſt hörte, durchaus nicht für den einer Haubenlerche halten wollte." Gleichviel ob ſie als ſelbſtändige Art oder blos als eine Spielart betrachtet werden darf, ſo

hat sie für die Liebhaberei nur das Interesse, daß sie wol über kurz oder lang von Reisenden oder Händlern eingeführt werden und dann durch ihren absonderlich schönen Gesang die Liebhaber erfreuen kann. Deshalb habe ich sie hier mitgezählt. Galerita Theklae, *L. et A. Br.* — **Die abessinische Lerche** [Alauda abyssinica, *Rpp.*, nec *Vrrx.*] „ist der vorigen sehr ähnlich, doch dunkler, fast schwarzbraun, jederseits zwei sehr deutliche Bartstreifen; unterseits rostgelblichweiß. In der Gestalt und Befiederung gleicht sie mehr der Haubenlerche; der Schnabel und die Füße sind im Verhältniß zur Größe außerordentlich stark; erstere ist zugleich sanft und gleichmäßig gebogen." (E. F. v. Homeyer). Es ist ebenfalls nicht mit Sicherheit nachgewiesen, ob sie als feststehende Art betrachtet werden darf. — **Die kleinhäubige Lerche** [Alauda micrólopha, *Rss.*] aus Abessinien; auch der Theklalerche ähnlich, doch in der Gestalt mehr der Haidelerche; oberseits dunkel, unterseits schmutzigrostgrau. Ein Exemplar befindet sich im Heine'schen Museum; sonst ist nichts bekannt. Galerita microcristata, *Hmr.* — **Die gelbe Lerche** [Alauda flava, *Br.*] „ist oberhalb lebhaft wüstengelb mit sehr wenig bemerkbarer dunkler Federmitte auf dem Kopfe; Schwanzfedern roströthlichdunkelbraun, an der Außenfahne bräunlichrostgelb; unterseits wenig lichter mit großen dunklen Flecken auf Unterhals und Brust; Füße und Schnabel hell." (E. v. Homeyer). „Sie scheint", sagt Heuglin, „im Gegensatz zur gemeinen Haubenlerche die eigentlichen Wüsten Nordostafrikas, namentlich Nubiens und Kordofans zu bewohnen." Sie soll übrigens eine sehr angenehme Sängerin sein. Bisher ist sie lebend noch nicht eingeführt. — **Die isabellfarbne Lerche** [Alauda isabellina, *Loche*] aus Ostafrika, „der vorigen wiederum ähnlich, doch die Rückenfedern mit etwas dunklerer Mitte und die Kopffedern oft sehr dunkel, namentlich bei den Exemplaren aus Nordostafrika, weniger bei denen aus Algier. Bei den letzteren ist die Unterseite der Flügel weißgrau, bei den abessinischen rostgelb; die eigenthümliche Haube ist kurz." (E. v. H.). Nach Taczanowski findet man sie selten tief in der Wüste, sondern meistens auf Sanddünen, an den mit Steinen bedeckten Hügeln, und A. L. Adams sagt, daß sie an steinigen Plätzen, so z. B. in der Todtenstätte von Theben und in dem Thale, welches zu den dortigen Königsgräbern führt, gemein sei. Sie ist bisher weder eingeführt, noch hat sie in irgend einer Beziehung die Aussicht, Bedeutung für die Liebhaberei zu gewinnen. Galerita abyssinica, *Vrrx.* [nec *Rpp.*]. — **Die sandfarbige Lerche** [Alauda arenícola, *Trstr.*] aus den algerischen und tunesischen Wüsten ist ziemlich dunkelgrau, nur schwach rostgelblich angeflogen, mit fast reinweißer, leicht roströthlich überhauchter Unterseite, mit schwarzbraunen scharfen Brust- und Halsflecken und sehr rostfarbner Schwanzzeichnung, welche auch die Spitzen der tiefschwarzen Steuerfedern in sehr deutlichem Endsaume einnimmt; um das Auge rings ein weißer Kreis (nach Tristram). „Am südlichen Abhange des Atlas von Batna findet man sie als die vorherrschende Lerche, welche sich durch helle sandähnliche Farbe auszeichnet, fleckig an der Brust, jedoch nicht auf dem Bauche, welcher sandfarben ist. Sie zeigt sich gemein und als die einzige Lerche auf der ganzen Anhöhe von Elkantara." (Taczanowski). — **Randon's Lerche** [Alauda Randoni, *Loche*] aus den Hochebenen von Marokko und Algier; sehr kräftig und durch eine eigenthümliche Haube ausgezeichnet, welche aus sehr vielen langen, schmalen, dunklen, heller gesäumten, sich bis auf den Vorderkopf ausdehnenden Federn besteht; ihre Oberseite ist bräunlichsandgelb, dunkler in der Mitte, lichter am Rande jeder Feder, die beiden äußersten Schwanzfedern im Sommer weiß, im Winter rostroth gezeichnet; unterseits hell, fahl weiß, nur an Seiten und Brust zart rostroth; Unterhals und Oberbrust rostgraubraun schaftfleckig. (Nach Hmr.). Die Exemplare, welche Drake in den Hochebenen Marokkos fand, waren dunkler und mehr rostfarben als die aus Algier, wo sie vornämlich wohnt. Galerita macrorrhyncha, *Trstr.* — **Dupont's Lerche** [Alauda Duponti, *Vll.*], heimisch in der Sahara u. a. Theilen des nordwestlichen Afrikas. Sie erscheint am Rücken buntgescheckt, indem die schwarzbraunen Federn rostgelbe und rostgraue Ränder haben; Streif über das Auge bis zum Hinterkopf rostgelblichweiß; Unterseite ebenso, Unterbrust roströthlich, Seiten roströthlichgrau; Brust und Hals schwarzbraun schaftstreifig; Schwanz braunschwarz; Seitenfedern weiß gezeichnet (Hmr.). Bogenschnabellerche (Br.). Alauda ferruginea. *v. d. Mhl.* — **Die dickschnäblige Lerche** [Alauda crassirostris, *Vll.*] aus Südafrika, oberhalb fahl erdbraun, jede Feder schwarzbraun schaftfleckig; Zügel- und Schläfenstreif gelblich-

weiß, Bartstreif schwärzlich, Wangen bräunlich; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun fahl außengesäumt; ganze Unterseite gelblichweiß, an Kehle, Brust und Seiten breit schwarzbraun schaftfleckig. Der bräunlichhorngraue Schnabel ist viel dicker als der der näher verwandten gem. Haubenlerche. Sie ist am Vorgebirge der guten Hoffnung überall häufig und auch bereits lebend nach Europa gebracht, indem sie im zoologischen Garten von London i. J. 1867 vorhanden war. Da sie eine angenehme Sängerin sein soll, so wäre ihre fernere Einführung immerhin erwünscht. Drosselerche, Dickschnabellerche (Br.).

Alle diese letzteren Vögel, von der Thekla- bis zur dickschnäbligen Lerche, zeigen einen mehr oder weniger auffallenden Federschopf, und daher sind sie eigentlich als Haubenlerchen (Galerita) einheitlich in eine Gruppe zusammenzufassen. Sie zeigen sich jedoch weder inhinsicht der Lebensweise, bzl. der Ernährung, Fortpflanzung, des Gesanges u. s. w., noch des Gefangenlebens abweichend von den Lerchen überhaupt.

Die Alpenlerche [Alauda alpestris].

Im Jahre 1874 erhielt ich von Fräulein Hagenbeck sechs Lerchen, welche mir in der Vogelstube große Schwierigkeiten bereiteten, da sie bei der geringsten Veranlassung emporschnellend mit den Köpfen gegen die Decke flogen und sich erst nach außerordentlich langer Zeit soweit beruhigten und eingewöhnten, daß man ohne Befürchtung ihnen nahen durfte. Bevor ich sie im Gefangenleben weiter schildere, sei ihre Beschreibung gegeben und zwar, da die Exemplare in meiner Vogelstube anfangs entfiedert und abgestoßen waren, nach der Mauser aber viel heller wurden, im wesentlichen nach der des Herrn Dr. Lazarus:

Auf den ersten Blick fällt die eigenthümliche Zeichnung des Kopfes und Halses auf. Die Stirn ist hellgelb, ebenso ein breiter Streif über dem Auge; auf dem Scheitel verläuft ein noch breiteres sammtschwarzes Band, welches sich an beiden Seiten in $0{,}5^{cm}$ lange, hervorstehende Spitzen verlängert, die dem Kopfe ein gehörntes Aussehen geben; Zügel und breiter Wangenstreif unterhalb des Auges ebenfalls sammtschwarz; der Oberkopf ist olivengrünlichgraubraun, nußbraun schaftfleckig, Hinterhals matt zimmtrothbraun; Rücken olivengrünlichgraubraun, dunkel nußbraun schaftfleckig; Schulterdeckfedern graulichweinroth, schmal weißlich endgesäumt, größere Flügeldecken und Schwingen olivengrünlichgraubraun, ebenso schmal weißlich endgesäumt; obere Schwanzdecken röthlichzimmtbraun, Schwanzfedern schwarz, bräunlich endgesäumt, die beiden äußersten mit schmalem weißen Außensaum; Kehle und ein breiter Streif gegen den Oberhals hin gelb, über den Hals ein breites sammtschwarzes Band, welches sich nach beiden Seiten zu verschmälert und daher schildförmig erscheint; Oberbrust weiß, hellgraubraun gefleckt; Unterbrust und Bauch silberweiß; die Federn der Brust- und Bauchseiten sind an der Wurzelhälfte schwarz; untere Flügelseite gelblichweiß; untere Schwanzdecken graulichweinroth, schmal weißlich endgesäumt; Schnabel schwärzlichgrau, Unterschnabel grünlichhorngrau mit schwarzer Spitze; Auge braun; Füße bräunlichfleischroth. Größe etwas geringer als die der Feldlerche. Das Weibchen ist am Oberkopf dunkelschaftstreifig, die schwarze Kopfbinde fehlt, der Fleck an den Kopfseiten und das Schild an der Oberbrust sind kleiner und durch helle Federspitzen weniger reinschwarz; die Brust ist matt schaftstreifig. Ihre Heimat erstreckt sich über den Norden von Europa, Asien und Amerika und als Wandrer kommt sie bis ins südliche Rußland und zur Mitte Europas vor.

Sie gehört zu den Vögeln, welche den ältesten Schriftstellern bereits bekannt waren. Edwards, Seeligmann, Frisch, Klein, Brisson, Buffon, Pennant, Latham und viele Andere geben Schilderungen, Abbildungen oder

wenigstens kurze Beschreibungen. Bechstein sagt nicht viel über sie; er hatte keine lebendig erhalten können. Dr. Bolle zählt sie in seinem Verzeichniß garnicht mit.

Kaum ein andrer außereuropäischer Vogel bietet eine solche außerordentlich reiche Fülle von Mittheilungen über das Freileben seitens der Reisenden und Naturforscher bis zur neuesten Zeit herab. Heuglin sagt folgendes: „Die Alpenlerche gehört zu den ziemlich häufigen Vögeln von Novaya Semlja und Waigatsch. Wie weit sich ihr Verbreitungsbezirk auf der Nordinsel ausdehnt, kann ich nicht angeben. Sie hält sich par- und familienweise auf trockenen sonnigen Gehängen in Schluchten und Wasserrinnen, selten auf Wiesenland und unmittelbar am sandigen Meeresstrande auf. In der ersten Hälfte des September sammeln sie sich zum Abzuge nach dem Süden. Die Mauser der Alten tritt zu Ende des August und Anfang Septembers ein. Einzeln vorkommende fand ich sehr flüchtig und lichtscheu. Der Lockton besteht in einem sanften Schwirren, das wie wiriwit klingt." Nach Nilsson's Mittheilungen über die Vögel Skandinaviens berichtet Gloger: „Diese Art liefert ein recht schlagendes Beispiel der Veränderungen, welche innerhalb der Fauna vor sich gehen. Sie ist, soweit man ihre Geschichte verfolgen kann, fortwährend weiter nach Westen vorgerückt. Pallas gibt an, daß sie zu seiner Zeit in ganz Sibirien häufig war. Von dort hat sie sich allmälig in die nordöstlichen Länder Europas hereingezogen und zwar durch Rußland nach Lappland. Aber vor ungefähr 20 (jetzt also 40) Jahren war kaum ein einziges Exemplar innerhalb der Grenzen der Skandinavischen Halbinsel gefunden. Der erste, welcher sie hier sah und schoß, scheint Professor S. Lovén gewesen zu sein, der einen Flug bei Wadsö in der Ostfinnmark antraf. Nachher wurde sie von Herrn Löwenhjelm bei Quickjock nistend gefunden und ebenso in den Jahren 1841 bis 1843 auf sumpfigen Alpenhaiden zwischen Mortensnäs und Wadsö. Seitdem sie ihre Sommerwohnplätze und Niststellen soweit nach Westen verlegt, hat sie auch begonnen, sich während ihrer Wanderzeit in Landstrichen zu zeigen, die weit südwärts von jenen liegen und in denen sie früher nie wahrgenommen. Bereits i. J. 1840 wurden mehrmals einzelne bei Kalmar, Ystadt, Lund u. a. geschossen, und 10 Jahre später fingen sie an, in Flügen von 50 bis 60 Köpfen in Schoonen zu erscheinen." Nach und nach verbreiteten sie sich dann dort immer weiter und alle Beobachter stimmen darin überein, daß sie stets nur sandigen, niemals aber lehmigen oder sonst fruchtbaren Boden aufsuche, selbst dann nicht, wenn der eine wie der andre mit Schnee bedeckt ist. Mit Recht gebührt ihr daher der Name Sandlerche, welchen die Bewohner der Ostfinnmark ihr beilegen. Ueber ihr Vorkommen in Lappland theilt nach Schrader's Beobachtungen Pastor W. P. Paeßler mit, daß sie in den ersten Tagen des Mai, sobald die Sonne das Land nur stellenweise vom Schnee befreit hat, in

kleinen Gesellschaften ankommt. Man trifft sie auf den freien großen trockenen Flächen mittelhoher Gebirge, ebenso wie in den Thälern dicht an der Meeresküste; überall aber liebt sie sandige, mit kurzem Rasen bewachsene Stellen. Ihre Nahrung besteht in Sämereien und Insekten und in ihrem Benehmen hat sie viel Aehnlichkeit mit der Feldlerche, doch steigt sie nicht wie jene singend in die Luft. Ueberhaupt hört man eigentlich nie einen rechten wirklichen Gesang, sondern blos ein leises Zirpen. Kommt man in die Nähe des Nestes, so lassen sie einen sanft klagenden Ruf erschallen, dem Tone des Seidenschwanz ähnlich. Etwa in der Mitte des Juni steht das Nest meistens an einer unbewachsenen Stelle in einer kleinen Vertiefung und es gleicht keineswegs den am wenigsten künstlichen ihrer Gattungsverwandten, sondern es ist in der That schön zu nennen. Es besteht aus groben, nach innen zu jedoch aus feineren Hälmchen und sein tiefer Napf ist mit Pflanzenwolle und zarten Samenhülsen sorgsam ausgelegt. Fünf Eier bilden gewöhnlich das Gelege. Man findet das Nest ebensowol am flachen Meeresufer als auch in 160 bis 200 Meter Meereshöhe. Im Herbste schlagen die Vögel sich zu Scharen von 40 Köpfen und darüber zusammen; dann sind sie in der Regel sehr fett, wenig scheu und leicht zu fangen. Auch v. Nordmann fand sie brütend in Lappland, im südlichen Finnland dagegen nur während des Durchzugs. Dybowski und Parrey erlegten sie bei Daraſun in Daurien auf dem Vorbeifluge im Herbst, und Radde fand sie am Baikal in den Hochsteppen Dauriens im Selengathale am Gänsesee und in den sajanischen Alpen nistend, im Amurlande dagegen nur durchziehend; gleicherweise traf sie Schrenck dort wandernd. In Ostsibirien erscheint sie nach Dybowski vom 9. bis 30. Mai und dann auf dem Durchzuge wiederum vom 10. September bis 6. Oktober. Auf der Reise nach Westsibirien beobachtete sie Dr. Finsch an mehreren Orten. Im Umanschen Kreise kommt sie nach Goebel als regelmäßiger Wintergast zwischen Ende Oktobers bis Mitte Novembers an und dann ist sie auf jeder Landstraße in großen Scharen zu sehen. Auf dem Markte von Odessa fand er sie im strengen Winter sehr zahlreich und zwar in der Nähe der Stadt gefangen oder geschossen. Ebenso beobachtete sie Radde im südlichen Bessarabien, selbst im schneereichen Winter sehr häufig, während sie im Chersonschen Gouvernement fehlte. In der Krimm dagegen war sie vorhanden. Eversmann traf sie nordwärts bis Orenburg, selbst in den Vorgebirgen des Ural, soweit steppenartige Anhöhen vorhanden sind. Sie komme, sagt er, im Altai in großer Anzahl vor, und überwintre auch dort, aber nur in Steppen oder anderen baumlosen Gegenden. Im südlichen Ural und den angrenzenden nördlichen Orenburgischen Steppen bleibe sie nicht den Winter hindurch, weil dort gewöhnlich der Schnee zu tief liege; sie erscheine bereits im März, sobald der Schnee zu thauen beginne, und späterhin finde man sie überall in den Steppen, wo hinreichender Kräuterwuchs ist, jedoch in den östlichen häufiger

als in den westlichen. Die im Namen ausgesprochene Annahme, daß sie ein Gebirgsvogel sei, beruhe auf einem Irrthum; „ich habe zwischen der untern Wolga und dem Uralfluß und ebenso in südlicheren Gegenden im Mai bis August viele Exemplare erlegt, wo sie also zweifellos nisteten. Nach Dr. Krüper ist als Seltenheit bei Smyrna in Kleinasien ein altes Männchen erlegt worden. In China weilt sie während der kalten Jahreszeit nach Swinhoë's Angaben in den nördlichen Theilen der Provinz Chelee. Was Amerika anbetrifft, so gibt Baird eine Beschreibung seiner gehörnten Lerche nach Exemplaren, welche in Pennsylvanien und Wiskonsin gesammelt worden. Im letztern State brüte sie und vielleicht auch noch weiter südlich. Auf Grönland kommt sie nach J. Reinhardt's Angaben vor, und auf den Bermudainseln hat sie E. v. Martens im Winter 1849—50 erlegt. Nicht selten ist sie auf Helgoland, wo sie nach Gätke gefangen und manchmal für wenige Groschen zum Kauf angeboten wird. Dr. Bolle erzählt über den dortigen Lerchenfang im allgemeinen folgendes:

„Da der Winter schneelos und mild und die Erde fast immer grün ist, so überwintern die Lerchen massenweise auf der Insel. In dunklen regnigten Nächten, zumal während des Zuges stoßen sie mit dem Kopfe wie Nachtfalter gegen die hellschimmernden Scheiben des Leuchtthurms, fallen betäubt nieder und werden unten mit Käschern zu Tausenden gefangen. Die Lerchensuppen, welche man aus ihnen bereitet, sind nicht ohne Ruf. Mit den Feldlerchen zugleich finden sich auch in jedem Jahre eine Anzahl von Alpenlerchen ein. Ich habe in den Helgoländer Naturalienkabineten viele von den letzteren ausgestopft gesehen." Gleicherweise ist sie nach Ferdinand v. Droste-Hülshoff auf der Nordsee-Insel Borkum mehrmals beobachtet worden. Im April 1868 sah der Grenzaufseher Ahrens fünf Köpfe, von denen er zwei erlegte. Auch auf Husum überwintert sie. Ueberblicken wir nun ihr Vorkommen in Deutschland, so finden wir zunächst die Mittheilung des Herrn Professor Altum, daß bei Gimbte im Münsterlande im Januar 1861 ein Exemplar auf dem Schnee geschossen worden; der einzige bisher festgestellte Fall ihres Vorkommens in jener Gegend. C. Wüstney berichtet, daß in Mecklenburg nahe bei der Stadt Schwerin im Januar 1860 bei sehr strenger Kälte ein Pärchen mehrere Tage hindurch beobachtet worden, und Herr Steenbock legte der Versammlung der Ornithologen Mecklenburgs ein Pärchen vor, welches im Januar 1855 bei Rostock erlegt worden. Nach Professor Borggreve's Angaben erscheint sie fast allwinterlich in Flügen auf Rügen und Hiddensoë. Schon Naumann hatte angegeben, daß sie in der Umgebung von Berlin vorgekommen sei, und dies bestätigte Dr. Karl Bolle u. A., nachdem der Vogel in der Mark Brandenburg bei Neustadt-Eberswalde und an anderen Orten mehrmals gesehen und erlegt worden. Dr. Luchs sagt, daß sie bei Warmbrunn im Gebirge in jedem Winter erscheine, und

A. v. Homeyer erlegte ein Exemplar bei Görlitz und schenkte es der dortigen naturforschenden Gesellschaft, worauf bekannt wurde, daß R. Tobias im Januar 1828 ebenfalls drei Köpfe geschossen, daß dies aber in der Zwischenzeit von 40 Jahren nicht geschehen sei, doch soll sie mehrfach in der Gegend von Herrenhut gefunden sein. Professor Fritsch, R. v. Tschusi-Schmidhofen u. A. bestreiten, daß sie im Riesengebirge regelmäßig erscheine oder gar niste. Sie werde von den Bewohnern mit dem Wasserpieper verwechselt, welchen man dort allgemein als Schneelerche bezeichne. Unter den Vögeln Böhmens, sagt der Erstre, sei sie nur als seltner Gast zu betrachten. Im Jahre 1877 soll sie im Februar seit Menschengedenken zum erstenmale in der Bukowina vorgekommen sein, indem nach Mittheilung des Herrn Dr. Lazarus ein Vogelfänger mehrere Köpfe in Czernowitz auf den Markt brachte. Wie die Gebrüder Sintenis angeben, kommt sie in der Dobrudscha auf dem Frühlingszuge mit Kalanderlerchen zusammen vor, jedoch nur selten. In der Gefangenschaft ist sie erst in der letztern Zeit beobachtet worden. Dr. Lazarus, der sie eine der schönsten Lerchen nennt, sagt folgendes: „Im Käfige zeigt sie ein ebenso scheues Wesen, wie die frischgefangne Feldlerche; sie läuft unermüdlich in demselben umher und schnellt bei menschlicher Annäherung gegen die obere Decke empor. Nicht jede geht sogleich ans Futter, sondern manche verhungert, wenn sie nicht gestopft wird. Ich habe sie einzugewöhnen versucht mit lebenden Mehlwürmern, Hafer und weißer Hirse. Gegenwärtig reiche ich als Futter ein Gemenge aus trockenen Ameisenpuppen und frischem Käse oder Quark, ferner die genannten Sämereien und gequetschten Hanf. Der Gesang, den manche fleißig vortragen, ist sehr zart und angenehm und nicht so gellend wie der von der Feldlerche, wodurch wenigstens für mich die erste werthvoller erscheint.“ Herr Prediger Böck in Danzig klagt ebenfalls darüber, daß ein im großen Käfige mit anderen Vögeln zusammengehaltnes Männchen anfangs außerordentlich wild sich zeigte und auch späterhin niemals so zahm wurde wie die Genossen. Es überschlug die Herbstmauser und starb dann im Frühjahr beim Beginn eines unregelmäßigen Federwechsels — wie dies bei vielen Vögeln in der Gefangenschaft bekanntlich leider nicht selten geschieht. In meiner Vogelstube hielten sie sich vortrefflich. Trotzdem ich sie pärchenweise trennte, ihnen alle möglichen Nistvorrichtungen, die mannigfaltigste Nahrung, auch Grünkraut u. drgl. bot, gelangten sie jedoch nicht zur Brut, ja nicht einmal einen Nistversuch habe ich wahrnehmen können. Nachdem ich sie etwa ein Jahr hindurch beherbergt, gab ich sie an Fräulein Hagenbeck zurück. Sie sind nach meinen Erfahrungen wol ausdauernd in der Gefangenschaft und werden mit der Zeit auch ruhiger; hält man sie jedoch in Gesellschaft oder parweise zusammen, so singen sie fast garnicht, indem immer eine die andre unterbricht. Nur das einzeln im zweckmäßig eingerichteten Käfige verpflegte Männchen

läßt ſich als fleißiger Sänger hören und man darf das freilich ſehr leiſe ertönende Lied zu den beſten unter denen aller Verwandten zählen. Da in letztrer Zeit alljährlich ziemlich regelmäßig größere Transporte ruſſiſcher Vögel von Gleitzmann u. a. Händlern zu uns gelangen, ſo wird hoffentlich auch dieſer hervorragende Sänger für die Liebhaber mehr zugänglich ſein. Im zoologiſchen Garten von London iſt er ſeit dem Jahre 1868 vorhanden. Sonſt findet man ihn freilich nur ſelten in den derartigen Naturanſtalten; das Berliner Aquarium hatte zur Zeit der erſten Direktion vom Händler Stader einmal vierzehn Köpfe erhalten, welche jedoch ſämmtlich bald ſtarben. Noch weniger aber dürften ſie bisher ſchon in die Vogelſtuben gelangt ſein, während ſich andrerſeits Züchtungsverſuche mit ſolchen Lerchen freilich ſo undankbar zeigen, daß die meiſten Liebhaber darauf verzichten, ſolche anzuſtellen. Der Preis iſt trotz der Seltenheit gering, etwa 6, höchſtens 9 Mark für den Kopf.

Die Alpenlerche heißt auch Berg-, Gürtel-, Prieſter-, Schnee- und Winterlerche und ruſſiſche Berglerche. [Gelbbärtige Lerche aus Virginien und Karolina, gelbköpfige Lerche, virginiſche Lerche, gelbbärtige nordiſche Schneelerche, türkiſche Lerche und Uferlerche, nach alten Autoren].

L'Alouette des Alpes; Shore Lark or Sky Lark.

Nomenclatur: Alauda alpestris, *L.*, *Frstr.*, *Wls.*, *Bp.*, *Nttll.*, *Audb.*, *Jard.*; Alauda flava, *Gml.*; Alauda cornuta, *Wls.*, *Rchrds.*, *Swns.*; Alauda nivalis, *Pll.*; Eremóphila cornuta, *Boie*, *Brd.*; Philéremus cornutus, *Bp.*; Ph. alpestris, *Bls.* et *Ksl.*, *Gld.*, *Hrtl.*; Otócorys alpestris, *Bp.*, *Gr.*, *Cb.*, *Br.* [Alauda hyemalis seu nivalis, *Frsch.*; A. gutture flavo Virginiae et Carolinae, *Kln.*; A. virginiana, *Brss.* — L'Alouette de Virginie, *Briss.*, *Buff.*; le Hausse-col noir, *Buff.*]

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 619.

Alauda alpestris: fronte striaque supra oculum sulfureis; vitta lata trans verticem atra, utrinque in apices $0{,}5^{cm.}$ prominentes decurrente, caput quasi cornutum simulante; loris striaque lata genarum subter oculum aterrimis; pileo olivaceo-viride fumido, umbrino-maculato; collo postico subcinnamomeo; dorso olivaceo-viride fumido, fusco-striolato; scapularibus griseo-rubiginosis; albido-terminatis; tectricibus al. majoribus remigibusque olivaceo-viride fumigatis, albido-terminatis; supracaudalibus rubente cinnamomeis; rectricibus nigris, subfusco-terminatis, ambabus extimis exterius albicante limbatis; gula striaque ad collum versus flavis, fascia lata trans collum scutiformi aterrima; gutture albo fumigato-maculato; epigastrio ventreque albissimis; dimidio plumarum pleurarum et hypochondriorum basali nigro; subalaribus ex gilvo albis; supracaudalibus griseo-rubiginosis, albicante terminatis; rostro subnigro-cinereo, apice mandibulae virente corneae nigro; iride fusca; pedibus subfusco-carneis. — ♀ pileo obscure striato; fascia capitis nigra nulla; macula capitis laterali scutoque pectorali minoribus, subnigris; pectore elute vittato.

Länge $16{,}4 — 16{,}6^{cm.}$; Flügel $8{,}9 — 10{,}3^{cm.}$; Schwanz $6{,}1 — 6{,}4^{cm.}$

Jugendkleid: Die Federn des Kopfes, der Halsſeiten, des Nackens, Oberrückens und Bürzels, wie auch die Flügeldeckfedern ſind matt graubraun mit blaßgelber Einfaſſung; Schwung- und Schwanzfedern einfarbig matt bräunlich; Unterkörper weiß, jede Feder blaßgelb eingefaßt (Schrader).

Juvenis: plumis capitis, colli lateralis, cervicis, dorsi, uropygii alarumque tectricum subfumidis, gilvo-limbatis; remigibus et rectricibus unicoloribus subfuscis; subtus alba plumis singulis flavido-marginatis (*Schrd.*).

Beſchreibung des Eies: Grundfarbe gelblich mit unendlich feinen dunkler gelben Strichelchen, am dickern Ende nicht ſelten einen Fleckenkranz bildend. An manchen Eiern, die mit weniger in einander verſchwimmenden Flecken gezeichnet ſind, ſodaß ihre Grundfarbe licht durchſcheint, bemerkt man außerdem noch matte, ſchiefergraue Schalenflecke; viele Exemplare zeigen auch dunkelbraune Harzzüge. Die gelblich ausſehenden ſind am häufigſten. Es gibt aber auch noch andere, von weißgrauer Grundfarbe mit grauen matt ins Bräunliche ziehenden feinſten Pünktchen, manchen Baumlercheneiern nicht unähnlich. Noch andere ſehen grünlich aus und die nur etwas dunklere Fleckenzeichnung ſticht wenig vom Grunde ab. (Schrader).

Ovum: discolor; plerumque flavicans lineolis subtilissimis flavis, circa basin interdum coronulam maculosam fingentibus, nonnunquam dilutius coloratum, parcius elute maculatum, maculis nonnullis schistaceis ipsum lineolis capillaceis fuscis notatum; modo etiam canum punctulis subfumidis conspersum (ovis quibusdam Al. arboreae simile); modo virescens, vix obscurius maculatum (*Schrd.*).

Die Indianer-Lerche [Alauda chrysolaema] iſt der vorigen ſehr ähnlich, aber bemerkbar kleiner und von ungleich lebhafterer gelber Färbung an Kopf und Kehle. Baird will ſie daher auch kaum als beſondre Art betrachtet wiſſen. Ihre Heimat erſtreckt ſich über den Weſten von Nordamerika und Kalifornien. „Dieſe weſtliche Prärielerche", ſagt Prinz Max v. Wied, „habe ich in allen Gegenden des obern Miſſouri häufig beobachtet; bei Sioux Agenzy bemerkte ich ſie zuerſt. Sie lebt parweiſe, vereinigt ſich jedoch im Herbſt zu vielköpfigen Flügen, welche in den Prärien umherſtreifen, vor Eintritt der Kälte aber ſüdwärts wandern", und zwar nach Dr. Finſch bis Neu Granada. Im Jahre 1875 führte Herr Schöbel in Grünau eine kleine Anzahl ein, welche wol nicht in Vogelſtuben, ſondern in einen zoologiſchen Garten gelangt ſind; ich habe inbetreff ihrer nichts weiter erfahren können. Sie iſt ſicherlich in allem der vorigen gleich. Kleinere gehörnte Lerche (Prinz Wied). Hornlerche (Br.). Alauda chrysolaema, *Wgl.*; A. minor, *Grd.*; A. rufa, *Audb.*; Otócorys chrysolaema, *Cb.* — **Die zweiſchopfige Lerche** [Alauda bilopha] aus dem nordöſtlichen Afrika und ſüdweſtlichen Aſien iſt oberhalb hellröthlichbraun; Scheitelſtreif, eine Querbinde über die Stirn, welche an jeder Seite in eine hervorragende Spitze ſich verlängert, Zügelſtreif, Fleck an jeder Kopfſeite ſchwarz, Vorderkopf und Augenbrauenſtreif reinweiß; Schwingen und Schwanzfedern dunkler röthlichbraun, die erſteren heller außengeſäumt, die beiden mittleren Schwanzfedern lebhaft rothbraun; Kehle weiß; an der Oberbruſt ein großes ſchwarzes Schild; die ganze Unterſeite weiß, röthlichbraun angehaucht; Schnabel graubraun, Unterſchnabel gelbgrau; Auge und Füße braun. Größe der Haidelerche. Heuglin berichtet über ſie wie folgt: „Sie iſt ein Bewohner felſiger Gegenden und parweiſe oder in kleinen Scharen im peträiſchen und glücklichen Arabien, namentlich um die meiſt ſteil abfallenden Felsgebilde am Golf von Agabah zu finden, aber wie alle hierher gehörenden Arten nicht ein eigentlicher Gebirgsvogel. Ich beobachtete ſie im Monat April. Die Männchen treiben ſich ſelbſt während der heißeſten Tageszeit in den öden und glühenden Klüften der Steinwüſten umher. Ob ſie Standvogel iſt, kann ich nicht mit Sicherheit angeben; während der kalten Jahreszeit habe ich ſie wenigſtens in den weſtlichen und ſüdlichen Theilen der ſinaitiſchen Halbinſel niemals geſehen." A. v. Homeyer, der ſie in Algier beobachtete, ſagt mir, daß ihre Aehnlichkeit mit der Alpenlerche überraſchend ſei, und Taczanowski fügt hinzu: „Eine Schar von 8 Köpfen ſah ich nahrungſuchend in einem kleinen mit Pflanzen bedeckten Thale inmitten der ſteinigen Wüſte. Sie waren ſo wenig ſcheu, daß ich ſechs einzeln erlegte, während die lebendiggebliebenen nach jedem Schuſſe nur einige hundert Schritt weit fortflogen, ſich dort aber wieder auf Schußweite ankommen ließen." Näheres iſt über dieſen Vogel nicht bekannt. Ohrenlerche (Heuglin); Doppelhornlerche (Br.). Alauda bilopha, *Tmm.*; A. bicornis, *Hmpr.* — **Die Ohrlerche** [Alauda penicillata, *Gld.*] aus dem ſüdweſtlichen Aſien, iſt wiederum der Alpenlerche ſehr ähnlich, nur oberſeits mehr bräunlichgrau; Stirn, Augenbrauenſtreif und vordere Wangen ſind nicht gelb, ſondern weiß; ein Hauptunterſcheidungszeichen iſt aber, daß der breite ſchwarze Stirnrand ſich mit der gleichen Färbung der Kopfſeiten und dem Schilde

an der Oberbruſt vereinigt. Schnabel ſchwarz; Auge braun; Füße ſchwarz. Größe der Verwandten gleich. Das Weibchen iſt matter gefärbt, namentlich die Kopfbinde und die übrigen Zeichnungen. Nach Dickſon und Roß, welche ſie bei Erzerum beobachteten, ſtimmt ſie in der Lebensweiſe mit den vorhergegangenen überein. Im Winter kommt ſie aus den Bergen in die Thäler herab und zeigt ſich dann auf den Wegen in kleinen Scharen von drei bis zwölf Köpfen nahrungſuchend ſo dreiſt, daß man ſie mit einer Peitſche erſchlagen könnte. Dr. Stoliczka ſammelte ſie im Himalaya und in Thibet; Dybowski und Parrey fanden ſie in Daurien im Winter häufig, während des Sommers jedoch ſelten; erſtrer auch in den Steppen nahe beim See Koſogol brütend und in der Gegend von Daraſun in Oſtſibirien. Przewalski beobachtete ſie in Oſtaſien auf dem Wege nach Pecking hundert Werſte nördlich von Kirachta, ſpäter in größerer Zahl in Ohowi, in geringerer im nördlichen China. Otócorys scriba, *Bp.*; O. albigula, *Brndt.*; O. larvata, *De Flpp.* — **Die langſchnäblige Lerche** [Alauda longirostris, *Gld.*], welche namentlich durch bedeutendere Größe, längeren Schnabel und durch breite braune Schaftſtriche der Rückenfedern verſchieden ſein ſoll, ſtellen Horsfield und Moore als eine beſondre Art hin. Ebenſo wird von Severzow eine gelbkehlige Lerche [Alauda — Otocorys — petróphila] als etwaige ſelbſtändige Art bezeichnet, welche mit der Ohrlerche faſt völlig übereinſtimmend und nur durch eine gelbe Kehle verſchieden ſein ſoll; ſchließlich ſtellt letztrer auch noch eine weißkehlige Lerche [Alauda albigula, *Bp.* nec *Brndt.*] der Erwägung anheim. Sie ſeien ſämmtlich nebſt noch einer im „Ibis" 1876, S. 181 genannten Art, Brandt's Lerche [Alauda Brandti, *Drss.*], nur erwähnt.

Die aſſamiſche Lerche [Alauda assamica, *Mc. Cll.*] aus Indien iſt oberhalb fahlbraun, jede Feder mit dunkler Mitte und hellem Außenſaum; Schläfenſtreif ſchwach gelblichweiß, Wangen matt roſtröthlich; Schwingen olivengrünlichbraun, roſtroth innen- und außengeſäumt, Flügeldecken fahl gelblichroſtroth geſäumt, Schwanzfedern dunkelbraun, ſchmal fahl geſäumt; Oberbruſt hell gelblichroſtroth, dunkler ſchaftfleckig; ganze übrige Unterſeite fahl rothgelblichweiß; Schnabel graubraun, Unterſchnabel graugelb; Auge braun; Füße graugelb. Das Weibchen ſoll nicht verſchieden ſein. Die Größe iſt etwas geringer als die der Haidelerche. In der Nähe von Kalkutta iſt ſie nach Blyth gemein; ebenſo in Nepal. In der Gefangenſchaft zeigt ſie ſich nicht ſo lebhaft wie die Feldlerche und deren Verwandte, ſondern ſie erſcheint als ein ſchwerfälliger und träger Vogel, welcher ſich gern hinter anderen verbirgt, ſowie jedes Verſteck aufſucht. (Nach Horsfield und Moore). Auch um Muttra iſt ſie nach Phillips häufig zu finden, das Männchen gewöhnlich auf einer kahlen Erhöhung, von wo aus es ſeinen Geſang erſchallen läßt. Derſelbe beſteht in etwa acht Tönen, deren erſtere ſehr ſchnell, die letzteren aber langſam erklingen, etwa wie: twïi twïi twïi twïi twïi twïi twïii twïii (twĕe twĕe twĕe twĕe twĕe twĕe twēēē twēēē). Der Genannte ſah ſie dort auch niſtend. Sie läuft flink auf dem Boden, ſich hurtig verbergend, wo ſie nur irgend kann. Singend erhebt ſie ſich, jedoch nur bis zu geringer Höhe, in die Luft, ſchwebt langſam hernieder und ſetzt ſich dann auch wol auf Gebüſch. Nach Jerdon ſoll ſie bis in die Gärten der Stadt kommen, aber auch hier ſtets verborgen leben. Hoffentlich wird ſie gleich anderen indiſchen Verwandten über kurz oder lang lebend eingeführt werden. Buſchwaldlerche (Br.). Plocealauda typica, *Hdgs.*; Mirafra javanica, *Hdgs.* [nec Horsf.]; Alauda Aggia, *Hmlt.* [Finch Lark et Aggia Lark, *Lath.*; Aggia in Hindoſtan, nach *Hmlt.*; Bhatul in Muttra, nach Phillips]. — **Die rothbrüſtige Lerche** [Alauda affinis] ebenfalls von Indien und auch auf Zeylon. Sie ſoll der vorigen ſehr ähnlich, aber oberſeits dunkler erſcheinen, indem jede Feder einen breiten ſchwärzlichen Schaftſtreif hat; Oberbruſt und Seiten ſind fahl roſtroth und der Flügel hat eine roſtrothe Querbinde. Nach Jerdon's Mittheilungen iſt ſie auf Lichtungen an der Weſtküſte Indiens ſehr häufig zwiſchen Dſchungle-Dickichten und in Gärten zu finden. Ihr Neſt ſteht, wie Tickell angibt, gewöhnlich unter Grasbüſcheln auf Brachfeldern, auch an lichten Stellen im Dſchungle und gleicht im Bau, wie in der Färbung der Eier dem anderer Lerchen. „Auf Zeylon", ſagt Layard, „iſt ſie bei Tangalla nicht ſelten, niemals ſah ich ſie jedoch in den Bergen. Sie iſt von den anderen

Lerchen, bevor man sie in die Hand nimmt und genau betrachtet, nicht leicht zu unterscheiden; eine Gewohnheit im Freileben läßt sich jedoch sogleich erkennen. Aufgescheucht steigt sie nämlich empor, eine angenehme Melodie singend und richtet ihren Flug nach einem Baume, auf welchen sie sich, die Füße aufsetzend und stark mit den Flügeln schlagend niederläßt, während noch mit aller Kraft ihre Laute erschallen. In dem Augenblick jedoch, in welchem sie den Sitz, gewöhnlich den höchsten kahlen Zweig, mit den Füßen erfaßt, hört der Gesang auf und sie steht umschauend und zum Fluge bereit, um beim geringsten Geräusch davonzueilen." Sie ist seit dem Jahre 1872 bereits im Londoner zoologischen Garten vorhanden und wird daher gelegentlich auch wol mehr eingeführt werden. Buschlerche (Br.). Madras Bush Lark. Mirafra affinis, *Jerd.*; Alauda coromandelica, *Kv.*, *Hrtl.* [Leepee, in den Ebenen, nach *Tckll.*]. — **Die rothflügelige Lerche** [Alauda erythróptera, *Jerd.*] aus Indien, von den vorigen hauptsächlich durch ihre lebhaft rothen Schwingen verschieden, fand Jerdon im niedrigen Dschunglegebüsch in der Nähe von Jaulnah ziemlich gemein; ebenso ist sie außer in anderen ähnlichen Oertlichkeiten am Fuße der östlichen Ghats auch nicht selten in den Bergregionen. Niemals wird sie aber an offenen Stellen oder in den Gärten gesehen. Beim Niedersetzen auf einen Baum bemerkt man am ausgebreiteten Flügel ihre auffallend rothen Schwingen. Immer nur einzeln oder parweise vorkommend, verbirgt sie sich bei jeder Annäherung sogleich im Gebüsch. Ihre Nahrung besteht wie die anderer Lerchen in verschiedenen Sämereien. Der heimatliche Name Chinna Eely-jitta ist von ihrem Gesange abgeleitet, welcher nur in einem gedehnten Flötenton besteht. Näheres ist nicht bekannt, daher genügt diese beiläufige Erwähnung. Mirafra javanica, *Jerd.*, nec *Hrsf.*, nec *Hdgs.* [Red-winged Lark, *Jerd.* — Ageea und Junglee Ageea in Hindostan, Chinna Eeli-jitta in Telugu, nach *Jerd.*]. — **Die weißwangige Lerche** [Alauda cantillans, *Jerd.*] von Indien ist dunkelbraun, jede Feder röthlichbraun gesäumt; Augenbrauenstreif und Kopfseiten röthlichgelb, Wangen weiß; Flügel dunkelbraun, jede Feder schmal rostroth außen- und breit gelblichroth innengesäumt; Schwanzfedern bräunlichschwarz, die äußeren weiß gesäumt; Oberkehle reinweiß, Unterkehle weiß, breit dunkelschaftfleckig, ganze Unterseite fahlgelblich, zart röthlich überhaucht. Schnabel dunkelbräunlichgrau, Unterschnabel heller, gelbgrau; Auge braun; Füße düster gelbgrau. Das Weibchen soll übereinstimmend gefärbt sein. Größe etwa der Haidelerche gleich. Nach Jerdon ist sie sehr gemein in Carnatic, und wahrscheinlich auch im nördlichen Circars; selten jedoch im großen Flachlande von Südindien. Ihres besonders süßen und anmuthigen Gesanges wegen wird sie dort viel gefangen und im Käfige gehalten, namentlich geschieht dies mit den Jungen, welche auch die Lieder anderer Vögel nachahmen lernen. Ebenso ist sie, wie Blyth sagt, in Bengalen ein beliebter Käfigvogel, um ihres angenehmen, klagenden, wenn auch nicht wechselreichen Gesangs willen. In der Ernährung und Lebensweise gleicht sie der Feldlerche, auch schwingt sie sich wie jene singend in die Höhe. Weshalb sie Singlerche (Br.) heißen soll, ist mir unverständlich, da sie allerdings gleich allen Verwandten singt, jedoch keineswegs schöner, noch mit irgendwelcher Auszeichnung; ich glaube daher nicht, daß eine Uebersetzung des lateinischen Namens hier durchaus geboten ist. Alauda Cheendola, *Jerd.* [Agghun, in Hindostan, nach *Jerd.*]. — Die javanische Lerche [Alauda javanica, *Hrsf.*, nec *Jerd.*, nec *Hdgs.*] wird von einigen Forschern nur als eine örtliche Spielart, von anderen als selbständige Art bezeichnet. Bernstein sagt, sie komme sowol in den bergigen, als auch in den niedrig gelegenen Gegenden Javas vor, jedoch ebensowenig im Hochgebirge, wie im Innern der Wälder. Ihre Lebensweise gleiche der verwandter Arten; ihr Gesang, den sie niemals im Fluge, sondern stets auf einem niedrigen Strauch sitzend erschallen lasse, könne sich am wenigsten mit dem der Feldlerche messen, kaum mit dem der Haubenlerche, mit welchem er noch am meisten Aehnlichkeit habe. Uebrigens sei sie die einzige Lerchenart im indischen Archipel. — **Horsfield's Lerche** [Alauda Horsfieldi, *Gld.*] von Australien ist oberhalb bräunlichaschgrau, jede Feder breit dunkelbraun schaftstreifig, namentlich an Kopf und Rücken; Augenbrauenstreif fahl; Schwingen braun, fahlröthlich gerandet; Oberkehle weiß, Unterkehle und Oberbrust dunkelschaftfleckig (diese Zeichnung bildet fast einen Halbmond); ganze übrige Unterseite fahl bräunlichaschgrau; untere Flügelseite röthlichgrau; Schnabel bräunlichfleischroth, am Grunde und an der

Spitze dunkelbraun; Auge braun; Füße röthlichdunkelbraun. Das Weibchen soll übereinstimmend sein. Gould, nach dessen Beschreibung ich die vorstehende gegeben, stellt sie als Art hin (und zwar als die einzige australische Lerche), während andere Forscher sie nur als Spielart betrachtet wissen wollen. „Sie ist über die Ebenen und offenen Gegenden von Neusüdwales spärlich verbreitet, aber häufiger nach dem Innern zu in den Gebirgen als nach der See hin. Ein Exemplar aus der Gegend der Moreton-Bay von Leichardt's Expedition mitgebracht und ein solches aus der Nähe von Port-Essington unterscheiden sich von denen aus Neusüdwales durch bedeutendere Größe, sowie stärkeren Schnabel und mehr rothe Farbe; sie dürften vielleicht artlich verschieden sein und stehen der javanischen Lerche sehr nahe. Der erst beschriebne Vogel aber aus Neusüdwales, wo ich ihn in den Liverpoolebenen am häufigsten fand, lebt mehr am Boden als auf Bäumen, ist so dreist, daß er sich fast treten läßt, bevor er sich erhebt und eine kurze Strecke fliegt. Häufig steigt er auch in der Weise der europäischen Feldlerche, doch nicht so kräftig singend, hoch in die Luft; zuweilen aber schmettert er seinen angenehmen, doch schwachen Gesang auch von dem Zweige eines Baumes herab. Dr. Zuchold stellt diese Lerche ebenfalls als eine der javanischen nahe verwandte, jedoch kleinere und selbständige Art hin. Horsfield's Bush Lark (*Gld.*). — Die Hofalerche [Alauda hofa, *Hrtl.*] von Madagaskar bedarf nur der Erwähnung, da blos ein Exemplar, welches Herr Professor Dr. Peters mitgebracht hat, in Spiritus im Berliner zoologischen Museum vorhanden ist.

Die Lerche von Kordofan [Alauda cordofanica] bezeichnet Heuglin als einen sehr seltnen oder vielleicht nur zufälligen Bewohner der ebenen Gegenden von Senar und Kordofan. Sie soll in der Lebensweise der Feldlerche ähnlich sein und nach Antinori auch hochsteigend wie jene sehr laut singen. Durch lebhaft gelbrothe Oberseite ist sie von anderen Lerchen zu unterscheiden. Ueber ihre weitere Verbreitung ist nichts genaueres bekannt. Mirafra cordofanica, *Strckl.*; Galerida rutila, *v. Mll.*; Alauda praestigiatrix, *Hgl.*; Melanocorypha ferruginea, *Br.*; Annomanes (!) cinnamomea, *Bp.* — **Die einfache Lerche** [Alauda simplex, *Cb.*] wurde von Hemperich und Ehrenberg an der arabischen Küste eingesammelt und ist nur in einem Exemplar im Berliner Museum vorhanden. — **Die zierlichste Lerche** [Alauda elegantissima], eine von Heuglin im Hügellande nördlich vom Tanasee im Monat Mai 1862 gefundne prächtige Art, „welche dort ziemlich selten an buschigen Gehängen lebt, viel auf kleinen Feldsteinen sitzt und der Haubenlerche ähnlich singt; sich hoch in die Lüfte erhebend, läßt sie ein schnarrendes Geräusch hören, welches wol vom raschen Zusammenklatschen und einer zitternden Bewegung der Flügel herrührt." Der genannte Forscher hatte nur zwei, vielleicht jüngere Vögel mitgebracht, welche oberhalb dunkelrostrothbraun, unterhalb heller rothbraun sind, mit weißem Augenbrauenstreif und ebensolcher Kehle; eine ausreichende Beschreibung der Art muß allerdings erst erwartet werden. Geocóraphus elegantissimus, *Hgl.* — Eine zimmtrothe Lerche [Alauda rufocinnamomea, *Slvd.*] wird noch mitgezählt, doch steht es nicht fest, ob sie wirklich eine selbständige Art ist, oder ob sie mit einer der vorigen zusammenfalle. — **Die bescheidne Lerche** [Alauda modesta, *Hgl.*] ist etwas kleiner als die kurzzehige, ihr aber in Gesang und Benehmen ähnlich, mit schwärzlichbraunem Oberkopf und Haube, das ganze übrige Gefieder hellbraun, schwärzlich gestrichelt, Halsseiten und Kehle weiß. Sie ist Standvogel in Bongo und am Kosangofluß, lebt meistens parweise auf steinigen Lichtungen in der Waldgegend, sitzt auf Steinen und Termitenbauen, selten an Stellen mit höherem Graswuchs. Näheres hat Heuglin nicht angegeben.

Die Bienenlerche [Alauda apiata] aus Südafrika ist oberhalb röthlichkastanienbraun, jede Feder aschgrau gesäumt und mit schwarzem Querstreif, wodurch das ganze Gefieder fein schwarz gebändert erscheint; Zügel, Wangen und Kehle sind gelblichrostroth und die ganze Unterseite ist bräunlichrostroth, dunkel schaftfleckig; der Schnabel ist bräunlichschwarz, Unterschnabel am Grunde heller; Auge braun; Füße gelbgrau. Das Weibchen soll matter gefärbt und ein wenig kleiner sein. Nach Layard bewohnt sie besonders die warmen sonnigen Stellen der hochgelegenen

Ebenen, und daher ist sie besonders in den westlichen Theilen des Kaplands häufig zu finden. „Sie erregt ebensowol durch die Schönheit ihres Gefieders Aufmerksamkeit, als auch durch ein wunderlich knisterndes Geräusch, welches sie während des senkrechten Emporsteigens, 5 bis 10 Meter hoch in die Luft, mit ihren Flügeln hervorbringt. Während sie bis dahin ihren einfachen Gesang erschallen läßt, stößt sie dann plötzlich einen langgezognen schrillen Ruf aus und läßt sich wie ein Stein zum Boden herabfallen. Nach wenigen Minuten wiederholt sie dasselbe Spiel und fährt so namentlich frühmorgens oder abends stundenlang fort." Ritter Georg v. Frauenfeld erzählt über diese Lerche folgendes von der Novara-Expedition her: „Wir waren im Oktober, also zur Zeit des Frühlings, am Kap der guten Hoffnung angelangt und fanden eine große Anzahl von Vögeln mit Nestbauen und Eierlegen beschäftigt. In den niederen Buschwäldern aus immergrünen Protaceen von 2—2,60 Meter Höhe war diese Lerche schon häufig. Sie steht im Wesen der europäischen Baumlerche sehr nahe. Die Männchen saßen auf den Spitzen der Gebüsche und waren meistens so zutraulich, daß man in der Entfernung von wenigen Schritten ihren Liebesspielen zuschauen konnte. Sie erhoben sich 2 bis 3 Klafter hoch in die Luft, dann ließen sie einen schnurrenden Laut hören, welcher mit den Flügeln hervorgebracht wird und an das Meckern der Sumpfschnepfe erinnert, doch weit schwächer als jenes ist. Nach der Rückkehr aus der Höhe läßt sich der Vogel, ein zartes hüüüt ausstoßend, auf seinen frühern Sitz nieder. Dies Auf- und Abschwingen erfolgt in kurzer Frist sechs- bis achtmal; ich konnte bequem den Vorgang beobachten und deutlich wahrnehmen, wie der Vogel willkürlich den einen oder andern Flügel stärker schnurrend mehr aufwärts richtete, wodurch sodann jedesmal die Flugrichtung etwas verändert ward." Da die Lerche vom Kapland, ihres Flugspiels halber auch Gaukellerche oder Gauklerlerche (Br.) benannt, hin und wieder einzeln in den Handel gelangt, so habe ich die Schilderung dieser Eigenthümlichkeit in ihrer Lebensweise (welche übrigens auch einige der vorherbeschriebenen afrikanischen Verwandten zeigen), hier beiläufig aufgenommen. Ich sah vor einigen Jahren fünf Köpfe im zoologischen Garten von Hamburg, welche, wie mir der damalige Direktor, Herr Dr. Hilgendorf, sagte, von Fräulein Hagenbeck eingeführt waren. Kaplandlerche (Ruß' „Handbuch"). Weshalb sie den wissenschaftlichen Namen Bienenlerche (A. apiata) erhalten hat, ist mir nicht bekannt. Alauda apiata, *Vll.*; Megalophonus clamosa, *Stph.*; Brachonyx crepitans, *Mrr.* — **Die rostfarbige Lerche** [Alauda planicola, *Lchtst.*] ebenfalls aus Südafrika, sie kommt jedoch auch in West- und Ostafrika vor und soll nach Ayres und Smith in der Lebensweise durchaus mit den Verwandten übereinstimmen. Sie ist an der ganzen Oberseite roströthlichbraun, dunkel gestrichelt, der Oberkopf breit schwarzbraun schaftstreifig; Zügel- und ein schmaler Augenbrauenstreif roströthlichgelb, ebenso Kopf- und Halsseiten nebst Kehle, jedoch fein dunkel gefleckt; Brust und Seiten lebhaft roströthlichzimmtbraun; ganze übrige Unterseite lebhaft roströthlichisabellgelb; Schnabel hellbraun, Unterschnabel fahl; Auge braun; Füße gelblichgrau. Das Weibchen soll nur matter in den Farben sein. Größe der Feldlerche gleich. Brachlerche (Br.). Mirafra africana, *Smth.*, nec *Gml.*; Megalophónus occidentalis et M. rostratus, *Hrtl.* — **Gray's Lerche** [Alauda Grayi, *Whlbrg.*], im Damaralande von J. A. Wahlberg gefunden, ist grau isabellfarben, ungefleckt, Stirn und Gegend um den Schnabel weißlich, Halsseiten braun gefleckt, Schwingen blaßbraun, fahl gesäumt; ganze Unterseite weißlich. — **Die braungefleckte Lerche** [Alauda plebeja, *Cb.*] wurde von Dr. Falkenstein an der Loangoküste und dann auch von Dr. Reichenow dort bei Loanda erlegt. Sie ist oberseits lerchenartig gefärbt, jede Feder mit dunkelbraunem Schaftfleck und hell gerandet; Oberkopf einfarbig dunkelbraun; Augenbrauenstreif schmal weiß; ganze Unterseite milchweiß, Brust dunkelbraun gefleckt. Sie stimmt mit der vorigen im allgemeinen überein, weicht aber in mehreren Punkten, so namentlich in der Färbung der Oberseite, ab. (Nach Cab.).

Die zweibindige Wüstenlerche [Alauda desertorum], deren Heimat sich über Nordostafrika und Westasien erstreckt, ist oberhalb röthlichisabellgelb; Zügel- und Augenbrauenstreif, sowie die Kopfseiten sind weiß, durchs Auge aber ein schwarzer Strich; Bartstreif matt gelbgrau, Wangen isabellgelb; Schwingen schwarz mit breiter weißer, dann schwarzer und schmaler röthlicher Quer-

binde; Schwanzfedern schwarzbraun, fahl röthlich gesäumt, die äußersten mit weißer Außenfahne, die beiden mittelsten röthlichbraun; Kehle und Oberbrust hell isabellgelb, jede Feder mit feinem dunkeln Schaftstreif; ganze übrige Unterseite reinweiß. Schnabel fahl horngrau; Auge braun; Füße gelblichgrau. Das Weibchen soll nur etwas matter gefärbt sein. Nahezu von Drosselgröße. Heuglin sagt über sie folgendes: „Wie die meisten ihrer Verwandten ändert auch sie inbezug auf Schnabelform, Länge der Nägel und Farbentöne ungemein mannigfaltig ab. Zuweilen ist die Oberseite sehr lebhaft röthlichisabellfarben; Oberkopf, Nacken und Bürzel sind meistens heller, mehr ins Graue spielend; die Flecke auf der Brust und die Zeichnung der Kopfseiten sind bei einigen scharf ausgeprägt, bei anderen aber auch ganz verschwommen und verwischt. Nubische Vögel sind im allgemeinen kleiner und lebhafter gezeichnet als egyptische, andere, die ich an der Somaliküste einsammelte, wiederum größer, ihr Schnabel ist hornbläulich mit hellen Schneiden, die Oberseite ist sattbräunlichgrau, die weiße von den Spitzen der kleineren Schwingen gebildete Binde ist schmäler u. s. w. In den Nilländern habe ich sie nur nördlich vom 16. Breitegrad angetroffen, ferner lebt sie in Nordarabien und längs der ganzen afrikanischen Küste des rothen Meers und des Golfs von Aden. Sie liebt sandige ebene Flächen mit wenig Pflanzenwuchs, besucht gern die Karawanenstraßen und wandert nicht. In vielen Beziehungen, namentlich im Fluge und Gesange, weicht sie von ihren Verwandten sehr ab; sie hält sich meistens an der Erde auf, läuft emsig hin und her, um Insekten, welche die Hauptnahrung bilden, zu jagen. Im raschen Lauf geradeaus hält sie plötzlich inne, jedoch nur auf Augenblicke, um sich umzuschauen oder die Richtung zu ändern. Der Flug ist kurz, leicht, weich, aber flatternd unruhig. Die Stimme ist ein melancholisch klagendes, flötendes Pfeifen; diese Lerche steigt während des Singens nicht, auch zeigt sie wenig Vorliebe für erhöhte Plätze, Steine u. drgl. oder Büsche; ihren Standort verläßt sie nicht leicht. Sie lebt meistens in der ausgebrannten trockensten Wüste, oft in Gegenden, wo jahrelang kein Regentropfen fällt. Ueber das Brutgeschäft habe ich keine eigenen Beobachtungen. Die Eier sollen denen des großen Würgers manchmal gleichen." Gould bezeichnet sie als einen guten Sänger, und Griffith, der sie ebenfalls kennen gelernt, sagt nur, daß sie sehr schnell laufe und sich von Sämereien ernähre. Auch Professor Robert Hartmann sah sie in Nordostafrika auf wüstem kiesigen Boden sehr schnellfüßig umherlaufen. Eingeführt ist sie bis jetzt noch nicht, doch läßt sich dies über kurz oder lang erwarten. Wüstenläuferlerche (Br.). Alauda desertorum, *Stnl.*; A. bifasciata, *Lchtst.*; Saxicola pallida, *Blth.*; Certhilauda meridionalis, *Br.*; Alaemon Jessei, *Fnsch.* et *Hrtl.*; Certhilauda Doriae, *Slvd.* [Desert Lark, *Stanl.*]. — **Jesse's Lerche** [Alauda Jessei, *Fnsch.* et *Hrtl.*] aus den Ländern am rothen Meere, dem abessinischen Küstenlande und der Somaliküste, wird gewöhnlich mit der vorigen zusammengeworfen, doch von Finsch und Hartlaub entschieden als selbständige Art hingestellt. „Zunächst fällt der fahlgraubraune Färbungston der Oberseite sehr ins Auge, der von dem deutlich rostisabellfahlen, echt wüstenfarbnen jener ganz abweicht. Noch wichtiger erscheint die dichte Fleckenzeichnung an Kropf und Brust. Jene zeigt eine rein milchweiße Unterseite mit einzelnen verwaschenen dunklen Schnitzchen auf dem Kropfe. Die Zeichnung der zweiten Schwingen ist bei dieser in der Mitte $2_{/2}$—$2_{/6}$ cm. breit schwarz, während sie bei jener nur 9—11 mm. breit schwarz, an beiden Seiten aber weiß ist." — **Die kleine zweibindige Wüstenlerche** [Alauda africana, *Gml.*] soll in Südafrika sehr häufig sein; der zweibindigen Wüstenlerche überaus ähnlich, ist sie jedoch kleiner und an der Unterseite, mit Ausnahme der Kehle und Bauchmitte jede Feder mit dunklem Schaftstrich. Ayres fand sie im Lydenburg-Gebiet der Transvaal-Republik spärlich einzeln oder parweise in den offenen Grasebenen. Layard's Angaben besagen nur kurz, daß sie in allen ihren Eigenthümlichkeiten mit den nächstverwandten Lerchen übereinstimme. Das Nest stehe unterhalb eines kleinen Busches oder Steins, sei aus Gräsern erbaut, mit Haren und Federn ausgerundet und enthalte drei Eier. Sichlerlerche (Br.). Plainloving Lark, *Ayres.*

Die weißbäckige Lerche [Alauda leucótis].

Ein liebliches Vögelchen, die kleinste unter allen Lerchen, kaum von der Größe des Hänflings. Sie ist an Kopf und Hals schwarz; Ohrfleck, ein schmales Querband im Nacken, Bürzel und obere Schwanzdecken weiß; Mantel- und Schulterfedern rosträthlich-kastanienbraun, die ersteren an der Außenfahne weißlich gesäumt; Schwingen dunkelbraun, fahl außengesäumt; Deckfedern rosträthlichkastanienbraun, eine braunschwarze Querbinde über den Flügel; Schwanzfedern dunkelbraun, die beiden äußersten längsgetheilt weiß, die beiden mittelsten heller, bräunlich außengesäumt; ganze Unterseite, nebst den unteren Schwanz- und Flügeldecken schwarz; Schnabel bleigrau; Auge braun; Füße fahlgelblichgrau. Das Weibchen ist oberhalb fahl gelblichrostroth; Zügel-, Augenbrauen- und Bartstreif weiß, Wangen röthlichgraubraun; Kehle und Brust fahlröthlichweiß, bräunlich schaftfleckig; Bauch und ganzer Hinterleib bräunlichschwarz. „Die weißohrige Gimpellerche", sagt Heuglin, nach dessen Beschreibung auch die obige aufgestellt, „ist ein häufiger Standvogel vom mittleren Nubien an längs des Nilthals und der benachbarten Regenstrombetten südwärts bis zum 13. Grad nördlicher Breite; im nordöstlichen Kordofan, im Küstenland des rothen Meeres und am Golf von Aden, von Sauakin bis Berbera und Lasgori ist sie beobachtet. In Abessinien sah ich sie nur auf der Hochebene von Telemt (etwa 2600 Meter hoch) und zwar im Januar auf sandigen Flächen, zwischen den Urwäldern des Ghazal-Gebiets im November. Sie lebt pärchen- und familienweise gewöhnlich in Niederungen an der Grenze zwischen Kultur- und Niederland, niemals sehr fern vom Wasser, auf Brachfeldern und in steinigen Gegenden, wo sich einige spärliche Vegetation findet, ebenso auf Karawanenstraßen, an Hecken und um Dörfer. Was ihr Benehmen und ihre Lebensweise anbelangt, so ist sie eine vollkommene Lerche. Die einzelnen Familien bestehen in drei bis sechs Köpfen, von einem oder zwei alten Männchen geführt, seltener sind sie in Flüge zusammengerottet. Sie treiben sich meist laufend und oft plötzlich anhaltend umher. Der zirpende Lockton, welcher wie dirli klingt und der Flug gleichen am meisten denen der kurzzehigen Lerche. Die Familie trennt sich ungern von dem einmal eingenommenen Standort; dort sieht man sie vom frühesten Morgen an und selbst während der glühendsten Mittagshitze sich munter umhertreiben. Sie baden gern im Sande und leben von kleinen Sämereien und Insekten. Arglos gegen Menschen und Thiere, drücken sie sich bei Gefahr zuweilen hinter Steine und trockene Grasschöpfe und steigen in unruhig schwirrendem, niedrigem Fluge auf, um in der Entfernung von 20—30 Schritten wieder einzufallen und sich dann in eiligem Lauf, wenn möglich unter Deckung weiter zu flüchten. Die Männchen sind sehr lebhaft und streitsüchtig, raufen mit einander manchmal im Fluge oder kämpfen mit aufgerichteter Holle auf der Erde. Der Gesang erreicht den der Feldlerche u. a. weder an Fülle noch an Abwechselung, doch trägt er unverkennbar den Charakter eines Lerchenliedes. Während des Singens sitzen die Männchen entweder auf einem kleinen Stein oder auf einer

Erdſcholle, ſeltener auf niedrigen kahlen Büſchen; auch ſteigen ſie gern empor, wie die Feldlerche, aber unruhig, nicht ſo hoch und lange ſchwebend wie die letztre. Ihre Parungszeit fällt im öſtlichen Sudan in die Monate Juni und Juli; es iſt mir jedoch niemals gelungen, das Neſt aufzufinden. Dieſe Lerche läßt ſich leicht zähmen und hält ſehr lange im Käfige aus." Im Laufe der letzten Jahre wurde ſie mehrmals einzeln oder zu zwei bis drei Köpfen von Fräulein Hagenbeck, Herrn Chs. Jamrach und auch wol einmal von kleineren Hamburger Händlern eingeführt; gewöhnlich iſt ſie dann aber mit anderen Vögeln zuſammen nach irgend einem zoologiſchen Garten abgegeben worden; ſo war ſie i. J. 1872 in dem von Frankfurt am Main und 1874 in Hamburg; im Berliner habe ich ſie noch nicht gefunden, ebenſo iſt ſie im Verzeichniß des Londoner Gartens auffallenderweiſe nicht vorhanden. Gleich allen übrigen Lerchen findet man ſie in den Vogelſtuben kaum.

Die weißbäckige Lerche heißt auch weißohrige, Weißohr-, Schellen- und weißohrige Gimpellerche.

L'Alouette à joues blanches; White-cheeked Lark.

Nomenclatur: Loxia leucotis, *Stnl.*; Alauda melanocephala, *Lchtst.*; Fringilla otoleuca, *Tmm.*; Pyrrhulauda et Pyrrhualauda leucotis, Auct. ex Afr. or. [nec *Smth.*], *Rpp.*, *Bp.*; P. leucotis, var. septentrionalis, *Sndvll.*, *Scl.*, *Hrtl.*, *Hgl.*, *Antn.*; Coraphites leucotis, *Cb.*, *Hgl.*, *Scl.*, *Fnsch.* et *Hrtl.*; ?Pyrrhulauda leucotis, *Hgl.*, *Br.*, *Blnf.*, *Fnsch.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſiehe Seite 631.

Alauda leucótis: capite colloque nigris, macula auriculari, fascia angusta cervicali, uropygio et supracaudalibus albis; plumis interscapilii et scapularibus ferruginoso-castaneis, illis exterius albido-limbatis; remigibus fuscis, exterius livide limbatis; tectricibus al. ferruginoso-castaneis; fascia trans alam fusco-nigra; rectricibus fuscis; ambabus extimis utrinque oblique dimidiatis albis; ambabus mediis dilutioribus, exterius subfusco-limbatis; gastraeo toto cum infracaudalibus et subalaribus nigro; rostro plumbeo; iride fusca; pedibus livide canis. — ♀ supra livide ferruginea; loris, stria superciliari et mystacali albis; genis rubente fumidis; gula pectoreque sordide rubide albis, subfusco maculatis; abdomine crissoque fuscato-nigris.

Länge $11{,}8^{cm.}$; Flügel $7{,}2$ bis $7{,}4^{cm.}$; Schwanz $4{,}3^{cm.}$

Smith' Lerche [Alauda Smithi, *Bp.*] ſtellen Finſch und Hartlaub als eine ſelbſtſtändige Art hin. Sie unterſcheidet ſich leicht durch die bräunliche Färbung der beiden äußeren Schwanzfedern jederſeits und durch die verſchiedne Zeichnung der oberen Flügeldecken; im übrigen aber ſtimmt ſie faſt mit der vorigen überein. Smith fand die Art in kleinen Flügen von fünf bis ſechs Köpfen unter dem Wendekreiſe des Steinbocks in Südafrika; Livingſtone ſandte ſie in zahlreichen Exemplaren vom Sambeſi an das britiſche Muſeum ein. Nähere Nachrichten fehlen. Pyrrhulalauda leucotis, *Smth.* [nec *Stnl.*]. — **Die weißſtirnige Lerche** [Alauda frontalis]. „Sie kommt", ſagt Heuglin, „in den Steppen und dem Hügellande Kordofans vor, wahrſcheinlich auch auf der Halbinſel Senar; ſie dürfte nicht wandern; freilich habe ich ihre Wohnplätze nur während und nach der Regenzeit, zwiſchen den Monaten Auguſt und Dezember, beſucht. Sie iſt viel ſeltner als die weißbäckige Lerche, lebt auch im allgemeinen viel mehr vereinzelt und entfernt vom Nil, gewöhnlich auf lichteren Stellen im Hochgras, um Gehöfte und Viehparke, in Dochen- und Büſchelmaisfeldern. Wenn Brehm angibt, man treffe eine Lerche, welche ohne allen Zweifel dieſe ſein ſoll, gewöhnlich am Nil, während die weißbäckige ein echter Steppenvogel zu ſein ſcheine, ferner daß beide Arten gemeinſchaftlich leben

ſich aber im Fluge ſondern, ſo ſtimmt dies durchaus nicht mit meinen Beobachtungen und Aufzeichnungen überein." Auch Dr. Dohrn bezeichnet ſie als einen echten Steppenvogel. Mehrere von verſchiedenen Autoren als beſondere Arten aufgeſtellte Lerchen fallen, wie die folgende Nomenclatur ergibt, mit dieſer zuſammen. Für die Liebhaberei hat ſie bis jetzt noch keine Bedeutung, da ſie wol noch nicht eingeführt worden. Weißſtirnige Gimpellerche (Hgl.); Kappenlerche (Br.). Alauda frontalis, *Lchtst.*; Pyrrhulalauda crucigera, *Rpp.* [nec *Tmm.*]; Coraphites nigriceps, *Cb.* [nec *Gld.*]; C. albifrons, *Sndvll.* — **Die ſchwarznackige Lerche** [Alauda melanauchen, *Cb.*], von den Küſten des rothen Meeres, welche ſie ausſchließlich zu bewohnen ſcheint, „iſt der vorigen ſehr ähnlich, nur dehnt ſich die weiße Färbung der Stirn weniger aus und an den Wangen iſt ſie ſchärfer abgegrenzt; Nacken hell röthlichgrau mit ſchwärzlichem querſtehenden Mittelfleck, welcher ſich zuweilen mit der ſchwarzen Zeichnung der unteren Vorderhalsſeiten vereinigt; erſte Schwanzfeder weißlich und nur an der Innenfahne nach dem Grunde zu hell rauchfarben. Ich beobachtete ſie längs der afrikaniſchen Küſte des rothen Meeres und auf den Inſeln von Dahlak, wo ſie meiſtens parweiſe als Standvogel in den glühendſten Niederungen, die gewöhnlich garkein ſüßes Waſſer enthalten, lebt; aber auch um die Gärten und Brunnen von Mekulu und Arkiko und im benachbarten Hügelland iſt ſie nicht ſelten. Sie kommt ohne Zweifel auch an der Küſte von Hedjas und bei Berbera im Somallande vor. In ihrem Weſen hat ſie viele Aehnlichkeit mit der weißbäckigen Lerche, doch lebt ſie mehr vereinzelt." (Heuglin). Cabanis führt noch eine ſchwarzkäppige Lerche [Alauda nigriceps, *Gld.*] an, welche wahrſcheinlich mit dieſer zuſammenfällt, wie auch die von Finſch aufgeſtellte Lerche von den kanariſchen Inſeln [Alauda modesta, *Fnsch.* nec *Hgl.*]. — **Die graue Lerche** [Alauda grisea, *Scpl.*] von Indien und Zeylon, iſt oberhalb fahl bräunlichgrau; Zügel- und Augenbrauenſtreif ſchwarz; Wangen und Kopfſeiten weißlich; Schwingen und Schwanzfedern olivengrünlichbraun, hell außengeſäumt; ganze Unterſeite ſchwarz. Schnabel weißlichgrau; Auge braun; Füße gelb. Das Weibchen iſt oberhalb fahl bräunlichgrau; Augenbrauenſtreif weiß, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, heller geſäumt; ganze Unterſeite matt grauweiß. Die Größe iſt kaum bedeutender als die der weißbäckigen Lerche. „Dieſer ſonderbare kleine Vogel", ſagt Jerdon, „iſt in ganz Indien ſehr gemein in den offenen Ebenen, auf angebautem Boden, an Wegen u. ſ. w. In ſeiner Lebensweiſe gleicht er durchaus anderen Lerchen und beſonders zeichnet er ſich durch das plötzliche Auf- und Niederſteigen im Fluge aus. Im allgemeinen fliegt er nur eine kurze Strecke und herabgekommen drückt er ſich dicht an den Boden. Gelegentlich ſieht man ihn auch wol auf einem Hausgiebel ſitzen, aber nur ein einzigesmal bemerkte ich, daß ihrer 12 oder 15 Köpfe auf einem niedrigen Baum dicht neben einem Hauſe während der größten Hitze ruhten. Das Neſt und die Eier erhielt ich im Februar; erſteres war aus Federn und Gräſern geformt, unter deren erſteren ſich ſogar einige kleine Tuchſtückchen fanden. Es ſtand in einer geringen Vertiefung in der offnen Ebene nahe bei einem Fluß und enthielt zwei ſchwach grünlichweiße, buntgefleckte Eier." Aehnlich berichtet Sykes: „Dieſe Lerche ſei ſo zahm, daß ſie ſich faſt überreiten laſſe, ehe ſie davonfliege. In Maden u. a. Inſekten und kleinen Sämereien beſtehe ihre Nahrung." Sundewall ſagt, daß ſie auf dem Boden ſitzend, die Flügel ausbreitend ſinge. Im Fliegen und Laufen gleiche ſie völlig einer Feldlerche. Nach Blyth niſtet ſie in der Nähe von Kalkutta; in Bengalen ſoll ſie das ganze Jahr hindurch zu finden ſein. Im weſtlichen Indien niſtet ſie, wie Burgeß mittheilt, im Januar und Februar. Nach Layard kommt ſie im nördlichen und öſtlichen Zeylon in Scharen von 50 bis 60 Köpfen, wahrſcheinlich als Zugvogel, vor. Ueberaus ſchnell an der Erde laufend, drückt ſie ſich, wie Tytler angibt, um ſich im offnen Felde vor einem Feinde zu verbergen, flach auf den Boden. Hiermit ſind alle Nachrichten über ſie erſchöpft. Lebend eingeführt iſt ſie bis jetzt noch nicht, doch dürfte dies wol demnächſt geſchehen, da ſie in ihrer Heimat nicht ſelten iſt. Kreuzlerche (Br.). Alauda gingica, *Gml.*; Pyrrhulauda crucigera, *Tmm.* [nec *Rpp.*]. — [Gingi Lark, Duree Finch, *Lth.*, *Hmlt.*; Black-bellied Finch-lark, *Jerd.*; Squat Finch-ortolan, bei einigen Europäern in Indien, nach *Jerd.* — Duree, in Bengalen, nach *Hamilt.*; Chak Bharai and Dhulo Chata, in Bengalen, nach *Blyth.*; Dhubuk Chari (d. h. Squat Sparrow) und Decora, in Hindoſtan,

nach *Jerd.*]. — **Die Falkenlerche** [Alauda Clót-Béki, *Tmm.*], von den Hochebenen der Sáhara, ist oberhalb fahl bräunlichisabellgelb, am Oberkopf dunkelschaftstreifig; Zügel und Strich unter dem Auge weiß; Wangen und Kopfseiten schwarz; Schwingen schwarzbraun, fahl außengesäumt, über dem Flügel eine düstre Binde; Schwanzfedern röthlichzimmtbraun, die äußersten weiß, ganze Unterseite weiß, breit schwarz schaftfleckig, an der Brust eine schwärzliche Binde; der riesige, fast papageienartige Schnabel, durch welchen sie sich von allen anderen Lerchen unterscheidet, ist gelblichgrau mit schwärzlicher Spitze; Auge braun; Füße fahlgrau. Sie ist beträchtlich größer als die Feldlerche. „Im Leydener Museum", sagt Heuglin, „befindet sich die von Clot-Bek, dem Leibarzte Mehemed Ali's, aus Egypten eingesandte Originaltype, und wahrscheinlich stammt dies Exemplar aus den westlichen an die lybische Wüste grenzenden Bezirken. Längs des Nils habe ich sie nicht beobachtet. In der westlichen Sahara bewohnt sie in kleinen Flügen steiniges Hügelland. Sie ist sehr scheu und fliegt und läuft mit großer Schnelligkeit. Bis jetzt ist sie in den Sammlungen noch äußerst selten." Triftram fand sie auf steinigem Hügellande in el Aghuat nur allein und konnte nicht erfahren, ob sie auch in Algier und anderen Theilen Afrikas vorkomme. Die Brut zeigt nichts besondres, sondern gleicht denen verwandter Arten. Taczanowski sah einige Köpfe neben den Oasen Tolga und Seriana im Januar und März und erlegte zwei Männchen. Sie sei nicht sehr vorsichtig, sondern setze sich bald wieder, nachdem man sie aufgescheucht habe. Knacker- oder Klapperlerche (Br.). Alauda Clot-Bey, *Tmm.*; Jerapterhina Cavaignaci, *O. Ds. Mrs.*; Hierapterhina [!] Clot-Bekii, *Hgl.*

Chrom. Lith. Th. Fischer. Cassel.

Die Tangaren [Tanagrinae].

Farbenreiche Vögel mit glänzendem Gefieder sind es, welche uns auf den ersten Blick als ganz besonders verlockend für die Liebhaberei dünken und inderthat auch vor allem andern fremdländischen Gefieder geschätzt sein würden, wenn sie nicht zugleich bedeutsame Mängel zeigten. Die vorzüglichste Gabe der Vögel, der Gesang, fehlt ihnen; nur leise, rauhe, nicht angenehme Töne lassen sie hören. Sodann entfalten sie keineswegs eine ihrem rothen, grünen, blauen u. a. Prachtfarben entsprechende Anmuth und Liebenswürdigkeit; sie erscheinen vielmehr plump, stürmisch, scheu und sind nicht leicht zu zähmen. Ferner sind sie nicht friedfertig, sondern manchmal recht bösartig und daher dürfen sie weder im Gesellschaftskäfige noch in der Vogelstube gehalten werden.

Ihre Verbreitung beschränkt sich auf Amerika, erstreckt sich aber auch nahezu über den ganzen Welttheil. Hinsichtlich der Lebensweise gleichen sie im allgemeinen den Finken. In den nördlichen Gegenden sind sie Zugvögel, welche im Frühlinge spät ankommen und zum Herbst zeitig wieder abziehen; im Süden leben sie als Strichvögel, indem sie immer den zu ihrer Ernährung dienenden reiferen Beeren u. a. Früchten nachgehen. Zur Nistzeit trifft man sie parweise und jedes Pärchen bewohnt und vertheidigt sein bestimmtes Gebiet. Späterhin streichen sie in Familien oder kleinen Scharen umher. Die Nahrung besteht in verschiedenartigen Stoffen, denn eine Anzahl von ihnen frißt vorzugsweise Sämereien, daneben wenige Kerbthiere und nur zuweilen naschen sie an Früchten, während andere fast ausschließlich von Früchten und Beeren sich ernähren. Theils in niedrigem Gebüsch, theils mannshoch und darüber auf Bäumen steht das Nest, welches in der Gestalt einer offnen Mulde aus dünnen Reisern, Stengeln, Ranken und Würzelchen geschichtet, mit Mos, Halmen, Fasern, Pflanzenwolle und Thierharen sorgsam ausgerundet ist und ein Gelege von 3 bis 5 Eiern enthält, die vom Weibchen allein in 12 Tagen erbrütet werden, während die beiden Alten gemeinsam die Jungen großfüttern. Im Norden machen sie alljährlich nur eine, in südlichen Gegenden dagegen wol zwei und mehrere Bruten. Obgleich mehrere Naturforscher, welche sie in der Heimat kennen gelernt, vom Gesange dieser oder jener Art schwärmen, so dürfte durch anhaltende Beobachtung in der Gefangenschaft doch festgestellt sein, daß keine einzige zu den namhaften Sängern zu zählen ist. Die meisten dieser Vögel machen außer der Mauser, also der Erneuerung des gesammten Gefieders, auch alljährlich noch eine Verfärbung durch, indem sie zum

Winter hin ein unscheinbares gelbgrünes Kleid anlegen. Die Weibchen sind durchgängig schlicht gefärbt und bei manchen Arten nur von Sachverständigen zu erkennen. In der Gefangenschaft sollen ihre Farben an Glanz und Pracht verlieren, ich habe dies jedoch, freilich bei sorgsamer entsprechender Pflege, an keiner Art bestätigt gefunden. Wie schon angedeutet, zeigen sie sich mit wenigen Ausnahmen — welche eigentlich nur die zarteren, ausschließlich fruchtfressenden bilden — durchaus unverträglich, und zum Theil sogar sehr bösartig unter ihren Genossen; jeder schwächliche, junge oder kranke Vogel wird von den Schwarztangaren entschieden umgebracht, während die Rothtangaren vornämlich die kleinen Jungen aus den Nestern stehlen. Auf eine nur zu oberflächliche Beobachtung, welche aus dem Berliner Aquarium veröffentlicht worden, bauend, mußte ich leider die empfindliche Erfahrung machen, daß ein Par Krontangaren mir Ringelastrilde, Auroraastrilde und die letzte Rothkopfamandine, welche ich besaß, zutode jagten, bevor ich die Missethäter erkannte und zu entfernen vermochte. In dieser Bösartigkeit mag es wol begründet liegen, daß man bis jetzt erst gar wenige Züchtungsversuche mit ihnen angestellt hat. Im übrigen glaube ich, daß ihre Züchtung keineswegs große Schwierigkeiten haben wird, wenn man nämlich einerseits richtige Pärchen zu beschaffen und diesen andrerseits ausreichende Räumlichkeiten zu bieten vermag. Denn gerade bei ihrer Zucht will jedes Par ganz entschieden seinen besondern abgegitterten Raum, bzl. einen Käfig für sich haben. Die Ernährung in der Gefangenschaft besteht nur bei den schwarzgefärbten Arten in mannigfaltigen Sämereien nebst wenig Ameisenpuppengemisch, Mehlwürmern und Früchten, bei allen anderen fast ausschließlich in süßen Beeren und Früchten nebst Ameisenpuppengemisch; an gesottnen Reis, eingeweichtes Eierbrot, gekochte Kartoffeln oder Morrübe u. drgl. lassen sie sich alle gewöhnen, und diese Zugaben scheinen ihnen gut zu bekommen. Was man inhinsicht ihrer Ausdauer in der Gefangenschaft geschrieben, beruht keineswegs in zuverlässigen Erfahrungen; wol zeigen sich alle samenfressenden Arten, wie besonders die schwarzen und sodann auch die Purpur-, Scharlach- und Feuertangara nebst deren nächsten Verwandten wirklich recht kräftig, allein die ausschließlich fruchtfressenden, besonders die buntfarbigen, gehören entschieden zu den weichlichsten unter allen Stubenvögeln; sie sterben infolge der geringsten ungünstigen Einflüsse, durch den Genuß einer sauer gewordnen Birne, irgend eines andern verdorbnen Futtermittels u. drgl. Ihre Preise stehen bis jetzt noch sehr hoch; wol werden die schwarzen und namentlich deren braune Weibchen von kleinen Händlern in den Hafenstädten manchmal aus Unkenntniß zu geringen Preisen fortgegeben, in der Regel aber muß man für ein Pärchen der farbenreichen Arten 45, 75 bis 100 Mark bezahlen.

Bis jetzt ist es noch keineswegs völlig klar, welche Stellung im System die Tangaren einnehmen sollen; einerseits erscheinen sie den Finkenvögeln nahe

verwandt und manche Schriftsteller reihen sie ohne weitres unter diesen ein, andrerseits aber zählen manche Ornithologen sie zu den Waldsängern (Sylvicolidae), also zu einer Gruppe der eigentlichen Kerbthierfresser. In der Verlegenheit nun — da sie in ein- und derselben Familie theils fast ausschließlich Samen-, theils ebenso, wenn auch nicht Insekten-, doch Fruchtfresser sind — glaube ich den obwaltenden Verhältnissen dahin Rechnung tragen zu müssen, daß ich diese erst neuerdings bekannter werdenden und steigernder Beliebtheit sich erfreuenden Vögel hier vorläufig wenigstens soweit berücksichtige, als sie bisher lebend eingeführt worden. Ich schildere sie daher nach den bisherigen Erfahrungen über ihre Pflege und Züchtung, selbstverständlich jedoch mit dem Vorbehalt, daß ich sie späterhin in einem andern Bande eingehender darstelle.

Die Krontangara [Tanagra coronata].

Vor etwa acht Jahren erhielt ich in einer Sendung aus London, welche in Finken von verschiedenen Welttheilen bestand, auch einen einzelnen einfarbig braunen Vogel mit ein wenig gekrümmtem Schnabel, den weder Händler noch Liebhaber kannten und der sich selbst im zoologischen Museum nicht sogleich feststellen ließ. Er zeigte sich in der Vogelstube außerordentlich bösartig, indem er in der Weise der Graukardinäle einen Vogel nach dem andern zutode jagte. Deshalb gab ich ihn fort und zwar an Herrn Dr. Bodinus für den Berliner zoologischen Garten, in welchem er sich jahrelang vortrefflich erhalten hat. Erst nach geraumer Zeit gelangte ich zu der Einsicht, daß es das Weibchen der Krontangara sei, nachdem mir das Männchen schon hin und wieder vorgekommen. Dasselbe ist tiefschwarz mit purpurrothem Fleck auf dem Scheitel. Seine Größe ist etwa die des europäischen Kernbeißers, doch erscheint die Tangara ungleich schlanker, zierlicher und anmuthiger.

Ihre Heimat erstreckt sich über das südliche und südöstliche Brasilien, wo sie nach Burmeister's Angaben in allen Waldungen, besonders aber in denen von St. Paulo und St. Katharina gemein ist. Azara beobachtete sie auch in Paraguay und Karl Euler in Kantagallo in der Provinz Rio de Janeiro. Letzterer schildert sie in folgendem: „Sie ist eine der gewöhnlichsten Tangaren, lebt in allen Gärten, Pflanzungen, niederen Gehölzen und hält sich viel an der Erde auf. Ihr Nest erbaut sie an den verborgensten Stellen im Dickicht. Ich fand es im Oktober auf dem etwa 65^{cm} hohen Stumpfe eines abgehauenen Baumes in der Nähe des Baches, wo es zwischen den dicht emporgeschossenen Sprößlingen versteckt war. Die sehr lockre Nestunterlage besteht in Pflanzenstengeln und dürren Blättern und die Mulde ist mit wenigen Wurzelfasern ausgelegt und geglättet und von etwa 7^{cm} Durchmesser. Drei außerordentlich angenehm gefärbte Eier bilden das Gelege." Näheres über das Freileben ist leider nicht angegeben.

In letztrer Zeit gelangt diese Art vielfach in den Handel, und im Vertrauen auf Brehm's Angabe, daß sie friedlich mit anderen zusammen lebe, hat man sie mehrfach für die Vogelstuben angeschafft. Auch ich erhielt ein Pärchen von Herrn H. Möller in Hamburg, und da ich annehmen mußte, daß die Bösartigkeit des ersten Weibchens in meinem Besitz nur eine individuelle gewesen, so ließ ich jene nebst Purpur- und Scharlachtangaren in die mit den seltensten und werthvollsten Prachtfinken reich besetzte Vogelstube. Hier zeigten sie sich alle anfangs sehr harmlos, sodaß ich obige Behauptung mit gutem Gewissen in der „Gefiederten Welt" bestätigen konnte. Bald aber, nachdem sie sich wahrscheinlich erst von den Reisebeschwerden völlig erholt und nistlustig geworden, begannen sie ihre unheilvolle Thätigkeit. Zunächst wurden alle jungen Vögel, sobald sie die Nester verließen, umgebracht, und nicht lange, da fand ich auch einen alten Prachtfink nach dem andern, selbst einen Bayaweber, einen Sonnenvogel u. a. todt am Boden. Während ich zuerst die Bülbüls, welche in drei Arten ebenfalls die Vogelstube bewohnten, in Verdacht hatte, stellte es sich bei aufmerksamer Beobachtung bald heraus, daß jene allerdings arge Raufbolde, daß aber die Tangaren und vor allem das Weibchen der Krontangara die bösartigsten seien. Mir mangelte dann leider der Raum, um weitere Züchtungsversuche mit ihnen anzustellen und ich mußte sie daher fortgeben. Anderweitige Versuche oder gar Erfolge sind leider nicht bekannt geworden. Im Berliner Aquarium soll ein Pärchen genistet haben, doch ist darüber sichres nicht verlautet. Kräftig und ausdauernd, hält sich diese Tangara vortrefflich und darf als ein besonders schöner Käfigvogel gelten. Einen Gesang hat sie nicht, Männchen und Weibchen lassen vielmehr nur rauhe heisere, manchmal weberähnlich zischende Laute hören. Sie frißt vorzugsweise Sämereien und zwar Kanariensamen, Hirse, auch etwas Mohn und Hanf; dagegen weniger Früchte und Kerbthiere, als andere Arten. Ihre Farben wechseln nicht mit den Jahreszeiten. Der Preis steht auf 45 bis 50 Mark für das Pärchen und nur selten niedriger.

Die Krontangara hat wol keine weiteren Namen. — Le Tangara ou Tachyphone couronné; Crowned Tanager. — Tschá, Heimatsname in Brasilien, nach *Eul.*

Nomenclatur: Agelaius coronatus, *Vll.*; Tanagra coryphaea, *Lchtst.*; T. brunnea, *Spx.*; Tachyphónus Vigorsii, *Swns.*, *Jard* et *Selb.*; T. coryphaeus, *Gr.*; T. coronatus, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.*; Tanagra nigerrima, *Eul.* [nec *L.*]. — [Tordo de bosque coronado y negro, *Azr.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Einfarbig schwarz, stahlblau glänzend; ein purpurrother Fleck auf dem Scheitel, welcher jedoch nur dann zur Geltung kommt, wenn der Vogel in der Erregung die Kopffedern sträubt; Schwingen und untere Flügeldecken am Grunde der Innenseite weiß. Schnabel schwarz; Auge braun; Füße braun. — Das Weibchen ist lebhaft roströthlichbraun; Oberkopf bis zum Nacken graubraun, Wangen braun, fein grau gestreift; Bürzel und Schwanz heller zimmtroth; ganze Unterseite roströthlichbraun. Schnabel braun Auge dunkelbraun; Füße bräunlichfleischroth.

Tanagra coronata: unicolor nigra, chalybaeo-nitens; plumis verticis nonnisi erectis maculam purpuream offerentibus; basi pogonii interioris remigum et tectricum

subalarium alba; rostro nigro; iride fusca; pedibus fuscis, — ♀ laete ferruginosa; pileo ad cervicem usque fumido; genis umbrinis, subtiliter cano-vittatis; uropygio caudaque dilutius cinnamomeis; subtus ferruginea; rostro umbrino; iride fusca; pedibus e fusco carneis.

Länge $18{,}4^{cm.}$; Flügel $8{,}7-8{,}9^{cm.}$; Schwanz $6{,}5^{cm.}$

Das Jugendkleid ist nach Burmeister dem des Weibchens gleich; das junge Männchen erhält in der ersten Mauser am Oberkopf einige schwarze stahlblauglänzende Federn; Schnabel schwarzbraun; Unterschnabel am Grunde weiß; Füße fleischbraun. Nach Schlüter zeigt das junge Männchen späterhin, selbst wenn bereits die rothe Scheitelmitte vorhanden ist, noch überall rostrothe Federn zwischen den schwarzen, so daß es ein scheckiges Aussehen hat.

Juvenis: cum femella conveniens; ♂ juv. plumas primas mutans plumis pilei nonnullis chalybaeo-nitentibus ornatus; rostro nigro-fusco, basi mandibulae alba; pedibus carneis. Secund. Schlüter ♂ juv. serius plumis inter nigras ferrugineis, quare maculosa apparens.

Beschreibung des Eies: Grundfarbe kräftig und hell fleischroth, mit großen, breiten, dunkelrothen Zeichnungen, welche in weiten Abständen vertheilt sind, theils verwachsene, theils scharfbegrenzte Ränder haben und mit kräftigen sepiabraunen Tüpfeln und Kritzeln vermischt sind; am dickern Ende steht die Zeichnung etwas gedrängter. Die Gestalt ist länglichoval und beide Enden sind fast gleich stumpf. Länge $23{,}5^{mm.}$; Dicke $17^{mm.}$; Schneidepunkt etwa $12{,}5^{mm.}$ (Euler).

Ovum: saturate carneum striis magnis latisque ruberrimis, ample divaricatis margines parte lavatos, parte circumscriptos ostendentibus notatum, nec non punctillis lineolisque distincte umbrinis intermixtis, usque circa basin magis coacervatis; ceteroquin oblongo-ovatum apice utroque fere aequabiliter obtuso.

Die Trauertangara [Tanagra melaleuca].

Tafel XIV. Vogel 72.

Der vorigen fast völlig gleich, doch ohne den rothen Schopf, vielmehr rein bläulichschwarz und mit weißem Schulterstreif, ist sie mehr im Norden Brasiliens, besonders in den Gegenden am Amazonenstrom, Guiana und Kolumbien, sowie auch in Venezuela und Trinidad heimisch. Sie war bereits den alten Autoren bekannt, und Buffon, der Beschreibung und Abbildung von beiden Geschlechtern gibt, sagt, daß Sonnini de Manoncourt die verschiedene Färbung des Männchens und Weibchens zuerst nachgewiesen hat. Letztrer beobachtete sie in der Heimat am Nest und fand sie auch außer der Nistzeit stets parweise im dichten Gebüsch lebend, niemals aber zahlreich vereinigt. Er gibt bereits an, daß sie durchaus keinen Gesang, sondern nur schrille durchdringende Lockrufe hören lasse. Ihre Nahrung bestehe in kleinen Früchten und Insekten. Näheres ist über ihr Freileben seither leider nicht veröffentlicht worden. Die Beobachtung in der Vogelstube hat ergeben, daß sie sowol in der Lebensweise, als auch in der Ernährung der vorigen durchaus gleich ist. Sie kommt übrigens viel seltner in den Handel, wird nur einzeln von Fräulein Hagenbeck, Herren K. Reiche, Chs. Jamrach, H. Möller u. A. eingeführt und ist daher noch weniger bei den Liebhabern zu finden. Der Preis beträgt etwa 45 Mark für das Pärchen. Im Berliner Aquarium hatte zur Zeit der ersten Direktion ein Pärchen dieser

Art geniſtet, und nach den Angaben des Oberwärters Seidel berichtete der „Führer", daß die eifrigen Alten „ſich garnicht damit begnügen, ihre eigenen Jungen zu füttern, ſondern daß ſie die ihnen gereichten Mehlwürmer auch barmherzig jedem andern Vogel bieten, welcher darum bettelt". Ich will über ſolche Fantaſieſchilderungen keine Worte verlieren; nur darauf ſei hingewieſen, daß Erfahrungen von zahlreichen Seiten mit voller Entſchiedenheit eine Bösartigkeit dieſes Vogels feſtgeſtellt haben, welche der des vorigen durchaus gleich iſt. Ueber die Brut der Trauertangara im Aquarium hat Herr Dr. Brehm keinerlei Mittheilung gemacht, während eine eingehende Beobachtung doch umſomehr dankenswerth geweſen wäre, da, wie ſchon vorhin bemerkt, das Freileben dieſer Vögel noch völlig unbekannt iſt. Darin liegt doch eben die höchſte Wichtigkeit aller Vogelzüchtung, daß durch die gewiſſenhafte Feſtſtellung und Angabe aller obwaltenden Verhältniſſe die Naturgeſchichte des betreffenden Vogels bereichert werde.

Die Trauertangara iſt von Br. Schwarztangara benannt. [Schwarze und braunrothe Tangara, Buff.]. — Tangara noir; Black Tanager.

Nomenclatur: Tanagra nigerrima, *Gml.*, *Lchtst.*, *Pr. Wd.*, *Dsm.*; Oriolus leucopterus, *Gml.*, *Buff.*, *Lth.*; Tanagra melaleuca, *Sprrm.*; Tachyphónus leucópterus, *Vll.*, *Orb.*; T. nigerrimus, *Cb.*, *Brmst.*; T. melaleucus, *Br.* — [Tordo di bosque negro cobijas blancas, *Arz.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Einfarbig ſchwarz, lebhaft ſtahlblau glänzend, namentlich an Hinterkopf, Oberrücken, Flügeln und Schwanz, wo alle Federn faſt rein dunkelblaue Außenſäume haben; Bruſtſeiten unterhalb des Flügels, untere Flügelſeite nebſt Innenfahne der Schwingen und Schulterrand reinweiß (in der Ruhe iſt der weiße Flügelrand jedoch garnicht zu bemerken); Schnabel glänzend ſchwarz, am Grunde, ſowie faſt der ganze Unterſchnabel heller blaugrau; Auge braun; Füße ſchwärzlichgrau. — Das Weibchen iſt einfarbig roſtröthlichbraun, dunkler als das des vorigen; die dunkelbraunen Schwingen ſind röthlichfahl geſäumt; Schwanzfedern lebhaft röthlichbraun; ganze Unterſeite hell gelblichbraun; Schnabel bräunlichgrau; Auge braun; Füße bräunlichfleiſchroth. Das Jugendkleid iſt nach Burmeiſter dem des Weibchens gleich, nach der erſten Mauſer ſchwarz gefleckt, ſpäterhin mattſchwarz, nur wenig glänzend.

Tanagra melaleuca: colore omnino nigro, laete chalybaea-nitente, praesertim occiput, tergum, alas caudamque occupante, eorumque plumis exterius subcyaneo-limbatis; pleuris subalaribus, latere alarium inferiore, pogoni oremigum interiore et campterio albis; basi rostri nitide nigri et mandibula caesiis; iride fusca; pedibus e nigro cinereis. — ♀ unicolor ferruginosa, priore obscurior; remigibus fuscis, subrufo-limbatis; cauda laeta castanea; subtus livide fuscata; rostro fumide cinereo; iride fusca; pedibus fuscato-carneis. — Juvenis: (sec. *Brmst.*) femellae persimilis; post mutationem plumarum primam nigro-maculata, serius nigra, parum nitens.

Länge 18,3 cm.; Flügel 8,7 cm.; Schwanz 6,3 cm.

Die rothhäubige Tangara [Tanagra cristata]

iſt der Krontangara ſehr ähnlich, doch mehr bläulichſchwarz mit beträchtlichem rothem Federbuſch auf dem Kopfe und an Kehle und Bürzel faſt röthlichgelb, auch von bemerkbar geringerer Größe. Sie war den alten Vogelkundigen ebenfalls bereits bekannt und Buffon ſagt, daß ſie in Guiana ſehr gemein ſei, von

kleinen Früchten lebe, ein schrilles finkenähnliches Geschrei, aber keinen solchen Gesang erschallen lasse und niemals in großen Wäldern, sondern nur im Freien auf beackerten Feldern zu finden sei. Nach Burmeister's Angaben ist sie im Waldgebiet des ganzen Brasilien heimisch und nirgends selten, bei Rio de Janeiro sogar häufig, doch mehr an den Ufern als in den Gebirgsthälern. Auch von Euler wurde sie in der Provinz Rio de Janeiro gesammelt und ihre Verbreitung dürfte sich außer Brasilien und Guiana auch noch auf Neu-Granada erstrecken. Da sie in allen diesen Gegenden keineswegs selten vorkommt, so ist es verwunderlich, daß der Vogelhandel sie nicht oft und in größrer Anzahl zu bieten hat, umsomehr, da solche Tangaren immer gern und zu hohen Preisen gekauft werden; sie wird nur hin und wieder einmal von Vekemans in Antwerpen in einzelnen Köpfen eingeführt. In ihrem ganzen Wesen und in allen Eigenthümlichkeiten dürfte sie der Krontangara völlig gleichen.

Die rothhäubige Tangara hat Br. Rothhaubentangara benannt. [Gehäubte oder kappigte Tangara und Haubenmerle, nach den alten Autoren]. — Houpette; Crested Tanager.

Nomenclatur: Tanagra cristata, *L.*, *Bff.*, *Pr. Wd.*; T. cirrhómelas, *Vll.*; Lanio Vieilloti, *Lfrsn.*; Tachyphónus cristatus, *Vll.*, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.* [Tanagra cayanensis nigra cristata, *Brss.* — Houpette, Tangara de la Guyane et Tangara de Cayenne, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Einfarbig mattschwarz; Oberkopf mit einer feuerrothen Holle, welche wol auf- und niedergeklappt, doch keineswegs völlig verdeckt werden kann; Unterrücken und Bürzel hell gelblichrostroth, ebenso ein Fleck an der Oberkehle; Schulterstreif und ganze innere Flügelseite reinweiß. Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Füße bläulichfleischroth. Das Weibchen ist olivengrünlichröthlichbraun, ohne Haube; Bürzel gelblichbraun; ganze Unterseite hellgelblichrostroth; Schnabel braun; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichfleischroth. — Das Jugendkleid gleicht nach Burmeister ebenfalls dem des Weibchens, das Uebergangskleid ist schwarz gefleckt mit durchscheinendem rothen Scheitel und etwas verlängerten Kopffedern.

Tanagra cristata: unicolor subnigra, crista pilei ignea erectili; macula gulari, tergo et uropygio gilvo-ferrugineis; campterio et subalaribus albis; rostro nigro; iride fusca, pedibus subcoeruleo-carneis. — ♀ olivaceo-virente badia; cristae vacua; uropygio gilvo-umbrino; subtus gilvo-ferruginea; rostro umbrino; iride fusca; pedibus fuscato-carneis. — Juvenis (sec. *Burm.*): femellae persimilis, post plumarum mutationem nigro-maculata, pileo rubro-tincto plumas subelongatas offerente.

Länge 17 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 6,5 cm.

Die kleine Trauertangara [Tanagra luctuosa].

Der großen Trauertangara fast völlig gleich, nur bedeutend kleiner und mit viel breiterer weißer Binde über den Flügel, erscheint sie als ein ungleich zarteres und vielmehr harmloses Vögelchen im Vergleich zu allen Verwandten. Ihre Heimat erstreckt sich über die kleinen Republiken Südamerikas von Neugranada bis Peru und auch über die Inseln Trinidad und Tabago; Dr. Frantzius beobachtete sie auf Kostarika. Ueber die Lebensweise ist leider garnichts bekannt. Nur höchst selten und einzeln wird sie von Vekemans eingeführt, auch hatte

einmal Gudera, damals in Leipzig, einen Schub von fünf Köpfen, leider lauter Männchen, von einem kleinen Händler aus Bordeaux gekauft, von denen ich ein solches für meine Vogelstube entnahm. Das zarte Vögelchen musterte sich sehr schön heraus, konnte dann aber die nächste Mauser nicht überstehen, und nachdem es lange gekränkelt, fand ich es im Gebüsch bereits in Verwesung übergegangen. Da ich es jedoch etwa neun Monate vor mir gesehen, so kann ich behaupten, daß es im Gegensatz zu allen übrigen schwarzen Tangaren überaus sanft und verträglich sich zeigte. Wenn wir diese kleinere Art, die bei ihrer weiten Verbreitung doch wol nicht schwierig zu erlangen sein dürfte, häufiger erhielten, so würde sie gewiß eine sehr schätzenswerthe Bereicherung unserer Vogelstuben bilden.

Die kleine Trauertangara nennt Br. blos Trauertangara. — Petit Tangara noir; Little Black Tanager.

Nomenclatur: Pyranga luctuosa, *Orb.*; Lanio tenuirostris, *Gr.*; L. albispecularis, *Léot.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Ganzes Gefieder tiefschwarz, lebhaft glänzend, doch nur mit schwachem bläulichen Schein; obere und untere Flügeldecken und Innensäume der Schwingen weiß, wodurch eine breite weiße Querbinde über den Flügel gebildet wird. Schnabel schwarz, Unterschnabel nur am Grunde heller bläulich; Auge dunkelbraun; Füße schwärzlichgrau — Das Weibchen soll nach Orbigny's Angaben olivengrünlichbraun und an den Seiten des Halses, sowie an der Kehle düsterbräunlichweiß sein.

Tanagra luctuosa: aterrima, laete subcoeruleo-nitens; tectricibus al. superioribus et inferioribus limbisque remigum interioribus albis, quare fascia trans alas alba; rostro nigro, basi mandibulae tantum subcoerulea; iride fusca; pedibus subnigro-cinereis. — ♀ (sec. *d'Orbigny*) olivaceo-viride fusca, colli lateribus gulaque sordide albidis.

Länge $14_{/4}$ cm.; Flügelbreite etwa 21 cm.; Schwanz $2_{/6}$ cm.

Die vierfarbige Tangara [Tanagra quadricolor] ist größer als die meisten verwandten und kommt einem Star fast gleich. Stirn und Vorderkopf schwarz, Oberkopf mit einem kurzen Schopfe lebhaft goldgelb; Flügel und Schwanz schwärzlich, erstere mit breiter weißer Querbinde; ganze übrige Oberseite olivengrünlichgraubraun, beim ganz alten Vogel mehr reingrau; ganze Unterseite fahl bräunlichgelb, Brust- und Bauchseiten grünlichgrau; Schnabel bleigrau, Unterschnabel an Grund und Spitze weißlich; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen ist einfarbig olivengrünlichgraubraun, nur an Flügeln und Schwanz schwarz. (Nach H. v. Berlepsch und Reinhardt dürften die Weibchen doch eine düster goldgelbe Scheitelmitte haben, an Stirn, Zügel und Augengegend aber nicht schwarz sein. Die Vögel ganz ohne gelben Scheitel sollen Junge sein). „Im Walde bei Rio de Janeiro", sagt Burmeister, „und Neu-Freiburg nicht selten, an letzterem Orte sogar häufig. Sie folgt den Zügen der großen Ameise, deren ungeflügelte Arbeiter ihre Lieblingsnahrung bilden." Karl Euler beobachtete sie in Kantagallo und fand auch das Nest am 10. November mit drei nackten Jungen aus der zweiten Brut. Er sagt, daß sie dort im Walde durchaus nicht selten ist. Trotzdem wird sie leider nur höchst selten lebend eingeführt; auf der ersten Ausstellung des Vereins „Aegintha" hatte Herr Möller aus Hamburg ein Männchen. Meines wissens ist sie jedoch weder vor- noch nachher im Handel vorhanden gewesen. Hartangara (Br.). — Le Tangara quadricolor ou le Quadricolor; Quadricolored Tanager. — Tachyphónus quadricolor, *Vll.*, *Cb.*, *Hrtl.*, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.*; Tanagra auricapilla, *Spx.*, *Pr. Wd.*; T. Suchii; *Swns.*; Muscicapa galeata, *Lchtst.*; Trichothraupis quadricolor, *Azr.*, *Brlpsch.* [Lindo pardo copete amarillo (♂), Lindo pardo y canela alas y cola negras (♀) *Azr.*].

Die purpurrothe Tangara [Tanagra brasilia].

Tafel XIV. Vogel 68.

Mit ganz besonderm Vergnügen darf ich diese Tangara schildern, denn sie vereinigt nicht allein viele Vorzüge, sondern sie ist auch bereits in einer Vogelstube mit Glück gezüchtet. Sie erscheint am ganzen Körper glänzend purpurroth bis auf Flügel und Schwanz, welche schwarz sind, und ihr vornämlichstes Kennzeichen ist der breit weiße Unterschnabel. Ihr Gefieder bleibt unverändert und verfärbt sich nicht wie das aller übrigen rothen Tangaren in ein unscheinbares Winterkleid; es blaßt jedoch in der Gefangenschaft manchmal merklich ab. In der Größe ist sie der Krontangara gleich.

Sie erfreut sich in den zoologischen Gärten außerordentlicher Beliebtheit und wird in denselben als herrlicher Schmuckvogel gern gehalten. Unter allen Tangaren gelangt sie am zahlreichsten zu uns und darf als eine regelmäßige Erscheinung des Vogelmarkts gelten. Ihre Heimat erstreckt sich über den Süden Brasiliens.

Zu den Vögeln gehörend, welche bereits den ältesten Schriftstellern bekannt waren, findet man inbetreff ihrer von Aldrovandi und noch weit früheren her bis zu Buffon mancherlei Angaben, in denen freilich viel Irrthum und Verworrenheit herrschen, während über die eigentliche Naturgeschichte des Vogels kaum etwas bestimmtes vorhanden ist. Schon Belon erzählt übrigens, daß zu seiner Zeit Kaufleute die rothen Tangaren in großer Anzahl von Brasilien aus in den Handel gebracht haben und zwar um sie für Kleiderbesatz und andern Schmuck zu benutzen. Man ersieht also, daß bereits damals die menschliche Eitelkeit und Putzsucht solche Vögel für ihre Zwecke tödten ließ. Buffon meint, man müsse vermuthen, daß sie vor einer solchen barbarischen Verwendung in ihren Heimatsstrichen ungleich häufiger gewesen sei. Spätere Vogelkundige verwechseln mancherlei rothe Vögel unter einander und stellen namentlich auch den virginischen Kardinal unter die Tangaren. Dann wiederum in späterer Zeit, als die Liebhaberei für lebende Vögel beginnt, ist die Purpurtangara völlig verschwunden; weder Bechstein noch Bolle haben sie mitgezählt und die Verzeichnisse der Händler bis zum Anfang der siebenziger Jahre hatten sie ebenfalls nicht aufzuweisen; selbst in den zoologischen Garten von London ist ein einzelnes Männchen erst im Juli 1863 gelangt.

Burmeister fand sie in den Gebüschen der Sumpfländer an den Mündungen der Flüsse oder im Flußthale selbst, aber stets auf nassen mit Schilf und Gebüsch besetztem Grunde durch ganz Brasilien und zwar in kleinen Schwärmen zusammen, aber nicht ganz dicht neben einander; „man sieht immer nur einzelne hier und da im Buschwerk herumhüpfen, bald Männchen, bald Weibchen. Die höheren

Gebirgsthäler besucht sie nicht. Das Nest steht im Gebüsch, nicht hoch, ist aus Mos und trockenen Halmen geformt und enthält zwei bis drei Eier." Diese Angaben ergänzt Euler, der sie an ähnlichen Oertlichkeiten, namentlich auch in den angeschwemmten Bezirken neben der Seeküste häufig sah, dahin, daß das Nest gewöhnlich in den Riedgrasbüschen kleiner von Sumpf umgebener Hügel stand. Es bildet einen offnen Napf aus Binsen und Schilfblättern, welche sorgfältig in einander gesteckt und geflochten, jedoch in Ermanglung jedes Bindemittels schlecht zusammenhalten und beim Emporheben gewöhnlich auseinanderfallen. Die flache Nestmulde ist aus feinen zarten Blütenstengeln gemacht, doch ziemlich kunstlos; ihr Durchmesser beträgt 7cm., ihre Tiefe kaum 3cm. Das Material ist nach außen hin verschwenderisch angebracht, einen großen Büschel bildend, der in dem über ihm sich schließenden hohen Grase versteckt liegt. Auch Prinz Wied berichtet, daß das Nest auf mittelhohen Bäumen oder dicht über dem Boden im Gebüsch stand, aus Würzelchen, Halmen und Mos gebaut war und zwei bis drei Eier enthielt. Hiermit sind sodann aber alle Angaben über das Freileben abgeschlossen.

Im allgemeinen wird auch dieser prächtige Vogel wenig und namentlich pärchenweise nur höchst selten bei uns in Vogelstuben und Käfigen gefunden und dies mag allerdings einerseits in seinem recht hohen Preise, und andrerseits in seiner Unverträglichkeit begründet liegen. Sie sind zwar nicht ganz so bösartig wie die schwarzen Arten, allein immerhin zeigen sie sich für manche Vögel gefährlich genug; so jagte das Pärchen bei mir jeden rothen Vogel, also zunächst einen australischen Amarant oder Sonnenastrild, dann einen Purpurgimpel und späterhin auch einen reinweißen Reisvogel, dessen Weibchen gerade auf sechs Eiern brütete, zutode.

Die erste und einzige Zucht, welche bisher geglückt ist, hat Frau Prinzessin v. Croy auf Schloß Roeulx zu Hainaut in Belgien erzielt, und sie schildert dieselbe in folgendem: „Das Männchen besaß ich seit vier Jahren, das Weibchen seit zwei Jahren und erst dann begannen sie zu nisten. Ich hatte für sie ein offnes Korbnest in einer sehr geschützten Ecke des Gartens aufgehängt, in welches sie nur wenige Niststoffe trugen und dann zwei blaugrünliche Eier legten. Dieselben wurden vom Weibchen allein ungefähr 13 Tage emsig bebrütet; während dieser Zeit wurde das erstre vom Männchen gefüttert, und als die Jungen ausgeschlüpft, wurden sie von beiden Alten gemeinsam sorgfältig gepflegt. Die anfangs schwärzlich und sehr häßlich aussehenden Kleinen befiederten sich bald und erschienen dann schwärzlichbraun und röthlichbraun an Brust und Rücken; da das eine in dieser Farbe kräftiger, das andre matter war, so hielt ich sie für ein Pärchen. Die Alten sowie auch die Jungen sind recht zahm, wie alle meine Vögel überhaupt, was ich für das gute Gedeihen der Bruten als sehr zuträglich erachte. Ich reichte ihnen wol zwölfmal täglich viele recht kleingeschnittene Mehlwürmer

mit frischen Ameisenpuppen und hartgekochtem Eigelb vermischt, an verschiedenen Plätzen des Gartens und der Vogelstube. Außerdem suchten sie sich eifrig allerlei Insekten und namentlich kleine Würmer, welche alle vor der Verfütterung immer erst in Stücke zerhackt wurden. Nebenbei raubten sie sodann die eben aus den Eiern geschlüpften Jungen einer grauen Bachstelze, welche mit einer gelben zusammen genistet hatte. Auch die kleinen Vögel wurden sorgsam zerkleinert. Selbstverständlich fütterte ich zugleich täglich viel Obst."

Das Männchen von dem vorhin erwähnten Par hatte sich seit längrer Zeit in meiner Vogelstube, theils freifliegend, theils im Käfige befunden, ohne daß es mir gelang, ein Weibchen für dasselbe zu beschaffen. Diese prächtige Tangara erhielt sich bei dreimaligem Federwechsel immer in gleichem feurigen Farbenglanz und dies mag wol einerseits in der sorgsamen Verpflegung mit guten süßen Früchten nebst Mehlwürmern, Ameisenpuppen und Eierbrot und andrerseits darin begründet gewesen sein, daß sie bei Sonnenschein und Regen ins Gitterfenster hinaus an die freie Luft gelangen konnte. Als ich dann von Herrn H. Möller in Hamburg eine Anzahl mittelamerikanischer Vögel zur Bestimmung empfing, war darunter ein röthlichbrauner, den ich für ein Weibchen dieser Art erachtete, ohne dies jedoch mit voller Sicherheit zu wissen. Ich brachte ihn nebst den anderen in die Vogelstube in einen geräumigen Käfig und jetzt entfaltete sich ein gar reizendes Bild. Die braune Tangara stieß leise zirpende Töne aus, während sie sehnsüchtig mit den Flügeln zitterte, und das glänzendschöne Männchen kam schwanz- und flügelschwippend herbei und umtanzte den Käfig mit schrillem Jubelgeschrei. Nun durfte ich mich davon überzeugt halten, daß ich ein richtiges Pärchen besaß; als sie dann jedoch freifliegend in der Vogelstube die vorhin geschilderte Bösartigkeit entwickelten, mußte ich sie abschaffen. Nachher hatte ich freilich Ursache, dies umsomehr zu bedauern, da es mir nicht gelingen wollte, ein richtiges Pärchen wieder in meinen Besitz zu bringen; die als angebliche Weibchen gekauften zeigten sich stets als junge Männchen, indem sie sich nach längerer oder kürzerer Zeit zum Prachtgefieder verfärbten. Der Preis beträgt 60 bis 75 Mark für das Pärchen.

Die purpurrothe Tangara heißt auch Purpurtangara, brasilische Tangara, Immerrothvogel und Tapiranga (nach ihrem brasil. Namen, Br.). — [Scharlachfarbige Merle oder Tangara, Schwarzflügler, Scharlachsperling, karminfarbener Kernbeißer und brasilianische Amsel nach alten Autoren].

Le Tangara du Brésil ou le Tangara rouge du Brésil; Brazilian Tanager.

Nomenclatur: Tanagra brasilia, *L.*, *Buff.*, *Lth.*, *Pr. Wd.*; Rhamphocélus coccíneus, *Vll.*, *Lss.*, *Dsm.*; Rhamphópis coccineus, *Swns.*; Rhamphocélus brasilius, *b.*, *Brmst.*; R. brasiliensis, *Hrtl.* [nec *L.*], *Br.*; *Rss.* [„*Hndb.*"]. [Tanagra Cardinalis, *Brss.*; Passer indicus erythromelanus sine uropygio et P. indicus porphyromelanus, *Inst.*: P. erythromelanus indicus sine uropygio et P. indicus caudatus porphyromelanus, *Aldvr.*; Tijepiranga brasiliensis, *Mrkgr.*, *Wllghb.*: Mérula brasilica, *Bln.*, *Aldr.*, *Inst.*, *Chrl.*, *Wllghb.*, *Ray.* — Scarlet Sparrow et Moineau écarlate, *Edw.*; Red and blac

Kumploset, *Charl.*; Merle du Brésil, *Bgl.*; le Scarlatte ou Tangara du Mexique, *Buff.* — Tijé-piranga in Brasilien, *Markg.*; Chilchiltototl und Hauhtototl in Mexiko, *Fern.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Gleichmäßig glänzend dunkelpurpurroth, an Schultern und Oberrücken noch etwas dunkler, an Bürzel und Unterschwanzdecken lichter und an der ganzen untern Körperseite ein wenig heller und matter; Flügel und Schwanz rein- und tiefschwarz, Schwingen und große Flügeldecken schmal fahl braunroth außengesäumt. Schnabel schwarz, Unterschnabel am Grunde breit bläulichweiß; Auge hochroth; Füße bräunlichschwarz. — Weibchen am Oberkopf und Oberrücken dunkelbraun mit rothem Schein; übrige Oberseite schwärzlichbraun; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun mit lebhaft rothem Schein; Bürzel glänzendroth; Kehle matt bräunlichgrau; ganze übrige Unterseite düsterbraun, röthlich scheinend. Schnabel heller braun mit blassem Unterschnabel; Auge roth; Füße fahlbraun. (Diese Beschreibung ist von mir nach zahlreichen lebenden Exemplaren gegeben; in folgendem füge ich noch Burmeister's an): „Glänzend gleichmäßig kochenilleroth; Flügel, Schwanz und Unterschenkel schwarz; Beine fleischbraun. Weibchen an Kopf, Hals und Rücken graubraun; Flügel olivenbraun; Unterrücken kochenilleroth; Schwanz schwarzbraun; Brust, Bauch und Bürzel trübe röthlichgrau."

Tanagra brasilia: nitide purpurea; humeris dorsoque paulo obscurioribus, uropygio, infracaudalibus totoque gastraeo subpallidioribus, alis caudaque aterrimis; remigibus tectricibusque al. majoribus exterius anguste subfusco-limbatis; rostro nigro, basi mandibulae late subcoeruleo-alba; iride ruberrima; pedibus e fusco nigris. — ♀ pileo dorsoque fuscis, rubro-micantibus; notaeo reliquo fuliginoso; remigibus caudaque fuliginosis, rubente micantibus; uropygio nitide rubro; gula subfumida; subtus luride fusca, rubente imbuta; rostro dilutius fusco, mandibula pallida; iride rubra; pedibus livide umbrinis (*Rss.*) ♂ omnino nitide coccinea; alis, cauda tibiisque nigris; pedibus fuscato-carneis. ♀ capite, collo dorsoque fumidis; alis olivaceo-umbrinis; tergo coccineo; cauda fuliginosa; pectore, abdomine et uropygio fumide rubiginosis (*Brmstr.*).

Länge 17cm.; Flügel $8{,}2^{cm.}$; Schwanz 7cm.

Beschreibung des Eies: Bläulichgrün, braun bespritzt und gestrichelt (Pr. Wied). Blaugrün, dunkler besprengt, am stumpfen Ende schwarz bekritzelt (Brmst.). Schön blaugrün mit weit abstehenden, scharf begrenzten runden pechschwarzen, gleichmäßig vertheilten Flecken und Punkten, zwischen denen einige sehr feine schwarze Kritzel; glattschalig und glänzend; Gestalt normal mit schmal zulaufendem Vorderende und sanft abgerundetem Hinterende. Länge 22mm.; Breite 16mm.; Schneidepunkt 13mm. (Euler).

Ovum: subaerugineum fusco-adspersum et lineolatum (*Pr. Wd.*). O. aeruginosum, obscurius adspersum, basi nigro-lineolatum (*Brmst.*). O. pulchre aeruginosum maculis punctisque late distantibus, circumscripte rotundis, piceis, regulariter distributis, nonnullisque lineolis nigris subtilissimis interjectis; laeve nitidumque; apice anguste decurrente basique leniter rotundata (*Euler*).

Die schwarzbraune Tangara [Tanagra jacapa]

zeigt gleich manchen anderen fremdländischen Vögeln die Erscheinung, daß sie nicht allein nach der Beschreibung des Federkleides, sondern auch sogar nach dem Freileben den alten Autoren bekannt war. Sie ist glänzendkirschroth; Rücken, Flügel und Schwanz schwärzlich, jede Feder matt roth gerändert; Oberkopf lebhafter bräunlichroth; ganze Unterseite wenig heller purpurbräunlichroth, an der Brust am lebhaftesten, Bauch und Hinterleib mehr schwärzlichbraun. Schnabel dunkelbraun, und der am Grunde sehr dicke Unterschnabel ist gelblichbleifarben, nur an der Spitze dunkelbraun; Auge braun; Füße

bräunlichfleischfarben. Das Weibchen ist braun mit röthlichem Schein, letzterer besonders an Brust und Bürzel; Schwingen und Schwanzfedern bräunlichschwarz. Schnabel braun, Unterschnabel am Grunde wenig heller; Auge braun; Füße bräunlichfleischfarben. Sie ist kleiner als die vorigen, nur etwa von Finkengröße. Ihre Verbreitung erstreckt sich über das nördliche Brasilien, Guiana, Kolumbia und Peru, und da sie überall häufig erscheint, so läßt sich auch wol erwarten, daß sie demnächst mehr in den Handel gelangen werde. Die wenigen einzelnen Köpfe, welche noch dazu nur selten von Händlern in Bordeaux unter dem uralten Namen Silberschnabel ausgeboten werden, gelten in den deutschen Handlungen und selbst in Antwerpen gewöhnlich als Weibchen anderer Arten. Buffon sagt, daß die erwähnte volksthümliche Bezeichnung ihr von den Kolonisten beigelegt und umsomehr zutreffend sei, da der Unterschnabel am Grunde wie von blankem Silber erglänze; nach dem Tode verlösche dieser Schiller. Da Edwards die Abbildung seiner ‚Amsel mit rother Brust' nach einem ausgestopften Exemplare gegeben, so habe er den glänzenden Schnabel nicht zur Geltung gebracht. In ihrem Freileben schildert sie bereits Sonnini, der sie in der Heimat beobachtet hat: „Sie hält sich meistens in freien Gegenden auf, zeigt sich nicht scheu, sondern kommt dreist bis in die Gärten, doch ist sie auch in menschenleeren Gegenden häufig und namentlich inmitten der Wälder an freien Stellen oder solchen, in denen der Wind viele Bäume umgeworfen hat, zu finden. Ihre Ernährung besteht in kleinen oder auch in großen weichen Früchten, welche letzteren sie anhackt; dagegen verschmäht sie dann die Insekten völlig. Niemals lebt sie in Scharen, sondern stets parweise. Das Nest steht auf mittelhohen Bäumen, auf einem wagerechten Zweige, ist gewölbt und mit dem Schlupfloch von unten, aus trockenen Gräsern, Halmen und Rohrblättern gewebt und innen mit breiten Blattstückchen ausgepolstert." (Da nach den übereinstimmenden Angaben aller neueren Reisenden sämmtliche Tangaren offene, denen der Finken ähnliche Nester erbauen, so dürfte hier wol ein Irrthum, bzl. eine Verwechselung vorliegen). „Das Gelege besteht in zwei länglichrunden weißen, am dickern Ende schwachroth gefleckten Eiern." Weder Burmeister noch die übrigen neueren Ornithologen haben etwas näheres hinzugefügt.

Die schwarzbraune Tangara ist von Br. Purpurtangara genannt. — [Silberschnabel, schwarze Merle, Amsel mit rother Brust, nach alten Autoren]. — Le Ramphocèle à bec d'argent; Red-breasted Tanager or Red-breasted Blackbird.

Nomenclatur: Tanagra jacapa, *L.*, *Bff.*, *Lth.*; Rhamphocélus purpúreus, *Vll.*, *Lss.*; Rhamphópis atrococcíneus, *Swns.*, *Dsmr.*; Rhamphocélus jacapa, *Lss.*, *Cb.*, *Brmst.*. *Br.* [Chilchiltototl tepazcullula, *Fern.*; Cardinalis purpureus, *Brss.* — Red-breasted Black-bird, Merle à gorge rouge, *Edw.*; Cardinal pourpre-foncé, *Sal.* — Chilchiltototl, in Mexiko, Bec d'argent, bei den Einwohnern von Kayenne, Buff.].

Länge 15,7 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 5,9 cm.

Die blutrothe Tangara [Tanagra sanguinolenta] ist am ganzen Kopf, an Nacken, Halsseiten, Bürzel, Oberschwanzdecken, Kehle, Brust und Unterschwanzdecken glänzend blutroth und an den übrigen Körpertheilen glänzendschwarz; der Schnabel ist bleigrau, am Grunde weißlich;

In letztrer Zeit gelangt diese Art vielfach in den Handel, und im Vertrauen auf Brehm's Angabe, daß sie friedlich mit anderen zusammen lebe, hat man sie mehrfach für die Vogelstuben angeschafft. Auch ich erhielt ein Pärchen von Herrn H. Möller in Hamburg, und da ich annehmen mußte, daß die Bösartigkeit des ersten Weibchens in meinem Besitz nur eine individuelle gewesen, so ließ ich jene nebst Purpur- und Scharlachtangaren in die mit den seltensten und werthvollsten Prachtfinken reich besetzte Vogelstube. Hier zeigten sie sich alle anfangs sehr harmlos, sodaß ich obige Behauptung mit gutem Gewissen in der „Gefiederten Welt" bestätigen konnte. Bald aber, nachdem sie sich wahrscheinlich erst von den Reisebeschwerden völlig erholt und nistlustig geworden, begannen sie ihre unheilvolle Thätigkeit. Zunächst wurden alle jungen Vögel, sobald sie die Nester verließen, umgebracht, und nicht lange, da fand ich auch einen alten Prachtfink nach dem andern, selbst einen Bayaweber, einen Sonnenvogel u. a. todt am Boden. Während ich zuerst die Bülbüls, welche in drei Arten ebenfalls die Vogelstube bewohnten, in Verdacht hatte, stellte es sich bei aufmerksamer Beobachtung bald heraus, daß jene allerdings arge Raufbolde, daß aber die Tangaren und vor allem das Weibchen der Krontangara die bösartigsten seien. Mir mangelte dann leider der Raum, um weitere Züchtungsversuche mit ihnen anzustellen und ich mußte sie daher fortgeben. Anderweitige Versuche oder gar Erfolge sind leider nicht bekannt geworden. Im Berliner Aquarium soll ein Pärchen genistet haben, doch ist darüber sichres nicht verlautet. Kräftig und ausdauernd, hält sich diese Tangara vortrefflich und darf als ein besonders schöner Käfigvogel gelten. Einen Gesang hat sie nicht, Männchen und Weibchen lassen vielmehr nur rauhe heisere, manchmal weberähnlich zischende Laute hören. Sie frißt vorzugsweise Sämereien und zwar Kanariensamen, Hirse, auch etwas Mohn und Hanf; dagegen weniger Früchte und Kerbthiere, als andere Arten. Ihre Farben wechseln nicht mit den Jahreszeiten. Der Preis steht auf 45 bis 50 Mark für das Pärchen und nur selten niedriger.

Die Krontangara hat wol keine weiteren Namen. — Le Tangara ou Tachyphone couronné; Crowned Tanager. — Tschá, Heimatsname in Brasilien, nach *Eul.*

Nomenclatur: Agelaius coronatus, *Vll.*; Tanagra coryphaea, *Lchtst.*; T. brunnea *Spx.*; Tachyphónus Vigorsii, *Swns.*, *Jard* et *Selb.*; T. coryphaeus, *Gr.*; T. coronatus, *Cb. Brmst.*, *Br.*; Tanagra nigerrima, *Eul.* [nec *L.*]. — [Tordo de bosque coronado y negro, *Azr.*]

Wissenschaftliche Beschreibung: Einfarbig schwarz, stahlblau glänzend; ein purpurrother Fleck auf dem Scheitel, welcher jedoch nur dann zur Geltung kommt, wenn der Vogel in der Erregung die Kopffedern sträubt; Schwingen und untere Flügeldecken am Grunde der Innenseite weiß. Schnabel schwarz; Auge braun; Füße braun. — Das Weibchen ist lebhaft roströthlichbraun; Oberkopf bis zum Nacken graubraun, Wangen braun, fein grau gestreift; Bürzel und Schwanz heller zimmtroth; ganze Unterseite roströthlichbraun. Schnabel braun Auge dunkelbraun; Füße bräunlichfleischroth.

Tanagra coronata: unicolor nigra, chalybaeo-nitens; plumis verticis nonnisi erectis maculam purpuream offerentibus; basi pogonii interioris remigum et tectricum

subalarium alba; rostro nigro; iride fusca; pedibus fuscis, — ♀ laete ferruginosa; pileo ad cervicem usque fumido; genis umbrinis, subtiliter cano-vittatis; uropygio caudaque dilutius cinnamomeis; subtus ferruginea; rostro umbrino; iride fusca; pedibus e fusco carneis.

Länge $18{,}4^{cm.}$; Flügel $8{,}7 - 8{,}9^{cm.}$; Schwanz $6{,}5^{cm.}$

Das Jugendkleid ist nach Burmeister dem des Weibchens gleich; das junge Männchen erhält in der ersten Mauser am Oberkopf einige schwarze stahlblauglänzende Federn; Schnabel schwarzbraun; Unterschnabel am Grunde weiß; Füße fleischbraun. Nach Schlüter zeigt das junge Männchen späterhin, selbst wenn bereits die rothe Scheitelmitte vorhanden ist, noch überall rostrothe Federn zwischen den schwarzen, so daß es ein scheckiges Aussehen hat.

Juvenis: cum femella conveniens; ♂ juv. plumas primas mutans plumis pilei nonnullis chalybaeo-nitentibus ornatus; rostro nigro-fusco, basi mandibulae alba; pedibus carneis. Secund. Schlüter ♂ juv. serius plumis inter nigras ferrugineis, quare maculosa apparens.

Beschreibung des Eies: Grundfarbe kräftig und hell fleischroth, mit großen, breiten, dunkelrothen Zeichnungen, welche in weiten Abständen vertheilt sind, theils verwachsene, theils scharfbegrenzte Ränder haben und mit kräftigen sepiabraunen Tüpfeln und Kritzeln vermischt sind; am dickern Ende steht die Zeichnung etwas gedrängter. Die Gestalt ist länglichoval und beide Enden sind fast gleich stumpf. Länge $23{,}5^{mm.}$; Dicke $17^{mm.}$; Schneidepunkt etwa $12{,}5^{mm.}$ (Euler).

Ovum: saturate carneum striis magnis latisque ruberrimis, ample divaricatis margines parte lavatos, parte circumscriptos ostendentibus notatum, nec non punctillis lineolisque distincte umbrinis intermixtis, usque circa basin magis coacervatis; ceteroquin oblongo-ovatum apice utroque fere aequabiliter obtuso.

Die Trauertangara [Tanagra melaleuca].

Tafel XIV. Vogel 72.

Der vorigen fast völlig gleich, doch ohne den rothen Schopf, vielmehr rein bläulichschwarz und mit weißem Schulterstreif, ist sie mehr im Norden Brasiliens, besonders in den Gegenden am Amazonenstrom, Guiana und Kolumbien, sowie auch in Venezuela und Trinidad heimisch. Sie war bereits den alten Autoren bekannt, und Buffon, der Beschreibung und Abbildung von beiden Geschlechtern gibt, sagt, daß Sonnini de Manoncourt die verschiedene Färbung des Männchens und Weibchens zuerst nachgewiesen hat. Letztrer beobachtete sie in der Heimat am Nest und fand sie auch außer der Nistzeit stets parweise im dichten Gebüsch lebend, niemals aber zahlreich vereinigt. Er gibt bereits an, daß sie durchaus keinen Gesang, sondern nur schrille durchdringende Lockrufe hören lasse. Ihre Nahrung bestehe in kleinen Früchten und Insekten. Näheres ist über ihr Freileben seither leider nicht veröffentlicht worden. Die Beobachtung in der Vogelstube hat ergeben, daß sie sowol in der Lebensweise, als auch in der Ernährung der vorigen durchaus gleich ist. Sie kommt übrigens viel seltner in den Handel, wird nur einzeln von Fräulein Hagenbeck, Herren K. Reiche, Chs. Jamrach, H. Möller u. A. eingeführt und ist daher noch weniger bei den Liebhabern zu finden. Der Preis beträgt etwa 45 Mark für das Pärchen. Im Berliner Aquarium hatte zur Zeit der ersten Direktion ein Pärchen dieser

Art geniſtet, und nach den Angaben des Oberwärters Seidel berichtete der „Führer", daß die eifrigen Alten „ſich garnicht damit begnügen, ihre eigenen Jungen zu füttern, ſondern daß ſie die ihnen gereichten Mehlwürmer auch barmherzig jedem andern Vogel bieten, welcher darum bettelt". Ich will über ſolche Fantaſieſchilderungen keine Worte verlieren; nur darauf ſei hingewieſen, daß Erfahrungen von zahlreichen Seiten mit voller Entſchiedenheit eine Bösartigkeit dieſes Vogels feſtgeſtellt haben, welche der des vorigen durchaus gleich iſt. Ueber die Brut der Trauertangara im Aquarium hat Herr Dr. Brehm keinerlei Mittheilung gemacht, während eine eingehende Beobachtung doch umſomehr dankenswerth geweſen wäre, da, wie ſchon vorhin bemerkt, das Freileben dieſer Vögel noch völlig unbekannt iſt. Darin liegt doch eben die höchſte Wichtigkeit aller Vogelzüchtung, daß durch die gewiſſenhafte Feſtſtellung und Angabe aller obwaltenden Verhältniſſe die Naturgeſchichte des betreffenden Vogels bereichert werde.

Die Trauertangara iſt von Br. Schwarztangara benannt. [Schwarze und braunrothe Tangara, Buff.]. — Tangara noir; Black Tanager.

Nomenclatur: Tanagra nigerrima, *Gml.*, *Lchtst.*, *Pr. Wd.*, *Dsm.*; Oriolus leucopterus, *Gml.*, *Buff.*, *Lth.*; Tanagra melaleuca, *Sprrm.*; Tachyphónus leucópterus, *Vll.*, *Orb.*; T. nigerrimus, *Cb.*, *Brmst.*; T. melaleucus, *Br.* — [Tordo di bosque negro cobijas blancas, *Arz.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Einfarbig ſchwarz, lebhaft ſtahlblau glänzend, namentlich an Hinterkopf, Oberrücken, Flügeln und Schwanz, wo alle Federn faſt rein dunkelblaue Außenſäume haben; Bruſtſeiten unterhalb des Flügels, untere Flügelſeite nebſt Innenfahne der Schwingen und Schulterrand reinweiß (in der Ruhe iſt der weiße Flügelrand jedoch garnicht zu bemerken); Schnabel glänzend ſchwarz, am Grunde, ſowie faſt der ganze Unterſchnabel heller blaugrau; Auge braun; Füße ſchwärzlichgrau. — Das Weibchen iſt einfarbig roſtröthlichbraun, dunkler als das des vorigen; die dunkelbraunen Schwingen ſind röthlichfahl geſäumt; Schwanzfedern lebhaft röthlichbraun; ganze Unterſeite hell gelblichbraun; Schnabel bräunlichgrau; Auge braun; Füße bräunlichfleiſchroth. Das Jugendkleid iſt nach Burmeiſter dem des Weibchens gleich, nach der erſten Mauſer ſchwarz gefleckt, ſpäterhin mattſchwarz, nur wenig glänzend.

Tanagra melaleuca: colore omnino nigro, laete chalybaea-nitente, praesertim occiput, tergum, alas caudamque occupante, eorumque plumis exterius subcyaneo-limbatis; pleuris subalaribus, latere alarium inferiore, pogoni oremigum interiore et campterio albis: basi rostri nitide nigri et mandibula caesiis; iride fusca: pedibus e nigro cinereis. — ♀ unicolor ferruginosa, priore obscurior; remigibus fuscis, subrufo-limbatis; cauda laeta castanea; subtus livide fuscata; rostro fumide cinereo; iride fusca; pedibus fuscato-carneis. — Juvenis: (sec. *Brmst.*) femellae persimilis; post mutationem plumarum primam nigro-maculata, serius nigra, parum nitens.

Länge 18,3 cm.; Flügel 8,7 cm.; Schwanz 6,3 cm.

Die rothhäubige Tangara [Tanagra cristata]

iſt der Krontangara ſehr ähnlich, doch mehr bläulichſchwarz mit beträchtlichem rothem Federbuſch auf dem Kopfe und an Kehle und Bürzel faſt röthlichgelb, auch von bemerkbar geringerer Größe. Sie war den alten Vogelkundigen ebenfalls bereits bekannt und Buffon ſagt, daß ſie in Guiana ſehr gemein ſei, von

kleinen Früchten lebe, ein schrilles finkenähnliches Geschrei, aber keinen solchen Gesang erschallen lasse und niemals in großen Wäldern, sondern nur im Freien auf beackerten Feldern zu finden sei. Nach Burmeister's Angaben ist sie im Waldgebiet des ganzen Brasilien heimisch und nirgends selten, bei Rio de Janeiro sogar häufig, doch mehr an den Ufern als in den Gebirgsthälern. Auch von Euler wurde sie in der Provinz Rio de Janeiro gesammelt und ihre Verbreitung dürfte sich außer Brasilien und Guiana auch noch auf Neu-Granada erstrecken. Da sie in allen diesen Gegenden keineswegs selten vorkommt, so ist es verwunderlich, daß der Vogelhandel sie nicht oft und in größrer Anzahl zu bieten hat, umsomehr, da solche Tangaren immer gern und zu hohen Preisen gekauft werden; sie wird nur hin und wieder einmal von Bekemans in Antwerpen in einzelnen Köpfen eingeführt. In ihrem ganzen Wesen und in allen Eigenthümlichkeiten dürfte sie der Krontangara völlig gleichen.

Die rothhäubige Tangara hat Br. Rothhaubentangara benannt. [Gehäubte oder kappigte Tangara und Haubenmerle, nach den alten Autoren]. — Houpette; Crested Tanager.

Nomenclatur: Tanagra cristata, *L.*, *Bff.*, *Pr. Wd.*; T. cirrhómelas, *Vll.*; Lanio Vieilloti, *Lfrsn.*; Tachyphónus cristatus, *Vll.*, *Cb.*, *Brmst.*, *Br.* [Tanagra cayanensis nigra cristata, *Brss.* — Houpette, Tangara de la Guyane et Tangara de Cayenne, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Einfarbig mattschwarz; Oberkopf mit einer feuerrothen Holle, welche wol auf- und niedergeklappt, doch keineswegs völlig verdeckt werden kann; Unterrücken und Bürzel hell gelblichrostroth, ebenso ein Fleck an der Oberkehle; Schulterstreif und ganze innere Flügelseite reinweiß. Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Füße bläulichfleischroth. Das Weibchen ist olivengrünlichröthlichbraun, ohne Haube; Bürzel gelblichbraun; ganze Unterseite hellgelblichrostroth; Schnabel braun; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichfleischroth. — Das Jugendkleid gleicht nach Burmeister ebenfalls dem des Weibchens, das Uebergangskleid ist schwarz gefleckt mit durchscheinendem rothen Scheitel und etwas verlängerten Kopffedern.

Tanagra cristata: unicolor subnigra, crista pilei ignea erectili; macula gulari, tergo et uropygio gilvo-ferrugineis; campterio et subalaribus albis; rostro nigro; iride fusca, pedibus subcoeruleo-carneis. — ♀ olivaceo-virente badia; cristae vacua; uropygio gilvo-umbrino; subtus gilvo-ferruginea; rostro umbrino; iride fusca; pedibus fuscato-carneis. — Juvenis (sec. *Burm.*): femellae persimilis, post plumarum mutationem nigro-maculata, pileo rubro-tincto plumas subelongatas offerente.

Länge 17 cm.; Flügel 7,9 cm.; Schwanz 6,5 cm.

Die kleine Trauertangara [Tanagra luctuosa].

Der großen Trauertangara fast völlig gleich, nur bedeutend kleiner und mit viel breiterer weißer Binde über den Flügel, erscheint sie als ein ungleich zarteres und vielmehr harmloses Vögelchen im Vergleich zu allen Verwandten. Ihre Heimat erstreckt sich über die kleinen Republiken Südamerikas von Neugranada bis Peru und auch über die Inseln Trinidad und Tabago; Dr. Frantzius beobachtete sie auf Kostarika. Ueber die Lebensweise ist leider garnichts bekannt. Nur höchst selten und einzeln wird sie von Bekemans eingeführt, auch hatte

einmal Gubera, damals in Leipzig, einen Schub von fünf Köpfen, leider lauter Männchen, von einem kleinen Händler aus Bordeaux gekauft, von denen ich ein solches für meine Vogelstube entnahm. Das zarte Vögelchen musterte sich sehr schön heraus, konnte dann aber die nächste Mauser nicht überstehen, und nachdem es lange gekränkelt, fand ich es im Gebüsch bereits in Verwesung übergegangen. Da ich es jedoch etwa neun Monate vor mir gesehen, so kann ich behaupten, daß es im Gegensatz zu allen übrigen schwarzen Tangaren überaus sanft und verträglich sich zeigte. Wenn wir diese kleinere Art, die bei ihrer weiten Verbreitung doch wol nicht schwierig zu erlangen sein dürfte, häufiger erhielten, so würde sie gewiß eine sehr schätzenswerthe Bereicherung unserer Vogelstuben bilden.

Die kleine Trauertangara nennt Br. blos Trauertangara. — Petit Tangara noir; Little Black Tanager.

Nomenclatur: Pyranga luctuosa, *Orb.*: Lanio tenuirostris, *Gr.*; L. albispecularis, *Léot.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Ganzes Gefieder tiefschwarz, lebhaft glänzend, doch nur mit schwachem bläulichen Schein; obere und untere Flügeldecken und Innensäume der Schwingen weiß, wodurch eine breite weiße Querbinde über den Flügel gebildet wird. Schnabel schwarz, Unterschnabel nur am Grunde heller bläulich; Auge dunkelbraun; Füße schwärzlichgrau — Das Weibchen soll nach Orbigny's Angaben olivengrünlichbraun und an den Seiten des Halses, sowie an der Kehle düsterbräunlichweiß sein.

Tanagra luctuosa: aterrima, laete subcoeruleo-nitens; tectricibus al. superioribus et inferioribus limbisque remigum interioribus albis, quare fascia trans alas alba; rostro nigro, basi mandibulae tantum subcoerulea; iride fusca; pedibus subnigro-cinereis. — ♀ (sec. *d'Orbigny*) olivaceo-viride fusca, colli lateribus gulaque sordide albidis.

Länge $14_{,4}$ cm.; Flügelbreite etwa 21 cm.; Schwanz $2_{,6}$ cm.

Die vierfarbige Tangara [Tanagra quadricolor] ist größer als die meisten verwandten und kommt einem Star fast gleich. Stirn und Vorderkopf schwarz, Oberkopf mit einem kurzen Schopfe lebhaft goldgelb; Flügel und Schwanz schwärzlich, erstere mit breiter weißer Querbinde; ganze übrige Oberseite olivengrünlichgraubraun, beim ganz alten Vogel mehr reingrau; ganze Unterseite fahl bräunlichgelb, Brust- und Bauchseiten grünlichgrau; Schnabel bleigrau, Unterschnabel an Grund und Spitze weißlich; Auge braun; Füße bleigrau. Das Weibchen ist einfarbig olivengrünlichgraubraun, nur an Flügeln und Schwanz schwarz. (Nach H. v. Berlepsch und Reinhardt dürften die Weibchen doch eine düster goldgelbe Scheitelmitte haben, an Stirn, Zügel und Augengegend aber nicht schwarz sein. Die Vögel ganz ohne gelben Scheitel sollen Junge sein). „Im Walde bei Rio de Janeiro", sagt Burmeister, „und Neu-Freiburg nicht selten, an letzterem Orte sogar häufig. Sie folgt den Zügen der großen Ameise, deren ungeflügelte Arbeiter ihre Lieblingsnahrung bilden." Karl Euler beobachtete sie in Kantagallo und fand auch das Nest am 10. November mit drei nackten Jungen aus der zweiten Brut. Er sagt, daß sie dort im Walde durchaus nicht selten ist. Trotzdem wird sie leider nur höchst selten lebend eingeführt; auf der ersten Ausstellung des Vereins „Aegintha" hatte Herr Möller aus Hamburg ein Männchen. Meines wissens ist sie jedoch weder vor- noch nachher im Handel vorhanden gewesen. Hartangara (Br.). — Le Tangara quadricolor ou le Quadricolor; Quadricolored Tanager. — Tachyphonus quadricolor, *Vll.*, *Cb.*, *Hrtl.*, *Bp.*, *Brmst.*, *Br.*; Tanagra auricapilla, *Spx.*, *Pr. Wd.*; T. Suchii; *Swns.*; Muscicapa galeata, *Lchtst.*; Trichothraupis quadricolor, *Azr.*, *Brlpsch.* [Lindo pardo copete amarillo (♂), Lindo pardo y canela alas y cola negras (♀) *Azr.*].

Die purpurrothe Tangara [Tanagra brasilia].

Tafel XIV. Vogel 68.

Mit ganz besonderm Vergnügen darf ich diese Tangara schildern, denn sie vereinigt nicht allein viele Vorzüge, sondern sie ist auch bereits in einer Vogelstube mit Glück gezüchtet. Sie erscheint am ganzen Körper glänzend purpurroth bis auf Flügel und Schwanz, welche schwarz sind, und ihr vornämlichstes Kennzeichen ist der breit weiße Unterschnabel. Ihr Gefieder bleibt unverändert und verfärbt sich nicht wie das aller übrigen rothen Tangaren in ein unscheinbares Winterkleid; es blaßt jedoch in der Gefangenschaft manchmal merklich ab. In der Größe ist sie der Krontangara gleich.

Sie erfreut sich in den zoologischen Gärten außerordentlicher Beliebtheit und wird in denselben als herrlicher Schmuckvogel gern gehalten. Unter allen Tangaren gelangt sie am zahlreichsten zu uns und darf als eine regelmäßige Erscheinung des Vogelmarkts gelten. Ihre Heimat erstreckt sich über den Süden Brasiliens.

Zu den Vögeln gehörend, welche bereits den ältesten Schriftstellern bekannt waren, findet man inbetreff ihrer von Aldrovandi und noch weit früheren her bis zu Buffon mancherlei Angaben, in denen freilich viel Irrthum und Verworrenheit herrschen, während über die eigentliche Naturgeschichte des Vogels kaum etwas bestimmtes vorhanden ist. Schon Belon erzählt übrigens, daß zu seiner Zeit Kaufleute die rothen Tangaren in großer Anzahl von Brasilien aus in den Handel gebracht haben und zwar um sie für Kleiderbesatz und andern Schmuck zu benutzen. Man ersieht also, daß bereits damals die menschliche Eitelkeit und Putzsucht solche Vögel für ihre Zwecke tödten ließ. Buffon meint, man müsse vermuthen, daß sie vor einer solchen barbarischen Verwendung in ihren Heimatsstrichen ungleich häufiger gewesen sei. Spätere Vogelkundige verwechseln mancherlei rothe Vögel unter einander und stellen namentlich auch den virginischen Kardinal unter die Tangaren. Dann wiederum in späterer Zeit, als die Liebhaberei für lebende Vögel beginnt, ist die Purpurtangara völlig verschwunden; weder Bechstein noch Bolle haben sie mitgezählt und die Verzeichnisse der Händler bis zum Anfang der siebenziger Jahre hatten sie ebenfalls nicht aufzuweisen; selbst in den zoologischen Garten von London ist ein einzelnes Männchen erst im Juli 1863 gelangt.

Burmeister fand sie in den Gebüschen der Sumpfländer an den Mündungen der Flüsse oder im Flußthale selbst, aber stets auf nassen mit Schilf und Gebüsch besetztem Grunde durch ganz Brasilien und zwar in kleinen Schwärmen zusammen, aber nicht ganz dicht neben einander; „man sieht immer nur einzelne hier und da im Buschwerk herumhüpfen, bald Männchen, bald Weibchen. Die höheren

Gebirgsthäler besucht sie nicht. Das Nest steht im Gebüsch, nicht hoch, ist aus Mos und trockenen Halmen geformt und enthält zwei bis drei Eier.“ Diese Angaben ergänzt Euler, der sie an ähnlichen Oertlichkeiten, namentlich auch in den angeschwemmten Bezirken neben der Seeküste häufig sah, dahin, daß das Nest gewöhnlich in den Riedgrasbüschen kleiner von Sumpf umgebener Hügel stand. Es bildet einen offnen Napf aus Binsen und Schilfblättern, welche sorgfältig in einander gesteckt und geflochten, jedoch in Ermanglung jedes Bindemittels schlecht zusammenhalten und beim Emporheben gewöhnlich auseinanderfallen. Die flache Nestmulde ist aus feinen zarten Blütenstengeln gemacht, doch ziemlich kunstlos; ihr Durchmesser beträgt 7cm., ihre Tiefe kaum 3cm. Das Material ist nach außen hin verschwenderisch angebracht, einen großen Büschel bildend, der in dem über ihm sich schließenden hohen Grase versteckt liegt. Auch Prinz Wied berichtet, daß das Nest auf mittelhohen Bäumen oder dicht über dem Boden im Gebüsch stand, aus Würzelchen, Halmen und Mos gebaut war und zwei bis drei Eier enthielt. Hiermit sind sodann aber alle Angaben über das Freileben abgeschlossen.

Im allgemeinen wird auch dieser prächtige Vogel wenig und namentlich pärchenweise nur höchst selten bei uns in Vogelstuben und Käfigen gefunden und dies mag allerdings einerseits in seinem recht hohen Preise, und andrerseits in seiner Unverträglichkeit begründet liegen. Sie sind zwar nicht ganz so bösartig wie die schwarzen Arten, allein immerhin zeigen sie sich für manche Vögel gefährlich genug; so jagte das Pärchen bei mir jeden rothen Vogel, also zunächst einen australischen Amarant oder Sonnenastrild, dann einen Purpurgimpel und späterhin auch einen reinweißen Reisvogel, dessen Weibchen gerade auf sechs Eiern brütete, zutode.

Die erste und einzige Zucht, welche bisher geglückt ist, hat Frau Prinzessin v. Croy auf Schloß Roeulx zu Hainaut in Belgien erzielt, und sie schildert dieselbe in folgendem: „Das Männchen besaß ich seit vier Jahren, das Weibchen seit zwei Jahren und erst dann begannen sie zu nisten. Ich hatte für sie ein offnes Korbnest in einer sehr geschützten Ecke des Gartens aufgehängt, in welches sie nur wenige Niststoffe trugen und dann zwei blaugrünliche Eier legten. Dieselben wurden vom Weibchen allein ungefähr 13 Tage emsig bebrütet; während dieser Zeit wurde das erstre vom Männchen gefüttert, und als die Jungen ausgeschlüpft, wurden sie von beiden Alten gemeinsam sorgfältig gepflegt. Die anfangs schwärzlich und sehr häßlich aussehenden Kleinen befiederten sich bald und erschienen dann schwärzlichbraun und röthlichbraun an Brust und Rücken; da das eine in dieser Farbe kräftiger, das andre matter war, so hielt ich sie für ein Pärchen. Die Alten sowie auch die Jungen sind recht zahm, wie alle meine Vögel überhaupt, was ich für das gute Gedeihen der Bruten als sehr zuträglich erachte. Ich reichte ihnen wol zwölfmal täglich viele recht kleingeschnittene Mehlwürmer

mit frischen Ameisenpuppen und hartgekochtem Eigelb vermischt, an verschiedenen Plätzen des Gartens und der Vogelstube. Außerdem suchten sie sich eifrig allerlei Insekten und namentlich kleine Würmer, welche alle vor der Verfütterung immer erst in Stücke zerhackt wurden. Nebenbei raubten sie sodann die eben aus den Eiern geschlüpften Jungen einer grauen Bachstelze, welche mit einer gelben zusammen genistet hatte. Auch die kleinen Vögel wurden sorgsam zerkleinert. Selbstverständlich fütterte ich zugleich täglich viel Obst."

Das Männchen von dem vorhin erwähnten Par hatte sich seit längrer Zeit in meiner Vogelstube, theils freifliegend, theils im Käfige befunden, ohne daß es mir gelang, ein Weibchen für dasselbe zu beschaffen. Diese prächtige Tangara erhielt sich bei dreimaligem Federwechsel immer in gleichem feurigen Farbenglanz und dies mag wol einerseits in der sorgsamen Verpflegung mit guten süßen Früchten nebst Mehlwürmern, Ameisenpuppen und Eierbrot und andrerseits darin begründet gewesen sein, daß sie bei Sonnenschein und Regen ins Gitterfenster hinaus an die freie Luft gelangen konnte. Als ich dann von Herrn H. Möller in Hamburg eine Anzahl mittelamerikanischer Vögel zur Bestimmung empfing, war darunter ein röthlichbrauner, den ich für ein Weibchen dieser Art erachtete, ohne dies jedoch mit voller Sicherheit zu wissen. Ich brachte ihn nebst den anderen in die Vogelstube in einen geräumigen Käfig und jetzt entfaltete sich ein gar reizendes Bild. Die braune Tangara stieß leise zirpende Töne aus, während sie sehnsüchtig mit den Flügeln zitterte, und das glänzendschöne Männchen kam schwanz- und flügelschwippend herbei und umtanzte den Käfig mit schrillem Jubelgeschrei. Nun durfte ich mich davon überzeugt halten, daß ich ein richtiges Pärchen besaß; als sie dann jedoch freifliegend in der Vogelstube die vorhin geschilderte Bösartigkeit entwickelten, mußte ich sie abschaffen. Nachher hatte ich freilich Ursache, dies umsomehr zu bedauern, da es mir nicht gelingen wollte, ein richtiges Pärchen wieder in meinen Besitz zu bringen; die als angebliche Weibchen gekauften zeigten sich stets als junge Männchen, indem sie sich nach längerer oder kürzerer Zeit zum Prachtgefieder verfärbten. Der Preis beträgt 60 bis 75 Mark für das Pärchen.

Die purpurrothe Tangara heißt auch Purpurtangara, brasilische Tangara, Immerrothvogel und Tapiranga (nach ihrem brasil. Namen, Br.). — [Scharlachfarbige Merle oder Tangara, Schwarzflügler, Scharlachsperling, karminfarbener Kernbeißer und brasilianische Amsel nach alten Autoren].

Le Tangara du Brésil ou le Tangara rouge du Brésil; Brazilian Tanager.

Nomenclatur: Tanagra brasilia, *L.*, *Buff.*, *Lth.*, *Pr. Wd.*; Rhamphocélus coccíneus, *Vll.*, *Lss.*, *Dsm.*; Rhamphópis coccineus, *Sws.*; Rhamphocélus brasilius, *b.*, *Brmst.*; R. brasiliensis, *Hrtl.* [nec *L.*], *Br.*; *Rss.* [„*Hndb.*"]. [Tanagra Cardinalis, *Brss.*; Passer indicus erythromelanus sine uropygio et P. indicus porphyromelanus, *Inst.*; P. erythromelanus indicus sine uropygio et P. indicus caudatus porphyromelanus, *Aldrr.*; Tijepiranga brasiliensis, *Mrkgr.*, *Wllghb.*; Mérula brasilica, *Bln.*, *Aldr.*, *Inst.*, *Chrl.*, *Wllghb.*, *Ray.* — Scarlet Sparrow et Moineau écarlate, *Edw.*; Red and blac

Kumploset, *Charl.*; Merle du Brésil, *Bgl.*; le Scarlatte ou Tangara du Mexique, *Buff.* — Tijé-piranga in Brasilien, *Markg.*; Chilchiltototl und Hauhtototl in Mexiko, *Fern.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Gleichmäßig glänzend dunkelpurpurroth, an Schultern und Oberrücken noch etwas dunkler, an Bürzel und Unterschwanzdecken lichter und an der ganzen untern Körperseite ein wenig heller und matter; Flügel und Schwanz rein- und tiefschwarz, Schwingen und große Flügeldecken schmal fahl braunroth außengesäumt. Schnabel schwarz, Unterschnabel am Grunde breit bläulichweiß; Auge hochroth; Füße bräunlichschwarz. — Weibchen am Oberkopf und Oberrücken dunkelbraun mit rothem Schein; übrige Oberseite schwärzlichbraun; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun mit lebhaft rothem Schein; Bürzel glänzendroth; Kehle matt bräunlichgrau; ganze übrige Unterseite düsterbraun, röthlich scheinend. Schnabel heller braun mit blassem Unterschnabel; Auge roth; Füße fahlbraun. (Diese Beschreibung ist von mir nach zahlreichen lebenden Exemplaren gegeben; in folgendem füge ich noch Burmeister's an): „Glänzend gleichmäßig kochenilleroth; Flügel, Schwanz und Unterschenkel schwarz; Beine fleischbraun. Weibchen an Kopf, Hals und Rücken graubraun; Flügel olivenbraun; Unterrücken kochenilleroth; Schwanz schwarzbraun; Brust, Bauch und Bürzel trübe röthlichgrau."

Tanagra brasilia: nitide purpurea; humeris dorsoque paulo obscurioribus, uropygio, infracaudalibus totoque gastraeo subpallidioribus, alis caudaque aterrimis; remigibus tectricibusque al. majoribus exterius anguste subfusco-limbatis; rostro nigro, basi mandibulae late subcoeruleo-alba; iride ruberrima; pedibus e fusco nigris. — ♀ pileo dorsoque fuscis, rubro-micantibus; notaeo reliquo fuliginoso; remigibus caudaque fuliginosis, rubente micantibus; uropygio nitide rubro; gula subfumida; subtus luride fusca, rubente imbuta; rostro dilutius fusco, mandibula pallida; iride rubra; pedibus livide umbrinis (*Rss.*) ♂ omnino nitide coccinea; alis, cauda tibiisque nigris; pedibus fuscato-carneis. ♀ capite, collo dorsoque fumidis; alis olivaceo-umbrinis; tergo coccineo; cauda fuliginosa; pectore, abdomine et uropygio fumide rubiginosis (*Brmstr.*).

Länge 17cm.; Flügel 8,2cm.; Schwanz 7cm.

Beschreibung des Eies: Bläulichgrün, braun bespritzt und gestrichelt (Pr. Wied). Blaugrün, dunkler besprengt, am stumpfen Ende schwarz bekritzelt (Brmst.). Schön blaugrün mit weit abstehenden, scharf begrenzten runden pechschwarzen, gleichmäßig vertheilten Flecken und Punkten, zwischen denen einige sehr feine schwarze Kritzel; glattschalig und glänzend; Gestalt normal mit schmal zulaufendem Vorderende und sanft abgerundetem Hinterende. Länge 22mm; Breite 16mm; Schneidepunkt 13mm. (Euler).

Ovum: subaerugineum fusco-adspersum et lineolatum (*Pr. Wd.*). O. aeruginosum, obscurius adspersum, basi nigro-lineolatum (*Brmst.*). O. pulchre aeruginosum maculis punctisque late distantibus, circumscripte rotundis, piceis, regulariter distributis, nonnullisque lineolis nigris subtilissimis interjectis; laeve nitidumque; apice anguste decurrente basique leniter rotundata (*Euler*).

Die schwarzbraune Tangara [Tanagra jacapa]

zeigt gleich manchen anderen fremdländischen Vögeln die Erscheinung, daß sie nicht allein nach der Beschreibung des Federkleides, sondern auch sogar nach dem Freileben den alten Autoren bekannt war. Sie ist glänzendkirschroth; Rücken, Flügel und Schwanz schwärzlich, jede Feder matt roth gerändert; Oberkopf lebhafter bräunlichroth; ganze Unterseite wenig heller purpurbräunlichroth, an der Brust am lebhaftesten, Bauch und Hinterleib mehr schwärzlichbraun. Schnabel dunkelbraun, und der am Grunde sehr dicke Unterschnabel ist gelblichbleifarben, nur an der Spitze dunkelbraun; Auge braun; Füße

bräunlichfleischfarben. Das Weibchen ist braun mit röthlichem Schein, letzterer besonders an Brust und Bürzel; Schwingen und Schwanzfedern bräunlichschwarz. Schnabel braun, Unterschnabel am Grunde wenig heller; Auge braun; Füße bräunlichfleischfarben. Sie ist kleiner als die vorigen, nur etwa von Finkengröße. Ihre Verbreitung erstreckt sich über das nördliche Brasilien, Guiana, Kolumbia und Peru, und da sie überall häufig erscheint, so läßt sich auch wol erwarten, daß sie demnächst mehr in den Handel gelangen werde. Die wenigen einzelnen Köpfe, welche noch dazu nur selten von Händlern in Bordeaux unter dem uralten Namen Silberschnabel ausgeboten werden, gelten in den deutschen Handlungen und selbst in Antwerpen gewöhnlich als Weibchen anderer Arten. Buffon sagt, daß die erwähnte volksthümliche Bezeichnung ihr von den Kolonisten beigelegt und umsomehr zutreffend sei, da der Unterschnabel am Grunde wie von blankem Silber erglänze; nach dem Tode verlösche dieser Schiller. Da Edwards die Abbildung seiner ‚Amsel mit rother Brust' nach einem ausgestopften Exemplare gegeben, so habe er den glänzenden Schnabel nicht zur Geltung gebracht. In ihrem Freileben schildert sie bereits Sonnini, der sie in der Heimat beobachtet hat: „Sie hält sich meistens in freien Gegenden auf, zeigt sich nicht scheu, sondern kommt dreist bis in die Gärten, doch ist sie auch in menschenleeren Gegenden häufig und namentlich inmitten der Wälder an freien Stellen oder solchen, in denen der Wind viele Bäume umgeworfen hat, zu finden. Ihre Ernährung besteht in kleinen oder auch in großen weichen Früchten, welche letzteren sie anhackt; dagegen verschmäht sie dann die Insekten völlig. Niemals lebt sie in Scharen, sondern stets parweise. Das Nest steht auf mittelhohen Bäumen, auf einem wagerechten Zweige, ist gewölbt und mit dem Schlupfloch von unten, aus trockenen Gräsern, Halmen und Rohrblättern gewebt und innen mit breiten Blattstückchen ausgepolstert." (Da nach den übereinstimmenden Angaben aller neueren Reisenden sämmtliche Tangaren offene, denen der Finken ähnliche Nester erbauen, so dürfte hier wol ein Irrthum, vgl. eine Verwechselung vorliegen). „Das Gelege besteht in zwei länglichrunden weißen, am dickern Ende schwachroth gefleckten Eiern." Weder Burmeister noch die übrigen neueren Ornithologen haben etwas näheres hinzugefügt.

Die schwarzbraune Tangara ist von Br. Purpurtangara genannt. — [Silberschnabel, schwarze Merle, Amsel mit rother Brust, nach alten Autoren]. — Le Ramphocèle à bec d'argent; Red-breasted Tanager or Red-breasted Blackbird.

Nomenclatur: Tanagra jacapa, *L.*, *Bff.*, *Lth.*; Rhamphocélus purpúreus, *Vll.*, *Lss.*; Rhamphópis atrococcíneus, *Swns.*, *Dsmr.*; Rhamphocélus jacapa, *Lss.*, *Cb.*, *Brmst.*. *Br.* [Chilchiltototl tepazcullula, *Fern.*; Cardinalis purpureus, *Brss.* — Red-breasted Black-bird, Merle à gorge rouge, *Edw.*; Cardinal pourpre-foncé, *Sal.* — Chilchiltototl, in Mexiko, Bec d'argent, bei den Einwohnern von Kayenne, Buff.].

Länge 15,7 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 5,9 cm.

Die blutrothe Tangara [Tanagra sanguinolenta] ist am ganzen Kopf, an Nacken, Halsseiten, Bürzel, Oberschwanzdecken, Kehle, Brust und Unterschwanzdecken glänzend blutroth und an den übrigen Körpertheilen glänzendschwarz; der Schnabel ist bleigrau, am Grunde weißlich;

das Auge ist röthlichbraun und die Füße sind schwärzlichgrau. Das Weibchen soll blos düsterer gefärbt sein. In der Größe gleicht sie der Purpurtangara. Ihre Heimat erstreckt sich über fast ganz Mittelamerika und Südmexiko. Irgend welche näheren Angaben sind leider nicht zu finden. Im Laufe der Jahre erhielt ich nur einmal ein Männchen von Herrn Karl Gudera; im übrigen habe ich nicht erfahren können, ob sie jemals lebend eingeführt worden. Im Verzeichniß der Vögel des zoologischen Gartens von London ist sie nicht vorhanden und ebensowenig in denen der übrigen. Hoffentlich wird auch sie über kurz oder lang mehr eingeführt werden, da sie weit verbreitet und in ihrer Heimat nicht selten ist. Bluttangara (Br.). — Le Tangara sanguin; Sanguinous Tanager. — Tanagra sanguinolenta, *Lss.*; Tachyphónus sanguinolentus, *Lss.*, *Gr.*; Rhamphocélus sanguinolentus, *Cb.*, *Br.*

Die scharlachrothe Tangara [Tanagra rubra].

Tafel XIV. Vogel 69.

Endlich tritt uns nun eine Tangara entgegen, über deren Freileben mehrfache eingehende Berichte vorhanden sind. Dieselben werde ich möglichst ausführlich mittheilen, damit meine Leser dadurch ein Gesammtbild der Lebensweise aller dieser Prachtvögel gewinnen. Denn ich darf wol voraussetzen, daß das Freileben bei ihnen sämmtlich im wesentlichen übereinstimmend sein wird.

Sie ist heller scharlachroth als die brasilische Purpurtangara, ihr aber sehr ähnlich, an Flügeln und Schwanz tiefschwarz. Im ganzen Gefieder prachtvoll glänzend und mit bläulichgrauem Schnabel. Auch das Weibchen erscheint von dem jener Art verschieden, indem es nicht von brauner, sondern von olivengrüner Grundfarbe ist, am Unterkörper heller gelblich, an Flügeln und Schwanz schwarzbraun. Zum Winter hin verliert das Männchen sein Prachtkleid und verfärbt sich zu dem schlichten des Weibchens. Sie ist ein wenig größer als die Purpurtangara. Ihre Verbreitung erstreckt sich über fast ganz Nordamerika und selbst in Texas kommt sie noch als Brutvogel vor. Zum Winter hin wandert sie nach Westindien und bis zum Norden von Südamerika.

In den Angaben der alten Schriftsteller wird sie vielfach Kardinal genannt und mit dem S. 524 beschriebnen eigentlichen verwechselt. Buffon aber unterschied sie schon mit Sicherheit und wußte auch, daß sie im Norden, der Silberschnabel dagegen nur im Süden heimisch sei.

„Schon im Monat August", sagt Prinz Wied, „waren die männlichen Vögel sehr schön roth und dabei noch grün, in welchem gescheckten Gefieder sie recht hübsch aussehen. Diese Art lebt in allen Gegenden Nordamerikas, welche ich bereist habe. In Pennsylvanien fand ich sie häufig, noch mehr am Ohio und untern Missouri, wo sie als eine Zierde der herrlichen Waldungen zu betrachten ist. Sie gleicht in der Lebensweise völlig den verwandten brasilischen Tangaren, ist ein stiller Vogel und hat, wie es scheint, wenig Stimme; ich hörte nur einen kurzen Lockton. Gewöhnlich sieht man sie hoch auf den Spitzen der Bäume, wo ich sie manchmal mit einem Gewehrschuß nicht erreichen konnte. Als ich im

Frühjahr 1834 den Missouri wieder hinabreiste und im Monat Mai die großen Waldungen an seinem untern Lauf erreichte, nachdem ich die offenen Gegenden mit ihren endlosen Prärien im Rücken hatte, durchstreifte ich jene hohen, geschlossenen und wildgedrängten Forsten aus mancherlei Baumarten, besonders vielerlei Wallnußbäumen, Eichen, Eschen, Ulmen, Ahorn-, Sassafras-, Tulpenbäumen u. a. m., wo eine einsame Ruhe herrschte und mancherlei fremdartige Vogelstimmen sich vernehmen ließen. Hier hatte der Schütze freies Spiel. Unter zahlreichen Vögeln sah ich hier häufig auf der Spitze der höchsten Bäume die scharlachrothe Tangara im hellen Sonnenlicht glänzen, wo sie sich nett gegen den blauen Himmel malte; ich war entzückt von diesem Anblick. Bei einigen einsamen Pflanzerwohnungen am untern Missouri kam sie bis in den Garten, unmittelbar am Hause und die Hausfrauen versicherten, daß sie an den Flachsknoten vielen Schaden verursache, weshalb sie hier am Missouri auch Flachsvogel genannt werde (der eigentliche Flachsvogel ist übrigens eine andre Art, nämlich die nächstfolgende feuerrothe Tangara). Nach Audubon ist sie in den südlichen Staten Louisiana, Florida, Texas, Mexiko und selbst auf den westindischen Inseln häufig zu finden; nördlich soll sie im Sommer bis über den Huronsee hinauf beobachtet sein. Die Abbildungen Wilson's und Audubon's lassen viel zu wünschen übrig, denn sie stellen den Vogel ganz roth dar, wie angestrichen und bei der des letztern Forschers ist diese Farbe viel zu dunkel und unansehnlich, beiweitem nicht brennend genug. Das Weibchen ist richtiger gegeben."

Am ausführlichsten berichtet Thomas Gentry: „Unter unseren Sommergästen ist die Scharlachtangara der vorzüglichste und herrlichste. Von ihrem Erscheinen im frühen Mai bis zum Abzuge in der letzten Septemberwoche, bei ungewöhnlich rauher Witterung auch wol schon früher, zeigt sie sich zugleich überaus nützlich durch die Vertilgung von Insekten und allerlei anderm Ungeziefer. In ferngelegenen menschenleren Gegenden ist sie scheu und furchtsam, in der Nähe der menschlichen Wohnungen dagegen dreist und zutraulich; man kann sich ihr hier bis auf wenige Schritte nähern. Sie geht in Waldgegenden auf den äußersten Aesten der höchsten Bäume stundenlang ihrer Nahrung nach. Apfel- und Birnbäume locken sie vorzugsweise an. Man sieht sie auch mit Wanderdrosseln und Purpurgrakeln gemeinschaftlich auf dem Felde hinter dem Pflüger das Ungeziefer auflesen. Samen, gleichviel von welchen Pflanzen, frißt sie niemals. Nach der Brutzeit trennen sich die Pärchen und Familien und treiben sich einzeln umher. Vielleicht darf man annehmen, daß im Frühjahr bei der Rückkehr die Geschlechter getrennt und zwar die Männchen früher ankommen. Dieselben sitzen dann auf den Spitzen der höchsten Bäume stundenlang singend, zweifellos in der Absicht, vorüberfliegende Weibchen herbeizulocken; hier und da sieht man ein Männchen hoch oben auf einem großen Baume dicht an einem

vielbelebten Wege, unbekümmert um den Verkehr und ebenso wie hier sucht es sich auch im weiten Walde stets die höchsten Baumspitzen aus. Sein hin und wieder erschallender Ruf klingt wie tschitschar (chichar) und zwar sehr täuschend wie aus der Ferne, selbst wenn der Vogel dicht neben uns sich befindet. Späterhin, wenn die Bäume mit Laub bedeckt sind, weiß sich diese Tangara trotz ihrer prächtigen Farbe gut zu verbergen, wenigstens im Walde, während sie in den Obst- und anderen Gärten sich immer frei zeigt, gleichsam als wisse sie wol, daß sie hier vor den Raubvögeln sicherer sei. Der Gesang des Männchens, welcher förmlich bauchrednerisch erklingt und in ziemlich langsamem Tempo vorgetragen wird, läßt sich etwa durch folgende Silben ausdrücken: tschí-tschí-tschí-tschar-ii-tscharr-ii-tschi (chĭ-chĭ-chĭ-char-éé-charr-éé-chĭ). Man hat ihn mit dem des Baltimorevogels verglichen. Ich kann jedoch nicht die geringste Aehnlichkeit zwischen beiden herausfinden. Die Brutzeit fällt zuende Mai oder anfangs Juni, und das Männchen hält sich, gleichsam als wolle es vermeiden, durch sein auffallendes Farbenkleid das Nest zu verrathen, immer in einer gewissen Entfernung auf. Beim Herannahen einer Gefahr lassen beide Vögel ein leise flüsterndes Gezwitscher hören, welches in zarten anmuthigen Tönen besteht, während sie durch das dichteste Gewirr von Zweigen und Blättern schlüpfen, und wenn jemand die Brut rauben will, so stürzt sich das Weibchen ihm muthig entgegen, fast auf den Kopf. Das Nest wird vom letztern allein immer auf einem horizontalen Zweige eines Tulpenbaums oder einer Eiche in einem Hain oder lichten Gehölz oder auch wol auf einem Apfelbaum im Garten und zwar in nur vier Tagen erbaut. Es besteht aus Stengeln, Halmen, Blättern u. drgl. Stoffen, ist lose geschichtet und mit Würzelchen, Gräsern, Bast und Fasern ausgerundet. Täglich wird ein Ei gelegt, bis das Gelege von 4—5 Eiern vollzählig ist; das Weibchen brütet auch allein und wird nicht einmal vom Männchen gefüttert. Ebenso muß es die nach zwölf Tagen entschlüpfenden Jungen allein ernähren und zwar mit allerlei weichen Insekten, deren Eiern und Larven. Nach etwa zwei Wochen verlassen die Jungen das Nest und schon eine Woche später sind sie auf sich selbst angewiesen. Nur eine Brut wird in jedem Jahre gemacht. Noch sei bemerkt, daß diese Art ungemein empfindlich gegen Kälte ist. Wenn im Mai nach den heißen Tagen des April noch eisige Tage eintreten, wie das hier gewöhnlich geschieht, so leiden diese Vögel sehr und manche gehen zugrunde."

Auch Herr Nehrling gibt eine hübsche Schilderung: „Die Scharlachtangara, welche in ihrem prächtigen Gefieder mit den schönsten Tropenvögeln verglichen werden kann, ist ein wahrer Edelstein der Vogelwelt in den Nordstaten der Union. Kein andrer gereicht den Wäldern so zur Zierde wie sie. Man kann sich kaum etwas prächtigeres denken, als einige dieser einfachen und doch

so wundervoll geschmückten Vögel im frischen Grün der Bäume sitzen oder langsam umherfliegen zu sehen. Sie lebt still und verborgen; niemals sucht sie durch lautes lebhaftes Wesen Aufmerksamkeit zu erregen. Dem Menschen gegenüber zeigt sie sich wenig furchtsam, so daß man sie genau betrachten kann. In der Regel siedelt sie sich an den Waldrändern, welche wenig oder garnicht mit Gebüsch oder Unterholz bestanden sind, an, manchmal aber auch in dichten Baumpflanzungen oder großen Gärten. Freie mit einzelnen Bäumen bepflanzte Stellen und Gebüsche meidet sie. Ihre Nahrung besteht meistens in allerlei Insekten und Würmern, im Herbst auch in wilden Beren, und um die ersteren zu suchen, kommt sie oft auf den Boden herab. Doch nur aus den luftigen Höhen der Baumkronen, wo sie sich vorzugsweise aufhält, ertönt ihr Gesang, den nur einige ziemlich melodische Laute bilden. Der Flug ist schnell und gewandt. In Wiskonsin und Illinois ist sie ein recht bekannter Vogel, da sie durch ihre rothe Farbe leicht in die Augen fällt; sie kommt nicht gerade selten, doch ebensowenig häufig vor. In der Mitte des Juni 1873 entdeckte ich in Abissou du page Co., Illinois, ein Nest und zwar auf dem wagerechten Ast einer Eiche am Waldsaum etwa $6{,}_{60}$ m. hoch vom Boden. Es war aus Bast und Halmen ziemlich lose und nachlässig gebaut, sodaß man an einigen Stellen das Blau des Himmels hindurchschimmern sah. Das Gelege bestand in vier Eiern und außerdem befand sich in dem Nest auch ein Ei des Kuhstars (Sturnus pécoris, *Gml.*). Durchstreift man zu Anfang des Monats August unsere Wälder, so wird man wol sehr regelmäßig dieser Tangara begegnen, aber es ist nicht mehr der prachtvolle Waldvogel, den wir vorhin bewunderten. Sie hat das männliche Prachtkleid ab- und das unscheinbare des Weibchens und der Jungen angelegt, sodaß man nun die Geschlechter nicht mehr zu unterscheiden vermag. Im Frühlinge ist sie einer der spätesten Ankömmlinge aus dem Süden; nach meinen Beobachtungen erscheint sie hier in der Regel erst in den letzten Tagen des Mai. Die Zeit des Abzugs nach dem Süden kann ich nicht genau angeben, glaube aber mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß derselbe schon in den ersten Tagen des Monats September vorsichgeht. Im Käfige hält man sie hier nicht, theils weil es sehr schwierig ist, sie einzugewöhnen, theils auch, weil die Fänger einen fabelhaft hohen Preis für sie fordern."

Nach Gundlach's Mittheilungen kommt sie auf Kuba im Oktober aus dem Norden an und verschwindet dann; im April erscheint sie wiederum, aber aus dem Süden, um nach dem nördlichen Festlande zurückzuwandern: „Man kann sie fast alljährlich beobachten, und in den Jahren, in denen man sie nicht sieht, mag sie dennoch durchziehen, nur in anderen Gegenden. Bei Habaña, Cardenas und den zwischenliegenden Orten ist sie bisher oft beobachtet worden, ich habe jedoch keine sichre Nachricht darüber erhalten können, ob sie auch weiter östlich durchzieht,

und auf meiner dreijährigen Reise durch den Osten der Insel habe ich von ihr wie von so manchen anderen Zugvögeln nichts gesehen. Hier ernährt sie sich von allerlei Beren und man sieht sie gewöhnlich in kleinen Trupps, oft auch mit Feuertangaren oder Sommerrothvögeln, rosenbrüstigen Kernbeißern, Baltimore-Trupialen u. a. in Gesellschaft." D'Orbigny hatte behauptet, daß sie auf Kuba überwintere. Jamaika berührt sie nach R. Albrecht nur bisweilen auf dem Frühlingszuge und auch Baird führt sie unter den dort vorkommenden Vögeln auf. Von Wedderburn und Hurdis wurde sie im April und Mai auf den Bermudainseln gesehen und dies bestätigt Baird ebenfalls. Auf Kosta-rika hat sie Dr. v. Frantzius beobachtet und gleicherweise gehört sie zu den Wanderern, welche nach Hartlaub gelegentlich in Neugranada vorkommen. Ueber-aus interessant muß es für jeden Freund der gefiederten Welt erscheinen, daß unter den Vögeln, welche F. W. Hutton auf Neuseeland als eingeführt durch europäische Kolonisten aufzählt und unter denen europäische, amerikanische, afri-kanische und asiatische sich befinden, auch diese Tangara verzeichnet ist und zwar unter denen, die sich bereits in der Freiheit fortgepflanzt haben und anfangen, zahlreich zu werden.

Was sodann das Gefangenleben anbetrifft, so dürfen wir ihr freilich nicht ganz den Werth zumessen, welchen die brasilische Verwandte hat, einerseits weil jene beständig im Prachtgefieder bleibt und andrerseits auch, weil die Farben dieser regelmäßig ausbleichen und mit jeder Mauser matter und fahler werden. Sodann erscheint sie seltener als die anderen rothen Tangaren im Handel und namentlich sind die Weibchen schwierig zu erlangen. Einzeln wird sie von Herrn Reiche und Fräulein Hagenbeck eingeführt. Herr L. Nesmirak in Karolin-thal bei Prag schreibt, daß er ein Pärchen längere Zeit im Käfige hielt und sie mit einem zusammengeriebnen Gemisch aus Mören, Weizenbrot, Ameisenpuppen und grünem Salat und dazu täglich einigen Mehlwürmern und Apfelschnitten, welche letzteren sie mit Vorliebe verzehrten, ernährte. Sie badeten täglich einige-mal und wurden so zahm, daß sie das dargereichte Futter gern aus der Hand nahmen. Trotz aller möglichen günstigen Nistvorrichtungen im Käfige ge-langten sie jedoch zu keiner Brut. Ich erhielt ein Männchen im Winter-kleide unter mehreren anderen amerikanischen Vögeln zur Bestimmung von Herrn H. Möller in Hamburg und dann erst nach zwei Jahren zufällig ein Weibchen zur Feststellung von Herrn Lintz dem jüngeren. In ihrem Wesen und allen übrigen Eigenthümlichkeiten dürfte sie der Purpurtangara vollständig gleichen, doch keineswegs so bösartig in der Vogelstube sein, da sie beiweitem ruhiger, ja vielmehr gleichgiltig sich zeigt. Aus der Seite 638 mitgetheilten Ursache mußte ich sämmtliche Tangaren abschaffen, und ich verspreche hiermit, daß ich in einem späteren Bande dieses Werks, und sei es auch nur in den Nachträgen, vor

dem Schluß nähere Mittheilungen über sie bringen werde, wenn es mir gelingt, was ich mit voller Bestimmtheit hoffe, sie zu züchten. Der Preis ist etwas höher als für andere verwandte Arten und beträgt mindestens 30, meistens 45 Mark für den Kopf.

Die scharlachrothe Tangara heißt auch Scharlachtangara und schwarzflügeliger Flachsvogel (Pr. Wied). — [Kanadische Tangara, Buff.].

Le Rhamphocèle scarlatte ou Scarlatte; Scarlet Tanager or Scarlet Sparrow. — Cardenal de alas negras, auf Kuba, nach Gundl.; Flax-bird, am Missouri, nach Pr. Wied.

Nomenclatur: Tanagra rubra, *L.*, *Gml.*, *Wls.*, *Audb.*; Pyranga rubra, *Vll.*, *Swns.*, *Bp.*, *Audb.*, *Scl.*, *Brd.*, *Br.*; P. erythrómelas, *Vll.*; Phoenisoma [!] rubra, *Swns.*; Phoenicosóma rubra, *Cb.* [Cardinalis canadensis, *Brss.* — Le Tangara du Canada, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Prachtvoll scharlachroth, jede Feder am Grunde weiß; Flügel und Schwanz tiefschwarz; Schnabel graubräunlichhornfarben, an den Schneiden heller; Auge lebhaftbraun, von einem merklich helleren Rande umgeben; Füße röthlichbraungrau. Weibchen an der ganzen Oberseite zeisiggrün; Flügel und Schwanzfedern dunkler schwärzlichgrün; Kehle und Oberbrust lebhaft und die ganze übrige Unterseite mattgelblichgrün. — (Baird beschreibt sie wie folgt: Hauptfarbe lebhaft karminroth; Flügel und Schwanz sammtschwarz, Schwingen innen gegen die Basis hin weiß gerandet. Das Weibchen ist oberhalb olivengrün; Schwingen und Schwanzfedern braun, olivenfarben gerandet; unterhalb gelblichgrün. Das junge Männchen ist wie das Weibchen gefärbt, zeigt jedoch gewöhnlich mehr oder weniger rothe Federn zwischen den grünen; zuweilen ist das Gefieder mit einigen gelben vermischt oder die Federn an den Flügeln zeigen olivenfarbene Ränder, auch hat der Flügel wol eine verborgene rothe oder gelbe Binde. In der Verfärbung erscheinen die jungen Männchen überhaupt sehr sonderbar, indem das Gefieder manchmal mehr dem Männchen gleicht, manchmal mehr dem Weibchen).

Tanagra rubra: magnifice scarlatina basi cujusque plumae alba; alis caudaque atris; tomiis rostri fumide cornei pallidioribus; margine dilutiore iridi cinnamomeae circumdato; pedibus rubente fumidis. ♀ supra omnino flavo-virens; alis caudaque nigrescente viridibus; gula guttureque laetius, gastraeo reliquo dilutius e flavo viridibus. (Sec. Baird: laete coccinea, alis caudaque aterrimis; remigibus prope basin albo-marginatis. — ♀ supra olivaceo-viridis; remigibus rectricibusque umbrinis, olivaceo-marginatis; subtus flavido-viridis. — ♂ juv. femellae similis plumis rubris, etiam flavis magis minus interjectis; interdum remigibus olivaceo-marginatis, atque fascia trans alam occulta rubra vel flava).

Länge 17,2 cm.; Flügelbreite 28 cm.; Schwanz 6,7 cm.

Beschreibung des Eies: Die Grundfarbe ist veränderlich, von mattweiß bis grünlichblau mit röthlichen oder röthlichbraunen Flecken, welche am dickeren Ende mehr oder weniger zusammenlaufen (Gentry); auf hellgrünem Grunde mit vielen kleinen dunkel- und hellbraunen Flecken übersät; Gestalt sehr länglich; zartschalig (Nehrling).

Ovum: varie coloratum, a sordide albo ad subaeruginosum usque maculis rufis vel badiis, circa basin magis minus confluentibus (*Gntr.*). O. virescens, maculis parvis numerosis obscurius et dilutius fuscis conspersum; forma valde oblonga; testa tenera (*Nhrl.*).

Die feuerrothe Tangara [Tanagra aestiva]

(Tafel XIV. Vogel 71.)

unterscheidet sich von den vorigen dadurch, daß sie keine schwarzen Flügel hat, sondern im ganzen Gefieder roth erscheint. Das Weibchen ist olivengrünlichgelb

und ihm gleicht das Männchen im Winterkleide. Ihre Größe stimmt mit der der vorigen überein und ebenso ist auch ihre Verbreitung eine ganz gleiche; sie lebt gleicherweise als Zugvogel. Unter den alten Schriftstellern hat sie Buffon wol zuerst mit Sicherheit gekennzeichnet, doch gibt er nichts näheres an; seine Abbildung war nach einem ausgestopften Exemplare hergestellt. Uebrigens sei hier noch bemerkt, daß die Angaben inbetreff des angenehmen Gesangs, welche die alten Autoren mehrmals machen, sich nicht etwa wirklich auf eine Tangara, sondern immer nur auf den virginischen rothen Kardinal beziehen. Ueberhaupt wird über diese Vögel in den alten Schriften viel gefabelt. So sagt z. B. Du Praz: „Im Sommer hört man häufig den Gesang des Kardinals (womit diese Tangara gemeint sein soll, in Wirklichkeit aber jedenfalls der erwähnte Kernbeißerfink) in den Wäldern und des Winters blos an den Ufern der Flüsse, wenn er getrunken hat. In dieser Jahreszeit verläßt er seine Heimat nicht, wo er beständig den Vorrath bewacht, welchen er im Sommer gesammelt. Man hat in solchen Vorrathskammern wirklich bis zu einem Par Pariser Scheffel Mais gefunden. Dieses Korn ist künstlich zuerst mit Blättern und darauf mit kleinen Aesten bedeckt und es bleibt nur eine Oeffnung, durch welche der Vogel in sein Vorrathshaus gelangen kann." (Von Buffon mitgetheilt nach der Histoire de la Louisiane par Page du Praz). Woher sich solche komischen Angaben schreiben, ist wol schwer zu ergründen. Prinz Max v. Wied schildert diese Tangara in folgendem: „Sie lebt in den südlichen Staten Nordamerikas, wo sie sich aber nach Audubon nicht länger als vier Monate aufhalten und dann wieder nach dem Süden ziehen soll. Ob sie schon am Wabasch vorkommt, kann ich nicht sagen. Ich fand sie in den großen Waldungen am südlichen Ohio und am Mississippi, wo sie still auf einem etwa 2 bis 3 Meter hohen Strauche saß, ruhig und lautlos, ohne einen Ton hören zu lassen, wie die meisten brasilischen Tangaren. Der schön rothe Vogel fällt angenehm ins Auge und ist durchaus nicht schüchtern. An der Stelle, wo sich der Ohio mit dem Mississippi vereinigt, waren an beiden Ufern große geschlossene Waldungen, in denen nur eine kleine Ansiedlung von wenigen Gebäuden den Holzwuchs unterbrach. Hier sahen wir lebende junge Bären, deren Mütter ganz in der Nähe erschossen worden und gegenüber am andern Ufer vertieften wir uns in den am Boden zwar ziemlich freien, im übrigen aber dunkelschattigen, erfrischenden Hochwald. Während schöne Schmetterlinge in großer Zahl flogen, fiel unser Blick doch zunächst auf die vielen zinnoberrothen Tangaren, welche still auf einem niedern Zweige sitzend uns nahe herankommen ließen. Mehrere Pärchen wurden erlegt und es währte nicht lange, so fand sich auch ein Nest derselben, auf welchem der weibliche Vogel gemüthlich sitzen blieb und sich ganz in der Nähe betrachten ließ. Das Nest stand $3_{,3}$ bis 4 Meter hoch vom Boden in einer Astgabel, und da das Stämmchen zu dünn war, so

konnten wir es leider nicht näher betrachten, zumal die Schiffsglocke bereits die zerstreuten Passagiere zurückrief. Die Vögel hatten nur einen kurzen Lockton. Am Missouri habe ich diese Art nicht wieder bemerkt.“ Audubon sowol als auch Wilson haben auch von dieser Tangara kurze Beschreibungen und Abbildungen gegeben. Ueber ihr Vorkommen auf Kuba berichtet Gundlach genau das über die Scharlachtangara gesagte, und ich brauche seine Worte daher hier nicht zu wiederholen. Auf den Bermudainseln wurde sie von Wedderburn und Hurdis im April erlegt und nachher nicht mehr gesehen, was wiederum Baird bestätigt. Ob sie auf Jamaika vorkommt, ist noch nicht festgestellt. Auf Kostarika findet sie sich nach Dr. v. Frantzius' Angaben in der Trockenzeit vom Dezember bis März in der Gesellschaft einer andern Art, doch nicht häufig und auch stets fern von menschlichen Wohnungen. Ihres schönen Gefieders halber wird sie dort oft im Käfige gehalten. Wie die vorige soll sie nach Hartlaub gelegentlich auch nach Neugranada kommen. Hiermit sind die Angaben über ihr Freileben abgeschlossen.

Sie gelangt gleich der vorigen nur selten und meistens einzeln in den Handel. Auf der großen Berliner Vogelausstellung im Herbst 1876 war ein einzelnes Männchen im Besitz eines Händlers zweiter Hand, des Herrn Lemm, und hin und wieder wird sie in einigen Köpfen von den Großhändlern Reiche in Alfeld und Möller in Hamburg eingeführt. Herr Vogelhändler Dufour hat seit mehreren Jahren ebenfalls ein Männchen und an demselben konnte ich die Verfärbung zum Prachtgefieder und zurück zum Winterkleide recht eingehend beobachten. Es sei hier nebenbei bemerkt, daß ich späterhin im letzten Bande außer der Verpflegung und Zucht im allgemeinen auch alle derartigen Verhältnisse insbesondre ausführlich behandeln werde. Obwol nur ausnahmsweise, so ist doch in manchen Vogelstuben ein Pärchen von dieser Art zu finden, so namentlich bei Herrn Karl Masius in Schwerin, der hoffentlich noch vor dem Schluß dieses Werks nähere Mittheilungen über Züchtungserfolge u. s. w. machen kann. In den zoologischen Gärten ist sie kaum vorhanden, selbst der Londoner hat sie nicht aufzuweisen. Der Preis beträgt etwa 30 Mark für das Männchen und da Weibchen nur höchst selten zu haben sind, so weiß ich ihn für diese nicht anzugeben.

Die feuerrothe Tangara heißt auch Feuertangara, Sommerrothvogel und Mississippi-Flachsvogel (Pr. Wied). — [Mississippische Tangara, Buff.].

Le Tangara du Mississippi; Summer-Redbird or Mississippi Tanager. — Cardenal acamindo, auf Kuba nach Gundl.

Nomenclatur: [Muscicapa rubra, *L.*]; Tanagra aestiva et T. mississippiensis, *Gml.*; T. aestiva, *Wls.*, *Audb.*; *T.* variegata, *Lth.*; Pyranga aestiva, *Vll.*, *Bp.*, *Audb.*, *Scl.*, *Brd.*, *Br.*; Phoenisoma! aestiva et Pyranga livida, *Sws.*; Phoenicosóma aestiva *Cb.* [Tangara du Mississippi, *Buff.*].

Wissenschaftliche Beschreibung: Das Männchen ist hell zinnoberroth, oberhalb ein wenig dunkler, am lebhaftesten auf dem Kopf; Schwingen braun mit rothen Außensäumen; Schwanzfedern nur am Schaft braun. Schnabel hell hornfarben, mit gelben Schneidenrändern, Auge dunkelbraun; Füße fahl gelblichbraun. — Das Weibchen ist oberhalb düster gelblich-olivengrün, unterhalb heller; Flügel braun, jede Feder mit olivengrünlichgelbem Außensaum; Schnabel, Augen und Füße wie beim Männchen. — Das Männchen im Winterkleide gleicht völlig dem Weibchen, nur ist beim kräftigen Vogel an Stirn und Brust hier und da ein rothes Federchen vorhanden. — Das Jugendkleid stimmt ebenfalls mit dem des Weibchens überein und bei der ersten Verfärbung erscheint es wie das der verwandten roth und grüngelb gemischt. (Das Jugendkleid ist nach Baird beschrieben).

Tanagra aestiva: ♂ dilute cinnabarina, supra paulo obscurior; capite laetissime colorato; remigibus umbrinis, exterius rubro-marginatis; basi rectricum umbrina; tomiis rostri subcornei flavis; iride fusca; pedibus livide umbrinis. — ♀ supra subolivaceo-virens, subtus dilutior; alis fuscis, pluma quaque exterius olivaceo-virente marginata; colore rostri, iridis pedumque aeque ac in mare. — ♂ vest. hiem. cum femella conveniens plumulis nonnullis fronti pectorique rubris inspersis.

Länge 17 cm.; Flügelbreite 27 cm.; Schwanz 6,5 cm.

Juvenis: etiam femellae persimilis, post mutationem plumarum primam rubro- et galbino-variegata (sec. *Baird*).

Die goldgelbe Tangara [Tanagra ludoviciana] von Nordamerika und Kalifornien, wo sie gleich den vorhergegangenen als Zugvogel lebt und zum Winter ebenfalls nach Mittelamerika und bis ins nördliche Südamerika wandert. Baird sagt, daß sich ihre Heimat von den schwarzen Bergen bis zum stillen Ozean und südlich bis Mexiko erstrecke. Sie ist am Oberkopf, Nacken und Hals zinnoberroth, Gesicht heller roth; Rücken, Schultern, Flügel und Schwanz sind schwarz, über den Flügel zwei gelbe Binden und darunter noch eine weißliche. Alle übrigen Körpertheile sind glänzend zitrongelb; der Schnabel ist hellbraun mit gelben Schneidenrändern; Auge dunkelbraun, Füße schwärzlichbraun. Das Weibchen ist oberhalb lichter gelblicholivengrün; Zügelstreif schwefelgelb; Flügel und Schwanz schwärzlichbraun, jede Feder schmal olivengrün außengesäumt und über den Flügel eine weißliche und grüngelbliche Querbinde; ganze Unterseite reingelb; Schnabel gelbgrau mit hellem Unterschnabel. Ebenso gefärbt ist das Männchen im Winterkleide, und nach Baird weicht auch das Jugendkleid wenig ab. In der Größe ist sie mit der Purpurtangara übereinstimmend. Ueber das Freileben ist garnichts bekannt. Sie wird seltner als alle anderen vorhergehenden Arten eingeführt. Im Jahre 1873 erhielt ich von Herrn Karl Gudera ein Männchen, welches nach einigen Monaten im Prachtgefieder plötzlich starb; es steht im zoologischen Museum von Berlin. Meines wissens ist sie weder vorher noch nachher lebend zu uns gelangt; in den Verzeichnissen der zoologischen Gärten ist sie ebenfalls nicht vorhanden. Es ist schade, daß der sehr schöne Vogel, welcher eine weite Verbreitung hat und mancherorts auch wol recht häufig ist, nicht öfter auf den Markt gekommen; hoffentlich geschieht dies demnächst. — Goldtangara (Br.). — Le Tangara de la Louisiane; Louisiana Tanager. — Tanagra ludoviciana, *Wls.*, *Bp.*, *Ntll.*, *Audb.*; Tanagra columbiana, *Jard.* et *Scl.*; Pyranga erythrópis, *Vll.*; Pyranga ludoviciana, *Bp.*, *Ntll.*, *Rchrds.*, *Audb.*, *Scl.*, *Brd.*, *Br.*

Die zinnoberrothe Tangara [Tanagra saira] ist in fast ganz Südamerika, Paraguay und den Laplataſtaten heimisch und gelangt trotzdem kaum häufiger als die vorhergehende in den Handel. Sie ist lebhaft scharlachroth oder richtiger zinnoberroth, am Rücken dunkler mit bräunlichem Ton; Zügelstreif, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun mit düsterrothem Außen- und blaßrothem Innensaum. Schnabel tief bräunlichgrauschwarz, Unterschnabel am Grunde bleigrau, in der Mitte weißlich; Auge braun; Füße schwärzlichbraun. Das Weibchen ist oberhalb düster olivengrünlichgelb; Schwingen und Schwanzfedern außen heller olivengrün, innen grünlichgelb gesäumt; ganze Unterseite lebhaft gelb. — (Nach Burmstr. sind Stirn

Oberkopf, Kehle, Vorderhals bis zur Bruft und Steiß rothgelb, Ohrgegend und Hinterkopf braungelb). Sie iſt etwas größer als die vorigen: Länge 18,3 cm.; Flügel 10,5 cm.; Schwanz 7,2 cm. Sie ſoll nach Angabe des Genannten häufig und überall auf dem Kamposgebiet des innern Braſiliens, aber nur einzeln oder parweiſe zu finden ſein; „ein ſtummer, wenig ſcheuer, an ſeiner Farbe leicht kenntlicher Vogel, der zu den täglichen Erſcheinungen für den Reiſenden in Minas geraes gehört". Näheres iſt weder über das Frei- noch Gefangenleben bekannt. — Zinnobertangara (Br.). — Le Tangara d'Azara; Azara's Tanager. — Saltator ruber et S. flavus, *Vll.*; Tanagra saira, *Spx.*; T. mississippiensis, *Lchtst.*, *Pr. Wd.* [nec *Gml.*]; Pyranga Azarae, *Lfrsn.* et *Orb.*; P. coccinea, *Gr.*, *Brmst.*; Phoenicosóma Azarae, *Cb.*, *v. Tschd.*; Pyranga saira, Br. [Habia amarillo et H. punzo, *Azr.*].

Die Schmucktangara [Tanagra ornata].

Ein hübſcher Vogel, welcher jedoch, wenigſtens im Verhältniß zu den übrigen Tangaren, den obigen Namen keineswegs ausſchließlich verdienen dürfte. Er iſt am Oberkopf lebhaft blau, der übrige Kopf und Hals glänzend dunkelblau; Zügel ſchwarz; Mantel und Schultern bläulichſchwarz; Flügel und Schwanz ſchwarzbraun, jede Feder grünlich außen- und weiß innengeſäumt, obere Flügeldecken gelb, kleinſte blau, untere Flügeldecken gelblichweiß; Bürzel und Steiß grünlichgrau; die ganze untre Seite düſterblau, die Bruſt aber glänzend graulichhellblau und der Bauch ſchwärzlichblaugrau; Schnabel ſchwarzgrau; Auge rothbraun; Füße ſchwärzlichbraungrau. Das Weibchen ſoll an Kopf, Hals und Bruſt mehr mattgraublau, im übrigen dem Männchen gleich ſein. In der Größe iſt ſie mit der purpurrothen Tangara übereinſtimmend. Burmeiſter ſagt, daß ſie in den Waldungen der mittleren Küſtenſtrecke Braſiliens, beſonders bei Bahia und in der Umgegend häufig ſei, und zwar leben ſie wie alle Tangaren in der Nähe der Anſiedlungen, komme in die Gärten und ſei wenig ſcheu. Im ſüdlichen Braſilien und im Gebiet ſeiner Reiſe habe er ſie nicht mehr geſehen, dagegen ſei ſie noch nordwärts vom Amazonenſtrom über Guiana verbreitet. Im Widerſpruch hiermit ſteht, daß ſie Schlüter in der Kolonie Blumenau in der Provinz Sta. Katharina ſammelte, während ſie Euler in Kantagallo in der Provinz Rio de Janeiro fand. Näheres iſt über das Freileben nicht angegeben und auch in der Gefangenſchaft iſt ſie ſehr wenig bekannt, denn ſie gelangt nur einzeln und ſelten in den Handel, durch Fräulein Hagenbeck oder die Herren Möller und Lintz von den Seeleuten angekauft, welche ſie auf den großen Dampfſchiffen, die regelmäßig nach Braſilien fahren, mitgebracht haben. Es iſt ſehr zu bedauern, daß letztres mit den vielen überaus prachtvollen Vögeln jenes Wunderlandes nicht häufiger geſchieht. Ein Preis iſt angeſichts der geringen Einführung nicht anzugeben.

Die Schmucktangara nennt Br. Zierlangara. — Archbishop Tanager; Tangara Archevêque.

Nomenclatur: Tanagra ornata, *Sprrm.*, *Swns.*, *Brmst.*, *Scl.*, *Plzln.*, *Rnhrd.*; *Hmlt.*, *Brlpsch.*; T. archiepiscopus, *Dsmr.*, *Pr. Wd.*, *Spx.*, *Schmb.*; Thraupis ornata, *Cb.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben. (Nach H. v. Berlepſch iſt noch hinzuzufügen, daß bei den Männchen faſt die ganze Unterſeite ſchön purpurblau gefärbt und der Rücken ſtark blau überflogen iſt. Die Weibchen ſollen in der Färbung viel matter und nur an der Oberbruſt pupurblau angehaucht ſein).

Tanagra ornata: pileo laete coeruleo, capite reliquo colloque nitide cyaneis; loris nigris; interscapilio humerisque subcoeruleo-nigris; pluma quaque alarum caudaeque fumidarum exterius virente, interius albente limbata; tectricibus al. minoribus flavis, minimis coeruleis, inferioribus flavide albis; uropygio crissoque virescente canis; gastraeo toto sordide coeruleo; pectore nitide caesio; rostro e nigro cinereo; iride rufa; pedibus fuliginosis. — ♀ mari simillima, tantum collo pectoreque opacius caesiis.

Länge $17_{,2}$—$18_{,2}$ cm.; Flügel $9_{,6}$—$9_{,7}$ cm.; Schwanz $7_{,3}$—$7_{,4}$ cm.

Die Palmtangara [Tanagra palmarum] muß ich hier mitzählen, weil sie sich seit d. J. 1875 im zoologischen Garten von London befindet, während sie außerdem kaum eingeführt, bzl. in den Handel gelangt sein dürfte. „Sie ist graulicholivengrün; Kopf bis zum Nacken und eine schiefe Binde über die Flügel lebhafter grün, desgleichen der Grund und Rand der Handschwingen, sowie der Rand der Schwanzfedern, letztere sowie die Schwingen übrigens schwärzlichbraun und am Grunde innen weiß gesäumt; Rücken etwas brauner, Brust mehr grau; Schnabel schieferschwarz; Auge dunkelbraun; Füße dunkelgraubraun. Das Weibchen ist in allen Theilen ähnlich, aber matter gefärbt, die Farbe des Oberkopfs ist von der des Nackens weniger verschieden, die Flügelbinde undeutlicher. Ich fand sie mehr als die vorige im Innern an offenen Stellen und häufig in den Gärten bei Lagao Santa, wo sie besonders in den Kronen der hohen Makauba-Palmen sich aufhält und in denselben auch nistet. Leider brütete sie zur Zeit meiner Anwesenheit nicht und daher sind mir die Eier entgangen." (Burmeister). Auf Kuba kommt sie, wie Gundlach angibt, nicht vor, dagegen hat Euler sie in Kantagallo gesammelt. „Sie scheint", sagt Berlepsch, „zu den weitverbreiteten Arten zu gehören, deren am weitesten von einander entfernt lebende Exemplare wol manchmal so sehr von einander abweichen, daß man versucht ist, sie als verschiedene Arten festzustellen, während dies doch nach meiner Ueberzeugung unmöglich ist." Da Dr. Finsch zwischen ihr und der als besondre Art hingestellten schwarzflügeligen Tangara (T. melanóptera, *Hrtl.*) Mittelformen nachgewiesen hat, so ist die Uebereinstimmung beider wol als fraglos anzusehen, und dann hat diese Art allerdings eine außerordentlich weite Verbreitung, denn dieselbe erstreckt sich über fast ganz Brasilien, mehrere westindische Inseln und einen Theil von Südamerika. Umsomehr erscheint es verwunderlich, daß sie bisher kaum eingeführt worden, doch läßt sich dies mit Bestimmtheit erwarten. — Tangara palme; Palm Tanager. — Tanagra olivascens, *Lchtst.*, *Sws.*, *Schmb.*, *Brmst.*; T. palmarum, *Pr. Wd.*, *Br.*; T. praelatus, *Lss.*; Thraupis olivascens, *Cb.*, Tanagra melanóptera, *Hrtl.*, *Plzln.*

Die blauflügelige Tangara [Tanagra cyanóptera].

Auf den ersten Blick unscheinbar, zeigt sie sich bei näherer Betrachtung doch recht hübsch. Ihre Grundfarbe ist zart grünlichblau, oberhalb dunkler, an der Stirn reiner glänzendblau, an Kopfseiten und Kehle mehr blaugrau; Schwingen und Schwanzfedern bräunlichschwarz mit schwachen bläulichen Außensäumen, kleine Flügeldecken glänzend grünlichblau; ganze Unterseite schwach graulichgrünblau; Bauchmitte weißlichgrünblau; Schnabel bleigrau; Auge dunkelbraun, Füße schwärzlichbraun. Das Weibchen ist oberhalb fahler graulichblau; die kleinen Flügeldecken sind nicht blau, sondern mit dem übrigen Flügel gleich, schwärzlichbraun, die ganze Unterseite ist hellbläulichgrau, Bauchmitte fast reinweiß. Als Unterscheidungszeichen von der nächstfolgenden nahverwandten und sehr ähnlichen Art gibt Cabanis an: „Die ganze Oberseite von der Stirn an ist meergrün angeflogen, ebenso die Unterseite von der Brust an; die Ränder der Schwingen sind lebhafter und etwas ins bläuliche ziehend gerandet, die kleinen Flügeldecken sind lebhaft glänzend blau gefärbt; nur die Kehle und die Mitte des Bauches sind

grau." Herr Professor Dr. von Pelzeln schreibt, daß ein Pärchen im Wiener Museum an beiden, Männchen wie Weibchen, den blauen Schulterfleck zeigen und daß sie mit den Exemplaren, welche Herr H. von Berlepsch aus der Schlüter'schen Sammlung von Blumenau an ihn eingeschickt, durchaus übereinstimmen. Die Vaterlandsangabe von Kuba sei jedenfalls irrig, doch wäre es ja möglich, daß die Vögel dort im Käfige gehalten worden. Die Verbreitung erstreckt sich über Südbrasilien und Paraguay; die Größe ist etwas bedeutender als die der Purpurtangara. Da die meisten Schriftsteller nicht mit Sicherheit erkennen lassen, welche von den beiden nahestehenden Arten sie meinen und da dieselben wie in der Färbung so doch auch wol in der Lebensweise miteinander übereinstimmend sein dürften, so bitte ich, die folgende von Burmeister gegebne kurze Bemerkung über das Freileben auch auf die nächste zu beziehen. „Sie ist im Innern Brasiliens auf dem Kamposgebiet und weiter südlich oder westlich bis nach Paraguay und an den Fuß der Kordilleren verbreitet, lebt gleich den verwandten Arten in den Gipfeln der Palmen, nährt sich von fleischigen Beeren und weichen Insekten, kommt viel in die Nähe der Ansiedlungen und ist dort nicht selten, besonders in Gärten, wo Palmen stehen." Im Handel ist sie, gleich den vorhergegangenen, selten. Jamrach in London hat im Laufe der letzten Jahre wol hin und wieder ein Exemplar eingeführt. Ich erhielt das erste 1872 und ein zweites 1876; beide blieben eine zeitlang recht munter und das eine gelangte in die Vogelstube des Herrn Graf Rödern in Breslau, wo es mehrere Jahre ausdauernd sich gezeigt. Vor längerer Zeit sollen auch einige Köpfe dieser Art im Berliner Aquarium vorhanden gewesen sein. Ein Preis läßt sich nicht angeben.

Die blauflügelige Tangara nennt Br. Blauflügeltangara und in Ruß' „Handbuch" heißt sie blauschulterige Tangara. — Tangara à épaulettes bleues; Blue-shouldered Tanager.

Nomenclatur: Tanagra cyanóptera, *Vll., Azr., Bp., Scl.* et *Slv., Hds., Plzn., Rnhrdt., Hmlt., Brlpsch.*; T. episcopus, *Swns.* [nec *L.*]; T. virens, *Strckl.*; T. inornata, *Swns.*; T. argentata, *Gr.*; Thraupis cyanoptera, *Cb., Fnsch.*; Tanagra coelestis, mas., *Brmst.* [nec *Spx.*, nec *Swns.*]; T. sayaca, *Pr. Wd., Bp., Brmst.* [Lindo saihobi, *Azr.*; Sangaço der Brasilianer, *Brmst.*].

Länge 17 bis 19,5 cm.; Flügel 9, bis 10,6 cm.; Schwanz 6,8 bis 8,9 cm.

Die meerblaue Tangara [Tanagra sayaca].

Bisher fast immer mit der vorigen verwechselt und zwar nicht allein in den Beschreibungen der Ornithologen von Fach, sondern auch im Handel, ist sie an Kopf, Hals und der ganzen Oberseite aschgraubläulich und auf dem Rücken meergrünlichblau scheinend; Schwingen und Schwanz schwarz, jede Feder düstermeerblau außen- und weißlich innengerandet, über den Flügel eine meerbläulichgraue Querbinde; ganze Unterseite bläulichgrau. Schnabel schwärzlichgrau, am Grunde heller bleigrau; Auge dunkelbraun; Füße bläulichschiefergrau. Das Weibchen soll im ganzen Gefieder matter gefärbt sein und garkeine Flügelbinde haben; ich bitte indessen, das von Herrn von Pelzeln bei der vorigen Art Festgestellte zu beachten. Beide gehören zu den Vögeln, welche sich zum Winter hin

nicht verfärben, sondern das Schmuckgefieder einfürallemal behalten. „Diese Art", sagt Cabanis', „erreicht niemals die hohe Ausfärbung wie die blauflügelige, und da die Jugendkleider beider einander sehr ähnlich sind, so hat man diese immer für das noch unvollständige Kleid jener genommen und als Alters- und Geschlechtsunterschied betrachtet. Sie ist die am meisten einförmig gefärbte Art der Gruppe und zwar vorherrschend grau, wie Brisson sie beschreibt, an der Oberseite dunkler, an der Unterseite heller, die Bauchmitte ins weißliche ziehend, die Weichen kaum merklich grün angehaucht; nur der ganze Rücken mit den oberen Schwanzdecken, die Flügel und der Schwanz sind meergrün angeflogen; die kleinen Flügeldecken sind kaum etwas lebhafter grün, als die Ränder der Schwung- und Steuerfedern, wodurch der ganze Flügel eine ziemlich einförmige Zeichnung zeigt, während bei den anderen Arten das lebhafte Blau, Weiß, Violett der kleinen Flügeldecken eine abstechende Zierde bildet. Die Annahme, daß dieser Vogel eine blauflügelige Tangara im unfertigen Kleide sein könne, wird schon durch den großen Unterschied in der Schnabelform entschieden widerlegt. Vergleicht man die Schnäbel beider Arten, so muß man auf den ersten Blick finden, daß die graue den längern seitlich zusammengedrückten Schnabel mit den anderen gemein hat, während die blauflügelige durch einen kürzern, breitern, dickern, mithin nicht gestreckten Schnabel auffallend von allen ähnlichen Arten abweicht." Die Größe ist auch ein wenig geringer. Ihre Verbreitung dürfte sich über den ganzen Norden und Osten Brasiliens erstrecken, doch ist dieselbe noch keineswegs mit Sicherheit festgestellt.

In seinen „Beiträgen zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens" gibt Euler an, daß er sie in den Monaten September bis Dezember beobachtet und daß sie jährlich drei Bruten mit etwa 3 Eiern mache. Er schildert sie dann in folgendem: „In allen offenen Gegenden ist sie gemein. Ihre Nester fand ich in jedem Jahre im Garten, in den Kaffeepflanzungen oder auf den das Haus umgebenden Bäumen, in wechselnder Höhe von 1_{60} bis etwa 10 Meter, wo sie dieselben gern in die Blätter der äußeren Zweige verstecken. Sie bestehen hauptsächlich aus den Blütenstengeln nesselartiger Gewächse, von denen hier oft große Strecken ausschließlich bewachsen sind. Die trockenen Blüten hängen meist noch daran und sind an der Nestwand nach außen gekehrt. Die Stengel sind schön und sorgfältig durcheinandergewebt und mit mancherlei Wurzelfasern und Gräsern fest verbunden. Die ganze Außenseite ist mit Mos, Flechten, verwitterten Rindenstückchen und großen Baumwollflocken geschmückt; letztere sind an manchen Stellen sorgfältig in die Nestwand eingesponnen. Die tiefe Nestmulde ist mit breiten Binsenblättern dicht ausgelegt und schön glatt gedrückt. Auf ihrem Grunde liegt eine leichte Lage feiner Wurzeln." Auch die alten Schriftsteller Edwards, Brisson, Buffon u. A. kannten diese Tangara, geben jedoch nichts bemerkenswerthes über sie an.

Als die Vogelsammlung des Berliner Aquarium im vollsten Glanze war, hatte man unter mehreren anderen auch die meerblaue Tangara angeschafft, doch kannte ich damals diese Vögel noch nicht ausreichend, um die beiden nahe verwandten Arten unterscheiden zu können. Späterhin erhielt ich sie mehrmals in einzelnen Köpfen von dem alten erfahrenen Händler Herrn Lintz in Hamburg. Leider zeigten sie sich bei mir nicht besonders ausdauernd, während sie es nach den Erfahrungen des Futtermeisters Seydel in der erwähnten Naturanstalt in vollem Maße gewesen sein sollen; ob sich letztres anderweitig bestätigt hat, weiß ich nicht anzugeben, doch läßt es sich annehmen, da die nächstverwandte Art nicht weichlich ist. Der Preis beträgt 24 bis 30 Mark für den Kopf.

Die meerblaue Tangara heißt Sangassu [bei Br.] und graue Tangara (Ruß' „Handbuch"). — [Gesprenkelte Merle, grüngefleckte Meise, graue Merle und Sayacu nach alten Autoren]. — Grey Tanager; Tangara gris.

Nomenclatur: Tanagra sayaca, *L.*; T. coelestis, *Swns.* [nec *Spx.*]; T. Swainsoni, *Gr.*; Thraupis sayaca, *Cb.* [Sayacu brasiliensibus, *Mrkg.*, *Instn.*; Tanagra brasiliensis varia, *Brss.* — Spotted green Titmouse, Mésange verte tachetée, *Edw.*; Le Cyacu, Tangara tacheté des Indes, Tangara de Cayenne, *Buff.*; Sayacu, *Sal.*, *Edw.*].

Wissenschaftliche Beschreibung siehe oben.

Tanagra sayaca: capite, collo totoque notaeo caesiis, dorso subglauco; remigibus rectricibusque nigris, exterius luride glauco-, interius albido-marginatis; fascia trans alam subglauca; subtus omnino caesia; basi rostri subnigrocinerei dilute plumbea; iride fusca; pedibus schistaceis. — ♀ dilutior, fasciae trans alam vacua.

Länge 17 cm.; Flügel 9,5 cm.; Schwanz 6,5 cm.

Jugendkleid unbekannt.

Beschreibung des Eies: Grundfarbe gelblichweiß mit zahlreichen leberbraunen Flatschen und Punkten, auf denen hin und wieder dunklere Stellen vorkommen. Am dicken Ende steht ein verborgener Kranz von feinen schwarzen Kritzeln. Die ganze Zeichnung ist buntscheckig und dicht über die ganze Oberfläche verbreitet, sodaß die Grundfarbe nur an wenigen Stellen zutage tritt. Gestalt länglich; Vorderende lang gestreckt, mit abgestumpfter Spitze. Länge 24,5 mm.; Breite 17 mm.; Schneidepunkt 15 mm. (Brmstr.).

Ovum: flavide-album maculis punctisque valde numerosis hepaticis, singula includentibus obscuriora, necnon lineolis subtilissimis coronulam obliteratam circa basin fingentibus; forma oblongiuscula; apice porrecto, obtuso.

Die graue Tangara [Tanagra cana]. Auch diese Art gehörte zu den Vögeln, welche im Berliner Aquarium gleich nach der Eröffnung vorhanden waren und die Direktion stellte inbetreff ihrer ebenfalls die Behauptung auf, daß sie friedlich und ausdauernd sei. In neuerer Zeit ist sie nur höchst selten in den Handel gelangt, und da ich sie damals noch nicht genau kannte, so habe ich sie mit der vorigen verwechselt. Sie ist an Kopf, Hals und Brust hellbleigrau; Rücken dunkler bläulichgrau; Schwingen nebst großen Flügeldecken und Schwanzfedern schwarzbraun, breit grünlichblau außengesäumt, kleine Flügeldecken glänzend zyanblau; ganze Unterseite blaugrau mit grünlichem Schein; Schnabel schwärzlichgrau mit hellerm Grunde; Auge gelbgrau; Füße schwärzlichgrau. Das Weibchen soll nicht verschieden, nur düstrer und von matterm Blau sein. Ammergröße. Die Verbreitung erstreckt sich über das nördliche Brasilien, Kolumbien, Guiana, Venezuela und Trinidad. Näheres über das Freileben ist nicht bekannt, doch wird sie in demselben wol mit den vorigen übereinstimmen. Im Londoner zoologischen Garten befindet

sie sich seit d. J. 1864; in anderen habe ich sie nicht gesehen. Ein Preis läßt sich des seltenen Vorkommens wegen nicht angeben. — Grautangara (Br.) und blaue Tangara (Ruß' „Handbuch"). Tangara évêque; Bishop Tanager or Silver-blue Tanager. — Tanagra cana, *Swns.*; Thraupis cana, *Cb.*

Die blaue Tangara [Tanagra episcopus]. Herr Direktor Bekemans in Antwerpen pflegt in den Ankündigungen zur alljährlichen Versteigerung unter den zahlreichen und kostbaren Vögeln auch gewöhnlich die Tangare evêque, den Episcopus der alten Autoren aufzuzählen, und ich war neugierig, ob es denn wirklich auch diese Art sei. Als ich mir zuerst im Jahre 1873 einen solchen Vogel schicken ließ, erhielt ich den freilich auch Bischof genannten, S. 554 beschriebnen dunkelblauen Kernbeißerfink, dann aber hatte ein Liebhaber, Herr F. Weiße in Berlin, wirklich ein Exemplar jener Tangara, leider in zerlumptem Gefieder und mit abgestoßenem Schwanz, von der kleinen Versteigerung im Frühjahr 1877 mitgebracht. Der Vogel ist hell und schwach grünlich glänzend blaugrau; Flügel und Schwanzfedern an der untern Hälfte schwärzlichgrau, an der obern blau und die Schwingen mit weißen Innensäumen, die großen Deckfedern bilden eine weißliche und darunter eine violettblaue Querbinde; der Schnabel ist schwarz, Unterschnabel am Grunde heller; Auge braun; Füße schwärzlich. Das Weibchen soll düstrer und mehr grünblau gefärbt sein und keine weiße Binde am Flügelbug haben. Buffon äußert sich entrüstet über die unpassende Benutzung des Namens Bischof für einen Vogel und noch mehr unschicklich sei es, daß man sogar zwei Arten so benannt habe, ohne zu wissen warum, es sei denn, daß ein Theil ihres Gefieders blau gefärbt ist. Dieser Vogel sei übrigens bei den Kolonisten in seiner Heimat als Tangara von Kayenne bekannt. Dort sei er sehr häufig, halte sich auf Bäumen an den Waldrändern auf, komme auch auf frischgepflügten Acker und ernähre sich von Sämereien. Man sehe ihn niemals in großen Scharen, sondern immer nur parweise; Abends sitzen sie zwischen den Blättern der Palmbäume nahe am Stamm und machen dort ähnlichen Lärm, wie unsere Sperlinge in den Wäldern; denn sie haben keinen Gesang, sondern nur ein unangenehmes durchdringendes Geschrei. Nach Burmeister's kurzen Angaben ist sie im Innern des nördlichen Brasiliens am Amazonenstrom und Rionegro, sowie abwärts bis Para heimisch, besonders aber in Guiana häufig. Sie hält sich vorzugsweise in den Kronen der Palmbäume auf und kommt auch gern in die Gärten der Ansiedlungen. Näheres ist nicht bekannt. Ein Preis läßt sich der seltnen Einführung halber nicht angeben — [Blaue Tangara oder Bischof nach alten Autoren]. — Tanagra episcopus, *L.*, *Lth.*, *Buff.*; T. coelestis, *Spx.*; Thraupis episcopus, *Cb.* [Episcopus avis, *Briss.* — Le Bluet et L'Evêque de Cayenne, *Buff.*].

Die vielfarbige Tangara [Tanagra fastuosa].

Tafel XIV. Vogel 70.

(Diese, eine der farbenprächtigsten unter allen, macht den Anfang in einer Sippschaft kleinerer Tangaren, welche sich durch besondern Reichthum und Glanz in der Färbung auszeichnen und daher großer Beliebtheit erfreuen, zumal manche von ihnen auch ziemlich regelmäßig alljährlich eingeführt werden. Sie zeigen leider jedoch einige erhebliche Schattenseiten. Alle fressen vorzugsweise Früchte und manche verschmähen sogar die Beigabe von Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Eierbrot und gesottenem Reis; alle Sämereien lassen sie unberührt liegen. Da sie geradezu fabelhaft schmutzen, so sind sie schwierig reinlich zu halten. Gar bedauerlich aber ist ihre Hinfälligkeit; jeder, der sie längere Zeit gepflegt, wird sicherlich erfahren haben, daß sie durch die geringsten ungünstigen Einflüsse, z. B.

durch die Fütterung mit zu früh abgenommenem und säuerlich gewordnem Obst überraschend leicht erkranken und daher selbst in der sorgsamsten Pflege regelmäßig frühzeitig zugrunde gehen. Am längsten dauern sie aus, wenn man sie an eingeweichtes und dann gut ausgedrücktes Eierbrot und in Wasser abgesottenen Reis gewöhnt und sie mit süßen saftigen und weichen Früchten reichlich füttert. Jede einzelne Frucht muß aber vorher sorgfältig gekostet werden, damit sie nicht irgendwie verdorben oder auch nur im Beginn der Verderbniß sich befinde, also bereits weich oder säuerlich oder gar molsch zu werden anfängt. Sie haben sämmtlich etwa Finkengröße).

Die vielfarbige Tangara ist am ganzen Kopf, an Hinterhals, Oberkehle und Schultern glänzend bläulichgrün; Oberrücken und ein breites Band über den Vorderhals tiefschwarz; Mittel- und Unterrücken glänzend orangegelb; Schwingen und große Deckfedern schwarz, breit glänzend dunkelblau außengesäumt, kleine Flügeldecken glänzendblau, die letzten kleinen Schwingen schwarz breit gelb gerandet; Schwanzfedern schwarz, breit glänzend blau außengesäumt; Oberbrust hell, lilablau, ganze übrige Unterseite tief und glänzend blau; untere Flügelseite schwärzlichgrau; Schnabel und Füße schwarz; Auge lebhaft braun. — Das Weibchen soll übereinstimmend und nur matter gefärbt sein; ich glaube jedoch, daß es nicht den gelben Unterrücken hat, denn ich besaß einst einen solchen Vogel, der bei kaum bemerkbar düsterern Farben das lebhafte Gelb garnicht und anstatt dessen einen fahlbräunlich schwarzen Unterrücken zeigte. Die Größe ist etwa der des Kanarienvogels gleich. Ihre Heimat erstreckt sich über ganz Nordbrasilien. Näheres über ihre Lebensweise ist leider nicht bekannt; auch Sclater gibt nichts an. Das überaus buntfarbige Vögelchen entspricht in seinem Wesen dieser schönen äußern Naturausstattung leider nicht; es zeigt sich still und ruhig, ja fast stumpfsinnig, und seine hervorragendste Eigenthümlichkeit ist die eines Fressers. Von früh bis abends sitzt es am Troge und schlingt staunenswerthe Massen von Früchten, süßem Reis und allerlei anderm Weichfutter hinunter — und ganz entsprechend sind auch seine Entleerungen, sodaß der Liebhaber solcher Vögel fortdauernd nur einen Riesenkampf mit der Futterbeschaffung einerseits und der Unreinlichkeit andrerseits zu bestehen hat. Vielleicht aber liegt die Ursache solcher unliebenswürdigen Eigenschaften eben nur in der schlechten Behandlung begründet, welche diese Vögel vom Augenblick des Einfangens an und während des ganzen Transports erdulden mußten, und in solchem Falle würden sie also, sobald sie sich vollständig erholt haben, mäßiger und reinlich zugleich sein. Inanbetracht ihrer Farbenpracht würde es sich verlohnen, Versuche dieserhalb mit ihnen anzustellen. Leider tritt dabei einerseits ihre erwähnte Hinfälligkeit und andrerseits ihr wirklich recht hoher Preis störend entgegen; letztrer beträgt je nach dem Zustande, in welchem sie in den Handel gelangen, zwischen 45 bis 75 Mark für das Pärchen. Während sie bisher alljährlich immer nur in wenigen einzelnen Köpfen von Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen und den Händlern Frau Poisson in Bordeaux und Herrn K. Gudera in Wien eingeführt worden, läßt sich wol erwarten, daß sie demnächst auch zahlreicher in

den Handel gelangen werden, ſobald der Vogelhandel zwiſchen Europa und Braſilien erſt beſſer geordnet iſt.

Die vielfarbige Tangara heißt auch Prachttangara (Br.). — Le Tangara multicolor ou le Tangara superbe; Superb Tanager or Many-colored Tanager.

Nomenclatur: Tanagra fastuosa, *Lss.*; Calliste fastuosa, *Scl.*, *Br.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. oben.

Tanagra fastuosa: capite, cervice, gula humerisque nitide aeruginosis; interscapilio fasciaque lata trans guttur atris; dorso tergoque nitide aurantiis; remigibus tectricibusque al. majoribus nigris, exterius late nitideque cyaneo-limbatis; tectricibus minoribus nitide cyaneis; remigibus ultimis parvis nigris, late flavo-marginatis; rectricibus nigris, exterius late nitideque cyaneo-limbatis; gutture sublilaceo-coerulescente; gastraeo toto reliquo nitide cyaneo; subalaribus fuliginosis; rostro pedibusque nigris; iride badia. — ♀ conveniens, tantum opacior, tergo verosimiliter haud flavo, sed fumido.

Länge 13,9 cm.; Flügel 7,6 cm.; Schwanz 7 cm.

Die ſiebenfarbige Tangara [Tanagra tatao].

Ebenſo ſchön wie die vorige, erſcheint ſie leider faſt noch ſeltner im Handel. Sie iſt an Mittelkopf, Backen und Augengegend glänzend meergrün, wie geſchuppt erſcheinend: vorderſter Stirnrand, ebenſo Hinterkopf, Nacken, Rücken, Flügel, Schwanz, Steiß und Bauchmitte kohlſchwarz; kleinſte Deckfedern himmelblau, eine Querbinde über den Flügel bildend, die erſten Handſchwingen fein blau gerandet; Unterrücken feuerroth, Bürzel gelblichroth; Hals vom Schnabelgrunde bis zur Oberbruſt laſurblau, Bruſt-, Hals- und Bauchſeiten himmelblau; Unterſchenkel und Hinterleib ſchwarz; Schnabel und Füße ſchwarz; Auge braun. Das Weibchen ſoll dem Männchen gleich, aber in den Farben matter, mehr graulich und am Mittel- und Unterrücken gelb ſein. „Dieſe Art bewohnt das Waldgebiet Braſiliens am untern Amazonenſtrom und geht ſüdlich etwa bis Pernambuko, höchſtens ausnahmsweiſe bis Bahia; nordwärts verbreitet ſie ſich über Guiana, Venezuela, Neugranada, aber nicht mehr nach Peru, dort trifft man den Vogel wol bei den Händlern, aber nicht im Freien.“ Näheres iſt nicht angegeben. Auch ſie wird nur gelegentlich von den genannten Händlern eingeführt und hat dann gewöhnlich denſelben oder einen noch höhern Preis. Den Namen hatte ihr übrigens bereits Buffon beigelegt, der ſie ſehr eingehend beſchreibt, aber fehlerhafte Abbildungen bringt, weil der Aufſeher des Naturalienkabinets dem getrockneten Exemplare einen falſchen Schwanz eingeſetzt hatte. Er hält ſie für die ſchönſte unter allen Tangaren und meint, daß ſie in mancherlei Abänderungen vorkomme, doch liegt dies wol darin begründet, daß die alten Schriftſteller die einzelnen Arten noch nicht mit Sicherheit zu unterſcheiden vermochten, ſondern vielfach zuſammenwarfen und mit einander verwechſelten.

Die ſiebenfarbige Tangara nennt Br. Siebenfarb. — [Paradismerle und Paradismeiſe, nach alten Autoren]. — Le Tangara septicolor ou le Septicolor; Paradise Tanager.

Nomenclatur: Tanagra tatao, *L.*, *Bff.*, *Lth.*, *Edw.*, *Dsm.*, *Kttl.*, *Cb.*: Calliste tatao, *Scl.*, *Brmst.*, *Br.*; Aglaja paradisea, *Swns.*; Callispiza tatao, *Cb.* [Tanagra prima brasiliensibus, *Mrkgr.*, *Inst.*, *Wllghb.*, *Ray.* — Mésange du Paradis, Titmouse

of Paradise, *Edw.*; Tangara, *Briss.*, *Buff.*; Le Septicolor ou le Tangara du Bresil, *Buff.* — Dos rouge ou Oiseau épinard, bei den Kreolen in Kayenne und Pavert bei einigen Vogelhändlern, nach *Buff.*].

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſ. S. 664.

Tanagra tatao: pileo, genis, regioneque ophthalmica nitide aeruginosis, quasi squamosis visis; margine frontali antico, occipite, cervice, dorso, alis, cauda, crisso, abdomineque medio anthracinis; tectricibus al. minimis coeruleis, fasciam trans alam fingentibus; remigibus anterioribus subtiliter coeruleo-marginatis; tergo igneo: uropygio aurantio; collo a rostri basi usque ad guttur azureo; lateribus colli, pectoris abdominisque coeruleis; tibiis ventreque nigris; rostro pedibusque nigris; iride fusca. — ♀ similis, tantum opacior, magis cinerescens dorsoque flavo.

Länge 13,9 cm.; Flügel 7,8 cm.; Schwanz 7 cm.

Die dreifarbige Tangara [Tanagra tricolor], „im mittlern Braſilien von Rio de Janeiro aufwärts bis Bahia, ferner weſtwärts über die inneren Gegenden verbreitet, dort in kleinen Trupps im dichten Walde lebend, laſſen ſie nur zeitweiſe kurze Locktöne hören und verrathen ſich ſonſt nicht; trotzdem ſind ſie wenig ſcheu und kommen ſelbſt in die Gärten der Anſiedler. Ich erhielt einen ſolchen bunten Vogel in Neu-Freiburg. Er iſt an Oberkopf, Backen und Kinnrand ſpahngrün, ziemlich ſtark himmelblau ſcheinend; Nacken, Halsſeiten und Oberrücken gelbgrün, Mittelrücken ſchwarz, die Federn theilweiſe mit gelbgrünen Rändern, Unterrücken orange; Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz, letztere und die Handſchwingen ſchmal blau gerandet, Armſchwingen breit grün geſäumt, Flügeldeckfedern zyanblau, am Grunde ſchwarz; Vorderhals ſchwarz, Bruſt himmelblau, oberer Theil mit einzelnen ſchwarzen Flecken; Bauch, Steiß und Bürzel grün, Unterſchenkel himmelblau; Schnabel glänzend ſchwarz; Auge braun; Füße ſchwarzbraun. Das Weibchen unterſcheidet ſich nur durch etwas mattere Farben, gleichmäßig grün gefleckten Rücken und nicht ganz reinblaue, ſondern mehr blaugrüne kleinſte Flügeldecken. Die Größe iſt etwas geringer als die der ſiebenfarbigen." Die obige kurze Schilderung und eingehende Beſchreibung habe ich von Burmeiſter entlehnt. Euler fügt hinzu, daß er ſie in Kantagallo im Oktober, November und Februar niſtend gefunden und zwar Gelege mit 2 bis 3 Eiern. Er ſagt, ſie ſei dort ſehr häufig, halte ſich jedoch im Gebüſch mehr als andere Arten auf. „Das Neſt ſtand ausſchließlich auf Bananenbäumen, bald zwiſchen Blattſtiel und Stamm, bald zwiſchen die unreifen Früchte des herabhängenden Fruchtkolbens oder auch auf den Stumpf eines abgehauenen Stamms gebaut; es gleicht dem der meerblauen Tangara." Da dieſe Art gleich den vorigen ſelten eingeführt wird, eigentlich noch ſeltner, nur beiläufig, ſo will ich auf die näheren Mittheilungen des letztgenannten Forſchers vorläufig nicht weiter eingehen. Wie bereits bemerkt, werde ich eine ganz ausführliche Schilderung aller Tangaren noch in einem ſpäter folgenden Bande geben. Buffon warf dieſe und die blaukäppige Tangara als eine Art zuſammen und ſtellte ſie beide gemeinſam auf der 33. Kupfertafel dar. Er hielt ſie für Abänderungen oder nur für verſchiedene Geſchlechter einundderſelben Art, „weil ſie ſich blos durch die Farbe des Kopfs, der bei der einen grün und bei der andern blau iſt, unterſcheiden. Die Sitten dieſer Vögel", ſagt er weiter, „ſind uns gänzlich unbekannt, wir haben ſie von Kayenne erhalten, wo ſie aber Herr Sonnini de Manoncourt garnicht geſehen. Ich benenne dieſe Art deswegen als dreifarbige Tangara, weil auf ihrem Gefieder die herrſchenden Farben Roth, Grün und Blau ſind und zwar alle drei ſehr glänzend. In dem Kabinet des Herrn Aubri, Prediger zu St. Louis in Paris, findet man die blaukäppige Tangara unter dem Namen des magellaniſchen Papſtes; es iſt aber nicht glaublich, daß ſie in den an jener Meerenge gelegenen Ländern einheimiſch ſei, weil die im Königl. Kabinet befindlichen Vögel aus Kayenne gekommen ſind." Im übrigen bitte ich, die nächſtfolgende Art vergleichen zu wollen. Dreifarbentangara bei Br. [Gefleckter grünköpfiger kayenniſcher Tangara, Bff.]. — Le Tangara tricolor ou le Tricolor; Green-headed Tanager or Tricolored Tanager. — Tanagra

tricolor, *Gml.*, *Bff.*, *Lth.*, *Tmm.*, *Dsm.*, *Kttl.*; T. tatao, *Pr. Wd.* [nec *L.*]; Calliste tricolor, *Scl.*, *Brmst.*, *Br.*; Callispiza tricolor, *Gr.*, *Cb.* [Tangara cayenensis *variet.* chlorocéphala, *Brss.* — Le Tricolor; Tangara varié à tête verte de Cayenne, *Buff.*].

Die blauköppige Tangara [Tangara festiva] ist überaus zierlich gebaut und anmuthig im Wesen. Streif rings um den Schnabel und also auch das sog. Kinn, sowie der Zügel tiefschwarz, ein breiter Streif quer über die Stirn von einem Auge zum andern grünlichblau; Ober- und Hinterkopf zyanblau; im Nacken eine breite hellzinnoberrothe Binde, welche sich vorn über die Ohrdecke bis zum Kinn fortsetzt; Oberrücken tiefschwarz, Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend grün; Flügel- und Schwanzfedern schwarz, die kleinsten Deckfedern am Bug einfarbig schwarz, darunter eine orangefarbige Binde, alle übrigen mit breitem grüngelben Außenrande, die Schwingen schmaler grüngelb außengesäumt; Kehle zyanblau; Oberbrust glänzend maigrün, ganze übrige Unterseite grün, untere Flügel- und Schwanzseite aschgrau; Schnabel schwärzlichsilbergrau; Auge dunkelbraun; Füße bläulichschwarzgrau. Das Weibchen soll nach Brmstr. dem Männchen gleich, nur wenig matter und auf dem Rücken nicht rein-, sondern schwarz gefleckt sein. Die Größe stimmt mit der der vorigen überein. Die obige Beschreibung habe ich nach einem Männchen gegeben, welches ausgestopft vor mir steht. Ich erhielt dasselbe unter einer Sendung kleiner afrikanischer Vögel, welche für mich in Bordeaux von einem Kleinhändler angekauft waren und sonderbarerweise garkeine Angabe der Seltenheiten enthielt, die sich darunter befanden. Für die Tangaren war leider keine entsprechende Fütterung beigegeben und sie kamen daher, mit einigen Früchten versorgt, lebend nur gerade bis Berlin. Im Verzeichniß der Thiere des zoologischen Gartens von London befindet sie sich in einem Exemplar seit d. J. 1875; außerdem dürfte das überaus hübsche Vögelchen noch nirgends eingeführt sein. Inbetreff der Lebensweise sagt Burmeister folgendes: „Im Waldgebiet der Ostküste Brasiliens von St. Paulo bis nach dem Amazonenstrom ist sie verbreitet, auch jenseits desselben noch in Guiana ist sie heimisch, aber nicht häufig; sie liebt die Gebirgswaldungen höher gelegener Gegenden und darum ist sie dem Prinzen von Wied nur einmal vorgekommen. Bei Neu-Freiburg erhielt ich dagegen nach und nach mehrere Exemplare." Da dies hübsche Vögelchen also auch in seiner Heimat nur selten vorkommt, so dürfen wir auf eine häufige Einführung leider nicht hoffen. — Le Tangara à tête bleue; Festive Tanager. — Tanagra tricolor, var β., *L.*, *Bff.*; T. festiva, *Sh.*; T. trichroa, *Lchtst.*; T. cyanocephala, *Vll.*, *Dsm.*; T. rubricollis, *Tmm.*, *Pr. Wd.*, *Kttl.*; Aglája cyanocephala, *Swns.*; Calliste festiva, *Gr.*, *Scl.*, *Brmst.*; Callispiza festiva, *Cb.*

Die schwarzrückige Tangara [Tanagra melanóta] aus dem Waldgebiet des mittleren Brasiliens, besonders nördlich von Bahia und im Innern am Amazonenstrom; sie ist an Oberkopf, Backen und Hinterhals bis zum Rücken rothbraun; Zügel schwarz; Rücken schwarz, kleine Flügeldecken ockergelb, große Flügeldecken und Schwingen, sowie Schwanzfedern schwarz, himmelblau außengesäumt, Unterrücken grünlich; Bürzel gelblichrostroth; die ganze Unterseite vom Schnabel bis zum Bauch grün; Hinterleib und untere Schwanzdecken rosströthlichgelb; Schnabel schwarzbraun; Auge braun; Füße bräunlichfleischfarben. Das Weibchen ist matter gefärbt, besonders am Rücken trüber schwarzbraun; Flügeldecken und Unterrücken grün; Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun, grün gerändert; Kehle und Vorderhals grünlich überlaufen, ganze übrige Unterseite blaßgelblichweiß. Größe kaum bemerkbar bedeutender als die der dreifarbigen. Sie ist im Oktober 1873 in den zoologischen Garten von London gelangt; außerdem dürfte sie kaum eingeführt sein. — Le Tangara à dos noir; Black-shouldered Tanager. — Aglaja melanota, *Swns.*; Tanagra gyrola, *Pr. Wd.* [nec *L.*]; T. peruviana, *Dsmr.*; Calliste peruviana, *Scl.*; C. melanóta. *Brmst.*

Die gelbe Tangara [Tanagra flava] aus dem Osten Brasiliens. Im Jahre 1874 sandte mir Herr Lintz aus Hamburg zwei Männchen und ein Weibchen dieser überaus seltnen, schönen Tangara, und ich glaube behaupten zu dürfen, daß die Art außer einer gelegentlichen

Sendung im Berliner Aquarium, welche ebenfalls in zwei Männchen bestand und bald nach der Eröffnung anlangte, weder vor- noch nachher jemals wieder eingeführt worden; selbst im zoologischen Garten von London war sie bisher noch nicht vorhanden. Sie ist an Ober- und Hinterkopf röthlichgelb, Stirnrand etwas dunkler; Zügel und ganzes Gesicht nebst Hals und Brust, Bauchmitte und Hinterleib tiefschwarz; Schulter- und alle übrigen Flügelfedern schwarz mit breiten bläulichgrünen Außensäumen, Schwingen reiner blau gesäumt, am Innenrande weißlich; Schwanzfedern schwarzbraun, himmelblau scheinend und grünlichblau außengesäumt; Brust- und Bauchseiten nebst Ober- und Unterschwanzdecken fahlröthlichgelb; Schnabel braungrau; Auge braun; Füße bräunlichgrau. Das Weibchen ist nach Burmeister am ganzen Rumpfe aschgrau; Stirn und Oberkopf rostgelblich; Rücken grünlich überlaufen, Flügel und Schwanz wie beim Männchen, nur matter graugrünlich; Kehle und Vorderhals weißlich; Bauch und Steiß rostgelblich; Schnabel und Füße heller als beim Männchen. Die Größe ist etwas bedeutender als die der vorigen. „Bei Neu-Freiburg, aber auch nordwärts bis Bahia und südwärts bis Paraguay verbreitet." Näheres ist nirgends angegeben. Nach meinen Erfahrungen erhält sie sich vortrefflich und zeigt sich als ein anmuthiger und lebhafter, nicht unverträglicher, aber sehr gefräßiger Vogel. Das Pärchen gelangte in die Vogelstube des Herrn Graf Rödern in Breslau, und nach den Erfahrungen desselben kann ich hoffentlich späterhin eingehende Mittheilungen machen. Isabelltangara (Br.). — Le Tangara jaune; Yellow Tanager. — Tanagra flava. *Gml., Lth., Pr. Wd.;* T. formosa, *Vll.;* Callispiza flava. *Cb.:* Calliste flava, *Brmst., Br.* [Lindo bello, *Azr.*; Guirapera, *Mrkgr.*].

Die schwarzkäppige Tangara [Tanagra brasiliensis], welche nach Burmeister im Waldgebiet Brasiliens nicht selten, von ihm bei Neu-Freiburg gesammelt, nordwärts aber seltner und kaum über Bahia hinaus vorkommt, ist in folgender Weise gefärbt: Stirn bis über die Augen hinauf, Backen, Kehle, Brust, Bauchseiten, kleine Flügeldecken und Bürzel hellbläulichviolett; übriges Gefieder größtentheils schwarz, große Flügeldecken und Handschwingen ebenso fein gerandet, alle Schwingen innen weiß gesäumt; Bauchmitte, Steiß und untere Schwanzmitte weiß; Schnabel schwarz; Auge braun; Füße glänzend schwarzbraun. Weibchen dem Männchen gleichgefärbt, aber die blauviolette Farbe matter weißlich und mehr auf die Spitzen der Federn beschränkt. Größe der der vorigen gleich. Brisson, Buffon u. a. alte Schriftsteller bringen nur ihre Beschreibung ohne alle weiteren Angaben. Näheres über sie ist überhaupt nicht zu finden, da sie ebenso zu den am wenigsten bekannten, als auch am seltensten eingeführten gehört. Ich hätte sie hier nicht mitzuzählen brauchen, wenn sie nicht im Laufe der Jahre einmal von Herrn Gudera und dann von Herrn Möller mir zur Bestimmung zugesandt worden. Beidemale freilich in so kläglichem Zustande, daß sie nicht am Leben blieb. Im Londoner zoologischen Garten ist sie bisher noch nicht vorhanden gewesen und meines Wissens auch überhaupt nicht weiter eingeführt. — Türkistangara bei Br. [Dunkelblauer brasilischer oder türkisblauer Tangara und brasilische Merle, nach alten Autoren]. — Le Tangare à calotte noire: Black-bonnet Tanager. — Tanagra brasiliensis, *L., Bff., Lth., Pr. Wd.* [nec *Hrtl.*]; Calliste brasiliensis, *Sel., Brmst., Br.:* Tanagra barbadoensis, *Khl., Rss.* [„*Hndb.*"]; Callispiza brasiliensis, *Cb.* [Tangara brasiliensis coerulea, *Brss.* — Tangara bleu du Brésil, *Brss.*; Le Turquin, *Buff.*].

Nachträge und Ergänzungen.

Der Zügelastrild [Aegintha rhodopýga]. (Ergänzung zu S. 50.) Ein Exemplar, nach dem Wiener zoologischen Museum bestimmt, befand sich in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Koburg-Gotha in Wien und erhielt sich längere Zeit am Leben.

Der Bronze-Astrild [Aegintha Russi].

Im Spätherbst d. J. 1873 empfing ich in einer größern Vogelsendung von Herrn Ch. Jamrach aus London einen kleinen Astrild, welchen ich vorläufig nicht festzustellen vermochte. Er war so kahl und beschmutzt im Gefieder, daß nur der Kopf und Oberrücken sich deutlich erkennen ließen. In der Größe, Gestalt, in seinem ganzen Benehmen, im Lockton und namentlich in der Schwanzbewegung glich er durchaus dem S. 82 beschriebnen kleinen rothen Astrild (Aegintha minima), dem allbekannten kleinen Amarant; die Färbung zeigte sich aber nicht dunkelroth, sondern röthlichorange oder vielmehr echt goldbronzebraun. Ich bewahrte ihn sorgfältig mit anderen seltenen zusammen in einem Käfige. Er entkam mir jedoch aus demselben in die Vogelstube und da ich damals mehrere große Starvögel hatte, so ist er entweder getödtet worden oder hat sich auf Nimmerwiedersehn verkrochen.

Als im September d. J. 1875 Herr Vogelhändler W. Mieth in Berlin eine Sendung kleiner afrikanischer Prachtfinken aus Antwerpen erhielt, befand sich unter diesen wiederum ein solches goldbronzefarbnes Vögelchen und zwar im vollen Gefieder, jedoch krank, sodaß es nach wenigen Tagen starb. Herr Mieth übergab es mir und trotzdem wir, Herr Dr. Reichenow und ich, uns ebensowol im Berliner Museum als auch in der gesammten Literatur sorgfältig umsahen, vermochten wir es nirgends aufzufinden, und somit blieb uns kein Zweifel daran, daß wir in demselben eine neuentdeckte Art vor uns hatten. Herr Dr. Reichenow hat derselben meinen Namen beigelegt und ich habe ihr die obenstehende deutsche Benennung gegeben. Vielleicht wird der hübsche Prachtfink, dessen einziges vorhandnes Exemplar ausgestopft im Berliner zoologischen Museum steht, über kurz oder lang wieder einmal und dann hoffentlich in größerer Anzahl eingeführt. In den nahezu drei Jahren ist unter den Tausenden der kleinen Amaranten, welche der Spätsommer alljährlich in den Handel bringt, freilich noch kein zweites Exemplar mitgekommen.

Der Bronze-Astrild hat keine weiteren Namen.

Nomenclatur: Estrelda (Lagonosticta) Russi, *Rchn.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Vorderkopf, Kopfseiten und ganze Unterseite orange (gelbroth); Oberseite dunkelbraun, orange überflogen; Bürzel orange; Schwanzfedern schwarz, mit breiten orangefarbenen Außensäumen am Grunde; Unterschwanzdecken und Hinterleib dunkelbraun, schwach orange überflogen. Schnabel mennigroth mit schwarzer Firste und Dillenkante und blaßhornbraunen Schneidenrändern; Auge dunkelbraun; Füße blaßhornbraun. Der Vogel gleicht hinsichtlich der Größe und Farbenvertheilung sehr dem rothbrüstigen Astrild (Aegintha rufopicta) und ist nur dadurch verschieden, daß die weinrothe Färbung jenes bei ihm orangefarben ist. (Rchn.).

Aegintha Russi: sincipite, capitis lateribus totoque gastraeo aurantiis; supra fusca, aurantio-lavata; uropygio aurantio; basi pogonii rectricum extero late aurantio-limbata; infracaudalibus ventreque fuscis, subaurantio-affiatis; culmine gonateque rostri miniati nigris, tomiis subcorneis; iride fusca; pedibus subcorneis. Persimilis Aeg. rufopictae, sed colore aurantio (illius vinaceo) distincta.

Länge $9{,}5^{cm.}$; Flügel $4{,}5^{cm.}$; Schwanz $3{,}5^{cm.}$ [Schnabelfirst $0{,}6^{cm.}$; Mundspalte $0{,}9^{cm.}$; Lauf $1{,}2^{cm.}$]. Rchn.

Der gepunktete rothe Astrild [Aegintha rufopicta].

(Nachtrag zu dem rothbrüstigen Astrild S. 88).

Im Juni 1878 sandte mir Fräulein Chr. Hagenbeck zwei Männchen zur Bestimmung und ich will zunächst die vorn gegebne oberflächliche Beschreibung nach dem lebenden Vogel vervollständigen: Oberseite von der Stirn bis zum Bürzel nebst Rücken und Flügeln dunkelaschgrau, kaum schwachgrünlich und an den Schultern röthlich scheinend; Oberkopf bemerkbar heller reingrau; Stirnstreif, Zügel, Augenbrauen, Kopf- und Halsseiten, Brust, oberer Theil des Bauchs, Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelweinroth; Schwanzfedern schwärzlichbraun, die äußersten am Grunde schwach roth außengesäumt; Hinterbauch, Brust- und Bauchseiten schwach roth, indem die bräunlichaschgraue Grundfarbe der Federn durchscheint; Hinterleib und untere Schwanzdecken fahl gelblichgrau; die ganze Brust ist mit feinen weißen querstehenden Pünktchen, welche oberseits einen sehr schmalen dunklen Saum haben, übersäet; innere Flügelseite hellaschgrau, untere Flügeldecken hellgelblichgrau. Schnabel glänzend dunkelroth, vom Grunde des Unterschnabels bis hinauf zum Nasenloch zart weißlich, First des Ober- und Unterschnabels schwärzlichbraun; Auge grau, von einem sehr schmalen gelben Ring umgeben; Füße bräunlichfleischroth. Das Weibchen ist an Stirn, Hinterkopf und ganzer übriger Oberseite bräunlichaschgrau; Zügel und Wangen zart roth; Oberschwanzdecken und Schwanzfedern roth wie beim Männchen; Kehle und ganze übrige Unterseite schwach roth; Bauch und Hinterleib isabellaschgrau; Brust- und Bauchseiten aschgrau, röthlich überhaucht; nur hier und da ein weißes Pünktchen auf der Brust; Unterschwanz- und Unterflügeldecken fahl isabellgelb, untere Flügelseite aschgrau; Schnabel wie beim Männchen; Auge grau. Die Größe ist kaum bemerkbar beträchtlicher als die des kleinen rothen Astrild, welchem er auch im Wesen völlig gleicht. Nach den Erfahrungen des Herrn L. van der Snikt gehört er zu den zartesten Astrilde. „Der Liebesgesang des Männchens ist recht angenehm, hoch und laut und besteht in einer ziemlich langen Strofe. Während des Singens tanzt jenes neben dem Weibchen, streckt in rascher Bewegung den Schnabel gegen die Sitzstange, zwischen die Füße des letztern, spreizt den Schwanz, sich hin- und herwindend, gerade wie ein Goldfasan."

So haben wir also abermals einen schönen, bisher im Handel noch nicht vorhanden gewesenen Prachtfink vor uns, der es wol verdient, daß wir ihm unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Der Händler Herr Fockelmann in Hamburg, welcher mittheilt, daß er die Art bereits i. J. 1876 auf der Ausstellung in Kiel hatte, führte in diesem Jahre etwa 20 Köpfe ein, unter denen jedoch nur wenige Weibchen waren. Dieselben wurden sämmtlich durch Fräulein Hagenbeck in den Handel gebracht und die Liebhaber, in deren Vogelstuben nur Männchen gelangt sind, werden dieselben hoffentlich mit Weibchen des nächststehenden kleinen rothen Astrild zusammen Züchtungen vornehmen. Auch Fräulein Hagenbeck hatte schon vor etwa einem halben Jahre einige Köpfe erhalten, da dieselben aber entfiedert waren, nicht besonders beachtet, sondern als kleine rothe Astrilde fortgegeben.

Inbetreff des Namens sei übrigens noch bemerkt, daß die Bezeichnung rothbrüstiger Astrild oder Amarant, ja sogar Rothbrustamarant (Br.) durchaus unzutreffend ist. Der Vogel hat keineswegs eine auffallender rothe Brust, als der kleine, der dunkle, der australische und alle übrigen dieser Astrilde, welche man Amaranten nennt; sein hauptsächlichstes Merkmal sind die Punkte, welche nicht wie bei den anderen an den Seiten und nur einzeln vorhanden, sondern vielmehr die ganze Brust bedecken. Ich will ihn daher wie oben angegeben neu benennen. Auch der lateinische Name A. rufopicta, *Frs.*, ist nichts weniger als glücklich gewählt.

Aegintha rufopicta: a fronte ad uropygium usque cum dorso alisque obscure cinerea, virente lavata, humeris rubente micantibus; pileo purius cano; stria frontali, loris, superciliis, lateribus capitis collique, pectore, epigastrio, uropygio et supracaudalibus obscure vinaceis; rectricibus fuliginosis, basi pogonii extimarum exteri rubente limbata; ventre, pleuris et hypochondriis sordide

canis, subrubro-imbutis; crisso et infracaudalibus luride gilvis; punctulis albis transversis, superne obscurius sublimbatis, supra pectus totum conspersis; subalaribus incanis; tectricibus al. inferioribus subgilvis; basi rostri nitide corallini ad nares usque albida; culmine maxillae mandibulaeque fuliginoso. — ♀ fronte, occipite totoque notaeo luride canis; loris genisque subrubris; supracaudalibus aeque ac in mare rubris; gula totoque gastraeo rubentibus; abdomine ventreque livide canis; pleuris et hypochondriis cinereis, rubente afflatis; pectore rarius albopunctulato; tectricibus subalaribus et infracaudalibus sordide isabellinis; subalaribus cinereis; rostro aeque ac in mare picto; iride cinerea.

Länge $9,_1$ cm.; Flügel $4,_4$ cm.; Schwanz $3,_3$ cm.

Der dunkelrothe Astrild [Aegintha rubricata].

(Ergänzung zu Seite 89).

Nachdem ich im Laufe der Jahre eine beträchtliche Anzahl dunkelrother Astrilde in beiden Geschlechtern und verschiedenen Altersstufen vor mir gehabt, muß ich die S. 2 gegebne wissenschaftliche Beschreibung in folgendem berichtigen: Oberkopf und Nacken graubraun, kaum bemerkbar olivengrünlich scheinend, aber ganz deutlich roth überflogen; übrige Oberseite schwach olivengrünlichdunkelbraun; Schwingen bräunlichaschgrau, breit fahl außengesäumt; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne dunkelroth gesäumt, die äußersten einfarbig schwarz; obere Schwanzdecken dunkelpurpurroth; Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kehle und ganze Brust, Brust- und Bauchseiten dunkelweinroth, an der Brustseite einzelne weiße Pünktchen, Brust- und Bauchmitte schwärzlichbraun; Schenkel und Hinterleib schwarzbraun; untere Schwanzdecken rußschwarz; untere Flügelseite hellaschgrau; untere Flügeldecken bräunlichisabellfarben. Schnabel bleigrau mit schwärzlicher Spitze und Schneidenrändern; Auge dunkelbraun von gelblichem Rande umgeben; Füße dunkelbleigrau. Das Weibchen (welches bis jetzt noch garnicht beschrieben war) ist an der ganzen Oberseite einfarbig fahl graubraun; Stirn und Oberkopf düster aschgrau, schwacholivengrünlich scheinend; breiter Zügelstreif, Augenbrauen und Kinn hellweinroth, Kopfseiten röthlichgrau, Hals, Brust, Brust- und Bauchseiten röthlichdunkelbraun, an der Brustseite weiße Pünktchen; Schwingen bräunlichgrau; Schwanzfedern schwarz, in der Mitte der Außenfahne breit düsterroth; obere Schwanzdecken dunkelpurpurroth; Bauchmitte dunkelgelblichbraun, Hinterleib und untere Schwanzdecken schwarz; untere Schwanz- und Flügelseite aschgrau. Schnabel bleigrau mit schwärzlicher Spitze; Auge dunkelbraun von ganz feinem gelblichen Rande umgeben; Füße dunkelbleigrau.

Aegintha rubricata: pileo cerviceque fumidis, parum olivaceo-virente micantibus, at distincte rubro-afflatis; notaeo toto olivaceo-virente fusco; remigibus subfumidis, exterius livide lateque limbatis; pogonio externo medio rectricum nigrarum rubro-limbato; extimis earum unicoloribus nigris; supracaudalibus obscure purpureis; loris, lateribus capitis collique, gula, pectore toto, pleuris et hypochondriis obscure vinaceis; punctulis pleurarum albis; pectore abdomineque mediis castaneis; tibiis crissoque e nigro fuscis; infracaudalibus fuliginosis; subalaribus incanis; tectricibus al. inferioribus luride isabellinis; apice tomiisque rostri plumbei nigrescentibus; iride fusca, flavide circumcincta; pedibus osbcure plumbeis. — ♀ supra unicolor subfumida; fronte pileoque obscure cinereis, olivaceo-virente micantibus; stria lororum lata, superciliis mentoque subvinaceis; capitis lateribus rubicunde cinereis; collo, pectore, pleuris albo-punctulatis et hypochondriis badiis; remigibus subfumidis; pogonio externo medio rectricum nigrarum late sordide rubro; supracaudalibus obscure purpureis; abdomine medio flavide fusco; crisso et infracaudalibus nigris; latere alarum caudaeque inferiore canis; apice rostri plumbei late nigro; iride fusca, subflavide circumcincta; pedibus e nigro plumbeis.

Dühring's rother Astrild.

„Im Herbste d. J. 1876 erhielt ich durch einen Freund, welcher mit seinem Schiffe von einer Reise nach der Küste Benguelas zurückkehrte, mehrere Prachtfinken und unter ihnen einige, welche bis jetzt, wenn auch vielleicht schon nach Europa gebracht, doch noch in keinem wissenschaftlichen Werke beschrieben sein dürften. Vor kurzem bemerkte ich nun, daß diese Vögel, ein Männchen und zwei Weibchen, sich zu einer Brut rüsteten, indem das erstre Niststoffe in ein von Helenafasänchen angefangnes und wieder verlassenes Nest, welches sich in einem oben zusammengebundnen freihängenden Nistkorbe befand, hineintrug. Die beiden Weibchen sind sehr leicht von einander zu unterscheiden, da das eine etwas kahl auf dem Rücken ist. Ich beobachtete nun, daß das eine morgens um 5—6 Uhr das andre ablöste und zwar ungefähr bis 9 Uhr; dann ging das Männchen aufs Nest, saß bis um 2 Uhr, wurde für kurze Zeit vom erstern Weibchen, um zu fressen und zu trinken, abgelöst und saß dann bis abends gegen 8 Uhr, zu welcher Zeit das zweite Weibchen seine Stelle wieder einnahm. Dieser Vorgang wiederholte sich ganz regelmäßig an jedem Tage. Leider wurde meine Freude und Hoffnung auf betrübende Weise gestört. Wie ich schon erwähnt, hatten die Vögel in einem freistehenden Nistkörbchen gebaut, und zwar ein rundes herunterhängendes Nest, aus Halmen, Fasern, Zeugläppchen, Fäden u. drgl., mit einer sorgsam gerundeten Eingangsöffnung. Es war kaum fertig, als auch schon ein Par Schmetterlingsfinken anfingen, dasselbe zu zerstören. Das brütende Weibchen beachtete dies jedoch nicht und ich bemerkte nur, daß das Männchen sehr emsig sich mit dem Ausbessern des Schadens zu schaffen machte. Herr Hald, dem ich meine Noth klagte, rieth mir, die übrigen in der Voliere befindlichen Vögel herauszufangen, indem ich sonst kaum darauf rechnen könne, die Brut glücklich großzuziehen. Da ich an jenem Tage davon abgehalten wurde, diesem Rathe folgezugeben, so verschob ich die Ausführung desselben bis zum nächsten Morgen, mußte aber die Erfahrung machen, daß ich durch den Aufschub die Zeit dazu leider schon versäumt hatte. Als ich am andern Morgen ganz früh nach der Voliere sah, bemerkte ich gleich, daß alle drei Vögel außerhalb des Nestes waren und als ich genauer untersuchte, fand ich denn auch das gänzlich zerstörte Nest und auf dem Boden im Sande fünf bereits ziemlich stark angebrütete Eier. Dieselben sind nicht von gleicher Größe (vielleicht weil beide Weibchen gelegt haben); sie waren länglich, weiß, ganz hell rosa schimmernd. Seitdem habe ich wieder die Freude, daß das Männchen dasselbe Nest neuzubauen beginnt und zwar in der Weise, daß es ganz allein thätig ist, während die beiden Weibchen sich anscheinend garnicht darum bekümmern."

Herr F. H. Dühring in Hamburg, der mir die obige Mittheilung zukommen ließ, schickte mir die geschilderten Vögel freundlichst zu und ich will nun über sie folgendes berichten. Im äußern Ansehen, in der Gestalt und Färbung gleichen sie dem dunkelrothen Astrild oder dunklen Amarant (Aegintha rubricata, *Lchtst.*); bei näherer Betrachtung aber weichen sie doch ganz erheblich von demselben ab. Ich gebe nun zunächst eine genaue Beschreibung: Oberkopf rein aschgrau, Hinterkopf, Nacken und ganze Oberseite bräunlichgrau mit gelblichem, aber nicht olivengrünlichem Schein; schmaler Stirnstreif, Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn, Kehle, Brust und Bauchseiten lebhaft hell todtenkopfroth; obere Schwanzdecken ebenso, doch wenig heller; an den Brustseiten einige weiße Pünktchen; Brust- und Bauchmitte schwärzlichbraun, hintrer Unterleib und untere Schwanzdecken rauchschwarz, jede Feder breit roth gesäumt; untere Flügelseite silbergrau, untere Flügeldecken isabellgrau; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne breit schwach roth gesäumt, die äußersten Federn einfarbig schwarz. Schnabel dunkel bleiblau, mit schwärzlicher Spitze; Auge braun, von feinem röthlichen Rand umgeben; Füße blaugrau. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite einfarbig graubraun, mit lebhaft gelbgrauem Schein, Stirn bis Oberkopf fast rein aschgrau; breiter Zügel, Augenbrauenstreif und Kinn todtenkopfroth, Kopfseiten aschgrau, zart röthlich überflogen. Schwingen bräunlichaschgrau mit breiten hellen Innensäumen; Schwanzfedern reinschwarz, in der Mitte der Außenfahne breit mattroth; die beiden äußersten reinschwarz; Hals, Brust und ganze Unterseite hellgelblichbraun, lebhaft roth überflogen, an den Brustseiten weiße Pünktchen, Unterbauch gelblich-

grau, jede Feder heller gesäumt, untere Schwanzdecken schwarz, ebenfalls fein hell gesäumt; untere Flügelseite fein aschgrau, untere Flügeldecken bräunlichgelbgrau; Schnabel glänzend bleigrau mit schwärzlicher Spitze; Auge dunkelbraun von ganz feinem weißlichgelben Rand umgeben; Füße bleigrau.

Da der Vogel auf den ersten Blick, wie gesagt, dem dunkelrothen Astrild gleicht, so sandte Herr Dühring mir auch ein Exemplar dieses letztern mit und die Vergleichung ergab allerdings bedeutsame Unterschiede. Zunächst ist das Roth keineswegs dunkelpurpurn, sondern ganz entschieden viel heller todtenkopfroth, mit auffallend gelblichem Stich. Die Schattirung der Oberseite ist durchaus nicht olivengrünlichbraun, sondern schwach ins gelbliche scheinend. Der Oberkopf ist nicht roth überflogen, sondern reinaschgrau; während als Hauptkennzeichen aber die unteren Schwanzdecken des dunkelrothen Astrild rein rußschwarz sind, erscheinen sie bei diesem rothgesäumt; der Schnabel ist ebenfalls heller, mehr blau. Auffallend unterscheidet sich zugleich das Weibchen, indem es eine viel heller gelbrothe Schattirung hat.*) Ich habe nun überall in der betreffenden Literatur umhergesucht, und schon glaubte ich, daß der Vogel die Aegintha—Lagonosticta—rhodopareia Heuglin's sei, doch wird von dieser behauptet, daß der Unterleib sowol, als auch die unteren Schwanzdecken schwarz seien, während dies bei dem vor mir stehenden Vogel nicht der Fall ist. Mit Bestimmtheit kann ich nun freilich nicht behaupten, daß die Abweichungen bedeutsam genug sind, um eine gute Art darauf zu begründen; jedenfalls aber ist der Vogel interessant genug, um ihn hier zu besprechen. Hoffentlich wird es Herrn Dühring gelingen, ihn zu züchten und dann, oder im ungünstigen Falle nach dem Tode dieses Pärchens, wird sich immerhin die Gelegenheit finden, ihn endgiltig festzustellen. Sollte er eine neue, bisher noch nicht beschriebne Art sein, so benenne ich ihn hiermit: Dührings rother Astrild (Aegintha Dühringi, *Rss.*) und überlasse das weitere der Zukunft.

Der Larvenastrild [Aegintha larvata].

(Nachtrag zu S. 91).

Unter den vielen seltenen Vögeln, welche ich in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Koburg-Gotha sah, befanden sich auch zwei Männchen und ein Weibchen des schönen Larvenamarant, leider freilich bereits im ausgestopften Zustande, doch hatten sich dieselben mehr oder minder lange Zeit dort lebend erhalten. Der Vogel ist so selten, daß ihn selbst das Berliner zoologische Museum nicht besitzt, und umsogrößer war daher meine Freude, ihn hier zum erstenmal vor mir zu erblicken. Zu meiner Ueberraschung aber bot ihn wenige Wochen später Herr L. van der Snickt in Brüssel in der „Gefiederten Welt" aus, Herr R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunstverlagshandlung in Berlin erhielt zwei Pärchen, und ich bin in der glücklichen Lage, nicht allein ebenfalls ein Par vor mir zu haben, sondern auch die bisher garnicht vorhandne Beschreibung des Weibchens geben zu können. Bemerkt sei zunächst nur noch, daß er im Wesen viel weniger dem kleinen rothen, als dem rothschwänzigen Astrild ähnelt. Das eigenthümliche Schwanzwippen des erstern, auf und nieder, hat er nicht; er thut es vielmehr wie der letztre seitwärts. Auch er gehört nach L. van der Snickt zu den weichlichsten Astrilde. Das prachtvolle Männchen in meinem Besitz ist am Ober- und Hinterkopf schwärzlichgrau; Wangen, Augengegend, Zügel und Kehle schwarz; Nacken und Rücken röthlichgrau (jede Feder an der untern Hälfte und der ganzen Innenseite rein aschgrau, an der obern Hälfte der Außenseite schön dunkel weinroth); Schwingen aschgrau, die letzten mit schwachröthlichem Außensaum; große Flügeldecken aschgrau, breit roth gesäumt; Schwanzfedern schwarz, mit dunkelweinrother Außenfahne, beiderseitig die zwei letzten Federn ganz roth; Brust und Bauch schön weinroth, an beiden Brustseiten weiße, fein schwärzlich gerandete Pünktchen; Unterbauch, Bürzel,

*) Herr Maler Paul Meyerheim gab mir die Farbenunterschiede freundlichst in folgender Weise an: Der dunkelrothe Astrild ist purpurn, eigentlich van Dyck-roth; das Männchen dieser Art oder Varietät Caput mortuum-roth, das Weibchen ocker- (gebrannt) gelbbraun.

untere Schwanzdecken rauchschwarz; untere Schwanzseite schwarzgrau. Oberschnabel schwarzblau, Unterschnabel heller, röthlichsilberblau; Auge schön rothbraun, von schmalem blauen Rand umgeben; Füße schwach röthlichblaugrau. — Das Weibchen ist am Oberkopf bis zum Nacken reinaschgrau mit schwachbläulichem Schein; Kopfseiten und Oberkehle mattgelblichaschgrau; Nacken und ganzer Rücken zart röthlichgrau (wie beim Männchen jede Feder aschgrau und nur an der obern Hälfte der Außenseite roth); Schwingen aschgrau, breit fahlgrau außengesäumt, die letzten mit breiten gelblichweißen Innensäumen; große Flügeldecken grau, röthlich überhauchte Schwanzfedern dunkelgrau, mit breiten rothen Außensäumen, die beiden mittleren ganz roth; Brust und ganze übrige Unterseite hell weinroth, nur wie überhaucht (jede Feder isabellgrau, nur an der Außenseite der obern Hälfte zart roth; an beiden Brustseiten ebenfalls die weißen Pünktchen); untere Schwanzdecken fahlröthlich; untere Schwanz- und Flügelseite aschgrau; Schnabel schwärzlichblau, Unterschnabel am Grunde heller, röthlich; Auge braun, von einem blauen Rande umgeben; Füße bläulichgrau.

Aegintha larvata: pileo occipiteque fuliginosis; genis, regione ophthalmica, loris gulaque nigris; cervice dorsoque rubente cinereis (dimidio inferiore pogonioque interno cujusque plumae cinereis, dimidio pogonii exteri intense vinaceo); remigibus cinereis, ultimis exterius rubente sublimbatis; tectricibus al. majoribus cinereis; late rubro-limbatis; pogonio rectricum nigrarum extero obscure vinaceo, ultimis ambabus utrinque totis rubris; pectore, abdomineque laete vinaceis; maculis pleurarum albis, nigrescente submarginatis; crisso, uropygio et infracaudalibus fuliginosis; cauda subtus nigro-cinerea; maxilla nigro-coerulea, mandibula dilutiore, rubente subcaesia; margine anguste coeruleo iridi castaneae circumdato; pedibus rubiginoso-caesiis. — ♀ pileo occipiteque pure cinereis, subcoeruleomicantibus; capitis lateribus gulaque superiore livide canis; cervice dorsoque toto rubicunde canis (dimidio pogonii tantum extero plumae cujusque basali aeque ac in mare rubro); remigibus cinereis, exterius livide lateque limbatis, ultimis interius flavide albo-limbatis; tectricibus al. majoribus canis, rubente afflatis; rectricibus cinereis, exterius late rubro-limbatis, ambabus intermediis totis rubris; pectore et gastraeo reliquo subvinaceis (dimidio pogonii externi plumae cujusque gilvae basali rubro; punctulis pleurae utriusque etiam albis); infracaudalibus livide rubentibus; latere alarum caudaeque inferiore canis; rostro e nigro coeruleo, basi mandibulae dilutiore; iride fusca, coeruleo-circumcincta; pedibus plumbeis.

Länge $11{,}8^{cm.}$; Flügel $4{,}8^{cm.}$; Schwanz 3,9 bis $4{,}4^{cm.}$

Der weinrothe Astrild [Aegintha vinácea], welcher S. 92 erwähnt ist, befindet sich in dem Verzeichniß der Vogelsammlung des Prinzen von Koburg-Gotha, und in den Anmerkungen von der Hand des Prinzen selber, welche ich neben jenem erhielt, ist folgendes gesagt: „er ist wol der reizendste aller Astrilde; im Benehmen gleicht er sehr dem Schönbürzel. Ich erhielt drei Exemplare von Monsieur Geoffroy de Saint Hilaire, dem Direktor des Jardin d'Acclimatation in Paris, die einzigen, welche er hatte, als Estrelda margaritata. Leider starben sie im Dezember v. J. Einer derselben befindet sich im Wiener Naturalienkabinet, wo die Art bis dahin noch nicht vorhanden war." In dieser Bemerkung des Prinzen sind die bei der vorigen Art erwähnten drei Exemplare gemeint, denn nach meiner Ueberzeugung fallen der Larvenastrild und der weinrothe Astrild als übereinstimmend zusammen. Die oben beschriebenen vor mir befindlichen Vögel sind einerseits sicherlich dieselben, welche der Prinz besessen und andrerseits weichen sie von der Beschreibung, welche Heuglin vom Larvenastrild gegeben, durchaus nicht ab. Der graue oder bräunlichgraue Oberkopf und die mehr oder minder wein- bis purpurweinrothe Färbung können unmöglich ein stichhaltiges Unterscheidungszeichen sein. Die Größe dürfte nahezu übereinstimmen, denn sie beträgt Länge $11{,}3^{cm.}$; Flügel $4{,}8^{cm.}$; Schwanz $4{,}4^{cm.}$ Hoffentlich ergibt weitere Forschung demnächst mit Sicherheit, ob meine Ansicht richtig ist oder auf Irrthum beruht.

Der granatrothe Astrild [Aegintha granátina]. (Ergänzung zu S. 100). Zu Bechstein's Zeit war diese Art bereits lebend eingeführt, doch mit den älteren Ornithologen irrt auch der Genannte, indem er sagt: „Dieser schöne Vogel ist in Brasilien zuhause." Dann aber fügt er hinzu, daß er nach Europa als Stubenvogel gebracht werde, aber sehr theuer sei, denn das Stück koste 4 bis 6 Louisd'or. „Er ist in der Gestalt seines Schnabels dem Stiglitz ähnlich und nimmt auch mit dessen Nahrungsmitteln vorlieb. Seine Bewegungen sind lebhaft und sein Gesang ist ungemein angenehm." In diesem überschwenglichen Lobe schießt der alte Schriftsteller freilich weit über das Ziel hinaus, denn der Granatfink gleicht inhinsicht des Gesangs doch nur allen übrigen Astrilde. Herr Dr. W. Jantzen in Hamburg schreibt mir sodann folgendes: In Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" las ich die Beschreibung des Granatfink und erinnerte mich, ein Pärchen dieser Vögel besessen zu haben. Als ich im Winter 1869/70 zur Herstellung meiner Gesundheit auf Madeira weilte, pflegte ich oft an Bord der vom Kap und von Westafrika ankommenden Schiffe zu gehen, um die reichen Vogelschätze zu betrachten welche sie regelmäßig mitbrachten und aus denen ich dann und wann einen Vogel für billigen Preis kaufte. So erstand ich auch ein Par der mir damals unbekannten Granatfinken und erhielt sie längere Zeit hindurch im Käfige. Sie zeigten sich als ebenso angenehme, ruhige, wie farbenprächtige Vögel. Bestimmt kann ich versichern, daß ich unter den Tausenden von Vögeln, die ich damals auf den Dampfern sah, nur dies einzige Pärchen gefunden habe. Seine Füße sind übrigens schwarz und nicht, wie in manchen Naturgeschichten und auch in Ihrem Werke angegeben, fleischfarben." Von der Richtigkeit dieser letztern Bemerkung habe ich mich an den vor mir stehenden, leider bereits ausgestopften Exemplaren allerdings überzeugt. Herr Aug. F. Wiener in London erließ zu Anfang d. J. 1877 in der „Gefiederten Welt" eine Aufforderung an die Liebhaber der Prachtfinken, daß man eine Subskription veranstalten möge, um einen Preis von 200 Mark als Prämie für den zusammenzubringen, welcher 10 Par Granatfinken einführen, bzl. in den Handel bringen werde. Leider ist dieselbe bis jetzt noch nicht ermöglicht worden. Dagegen hatten auf der „Aegintha"-Ausstellung d. J. 1877 in Berlin Fräulein Ch. Hagenbeck ein Par und Herr H. Möller drei Männchen Granataftrilde aufzuweisen und beide erhielten für dieselben einen ersten Preis. Auch in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Koburg-Gotha befindet sich diese Art. Bechstein nennt ihn brasilischer Fink, Granatvogel und rothschnäbliger Distelfink.

Der Buntastrild [Aegintha melba]. (Ergänzung zu S. 102). Bechstein nennt ihn grüner Stiglitz (nach dem Chardonneret vert Buffon's und dem Green Goldfinch Latham's). Wie jene läßt auch er ihn aus Brasilien herstammen und sagt: „das Männchen singt lieblich und ergötzt durch seine schöne Farbe. Man steckt es in ein Vogelbauer und gibt ihm Kanarien- und Rübsamen, wobei es sich viele Jahre wohlbefindet." In den letzteren Jahren wurde er mehrfach eingeführt. So befand er sich in den Sammlungen des Prinzen Ferdinand von Koburg-Gotha und des Herrn Aug. F. Wiener in London. Herr F. H. Dühring in Hamburg erhielt ein Par durch einen Freund von der Küste von Benguela; Herr Dr. Franken hatte ein Männchen auf der „Aegintha"-Ausstellung i. J. 1876 und Fräulein Chr. Hagenbeck ein Pärchen auf derselben i. J. 1877. Somit läßt sich erwarten, daß die Art hinfort immer zahlreicher in den Vogelstuben erscheinen werde.

Wiener's Astrild [Aegintha Wieneri].

Herr Aug. F. Wiener in London schrieb mir folgendes: „Ich brachte kürzlich viele Stunden im britischen Museum zu, indem ich sämmtliche Vogelbälge der Prachtfinkenarten, welche in den zahlreichen Schubläden noch unaufgestellt ruhen, durchging, ohne den betreffenden oder auch nur einen ähnlichen Vogel zu finden. Schließlich brachte ich die lebenden Vögel selber dorthin, um sie zur genauen Untersuchung vor Augen zu haben — und als Ergebniß zeigt sich, daß mir als Liebhaber der Zufall vier Köpfe einer Art zugeführt hat, von welcher die Wissenschaft bis jetzt noch nichts weiß. Mir wurden die Vögel im Geschäftslokal zum Kauf an-

geboten und ich konnte nichts näheres über sie erfahren. Für den Todesfall mußte ich die Bälge der Verwaltung des britischen Museum versprechen." Als ich dann ein von Frau Wiener gemaltes Aquarellbild des Vogels erhielt, legte ich der Art den obigen Namen bei, und Herr Dr. Otto Finsch, dem ich späterhin ein von Herrn W. gesandtes Exemplar vorlegte, gab die erste wissenschaftliche Beschreibung:

„Gesicht, Stirn, einschließlich Vorderkopf, Backen bis Ohrgegend, Kinn und Oberkehle scharlachroth, Grund der Federn olivenbräunlich durchscheinend; Oberkopf, Halsseiten und Kehle olivenbräunlich mit olivengelbem Anfluge; Außensäume der braunschwarzen, innen heller gerandeten Schwingen orangezinnober, wie die Außensäume der Armdecken; Bürzel und die mittelsten Schwanzfedern tief scharlachroth, die übrigen braunschwarz mit rother Außenfahne; Unterseite auf düster olivengrünlichgelbem Grunde mit undeutlichen ockergelblichen schmalen Wellenlinien; Bauchmitte und After ockergelblich, untere Schwanzdecken ockerweißlich mit dunklem Randmittelfleck und Grunde; die einzelnen Federn der Unterseite weiß mit ein bis zwei düster olivenfarbenen hufeisenförmigen Binden und olivengelblicher Spitze, welche den Anflug der Unterseite verursacht; untere Flügeldecken weißlich, schwach orange angeflogen. Schnabel blutroth; Auge braun; Füße hellroth."

(„Diese zunächst mit dem Buntastrild [Aegintha — Pytelia — melba, *L.*] verwandte Art unterscheidet sich von letztrer durch die Verschiedenheit in der Querzeichnung der Unterseite, den ockergelblichen Anflug der Bauchmitte und des Hinterleibs, sowie hauptsächlich durch die orangezinnoberrothen Außensäume der Schwingen. Offenbar bezieht sich auf diese Art der bisher nicht mehr zur Untersuchung gelangte ‚Green Goldfinch' von Edwards, auf dessen Darstellung Linné's Fringilla melba theilweise mit beruht und nach der Gmelin jedenfalls seine Beschreibung entwarf. P. hypogrammica, *Shrp.*, unterscheidet sich durch den schwarzen Schnabel und die dunkelschiefergraue mit weißen Quervermiculationen gezeichnete Unterseite. Eine andre hier inbetracht kommende Art ist mir nicht bekannt").

Herr Wiener ist nun im Besitz von noch drei Köpfen dieser ganz neuen bis dahin nicht eingeführten und völlig unbekannten Art, welche eine wichtige Bereicherung der Wissenschaft Ornithologie bildet, umsomehr, da sie eine Erklärung zu den Beschreibungen und Abbildungen, die alte Schriftsteller gegeben, bietet.

Der Prinz von Koburg schrieb mir sodann folgendes: „Ueber diese Art bin ich noch immer nicht im klaren. Im zoologischen Museum hier befindet sich ein Weibchen desselben Vogels, welches Pytelia afra, *Gml.*, benannt ist und das vor Jahren in der kaiserlichen Menagerie lebend vorhanden war. Es ähnelt ganz dem in meinem Besitz befindlichen, welches ich Ihnen zeigte. Ebenfalls im Museum ist eine Pytelia hypogrammica, *Shrp.* ♀ vorhanden, welche mit meinem zweiten Exemplar, das ich für das Männchen ansah, große Aehnlichkeit hat. Somit scheinen P. afra, *Gml.* und P. Wieneri, *Fnsch.* übereinstimmend zu sein, was auch durch die Beschreibung der erstern Art in Reichenbach's „Singvögel" einigermaßen angedeutet ist. Mein Pärchen erhielt ich i. J. 1872 von Monsieur Geoffroy. Im Benehmen gleicht es ganz dem Auroraastrild. Das Weibchen legte mehrmals Eier, welche aber alle unbefruchtet waren. Merkwürdig ist es, daß mein angebliches Männchen keinen rothen Kopf und viel grauere Unterseite hatte und auch mehr fein gewellt war als P. hypogrammica. War es vielleicht auch ein Weibchen? Beide aber hatten die olivengelbe Oberseite und die orangebraunen Flügel." Herr Dr. Finsch hält die Art als selbständige aufrecht, indem er mir noch kürzlich mittheilte: „Meine Vermuthung, daß der Vogel unbedingt aus Afrika herstammen müsse, hat sich bestätigt; ich sah ihn in der neuesten Sammlung des Herrn Hildebrandt aus Afrika." Hoffentlich wird sie demnächst häufiger eingeführt und mein Werk kann dann auf den späteren Tafeln auch eine Abbildung bringen.

Nomenclatur: Aegintha Wieneri, *Rss.*; Pytelia (richtig Pitylia) Wieneri, *Fnsch.*

Wissenschaftliche Beschreibung: Durch die Freundlichkeit des Herrn Wiener selbst bin ich in der Lage, noch eine, die obige in etwas ergänzende Beschreibung geben zu können: Breiter

Stirnſtreif, breiter Augenbrauenſtreif und Streif von einer Backe übers Kinn zur andern karmoiſinroth; Oberkopf und Rücken dunkel olivengrünlichgrau; Flügel heller, gelblicholivengrün; Schwingen aſchgrau, breit gelbroth außengerandet, erſte einfarbig aſchgrau, blos mit hellem breiten Innenſaum; große und kleine Flügeldecken gelblicholivengrün mit breitem rothen Außenſaum; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzſeite dunkelgelbroth (jede Feder dunkelaſchgrau mit rother Außenfahne), die beiden äußerſten Schwanzfedern einfarbig roth; Kehle und Oberbruſt olivengrünlichgelbgrau, jede Feder fahlweiß marmorirt; Bruſt, Bruſt- und Bauchſeiten weiß, bräunlich und gelb marmorirt; Bauch gelbweiß; untere Schwanzdecken bräunlichweiß und braungrau gebändert; Schulterfedern rothgelb geſäumt, Achſel röthlichfahlweiß; untere Flügel- und Schwanzſeite aſchgrau. Schnabel roth, Ober- und Unterſchnabel am Grunde ſchwach bläulich; Auge braun; Füße hell hornfarben. Die Geſtalt gleicht der des Auroraaſtrild, doch iſt Wiener's Aſtrild gedrungener und auch ein wenig kleiner; der Schnabel iſt lang geſtreckt, der Schwanz kurz, gerundet.

Aegintha Wieneri: stria frontali et superciliari lata, striaque circumcirca mentum ad genas usque coccineis; pileo cerviceque olivaceo-fumidis; alis dilutioribus, subolivaceo-fumidis; remigibus cinereis, exterius late subfulvo-marginatis, primo unicolore, tantum interius late dilutiusque marginato; tectricibus al. majoribus et minoribus flavide olivaceo-viridibus, exterius late rubro-marginatis; tergo, uropygio et supracaudalibus fulvis (pogonio plumae cujusque cinereae extero rubro); rectricibus ambabus extimis unicoloribus rubris; pluma quaque gulae gutturisque olivaceo-gilvorum sordide albo-marmorata; pectore, pleuris et hypochondriis albis, subfusco flavoque marmoratis; abdomine flavide albo; infracaudalibus sordide albis, fumide fasciatis; scapularibus fulvo-limbatis; axilla rubente albida; latere alarum caudaeque inferiore cinereo, basi rostri rubri subcoerulea; iride fusca; pedibus dilute corneis.

Der Sonnenaſtrild [Aegintha Phäethon]. (Ergänzung zu S. 111). Die S. 113 ausgeſprochene Vorausſetzung, daß der Sonnenaſtrild unſchwer in der Gefangenſchaft niſten werde, hat ſich überraſchend bald bewahrheitet. Im Jahre 1876 erhielt ich durch einen Zufall endlich ein Weibchen und zwar nicht wie es mir bereits mehrfach vorgekommen, einen jungen Vogel, der ſich dann zum Männchen ausfärbte, ſondern ein älteres bereits vollſtändig niſtfähiges Weibchen. Da ich zu jener Zeit aber kein Männchen erlangen konnte, ſo überließ ich daſſelbe auf beſondern Wunſch Fräulein Chriſtiane Hagenbeck, welche ein Pärchen für Herrn F. Schmidt in Hamburg beſtimmt hatte. Dieſem letztern iſt nun eine glückliche Zucht gelungen und er ſchreibt über dieſelbe wie folgt: „Sie und alle Leſer werden gewiß meine Freude über einen ſolchen Erfolg theilen und ich will daher den Verlauf dieſer höchſt intereſſanten Brut ſchildern. Zu Anfang des Sommers brachte ich das Pärchen in ein großes Heckbauer, in welchem es bald niſtete; leider ſtarben jedoch im Alter von etwa acht Tagen die Jungen, wie ich vermuthe infolge der Fütterung mit naſſem Grünkraut. Um die Mitte des Monats Juli ließ ich die Sonnenaſtrilde in die Vogelſtube fliegen, wo ſie freilich die kleineren Aſtrilde in arger Weiſe tyranniſirten. Nach vierzehn Tagen ſchritten ſie aber ſchon zur zweiten Brut, bauten in einem offnen Käſtchen ihr Neſt aus Agavefaſern und Grashalmen mit langer Eingangsröhre und innen mit Federn ausgepolſtert. Die Brutdauer beträgt 11 bis 12 Tage und die Eier ſind reinweiß. Aus Furcht, zu ſtören, habe ich die Jungen in der erſten Entwicklung nicht beſehen, nur kann ich verſichern, daß ſie im Alter von 23 Tagen ausgeflogen ſind. Ich war gerade auf meinem Beobachtungspoſten, als ſie das Neſt verließen. Das alte Weibchen ſaß vor demſelben und lockte und heraus kamen ein, zwei, drei, vier, fünf reizende bewegliche Vögelchen, hurtig wie kleine Kubafinken. Das Gefieder iſt ſchmutzig hellbraun, die Bruſt heller; eine röthliche Färbung des Bürzels und der Deckfedern läßt die Art erkennen. Ein Junges iſt leider geſtorben, die anderen entwickelten ſich aber in erfreulicher Weiſe. Erwähnen will ich noch, daß die Alten wenigſtens 25 Mehlwürmer täglich verzehrt haben, welche ſie mir faſt aus der Hand holten. Ihr Neſt vertheidigten ſie muthvoll, indem ſie mich mit fächerartig ausgebreiteten Schwänzen

umkreiſten, ſobald ich mich zu ſehr näherte.“ Herr Schmidt ſandte mir im September das todte junge Vögelchen und daſſelbe ſteht im Berliner zoologiſchen Muſeum.

Jugendkleid: Kopf, Rücken, Wangen und Hals fahl erdbraun; Flügel graubraun, Schwingen dunkler ſchwärzlichbraun mit feinen fahlen Außenſäumen, die letzten und ebenſo die großen Flügeldecken fahl röthlich angehaucht; obere Schwanzdecken fahl röthlich; Schwanzfedern rothbraun; Kehle und Oberbruſt heller fahlbraun als der Kopf; ganze Unterſeite düſter bräunlichgelb; untere Flügeldecken fahl bräunlichgelb, Schwingen unterſeits aſchgrau mit breitem fahlen Innenſaum, untere Schwanzdecken fahlgelb, Unterſeite der Schwanzfedern fahl röthlichbraun; Schnabel glänzendſchwarz, Wachshaut weißlichgelb; Auge ſchwarz; Füße bräunlichhorngrau, Sohlen und Unterſeite der Knöchel hell gelblichhorngrau.

Juvenis: capite, genis, collo dorsoque livide umbrinis; gula guttureque pallidioribus; alis fumidis; remigibus nigrescente fuscis, exterius livide limbatis; remigibus ultimis et tectricibus al. majoribus rubicunde afflatis; supracaudalibus livide rubentibus; cauda rufa; gastraeo toto luride ochraceo; subalaribus livide ochraceis; latere inferiore remigum interius late livide limbatorum cinereo; infracaudalibus gilvis; latere rectricum inferiore livide badio; rostro nitide nigro; cera albide flava, iride nigra; pedibus e fusco corneis; plantis latereque malleolorum inferiore flavescentibus.

Der Ringelaſtrild [Aegintha Bichenovi]. (Ergänzung zu S. 119). Ein altes ſehr kräftiges und garnicht ſcheues Pärchen erbaute in meiner Vogelſtube mehrere Neſter mit großem Eifer und zwar in einer von der anderer Pärchen durchaus verſchiednen Weiſe. Als Bauſtoff nahmen ſie nur Agaveſaſern, wenige Baſtſtreifen, Fäden und Riſpen von Rohr. Das Neſt bildet einen Beutel in Geſtalt einer Börſe mit langgeſtreckter und dann plötzlich nach unten ausmündender Flugröhre. Es iſt von ähnlichem Gefüge wie das Gewebe der oſtindiſchen Bayaweber und weicht alſo von den Neſtern aller übrigen Prachtfinken ganz entſchieden ab. Solcher Neſter ſtanden fünf oder ſechs nebeneinander, doch nur das eine war vollendet. Im übrigen glich die Brut völlig der S. 121 geſchilderten.

Der gemalte Aſtrild [Aegintha picta]. (Ergänzung zu S. 122). Im März 1877 ſandte mir Herr Wiener aus London ein todtes Männchen, welches ich dem zoologiſchen Muſeum von Berlin übermachte. Der Kuſtos, Herr Dr. Reichenow ſchrieb mir: „Es iſt ein junges Männchen. Wir haben erſt ein Exemplar, etwas älter, aber noch nicht ausgefärbt; welches wir auch Ihrer Güte verdanken (ebenfalls von Herrn Wiener). Schade, daß das vorliegende durch die Verſendung mit der Poſt ſo ſehr mitgenommen iſt. Vielleicht erhalten Sie wieder einmal ein Exemplar und bedenken dann unſer Muſeum.“ In irgend einer andern Sammlung außer der des Herrn Wiener dürfte ſich der Vogel lebend nicht befinden.

Die Rothkopfamandine [Spermestes erythrocéphala]. (Ergänzung zu S. 133). Die Art an und für ſich iſt bis jetzt meines wiſſens nicht weiter eingeführt, und da die in der Vogelſtube des Herrn Graf Rödern wie in der meinigen befindlichen Pärchen geſtorben, bevor ſie geniſtet haben, ſo läßt ſich nichts näheres berichten. Die S. 134 erwähnten Baſtarde niſteten niemals unter ſich, ſondern nur mit Bandfinken gepart weiter. Es zeigte ſich aber die ſonderbare Erſcheinung, daß die dann erzeugten Jungen ſchon in der nächſten Generation von den gewöhnlichen Bandfinken nicht mehr zu unterſcheiden waren; auch längere Züchtung ergab niemals Rückſchläge.

Die braune Reisamandine [Spermestes fuscata]. (Ergänzung zu S. 142). Auf der Ausſtellung des Ornithologiſchen Vereins in Wien im Jahre 1878 hatte der Prinz von Koburg auch einen einzelnen Vogel, welchen man im erſten Augenblick wirklich für jene verloren gegangene, gleichſam myſtiſche Art, den Padda brun Vieillot's, hätte halten können. Nach meiner Ueberzeugung war es jedoch ein Baſtard von dem gemeinen Reisvogel (Spermestes oryzivora, *L.*) und dem Schilffink (S. castanóthorax, *Gld.*), alſo ſtaunenswertherweiſe von einer oſtindiſchen und einer auſtraliſchen Art und zwar wird der Schilffink jedenfalls das Männchen geweſen ſein.

Die größte Elsteramandine [Spermestes fringillína]. Seitdem ich die Schilderung S. 143 geschrieben, ist diese Art so häufig eingeführt, daß sie keineswegs mehr zu den selteneren Vögeln des Handels gehört, und obwol im Jahre 1868 noch nicht einmal im Berliner zoologischen Museum vorhanden, geschweige denn in den Vogelstuben, ist sie gegenwärtig bereits in unzähligen Fällen gezüchtet. Bedürfte es überhaupt noch eines Beweises, wohin diese Art im System zu stellen ist, so könnte derselbe in folgendem geliefert sein. Nachdem ich die Riesenelsterchen in großer Anzahl gezüchtet, gab ich die ganze Gesellschaft ab, um Platz für andere Ankömmlinge zu gewinnen. Nur ein altes Heckweibchen blieb zurück, weil ihm einst von einem Papagei ein Flügel zerbissen und schief geheilt war, sodaß es zwar fliegen konnte, aber nicht verkäuflich erschien. Zu demselben setzte ich ein Männchen kleiner Elsterchen (Spermestes cucullata, *Swns.*), mit welchem es sich sogleich parte und zu nisten begann, ohne daß ich im Ernst an einen Erfolg glaubte, weil die beiden Vögel inhinsicht der Größe doch zu verschieden sind. Trotzdem wurden vier Junge ausgebrütet und glücklich flügge. Das Jugendkleid gleicht dem des Riesenelsterchens durchaus und die jungen Vögel waren beim Nestverlassen bereits bemerkbar größer als das alte Männchen. Nach der Verfärbung zeigten sie eine interessante Mischung der charakteristischen Merkmale beider Arten. Einen der Mischlinge gab ich an das zoologische Museum von Berlin.

Die japanesischen Mövchen [Spermestes acuticauda, var.]. (Ergänzung zu S. 154). Bisher ist es noch immer nicht mit voller Sicherheit festgestellt worden, ob diese wunderlichen Kulturvögel wirklich von dem spitzschwänzigen Bronzemännchen (Spermestes acuticauda, *Hdgs.* oder von dem gestreiften B. (S. striata, *L.*) herstammen. Inzwischen züchtet man sie mit immer größeren Erfolgen und auch Bastarde von den verschiedensten Prachtfinken werden mit ihnen gezogen. Vorzugsweise interessant erscheint der Erfolg des Herrn E. Hald in Hamburg, welcher Mischlinge vom Mövchen und der weißköpfigen Nonne (S. Maja, *L.*) züchtete; ferner die des Herrn Buchdruckereidirektor W. Elsner in Berlin, in Mischlingen vom Mövchen und Silberfasänchen (S. cantans, *L.*) bestehend u. s. w. Dergleichen Mischlingszucht ist bis jetzt jedoch reine Spielerei geblieben, einerseits weil die Parungen, bzl. Ergebnisse fast regelmäßig nur vom Zufall abhängen und andrerseits weil es bisher noch nicht gelungen ist, sachgemäß weiter zu züchten.

Die weißköpfige Nonnen-Amandine [Spermestes Maja]. (Zusatz zu S. 163). Während es bis jetzt noch nicht ermöglicht worden, die Nonnenvögel überhaupt zu züchten, so hat Herr Fabrikdirektor Linke in Larisch einen geradezu ans wunderbare grenzenden Erfolg erreicht, indem er Mischlinge von der weißköpfigen Nonne und dem Schilffink (Spermestes castanóthorax, *Gld.*) in mehreren Bruten erzielte, also von einer Art, die noch garnicht in der Gefangenschaft genistet hatte, während die andre in der letztern Zeit freilich in einzelnen, jedoch immer nur sehr seltenen Fällen gezüchtet worden.

Die Zebra-Amandine [Spermestes castanótis]. (Bemerkung zu S. 172). Eine der interessantesten aller Mischlingszuchten hat Herr Graf Yorck von Wartenburg erreicht, indem er Mischlinge vom Zebrafink und Diamantfink (Spermestes guttata, *Shw.*) in der Vogelstube zog. Ein Männchen derselben in meinem Besitz zeigt die schönen charakteristischen Kennzeichen beider Arten in einer Vereinigung, welche es als einen bewundernswürdig schönen Vogel erscheinen läßt.

Die Feuerschwanz-Amandine [Spermestes nitida] ist seither von Abrahams in London und H. Möller in Hamburg eingeführt worden. Ich erhielt ein Pärchen und sah ein solches in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha. Die Vögel waren im Gegensatz zu dem S. 181 geschilderten überaus kräftig und munter, trotzdem sind die des Prinzen laut brieflicher Nachricht „in räthselhafter Weise" eingegangen: ebenso starben die meinigen einer nach dem andern plötzlich, ohne daß ich eine Veranlassung ermitteln konnte.

Die lauchgrüne Papagei-Amandine [Spermestes prásina]. (Zusatz zu S. 190). In letztrer Zeit (1878) ist sie mehrmals und zwar von Herrn Abrahams in London sogar in 40 Pärchen eingeführt worden. Ein Pärchen, welches ich im Sommer 1877 in der Vogelstube hielt, hatte

während meiner Sommerreise genistet, dann aber war das Männchen eingegangen. Als die Vogelstube im Herbst ausgeräumt wurde, fand ich das Nest mit den nahezu flüggen, vertrockneten Jungen, an deren zarter Befiederung, namentlich an Flügel und Schwanz, sich die Art schon mit Sicherheit feststellen ließ.

Die eigentliche Papagei-Amandine [Spermestes psittácea].

(Nachtrag zu S. 192).

„Während ich im Mai 1877 von London abwesend war", schrieb mir Herr Wiener, „hatte Jamrach neueingeführte grüne ‚Bartvögel' angezeigt, und als ich im Juni zurückkam, fand ich noch ein Exemplar übrig, welches, weil es kahl war und blos ein Auge hatte, unverkauft geblieben. Diesen Vogel erstand ich sofort mit der Bedingung, daß mir der Käufer der anderen zwei tadellosen genannt werde. Letztere hatten schon mehrfach den Besitzer gewechselt und waren dabei nicht billiger geworden, aber ich fand sie heraus und kaufte sie anfangs Juni; so kam ich in den Besitz von drei eigentlichen Papageiamandinen. Eine gründliche Untersuchung der Vogelbälge im britischen Museum, welche nicht aufgestellt sind, führte mir endlich zwei Exemplare in die Hand, deren Vergleichung mit meinen drei lebenden alle Zweifel löste. Die ersteren sind nach der Untersuchung als Männchen und Weibchen bezeichnet, doch erscheinen sie einander ungemein ähnlich. Das Scharlachroth des Kopfes und der Brust ist bei dem einen Exemplar ein wenig lebhafter und ausgedehnter, aber der Unterschied zeigt sich so gering, daß er vielleicht eher auf Verschiedenheit im Alter oder Zufall, als auf Geschlechtsmerkmalen beruhen dürfte. Auch bei meinen lebenden Vögeln kann ich die Geschlechter nicht unterscheiden. Die Beschreibung in Ihrem Werke ist richtig, nur ist das Auge schwarz und die Füße sind schwärzlichgraubraun. Meine drei Papageiamandinen bewohnen eine Abtheilung einer großen Flugvolière mit zwei Par Wiener's Astrilde und einem Par Ringelastrilde gemeinschaftlich. Sie fühlten sich bald heimisch, waren sehr munter und verträglich, behender, lebhafter und anmuthiger als die lauchgrünen Papagei-Amandinen. Während ich wieder verreisen mußte und bis zu Anfang des August fort war, wurde ich durch die Nachricht erfreut, daß meine grün und rothen Finken, wie wir sie damals nannten, ein Nest gebaut und vier Eier gelegt hatten; die zweite Nachricht sagte, die Eier seien ausgebrütet und eine dritte, es seien vier Junge ausgeflogen. Bei meiner Rückkehr fand ich den kleinen Schwarm von vier sehr kräftigen, schön entwickelten jungen Papageiamandinen neben den drei Alten, sowie auch das Nest vor. Letztres war in ein hochhängendes Harzerbauerchen mit Flugloch an der Seite gebaut. Das Bauerchen hatten die Vögel mit Aloëfasern ganz gefüllt und in einer tiefen überwölbten Mulde waren die Jungen herangewachsen. Inzwischen war von den Alten schon ein neues Nest aus Aloëfasern frei auf das Harzerbauerchen hergestellt und abermals waren vier Eier gelegt. Dasselbe schien mir jedoch nicht fest genug gebaut, die noch nicht ganz selbständigen Jungen setzten sich manchmal zu den brütenden Alten mit ins neue Nest hinein oder darauf, wodurch es noch loser wurde. Ich hielt es für rathsam, dasselbe zu zerstören, einerseits damit die Alten ihre Jungen solange als möglich füttern sollten und andrerseits um sie zu veranlassen, ein neues, Aussicht auf Erfolg versprechendes zu errichten. Von den vier weißen und ziemlich großen Eiern waren drei befruchtet und eins untauglich. An die Stelle des ersten Nestes wurde nun ein frisches leeres Harzerbauerchen gehängt, und alsbald bauten die Vögel ein drittes in dasselbe genau wie jenes. Wie viele Eier sie legten, konnte ich mit Bestimmtheit nicht ermitteln, weil die Nestmulde zu tief war, um sie übersehen zu können. Bis das Brüten begann, waren die vier Jungen ganz selbständig geworden und das Gefieder an Kopf und Brust zeigte Sprossen kleiner scharlachrother Federn, der obere Schnabel war bereits schwarz. Ich ließ nun die Jungen einfangen und von den Alten trennen, wobei mir leider das Unglück geschah, daß der Käfig von einem kleinen, auf Mäuse abgerichteten Rattenfänger (Terrier), der noch niemals einen Vogel berührt oder auch nur belästigt hatte, überfallen und drei der unersetzlichen Jungen todtgebissen wurden. Das noch lebende vierte verfärbt sich ganz schön, es ist jetzt etwa drei Monate

alt und hat an Kopf, Hals und Brust scharlachrothe Fleckchen, welche von Woche zu Woche mehr hervortreten. Wie lange die Alten auf dem letzten Gelege brüteten, kann ich nicht bestimmt sagen, es schien mir aber länger als vierzehn Tage. Am 2. September bemerkte ich Junge, welche ein oder zwei Tage alt sein mochten. Am 22. September flogen drei solche recht schön entwickelte aus dem Neste. Eine merkwürdige Erscheinung an den jungen Vögeln sind zwei kleine Bläschen an der Schnabelwurzel, das eine am Ober-, das andre am Unterkiefer, erstres etwas weiter zurück, sodaß beide, wenn der Schnabel geschlossen ist, vor einander stehen. Diese Bläschen sind von der Größe eines sehr kleinen Stecknadelkopfs und glänzen wie die schönsten Perlen, verlieren sich aber bald nach dem Ausfliegen. — Die Vögel erhalten Kanariensamen, Hirse (französische, geschälte und Kolbenhirse), Grünkraut, Eierbrot und Eikonserve. Mehlwürmer habe ich ganz vermieden. Falls es den Alten belieben sollte, im Winter weiter zu nisten, gedenke ich sie darin nicht zu stören. Seit ich am 22. Dezember vorigen Jahres eine Brut Safranfinken ausfliegen sah, welche glücklich groß wurde, bin ich überzeugt davon, daß es möglich ist, mit Hülfe von Petroleumlampen auch im Winter Vögel zu züchten und großzuziehen.

Das von der ersten Brut übrig gebliebne Junge sandte Herr Wiener im noch unausgefärbten Zustande zur „Aegintha"-Ausstellung 1877 nach Berlin und ich behielt es dann als werthvolles Geschenk in meiner Vogelstube, wo es sich prächtig ausfärbte. Hoffentlich wird die weitere Zucht ihm demnächst noch reiche Erfolge bringen. Der Prinz von Koburg theilte mir mit, daß er die eigentliche Papageiamandine in einem Exemplar bereits im Jahre 1873 bei Monsieur Geoffroy de St. Hilaire in Paris gesehen, doch sei der Vogel dort unverkäuflich gewesen.

Das Jugendkleid ist matt grünlichbraun ohne rothe Färbung an Kopf und Brust, nur an der Schnabelwurzel zeigt sich mattes Roth. Schnabel gelb; Füße hell gelbgrau. — Das Nest besteht gleich denen naheverwandter Prachtfinken in einer geräumigen Kugel aus sehr weichen Aloëfasern in der Größe eines Kinderkopfs, mit einem weiten Schlupfloch. Mehr zum Schmuck als etwa zur Auspolsterung sind einige Papageienfedern eingewebt.

Juvenis: sordide virente umbrina, colore capitis pectorisque rubro carens; basi rostri flavi sola rubente; pedibus gilvo-canis.

Beschreibung des Eies: Schneeweiß, ohne Glanz; Länge 18 mm, Breite 13 mm (Nehrkorn).

Ovum niveum, opacum.

Die rothbrüstige und die geschuppte Samenknacker-Amandine [Spermestes haemátina et S. Luchsi] wurden im Frühjahr 1878 durch den Händler Herrn Fockelmann in Hamburg in größerer Anzahl eingeführt und dann von Fräulein Hagenbeck in den Handel gebracht. Leider waren es nur Männchen und Herr Fockelmann, welcher angibt, daß die Weibchen auf dem Rücken kaffeebraun und der Brust grau seien, sagt: „dieselben kommen sehr selten vor und werden wahrscheinlich in der Heimat von den Fängern aus Unkenntniß getödtet." (Zu S. 193).

Der Rodriguez-Webervogel [Ploceus flávicans].

(Ergänzung zu S. 254).

Nachdem ich diesen Weber nur beiläufig erwähnt, bin ich jetzt veranlaßt, eine ausführliche Beschreibung geben zu müssen, da er seitdem im Besitz der Herren Pfarrer Winckler in Fischenthal bei Zürich, des Prinzen Ferdinand von Koburg-Gotha und im zoologischen Garten von Berlin sich befunden. Herr Dr. Stölker machte mich zuerst darauf aufmerksam, daß diese Art bereits eingeführt sei und Herr Winckler bestätigte seine Angabe. Im zoologischen Garten konnte ich das vorhandene einzelne Männchen beobachten, indem es mit einem Madagaskarweberweibchen nistete. Es gleicht in seinem ganzen Wesen durchaus der letztern Art. Der Prinz von Koburg schreibt: „Es ist möglich, daß der Vogel in meinem Besitz eine gelbe Varietät des Madagaskarwebers

war, doch verfärbte er sich regelmäßig in ein dunkel chromgelbes Prachtkleid und auch sein Winterkleid war mehr gelbbraun. Er wurde von großen Webervögeln getödtet."

Wissenschaftliche Beschreibung: Oberhalb düster olivengrünlichbraun; Stirn und ein breiter Streif rings um den Schnabel lebhaft röthlichgelb; Oberkopf, Kehle und Oberbrust hochgelb; an Rücken und Schultern jede Feder mit breitem dunkelbraunen Mittelfleck; Schwingen und Schwanzfedern olivengrünlichbraun, schmal fahl außengesäumt, über den Flügel zwei breite weißliche Querbinden; Brust, Bauch und Hinterleib gelblichweiß, Brustseiten fahler gelblich; Bauchseiten und untere Schwanzdecken fahl olivengrünlichbraun; Schnabel glänzendschwarz; Auge braun, fein schwarz umrandet; Füße röthlichbraun. — Das Weibchen (welches ich nicht gesehen habe) ist oberhalb düster olivengrünlichgraubraun und dunkler schaftfleckig; Augenbrauenstreif grüngelblichgrau; über den Flügel ebenfalls zwei breite fahlweiße Binden; ganze Unterseite olivengrünlichgelbgrau, Brust- und Bauchseiten bräunlich; Schnabel röthlichbraun, Unterschnabel heller. Auge dunkelbraun; Füße fahlröthlichbraun.

Ploceus flavicans: supra olivaceo-virente fuscus, fronte striaque lata circa rostrum laete fulvis; pileo, gula guttureque luteis; pluma quaque dorsi et scapularum maculam mediam latam ostendente fuscam; remigibus et rectricibus olivaceo-virente umbrinis, exterius livide sublimbatis; fasciis duabus trans alam albidis; pectore abdomine crissoque flavide albis; pleuris livide flavidis; hypochondriis et infracaudalibus olivaceo-virescente umbrinis; rostro nitide nigro; iride fusca, subnigro-circumcincta, pedibus castaneis. ♀ supra olivaceo-virente fumida, obscurius maculata; stria superciliari viride gilva; fasciis duabus latis trans alam albidis; subtus olivaceo-virescens, pleuris et hypochondriis subfuscis; rostro badio, mandibula pallidiore; iride fusca; pedibus livide badiis.

Ruß' rothschnäbliger Webervogel [Ploceus Russi].

Tafel VIII. Vogel 40.

Seit Jahren bereits war in den Vogelhandlungen ein Webervogel vorhanden, welcher mit dem S. 255 geschilderten rothschnäbligen Webervogel als übereinstimmend zusammengeworfen und niemals beschrieben worden. Als ich die letztre Art, also den allbekannten Blutschnabelweber schilderte, wagte ich noch nicht zu behaupten, daß der unter Nr. 40 abgebildete Vogel eine selbständige Art sei. Zur vollen Gewißheit, daß der in meinem Besitz befindliche Vogel kein einzelner zufällig abweichender Blutschnabelweber sei, gelangte ich dadurch, daß einerseits in den Vogelstuben der Herren Schriftsteller B. Dürigen, Buchdruckereidirektor W. Elsner, U. Sauter und der Frau Kommerzienrath Borsig gleiche Exemplare sich befanden und daß andrerseits solche auch in den Handlungen von Fräulein Hagenbeck, H. Möller und W. Mieth im Herbst 1877 in zahlreichen Köpfen vorhanden waren; auch in der Vogelstube des Prinzen von Koburg-Gotha sah ich ein Par. Ein Männchen, welches ich seit nahezu fünf Jahren besitze und das sich stets in gleicher Weise zum Prachtgefieder verfärbt, sandte ich an Herrn Dr. O. Finsch, welcher die erste wissenschaftliche Beschreibung gegeben: „Größe des gem. Blutschnabelwebers. Oberkopf, Nacken, Halsseiten, Brust und Bauch lebhaft rosapfirsichroth; Stirn, Kopfseiten bis zur Ohrgegend, Kinn und Oberkehle strohisabellgelb, kein Schwarz im Gesicht (um die gelben Wangen und überm Auge bis zum Nasenloch im höhern Alter ein feiner schwärzlicher Streif); Brust- und Bauchseiten hellbraun, untrer Hinterleib und untere Schwanzdecken gelblichweiß, erstrer rosa angehaucht; Rückenfärbung wie beim Blutschnabel, doch die Nacken- und Rückenfedern schwach rosenroth angehaucht. Schnabel blutroth; Auge braun mit schön rothem, feingeperlten Ring; Füße hellroth." Das Wbch. ist mit dem des gem. Blutschnabelwebers durchaus übereinstimmend und hat zur Brutzeit auch denselben wachsgelben Schnabel.

(„Diese durch die isabellgelbliche Färbung der Kopfseiten ausgezeichnete Art weiß ich mit keiner bekannten in Einklang zu bringen und muß dieselbe für neu halten. Sie unterscheidet sich von den Nächstverwandten, gem. Blutschnabelweber (Ploceus sanguinirostris, *L.*) und äthiopischen Blutschnabelweber (P. aethiopicus, *Sndvll.*) schon genügend durch den Mangel

des ſchwarzen Geſichts. Die Heimat iſt jedenfalls Afrika, doch wäre eine Sicherſtellung der Oertlichkeit ſehr zu wünſchen." Dr. O. Finſch). Die Vögel kommen mit den gem. Blutſchnäbeln zugleich in den Handel; Heimat, Freileben, Ernährung wie alles übrige werden daher wol übereinſtimmend ſein. Gegenwärtig bauen fünf Pärchen in meiner Vogelſtube eifrig ihre Neſter und hoffentlich wird es gelingen, ſie glücklich zu züchten.

Ruß' rothſchnäbliger Webervogel heißt auch gelbwangiger rothſchnäbliger Webervogel (Finſch), roſenrother Webervogel (Ruß) und Rußweber (bei den Händlern).

Nomenclatur: Ploceus Russi, *Fnsch.*

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Geſtalt und Größe des gem. Blutſchnabelwebers; breiter Stirnrand und Kehle rothgelb; Zügel und Wangen fahlröthlichgelb; Oberkopf, Nacken bis zum Hinterhals, Halsſeiten und Oberbruſt prächtig roſenroth; Oberrücken grünlichgrau, jede Feder zart roſenroth geſäumt; Rücken ſchwarzbraun, jede Feder breitfahl geſäumt; Schwingen und Schwanzfedern ſchwärzlichbraun mit ſchmalem röthlichgelben Außenſaum; Schulterrand hell röthlichgelb, Achſel fahlgelb; am Unterrücken tritt die ſchwärzliche Farbe der Federn immer mehr zurück, ſodaß dieſelben bräunlichfahl ſind mit verſchwimmenden dunklen Rippen; Bruſt- und Bauchſeiten bräunlichgelbroth; hinterer Unterleib roſenröthlichweiß: untere Schwanzdecken bräunlichweiß; untere Flügel- und Schwanzſeite rein aſchgrau; Schnabel glänzend blutroth; Auge braun, mit ſchön purpurrothem geperlten Rand umgeben; Füße orangeroth. — Männchen im Winterkleide und Weibchen: Stirn und Oberkopf aſchgrau, jede Feder fein heller geſäumt, nach hinten zu jede Feder iſabellbräunlich geſpitzt, Augenbrauenſtreif, Streif unterm Auge und Bartſtreif, wie die Kehle fahlweiß, oberhalb des Auges iſt der Streif roſenroth angehaucht (und dies dürfte ein ſicheres Unterſcheidungszeichen ſein). Wangengegend vom Auge zum Nacken und ebenſo ein kurzer Streif am Mundwinkel aſchgrau; Mantel, Ober- und Unterrücken iſabellfarben, jede Feder mit breitem ſchwarzen Mittelſtreif; große und kleine Flügeldecken ſchwarz, ſehr breit iſabellfarben geſäumt; Schwingen dunkelaſchgrau mit ſchmalen fahl röthlichgelben Außenſäumen, die erſte und zweite Schwinge faſt ohne dieſelben; Schulterrand ſchön hell orangegelb; Schwanzfedern ſchwärzlichaſchgrau mit feinen orangegelben Außenſäumen und ſchmalen fahlen Innenſäumen; Bruſt bräunlichweiß; Bauch iſabellweiß, Unterbauch reinweiß, untere Schwanzdecken iſabellfarben; untere Schwanz- und Flügelſeite aſchgrau; Körperſeiten dunkel iſabellgrau; Schnabel blutroth; Auge dunkelbraun; Füße fahlroth.

Ploceus Russi: statura et magnitudine Pl. sanguinirostris; margine frontali lato gulaque fulvis; loris genisque livide subfulvis; pileo, nucha usque ad cervicem, colli lateribus guttureque laetissime roseis; pluma auchenii quaque subroseo-limbata; plumis singulis interscapilii dorsique nigro-fuscorum livide lateque limbatis; remigibus et rectricibus fuliginosis, exterius fulvescente marginatis; campterio subfulvo; axilla gilva; tergo livide umbrino, obscurius substriato; pleuris et hypochondriis sordide fulvis; crisso subroseo-albo; infracaudalibus sordide albis; latere alarum caudaeque inferiore cinereo; rostro nitide sanguineo; cingulo purpureo-punctulato iridi fuscae circumdato; pedibus aurantio-rubris. ♂ vest. hiem. et ♀: pluma frontis pileique cinereorum quaque dilutius sublimbata, post sordide ochraceo-terminata; striis superciliari, hypophthalmica et mystacali necnon gula albis, stria superciliari roseo-lavata (signo marem a femella verosimiliter discernente); genis ab oculo ad nucham usque, striaque brevi capistri cinereis; interscapilio, dorso tergoque isabellinis, nigro-vittatis; tectricibus al. majoribus et minoribus nigris, latissime isabellino-limbatis; remigibus obscure cinereis, exterius subfulvo-limbatis, primo secundoque fere unicoloribus; campterio laete aurantio; rectricibus fumidis exterius aurantio-, interius livide limbatis; pectore sordide albo; abdomine gilvo-albido; crisso pure albo; infracaudalibus isabellinis; latere alarum caudaeque inferiore cinereo; pleuris et hypochondriis gilvo-cinereis; rostro sanguineo; iride fusca; pedibus livide rubris.

Länge $11{,}8^{cm}$; Flügel $6{,}6^{cm}$; Schwanz $3{,}6^{cm}$.

Der Baya-Webervogel [Ploceus baya], **der Manyar-Webervogel** [P. manyar], **der Bengalen-Webervogel** [P. bengalensis] **und der gelbbrüstige Webervogel** [P. hypoxanthus]. Nachdem ich die S. 265 ff. geschilderten ostindischen Weber mehrere Jahre hindurch in der Vogelstube gehalten und mit großem Glück gezüchtet hatte, fing ich sie sämmtlich heraus und bin nun imstande, die Beschreibung auch durch Darstellung der Winterkleider und Färbung der Weibchen zu ergänzen: Der Bayaweber im Winterkleide (und Weibchen) ist am Oberkopf und der ganzen Oberseite bräunlichgelb mit schwacholivengrünlichen Ton, jede Feder mit breitem schwarzbraunen Schaftstreif; Augenbrauen- und Bartstreif hellgelb; Gesicht und Kehle gelbgrau; ganze Unterseite bräunlichgrauweiß; Oberbrust und Seiten breit schwarzbraun schaftstreifig; Schnabel gelb; Füße gelbgrau (alle nicht genannten Theile stimmen mit dem Sommerkleide überein). Nestkleid: Flaum sehr spärlich, eigentlich nur am Kopf und den Schultern bemerkbar und wie der ganze Körper fleischfarbenweißlich; die hervorsprießenden Flügelfedern und das kaum hervorbrechende Schwänzchen silbergrau; Schnabel blaßfleischfarben mit röthlicher Spitze, Unterschnabel beträchtlich länger als der obere, welcher letztere in den erstern gleichsam wie in ein Futteral paßt; Drüsen an beiden Schnabelseiten sehr groß, reinweiß; Füße weiß mit dunklen Nägeln (am 11. Juli 1877 aus dem Nest gefallen). — Der Manyarweber im Winterkleide (und Weibchen): Oberkopf dunkelbraun, breiter Augenbrauenstreif, Fleck an den Halsseiten und Kinn lebhaft gelb; Kopf- und Halsseiten schwärzlichbraun mit gelblichem Schein; Rücken und ganze Oberseite gelbbraun, jede Feder fahl gesäumt und dunkel schaftstreifig; Bauch und übrige Unterseite fahl bräunlichweiß; Schnabel gelblichbraun; Füße bräunlichgelb; alles übrige mit dem Prachtkleide übereinstimmend. — Der Bengalenweber im Winterkleide (und Weibchen): am Oberkopf olivengrünlichbraun; Augenbrauenstreif fahlgelblich; Wangen, Kinn und Oberkehle bräunlichgelb; ganze Oberseite olivengrünlichbraun, jede Feder fahl gesäumt; Brust und übrige ganze Unterseite bräunlichweiß, beim Männchen an den Brustseiten einige dunkle Schaftstreifen; Schnabel immer grauweiß. — Der gelbbrüstige Webervogel im Winterkleide (und Weibchen): Oberkopf und ganze Oberseite dunkelbraun, jede Feder fahl gesäumt; Schwingen und Flügeldecken breit fahlbräunlich gesäumt; Kopfseiten, Kehle und Oberhals fahlbräunlichgelb; ganze Unterseite bräunlichweiß; Schnabel bräunlichgrau, Unterschnabel weißgrau. — Bemerkt sei noch, daß ich eine genaue Beschreibung der in der Vogelstube erbauten Nester nebst deren Abbildungen weiterhin in dem Theile dieses Werks bringen werde, welcher die Vogelpflege und Zucht behandelt. — Ploceus baya: ♂ vest. hiem. et ♀: pileo totoque notaeo ochraceis, olivaceo-virente lavatis, scapo plumae cujusque late fuliginoso; superciliis striaque mystacali sulfureis; facie gulaque flavocinereis; gastraeo toto sordide albo; gutture, pleuris et hypochondriis nigro-vittatis; rostro flavo; pedibus flavo-cinereis (partibus omissis cum vestimento aestivali convenientibus). Neonatus: lanugine flavido-albida, perpauca; plurima jam caput humerosque occupante; pennis alarum caudaeque progerminantibus incanis; apice rostri subcarnei rubicundo; mandibula maxillam multo superante; glandulis rostri lateralibus permagnis, albis; unguibus pedum alborum obscuris. — Ploceus manyar: ♂ vest. hiem. et ♀: pileo fusco; stria superciliari lata, mento maculaque lateris utriusque colli flavissimis; lateribus capitis collique fumidis, obscurius striatis, abdomine et gastraeo reliquo sordide albidis; rostro gilvo-umbrino; pedibus ochraceis; partibus reliquis a vestimento aestivali haud discrepantibus. — Ploceus bengalensis: ♂ vest. hiem. et. ♀: pileo olivaceo-umbrino; stria superciliari livide gilva; genis, mento gulaque superiore ochraceis; pluma quaque notaei totius olivaceo-umbrini livide limbata; pectore totoque gastraeo reliquo sordide albidis; pleuris maris strias obscuriores offerentibus nonnullas; rostro usque incano. — Ploceus hypoxanthus: ♂ vest. hiem. et ♀: plumis pilei totiusque notaei fuscorum singulis livide limbatis; remigibus rectricibusque al. late subumbrino-limbatis; capitis lateribus, gula gutturque livide ochraceis; gastraeo toto sordide albo; rostro subfumido, mandibula incana.

Cabanis' Webervogel [Ploceus Cabanisi]. (Ergänzung zu S. 293.) Wiederum hat sich eine meiner Voraussetzungen bewahrheitet, indem der Prinz von Koburg-Gotha auch diese Art besitzt und zwar befindet sich das Pärchen, während diese Nachträge gedruckt werden, gerade in der Brut. In der „Gefiederten Welt" und dann in den Schlußergänzungen dieses Werkes werde ich hoffentlich noch nähere Mittheilungen bringen können.

Der schwarzkehlige Webervogel [Ploceus atrogularis] ist ebenfalls in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha vorhanden und dies ist wol die erste und einzige Einführung, welche bis jetzt festgestellt worden. (Ergänzung zu S. 293).

Den schulterfleckigen Webervogel [Ploceus badius], S. 303 erwähnt, erhielt der Prinz von Koburg-Gotha vor sechs oder sieben Jahren in zwei Männchen, von denen das eine bis zum Frühjahr 1877 lebte. „Ich verglich sie mit den Exemplaren im Wiener zoologischen Museum und fand, daß sie mit denselben in Gestalt und Farbe bis auf den gelben, anstatt gelbbraunen Rücken übereinstimmen. Das Winterkleid ist dem des P. capitalis ähnlich." Ich kann nur meinen Wunsch und meine Erwartung wiederholt aussprechen, daß solche interessanten Vögel mit der weiteren Erschließung Afrikas immer mehr eingeführt werden.

Der Pirol-Webervogel [Ploceus galbulus] befindet sich ebenfalls in der oben genannten Sammlung und der Prinz sagt: „Er ist wol einer der seltensten Webervögel, denn seit acht Jahren habe ich kein andres Exemplar gesehen als das meinige; früher tauchte er allerdings zuweilen unter den eingeführten Vögeln auf. Sein Gesang erscheint eigenthümlich schnarrend."

Hagenbeck's gelbköpfiger Girlitz [Fringilla imberbis], welcher S. 400 kurz erwähnt ist, müßte auf S. 379 eingereiht werden. Das einzige bisher lebend eingeführte Exemplar dieser kaum in einigen zoologischen Museen vorhandnen Art, erhielt Herr Dr. F. Franken in Baden-Baden. „Er kam im trübseligen Zustande an, erholte sich jedoch und mauserte gut, starb dann aber plötzlich. Beim Ausstopfen ergab er sich als Weibchen." Der Genannte gibt sodann folgende Beschreibung: Weibchen: Oberkopf von der Stirn an gelbgrünlich, im Nacken immer mehr in das bräunliche Olivengrün des Mantels übergehend, jede Feder mit breitem dunklen Mittelstreif; Augengegend reiner gelblich; Ohrgegend dunkler streifig; Schultern und kleine Deckfedern bräunlichgelb, große Flügeldecken schwärzlichgrau, breit gelbgrün gerandet und fahl gespitzt; Schwingen mattschwarz, die äußersten mit schmalem gelben Außenrande, die inneren breiter gelblich gerandet und fahl weiß gespitzt; Schwanzfedern schwärzlich, schwal gelb gerandet und fahlweiß gespitzt; Kehle und Brust düstergelb; Unterleib düsterweiß; Seiten bräunlich überflogen; Bürzel weißlicholivengelb; untere Schwanzdecken fast weiß; Schnabel hornfarben, Oberschnabel mit dunklerer Spitze; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichgrau. Länge 13 cm.; Schwanz 5,5 cm.; Flügel bis 2,5 cm. des Schwanzes.

Der Magelhanzeisig [Fringilla magelhanica] befand sich auch im Besitz des Prinzen von Koburg-Gotha. (S. S. 394).

Der bärtige Zeisig [Fringilla marginalis]. (Ergänzung zu S. 399). Das in der Anmerkung S. 400 erwähnte Exemplar gelangte ebenfalls in den Besitz des Herrn Dr. Franken in Baden-Baden, wo es noch lebt, sich aber als ein Weibchen ergeben hat.

Den chinesischen Grünfink [Fringilla sinica], S. 400 kurz beschrieben, weil bisher noch nicht eingeführt, kaufte der Prinz von Koburg-Gotha in Paris von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire in zwei Exemplaren, welche jedoch wahrscheinlich beide Weibchen waren. Sie erbauten ein Nest, legten auch Eier und brüteten sehr fleißig, jedoch ohne Erfolg. Ihr Benehmen ähnelte dem des europäischen Grünfink.

Der Edelfink von Algier [Fringilla spodiogenia], S. 402 kurz beschrieben, befand sich in der Sammlung des Prinzen von Koburg und war in Paris gekauft; er sang sehr schön.

Der größere Kubafink [Fringilla lepida] ist in letzterer Zeit auch mehrfach parweise eingeführt; ein Pärchen befindet sich im Besitz des Herrn Regierungsrath von Schlechtendal. (Ergänzung zu S. 416).

Der Kehlsperling [Fringilla dentata], S. 444 behandelt, nistete i. J. 1873 in der Vogelstube des Prinzen von Koburg Gotha, erzog ein Junges und begann im Sommer 1878 wieder eine Brut.

Der Goldsperling [Fringilla lútea] zeigt in der Vogelstube des Prinzen von Koburg-Gotha die höchst interessante Erscheinung, daß ein Weibchen in den Jahren 1872 bis 1877 mit einem Männchen europäischer Haussperling zusammen 25 Junge erzogen hat. Das alte Pärchen lebte bei meinem Dortsein (1878) noch. Der Prinz schreibt, daß sich die Bastarde noch nicht weiter fortgepflanzt haben, daß er sie aber wenn irgend möglich weiter züchten werde.

Der fuchsrothe Ammersperling [Fringilla ilíaca]. (Anmerkung zu S. 474). Er ist in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha vorhanden.

Der Diuka-Ammersperling [Fringilla diuca]. (Ergänzung zu S. 477). „Von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire", schreibt der Prinz von Koburg-Gotha, „erhielt ich vier Köpfe dieser schönen Art. Sie erbauten theils frei im Gebüsch, theils in Harzerbauerchen ihre Nester und erbrüteten mehrmals Junge, deren eins noch am Leben ist."

Der Hausgimpel [Pyrrhula frontalis] befand sich in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha, der ihn als herrlichen Sänger rühmt. (Ergänzung zu S. 492).

Der schwarzschwänzige Kernbeißer [Coccothraustes melanurus] war in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha vorhanden. (Zu S. 515).

Der purpurrothe Kardinal [Coccothraustes phoeníceus]. (Ergänzung zu S. 540). „Ein Männchen befindet sich in meinem Besitz und ich kann die von Ihnen gegebne Beschreibung als völlig zutreffend nicht anerkennen. Mein Vogel ist etwas kleiner und gedrungener gebaut als der rothe Kardinal und seine Farbe ist heller; sie wird etwa mit hell scharlachroth bezeichnet werden können. Den Gesang habe ich noch nicht gehört; der Lockruf ist ein scharfes, aber ziemlich leises zit. Sein dicker Schnabel und der hohe Schopf lassen den hübschen Vogel etwas dickköpfig erscheinen. Es ist übrigens derselbe, welchen Fräulein Hagenbeck auf der großen Berliner Ausstellung i. J. 1877 hatte." (v. Schlechtendal). Obwol ich zugeben will, daß ich mich geirrt haben kann, so wäre es doch auch möglich, daß die Färbung dieses Vogels in der Gefangenschaft seither bereits etwas verblichen ist. Demnächstige weitere Einführung wird ja mit Sicherheit den Sachverhalt feststellen lassen.

Der hellblaue Bischof [Coccothraustes coerúleus] befindet sich im Besitz des Prinzen von Koburg-Gotha. Herr v. Schlechtendal theilt mit, daß das S. 537 erwähnte Männchen sich wider Erwarten erholt hat und noch lebt, schön im Gefieder ist und singt. (Zu S. 554).

Das Schmuckpfäffchen [Coccothraustes ornatus; S. 562], **das bleigraue Pfäffchen** [C. plumbeus; S. 564], **das rothschnäblige Pfäffchen** [C. hypoleucus; S. 565], **das Erzpfäffchen** [C. collarius; S. 566], **das weißstirnige Pfäffchen** [C. linéola; S. 567], **das weißkehlige Pfäffchen** [C. albogularis; S. 569] und **das Kragenpfäffchen** [C. leucopsis; S. 572], waren sämmtlich in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha und sind zum Theil noch lebend in derselben vorhanden. Auf der Hamburger Ausstellung im Juli 1878 fand ich bei Herrn H. Möller das bleigraue Pfäffchen und das blaugraue Pfäffchen (C. intermedius) [S. 154] in mehreren Köpfen.

Der braunköpfige Ammer [Emberiza lutéola]. (Ergänzung zu Seite 591). Herr Dr. Luchs ist seit d. J. 1874 im Besitz eines Pärchens und schreibt über dasselbe folgendes: „Da ich Züchtungsversuche mit den Vögeln nicht angestellt, so bieten sie wenig bemerkenswerthes. Sie sind harmlos, ruhig, durchaus nicht scheu und vertragen sich mit einem Männchen Bandamandine in einem geräumigen Käfige zusammen recht gut. Nur das letztre, trotzdem es schwächer ist, benimmt sich am Futterkästchen und bei der Wahl des Schlafplatzes oft unleidlich. Zu Zeiten, besonders während der Mauser im September, jagt das Männchen der ersteren sich mit seinem Weibchen herum und seit Anfang Aprils läßt es jetzt einen nicht übel klingenden Gesang hören. Es ist der kurze deutlich artikulirte hell schrillende Ammersang, der sich etwa mit

„dschek, dschek drih, dreh, drah drih" wiedergeben läßt. Dies kurze zweistrofige Liedchen wird oft acht- bis zehnmal, nicht selten auch des Nachts, wiederholt. Zur Mauser bemerke ich noch, daß sie bei diesen wie bei vielen unserer einheimischen Vögel eine zweifache ist, im Frühjahr die kleine mit Abwerfen des Kleingefieders, zu Beginn des Herbstes die große mit Wechsel sämmtlicher Federn. Auch ich habe mich davon überzeugt, daß beide Geschlechter ein gleich gefärbtes, nur wenig von einander verschiednes Prachtkleid tragen und daß das Weibchen nur durch geringere Größe und wenig geringern Umfang der rothbraunen Kopffärbung verschieden ist."

Der Spornammer [Emberiza lapponica; zu S. 600] befindet sich nebst manchen anderen fremdländischen Ammern in der Sammlung des Prinzen von Koburg-Gotha.

Die kurzzehige Lerche [Alauda brachydáctyla; S. 612] hatte der Prinz von Koburg-Gotha in mehreren Köpfen aus Sizilien und Griechenland mitgebracht. Ebenso besitzt er die **gelbe Lerche** [A. flava; S. 618], welche er aus Athen erhalten und nur als eine Spielart der Haubenlerche betrachtet; auch die **weißbäckige Lerche** [A. leucótis; S. 631], von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire bezogen, war in seiner Sammlung vorhanden.

Die Indianer-Lerche [Alauda chrysolaema]. (Ergänzung zu S. 625). Herr H. Nehrling sendet soeben noch folgende Schilderung: „Die Hornlerche ist einer der allerhäufigsten Vögel von Wiskonsin und Illinois. Ihre Färbung ist, wenn man sie in der Nähe betrachtet, wirklich prachtvoll, aber sehr schwer zu beschreiben. Im Sommer sieht man sie ungemein häufig auf den Landstraßen sich im Staube paddeln, und auch im Winter sucht sie hier den größten Theil ihrer Nahrung, meist aus dem Pferdemist, auf. Sie scheint Standvogel zu sein, denn sie ist jederzeit anzutreffen. Das Nest findet man schon sehr früh im Jahre. Nach meinen Beobachtungen ist sie der erste Brutvogel des nördlichen Illinois; ich sah das Nest sehr oft bereits anfangs April und Mitte Aprils sogar schon ausgeflogene Junge. Das erstre steht immer auf der Erde an einem alten Grasbüschel oder an der Seite einer kleinen Erderhöhung. Es ist aus Halmen gebaut und enthält gewöhnlich fünf, manchmal auch nur vier Eier, welche auf weißlichem Grunde mit vielen kleinen bräunlichen Flecken überfät sind. Die Jungen verlassen, sobald sie flügge geworden, das Nest und laufen wie kleine Hühnchen auf dem Boden davon. Erst geraume Zeit nach dem Ausfliegen, versuchen sie es, ihre Flügel zu gebrauchen. Der Gesang der Hornlerche ist kurz, aber recht melodisch; beim Singen steigt sie hoch in die Luft. Im Käfige habe ich sie oft gehalten. Sie zeigte sich sehr zutraulich und ausdauernd und ließ auch ihren etwas leisen Gesang sehr eifrig ertönen."

Berichtigungen.

S. 6 Z. 10 v. u. muß es anſtatt Karminfinken heißen: Karminaſtrilde.
S. 43 Z. 5 v. o. muß es heißen: Astrild.
S. 43. Der graue Aſtrild heißt bei den franzöſiſchen Händlern noch Astrild à joues rouges; bei Jamrach Senegal Waxbill.
S. 45 Z. 5 v. o. muß es heißen: Sénégali.
S. 45 Z. 11 v. o. „ „ „ Gurney.
S. 45 Z. 20 v. o. „ „ „ längs der Gewäſſer.
S. 45 Z. 21 v. o. „ „ „ im Habeſch.
S. 49 Z. 16 v. o. „ „ „ Astrild ondulé.
S. 49 Z. 17 v. o. „ „ „ Bec de corail ondulé.
S. 49 Z. 18 v. o. „ „ „ The Ondulé, richtiger The Undulate. (In den Liſten einiger Lond. Händler iſt der Name wie an der angegebnen Stelle aufgeführt und wir berichtigen ihn hiermit für unſere Leſer.)
S. 49 Z. 4 v. u. muß es heißen: Aegintha astrild.
S. 53 Z. 3 v. o. „ „ „ Bengali à joues oranges.
S. 55 Z. 3 v. o. „ „ „ Joue orange.
S. 55 Z. 5 v. o. „ „ „ Benguéli ou Melpoda à joues oranges.
S. 55 Z. 5 v. o. „ „ „ Orange-cheeked Melpoda.
S. 55 Z. 6 v. o. muß der holländiſche Name heißen: Oranje-bekje oder Oranje-wang.
S. 56 Z. 11 v. o. muß es heißen: Bécoeur.
S 58 Z. 9 v. u. muß der holländiſche Name heißen: Zwart-bekje.
S. 58 Z. 5 v. u. muß es heißen: Weaver-finch.
S 63 Z. 18 v. u. muß der holländiſche Name nur heißen: Kleine Roodstaart; das übrige fällt fort.
S. 63 Z. 17 u. 18 v. u. muß es heißen: Cul-beau cendré, C.-b. grison und C.-b. de Port Natal.
S. 63 Z. 17 v. u. muß es heißen: Cinereous fair-rump und Black-bellied fair-rump.
S. 63. Den rothſchwänzigen Aſtrild nennt Jamrach noch Lavendel Finch.
S. 73. Den getigerten Aſtrild nennt Jamrach Aberdavat; ferner heißt er noch Havre de Vaz und Bengali moucheté (Vekemans).
S. 74 Z. 6 v. o. fehlt hinter album]
S. 76 Z. 13 v. u. muß es heißen: Lefebvre.
S. 77 Z. 1 v. o. „ „ „ Sénégali aurore.
S. 81 Z. 18 v. o. „ „ „ Benguéli zébré ou Zébré.
S. 81 Z. 19 v. o. „ „ „ Sénégali à ventre orange, Astrild à ventre orange ou Ventre-orange.
S. 81 Z. 21 v. o. „ „ „ Oranje-buikje, Zebra-vogeltje of Zebra-senegali.
S. 81 Z. 5 v. u. fehlt hinter albo-terminata .
S. 82 Z. 5 v. u. muß es heißen: der kleine rothe Aſtrild: Tafel II, Vogel 6.
S. 83 Z. 18 v. o. „ „ „ verfallenen.
S. 83 Z. 7 v. u. „ „ „ Petit Sénégali rouge.
S. 88 Z. 9 v. u. „ „ „ usque ad caudam.
S. 88 Z. 8 v. o. „ „ „ Le Sénégali, *Buffon*.
S. 90 Z. 14 v. o. „ „ „ Sénégali rouge.
S. 91 Z. 7 v. o. ſind die Worte: dunkler oder, fortzulaſſen.
S. 91 Z. 17 v. u. muß es heißen: externa.
S. 91 Z. 2 v. u. „ „ „ Semién.
S. 95 Z. 6 v. u. „ „ „ Lawrence.
S. 99 Z. 24 v. u. „ „ „ Cordon bleu.
S. 99 Z. 16 v. u. „ „ „ Mariposa à joues de carmin; The crimson-eared Benguell.
S. 102 Z. 9 v. o. „ „ „ Granat Finch.
S. 103 Z. 3 v. u. „ „ „ Shaw.
S. 107 Z. 11 v. u. fehlt hinter gula ,
S. 111. Der Dornaſtrild heißt im Handel auch noch Bec de cire und Astrild à cinq couleurs.
S. 116 Z. 20 v. u. Der Zeresaſtrild heißt bei den franzöſiſchen Händlern auch noch Diamant ou Moineau modeste.

S. 116 Z. 2 v. u. muß es heißen: supracaudalibus.
S. 117 Z. 2 v. o. „ „ „ harum in IV—V. etc.
S. 118 Z. 2 v. u. Den Auroraastrild nennt Jamrach Crimson-winged Waxbill; sodann heißt er auch Diamant aurore und Aurora Finch.
S. 119 Z. 15 v. o. muß es heißen: inferiore ſtatt interiore.
S. 122 Z. 2 v. o. „ „ „ Double-banded Finch.
S. 122 Z. 6 v. o. „ „ „ Aegintha Bichenovi.
S. 122 Z. 6 v. o. muß hinter fascia das , fortfallen.
S. 122 Z. 18 v. o. muß es heißen: canescens.
S. 127 Z. 10 v. u. „ „ „ Kortofan.
S. 132 Z. 3 v. o. „ „ „ fehnte.
S. 133 Z. 18 v. o. „ „ „ fulvo-cervina.
S. 133 Z. 19 v. o. „ „ „ variegata et fasciata.
S. 135 Z. 20 v. u. Die Rothkopf-Amandine wird von engliſchen Händlern Red-headed Finch genannt.
S. 141 Z. 15 v. u. muß es heißen: adultae.
S. 142 Z. 13 v. o. „ „ „ A. Preyer.
S. 143 Z. 5 v. u. „ „ „ Webervögeln.
S. 144 Z. 17 v. o. Die größte Elſteramandine heißt bei den franzöſiſchen Händlern auch None grande.
S. 147 Z. 2 v. u. muß es heißen: None.
S. 147 Z. 1 v. u. „ „ „ Hooded Finch.
S. 148 Z. 1 v. o. Die kleine Elſteramandine heißt in England auch Little Pied Grassfinch.
S. 148 Z. 15 v. o. muß es heißen: übereinſtimmend.
S. 148 Z. 1 v. u. „ „ „ ſahen im Jugendkleide völlig wie dieſe Jungen aus.
S. 149 Z. 20 v. u. Die zweifarbig Eſt amandine nennt Jamrach Two-colored Bronze-Manikin.
S. 150 Z. 16 v. o. muß es heißen: Spermestes rufodorsualis.
S. 151 Z. 7 v. u. „ „ „ niſtete.
S. 151 Z. 2 v. u. Die geſtreifte Bronze-Amandine nennt Jamrach auch Large Bronze-Manikin
S. 152 Z. 3 v. o. muß es heißen: Grosbec de l'Isle de Bourbon.
S. 152 Z. 1 v. u. „ „ „ fünfte Tafel.
S. 153 Z. 4 v. o. „ „ „ Die ſchwarzbürzelige Bronze-Amandine heißt bei den franzöſiſchen Händlern auch Hirondelle de Java.
S. 153 Z. 12 v. o. muß es heißen: tenuissime.
S. 153 Z. 6 v. u. „ „ „ Sharp-tailed Finch.
S. 153 Z. 4 v. u. „ „ „ Sharp-tailed Munia.
S. 153 Z. 3 v. u. „ „ „ Hdgs.
S. 154 Z. 6 v. o. „ „ „ haud.
S. 154 Z. 21 v. o. „ „ „ Preyer.
S. 155 Z. 16 v. o. Die japaneſiſchen Mövchen heißen bei den engliſchen Händlern: White, yellow or nanking and grey Japanese Bengalis und bei den franzöſiſchen Händlern: Bengalis blancs et panachés du Japon, bei Poisson: B. blancs et panachés de la Chine.
S. 158 Z. 11 v. u. muß es heißen: flavido-pallescens, .
S. 160 Z. 5 v. o. „ „ „ Lonchura Cheet, *Syk.*
S. 160 Z. 10 v. o. „ „ „ hypochondriorum.
S. 162 Z. 10 v. u. Die Muskatamandine nennen die franzöſiſchen Händler auch Capucin pointillé.
S. 165 Z. 18 v. u. muß es heißen: etwa eine Minute.
S. 165 Z. 4 v. u. „ „ „ Amadina Maja.
S. 166 Z. 7 v. o. „ „ „ deorsum gulam cervicemque versus paulatim etc.
S. 166 Z. 10 v. o. „ „ „ pedibus plumbeis.
S. 167 Z. 13 v. o. Die ſchwarzbrüſtige Nonnen-Amandine heißt in Frankreich auch Capucin à calotte blanche.
S. 169 Z. 18 v. o. muß es heißen: nach ihm.
S. 169 Z. 4 v. u. Die dreifarbige Nonnen-Amandine nennen Londoner Händler auch Tricolored Finch.
S. 170 Z. 6 v. o. muß es heißen: priori.
S. 170 Z. 24 v. o. „ „ „ braun, fein hell geſtrichelt.
S. 171 Z. 13 v. o. Die Schilfamandine heißt bei den franzöſiſchen Händlern noch Donacole marron.
S. 171 Z. 18 v. o. muß es heißen: Donacola bivittata.
S. 171 Z. 19 v. u. „ „ „ abdomen album.
S. 172 Z. 12 v. o. „ „ „ incanus; .
S. 172 Z. 20 v. u. muß vor dem Titel „Die Zebra-Amandine" die Bezeichnung der nun folgenden kleinen Gruppe der Amandinen: Die auſtraliſchen Prachtamandinen oder Diamantvögel eingeſchaltet werden.
S. 172 Z. 17 v. u. muß es heißen: eingebürgert.
S. 173 Z. 9 v. u. „ „ „ gekennzeichnet.
S. 174 Z. 5 v. o. „ „ „ Junge
S. 176 Z. 2 v. u. Die Zebra-Amandine heißt bei den franzöſiſchen Händlern auch Diamant à moustache Der richtige holländiſche Name iſt Bruin-oor-vink.

S. 177 Z. 14 v. o. fehlt hinter albida ,
S. 180 Z. 21 v. u. muß es heißen: Diamond Sparrow.
S. 189 Z. 2 v. o. „ „ „ occipite.
S. 189 Z. 12 v. u. muß hinter atra der Bindeſtrich fort.
S. 191 Z. 15 v. o. Die lauchgrüne Papagei-Amandine nennen franz. Händler auch Pape des prairies.
S. 191 Z. 24 v. u. muß es heißen: Lonchura quadricolor, *Syk.*
S. 192 Z. 9 v. u. „ „ „ Geospiza cyanovirens, *Peale.*
S. 201 Z. 9 v. u. „ „ „ Chénu.
S. 202 Z. 20 v. o. „ „ „ obtuse.
S. 211 Z. 12 v. o. muß hinter Fleck das , fort.
S. 213 Z. 17 v. o. muß es heißen: Koninga-Weduwe.
S. 215 Z. 19 v. u. Der Hahnſchweif-Widafink heißt bei Jamrach auch Red-shouldered Whydahbird.
S. 218 Z. 3 v. u. muß es heißen: Kofanga-Fluß.
S. 219 Z. 14 v. o. „ „ „ im Kamerun.
S. 225 Z. 8 v. o. „ „ „ Bambushäuſern.
S. 236 Z. 11 v. u. Der Sammt-Webervogel heißt bei den Londoner Händlern noch Cape-Weaverbird.
S. 240 Z. 13 v. u. Der Orange-Webervogel heißt bei Jamrach auch Bishops-Bird.
S. 243 Z. 21 v. u. und S. 262 Z. 4 v. u. ibidem.
S. 254 ſollte es im Titel heißen: Der Rodriguez-Webervogel (Ploceus flavicans).
S. 265 Z. 4 v. o. muß es heißen: superciliaribus.
S. 267 Z. 6 v. o. „ „ „ ein wenig kleiner.
S. 274 Z. 5 v. u. „ „ „ *Tltr.*, nicht *Tltr.*
S. 275 Z. 12 v. u. „ „ „ oder braunhalſige Bayaweber.
S. 275 Z. 12 v. u. Den gelbbrüſtigen Baya-Webervogel nennt Jamrach Bottle-Weaver.
S. 288 Z. 18 v. o. muß es heißen: Fringilla senegalensis, *Bras.*
S. 288 Z. 19 v. o. „ „ „ Loxia melanocephala, *Gml.*
S. 288 Z. 23 v. u. „ „ „ Pinson du Sénégal.
S. 288 Z. 3 v. u. „ „ „ flavissimis.
S. 289 Z. 21 v. o. „ „ „ epigastro.
S. 289 Z. 30 v. o. „ „ „ Pro aetate variabile.
S. 291 Z. 9 v. o. „ „ „ Great Masked Weaver-bird.
S. 291 Z. 15 v. o. „ „ „ Abyssinian Grosbeak, *Lth.*
S. 296 Z. 3 v. o. „ „ „ sulfureo-marginata.
S. 297 Z. 15 v. o. „ „ „ interscapiliti.
S. 300 Z. 12 v. o. „ „ „ fuscescente.
S. 300 Z. 28 v. o. „ „ „ aeruginosa.
S. 300 Z. 29 v. o. „ „ „ *(Hhn.)*.
S. 301 Z. 4 v. o. muß es heißen: H. concolor, *Hgl.*, *Fnsch.*
S. 301 Z. 6 v. o. „ „ „ Pomeranzengelbe Webervogel.
S. 311 Z. 10 v. u. „ „ „ P. melanogenys, *v. Mll.*
S. 314 Z. 13 v. o. „ „ „ Little Masked Weaver-bird.
S. 314 Z. 14 v. u. „ „ „ ibidem pictis.
S. 315 Z. 14 v. o. „ „ „ Ploceus Alecto.
S. 317 Z. 2 v. u. „ „ „ fuliginosus.
S. 322 Z. 5 v. o. „ „ „ Malimbe-Webervogel (Ploceus malimbe).
S. 326 Z. 10 v. u. „ „ „ Crithologus
S. 336 Z. 6 v. u. „ „ „ Kreuzblütlerſamen.
S. 340 Z. 9 v. o. „ „ „ Ich habe ſie ſogar in Canaria einzeln in Schlagnetzen, deren Locker ꝛc.
S. 341 Z. 11 v. u. „ „ „ die durch Schönheit ꝛc.
S. 351 Z. 19 v. o. „ „ „ dein fascia subnigra etc.
S. 352 Z. 2 v. o. „ „ „ tenuins.
S. 352 Z. 11 v. o. „ „ „ ventris.
S. 354 Z. 10 v. o. „ „ „ Der graue weißbürzelige Girlitz: Tafel XI, Vogel 53.
S. 362 Z. 15 v. u. „ „ „ albente.
S. 364 Z. 3 v. u. „ „ „ *Gml.*
S. 373 Z. 12 v. o. „ „ „ Haublettchen.
S. 374 Z. 16 v. u. muß hinter gastrael das ; fort.
S. 376 Z. 2 v. u. muß es heißen: ibidem.
S. 378 Z. 2 v. u. „ „ „ Serinus sp. et S. barbatus, *Hgl.*
S. 394 ſollte es im Titel heißen: D Ma Ihanzuſig [Fringilla magelhanica].
S. 396 Z. 15 v. o. muß es heißen: Hypacanthis Stanleyi, *Cb.*
S. 408 Z. 3 v. o. „ „ „ epigastro ventreque medio albidis.
S. 408 Z. 11 v. o. „ „ „ Schneidepunkt.

S. 410. Unter den Titel: Der Kubafink muß: Tafel XII, Vogel 60.
S. 415 Z. 26 v. o. muß es heißen: Bauch weißlichgrau.
S. 415 Z. 27 v. o. „ „ „ Hinterleib.
S. 418 Z. 27 v. o. „ „ „ albidiarum.
S. 421 Z. 15 v. u. fehlt hinter gula .
S. 425 Z. 30 v. o. muß es heißen: acuminatam.
S. 427 Z. 1 v. o. „ „ „ tſiwi-tſitſch-tſitſch ꝛc.
S. 430 Z. 4 v. u. „ „ „ Der Papſtfink: Tafel XII, Vogel 57 a.
S. 435 Z. 23 v. o. „ „ „ China Bull finch, *Alb.*
S. 445 Z. 16 v. o. „ „ „ Pyrgita fazoqlensis, *Pr. Wrtb.*
S. 445 Z. 19 v. o. „ „ „ röthlichbraungrau.
S. 445 Z. 14 v. u. „ „ „ umbrino cinerescens.
S. 445 Z. 5 v. u. „ „ „ lateque.
S. 448 fehlt unter dem Titel Der ſchuppenköpfige Sperling [Fringilla frontalis]: Tafel XII, Vogel 62.
S. 460 Z. 1. Der Zwergſperling muß, da eine Fringilla pusilla S. 253 bereits vorhanden iſt, Fringilla juncorum, *Nttll.*, heißen und unter den Synonymen (Nomenclatur) muß an Stelle des letztern Namens der erſtre, Fringilla pusilla, *Wls.*, treten.
S. 467 Z. 10 v. u. muß es heißen: Gambel's Ammerſperling [Fringilla Gambeli, *Nttll.*].
S. 471 Z. 6 v. u. „ „ „ olivengrünlichbraun.
S. 473 Z. 23 v. u. „ „ „ Bell's Finch.
S. 473 Z. 4 v. u. „ „ „ Heimat Südbraſilien.
S. 478 Z. 20 v. o. „ „ „ unzählige.
S. 494 Z. 22 v. o. „ „ „ Oregongebiet.
S. 506 Z. 7 v. u. „ „ „ namentlich den Ziegenhirten ꝛc.
S. 507 Z. 7 v. o. „ „ „ Bevor ich die Bolle'ſche Darſtellung fortſetze ꝛc.
S. 511 Z. 18 v. u. „ „ „ *Trstr.* nicht *Frstr.*
S. 512 Z. 3 v. u. „ „ „ mit dem Verwandten ꝛc.
S. 516 Z. 9 v. u. „ „ „ Der roſenbrüſtige Kernbeißer, Tafel XIII, Vogel 67.
S. 530 Z. 15 v. u. „ „ „ Vorbau.
S. 544 Z. 14 v. o. „ „ „ jedenfalls zuerſt Herr Dr. Bodinus ꝛc.
S. 550 Z. 11 v. u. „ „ „ Der grüne Kardinal: Taf. XIII, Vogel 66.
S. 551 Z. 6 v. o. „ „ „ Lesson.
S. 553 Z. 17 v. u. „ „ „ olivaceo-viridibus.
S. 554 Z. 12 v. o. „ „ „ Coccothraustes cristatellinus, *Rss.*
S. 554 Z. 19 v. o. „ „ „ S. 352.
S. 566 Z. 16 v. u. „ „ „ Pico grueso variabile.
S. 569 in der Kolumnenüberſchrift muß es heißen: Das ſchwarzkäppige Pfäffchen; ebenſo Z. 15 von oben: Das ſchwarzkäppige Pfäffchen [Coccothraustes gutturalis].
S. 572 Z. 17 v. o. muß es heißen: ſ. S. 571.
S. 574 iſt als Seitenzahl fälſchlich 374 gedruckt.
S. 582 Z. 24 v. o. muß es heißen: L'Ortolan du Cap de bonne espérance.
S. 582 Z. 10 v. u. „ „ „ Emberiza spodiocephala.
S. 585 Z. 14 v. u., S. 587 Z. 1 v. o. und S. 595 Z. 6 v. o. muß es heißen: Ammern.
S. 597 Z. 2 v. o. muß es heißen: Passerina nigricollis.
S. 612 Z. 5 v. o. „ „ „ Bartſtreif.
S. 614 Z. 6 v. o. „ „ „ tenuirostris et gallica.
S. 615 Z. 25 v. u. „ „ „ Alauda Reboudia.
S. 616 Z. 31 v. o. „ „ „ rothſchnäblige Lerche.
S. 620 Z. 7 v. o. „ „ „ Novaja Semlja.
S. 625 Z. 15 v. o. „ „ „ Baird will ſie ꝛc.
S. 635 Z. 7 v. o. „ „ „ eine ihren rothen ꝛc.
S. 639 Z. 17 v. o. „ „ „ verwaſchene.
S. 640 Z. 19 v. o. „ „ „ *Azr.*
S. 640 Z. 12 v. u. „ „ „ pogonio remigum interiore etc.
S. 643 Z. 4 v. u. „ „ „ naſſem ꝛc
S. 644 Z. 1 v. u. „ „ „ recht klein geſchnittene Mehlwürmer.
S. 645 Z. 5 v. u. muß b., fort.
S. 661 Z. 21 v. u. muß es heißen: lederbraunen Flatſchen.

Sachregiſter.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen).

A.

Acalanthe 189.
— psittacea 192.
Aegintha 27.
— **amandava** 64. 73.
annulosa 108. 122.
— **astrild** 43 49.
— **atricapilla** 56. 57.
— **atricollis** 105. 107.
— **Bichenovi** 119. 122. 677.
— **cinerea** 36. 43.
coerulescens 59. 64.
— **Dühringi** 671. 672.
— **Dufresnei** 57. 59.
— Ernesti 58.
— **erythronota** 105.
— **formosa** 56. 74. 75.
— **granátina** 100. 102. 674.
— **Hartlaubi** 92.
— **lucana** 59.
— **larvata** 91. 672. 673.
— **lineata** 119.
— margaritata 92.
— **melba** 102. 104. 674. 675.
— **melpóda** 51. 55.
— **minima** 82. 88.
— **modesta** 114. 116.
— nigricauda 50.
— **nigricollis** 92.
— occidentalis 50.
— **paludicola** 55.
— **Phäëthon** 111. 114. 676.
— Perreini 59.
— **phoenicóptera** 117. 119.
— **phoenicótis** 93 99.
— **picta** 122. 123. 677.
— **polyzóna** 107.
— punica 71.
— **Reichenowi** 92.
— **rhodopyga** 50. 668.
— rhodopareia 672.
— **rubricata** 89. 91. 670.
— rubriventris 50.
Aegintha rufibarba 50.
— **ruficauda** 123. 124.
— **rufopicta** 88. 669.
— **Russi** 668.
— **sanguinolenta** 76. 81.
— **temporalis** 108. 111.
— tricolor 101.
— **vinacea** 92. 673.
— viridis 56.
— **Wieneri** 674. 676.
Aeginthe 111.
Aeginthidae 18. 27.
Aeginthinae 27.
Aeginthinen, eigentliche 107.
Ageea 617. 627.
— Junglee 627.
Agelaius coronatus 638.
Aggia 626.
— Lark 626.
Agghun 627.
Aglaja cyanocephala 666.
— paradisea 664.
— melanota 666.
Agrophilus haematocephalus 278.
— melanorrhynchus 279.
— superciliosus 278.
Aidemosyne, beſcheidene 116.
Aidemosyne modesta 116.
Alaemon Jessei 630.
Alario 383.
Alario personatus 383.
Alauda abessinica 618.
— **affinis** 626.
— **africana** 630.
— **Aggia** 626.
— **albigula** 626.
— **alpestris** 619. 624.
— **Anderssoni** 615.
— **apiata** 628.
— arenaria 614.
— **arenícola** 618.
— arenícolor 617.
— arvensis 615.
— arvensis ruficeps 611.
— **assamica** 626.
— bagheira 614.
— bicornis 625.
— bifasciata 630.
— **bilopha** 625.
— **bimaculata** 607. 608.
— **brachydáctyla** 612. 614. 686.
Alauda Brandti 626.
— **Buckleyi** 614.
— **calandra** 603. 607.
— calandrella 614.
— cantillans 627.
— Cheendola 627.
— **chrysolaema** 625. 686.
— cinctura 617.
— **cinctuta** 616.
— **cinerea** 611.
— **Clót-Béci** 634.
— Clot-Bey 634.
— coelivox 616.
— conirostris 616.
— **cordofanica** 628.
— cornuta 624.
— coromandelica 627.
— **crassirostris** 618.
— **deserti** 616.
— **desertorum** 629. 632.
— **deva** 612.
— **Duponti** 618.
— dukhunensis 614.
— elegans 617.
— **elegantissima** 628.
— erythróptera 627.
— erythropyga 616.
— ferruginea 618.
flava 618. 624. 686.
— fraterculus 61
— **frontalis** 632. 633.
— gangetica 615.
— gingica 633.
— gracilis 615.
— **Grayi** 629.
— **grisea** 633.
— gutture flavo Virginiae et Carolinae 624.
— gulgula 615.
— **Heinei** 614.
— hermónensis 614.
— hofa 628.
— Horsfieldi 627.
— hyemalis 624.
— immaculata 614.
— infuscata 616.
— **isabellina** 616. 618.
— **japonica** 615.
— javanica 627.
— **Jessei** 630.
— Kollyi 615.
— leiopus, *var.* orientalis 615.
— leucóptera 611.
— **lencótis** 631. 686.
— **longirostris** 626.
— lusitanica 616.
— macróptera 614.
— major 607.
— **maiabarica** 615.
Alauda matutina 607.
— **melanauchen** 633.
— melanocephala 630.
— micrólopha 618.
— **minor** 615. 625.
— **modesta** 628. 633.
— **mongolica** 610.
— mutabilis 609.
— nigra 609.
— nigriceps 633.
— nivalis 624.
— pallida 616. 617.
— penicillata 625.
— petróphila 626.
— **phoenicura** 617.
— phoenicuroides 617.
— **pispoletta** 614.
— **pianicola** 629.
— **plebeja** 629.
— praestigiatrix 628.
— praetermissa 616.
— **Randoni** 628.
— Rebondia 615.
— regulus 617.
— rufa 625.
— ruficapilla 611.
— **ruficeps** 611.
— rufocinnamomea 628.
— **sibirica** 610. 611.
— **simplex** 628.
— sinensis 610.
— **Smithi** 632.
— spleniata 611.
— **tatarica** 608. 609.
— **Thekiae** 617.
— triborrhyncha 615.
— undata 607.
— virginiana 624.
— yeltoniensis 609.
Alaudinae 602.
Alecto 315.
— **albirostris** 317.
— erythrorhynchus 318.
Alektovogel 317.
Alektoweber 315.
Alekto-Webervogel 315. 317.
Alectornis albirostris 31
Alexto Dinemelli 319.
Algonda-Webervogel 253.
Alouette-calandra 607.
— des alpes 624.
— à joues blanches 632.
— de Virginie 624.
— noire 609.
Alpenlerche 619. 624. 625.

Altan gurguldai 579.
Amadina 27.
— acuticauda 153. 156.
— bicolor 119.
— cantans 158.
— castaneothorax 171
— castanotis 177.
— cincta 185.
— cucullata 148.
— erythrocephala 135.
— fasciata 133.
— fringilloïdes 144.
— frontalis 450.
— gestreepte 151.
— Gouldiae 188.
— guttata 180.
— Hartlaubi 92.
— larvata 92.
— Lathami 180.
— lunulata 107.
— Maja 165.
— malabarica 160.
— malacca 170.
— melanopygia 153.
— modesta 116.
— nitens 201.
— nitida 182.
— oryzivora 141.
— pectoralis 172.
— polyzona 107.
— prasina 191.
— punctipennis 150.
— punctularia 162.
— ruficauda 124.
— sinensis 168. 170.
— squamifrons 450.
— striata 152.
— temporalis 111.
— undulata 166.
Amaduvade, Java 73.
Amandava 73.
Amandava, getygerde 73.
Amandave piqueté 73.
— pointillé 73.
— rouge vif 73.
Amandaven 64.
Amandave 64.
Amandine, Band- 127. 132.
— **Bronze-, gestreifte** 151. 678.
— **Bronze-, schwarzbürzelige** 152.
— **Bronze-, spitzschwänzige** 153. 678.
— **Diamant-** 177. 180. 678.
— Elster- gitterflügelige 149. 150.
— **Elster-, größte** 143. 144. 678.
— **Elster-, kleine** 145. 147. 678.
— Elster-, rothrückige 150.
— **Elster-, zweifarbige** 148. 149.
— Erz-, kleine 147.
— **Feuerschwanz-** 181. 182. 678.
— **Frau Gould's** 188.
— **Gürtel-** 183. 185.
— Gürtel-, Gould's spitzschwänzige 186.
— Gürtel-, Masken- 186.
— **Gürtel-, weißbäckige** 187. 188.
— **Malabar-** 158. 159.
— **Nonnen-, dreifarbige** 169.
— **Nonnen-, schwarzbrüstige** 166. 167.
— **Nonnen-, schwarzköpfige** 167. 168.
— **Nonnen-, weißköpfige** 163. 165. 678.
— **Papagei-, dreifarbige** 191.
— **Papagei-, eigentliche** 192. 679.
— **Papagei-, kurzschwänzige** 192.
— **Papagei-, lauchgrüne** 190. 191. 678.
— Paradies- 135.
— **Reis-** 136.
— Reis-, braune 142.
— **Reis-, weiße** 141.
— **Rothkopf-** 133. 135. 677.
— rothköpfige 135. 192.
— **rothohrige** 182. 183.
— **Samenknacker-, geschuppte** 193. 194. 680.
— **Samenknacker-, rothbrüstige** 193. 680.
— **Schilf-** 170. 171. 678.
— Schilf-, gelbe 172.
— **Schilf-, weißbrüstige** 171.
— **Silberschnabel-** 155. 158. 678.
— **wunderschöne** 189.
— **Zebra-** 130. 172. 176. 678.
Amandinen 27. 125.
— Elster- 143.
— Papagei- 189.
— Pracht-, australische 172.
— Samenknacker- 192.
Amarant 19. 32. 87.
— australischer 113.
— dunkler 91.
— kleiner 19. 82. 87.
— kleinster 87.
— rothbrüstiger 89.
Amarante 88.
Amarantfink 32. 87.
Amaranthe 88.
— kleine 88.
Amarillo, crestudo 553.
Amarantvogel 20. 21. 22. 28. 39. 62. 82. 87.
Amauresthes fringilloïdes 144.
Amblynura 189.
— cyanovirens 192.
Ammer Bauern- 588.
— Berg- 600.
— Bild- 601.
— blaugrauköpfiger 590.
Ammer, brasilianischer 407.
— braunkäppiger 591.
— **braunköpfiger** 591. 592. 685.
— braunohriger 591.
— Cabanis'- 580.
— Eis- 600.
— Felsen- 579.
— **Fichten-** 584. 587.
— gelbbäuchiger 580.
— gelbkehliger 590.
— gemalter 435. 600.
— gestreifter 581.
— Giglioli's 591.
— Gimpel- 590.
— graubürzeliger 591.
— grauköpfiger 582.
— Hutton's 591.
— Hauben- 599.
— Hauben-, indischer 599.
— Kappen- 592. 594.
— kleiner 589.
— Latz- 601.
— Lerchen- 597. 600.
— lerchengrauer 589.
— Maccown's 601.
— Masken- 582.
— mit gelben Augenbrauen 583.
— mit gelbem Augenbrauenstreif 583.
— Pallas' 591.
— Pityornis 587.
— Pracht- 594.
— rostbärtiger 589.
— röthlicher 587.
— Sahara- 582.
— Schah- 591.
— Schild- 596.
— Schmuck- 601.
— Schnee- 599. 600.
— **Schopf-** 597. 599.
— schwarzbrüstiger 596.
— **schwarzkehliger, mit gelber Brust** 594. 596.
— **schwarzköpfiger** 592. 594.
— schwarzohriger 591.
— schwarzschultriger 601.
— siebenstreifiger 581.
— Sperlings- 591.
— Sporen- 599. 600.
— Sporn- 600. 686.
— Stewart's 583.
— Strachey's 591.
— Sumpf- 591.
— Tristram's 589.
— Townsend's 597.
— **veränderlicher** 589.
— **vom Libanon** 591.
— **vom Vorgebirge der guten Hoffnung** 582.
— **Weiden-** 578.
— zierlicher 583.
— Zweifarben- 597.
— zweifarbiger 597.
— Zwerg- 588.
Ammern 577.
Ammerfink, Bäschen- 466.
— Braun- 482.
— Bruch- 474.
— Busch- 476.
— Dorn- 475.
— Fuchs- 474.
— Gras- 471.
— Katzen- 481.
— Küsten- 472.
— Polar- 471.
— Schiefer- 476.
— Schlag- 461.
Ammerfink, See- 472.
— Sommer- 474.
— Sperlings- 472.
— Sumpf- 474.
— Steppen- 470.
— Strichel- 473.
— Tropfen- 476.
— Wachtel- 472.
— Winter- 465.
Ammerfinken 437.
Ammerbabia 475.
Ammerkardinal 553.
Ammerling, Schnee- 600.
Ammersperlinge 437.
Ammersperling, Amsel- 475.
— Augenbrauen- 478.
— **bärtiger** 468.
— Bell's 473.
— Berg- 459.
— blasser 460.
— blaßnackiger 478.
— bleigrauer 472.
— braunohriger 478.
— breitschwänziger 473.
— Brewer's 460.
— Bruch- 464.
— Burmeister's 476.
— Cabanis' 473.
— Cassin's 474.
— Deville's 478.
— **Dinka-** 477. 685.
— Dinka-, aus Bolivien 478.
— Dinka-, gebänderter 478.
— einfarbiger 475.
— Erd- 475.
— Feld- 476.
— fuchsrother 474. 685.
— Gambel's 467.
— Gay's 476.
— gelbflügeliger 471.
— gelbgestreifter 476.
— gelbkehliger 478.
— gelbschnäbliger 475.
— Gesellschafts- 457. 459.
— gestreifter 473.
— Gras- 471.
— graurückiger 473.
— grünscheitliger 475.
— grünsteißiger 478.
— Grund-, Albert's 481.
— Grund-, Baird's 481.
— Grund-, brauner 482.
— Grund-, gefleckter 481.
— Grund-, grüner 482.
— Grund-, grünschwänziger 482.
— **Grund-, rothäugiger** 479.
— Grund-, rothbrauner 482.
— **Grund-, weißschultriger** 481.
— **Halsband-** 474.
— **Harris'** 468.
— **Henslow's** 472.
— **Herrmann's** 463.
— keilschwänziger 475.
— kohlschwarzer 476.
— Kron- 467.
— Lecontr's 472.
— Lerchen- 476.
— Linkoln's 464.
— mit braunem Nacken 475.
— mit weißer Krone 467.
— **Morgen-** 468.
— nordischer 471.
— olivengrüner 474.
— Plata- 474.
— rothbrauner 475.

Ammerſperling, rother 464.
— rothkäppiger 474.
— rothſcheiteliger 474.
— Samuel's 472.
— **Savannen-** 470.
— ſchiefergrauer 473.
— ſchwarzbrilliger 478.
— ſchwarzgeſichtiger 475.
— ſchwarzkehliger 460.
— ſchwarzköpfiger 478
— ſchwarzrother 473.
— ſchwarzweißer 474.
— **Sing-** 460. 463.
— Sommer- 474.
— ſpitzſchwänziger 472.
— ſtiller 475.
— Strand- 472.
— Strauch- 476.
— Trug- 464.
— von Bolivien 470.
— weißbrilliger 478.
— weißbrüſtiger 473.
— weißgekrönter 465.
— **weißkehliger** 466.
— weißnackiger 478.
— weißohriger 478.
— weißſtirniger 478.
— **Winter-** 451.
— Winter-, braunſchulteriger 456.
— Winter-, grauer 457.
— Winter-, grauköpfiger 457.
— Winter-, vom Oregon 456.
— zimmtfarbner 478.
— zweifſtreifiger 473.
— Zwerg- 460.
Ammerweber 254. 274. 275.
— gelbköpfiger 275.
— geſtrichelter 275.
Ammodromus 437.
— Macgillivrayi 472.
— Xanthornus 472.
Ammomanes fraterculus 617.
— phoenicura 617.
Amſel-Ammerſperling 475.
Amſel, braſilianiſche 645.
— mit rother Bruſt 647.
Angolagimpel 364.
Angolahänfling 363. 364.
Angolaſpaz 439.
Annomanes cinnamomea 628.
Araguira 422.
— à huppe grise 422.
— ensanglanté 422.
Arco-iris 435.
Argoondawachteln 410.
Arkanſaszeiſig 395.
Arremon conirostris 475.
— frontalis 475.
— gigantéus 575.
— torquatus 475.
Aſtúr el hadjar 511.
Astra:alinus columbianus 397.
— mexicanus 398.
— tristis 392.
— Yarrelli 398.
Astric 43.
Aſtrild, Aurora- 117. 118.
— **Binſen-** 123. 124.
— **blauer** 93. 99.
— blauer rothbäckiger 93.
— Blut- 35.
— **Bronze-** 668.
Aſtrild, Bunt- 102. 101. 674. 675.
— **Ceres-** 114. 116.
— **Dorn-** 35. 108. 111.
— dreifarbiger 101.
— **dunkelrother** 89. 91. 670.
— gelbbäckiger 48.
— **gelbgrüner** 56. 71. 75.
— gelbwangiger 55.
— **gemalter** 122. 123. 677.
— **getigerter** 61. 73.
— **gewellter** 28. 37. 43. 49.
— Gitter- 122.
— **goldbrüſtiger** 76. 81.
— goldgelber 67. 76.
— **granatrother** 100. 101. 674.
— Grau- 35.
— **grauer** 20. 32. 36. 43. 54.
— großer 49.
— grüner 56.
— Hartlaub's 92.
— Karmin- 35.
— **kleiner rother** 82. 87.
— **Larven-** 91. 672.
— **orangebäckiger** 51. 55.
— **Rebhuhn-** 105.
— Reichenow's 92.
— **Ringel-** 35. 108. 119. 121. 677.
— rothbärtiger 50.
— Rothbauch- 49.
— rothbäuchiger 49.
— **rothbrüſtiger** 88. 89. 669.
— **rother Dühring's** 671. 672.
— **rother, gepunkteter** 669.
— **rothſchwänziger** 59. 63.
— rothrückiger 105.
— **ſchwarzbäckiger** 57. 58.
— ſchwarzkehliger 92. 105.
— **ſchwarzköpfiger** 56.
— ſchwarzſchwänziger 50.
— **Sonnen-** 111. 113. 676.
— Streifen- 119.
— Sumpf- 55.
— **Wachtel-** 107.
— weinrother 92. 673.
— **Wiener's** 674.
— Zügel- 50. 668.
Astrild 49.
— à barbe rouge 51.
— à moustaches noires 105.
— ash-coloured 43.
— à ventre orange 81.
— à ventre rouge 50.
— blauwe 99.
— bridé 50.
— bridled 50.
— de Bichenow 122.
— de St. Hélène 49.
— du Sénégal 49.
— gris 43.
Astrild ondulé 49.
— ordinaire 43.
— perdrix 107.
— rod-bearded 51.
— roode venkbrow- 111.
roodstart-, kleine 63.
Astrilda 27. 35.
— cinerea 43.
— undulata 49.
— viridis 56.
Aſtrilde 27. 29.
— Dorn- 107.
— eigentliche 35.
— Schmetterlings- 93.
— Wachtel- 105.
Atlapotes rubricatus 478.
Atlasfink 422. 424.
Atlasvogel 198. 201. 422.
Atlas-Widafink 491.
Augenbrauen-Philagrus 278.
Augenbrauen-Sperlingsweber 276.
Auripasser aurantiiventris 401.
— lutea 448.
— luteus 448.
Aurora-Aſtrild 117.
Aurora-Senegall, Rothflügel- 118.
— weißſeitiger 75.
— zierlicher 104.
Aurora-Senegaliſt 81.
Auroravögelchen 81.
Avis rubra 539.
Azulam 558.
Azulejo 430.
— real 557.
Azulinha 99.
Azulito 430.
— de alpiste 430.
Azulleros 430.
Azullexos 430.

B.

Bänderbürzelfink 114.
Bänderſchwanzfink, braunwangiger 173.
Bagheiri 614.
Bai-Ling 610.
Bandamandine 127. 132. 134.
Bandbürzler, braunöhriger 173.
Bandelette 147.
Bandfink 19. 20. 127. 132.
Bandvogel 127. 132.
Band-vogeltje 132.
Bartfink 183. 185.
Bartgirlitz 378.
Bartvogel, grüner 679.
Bartzitronfink 400.
Baſtard von Band- und Rothkopf-Amand. 134.
— getigertem u. Schmetterlingsaſtrild 72.
— gewelltem und orangebäckigem Aſtrild 48.
— gewelltem und grauem Aſtrild 48.
— gewelltem und orangebäckigem Aſtrild 48.
— gewelltem u. Schmetterlingsaſtrild 48.
— gewelltem Aſtrild und Silberſchnabelamandine 49.
— grauem und orangebäckigem Aſtrild 41.
Baſtard von kleiner Elſteramandine und braunbuntem japaneſiſchen Mövchen 147.
— kleiner und zweifarbiger Elſteramandine 147.
— Graugirlitz u. Kanarienvogel 359.
— Graugirlitz und Hartlaubszeiſig 360.
— Hartlaubszeiſig und Graugirlitz 360. 373.
— weißbürzeligem u. gelbbürzeligem Graugirlitz 360. 364.
— Rothgirlitz und Kanarienvogel 382.
— rothſchwänzigem und kleinem rothen Aſtrild 62.
— Silberſchnabel- und Malabar-Amandine 157.
— Trauerzeiſig u. Kanarienvogel 391.
— ſchwarzköpfigem Zeiſig u. Kanarienvogel 385.
Baſtardhabia 573.
Baſtardzeiſig 399.
Batevio 561.
Bathilda, rothſchwänzige 124.
Bathilda urficauda 124.
Bauernammer 588.
Baumſperling 442. 459.
Bawi 274.
Baya 274.
— Bamani 275.
— Brahminee 275.
Baya-Nelikurvi 274.
Baya, Shore 275.
Bayaweber, bengaliſcher 265. 275.
— braunhalſiger 275.
Baya-Webervogel 265. 274. 683.
Bayaweber, eigentlicher 266. 271.
Baya-Webervogel, gelbbrüſtiger 267. 275. 683.
Baya-Webervogel, olivengrüner 276.
Bec d'argent 158. 617.
Bec de corail 261.
Bec de corail ordinaire 43.
Bec de plomb 159.
Bec-rond 557.
— noir et blanc 559.
— violet de la Caroline 491.
Bengalenweber 275.
Bengalen-Webervogel 265. 275.
Bengali 94.
— blanc 155.
— blauwe 99.
— grey 155.
— brun 69.
— cendré 87.
— cordon-bleu 99.
— grisbleu 59. 63.
— moucheté 173.
— nanking 155.
— panaché 155.
— piqueté 69. 73.
— vert 56.
— white 155.
— yellow 155.
Bengaliſt 56. 275.
— blauer 99.
— getigerter 73.

Bengaliſt, grüner 75.
Bengaliſten 25.
— gelbbunte 155.
— graubunte 155.
— ſchneeweiße 155.
— ſchwarzbunte 155.
Benguéli à joues oranges 55.
— grisbleu 63.
— zebré 81.
Bengueli cinereous 63.
— crimson-eared 99.
Benguelift 99.
Benguelißten 25.
Bergammer 600.
Bergammerfink 459.
Berg-Ammerſperling 459.
Berg-Diamant 123.
Berg-Kanarienvogel 376. 383.
Berglerche 624.
— ruſſiſche 624.
Bergſperling 443.

Berichtigungen 688.

Betylus picatus 575.
Bhatul 626.
Bindenkehlſpaz 446.
Binglis 191.

Binſenaſtrild 123.

Bildammer 601.
Bird, Canary- 350.
— chipping 457.
— Coury- 160.
— Indigo- 430.
— Red- 539.
— Snow-, american 456.
— Snow-, black 456.
— Snow-, common 456.
— Snow-, grey-headed 457.
— Snow-, mexican 457.
— Snow-, Oregon 456.
— Thistle- 392.
— yellow 392.
Biſchof 426. 557. 662.
— blauer 557.
— dunkelblauer 554. 558.
— hellblauer 554. 685.
— ſchwarzblauer 558.
— ſchwarzer 559.
Bishop, black 559.
— blue 557.
— blue brazilian 558.
Black-bird, red-breasted 647.
Bläßchen 567.
Blaßammerfink 460.
Blauaſtrild 99.
Blaubändchen 99.
Blaufink, guianiſcher 557.
Blauflügeltangara 659.
Blaugimpelfink 558.
Blauhänfling 430.
Blaukernbeißer 557.
Blaupfäffchen 570.
Blauvogel 430.
Bleiſchnäbelchen 561.
Bluet 662.
Blutaſtrild 82. 87.
Blutfink 83.
Blutknacker 193.
Blutſchnabel 261.
Blutſchnabelweber 248. 261. 681.
— äthiopiſcher 261. 681.
Bluttangara 648.
Bodenfink 481.
Bondol 165. 167.
Bogenſchnabellerche 618.
Bourion 494.
Bouriones 493.
Bouton d'or 407.
Bouvreuil bicolor 418.
Bouvreuil bleu d'Amérique 557.
— bleu de la Caroline 557.
— de la désert 511.
— de l'isle de Bourbon 568.
— du Cap de bonne espérance 381. 383.
— noir du Mexique 559.
— noir et blanc 559.
— olive 415.
— olivert 417.
— pin 501.
— pourpre 491.
— rougeâtre 488.
— sincerini 415. 417.
— violet de la Caroline
Brachonyx crepitans 629.
Brandweber 246.
Braunnackenhabia 475.
Breitſchwanzwida 220.
Breitſchwanzwitwe 220.
Brillenpfäffchen 570.
Brillenweber 295.

Brillen-Webervogel 294. 295.

Bronze-Amandine, geſtreifte 151.
— **ſchwarzbürzelige** 153.
— **ſpitzſchwänzige** 153.
— weißbäuchige 153.

Bronzeaſtrild 668.

Bronzemännchen 151. 154. 169.
— geſtreiftes 151 678.
— ſpitzſchwänziges 153. 678.
— ſchwarzbürzeliges 153.
Bronze-Manikin of Africa 148.
Bruant de Brésil 407.
Bruchſperling 464.
Buarremon xanthogenys 475.
Bubalornis niger 318.
Bucanetes 484.
— githagineus 511.

Büffelweber 315.

— roſaſchnäbliger 318.

Büffel-Webervogel 318.

— hellſchnäbliger 317.
— weißköpfiger 318.
Bullfinch, black 559.
— China 435.
— Desert 511.
— little black 559.
— purple 491.
— red-headed 502.
— rosy 490.

Buntaſtrild 102. 674.

Buntfarbenfink 437.
Buntfink, gemalter 123.
Buntkehle 374.
Bunting american 596.
— bay-winged 471
— black-crested 599.
— black-crowned 468.
— black-faced 262.
— black-headed 594.
— black-throated 596.
— blue 430.
— brown-headed 592.
— Cape 580. 582.
— Carmine 488.
— chestnut-collared 601.
— clay-colored 460.
— dominican 211.
— dyed 580.
— elegant 583.
— Golden, sibirian 579.
Bunting Goura 599.
— grey-capped 583.
— Henslow's 472.
— Indigo- 430.
— Kirwa 614.
— Lark- 597.
— Leconte's 472.
— long-tailed 211.
— masked 582.
— orange-shouldered 215.
— painted 435.
— panayan 216.
— red-backed 588.
— red-headed 592.
— red-rumped 58. 191.
— shaft-tailed 213.
— Smith' 601.
— striated 582.
— Unalaschka 471.
— variegated 211.
— white-winged 597.
— yellow-bellied 580.
— yellow-breasted 579.
— yellow-browed 583.
Burung prit 169.
Buſchammer 583.
Buſchlerche 627.
Buſchwaldlerche 626.
Buserinus Selbyi 367.
Bush-Lark, Horsfield's 628.
— Madras 627.
Butterfink 348.
Buttergimpel 370.

C.

Çalandra 607.
— nigra 609.
Calandre 607.
Calandrella ruficeps 611.
Calandritis sibirica 611.
Calandron 607.
Calfat 141.
Calliſpiza brasiliensis 667.
— festiva 666.
— flava 667.
— tatao 664.
— tricolor 666.
Calliste brasiliensis 667.
— fastuosa 664.
— festiva 666.
— flava 667.
— melanota 666.
— peruviana 666.
— tatao 664.
— tricolor 666.
Calyphantria 246.
— Algondae 253.
— comorensis 253.
— eminentissima 252.
— erythrops 264.
— flavicans 254.
— haematocephala 265.
— madagascariensis 251.
Calyptrophorus cucullatus 548.
— dominicanus 549.
— gularis 550.
Canari 350.
Canariam aviculam 344.
Canario 329. 344. 407.
— de campo 339.
— de fora 339.
— de terra 339.
Canary-bird 350.
Canary-finch 350.
— Cape 366.
Cap-more 288.
Capi 574.
Capitaine d'Orénoque 102.
Capucin à tête blanche 165.
— à tête noire 168.
Cardenal acamisado 655.
— de alas negras 653.
Cardinal 422.
— amarillo 553.
— black-crested 553.
— black-throated 550.
— brown-throated 550.
— dominicain 549.
— dominicain huppé de la Louisiane 548.
— dominican 549.
— dominiquain 549.
— à gorge brune 550.
— à gorge noire 550.
— gris huppé rouge 548.
— Grosbeak 539.
— huppé 539.
— Paroare 549.
— pourpré foncé 647.
— red-crested 548.
— red-headed 550.
— rouge 539.
— rose du Sénégal 262.
— à tête rouge 550.
— de Virginie 539.
— yellow-billed 550.
Cardinalin 240.
Cardinaline 254.
Cardinalis 514.
— angolensis 135.
— canadensis 653.
— capitata 550.
— cristatella 553.
— cucullatus 548.
— dominicanus 549.
— gularis 550.
— larvatus 549.
— madagascariensis 251
— obscurus 425.
— phoeniceus 541.
— purpureus 647.
— virginianus 539.
Carduelis 401.
— americana 392.
— atrata 397.
— brasiliana 425.
— canicops 408.
— columbianus 397.
— cucullatus 386.
— Lawrencii 398.
— lutea 448.
— luxuosus 437.
— magellanica 394.
— magellanicus 394.
— mexicanus 398.
— notata 396.
— obscurus 425.
— pinus 394.
— psaltria 395.
— rufogularis 473.
— spinoides 399.
— Stanleyi 396.
— tristis 392.
— Yarrelli 398.
Carpódacus 484.
— californicus 492.
— erythrinus 488.
— githagineus 511.
— grandis 495.
— Paraudaei 511.
— purpureus 491.
— Sophia 495.
— synoicus 495.
Carpospiza brachydactyla 444.
— longipennis 444.
Caryothraustes brasiliensis 523.
— viridis 523.

Ceresaſtrild 114.

Certhilauda Doriae 630.

Certhilauda meridionalis 630.
Chaffinch, algerian 402.
Chak Bharal 633.
Chalandra 607.
Chalandria 607.
Chanchito 476.
Chanteur d'Afrique 356. 362. 367.
— d'Angola 364.
— du Brésil 407.
— du Cap 366.
— de Cuba 414. 415.
— de Cuba, grand 417.
— de Jamaica 418.
— de Mozambique 373.
— Sénégali 362.
Chardonneret acalanthe 192.
— d'Amérique 392.
— du Canada 392.
— à front d'or 407.
— jaune 392.
— triste 392.
— à ventre jaune 409.
— vert 674.
Cheendola 627.
Chera caffra 215.
— Progne 215.
Chewink 481.
Chiltototl 646.
Chilchiltototi 647.
— tepazcululu 647.
Chingol 469.
Chingolino 469.
Chingolo 469.
Chinchilita 417.
Chindora 274.
Chincſe 168.
Chineſerfink 168.
Chinna Eeli-jitta 627.
Chipiu 409.
— negro y blanca 474.
— negro y canela 473.
Chirique 381.
Chloëbia Gouldiae 188.
— mirabilis 189.
Chloris bahamensis 419.
— indica 373.
— kawariba minor 401.
— sinica 401.
Chlorospiza auranti-ventris 401.
— plumbea 476.
— sinica 401.
— spinoides 399.
Chondestes 437.
— strigatus 473.
Chorga 160.
Chrysomitris 384.
— atrata 396.
— campestris 400.
— capitalis 395.
— columbiana 397.
— columbianus 397.
— flavospecularis 400.
— icterica 395.
— Lawrencei 398.
— Lawrencii 398.
— macroptera 394.
— magellanica 394. 396. 400.
— magellanicus 395.
— marginalis 400.
— mexicana 396.
— mexicanus 398.
— notata 396.
— pinus 394.
— psaltria 395.
— spinescens 396.
— spinoides 399.
— Stanleyi 396.
— tristis 392.
— uropygialis 396.
Chrycomitris xanthogastra 397.
— Yarrelli 398.
Chrysospiza cuchlora 448.
— lutea 448.
Churchura 160.
Cissopsis bicolor 575.
Citrinella 384.
— barbata 400.
— citrinelloides 400.
— Lawrenci 398.
melanops 400.
— nigriceps 400.
Citrinelle 398.
Citronvögelchen 81.
Coccoborus 514.
Coccoborus coeruleus 557.
— cyaneus 558.
— ludovicianus 522.
— magnirostris 561.
— melanocephalus 523.
— torridus 561.
Coccopsis gularis 550.
Coccopygia Dufresni 58.
Coccothrauste masqué 515.
— du Mexique 523.
— à poitrine rose 522.
— à queue mélaïne 516.
— vert 523.
Coccothraustes 514.
— **aiboguiaris** 569. 685.
— **ater** 576.
— **atriceps** 575.
— **atricollis** 574.
— aurantiirostris 576.
— **aurantius** 567. 568.
— **aureoventris** 524.
— Azárae 575.
— **bicolor** 568.
— brasiliensis 523. 549.
— **Brissoni** 554. 558.
— caeruleus 557.
— **caesius** 574.
— cantans 158.
— capensis 236.
— **capitatus** 541. 550.
— cardinalis 539.
— **carnipes** 516.
— cayanensis 523.
— cinnamomeus 570.
— coerulescens 570. 573.
— **coerúleus** 554. 557. 685.
— **collarius** 566. 685.
— **concolor** 570.
— **crassirostris** 561.
— cristata 539.
— **cristatellinus** 554.
— **cristatellus** 550. 553.
— chrysocephala 275.
— **chrysopepius** 524.
— **cucullatus** 541. 549.
— cyaneus 558.
— **diadematus** 575.
— **dominicanus** 541. 549.
— erythrina 488.
— **Euleri** 571. 572.
— falcirostris 571.
— **flabéllifer** 570.
— fortirostris 516.
— **fuliginosus** 573.
— gambiensis 288.
— **gigantódes** 575.
— **glaucocoeruleus** 558.
— **grossus** 574.
— **gularis** 511. 550.
— **gutturalis** 569.
Coccothraustes Hoffmanni 568.
— **hypoleucus** 565. 585.
— **hypoxanthus** 570.
— **icteroides** 516.
— indica cristata 539.
— **intermedius** 563. 564. 685.
— **japonicus** 576.
— javensis 170.
— leucocephalus 575.
— **leucopsis** 572. 685.
— **leucophaeus** 575.
— **Leverianus** 575.
— **linéola** 567. 685.
— **lineatus** 569.
— **luctuosus** 568.
— ludoviciana 522.
— **ludovicianus** 516.
— **magnirostris** 524.
— **magnus** 574.
— **major** 575.
— **maxillosus** 574.
— **Maximiliani** 561.
— melanocephala 523.
— **melanocéphalus** 523. 566.
— **melanógenys** 550.
— **melanoxanthus** 516.
— melanura 516.
— **melanúrus** 515. 685.
— **minor** 575.
— minutus 570.
— **mitratus** 570.
— **moestus** 570.
— **Morelleti** 572.
— multicolor 576.
— **niger** 558. 560.
— nigrorufus 570.
— occipitalis 575.
— **ochropygus** 572.
— **oliváceus** 574.
— ophthalmicus 570.
— **orenocensis** 575.
— **ornatus** 562. 563. 685.
— oryzivora 141.
— oryx 245.
— **pectoralis** 568.
— **personatus** 514. 515.
— **phoeniceus** 540. 685.
— **plúmbeus** 564. 565. 685.
poliogaster 524.
— rosea 488.
— rubricollis 522.
— ruficollis 570.
— rufiventris 561.
— sanguinirostris 261.
— scutatus 148.
— speculigerus 516.
— **similis** 574.
— sinensis 168.
— sinensis cinera 141.
— **sinuatus** 541.
— sulphuratus 377.
— telasco 570.
— **tibialis** 523.
— **torridus** 560.
— **virginianus** 524. 539. 540.
— viridis 523.
Coccothraustinae 513.
Cola aguda encuentro amarillo 475.
Colluspasser torquatus 220.
Comba-Sou 201.
— brillant 201.
Combasso 201.
Combassou 201.
Commándeur, Bruant 553.
— cristatelle 553.
Coraphités albifrons 633.
Coraphites leucotis 632.
— nigriceps 633.
Cordon bleu 93. 99.
Coury Bird 160.
Corydalos 607.
Corydalus galerita 607.
Coryphospingus 401.
— cristatus 422.
— cruentus 422.
— griseocristatus 422.
— pileatus 421.
Corythus enucleator 501.
Coturniculus 437.
Cou-coupé 132. 133.
Crestudo amarillo 553.
— roxo 548.
Crithagra 326. 370.
— angolensis 364.
— barbata 378.
— bistrigata 383.
— brasiliensis 407.
— brevirostris 381.
— butyracea 373.
— canaria 350.
— canicollis 366.
— capistrata 379.
— chloropsis 379.
— chrysopyga 373. 378.
— cinerea 368.
— flava 376.
— flaviventris 376.
— flavivertex 379.
— Hartlaubi 369.
— Hartlaubii 373.
— Hilarii 409.
— imberbis 400.
— leucopygia 362.
— mossambica 373.
— musica 362.
— nigriceps 400.
— ruficauda 383.
— Selbyi 368.
— sulfurata 368. 377.
— sulphurata 377.
— striolata 380.
Crithologus 326.
— Alario 388.
Croissant 439.
Crucculeu de monti 444.
Cyacu 661.
Cyanoloxia coerulea 557.
Cyanospiza 401.
— amoena 437.
— ciris 435.
— cyanea 430.
— versicolor 437.
Culassade 607.

D.

Decora 633.
Degollado 522.
Dermophrys 163.
— ferruginea 167.
— flaviprymnus 172.
— Maja 165
— malacca 170.
Dertroides albirostris 317.
Dhubuk Chari 633.
Dhulo Chata 633.
Diabemfink, blauer 575.
Diadem-Papageifink 575.
Diamant 180.
— **Amandine** 177. 180

Diamant-Fink 126. 180.
— -Sperling 180.
— -Vogel 28. 177. 180.
Diamant à bavette 185.
— à bavette châtaine 171.
— brun 171.
— ordinaire 180.
— zébré 173.
Diamantfink 678.
Diamantvogeltje 180.
Diamantvögel 172.
Diamond-Sparrow 180.
Dickſchnabel, rother 539.
— virginiſcher 539.
Dickſchnabellerche 619.
Dickſchnäbler, blauer 557.
Dinemellia leucocephala 319.
Dinemellina, weißköpfige 319.
Dioch 255. 261.
— roſenrother 261.
— rothbäuchiger 261.
— rothköpfiger 263.
— rothſchnäbliger 257.
Dioch à tête rouge 261.
— rose 256. 262.
Diſtelfink, amerikaniſcher 392.
— blauer 430.
— blauköpfiger 435.
Distelvink, amerikaansche 392.
Diuka-Ammerſperling 477. 685.
— gebänderter 478.
— aus Bolivien 478.
Diuca fasciata 478.
Diucopsis leucophaea 575.
Dominikaner 549.
Dominikaner-Kardinal 549.
Dominikaner-Kernbeißer 549.
Dominikaner-Wida 197.
Dominikaner-Widafink 208. 210.
Dominikanerammer 210.
Dominikanerwitwe 198. 208. 210.
Domino 151. 152. 153. 160. 162.
Donacola bivittata 171.
— castaneothorax 171.
— flaviprymna 172.
— pectoralis 172.
Doppelfarb 149.
Doppelbornlerche 625.
Doppelweber 288.
Dornaſtrild 108. 111.
— Augenbrauen- 111.
Dornaſtrilde 107.
Dos rouge 655.
Dreifarbentangara 665.
Droſſellerche 619.
Dryospiza canaria 350.
— leucopygia 362.
— leucopygos 362.
— nigriceps 400.
Dumbeea 192.
Düſterpfäffchen 570.
Duree 633.
Dwér-den-ngool-gnánneer 183.

E.

Ecailleux 450.
Edelfink 401.
— grauer 632.
— von Algier 402. 684.
Edelſchläger 362.
Edelweber 225. 280.
Einführung 1.
Eiſammer 600.
Elet 218.
Elégante 104.
Elſter-Amandinen 143.
— gitterflügelige 149. 150.
— **größte** 143. 144. 678.
— **kleine** 145. 147. 678.
— rothrückige 150.
— **zweifarbige** 148. 149.
— Zwerg- 150.
Elſterchen 20.
— doppeltes 143.
— Glanz- 147. 149.
— größtes 144.
— kleinſtes 145. 147. 678.
— Kutten- 144.
— Rieſen- 143. 144.
Elſterling 575.
Elſtervögel 143.
Elſtervögelchen 77 130.
Elſtervogel 147. 169.
Emberiza affinis 580.
— albicollis 580.
— Alleoni 591.
— **americana** 594. 597.
— amoena 437.
— araguira 422.
— arctica 471.
— ardens 216.
— atricapilla 468.
— **auréola** 578. 579.
— auriceps 354.
— **bicolor** 597.
— Bonapartei 587.
— borealis 588.
— brasiliensis 407.
— brunniceps 592.
— Buchanani 591.
— **Cabanisi** 580.
— **caesia** 589. 590.
— caffrariensis 582.
— caniceps 583.
— **capensis** 582.
— capistrata 581.
— caspia 591.
— castaniceps 591.
— Cerruti 591.
— chlorocephala 583.
— chrysops 471.
— **chrysophrys** 583.
— **cinérea** 590.
— cinerácea 590.
— cioides 591.
— ciopsis 591.
— ciris 435.
— coerulea 430.
— cristata 599.
— cristatella 553.
— cyanea 430.
— cyanella 430.
— dominicensis 417.
— **elegans** 583.
— erythrophthalma 481.
— erythroptera 582. 599.
— esclavonica 587.
— flaveola 407.
— flavigastra 580.
— **flaviventris** 580.
— **fucata** 579.
— Giglioli 591.
— glacialis 600.
— granativora 594.
— griseo-cristata 422.
— gubernatrix 553.
— guttata 476.
— hortulana, *var.* 590.
— Huttoni 591.
Emberiza hyemalis 456.
— icterica 592.
— **impetuani** 589.
— intermedia 591.
— jacarini 425.
— **lapponica** 600. 686.
— Lathami 599.
— lesbia 580. 588.
— leucocéphala 587.
— longicauda 215.
— luctuosa 476.
— **lutéola** 591. 592. 685.
— **Maccowni** 601.
— **melanictera** 597. 599.
— **melanocéphala** 592. 594
— **melanóma** 601.
— melanops 583.
— meridionalis 591.
— mexicana 597.
— montana 600.
Emberiza mustelina 600.
— nipalensis 599.
— **nivalis** 600.
— oinops 589.
— olivacea 417.
— ornata 601.
— oryx 245.
— **Pallasi** 591.
— pallida 460.
— palustris 591.
— panayensis 216.
— paradisea 207.
— passerina 591.
— **picta** 600.
— **personata** 582. 592. 601.
— **pityornis** 584. 587.
— polaris 591.
— principalis 211.
— **pusilla** 588.
— **pyrrhuloides** 590. 591.
— quadricolor 191.
— quelea 261.
— **Quelea** 262.
— quinquelineata 589.
— quinquevittata 580.
— rubra 254.
— rufibarba 590.
— ruficapilla 421.
— rufigularis 590.
— **rústica** 588
— **rútila** 587.
— **Sáharae** 582.
— septemstriata 581.
— serena 211.
— schoenicius, *var.* β. 591.
— shah 591.
— Shattuckii 460.
— sibirica 579.
— signata 216.
— socialis 459.
— sordida 589.
— **spodiocéphala** 582. 583.
— **Stewarti** 583.
— Stracheyi 591.
— **striolata** 581.
— suberistata 599.
— **tahapisi** 581.
— **Townsendi** 597.
— **Tristrami** 589.
— unalaschcensis 475.
— **variabilis** 589.
— vidua 211.
— xanthogastra 580.
Emberizinae 577.
Emberizoides marginalis 475.
— poliocephalus 474.
Embernagra 437.
— dumetorum 474.
— **macroura** 475.
— torquata 475.
Emblema picta 123.
Emmerlingsvogel braſilianiſcher 407.
Enucleator indicus 539.
Eophona melanura 516.
— personata 515.
Epaulettenwitwe 215.
— kurzſchwänzige 221.
Episcopus 662.
— avis 662.
Erd-Ammerſperling 475.
Eremóphila cornuta 624.
Ergänzungen 668.
Erythrospiza erythrina 488.
— **frontalis** 493.
— **githaginea** 511.
— **obsoleta** 512.
— **phoenicoptera** 495.
— purpurea 491.
Erythrothorax albifrons 490.
— rubrifrons 488.
Erythrura 189.
— cyanovirens 192.
— Kittlitzii 191.
— psittacea 192.
— trichroa 192.
— viridis 191.
Erzamandine, kleine 147.
Erzpfäffchen 566. 685.
Erzweber 254.
Estrelda 35.
— amandava 73.
— astrild 49.
— atricapilla 57.
— bella 182.
— benghala 99.
— Bichenovii 122.
— cinerea 43.
— coerulescens 63.
— coerulescens ex Mozambique 63.
— Dufresnei 58.
— erythroptera 119.
— formosa 75.
— frontalis 450.
— granatina 102.
— lateralis 75.
— lateritia 89.
— margaritata 673.
— melanogastra 63.
— minima 88.
— modesta 116.
— musica 362.
— mystacea 69.
— nigricollis 92.
— paludicola 56.
— Perreini 63.
— Phaëthon 113.
— phoenicotis 99.
— polyzona 107.
— psittacea 192.
— punicea 73.
— rubricata 91.
— rubriventris 43. 49.
— ruficauda 124.
— rufopicta 89.
— Russi 668.
— sanguinolenta 81.
— squamifrons 450.
— subflava 81.
— temporalis 111.
— trichura 192.
— vinacea 92.
— viridis 56.
Estrilda 35.
— elegans 104.
— incana 68.

Estrilda melanogenys 58.
— melpoda 55.
— minima 88.
— rufibarba 51.
Euethia 401.
bicolor 419.
— canora 415.
— lepida 417.
— pusilla 418.
Euodice cantans 158.
— malabarica 160.
Euphone jacarina 425.
Euplectes 228.
— abyssinicus 234.
— albirostris 275.
— bengalensis 275.
— capensis 236.
— craspedopterus 212.
— Edwardsi 245.
— erythrops 264.
— flammiceps 242.
— flaviceps 242. 274. 275.
— flavigula 275.
— franciscana 240.
— gregarius 262.
— habessinicus 234.
— ignicolor 240.
— lepidopterus 450
— lepidus 280.
— melanogaster 234.
— nigroventris 246.
— nigriventris 246.
— oryx 245.
— Petiti 240.
— pseudoryx 245.
— pyrrhozona 242.
— ranunculaceus 234.
— ruber 251.
— sanguinirostris 261.
— Sundevalli 245.
— Taha 235.
— xanthomelas 236.
Euspina americana 597.
Euspiza 437.
— americana 597.
— aureola 579.
— diuca 477.
— flavigularis 579.
— fucata 580.
— icterica 592.
— Lathami 599.
— luteola 592.
— melanocephala 594.
— simillima 594.
Evêque bleu 557.
— bleu de ciel 558.
— de Cayenne 662.
— noir 559.

F.

Farbenfink 401.
Faſänchen 43. 49.
— auſtraliſches 108. 111.
— graues 43. 49.
— großes 49.
— kleines 43.
— Malabar- 157.
— orangebäckiges 55.
Feinweber 307.
— augenſtreifiger 295.
— orangefarbiger 301.
— Prinz- 294.
Feldammerfink 460.
Feldammerſperling 476.
Feldgimpel 326. 370.
Feldſperling 460.
Felſenammer 579.
Felſenſperling 437.
Feuerfink 228.
— doppelter 243.
— Swainſon's flammenköpfiger 242.
Feuerfink, Franziskaner- 240.
— großer 243.
— großer gelber 236.
— rothſchwänziger 245.
Feuerſchwanz 182.
Feuerſchwanz-Amandine 181. 182. 678.
Feuertangara 655.
Feuervögelchen 87.
Feuerweber 225. 228.
— **abeſſiniſcher, gelber** 235.
Fichtenammer 584. 587.
Fichtengimpel 501.
Fichtenhacker 501.
Fichtenzeiſig 393. 394.
Finch, Alario 383.
— Angola 364.
— Arcansas 395.
— Bachman's 474.
— Bichenow's 122.
— black-collared 234.
— black-headed 168. 169. 170.
— Bell's 473.
— Blanding's 482.
— blue-bellied 99.
— bluish 564.
— chestnut-breasted 171.
— chestnut-eared 171. 173.
— crimson 113.
— Cut-throat 132.
— Diuca 477.
— double-banded 122.
— duree 633.
— dusky 418.
— Dwarf 81.
— fasciated 132.
— fire-tailed 182. 191.
— glossy 201.
— golden 392.
— goura 599.
— Grass-, banded 185.
— Grass-, beautiful 189.
— Grass-, long-tailed 186.
— Grass-, masked 187.
— Grass-, modest 116.
— Grass-, pied 144.
— Grass-, white-eared 188.
— Ground-, red-eyed 481.
— half-white 565.
— Harris' 468.
— Hause-, american 494.
— hooded 147.
— Jacarini 424.
— Lark 473. 626.
— Lark, black-bellied 633.
— Lazuli 437.
— Lincoln's 464.
— lined 567.
— Maja 165.
— Maja, javan 167.
— melodious 415.
— Mountain 459.
— Nonpareil 435.
— Nonpareil-, Lazuli 427.
— Nonpareil, many-colored 137.
— Olive 517.
— ornamented 563.
— Ortolan, Squat 633.
— painted 123. 435.
— Parrot- 192.
— pileated 421.
— Pine 394. 501.
— plain-colored 116.
— Purple 491.
— Purple, western 492.
Finch, Quail 107.
— red 113.
— red-crested 422.
— red-crowned 422.
— red-eared 183.
— red-eyebrowed 111.
— red-headed 254.
— red-pileated 421.
— red-tailed 124.
— ruddy 488.
— saffron 407.
— Seaside 472.
— Seed-, tropical 561.
— sharp-tailed 153. 472.
— singing 362.
— spotted-sided 180.
— striated 151.
— Summer- 474.
— Temporal- 111.
— Tooty- 488.
— Ultramarine 201.
— Weaver-, black-eared 58.
— Weaver-, carmin 73.
— Weaver-, Amanduvade 73.
— white breasted 72.
— white eyebrowed 467.
— white-headed 165. 177.
— white-throated 569.
— Yellow 373.
— yellow-bellied 409.
— yellow-throated 597
— Zebra 177.
Fink, amerikaniſcher 435.
— angoliſcher 364.
— **Atlas-** 422. 424.
— Bänderbürzel- 116.
— blaßköpfiger 177.
— Brand- 488.
— buttergelber 373.
— dreifarbiger 435.
— Edel-, von Algier 402. 684.
feuerſchwänziger 182.
— fuchsfarbiger 474.
— Grün-, chineſiſcher 400. 684.
— Haus- 494.
— Haus-, kaliforniſcher 491.
— havaniſcher 417.
— **Indigo-** 426. 430.
— **Jakarini-** 422. 424.
— Jamaika- 418.
— Kanarien- 401.
— Kappen- 147.
— karmoiſinfirniger 493.
— **Kron-, von Bolivia** 422.
— **Kron-, v. Braſilien** 421.
— **Kron-, von Ekuador** 422.
— **Kron-, von Südamerika** 419. 421.
— **Kuba-** 410. 415.
— **Kuba-, größerer** 416. 417. 684.
— Masken- 142.
— Mohrwachtel- 107.
— Nacht- 477.
— **Papſt-** 430. 435.
— **Papſt-, lieblicher** 436. 437.
— **Papſt-, vielfarbiger** 436. 437
— Purpur- 491. 493.
— rothbäuziger 481.
— mit rothbraunen Augen 481.
— rothhäubiger 488.
Fink, Rothkopf- 134.
— rothſcheiteliger 459.
— **Safran-** 403. 407.
— Safran-, kleiner 408.
— Safran-, kleinſter 408.
— Safran-, von Kolumbien 408.
— Schnee- 600.
— Sporen- 600.
— Spring-, gehäubter 425.
— Wachtel-, ſchwarzkehliger 107.
— Leyde- 402.
— Venezuela- 418.
— weißköpfiger 177.
— weißſcheiteliger 467.
Finken 324. 401.
Finkenlerche 612.
Firebird 88.
Firefinch 88.
Flachsvogel 649.
— Miſſiſippi- 655.
— ſchwarzflügeliger 653.
Flammenfink 211.
Flammen-Webervogel 241. 242.
Flax-bird 653.
Foedi 251.
Foudi 247. 251.
Foudi, rothköpfiger 251.
Foudia eminentissima 252.
— erythrocephala 254.
— erythrops 261.
— flavicans 254.
— haematocephala 265.
— madagascariensis 251.
— Martineti 254.
Franziskanerfink 240.
Fringilla 401. 437.
— **Aberti** 481.
— abyssina 234.
— aestiva 474.
— **aestivalis** 474.
— **affinis** 475.
— africana 402.
— africana macroura 207.
— **Alario** 142. 381. 383.
— **alaudina** 476.
— albeola 448.
— **albicollis** 465. 467.
— albifrons 478.
— albinucha 478.
— amandava 73.
— americana 568. 597.
— **amoena** 436. 437.
— **angolensis** 94. 99. 363. 364. 365.
— araguira 422.
— **arbórea** 442. 459.
— arctica 481.
— **arcuata** 438. 439.
— arvensis 381.
— astrild 49.
— **atrata** 397. 456.
— atricapilla 566.
— atricollis 107.
— **atrigularis** 460.
— aurantia 568.
— **aurantiiventris** 401.
— aurifrons 354. 373.
— aurocapilla 468.
— Bachmani 474.
— **Bairdi** 481.
— **barbata** 378. 400.
— bengala 94.
— bengalensis 274.
— bengalus 99.
— bella 181. 182.
— **Bellí** 473.

Fringilla **biarcuata** 478.
— Bichenovii 122.
— bicolor 418.
— **bilineata** 473.
— blandingiana 482.
— bononiensis 444.
— **brachydáctyla** 444.
— **brasiliensis** 403. 407.
— **brevirostris** 380.
— **Breweri** 460.
— Brissoni 558.
— **brunneinucha** 475.
— buccalis 51.
— **butyracea** 348. 368. 369. 373.
— **Burmeisteri** 476.
— **Cabanisi** 473.
— caffra 215.
— calcarata 600.
— campestris 394. 476.
— **canaria** 326. 350.
— canariensis 401.
— **canicapilla** 446.
— **caniceps** 402. 403. 476.
— **canicollis** 365. 366.
— **canóra** 410. 415.
— capensis 469.
— **capistrata** 379.
— capitalis 478.
— **carbonaria** 476.
— cardinalis 539.
— **Cassini** 474.
— **castanóptera** 442.
— cataloti 398.
— **caudacuta** 472.
— cayanensis 523.
— chilensis 469.
— **chloropsis** 379.
— **chlorura** 482.
— chrysomelas 314.
— chrysoptera 219.
— chrysopogon 478.
— **cinérea** 43. 457. 464.
— cinereicollis 366.
— **ciris** 430. 435.
— cisalpina 441.
— **citrinellina** 400.
— citrinelloides 400.
— coerulea 557.
— coerulescens 63.
— collaris 566.
— **columbiana** 397.
— comata 468.
— **coronata** 467.
— crassirostris 561.
— crissalis 482.
— **cristata** 421. 422.
— **cruenta** 422.
— Cubae 386.
— **cuculiata** 384. 386.
— **cyánea** 426. 430.
— dalmatica 587.
— **dentata** 444. 445. 685.
— detruncata 133.
— Devillei 478.
— diffusa 439.
— **diuca** 469. 477. 478. 685.
— dominicana 549.
— **dorsalis** 456.
— Dufresnei 59.
— effrenata 50.
— elegans 104.
— enucleator 501.
— epopoea 523.
— erythrina 488.
— erythrocephala 254.
— **erythrophthalma** 479. 481.
Fringilla erythrorhyncha 476.
— **euchlóra** 448.
— Euleri 572.
— falcirostris 572.
— **fallax** 464.
— **fasciata** 478.
— ferruginea 474.
— flammea 422.
— **flavicollis** 446. 597.
— **flavigula** 446.
— **flaviguiaris** 478.
— **flavirostris** 475.
— **flaviventris** 369. 375. 376. 378.
— **flavivertex** 379.
— flavoptera 219.
— **Frantzii** 418.
— frenata 50.
— **frontalis** 448. 450. 494.
— **fruticeti** 476.
— funerea 201.
— **fusca** 482.
— **Gamboli** 467.
— **Gayi** 476.
— georgia 464.
— githaginea 511.
— **Gouldi** 464.
— gnatho 573.
— **grámmaca** 473.
— granatina 102.
— grisea 441. 444.
— **griseocristata** 422.
— guttata 464.
— gutturalis 569.
— haemórrhoa 494.
— **Heermanni** 463.
— **Henslowi** 472.
— **hiemalis** 390. 451. 456.
— **Hilairi** 408.
— hispaniolensis 442.
— hudsonia 456.
— **humeralis** 475.
— hyemalis 456.
— hypochondria 470.
— hypoleuca 565.
— hypoxantha 570.
— ictera 373.
— icterica 395.
— ignicolor 240.
— **iliaca** 474. 685.
— **imberbis** 400. 684.
— intermedia 564.
— Italiae 441.
— **italica** 411.
— **jacarina** 422. 425.
— **jagoënsis** 412.
— jugularis 446.
— **juncorum** 460.
— kawariba 401.
— lapponica 600.
— **lateralis** 473.
— Lathami 180.
— laticauda 220.
— **Lawrencei** 398.
— lazulina 437.
— **Lecontei** 472.
— **lépida** 416. 417. 684.
— **lepidóptera** 450.
— leucocephala 180.
— lenconota 1:2.
— **leúcophrys** 465. 467.
— leucopógon 563.
— leucopygos 362.
— **leucótis** 478.
— leucura 444.
— **Lichtensteini** 396.
— **Lincolni** 464.
— lineola 567.
— lippa 55.
Fringilla littoralis 472.
— longirostris 288.
— ludoviciana 522.
— **lútea** 446. 448. 685.
— **luteiventris** 409. 410.
— luteola 314.
— macrocerca 218.
— mácronyx 482.
— **maculata** 481. 523.
— **magellanica** 394. 395. 396. 684.
— Maja 165.
— majanoïdes 167.
— **manimbe** 472.
— Manyar 270.
— **marginalis** 399. 684.
— mariposa 435.
— **maritima** 472.
— **matutina** 468. 469.
— melanictera 599.
— melanocephala 523.
— **melanoleuca** 474.
— **mélanops** 400.
— **melanotis** 475.
— melanoxantha 398.
— melanura 516.
— melba 104.
— **melódia** 460. 463.
— melpoda 55.
— meruloides 475.
— **mexicana** 397. 398.
— minima 88.
— molybdocephala 322.
— **monticola** 459.
— **motitensis** 442.
— Muelleri 314.
— multizona 107.
— **musica** 354. 362.
— **mystacalis** 468.
— mystacea 73.
— nelsna 59.
— nigra 560.
— **nigriceps** 400.
— **nigrorufa** 473
— nitens 201. 425.
— **notata** 396.
— nuchalis 469.
— ochropyga 573.
— oculea 183.
— **olivácea** 474.
— ophthalmica 478.
— **oregona** 456. 481.
— **ornata** 425. 426. 569.
— oryx 240.
— oryzivora 141.
— otoleuca 632.
— **pallida** 460.
— **palustris** 464.
— panayensis 216.
— paradisea 207.
— **passerina** 471.
— pennsylvanica 466.
— Perreini 63.
— personata 383. 515.
— **petronia** 442. 441.
— Phaëthon 113.
— philippina 275.
— **pileata** 419. 421.
— pinetorum 579.
— **pinus** 393. 394.
— **platensis** 474.
— plumbea 565.
— polyzona 107.
— postocularis 478.
— prasina 191.
— principalis 211.
— **psaltria** 395.
— psittacea 192.
— pulchella 192.
— punctularia 162.
Fringilla punctulata 193.
— punicea 73. 522.
— purpurea 491.
— **pusilla** 352. 354. 451. 460.
— **pyrgita** 446.
— pyrrhómelas 568.
— quelea 261.
— **quérula** 468.
— quinticolor 111.
— ranunculacea 234.
— reticulata 135.
— rubricata 91.
— rubrifrons 354.
— rubriventris 49.
— rufibarba 51.
— **rufescens** 475.
— **ruficeps** 474.
— rufidorsalis 457.
— **rufina** 464.
— rufirostris 565.
— **rufivirgata** 474.
— **russata** 442.
— **rustica** 476.
— rutila 482.
— **Samuelis** 472.
— **sandwichensis** 471.
— **sanguinolenta** 81.
— **Savanna** 470.
— savannarum 472.
— **scapularis** 481.
— **schistacea** 473.
— **Selbyi** 366. 368.
— semirufa 478.
— senegala 88.
— senegalensis 288.
— serena 211.
— silens 475.
— **simplex** 439. 441.
— sinaitica 495.
— **sinica** 400. 401. 684.
— **socialis** 388. 457. 459.
— speciosa 104.
— **speculifera** 478.
— **sphenúra** 191. 475.
— spinescens 396.
— **spinoides** 399.
— splendens 425.
— splendida 575.
— **spodiogenia** 402. 684.
— squamifrons 450.
— **Stanleyi** 396.
— **striolata** 379. 582.
— stulta 441. 446.
— subflava 81.
— **sulfurata** 377. 378.
— **superciliaris** 446. 478.
— **Swainsoni** 439. 441.
— temporalis 111.
— texensis 398.
— **teydea** 402.
— **thoracica** 473.
— **Tintilion** 401.
— tobaca 364.
— torrida 561.
— **torquata** 474.
— **totta** 383. 384.
— **Townsendi** 475.
— trichroa 192.
— tricolor 435.
— **tristis** 387. 392.
— troglodytes 43.
— ultramarina 201.
— **unicolor** 475.
— **uropygialis** 364. 395.
— velata 288.
— **versicolor** 436.
— viridis 56. 523.
— **vitellina** 307.
— **Woodhousi** 457.

Fringilla salicicola 441.
— **xanthogramma** 476.
— xanthomaschalis 523.
— **xanthosterna** 446.
— **Yarrelli** 398.
— **zena** 418.
Fringillinae 324.
Fringillaria anthoides 589.
— bicincta 580.
— Cabanisi 581.
— capensis 580.
— rufa 581.
Fringille Cardeline 254.
— leucophore 177.
Fuchsweber 301. 302.
Furfurinu de monte 414.

G.

Gafarron 395.
Galander 607.
Galerida rutila 638.
Galerita abessinica 618.
— macrorrhyncha 618.
— microcristata 618.
— Theklae 618.
Galfa 141.
— de Java 141.
Gartenammer 579.
Gatterer 141.
Gebirgszeiſig 399.
— abeſſiniſcher 400.
Gelatik 141.
Gelbammer 592.
Gelbbäckchen 55.
Gelbborſten 81.
Gelbbrüſtchen, grünes 75.
Gelbbürzel 172. 364.
Gelbkopfweber, indiſcher 275.
Gelbkragen 415.
Gelbſchnabelbabia 475.
Gelbſchulterwida 218.
Gelbſchulterwitwe 218.
Gelbvogel 388.
Gelbweber 292. 304. 314.
— äthiopiſcher 293.
Gelb-Webervögel 280.
Gelb-Webervogel, äthiopiſcher 293.
Geocoraphus elegantissimus 628.
Geospiza cyanovirens Pealei 192.
Geſangsſperling, gelber 407.
Geſellſchafts-Ammerfink 459.
Geſellſchafts-Ammerſperling 457. 459.
Geſellſchaftsfink 388. 428. 459.
Geſellſchaftslerche 614.
Geſellſchaftsſpaz 459.
Geſellſchaftsſperling 459.
Geſellſchaftsweber 280.
Gilbling, goldgelber 301.
Gilbweber 310.
Gimpel 483.
— aſchgrauer 502.
— blauer nordamerikaniſcher 557.
— Butter- 370.
— Caſſin's 502.
— eigentliche 484.
— **eigentliche fremdländiſche** 502.
— Feld- 370.
— Gold- 370.
— grauböuchiger 502.
Gimpel, Haken- 484. 495. 501.
— **Haus-** 492. 494. 685.
— **Karmin-** 484. 488.
— karoliniſcher 557.
— **kochenillerother** 502.
— langſchwänziger 484.
— **langſchwänziger blutrother** 503.
— **langſchwänziger ſibiriſcher** 503.
— mäuſegrauer 502.
— Nepal- 502.
— pomeranzengelber 502.
— **Purpur-** 487. 490. 491.
— Purpur-, Caſſin's 492.
— **Purpur-, kaliforniſcher** 492.
— Roſen- 489.
— Roſen-, vom Sinai 595.
— rothbäuchiger 495.
— rothköpfiger 502.
— rothmanteliger 495.
— rothſchulteriger 495.
— rothſchwänziger 502.
— vom Sinai 495.
— Sinaitiſcher 495.
— aus dem Himalaya 502.
— **Wüſten-** 484. 504.
— Wüſten-, düſterer 512.
Gimpelammer 590.
Gimpellerche, weißſtirnige 633.
Girlitz 326. 361. 370.
Girlitz, Bart- 378.
— **buttergelber** 368. 373.
— gelber 349.
— **gelbbäuchiger** 349. 409.
— **gelbſtirniger** 369. 375. 376.
— **gelbrückiger** 379.
— **geſtrichelter** 379.
— **Grau-** 354. 372. 373. 375. 383.
— Grau-, gelbbürzeliger 363. 381.
— **grauer gelbbürzeliger** 363. 364.
— **grauer weißbürzeliger** 354. 361.
— grauer weißkehliger 367.
— **graukehliger** 349. 360. 365. 366. 383.
— grauköpfiger 369.
— goldſtirniger 354.
— grüngelber 379.
— grünköpfiger 369. 378.
— Hagenbeck's gelbköpfiger 400. 684.
— **von den Kanariſchen Inſeln** 326. 350.
— kurzſchnäbliger 380.
— **orangeſtirniger** 352.
— ſüdafrikaniſch. 369. 376.
— **ſchwefelgelber** 377. 381.
— **Roth-, ſchwarzköpfiger** 381.
— ſchwarzhalſteriger 379.
— **Totta-** 383.
— weißbürzeliger 362.
— **weißkehliger** 366. 367.
Girlitzfink 409.
Gitter-Weberfink 150.
Glanzelſterchen 147.
Glastik-betul 141.
Glate 141.
Goldaſtrild 81.
Goldbärtchen 418.
Goldbauch 376.
Goldblättchen 81.
Goldbrüſtchen 33. 34. 37. 76. 81. 84.
Goldbraue 417.
Goldbrauenammer 583.
Goldbürzelzeiſig 396.
Golddiſtelfink 392.
Goldfinch, american 392.
— black 397. 398.
— black-headed 394.
— cordillerean 396.
— green 674.
— indian 403.
— mexican 398.
— Red black-headed 386.
— Spine 396.
— Stanley's 396.
— Yarrell's 398.
Goldfink 388. 392. 418.
— Stanley's 396.
Goldgelbweber 301.
Goldgimpel 369.
Goldkanarienvogel 407.
Goldkehle 377.
Goldkragen 415.
Goldkronfink 468.
Goldkronſperling 468.
Goldſcheitelweber 296.
Goldſpaz 448.
Goldſperling 437. 446. 685.
— grüner 448.
Goldſtiglitz 392.
Goldſtirngirlitz 354.
Goldtangara 656.
Goldweber 288.
Goldwebervogel 300.
Goldzeiſig 390. 392.
Goldzügel 409.
Goniaphea coerulea 557.
— cyanea 558.
— ludoviciana 522.
— nigra 560.
— torrida 561.
Goo-lung-ag-ga 111.
Gorge rose 522.
Gorrion 493.
colorada 511.
Graminero 470.
Granataſtrild 93. 100. 101. 192. 674.
Granatfink 101.
Granatinus 102.
Granatvogel 101.
Gras-Ammerſperling 471.
Grass-Finch 471.
— banded 185.
— beautiful 189.
long-tailed 186.
— masked 187.
— modest 116.
— pied 144.
— white-eared 188.
Grasfink, Masken- 187.
— ſpitzſchwänziger 186.
— weißöhriger 188.
Grasvink, gebande 185.
Gras-Weberfink 188.
— wunderſchöner 189.
Grauammerfink 457.
Grauaſtrild 30. 33. 38. 43. 84.
Graubauchknacker 524.
Grauedelfink 362.
Graugirlitz 325. 355. 362. 372. 375. 383.
Graugirlitz, gelbbürzeliger 363. 364. 381.
— weißbürzeliger 364.
Graubabia 575.
Graukardinal 543. 548.
Graulerche 611.
Graumantel 573. 576.
Graupfäffchen 564.
Grautangara 662.
Grauvögelchen 30. 43.
Greenfinch, algerian 401.
— chinese 401.
Grenadier 245.
Grenadier-Kernbeißer 243. 245.
— **-Weber** 245.
Grenadin 100.
Grenadin 102.
— de la côte d'Afrique 100.
Grisbleu 59.
Grivelin 133.
Grosbeak, abyssinian 291.
— black 559.
— **black-bellied** 234.
— black-bonnet 569.
— **black-headed** 523.
— black-lined 182.
— black and yellow 516.
— black-tailed 516.
— blew 557.
— blue 557. 558.
— **blue brazilian** 558.
— bluish 564.
— Brimstone 377.
— brown-cheeked 415.
— Cape 236.
— Cardinal 539.
— crested dominican 548.
— crimson-breasted 193. 194.
— fasciated 133.
— flesh-footed 516.
— Frontal 450.
— Grenadier 240. 245.
— giant 572.
— icterine 516.
— Isle-Bourbon 568.
— Java 141.
— long-tailed 219.
— Malabar 160.
— Malacca 165. 168. 170.
— mine 566.
— olivaceous-billed 565.
— orange 215.
— ornamented 563.
— plumbeous 564.
— red-billed 262.
— red-mantled 495.
— rose-breasted 522.
— spotted-sided 180.
— striated 152.
— white-fronted 567.
— white-headed 165.
— white-throated 569.
Grosbec d'Abyssinie 291.
— à bec olivâtre 565.
— bleu 557.
— bleuâtre 564.
— à calotte noire 569.
— bleu de ciel 558.
— de la Chine 516.
— à collier 563.
— du Coromandel 236.
— épervin 161.
— à front blanc 567.
— géant 572.
— à gorge blanche 569.
— des Indes 275. 539.
— de l'isle de Bourbon 152. 568.
— du Japon 515.
— de Java 191.
— de la Louissiane 522.

Grosbec masqué 515.
— du Mexique 523.
— mine 566.
noir 219. 559.
— de plomb 564.
— à poitrine rose 522.
— à queue médiane 516.
— de riz noir 561.
— de riz à tête noire 561.
— rouge 539.
— tacheté du Cap de bonne espérance 236.
— tacheté de Java 160.
— vert 523.
— de Virginie 539.
Ground-Robin 481.
— californian 481.
Grundammerſperling, Abert's 481.
— **Baird's** 481.
— **brauner** 482.
— **gefleckter** 481.
— **grüner** 482.
— **grünſchwänziger** 482.
— **rothängiger** 479. 481.
— rothbrauner 482.
— **weißſchulteriger** 481.
Grundfink 481.
Grundröthel 479. 481.
Grünfink 384.
— **algeriſcher** 401.
— **von Bahama** 418.
— **chineſiſcher** 400. 684.
Grünhabia 574.
Grünſperling 418.
Gubernatrix cristata 553.
— cristatella 553.
— pusilla 554.
Guerubeea 192.
Gürtel-Amandine 181. 185.
— **Gould's ſpitzſchwänzige** 185.
— **Masken-.** 186. 187.
— **weißbäckige** 187. 188.
Gürtelaſtrild 64.
— **augenfleckiger** 183.
— **bürzelglänzender** 182.
— **rothohriger** 183.
Gürtelgrasfink 61. 185.
Gürtellerche 624.
Gürtel-Raſenweberfink 185.
Gürtel-Webervogel 292.
Guiraca caerulea 557.
— coerulea 557.
— ludoviciana 522.
— magnirostris 561.
— melanocephala 523.
Guiranheem gutú 407.
Guirapera 667.
Guirnegat 407.
Gymnoris petronius 444.
Gyrinorhynchus collarius 566.
— hypoleucus 565.
— intermedius 564.
— linéola 567.

H.

Haarſtrichfink, weißrückiger 151.
Haarſtrich-Weberfink, weißrückiger 153.
Haartangara 642.
Habia 573.
— **Baſtard-** 573.
Habia amarillo 657.
— de banado 474.
ceja blanca 574.
Habia punzo 657.
Habropyga 28. 35.
— astrild 49.
— cinerea 43.
— coerulescens 63.
— fimbricata 63.
— frenata 50.
— incana 63.
— larvata 92.
— leucotis 50.
— melpoda 55.
— natalensis 63.
— paludicola 56.
— Perreini 63.
— rhodopyga 50.
— rufibarba 51.
— subflava 81.
Haemophila 437.
Haemorrhous purpurea 491.
— roseus 488.
Hänfling, angoliſcher 364.
— **blauer** 430.
— **Karmin-** 488.
Hahnſchweif-Widafink 213. 215.
Hahnſchweifwitwe 215.
Hakenfink 501.
Hakengimpel 484. 495. 501.
— **kanadiſcher** 500.
Hakenkernbeißer 501.
Hakenkreuzſchnabel 501.
Halbmond-Widafink 216.
Halbmondwitwe 216.
Halsbandamandine 132.
Halsband-Ammerſperling 474.
Halsbandlerche 607.
Halsband-Trauerwitwe 220.
Halsbandvogel 132.
Halsbandweber 293.
Halsband-Weberfink 132.
Haplospiza 437.
Harrelal 75.
Hartfutterfreſſer 12.
Hartlaubszeiſig 52. 325. 360. 368. 373. 375. 413.
Hartſchnabel 501.
Haubenblutfink 539.
Haubenfink 422.
— **indiſcher** 539.
Haubenkernbeißer 539.
Haubenlerche, kleine 612.
Hauben-Malimbus 320.
Haubenmerle 641.
Hauben-Prachtwebervogel 320.
Haubenweber 320.
Haubtlerchen 373.
Hausgimpel 492. 685.
Hausse-col noir 624.
Hautototl 646.
Hawfinch, black-tailed 516.
— masked 515.
— mexican 523.
Hedyglossa 437.
— Diuca 477.
Hedymeles ludoviciana
— melanocephala 523.
Helenafaſänchen 33. 37. 44. 49. 99.
Helena-fazantje, St. 49.
Helena-Kanarienvogel 376.
Helenavögelchen 49.
Helenavogel 49.
Hempbird 491.
Herkuleskacker 524.
Hesperiphona melanura 516.
Hierapterhina Clot-Bekii 634.
Himalayaſtiglitz 402.
Himmelslerche 616.
Hirundelchen 147.
Hirondelle 147.
Hordenweber 225.
— **feuerköpfiger** 225.
Hornlerche 625.
Hortulanus capitis Bonaespei 582.
Houpette 641.
Hypacanthis spinoides 399.
— Stanleyi 396.
Hyphantica 254.
— aethiopica 262.
— haematocephala 265.
— sanguinirostris 261.
Hyphantornis 225. 280.
— abyssinicus 291.
— aethiops 293.
— atrogularis 294. 309.
— aurea 301.
— aureïcapillus 293.
— aureoflava 301.
— aureoflavus 301.
— aurifrons 299.
— axillaris 303.
— badius 303.
— baglafecht 294.
— Bojeri 301.
— brachypterus 295.
— Cabanisi 293.
— capensis 299.
— capitalis 293.
— castaneo-fusca 302.
— chrysomelas 314.
— cinctus 293.
— concolor 301.
— erythrocephala 254.
— erythrophthalma 311.
— flammiceps 242.
— flavoviridis 291.
— galbula 310.
— gambiensis 288.
— grandis 292.
— Guérini 311.
— habesainica 291.
— intermedia 309.
— larvata 291.
— luteola 314.
— luteolus 314.
— mariquensis 293.
— modesta 288.
— nigerrimus 305.
— nigriceps 297.
— nigrifrons 293.
— ocularius 295.
— olivacea 299.
— personata 314.
— personatus 314.
— princeps 294.
— rubiginosa 303.
— somalensis 294.
— Speket 294.
— spilonotus 296.
— subaureus 301.
— taeniopterus 309.
— taeniopterus 294. 308.
— textor 288.
— velatus 293.
— vitellina 307.
— vitellinus 307.
— xanthopterus 311.
Hyphanturgus brachypterus 295.
— ocularius 295.
— personatus 314.
Hypocentor aenea 201.
— aureolus 579.
Hypocenter fucatus 580.
Hypochera musica 362.
— nitens 201.
— ultramarina 201.

I.

Icterus cafer 299.
— olivaceus 299.
Ignikolor 240.
Ignicolore 240.
Immerrothvogel 645.
Indianer-Lerche 625. 686.
Indigoammer 430.
Indigofink 325. 426. 430.
Indigovogel 430.
Ing-a-däm-oon 113.
Inhaltsverzeichniß XI.
Iſabellerche 616.
Iſabelltangara 667.
Jacarini 424. 425.
— brasilienaibus 425.
— Pinson- 424.
— Tanager 425.
Jacobijn 168. 169.
Jacobin 152. 169.
Jago-Sperling, St. 442.
Jakarini 423. 424.
Jakarinifink 422. 424.
Jakobin 169.
Jamaikafink 418.
Jéé-ree 183.
Jerapterhina **Cavalgnaci** 634.
Jilgero 400.
— de la Cordillera 396.
Joue orange 55.
Junco hyemalis 456.
— phaeonotus 457.

K.

Kaffernammer 582.
Kaffernweber 299.
Kalanderlerche 603. 607.
Kalandra 603.
Kalandralerche 607.
Kalandrelle 614.
Kanarie 350.
— van Brazilië 407.
— **Kaapsche** 373. 376.
— **pietje** 384.
Kanarienfink 350. 401.
Kanariensperling 350.
Kanarienvogel 326. 382. 411.
— **Berg-** 376.
— **braſilianiſcher** 407.
— **braſiliſcher** 403. 407.
— **Helena-** 376.
— **wilder** 350. 316. 375.
— **-Wildling** 350. 416.
Kantawala 275.
Kapellenvogel 443.
Kapkanarienvogel 349. 366.
Kaplandkanarienvogel 366.
Kap-Oriolin 299.
Kap-Oryny 236.
Kappenammer 592.
Kappenfink 147.
Kappenlerche 633.
Kappen-Weberfink von Fernando-Po 150.
— **bronzefleckiger** 147.
Kappenzeiſig 394.
Kap'ſcher Ammer 582.
Kap'ſcher Kernbeißer 236.
Kap'ſcher Sperling 215.

Kapuzenzeisig 386.
Kapweber 236. 299.
Kardeline 254.
Kardinaal, grijze 548.
— groene 553.
— roode 539.
Kardinälchen, kleines rothes 386.
— kleines westindisches 384.
— westindisches 386.
Kardinäle 514. 521. 562.
Kardinal 539.
— Ammer- 553.
— **Dominikaner-** 541. 542. 549.
— domingischer 548. 549.
— von Domingo 542.
— gehäubter 539.
— gezopfter domingischer 548.
— **grauer braunkehliger** 541. 542. 550.
— **grauer gehäubter** 541. 543. 548.
— grauer glattköpfiger 549.
— **grauer schwarzkehliger** 541. 542. 550.
— **grüner** 550. 553.
— kleiner grüner 554.
— vom Kap der guten Hoffnung 245.
— von Madagaskar 247.
— Mantel- 550.
— nordamerikanischer 539.
— **purpurrother** 540. 685.
— **rother** 524. 530. 539.
— Rothkopf- 550.
— rothköpfiger 550.
— schwarzbäckiger 550.
— spitzhäubiger 541.
— virginischer 539.
Kardinalin 240.
Kardinalkernbeißer 539.
Kardinalweber 252.
Karminastrild 19. 21. 33. 87. 91.
Karminfink s. Karminastrild.
Karmingimpel 484. 489.
Karminphaëthon 113.
Kastanjevink 171.
Katzenvogel 481.
Kawarahiba 401.
Keblammerfink 460.
Kehlspaz 145.
— großer 446.
Kehlsperling 437. 444. 685.
— Augenbrauen- 446.
— gelbbrüstiger 446.
— gelbhalsiger 446.
— graukäpfiger 446.
— großer 446.
— größter 446.
Keilschwanzastrild 93.
Kernbeißer 513.
— eigentliche 514.
— blauer 426. 557.
— brasilischer 523.
— braunwangiger 410.
— von China 516.
— Dominikaner 549.
— mit fleischfarbenen Füßen 516.
— gebänderter 132.
Kernbeißer, gelber 523.
— gelbbäuchiger 524.
— gelblicher 516.
— graubäuchiger 524.
— großschnäbliger 524.
— grüner 523.
— grünbäuchiger 524.
— himmelblauer 557.
— japanesischer 515. 516.
— karminfarbner 645.
— lasurblauer 558.
— louisianischer 522.
— **Masken-** 514.
— mexikanischer 523.
— **rosenbrüstiger** 516. 522.
— schwarzgelber 516.
— schwarzköpfiger 515. 523.
— **schwarzschwänziger** 515. 516. 685.
Kernbeißerfinken 513. 514.
Kernbeißerfink, dickschnäbliger schwarzer 561.
— **dunkelblauer** 554. 558.
— **hellblauer** 554. 557. 685.
— Maximilian's schwarzer 561.
— meerblauer 558.
— **schwarzer** 558. 559.
— **schwarzköpfiger** 560. 561.
Kernbeißerweber, dottergelber 307.
— gelbbäuchiger 275.
— Masken- 314.
— schwarzköpfiger 293.
— schwarzstirniger 293.
Kernfresser 501.
Kernknacker 514.
Kirschenfink, karmiurother 589.
Klapperlerche 634.
Kleinschnäbelchen 38.
Klumposet, red and black 645.
Knackerlerche 634.
Königsammer 213.
Königswida 213.
Königs-Widafink 212. 213.
Königswitwe 213.
Kolonieweber 251. 279.
Komoren-Webervogel 253.
Konings-Weduwe 213.
Koowau Leepee 617
Korallenschnäbelchen 47. 565.
Kordillerenzeisig 395. 396.
Kordonblau 94. 99.
Kragenpfäffchen 572. 573. 685.
Krappenfresser 501.
Kreuzlerche 633.
Kreuzschnabel, größter 501.
Kron-Ammerperling 467.
Kronfink von Bolivien 422.
— von Brasilien 421.
— von Ekuador 422.
— **von Südamerika** 419. 421.
Krontangara 637. 638.
Kubafink 410. 414.
— **größerer** 411. 416. 417. 684.
Kubafink, kleiner 415.
Kubavogel 416.
Kurzflügelweber 295.
Kurzzehenlerche 614.
Kuttenelsterchen 144.
Kuttenweber 144.

L.

Lagonosticta 28. 64.
— coerulescens 63.
— ignita 88.
— larvata 92.
— lateritia 89.
— minima 88.
— nigricollis 92.
— rhodopareia 91. 672.
— rubricata 91.
— rufopicta 89.
— Russi 668.
— senegala 88.
— vinacea 92.
Lal 73.
Lal Munia 73.
Langflügler 383.
Langstaart 215.
Lanio albispecularis 642.
— tenuirostris 642.
— Vieillioti 641.
Lanius leverianus 575.
— picatus 575.
Lanzenschwänzchen 151. 158.
Lappländer 600.
Lark, black 609.
— boag-geyra 614.
— Calandra- 607.
— common indian 615.
— gingi 633.
— pink-billed 616.
— plainloving 630.
— red-bellied 617.
— red-winged 627.
— Shore 624.
— short-toed 614.
— Sky 624.
— social 614.
— white-cheeked 632.
Larvenastrild 91. 672.
Larvenweber 291. 292. 312.
Larven-Webervogel 289. 291.
Lazammer 601.
Lazulifink 437.
Leepee 627.
Leinzeisig 353.
Lerchen 602.
Lerche, abessinische 618.
— **Alpen-** 620. 624. 625.
— **Anderssons** 615.
— aschgraue 611.
— **assamische** 626.
— Berg- 624.
— Berg-, rothköpfige 612.
— Berg-, russische 624.
— **bescheidne** 627.
— Bienen- 628.
— Blanford's 616.
— Bogenschnabel- 618.
— Brach- 629.
— Brandt's 626.
— braune 616.
— **braungefleckte** 629.
— Buckley's 614.
— Busch- 627.
— Buschwald- 626.
— **dickschnäblige** 618.
— Dickschnabel- 619.
— Doppelhorn- 625.
— Drossel- 619.
— Dupont's 618.
Lerche, einfache 628.
— fahle 616.
— Falken- 634.
— Finken- 612.
— gehörnte 625.
— gelbbärtige 624.
— gelbe 618. 686.
— gelbkehlige 226.
— gelbköpfige 624.
— Gesellschafts- 614.
— Gimpel-, weißohrige 632.
— Gimpel-, weißstirnige 633.
— Grau- 611.
— **graue** 633.
— Gray's 629.
— große 607.
— großflüglige 614.
— Gürtel- 624.
— kleine Hauben- 612.
— Heine's 614.
— hermonische 614.
— Himmels- 616.
— Hofa- 628.
— Horn- 625.
— Horsfield's 627.
— Indianer- 625. 686.
— Isabell- 616.
— isabellfarbne 618.
— japanische 615.
— javanische 627.
— Jesse's 630.
— **Kalander-** 603. 607.
— Kappen- 633.
— Klapper- 634.
— kleinschnäblige 615.
— kleinste 615.
— kleinbäubige 618.
— Knacker- 634.
— **von Kordofan** 628.
— Kreuz- 633.
— Kurzzehen- 614.
— **kurzzehige** 612. 686.
— **langschnäblige** 626.
— **Malabar-** 615.
— **Mohren-** 608. 609.
— Mongolen- 610.
— **mongolische** 610.
— Ohr- 625.
— Ohren- 625.
— Priester- 624.
— Raudon's 618.
— Ring- 607.
— **rostfarbige** 629.
— **rothbäuchige** 617.
— **rothbrüstige** 626.
— **rothflüglige** 627.
— **rothköpfige** 611.
— rothschnäblige 616.
— rothsteißige 616.
— rückenstreifige 616.
— Sand- 616. 617.
— **sandfarbige** 618.
— Schellen- 632.
— Schnee- 600. 624.
— Schnee-, gelbbärtige nordische 624.
— schwarzkäppige 633.
— **schwarznackige** 633.
— sibirische 610.
— Sichler- 630.
— Smith' 632.
— Spiegel- 611.
— Steppen- 609. 610.
— Stummel- 614.
— tatarische 609.
— Thekla- 617.
— Triller- 615.
— türkische 624.
— Ufer- 624.
— ungefleckte 614.
— virginische 624.

Lerche, weißbäckige 631. 632. 686.
— weißflügelige 611.
— weißgraue 614. 686.
— weißkehlige 626.
— Weißohr- 632.
— weißohrige 632.
— weißwangige 627.
— Winter- 624.
— Wüsten- 616.
— Wüsten-, zweibindige 629.
— Wüsten-, zweibindige, kleine 630.
— Wüstenläufer- 630.
— zierlichste 623.
— zimmtrothe 628.
— zweifleckige 607.
— zweischopfige 625.
Lerchenammer 597.
Lerchenammersperling 476.
Lerchenpfäffchen 570.
Lerchensporner 600.
Lencophrys pileatus 278.
Ligurinus 384.
— aurantiiventris 401.
— kawariba 401.
— sinicus 401.
Linaria angolensis 364.
— atrogularis 364.
— aurifrons 407.
— cinerea orientalis 49.
— coerulea 430.
— pinus 394.
— savanna 470.
Lindo azul cabeza blanca 575.
— bello 667.
— pardo copete amarillo 642.
— pardo y canela alas y cola negras 642.
— saihobi 659.
Linkolnspaz 464.
Linnet, blue 430.
Lonchura Cheet 160.
— melanocephala 168.
— nisoria 162.
— quadricolor 191.
Londra calandra 607
Longspur, Lapland 600.
Lophocorythus gubernatrix 553.
Lophospiza cristata 422.
— cruenta 422.
— ornata 426.
— pileata 421.
Lorbeerfink 401.
Loxia abyssina 234.
— abyssinica 291.
— africana 262.
— albigularis 368. 569.
— angolensis 561.
— astrild 35. 49.
— atricapilla 168.
— aurantia 568.
— bella 181. 182.
— bengalensis 275.
— bicolor 160.
— brasiliana 135.
— brevirostris 568.
— caffra 215.
— canadensis 523.
— canora 415.
— cantans 158.
— capensis 236.
— cardinalis 488. 539.
— cinerea 368.
— coerulea 557. 558.
— collaris 566.
— crassirostris 561.
Loxia cucullata 548.
— cyanea 558.
— dominicana 549.
— enucleator 501.
— erythraea 488.
— erythrina 488.
— erythrocephala 135.
— fasciata 133.
— ferruginosa 167.
— fiabellifera 570.
— flamengo 501.
— flavicans 592.
— flaviventris 366. 376.
— franciscana 240.
— fraterculus 568.
— frontalis 450.
— guttata 177 180. 194.
— haematina 193.
— hypoxantha 275.
— javensis 141.
— jugularis 133.
— leucocephala 165.
— leucotis 632.
— lineata 570.
— lineola 567.
— longicauda 219.
— ludoviciana 522.
— macroura 219.
— maculosa 135.
— madagascariensis 251.
— Maja 165.
— malabarica 160.
— malacca 170.
— melanocephala 288.
— melanogastra 234.
— melanopygia 153.
— melanura 516.
— musica 362.
— nasuta 561.
— nelicurvi 276.
— nigra 560.
— nitida 182.
— obscura 488. 522.
— oryx 245.
— oryzivora 141.
— prasina 191.
— pectoralis 568.
— pensilis 76.
— phalerata 236.
— philippina 274. 275.
— plebeja 569.
— prasipteron 148.
— punctularia 162.
— regia 275.
— rosea 488. 522. rubra 539.
— sanguinirostris 261.
— sibirica 503.
— socia 280.
— spittácea 501.
— striata 152.
— sulphurata 377.
— torrida 561.
— totta 384.
— undulata 162.
Loxie fasciée 133.
— haematine 193.
— ignicolore 237.
— mouchetée 193.
— oryx 243.
Loxigilla nitens 201.
Luscinia virginiana 539.

M.

Madagaskar-Kardinal 251.
Madagaskarweber 230. 251. 411.
Madagaskar-Webervogel 247. 248. 251.
Magellanzeisig 394. 684.
Mahali-Philagrus 276.
Mahali-Sperlingsweber 276.
Mahaliweber 254. 276.
Maharoi 446.
Maja 163.
— sinensis 165.
Maja 165.
— schwarzbrüstige 167.
— weißköpfige 165.
Malabar-Amandine 158. 159.
Malabar-Fasänchen 157. 159.
Malabarfink 159.
Malabarlerche 615.
Malakkafink 169.
Malakkamunia 169.
Malimbus cristatus 320.
Malimbus, glänzender 322.
— Prachtwebervogel 322.
— rothhalsiger 322.
Manimbé 472.
Mantelkardinal 550.
Mantelschwärzling 322.
Manuk manjar 274. 275.
Manyar 275.
— Kembang 275.
Manyar 275.
— -Weber 275.
— -Webervogel 265. 275. 683.
Mariposa 99.
— dreifarbiger 101.
Mariposa à joues de carmin 99.
— granatina 102.
— nigra 560.
— phoenicotis 99.
— pintada 435.
Marquetia elegans 104.
Maskal 240.
Maskenammer 582.
Maskenfink 142. 383.
Maskengimpel 383.
Masken-Grasfink 187.
Masken-Gürtelamandine 186. 187.
Maskenkernbeißer 514. 515.
Masken-Kernbeißerweber 314.
Maskenkernknacker 523.
Maskenweber 291. 314.
— gelblicher 314.
Masken-Webervogel 311. 314.
Maskenzeisig 400.
Maurenfink 402.
Mauritius-Webervogel 253. 265.
Megalophonus clamosa 629.
— occidentalis 629.
— rostratus 629.
Meise, grüngefleckte 661.
Meisenfink 401.
Meisengimpel 503.
Melanocorypha albigularis 607.
— albo-terminata 608.
— arabs 616.
— calandra 607.
— ferruginea 628.
— galeritata 616.
— gallica 614.
— graeca 614.
— itala 614. rufescens 608.
— subcalandra 607.
— tatarica 609.
— tenuirostris 614.
Melanocorypha torquata 608.
— yeltoniensis 609.
Melanomitris atrata 397.
— uropygialis 396.
Melophus erythropterus 599.
— melanicterus 599.
Melopyrrhula nigra 560.
Melpoda lippa 55.
— à joues oranges 55.
— orange-cheeked 55.
Melospiza 437.
— melodia 463.
Menyiring 73.
Merle, blaue 430.
— brasilische 667.
— gesprenkelte 661.
— graue 661.
— scharlachfarbige 645.
— schwarze 647.
Merle du Brésil 645.
— à gorge rouge 647.
Merula brasilica 645.
Mésange du Paradis 664.
— verte tachetée 661.
Metroponia pusilla 354.
Minister 430.
Ministre 430.
Mirafra affinis 627.
— africana 629.
— cordofanica 628.
— flavicollis 579.
— Hayi 612.
— javanica 626. 627.
Mittelweber 318.
Mnama 301.
Mönchszeisig 396.
Mövchen, japanisches 154. 678.
— braunbuntes 147. 125.
— gelbbuntes 154.
— weißes 142. 155.
Modeste 116.
Mohrenlerche 608.
Mohrwachtelfink 107.
Moineau alouette 473.
— des arbres 459.
— à bec rouge du Sénégal 262.
— du Brésil 201.
— du Canada 459.
— du Cap 439.
— du Cap de bonne espérance 439.
— de Cayenne 425.
— chapelant 459.
— chat 481.
— Chingolo 469.
— à couleur de renard 474.
— à couronne blanche 467.
— Diuca 477.
— doré 448.
— écarlat 645.
— du gazon 471.
— à gorge blanche 466.
— d'Italie 441.
— de Lincoln 464.
— mandarin 173.
— maritime 472.
— melodieux 463.
— des montagnes 444.
— nain 460.
— de neige américain 456.
— palus 464.
— de paradis 33. 135.
— de Pennsylvanie 466.
— des Saules 442.
— des Savannes 470.
— du Sénégal 262.
— à tête grise 441.

Mongole 168.
Mongolenlerche 610.
Monnikskap-Amadine 148.
Montese cabeza de bermillon 421.
— obscuro y roxo 473.
Montifringilla sanguinea 495.
Moro 511.
Morgen-Ammerſperling 468. 469.
Mosambik 373.
Motitaſperling 442.
Mozambek 373.
Mozambik 373.
Mozambikzeiſig 345. 373.
Mungul 168.
Munia acuticauda 158.
— ferruginea 167.
— ferruginosa 167.
— flaviprymna 172.
— fringilloides 144.
— fuscans 162.
— leuconota 153.
— lineiventris 162.
— Maja 165.
— malacca 170.
— molucca 153.
— oryzivora 141.
— punctularia 162.
— rubronigra 168.
— sinensis 168.
— sharp-tailed 153.
— Shubz 162.
— striata 152.
— topela 162.
— undulata 162.
Munie, weißbäuchige 153.
Munie, Schakari- 152.
— panaché 155.
Muscade blanche 155.
Muscicapa galeata 642.
— rubra 642. 655.
Musch, zwarte 201.
Muskat-Amadine 160. 162.
Muskaatvogel 162.
Muskatvögel 151.
Muskatvogel 20. 162.
— gelbſchwänziger 161.
— gepunkteter 160. 162.
— gewellter 160.
— rothbrauner 161.

N.

Nachtigal, braſiliſche 548. 549.
— virginiſche 539.
Nachträge 668.
Nachtwach 501.
Nahäidsche 148.
Napoleonsvogel 234.
— doppelter 236.
— großer 235.
Napoleons-Webervogel 230. 231. 248.
Natalaſtrild 59. 63.
Nattvaka 501.
Negretto 423. 424.
Negrito 559.
Nelikurvi 275.
— bengaliſcher 275.
Nelicourvi de Madagascar 276.
Nelicurvius pensilis 276.
Nemosia nigrogenys 550.
Neochmia Phaëthon 113.
Neſtfink, geſelliger 280.
Netzflügel 150.
Neuvogel 600.
Nightingale, virginian 539.
Nigrita 322.
— Arnaudi 322.
— bicolor 323.
— canicapilla 323.
— Emiliae 323.
— fusconota 323.
Niobe ardens 216.
— Widow 216.
Niphaea 437.
— hyemalis 456.
Nonne 20. 25. 126. 162. 165.
— dreifarbige 169.
— ſchwarzbrüſtige 167.
— ſchwarzköpfige 155. 167. 168.
— ſchwarzköpfige mit weißem Bauch 169.
— weißköpfige mit ſchwarzer Kehle 167.
Nonnen-Amadine, dreifarbige 169.
— **ſchwarzbrüſtige** 166.
— **ſchwarzköpfige** 167. 168.
— **weißköpfige** 163. 165. 678.
Nonnenfink 165.
Nonnenvögel 163.
Nonnenvogel 165
Nonnen-Weberfink 165.
Nonnetje 165.
Nonnette d'Afrique 144.
— à tête blanche 165.
— à tête blanche et à poitrine noire 167.
— à tête noire et à ventre blanc et noir 169.
Nonpareil 435.
— oſtindiſcher 190. 191.
Nukl-nore 169.
Nutmeg-bird 162.

O.

Ocyris oinopus 589.
Ohrlerche 625.
Ohrenlerche 625.
Oiseau épinard 665.
Olivarez 395.
Ombala 291.
Onychospina fuscata 580.
Orangebäckchen 20. 32. 33. 37. 41. 51. 55.
Orangevogel 237. 240.
— doppelter 245.
Orangewange 55.
Orangeweber 229. 231. 240. 248.
Orange-Webervogel 237. 240.
Oranje 81.
Oranjevogel 240.
Orchesticus 573.
Oreja negra 475.
Oriole, sharp-tailed 472.
Oriolin 299.
— goldſtirniger 299.
Oriolus aurifrons 299.
— capensis 299.
— leucopterus 640.
— melanocephalus 288.
— textor 288.
Ortolan 582. 614.
— gelbbäuchiger, vom Vorgebirge der guten Hoffnung 580.
— Schnee- 600.
Ortolan du Cap 582.
— du Cap de bonne espérance 582.
— à crête noire 599.
— doré de Sibérie 579.
— élégant 583.
— de hermita 443.
— à gorge noire 596.
— masqué 582.
— à sourcils jaunes 583.
— strié 582.
— teindu 580.
— à tête brune 592.
— à tête noire 594.
— à ventre jaune 580.
— à ventre jaune du cap de bonne espérance 580.
Ortolankönig 594.
Ortygospiza 105.
— atricollis 107.
— polyzona 107.
Orynx approximans 236.
— capensis 236.
— grand 236.
— xanthomelas 236.
Oryx 245.
— echter 245.
— -Weber 228.
— **Webervogel** 243.
— grand 245.
— oryx 245.
— wever 245.
Oryzóborus 570.
— crassirostris 561.
— finch 561.
— Maximiliani 561.
— torridus 561.
Oryzornis oryzivora 141.
Otocorys albigula 626.
— chrysolaema 625.
— larvata 626.
— petróphila 626.
— scriba 626.

P.

Padda 141.
— brun 142. 677.
Pajaro de la Cumbre 402.
— majorero 511.
— moro 511.
Pallasia leucoptera 611.
Palmtangara 658.
Papa Capim 421. 563.
Papagei, finniſcher 501.
— Pariſer 501.
— ſchwediſcher 501.
Papagei-Amadinen 189.
Papagei-Amadine dreifarbige 191.
— **eigentliche** 192. 679.
— **kurzſchwänzige** 192.
— **langgrüne** 190. 191. 678.
Papageifinken 514. 573.
Papageifink, Azara's 575.
— blaugrauer 574.
— Diadem- 575.
— dickſchnäbliger 574.
— elſterbunter 575.
— graumantliger 575.
— grauſchwänziger 574.
— großer 574.
— größerer 575.
— größter 575.
— kleinſter 575.
— olivengrüner 574.
— orangeſchnäbliger 576.
— Orinoco- 575.
Papageifink, Schopf- 575.
— ſchwarzer 576.
— ſchwarzhalſiger 574.
— ſchwarzkäppiger 574.
— Rieſen- 575.
— rußſchwarzer 573.
— mit weißem Rückenfleck 574.
— vielfarbiger 576.
Papageiengimpel 511.
Papageiſchnäbelchen 562.
Papagei-Weberfink 192.
Pape 431. 435.
— Lazuli 437.
— versicolor 437.
Papſt 435.
— magellaniſcher 665.
Papſtfink 325. 426. 430. 433. 435.
— lieblicher 436.
— vielfarbiger 436.
Papſtvogel 435.
Paradiesammer 207.
Paradiesmeiſe 664.
Paradiesmerle 664.
Paradiesvogel-Witwe 207.
Paradieswida 197
Paradieswitwe 195. 207.
Paradies-Amadine 135.
Paradies-Sperling 135.
Paradies-Widafink 202. 207.
Pariſvogel 501.
Pardao 443.
Paroare dominicain 549.
— huppé 548.
Paroaria capitata 550.
— cucullata 548.
— dominicana 549.
— gularis 550.
— larvata 549.
Paroire 548.
Parrot-Finch 192.
Passer 437.
— arcuatus 439.
— bicolor bahamensis 419.
— brasiliensis 407.
— canadensis 459.
— canariensis 350.
— canarius 350.
— capitis bonae spei 439.
— castanopterus 442.
— diffusa 441.
— diffusus 441.
— domesticus var. italicus 441.
— erythromelanus indicus sine uropygio 645.
— erythrophrys 442.
— Hansmanni 442.
— hispaniolensis 439.
— indicus candatus porphyromelanus 645.
— indicus erythromelanus sine uropygio 645.
— indicus porphyromelanus 645.
— jagoënsis 442.
— lunatus 445.
— motitensis 442.
— niger erythrorhynchos 201.
— pennsylvanicus 466.
— petronia 444.
— pileatus 469.
— pusillus 354.
— salicarius 442.
— salicicolus 442.
— sclavonicus 587.
— senegalensis erythrorhynchus 261.

Passer simplex 441.
— Swainsoni 441.
— Swainsonii 441.
— russatus 442.
Passera de Canaria 350.
— lagia 444.
Passérculus 437.
- cap. bon. sp. 383
— savanna 470.
— sonarius 464.
Passerella 437.
Passerina ciris 435.
— collaris 415. 579.
— cyanea 430.
— flava 407.
— flaviventris 580.
— jacarini 425.
— lepida 417.
— olivacea 417.
— ornata 421.
Pavert 665.
Pechito 417.
Peking 162.
Penthetria 217.
— ardens 216.
— axillaris 222.
— flaviscapulata 218. 219.
— laticauda 220.
— macrocerca 218.
— macroura 219.
Perdrix 106.
Père noir à bec rouge 201.
— noir à queue longue 219.
Petap Penang 153.
— Whobun 165.
Petronia 495.
— albigularis 445.
— dentata 445.
— petronella 445.
— rupestris 444.
— stulta 444.
Peucaea 437.
Pfäffchen 514. 562.
— Blau- 570.
— **blangraues** 563. 564. 685.
— **bleigraues** 564. 685.
— Brillen- 570.
— Düſter- 570.
— **einfarbiges** 570.
— **Erz-** 566. 685.
— **falſchnäbliges** 571.
— **gelbbürzeliges** 572. 573.
— **geſtreiftes** 569.
— **Hoffmann's** 568.
— **Kragen-** 572. 573. 685.
— **Lerchen-** 570.
— **mit ſchwarzer Bruſtbinde** 568.
— **Morellet's** 572. 573.
— Orangen- 568.
— **pomeranzengelbes** 567. 568.
— **Rieſen-** 570. 571. 572.
— **rothbrüſtiges** 570.
— **rothbalſiges** 570.
— **rothſchnäbliges** 565. 685.
— **Schmuck-** 562. 563. 685.
— **ſchwarzkäppiges** 569.
— **ſchwarzrothes** 570.
— **Telasko-** 570.
— **Trauer-** 568.
— **Weber-** 570.
— **weißkehliges** 569. 685.
— **weißſtirniges** 567. 685.
Pfäffchen, zimmtfarbnes 570.
— **zweifarbiges** 568.
— **Zwerg-** 570.
Pfaffenvogel 60. 185.
Phaëthon 113.
Pheucticus tibialis 524.
Philagrus 254.
— pectoralis 279.
- mahali 278.
— melanorrhynchus 279.
— superciliosus 278.
Philetaerus 254.
— lepidus 280.
— socius 280.
Philéremus cornutus 624.
Phoenicosoma aestiva 655.
— Azarae 657.
— rubra 653.
Phoenisoma aestiva 655.
— rubra 653.
Pholidocoma frontalis 450.
— musica 362.
— bicolor 419.
— gutturalis 569.
— lepida 418.
— pusilla 418.
— zena, *var.* portoricensis 419.
Phrygilus 437.
— caniceps 476.
— diuca 477.
Pico grueso azul 558.
— grueso azulejo 558.
— grueso ceja blanca 566.
— grueso gargantillo 563.
— grueso negro y blanco 570.
— grueso negro y canela 561.
— grueso variabile 566.
— plata 564.
— triguenno 565.
— vermelho 565.
Picuri 160.
Pinicola 484.
— americana 501.
— canadensis 501.
— enucleator 501.
Pinson à bec long 288.
— à crête rouge 422.
— à ventre bleu 99.
— algérien 402.
- Alario 383.
— couronné rouge 422.
— de trois couleurs 435.
— du Senegal 288.
— huppé rouge 421.
— Jacarini 424.
— rouge et bleu 102.
— rouge-gorge 481.
— violet 491.
Pintau 275.
Pipilo ater 481.
— arctica 481.
— arcticus 481.
— erythrophthalmus 481.
— macronyx 482.
— megalonyx 481.
— mesoleuca 482.
— personata 473.
— rufipileus 482.
— rufitorques 473.
— rutila 482.
— superciliosa 473.
Pipit 165.
Pirolin 301.
Pirolweber 310. 311.
Pirol-Webervogel 309. 310. 684.
Pispo 511.
Pitylus 514. 573.
— ardesiacus 573.
— Brissonii 558.
— canadensis 523.
— cardinalis 539.
— cyaneus 558.
— episcopus 524.
— erythrorrhynchus 573.
— flavocinereus 524.
— fuliginosus 573.
- guttatus 523
— personatus 523.
— torridus 561.
Plate-Ammerſperling 474.
Plectróphanes 599.
— ornatus 601.
— pictus 601.
— Smithi 601.
Ploccalauda typica 626.
Ploceidae 223.
Ploceolus capitalis 293.
— luteolus 314.
— nigrifrons 293.
— personatus 314.
— vitellinus 307.
Plocepasser mahali 278.
- pi catus 278.
- superciliosus 278. 279.
Ploceus 254.
— **abyssinicus** 234. 235. 299.
— aethiopicus 256. 262. 681.
— aethiops 293.
— afer 234.
— affinis 304.
— **Alecto** 315. 317.
— Algondae 253.
— algondensis 258.
— **Arnaudi** 322.
— atrigula 274.
— **atrogularis** 293. 684.
— aurantiiceps 397.
— **aurantius** 301. 311.
— aureicapillus 293.
— **aureoflavus** 300. 301.
— aureus 275. 299. 300.
— auricularis 311.
— aurifrons 299.
— **badius** 303. 684.
— **baya** 265. 274. 683.
— **bengalensis** 265. 275. 683.
— **bicolor** 323.
— **Bojeri** 301.
— brachypterus 295.
— **Cabanisi** 293. 684.
— **canicapillus** 323.
— **capensis** 235. 236. 237. 299.
— castáneo-auratus 304.
— **castáneofuscus** 301. 302. 303.
— **cinctus** 292. 293.
— collaris 292.
— comorensis 253.
— concolor 300.
— **cristatus** 320.
— cyclospilus 296.
— **Dinemelli** 318.
— dubius 235.
— Emiliae 323.
— **eminentissimus** 252. 253.
— **erythrocéphalus** 253. 254. 265. 321.
- erythrophthalmus 310. 311.
— **érythrops** 263. 264. 265.
Ploceus erythrorhynchus 318.
— **flammiceps** 241. 242. 233.
— **flavicans** 254. 680. 681.
— flaviceps 275. 296.
— flavigula 295.
— flavomarginatus 307.
— flavoviridis 291.
— **franciscanus** 237. 240. 241.
— galbula 310.
— **gálbulus** 309. 310. 684.
— **grandis** 292.
— **Guérini** 311.
— **haematocéphalus** 265. 278. 320.
— **hypoxanthus** 265. 275. 683.
— icterocephalus 299.
— **intermedius** 318.
— **larvatus** 288. 291. 312.
— Lathami 256. 261.
— lepidopterus 450.
— **luteifrons** 323.
— leuconotis 321.
— leucophthalmus 311.
— **lutéolus** 311. 314.
— **madagascariensis** 247. 251.
— magnirostris 288.
— mahali 276. 278.
— malimbe 322.
— **manyar** 265. 275 683.
— mariquensis 311.
— **melanocéphalus** 281. 288.
— **melanogaster** 231. 235.
— melanogenys 311.
— melanops 311.
— **melanorrhynchus** 276. 279.
— **melanótis** 311. 314. 321
— modereus 303.
— modestus 288.
— nelicurvi 276.
— niger 305.
— **nigerrimus** 304. 305.
— **nigriceps** 297.
— nigrifrons 293.
— **nigriventris** 246.
— nigroventris 246.
— **nitens** 322.
— **ocularius** 294. 295.
— **oliváceus** 297. 300.
— **oryx** 243. 245. 246
— Patersoni 280.
— **pectoralis** 276.
— **pensilis** 276.
— personatus 314.
— **phaenótus** 323.
— philippinus 274. 275.
— **princeps** 294.
— queles 261.
— Royrei 201.
— **rubiginosus** 301. 303.
— ruficeps 307.
— rufocitrinus 303.
— **Russi** 681. 682.
— **sanguinirostris** 255. 256. 261. 262. 681.
- sanguinirostris, *var.* aethiopicus 261.

Ploceus scutatus 320.
— senegalensis 288.
— **socius** 279.
— solitarius 288.
— **Spekei** 294.
— **spilonotus** 296. 297.
— striatus 275.
— stictonotus 296.
— **supercilliosus** 276. 278.
— **taeniópterus** 306.
— Taha 235.
— textor 288.
— **velatus** 293.
— **vitéllinus** 290. 305. 308.
— **xanthópterus** 311.
Poëphila acuticauda 186.
— cincta 185.
— leucotis 188.
— mirabilis 189.
— Paddoni 192.
— personata 187.
Poliospiza angolensis 364.
— atrigularis 364.
Polymitra Cabanisi 581.
— Saharae 582.
— septemstriata 581.
Pooecétes 437.
Poolloo 615.
Pope-bird 549.
Prachtammer 580.
Prachtfinken 18. 28.
— **groß- und ſtarkſchnäblige** 27. 125.
— **klein- und ſchwachſchnäblige** 27. 29.
Prachttangara 664.
Prachtweber 319.
Prachtwebervogel, Hauben- 320.
— **glänzender** 321.
— **Malimbe-** 322.
— **Schild-** 320.
— **ſchwarzohriger** 321.
Prieſterlerche 624.
Prinz-Feinweber 294.
Prinzen-Webervogel 294.
Prit 153.
Propasser sordidus 488.
Pseudomitris columbiana 397.
— mexicana 398.
— psaltria 395.
Pünktchenaſtrild 64.
Purpurfink 491.
Purpurgimpel 490.
— **kaliforniſcher** 492.
Purpurkardinal 541.
Purpurkronfink 422.
Purpurtangara 645. 647.
Putthur Chira 599.
Pyranga aestiva 655.
— Azarae 657.
— coccinae 657.
— erythromelas 655.
— erythropis 656.
— livida 655.
— luctuosa 642.
— ludoviciana 656.
— rubra 653.
— saira 657.
Pyrenestes lacteus 444.
Pyrgisoma Kieneri 478.
Pyrgita arctica 481.
— arcuata 439.
— crassirostris 441.
— diffusa 441.
— diffusus 441.
— euchlora 448.
— fazoqlensis 445.
— gularis 441.
— lutea 448.
Pyrgita nigripes 445.
— peruviana 469.
— peruviensis 469.
— petronella 446.
— petronia 444.
— petronioïdes 446.
— Rueppelli 261. 278.
— simplex 441.
— spadicea 441.
— Swainsonii 441.
Pyrgitopsis simplex 441.
— Swainsonii 441.
— de Swainson 441.
Pyromelaena 225. 228.
— abyssinica 235.
— capensis 236.
— flammiceps 242.
— nigriventris 246.
— oryx 245.
Pyrrhomitris cucullata 386.
Pyrrhualauda cruciger a 633.
— leucotis 632.
Pyrrhula 484.
— alaudina 570.
— arenirostris 560.
— aurantiaca 502.
— bicolor 568.
— **californica** 492.
— capistrata 568.
— carolinensis caerulea 557.
— carolinensis violacea 491.
— Cassini 492. 502.
— caudata 503.
— cinerácea 503.
— cinerea 565.
— cineréola 565.
— crispa 567.
— coccínea 502.
— collaris 414.
— **enucleátor** 495. 501.
— **erythrina** 484. 488. 489.
— **erythrocéphala** 502.
— erithacus 503.
— falcirostris 572.
— **familiaris** 492.
— **githaginea** 504. 511. 512.
— griseiventris 502.
— gutturalis 569.
— leucoptera 570.
— linéola 567.
— longicauda 503.
— ludoviciana 522.
— melanocephala 566.
— mexicana nigra 560.
— murina 502.
— mysia 568.
— nana 150.
— nigra 560.
— nipalensis 503.
— **obsoléta** 512.
— orientalis 502.
— Parandaei 511.
— **purpúrea** 490. 491. 492.
— pusilla 354.
— pyrrhómelas 568.
— **rhodocolpus** 495.
— **rhodóptera** 495.
— **rhodochlamys** 495.
— **rósea** 489.
— **sanguinolenta** 503.
— **sibirica** 503.
— sinaica 495.
— sinoica 495.
— **sinaitica** 495.
Pyrrhula striolata 380.
— torrida 561.
Pyrrhulauda cruciger a 633.
— leucotis 632.
Pyrrhulinae 483.
Pyrrhulinota roseata 488.
Pyrrhuloxia sinuata 541.
Pytelia afra 675.
— coerulescens 63.
— elegans 104.
— formosa 75.
— Hartlaubi 92.
— hypogrammica 675.
— incana 63.
— lateralis 75.
— lineata 119.
— melba 104.
— minima 88.
— Perreini 63.
— phoenicoptera 119.
— phoenicotis 99.
— polyzona 119.
— Reichenowi 92.
— speciosa 104.
— subflava 81.
— Wieneri 675.
Pytelie, bunte 104.

Q.

Quadricolor 191. 642.
Quelea 261.
— capitata 264.
— erythrops 264.
— Lathami 261.
— occidentalis 261.
— orientalis 261.
— sanguinirostris 261.
— sanguinirostris orientalis 262.
— socia 262.
Queue de vinaigre 63.

R.

Raji 446.
Ramphocèle à bec d'argent 647.
— scalatte 653.
Rannas 191.
Rara negra 476.
Raſenweber-Fink, Gürtel- 185.
Raſpelſperling 459.
Rebhuhnaſtrild 105.
Red-bill 111.
Red-bird 539.
— Summer- 655.
Reisamandine 136. 141.
— **braune** 142. 677.
— **ſchneeweiße** 141.
Reisfink 141.
Reisfreſſer 141.
Reismäher 141.
Reisvogel 20. 25. 141. 154. 677.
— **indiſcher und chineſiſcher** 141.
— **ſchneeweißer** 141.
— **Zimmt-** 142.
Républicain à capuchon écarlate 322.
Republikaner mit ſcharlachrother Kapuze 322.
Rhamphocelus brasiliensis 645.
Rhamphocelus brasilius 645.
— coccineus 645.
— jacapa 647.
— purpureus 647.
— sanguinolentus 648.
Rhamphopis atrococcineus 647.
— coccineus 645.
Rhopospiza 437.
Riebammerfink 464.
Rieſenelſterchen 143. 144.
Rieſengirlitz 367.
Rieſenpapageifink 575.
Rieſenpfäffchen 571. 572.
Rieſen-Webervogel 292.
Ringlerche, große 607.
Ringelaſtrild 119. 121. 677.
Risquero 414.
Rodriguez-Webervogel 254. 680.
Röthelammer 588.
Röthelbabia 478.
Röthelſperling 442.
Roodkop 548.
Roodkopvogeltje 135.
Roodkop-wever 261. 264.
Roodstaart-vink 191.
Roſa-Dioch 261.
Roſenbruſtknacker 522.
Roſenkehlchen 522.
Rossignol de Virginie 539.
Roſtammer 590.
Roſtgimpel 383.
Rothaſtrild 87.
Rothbäckchen, blaues 99.
Rothbauch-Aſtrild 49.
Rothbruſt 522.
Rothbruſtamarant 89. 668.
Rothbürzel 59. 63.
— **auſtraliſcher** 111.
Rothbürzelchen 33.
Rothflügel-Aurora-Senegali 118.
Rothgirlitz 326.
Rothgirlitz, ſchwarzköpfiger 381. 383.
Rothhaubenfink 421.
Rothhaubentangara 641.
Rothkafferfink 245.
Rothkappe 550.
Rothkopf 135. 263. 264.
Rothkopf-Amandine 133. 135. 677.
Rothkopf-Dioch 264.
Rothkopfgimpel 502.
Rothkopfkardinal 550.
Rothkopfſperling 441.
Rothkopfweber 264.
Rothſchnabel 261.
Rothſchnäbelchen, graues 43.
Rothſchwänzchen 33. 60. 63. 87.
— **grünes** 111.
— **blaugraues** 63.
Rothſchwänzlein, kleines ſchwarzes 559.
Rothſchwanz, eigentlicher 60.
— **grauer** 63.
Rothſchwanzfink 124.
Rothſterzfink 124.
Rothvogel 526. 537. 539.
Rouge-noir 193. 245.
Roxo, crestudo 548.
Rubicilla americana 549.
Rubin d'Australie 113.
Rubinvogel 113.

Ruderfinken 514. 573.
Rilstvogeltje 141.
Rundſchnabel, ſchwarzer 559.
Rußweber 682.

S.

Sänger, grauer 362.
— grauer afrikaniſcher 362.
Sängerfink 362.
Sängerſchuppenfink 362.
Sänger-Weberfink, afrikaniſcher 158.
Safranfink 325. 403. 407.
— kleiner 408.
— der kleinſte 408.
— von Kolumbien 408.
Safranweber 314.
Sahara-Ammer 582.
Saira 399. 403.
Saltator 573.
— atricollis 574.
— coerulescens 574.
— flavus 657.
— gigantódes 575.
— icterophrys 575.
— magnoides 575.
— maxillosus 574.
— olivaceus 574.
— ruber 657.
— ruficapillus 576.
— rufiventris 575.
— similis 575.
— validus 574.
— Vigorsi 575.
Samenfreſſer 12.
Samenknacker 192. 194.
— blutbrüſtiger 193.
— weißgetropfter 194.
Samenknacker-Amandine, rothbrüſtige 193. 680.
— **geſchuppte** 193. 194. 680.
Sammtfink 236.
Sammtweber 229. 236.
Sammt-Webervogel 235. 236.
Sammtwida 236.
Sandlerche 617.
Sangaço 659.
Sangaſſu 661.
Sanſibar-Webervogel 252.
Sar Munia 160.
Sarbo Baya 275.
Saumammerfink 464.
Savannen-Ammerſperling 470.
Savannen-Sperling 470.
Saxicola pallida 630.
Sayacu 661.
Sayacu 661.
— brasiliensibus 661.
Scarlatte 646. 653.
Schahammer 591.
Scharlachbürzel 57. 58.
Scharlachſchwanz 189. 191.
— lauchgrüner 191.
Scharlachſperling 645.
Scharlachtangara 653.
Scheitelfink 401.
Schildammer 596
Schild-Malimbus 321.
Schild-Prachtwebervogel 320.
Schildwida 216.
Schildwitwe 216.
Schilf-Amandine 170. 171. 678.
— gelbe 172.
— weißbrüſtige 171.
Schilffink 171. 677. 678.
— braunrückiger 171.
— kaſtanienbrüſtiger 171.
Schilfnonne 171.
Schilf-Weberfink, gelbbürzeliger 172.
Schiſtochlamys 573.
Schlagammerfink 464.
Schleierbabia 576.
Schleierweber 293.
Schleppwitwe 215.
Schmalſchnabelkardinal 541.
Schmetterlingsaſtrild 99
— rother 101.
Schmetterlingsaſtrilde 93.
Schmetterlingsfink 19. 20. 33. 48. 52. 72. 93. 99.
Schmetterlingsfinken 32. 46. 87.
Schmuckammer 601.
Schmuckfinken 18. 27.
Schmuckpfäffchen 562. 563. 685.
Schmucktangara 657.
Schneeammer 599.
Schneeammerfink 456.
Schneeammerling 600.
Schneefink 456. 600.
— braſilianiſcher 567.
Schneelerche 600. 624.
Schneeortolan 600.
Schneeſperling 600.
Schneeſpornammer 600.
Schneeſporner 600.
Schneevogel 456. 600.
— blauer 456.
Schneevögel 390.
Schnurrbärtchen 450.
Schönbürzel 32. 59. 60. 63.
Schönfinken 64. 75.
Schönweber 246.
Schopfammer 597. 599.
Schopffink 426.
Schuppen-Kapweberfink 450.
Schuppenköpfchen 450.
Schuppenköpfchen 450.
Schwärzlinge 322.
Schwärzling, braunrückiger 323.
— gelbſtirniger 323.
— grauköpfiger 323.
— Mantel- 323.
— Zweifarben- 323.
— zweifarbiger 323.
Schwarzbäckchen 58.
Schwarzfink 183.
Schwarzflügler 645.
Schwarzgeſichtchen 418.
Schwarzgimpelfink 559.
Schwarzhals 596.
Schwarzhalshabia 574.
Schwarzkäppchen 569.
Schwarzknacker 561.
Schwarzkopfknacker 523.
Schwarzſchwanzkernbeißer 516.
Schwarztangara 610.
Schwarzweber 322.
Schwarzwebervogel, Arnaud's 322.
— braunrückiger 323.
— Emiliens 323.
— gelbſtirniger 322.
— grauköpfiger 323.
Seed-eater, St. Helena 376.
— himalayan 354.
— Mozambique 373.
— sulphureous 377.
— white-rumped 362.
— white-throated 367.
— yellow-rumped 364. 373.
Seedfinch, Tropical 561.
— Tropical black 561.
Seidenſtar 409.
Sénégali 88.
— Aurore- 77.
Sénégali, Aurore-, little 81.
— Chanteur 355. 362.
— à front pointillé 450.
— petit rouge 83.
— quinticolor 108.
— rayé 45.
— rouge 90.
— à ventre jaune 81.
— Zébra- 81.
Senegali, rothbrüſtiger 89
— Rothflügel-Aurora- 118.
— ſchön rother 91.
Senegaliſten 25.
Senegaliſt, kleinſter 87.
Senegalus ruber 88.
— striatus 49.
Senegalvögel 25.
Senserenico 415.
Septicolor 664. 665.
Serin d'Arcansas 395.
— des Canaries 350.
— des Cordillères 396.
— epin 396.
— à front jaune 376.
— à front orange 354.
— à gorge blanche 367.
— des iles Canaries 350.
— du Mexique 398.
— des montagnes indiens 399.
— à moustaches 378.
— de Magellan 394.
— de Mozambique 373.
— noir 397.
— d'or 392.
— pin 394.
— sulfureux 377.
— à tête noire 386.
— Totta 384.
Serinus 326. 370.
— aurifrons 354.
— barbatus 378.
— butyraceus 375.
— canarius 350.
— canicollis 366.
— chrysopygus 373.
— citrinelloides 400.
— flaviventris 366.
— ictera 373.
— leucopygos 362.
— leucopygius 362.
— luteus 448.
— musicus 362.
— nigriceps 400.
— pusillus 354.
— striolatus 380.
Sersur akonar 240.
Sheene-bax 162.
Shira 403.
Sichlerlerche 630.
Siebenfarb 664.
Siebelweber 280.
Sijsje, zwartkop- 386.
Silberaſtrild 119.
Silberbeckchen 158.
Silberfaſänchen 19. 49. 151. 158. 678
Silberkronfink 467.
Silberſchnabel 59. 158. 647.
Silberſchnabel-Amandine 155 158.
Sligero 394.
Silverbill, african 158.
— indian 159.
Simbax 162.
Singammerfink 463.
Sing-Ammerſperling 460. 463.
Sing-bax 162.
Singfink 463.
Singgimpel 362.
Singſperling 463.
Siskin, black 397.
— Himalaya- 354.
— indian mountain- 399.
— Magellan 394.
— mexican 398.
— Mozambique 373.
— pine 394.
— sulphureous 377.
— Totta 384.
— white-rumped 362.
— white-throated 367.
— yellow-fronted 376.
— yellow-rumped 364.
Sitagra luteola 314.
Sittichfink 192.
Sommer-Ammerſperling 474.
Sommerrothvogel 655.
Sonnenaſtrild 111. 113. 676.
Sparrow, Alario 383.
— Bahama 419.
— Bengal 275.
— black-chinned 460.
— black-throated 473
— Brewer's 460.
— Canadian 459.
— Cat 481.
— Cape 383. 439.
— chinese 168.
— Chingolo 469.
— chipping 459.
— Dinca 477.
— Dwarf 460.
— fox-colored 474.
— Field 460.
— golden 448.
— golden-crowned 468.
— grey-headed 441.
— Indian white-breasted 170.
— Indian yellow 275.
— Java 141.
— Jungle 446.
— Lark 473.
— Lincoln's 464.
— little brown 460.
— maritime 472.
— melodious 463.
— Mountain 444.
— Native 183.
— Savannah 470.
— Scarlet 645. 653.
— Song 463.
— Song-, Heermann's 464.
— Song-, white-throated 466.
— squat 653.
— Tree 459.
— white- crowned 467.
— white- throated 466
— yellow-necked 446
— yellow winged 472
Spaz, Angola- 439.
— einfacher 439
— Perchen- 473.
Sperlinge 437.
Sperling von Bahama 418.
— Baum- 442.

Sperling, braſilianiſcher 469.
— braunköpfiger 412.
— chileniſcher 469.
— domingiſcher 549.
— Fuchs- 474.
Gold- 446. 685.
Gold-, grüner 448.
— Gras- 471.
— St. Jago- 442.
— von Java 111.
— Kap- 438.
— kap'ſcher 438.
— Kehl- 444. 685.
— Kehl-, Augenbrauen- 446.
— Kehl-, gelbbrüſtiger 446.
— Kehl-, gelbhalſiger 446.
— Kehl-, grauköpfiger 446.
— Kehl-, größter 446.
— Kehl-, großer 446.
— Mottis- 442.
— Nacht- 477.
— Polar- 471.
— Röthel- 442.
— rothköpfiger 441.
— Schnee- 600.
— ſchnurrbärtiger 450.
— ſchuppenköpfiger 448. 450.
— Stein- 442.
— Stein-, kurzzehiger 444.
— Strand- 472.
— Swainſon's 439.
— Swainſon'ſcher 440.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung 438.
— Weiden- 441.
— Winter 600.
— Wüſten- 441.
— zweifarbiger 418.
Sperlingsammer 591.
Sperlingsaſtrild 183.
Sperlingsweber 254.
— Augenbrauen- 276.
— bärtiger 276.
— Mahali- 276.
— ſchwarzſchnäbliger 276.
— Swainſon's 440.
— Webervögel, eigentliche 276.
Spermestes acuticauda 153. 154. 678.
— **acuticauda**, *var.* **alba** 155.
— **acuticauda**, *var.* **flavomaculata** 155.
— **acuticauda**, *var.* **griseo-maculata** 155.
— **bicolor** 148. 149.
catans 155. 158. 678.
— **castanóthorax** 170. 171. 677. 678.
castanotis 108. 172. 177. 678.
cincta 183. 185.
— **cucullata** 145. 148. 678.
— **cyanóvirens** 192.
— **erýthrocéphala** 133. 136. 677.
— **fasciata** 127. 133.
— **ferruginosa** 166. 167.
— **flaviprymna** 172.
Spermestes fringillina 143. 144. 678.
— **fuscans** 161.
— **fuscata** 142. 677.
— **Gouldiae** 188. 189.
— **Gouldi** 186.
guttata 177. 180. 678.
— **haemátina** 193. 194. 680.
— leucogastroïdes 153.
— **leucotis** 187. 188.
— **Luchsi** 193. 194. 680.
— **Maja** 163. 166. 678.
— **malabarica** 158. 160.
— malacca 170.
— **malaccensis** 169. 170.
— melanocephalus 168.
— **melanopygia** 152. 153.
— **mirabilis** 189.
— **nana** 150.
— **nisoria** 162.
— **nitida** 181. 182. 678.
— **ocúlea** 182. 183.
— **oryzivora** 136. 141. 677.
— **oryzivora**, *var.* **alba** 141.
— **pectoralis** 171. 172.
— **personata** 186.
— **poënsis** 149. 150.
— **prásina** 190. 191. 678.
— **psittácea** 192. 679.
— **punctularia** 160. 162.
— **rufodorsualis** 150.
— scutatus 148.
— **sinensis** 167. 168.
— **striata** 151. 152. 678.
— **topela** 161.
— **trichroa** 191.
undulata 160.
Spermestinae 27. 125.
Spermeſtinen 27.
Spermophaga cyanorhyncha 193.
Spermophila albigularis 573.
— angolensis 561.
— bicolor 419.
— capistrata 568.
— cinerea 565.
— cinereola 565.
— Daubentoni 383.
collaria 566.
— gutturalis 569.
— hypoleuca 565.
— ignobilis 569.
— leucopógon 563.
— lineola 567.
— luctuosa 569.
— melanocephala 569.
— Morelleti 573.
— nasuta 561.
— nigra 560.
— nigro-aurantia 568.
— olivacea 117.
— ornata 563.
— pyrrhómelas 568.
— rubiginosa 568.
— torrida 561.
Spermospiza 192.
guttata 191.
— haematina 193.
Sphenura fringillaris 475.
Spiegellerche 611.
Spinites socialis 459.
Spinus 437.
Spitzſchwanzfink 186.
Spitzſchwanzmunie 153.
Spiza 437.
— amoena 437.
— ciris 435.
— cucullata 548.
— cyanea 430.
— dominicana 549.
— hyemalis 456.
— jacarina 425.
— larvata 549.
— Leclancheri 437.
— versicolor 437.
Spizella socialis 459.
Sporaeginthus 64.
— amandava 73.
— subflavus 81.
Sporagra barbata 400.
— magellanica 395.
— notata 396.
Sporenammer 599. 600. 686.
Sporenfink 600.
Spornammer 600.
— Lerchen- 600.
— Schnee- 600.
Sporner 599.
— Lerchen- 600.
— Schnee- 600.
Sporóphila 514.
— albogularis 569.
— americana 568.
— ardesiaca 565.
— aurantia 568.
— cineréola 565.
— collaria 566.
— Euleri 572.
— falcirostris 572.
— gutturalis 569.
— Hoffmanni 568.
— hypoleuca 565.
— intermedia 564.
— leucopsis 573.
— leucopterygia 570.
— lineola 567.
— luctuosa 569.
— Morelleti 573. 397.
— ochropyga 573.
— olivascens 572.
— ornata 563.
— plumbea 565.
Sporopipes frontalis 450.
— lepidopterus 450.
Sporothlastes erythrocephalus 135.
— fasciatus 133.
Springfink 401. 424.
Springfink, gehäubter 425.
Stagonopleura castanotis 177.
— guttata 180.
Stahlfink 198. 201.
— blauſchimmernder 201.
Stahlwida 201.
Stanleyzeiſig 396.
Steganura paradisea 207.
— sphenura 207.
— Verreauxi 207.
Steinbeißer, rother 539.
Steinſperling 437. 442. 443.
— **kurzzehiger** 444.
Stephanóphorus coeruleus 575.
Steppenlerche 609. 610.
Stictoptera Bichenovii 122.
Stictoptére de Bichenow 122.
Stiglitz 346. 401.
— amerikaniſcher 392.
— gelber 388. 392.
— grüner 104. 674.
— Himalaya- 402.
Stirnſchuppenfink 450.
Strand-Ammerſperling 472.
Strauch-Ammerſperling 476.
Streifenammer 581. 582.
Streifenaſtrild 119.
Strietvogel 600.
Strobilóphaga enucleator 501.
Struthus 437.
— atrimentalis 460.
— caniceps 457.
— hyemalis 456.
Stummellerche 614.
Stummelſchwänze 189.
Stummelwida 221.
Stummelſchwanzwitwe 221.
Stummelwitwe 221.
Sumpfammer 591.
Sumpfaſtrild 55.
Sumpfrohrammer 591.
Sycalis 401.
— arvensis 409.
— brasiliensis 407.
— columbiana 408.
— flaveola 407.
— Hilarii 409.
— luteiventris 409.
— minor 408.
Sycobius 225. 304. 319.
— cristatus 320. 321.
— malimbus 322.
— melanotis 321.
— nigerrimus 305.
— nigrifons 320.
— nitens 322.
Sylvia herbicola 475.
Symplectes princeps 294.

T.

Tachyphone couronné 638.
Tachyphonus capitatus 550.
— coronatus 638.
— coryphaeus 638.
— cristatus 641.
— cristatellus 421.
— fringilloides 421.
— gularis 550.
— leucopterus 640.
— melaleucus 640.
nigerrimus 640.
— piloatus 421.
— quadricolor 642.
— rubescens 422.
— sanguinolentus 648.
— Vigorsii 638.
Taeniopyga castanotis 177.
Taha 235.
— abeſſiniſcher 234.
Taha abyssinica 231.
— dubia 235.
Tal Babie 274.
Tallbit 501.
Tallbitarna 501.
Tamboer 275.
Tampoa 275.
Tanager, Archbishop 657.
Azara's 657.
— Bishop- 662.
— black 610.
— black, little 642.
— black-bonnet 667.
— black-shouldered 666.
— blue-shouldered 659.

Tanager brazilian 645.
— crested 641.
— crowned 638.
— Festive 666.
— green-headed 665.
— grey 661.
— Louisiana 656.
— many-colored 664.
— Mississippi 655.
— Palm 658.
— Paradise 664.
— quadricolored 642.
— red-breasted 647.
— sanguineous 648.
— scarlet 653.
— silver-blue 662.
— Suchil 642.
— superb 664.
— tricolored 655. 665.
— yellow 667.

Tanagra aestiva 653. 655. 656.
— archiepiscopus 657.
— argentata 659.
— atra 576.
— atriceps 575.
— auricapilla 642.
— axillaris 478.
— barbadoënsis 667.
— **brasilia** 643.645.646.
— **brasiliensis** 667.
— brasiliensis coerulea 667.
— brasiliensis nigra 425.
— brasiliensis varia 661.
— brunnea 638.
— **cana** 661. 662.
— capistrata 576.
— Cardinalis 645.
— cayanensis nigra cristata 640.
— cayanensis varia chlorocephala 666.
— cirrhómelas 641.
— coelestris 661. 662.
— coelestris mas. 659.
— columbiana 656.
— conspicillata 576.
— **coronata** 637. 638.
— coryphaea 638.
— **cristata** 640. 641.
— cristatella 421.
— cyanea 430.
— cyanocephala 666.
— **cyanoptera** 658. 659.
— diademata 575.
— episcopus 659. 662.
— **fastuosa** 662. 664.
— **festiva** 666.
— **flava** 666. 667.
— formosa 667.
— grandis 575.
— gularis 550.
— Gyrola 666.
— inornata 659.
— **jacapa** 646. 647.
— jacarina 424.
— jugularis 574.
— leucophaea 576.
— **luctuosa** 641. 642.
— **ludoviciana** 656.
— magna 574.
— malembica 320.
— maxillosa 574.
— melaleuca 639. 640.
— melanopis 576.
— melanoptera 658.
— **melanota** 666.
— mississippiensis 655. 657.
Tanagra muta 575.
— nigerrima 638. 640.
— nigro-aurita 550.
— olivascens 658.
— **ornata** 657. 658.
— **palmarum** 658.
— peruviana 666.
— praelatus 658.
— prima brasiliensibus 664.
— psittacina 573.
— **quadricolor** 642.
— **rubra** 648. 653.
— rubricollis 666.
— rufa 575.
— ruficollis 469.
— **saira** 656. 657.
— **sanguinolenta** 647. 648.
— **sayaca** 659. 661.
— sibirica 609.
— superciliaris 571.
— Swainsoni 661.
— **tatao** 664.
— **tricolor** 665.
— tricolor, *var. β.* 666.
— Trichroa 666.
— variegata 655.
— virens 659.

Tanagrinae 635.

Tangara, blaue 658. 659.
— **blauflügelige Tangara** 662.
— blaukäppige 665. 666.
— blauschulterige 659.
— blutrothe 647.
— brasilische 645. 667.
— von Kayenne 662.
— dreifarbige 665.
— dunkelblaue brasilische 667.
— Feuer- 655.
— **feuerrothe** 653. 655.
— geflechte grüntöpfige kayennische 665.
— gehäubte 641.
— **gelbe** 666.
— **goldgelbe** 656.
— **graue** 661.
— kappigte 641.
— von Kayenne 662.
— kanadische 653.
— **Kron-** 637. 638.
— **meerblaue** 659. 661.
— missisippische 655.
— **Palm-** 658.
— **Purpur-** 645.
— **purpurrothe** 643. 645.
— rothbraune 640.
— **rothhäubige** 640. 641.
— Scharlach- 653.
— scharlachfarbige 645.
— **scharlachrothe** 648. 653.
— **Schmuck-** 657.
— schwarze 640.
— **schwarzbraune** 646. 647.
— schwarzflüglige 658.
— schwarzkäppige 667.
— schwarzrückige 666.
— **siebenfarbige** 664.
— türkisblaue 667.
— **Trauer-** 639. 640.
— **Trauer-, kleine** 641. 642.
Tangara, vielfarbige 662. 664.
— vierfarbige 642.
— zinnoberrothe 656.
Tangara Archévêque 657.
— d'Azara 657.
— bleu du Brésil 667
— bleu de la Caroline 430.
— du Brésil 645. 665.
— à calotte noire 667
— du Canada 653.
— de Cayenne 641. 661.
— couronné 638.
— à dos noir 666.
— à épaulettes bleues 659.
— évêque 662.
— gris 661.
— de la Guyane 641.
— jaune 667.
— de la Louisiane 656.
— du Mexique 646.
— du Mississippi 655.
— multicolor 664.
— noir 640.
— noir, petit 642.
— palme 658.
— quadricolor 642.
— rouge du Brésil 645.
— roux 575.
— sanguin 648.
— septicolor 661.
— superbe 664.
— tacheté des Indes 661.
— à tête bleue 666.
— tricolor 665.
— varié à tête verte de Cayenne 666.
Tangare évêque 662.
Tangaren 635.
Tapirauga 645.
Tarin de la Nouvelle York 392.
— noir du Mexique 398.
Tausendschön 87
Tau-tesa 152.
Tela-Munia 62.
Telaskopfäffchen 570.
Telia Baya 275.
Tenie 192.
Tentilhao 401.
Tertor 298. 302. 306. 315.
Tertor-Webervogel 281. 288.
Textor Alecto 317.
— atrogularis 294.
— aureiflavus 301.
— castaneo-fuscus 302.
— chrysopygus 307.
— Dinemelli 319.
— erythrorhynchus 318.
— galbula 310.
— intermedius 318.
— larvatus 291.
— melanocephalus 288.
— melanotis 311.
— rubiginosus 303.
— spilonotus 296.
— vitellinus 307.
Teydefink 402.
Theklalerche 617.
Thraupis cana 662.
— cyanoptera 659.
— episcopus 662.
— olivascens 658.
— ornata 657.
— sayaca 661.
Tiaris comptus 426.
— cruenta 422.
— funerea 201.
— jacarina 425.
— ornata 426.
— pileata 421.
Tiaris pusillus 418.
Ticko-ticko 469.
Ticko-Ticko-rey 421.
Tigeraftrild 73.
Tigerbengalist 73.
Tigerfink 19. 25. 34. 73
— hochrother 71.
Tigervogel 73.
Tije guacu paroara 548.
Tijepiranga 646.
— brasiliensis 645.
Tintillon 401.
Tisserin Alecto 317.
— **Baya** 274.
— **Baya à cou brun** 275.
— **de Bengale** 275.
— brun noir 302.
— Cape-Moore 288.
— de Dufresne 58.
— à front d'or 299.
— dugazon à ceinture 185.
— jaune d'oeuf 307.
— à lunettes 295.
— **Manyar** 275.
— masqué 291.
— **masque, petit** 314.
— **melanotis** 58.
— melanogenys 58.
— Oriole 310.
— à poitrine châtaine 171
— à taches rondes 296.
Titmouse of Paradise 661.
— spotted green 661
Tohi-Vogel 481.
Tokanam Cooroola 271.
Tomegin 417.
Tomeguin del Pinar 415.
— de la Tierra 417.
Tordo de bosque coronado y negro 638.
— de bosque negro cobijas blancas 640.
Totta 384
Totta-Girlitz 349. 383.
Towhee 481.
— Bird 481.
— Bunting 481.
Trauerpfäffchen 568
Trauertangara 639 640. 642.
— **kleine** 641. 642.
Trauerwida 219.
— gelbschulterige 217.
— rothbindige 220.
Trauerwitwe 217. 219.
— gelbschultrige 218.
— langschweifige 219.
Trauerzeisig 387. 392 397.
Travailleur 258. 261.
Trichogrammoptila melanopygia 153.
— striata 152.
Trichothraupis quadricolor 642.
Tricolor 665. 666.
Trillerlerche 615.
Trompetergimpel 511.
Tropfenfink 28. 180.
Trugammerfink 464.
Trugammerperling 464.
Trumbettier 511.
Truppweber 261.
Tsa-bo-toung 274.
Tschá 638.
Tschérikó 373.
Türkistangara 667.
Turquin 667.
Tuti 488
— Amonga 488.
— Chota 488.
— Surklar 488.

U.

Ultramarinfink 201.
Unvergleichlicher 435.
Uraeginthus 93.
— granatinus 102.
— phoenicotis 99.
— pusillus 354.
Uragus 484.
— sibiricus 503.
Urobrachya axillaris 222.
Uroloncha 151.
— cantans 158.
— melanopygia 153.
— molucca 153.
— punctularia 162.
— striata 152.
Uropytelia 93.
Ussing 73.

V.

Venezuelafink 418.
Vengoline 363. 364.
Verdegais 341.
Verdier de la Chine 401.
— de la Louisiane 435.
Verdin algérien 401.
Verdinière 419.
Verdon 435.
Verzeichniß der Abbildungen XX.
— **der hauptsächlichsten Schriften über die fremdländischen Stubenvögel** XXII.
Veuve à collier d'or 207.
— à dos d'or 219.
— à épaulettes 215.
— à épaulettes jaunes 218.
— à quatre brins 213.
— à queue courte 221.
— à large queue 210.
— chrysoptère 219.
— de la côte d'Afrique 213.
— de l'Isle Panay 216.
— dominicaine 211.
— en feu 216.
— grande 211.
— grande d'Angola 207.
— Niobe 216.
— reine 213.
Vida dominicaine 211.
Vidua 207. 225.
— aenea 199.
— **albonotata** 220.
— angolensis 211.
— **ardens** 216.
— **axillaris** 221. 222.
— **caffra** 213. 215.
— decora 211.
— erythrorhyncha 211.
— **flaviscapulata** 217. 218.
— fuliginosa 211.
— **laticauda** 220.
— macrocerca 218.
— **macroura** 218. 219. 220.
— major 211.
— minor 211.
— **nitens** 198.
Vidua paradisea 202. 207.
— phoenicoptera 215.
— **principalis** 208. 211.
— **regia** 212. 213.
— riparia africana 213.
— serena 211.
— sphenura 207.
— Verreauxi, 207.
Viduae 195.
Viehweber 319.
Vieh-Webervogel 318.
Vieillot 417.
Vierfarb 131.
Vink, St. Helena 373. 376.
— groote St. Helena 377.
— Nonpareil 435.
Vögel, körnerfressende 12.
Vogel Armida's 402.
— gemalter 435.
— Neu- 600.
— Schnee- 600.
— Strict- 600.
Volatin 425.
Volatinia 401.
— Jacarina 425.
— jacarina 425.
— splendens 425.
Vorwort V.
Vuurvink 113.
Vuurvogeltje 88.

W.

Wachtelastrild 105. 107.
Wachtelastrilde 105.
Wachtelfinken 105.
Wachtelfink, schwarzkehliger 107.
Waldammer 588.
Waldhüttensperling 440.
Waxbill, african 43.
— australian 111.
— cinereous 63.
— crimson-eared 99.
— crimson-faced 104.
— Dufresne's 58.
— Dufresni's 58.
— grey 63.
— St. Helena 49.
— orange-cheeked 55.
— red-bellied 49.
— Zebra 81.
Weaverbird, Baya 274.
— Bengal 275.
— blue-beaked 193. 194.
— chestnut-backed 302.
— circle-spotted 296.
— common 274.
— crimson-crowned 240. 242.
— Crimson short-tailed 240.
— great masked 291.
— Grenadier 245.
— half-masked 307.
— large 288.
— little masked. 314.
— Manyar 275.
— olive 299.
— Oriol 310.
— Ox 317.
— red-beaked 261.
— red-faced 264.
— red-headed 251. 264.
— rufous-necked. 288.
— spectacled 295.
— St. Thomae 292.
Weaverbird yellow-shouldered 236.
— Amanduvade 73.
— black-eared 58.
— carmin 73.
— scale-headed 450.
Weaver-Oriole 288.
Weber, braunrother 302.
— dottergelber 307. 309. 312.
— gelbscheiteliger 296.
— goldgelber 301.
— goldstirniger 300.
— großer 292.
— kastanienbrauner 304.
— kastanienrother 303.
— Kutten- 144.
— olivengrüner 276.
— rothbrauner 301.
— rundfleckiger 296.
— rückenmondfleckiger 296.
— Sperlings-, Augenbrauen- 276. 278.
— Sperlings-, bärtiger 276. 279.
— Sperlings-, Mahali- 276. 278.
— Sperlings-, schwarzschnäbliger 276. 279.
— Swainson's 440.
Weberfinken 26.
Weberfink, Gitter- 150.
— Gras-, Gould's 188.
— Gras-, wunderschöner 189.
— Halsband- 132.
— Haarstrich-, weißrückiger 153.
— Kappen-, von Fernando-Po 150.
— Nonnen- 165.
— Papagei- 192.
— Sänger-, afrikanischer 158.
— Schilf-, gelber 172.
Webervögel 223.
Webervogel, Alekto- 315. 317.
— **Gelb-** 280.
— Algonda- 253.
— **Baya-** 265. 275. 683.
— **Baya-, gelbbrüstiger** 265. 683.
— Baya-, olivengrüner 276.
— **Bengalen-** 265. 275. 683.
— **blutköpfiger** 265.
— **Bojer's** 301.
— **Brillen-** 294. 295.
— **Büffel-** 318.
— **Büffel-, hellschnäbliger** 317.
— **Büffel-, weißköpfiger** 318.
— **Cabanis'** 293. 684.
— **dottergelber** 305. 307.
— eigentlicher 281. 288.
— einfarbiger 300.
— **Feuer-, abessinischer gelber** 235.
— **Flammen-** 241.
— flügelbindiger 308.
— gelber 307.
— gelblicher 310.
— gelblichgrüner 291.
— **gelbscheiteliger** 296
— gemeiner 281. 288.
— Gold- 300.
Webervogel, goldgelber 300.
— **goldstirniger** 297. 299.
— großer 288.
— Gürtel- 292.
— **kastanienbrauner** 301. 302.
— Kolonie- 254. 279.
— Komoren- 253.
— kleiner schwarzbäuchiger 246.
— **Larven-** 289. 291.
— **Madagaskar-** 230. 247. 251. 680.
— **Manyar-** 265. 275. 683.
— **Masken-** 311. 314.
— **Mauritius-** 253. 265.
— **Napoleons-** 230. 231.
— olivengrauer 310.
— **olivengrüner** 297. 299.
— **Orange-** 237.
— **Oryx-** 228. 243.
— **Pirol-** 309. 310. 684.
— pomeranzengelber 301.
— **Pracht-, glänzender** 322.
— **Pracht-, Hauben-** 320.
— **Pracht-, Malimbe-** 322.
— **Pracht-, Schild-** 320.
— **Pracht-, schwarzohriger** 321.
— Prinzen- 294.
— Riesen- 292.
— **Rodrigez-** 254. 680.
— rosenrother 682.
— rothäugiger 311.
— rothbrauner 303.
— **rothköpfiger** 254. 236. 264. 265.
— **rothschnäbliger** 255. 261. 681.
— rothschnäbliger äthiopischer 256. 681.
— rothschnäbliger gelbwangiger 682.
— rothschnäbliger rosenrother 256.
— **rothschnäbliger, Ruß'** 681. 682.
— **Sammt-** 229. 235.
— **Sansibar-** 252.
— Schwarz-, Araaud's 322.
— Schwarz-, braunrückiger 323.
— Schwarz-, Emilien's 323.
— **Schwarz-, gelbstirniger** 323.
— Schwarz-, granköpfiger 223.
— Schwarz-, zweifarbiger 323.
— Speke's 294.
— schulterfleckiger 303. 684.
— schwarzer 304. 305.
— schwarzhäuptiger 297.
— schwarzkehliger 293. 684.
— schwarzköpfiger 281. 288.
— schwarzohriger 311.
— schwarzstirniger 293.
— **Textor-** 281. 288.
— tiefschwarzer 305.
— Vieh- 318.
— **weißschnäbliger** 315. 317.

Webervogel, zitrongelber 311.
Wechselammer 589.
Wectitje 207.
Wedelpfäffchen 570.
Weduwe, Paradys- 207.
— roodbruin zwarte 207.
witzwarte 211.
Wee-bong 182.
Weidenammer 578.
Weidenperling 441.
Weißschnabel-Aleltovogel 317.
Weißbauchmunie 153.
Weißbäckchen 188.
Weißbärtchen 563.
Weißbürzel 364.
Weißhalsperling 466.
Weißkehle 367.
Weißkronfink 467.
Weißkronperling 467.
Wever, castanjebruin 302.
— gewone 274.
— Javaansche 275.
— roodbruinnek 307.
— roodkop 261. 264.
— roodneck 288.
— kleine gele zwartkop 314.
Whydah-bird, long-tailed 215.
— Paradise 207.
Wida-bird 211.
Wida, Dominikaner 197. 10.
Widah-bunting 207.
Widafink, Atlas- 491.
— breitschwänziger 220.
— **Dominikaner-** 208.
— **gelbrückiger** 218.
— **gelbschultriger** 217. 218.
— **Hahnschweif-** 213.
— **Halbmond-** 216.
— **Königs-** 212.
— **kurzschwänziger** 221.
— **Paradies-** 202.
Widafink, rothschnäbliger 210.
— **stahlblauer** 198. 201.
— stahlgrüner 199.
— **weißgezeichneter** 220.
Widafinken 195.
Widow, broad-tailed 220.
— short-tailed 221.
— yellow-shouldered 218.
— yellow-backed 217.
— -bird, dominican 211.
Winterammerfink 456.
Winter Ammer-sperling 451. 456.
— braunschultriger 456.
— grauer 457.
— grauköpfiger 457.
— vom Oregon 456.
Winterfink 428 456.
Winterlerche 624.
Winterling 600.
Wintersperling 600.
Witwe mit Achselbändern 215.
— mit vier Fäden 213.
— gelbschultrige 218.
— mit dem goldnen Halsbande 202. 207.
— heitere 210.
— Nisbe- 216.
— rothschnäblige 210.
— schaftschwänzige 213.
Witwenvögel 195.
Worabe 232. 234.
Worabée 234.
Worabey 284.
Wudscherck 317.
Wüstenfink 511.
Wüstengimpel 504. 511.
— düstrer 512.
Wüstenläuferlerche 630.
Wüstenlerche 616.
— zweibindige 629.
— zweibindige kleine 630.
Wüsten-Siebenstreifen-ammer 581.
Wüstenperling 441. 444.
Wüstentrompeter 508. 511.

X.

Xanthodina albigularis 445.
— dentata 445.
— pyrgita 446.
Xanthomelaena 228.
Xanthophilus aureoflavus 301.
— sulfureus 307.

Z.

Zanger 366.
— geele 373.
— groote gryze 367.
— gryze 362.
Zaunkönig, indischer blauer 96.
Zanzibar-Foudi 252.
Zebra-Amandine 130. 172. 176. 678.
Zebra-Diamant 173.
Zebrafink 20. 22. 178.
Zebravink 177.
Zébré d'Australie 173.
Zedernammer 590.
Zeisige 384.
Zeisig, abessinischer 400.
— amerikanischer 392.
— von Arkansas 395.
— bärtiger 399. 684.
— **Fichten-** 393.
— **Gebirgs-** 399.
— **kalifornischer** 398.
— **von Kolumbien** 397.
— **Kordilleren-** 395.
— **Magellan-** 394. 684.
— Masken- 400.
— **Mönchs-** 396.
— **mexikanischer** 397.
— von Mexiko 398.
— olivenfarbner 394.
— schwarzer 397. 448.
— schwarzbärtiger 378.
— schwarzbrüstiger 396.
Zeisig, schwarzköpfiger 384. 386.
— **Stanley-** 396.
— **Trauer-** 387. 392.
— Yarrell's 398.
— Zitron- 400.
Zeisiggrünling 399.
Zeresastrild 111. 116.
Zierammer 583.
Zierfink 104.
Zierfink 428. 459.
Ziertangara 657.
— blauköpfiger 437.
— vielfarbiger 437
Zilverbekje 158.
Zimmtreisvogel 142.
Zinnobertangara 657.
Zitronfink 384.
Zitronvogel 301.
Zitronvögelchen 81.
Zitronzeisig 400.
Zonaeginthus bellus 182.
— nitidus 182.
— oculeus 183.
Zonogastris 64.
— citerior 104.
— lineata 119.
— phoenicoptera 119.
Zonotrichia 437.
— albicollis 466.
— leucophrys 467.
— melodia 463.
— pennsylvanica 466.
— savanna 470.
— socialis 459.
— subtorquata 469.
Zuckervogel 344. 350.
Zügelastrild 50. 668.
Zwartkeel-nonnetje 167.
Zweifarbenammer 596.
Zwergammer 588.
Zwergammerfink 460.
Zwerg-Ammerperling 460.
Zwergastrild 87.
Zwergelster-Amandine 150.
Zwergfink 87.
Zwergpfäffchen 570.
Zwergsperling 442. 460.



636.6 .R958 C.1
Die fremdlandischen Stubenvoge
Stanford University Libraries
3 6105 031 365 484

SYSTEMATIC
BIOL. LIB.

NAT.HIST.
send to dep

636
R9
v.1

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.